

Prefatio Florae Carvisinae

Flora hring.

Entomobrace.

Zygonetne

34/0026 - 1

34/0026 - 2

Profatio Florae Carviniensis

Agri Carviniensis Plantae, quae jam
asque ab etate maxime cur-
suere mihi, nondum hactenus,
quod sciam, ab ullo botanico viro
eligitae minisque mihi perlustra-
tae. Quam ob causam in patria
bellus quoad botanicam + dia neglecta, + hinc propterea omni luce
obscuraque foret (permaneret), perperis temporibus,
potissimumque a vehementi in
hoc studium ardore impulsus
lotis nervis, hanc plantas colli-
gendas definiendasque curavi,
earumque nunc tandem enumera-
tionem, utcumque, deinceps, bota-
nicisque timidus propono enu-
merationem facere, et quis dubitat
adhuc imperfectam, quippe quae veris-
simis haud maturis et ex novo
provis elaborata, sed quam, quasi
rudimentum, magis in dies, Deo
favente, distorem atque emenda-
tionem reddam.

Antequam catalogum exponam
pauca libet dicere.

Provincia Carvina, qualis hodie
habetur, nequequam naturalibus
finibus circumscripta est: Septem-
trionem versus finitimas habet
Bellunensis, ita Oceanum Victinos,
vix Patavinos, ad meridiam postremo
et orientem provincias Venetam
et Forojuliensem. Per mediam
fore provinciam Plavis flumen
interfluit, quae ex Alpibus Carni-
cis originem trahens, prope arces
Bellunum et Jellnam percurrit
et variis inter anfractibus in
lacunas venetas placide valie-
tur ad ostia. Del Cavallino.

Partem montanum, partem plani-
um est provincie solum; sed
planities prevalet: ad boream
primi sunt montes, & qui-
bus prestant: M. Grappa, M.
Cimane, M. Montebelluna, M. Indu-
nion, M. Pieve, M. Cresp, alijque
varie appellati et natura, stipen-
ditum, calcarea donati; hi deinde
ad meridiem declinant et colles
evadunt, natura pinguis,
qui pro totam provinciam,
quasi in terminum procedentes
collibus suis, pinguibus protis,
peranginis umbis audire enor-
mantur (ita ut Cingulum Veneris merito deantur)
mater ^(messina) et typhina botano-
pholis suggestantes.

Sylva Montebello, in insula Italia + cum viginti lapides circum-
pacta magnitudinem et naturam complectuntur, et spatium sylvarum
unica, plures ex diversis collibus in ellipsim per productum per
irregularis et fonsoro tegmine 6230 hectaria fere extendit;
operit: opus borealem oram ^(per 10,500 metra)
fl. Nivis jante lambit, ^(equi)
plantas sive ex montibus
affert ^(pro loco) pinguinas ac ^(pro loco) peculiare; ita ut regio fiat in hac
ita ut hec omnia videri re pinguas.
parva ardua, proclives Tar-
rinas longas una colligantur ^(pro loco) talia mellea un tal luogo, pinguas
alut, tum proclives, agrestes, per filologos tesori de omni mellea
nervosales, fluiditatis cum
montanas et alpe perfectione
alut.
sed hec sylva pariter ac thesauris
botanicis redundans, memora-
bilis est in historia: quapropter
non inutile duo de ea nominibus
distendere.

Antiquis temporibus, nempe
iustis sequi, ^{XX} post Ch. natum
minime illi sylva infidebat,

cippe dimetis vidui, et ita
sylvae fieri, quae hodie superest
et lunariabilis.

Sylvam hanc quondam haud
institeris, sed contraea illic morta-
lis habitasse, documenta sibi
adhuc nobis saepe composita
factum firmiter comprobant:
oppidorum fundamenta, habi-
tationum rudera, armorum
que et suppellectilium reliqua
sa et obsoleta vestigia hinc
eruta ipsi vidi, legitque pedulo
pariter ac historiis selectissimus
patruus Alexander Sauerus qui,
perbrevis, supra exhibitam
Marcelli historem benevale
communiavit.

Nunc fortasse de vegetabilibus
generali aspectu ^{quidam} ~~quidam~~ ^{hanc} ~~hanc~~ ^{equum}
erit, sed hoc nunc perfermito.
et quia a nobis parum abhinc
terre aspectum in floris pri-
mitis descriptum reperies et
quia hoc adhuc immaturum
~~est~~ dicam.

Non erit potius abs re uti
per arij absolvam de
nostratibus quibusdam
varioribus: sed antea lectorum
admonitum volo uti recte intel-
ligat: ~~nam~~ ^{nam} vegetabilia, quae
hic nominabo, alibi, per arij
in editionibus, vulgaribus sunt
sed tantum pro loco nostro
rariora censenda credo.

Musei ex M. S. Polo Cerevisi.

Nothura crispa

Arumida vitellina

Euphonia trinitatis

Hippom. molluscum

" corpe datum

Cypripedium calceoligium

H. stellatum

H. cyprinae formae

H. purum

Principali Monti nella prov. Trivigiana
(desunti dalla gran carta geogr. del Reinst. di Artaria)

M. Sabbioner	Presso Borso
M. Legnarol.	Crespan
M. Calchera	Crespan
M. Meda	
M. Grappa	Crespan
M. Bouaor	
M. Pizzo	Crespan
M. Zei	
M. Monfenera	Pedrobba
M. Perlo	Segusino
M. Zugo	Valdobbiadene
M. Concone (Pudimione)	
M. Cesen (W) mt. 1571.80	Valdobbiadene
M. Orsere	
M. Ceone (W) metri. 1453.57	Miane
M. Grave	
M. Calvadella	Mareno
M. Praderadego	
M. Grastura	Lago
M. Cimone (W) Mt. 1536.00	
M. Cima sopra Lago	Lago
M. Guebianca	Lisone
M. Cor	Serravalle
M. Paris	
M. Limon	Origo
M. Stella	
M. S. Marghera	Origo
M. Pizzoch (A) M. 2183.55	
M. Croce	Fregona
M. Toel	
M. Mareggia	Osigo
M. Costa	
M. Campo	Refrattalo
M. Fracchini & M. Capricolo	
M. Gaglio	Soligo
M. Villa	
M. Cucco	Barbisan
M. Salder . M. Rova	Maser e Cornuda

La gran carta geogr. del Veneto ^{a. 1844} fogli di 0,66^m base e 0,42^m alti.
In essa sono notati tutti i confini, le strade, le acque, i monti, le varie qualità del ter-
reno, i boschi, i paesi (indicati variamente secondo la grandezza loro); sono notati
i vari nomi di località secondo varie e incalcolabili; i ponti, i navigli, i fiumi,
e altre particolarità che non rinveniamo ne in altre carte principali, né in
topografia. La ebbe in stampa, prestata dal Ch. F. Cabello, il quale consegnò
a Milano

Principali Monti nella prov. Trivigiana
(desunti dalla gran carta geogr. del V.ist. d. Artaria)

M. Sabbioner	Presso Borso
M. Segnarol	{ Crespan
M. Calchera	{ Crespan
M. Neda	{ Crespan
M. Grappa	{ Crespan
M. Bouaor	{ Crespan
M. Pizzo	{ Crespan
M. Zeri	{ Crespan
M. Montenera	{ Crespan
M. Pello	{ Crespan
M. Zogo	{ Crespan
M. Conione (rudinione)	{ Crespan
M. Cesen (W) mt. 1577.80	{ Crespan
M. Orsere	{ Crespan
M. Cone (W) mt. 1453.57	{ Crespan
M. Grave	{ Crespan
M. Valvadella	{ Crespan
M. Praderadego	{ Crespan
M. Grastura	{ Crespan
M. Cimon (W) mt. 1536.00	{ Crespan
M. Cima sopra Lago	{ Crespan
M. Grocetranea	{ Crespan
M. Cor	{ Crespan
M. Paris	{ Crespan
M. Limon	{ Crespan
M. Stella	{ Crespan
M. S. Magarba	{ Crespan
M. Pizzoch (A) M. 2183.55	{ Crespan
M. Croce	{ Crespan
M. Toel	{ Crespan
M. Maroggia	{ Crespan
M. Costa	{ Crespan
M. Campo	{ Crespan
M. Prachin	{ Crespan
M. Ciglio	{ Crespan
M. Villa	{ Crespan
M. Cucco	{ Crespan
M. Salder	{ Crespan
M. Rocca	{ Crespan

La gran carta geogr. del Veneto ⁱⁿ fogli di 0,66" base e 0,42 alt. in essa sono notati tutti i confini, le strade, le acque, i monti, le varie qualità del ter. renos, i boschi, i paesi (indicati variamente secondo la grandezza loro) sono notati i vari nomi di località secondarie e inscolabili, i ponti, e variati sentieri, ma altre particolarità che non rinveniamo né in altra carta preziosa né in topografia. La ebbe in stampa, prestata dal Ch. F. Caballo, il quale consegnò a Milano

Ipsometria della provincia di Treviso.

tratta dalla Enumerazione ipsiometrica dei numerali della provincia veneta
art. II. Ipsometria. — pagine 72, 73, 74, 89, 90, 91.

	Bosco Campiglio, campo di Me- do al di sopra della casera		Alolo, porta della rocca	312.57 C.
W.	Cadellin	1260.00	M. Grappa	1724.90 B.
W.	B. Campiglio, Salario del Ma	983.10	— Dom. tra il M. Grappa e	
W.	— Capra Marpura	972.72	il M. Ajolon	1411.65 W.
K.	Cortina	124.71	Castelfranco	28.15 P.
W.	— albergo alla rocca, 2° piano	142.50	— Pila della torre	46.00 C.
	— Cima bianche, punto più culminante della strada, che Sta dal Tirolo conduce nel Veneto		Cavaso, chiese	256.68 W.
K.	Conegliano (Stef. 170)	48.57	Postagno, tempio di Lancia	282.79 W.
Co	Castello di Conegliano	170.00		
Δ	— torre del castello	168.80	Spiguarina delle Albeurature	
Mo.	— stazione della ferrovia	82.20		
K.	— Albergo alla rocca, 2° p.	59.90	W. Wolf, Höhenbestimmungen in den venetianischen Alpen. (in Jahrb. geod. K. A. 1857)	
W.	— " Antoniazzi, 2° p.	70.81	K. Kriegl, Meteorische und geo- graphische Ortsbestimmungen. Prag. 1847.	
C.T.	Follina, N. Col del Mor	2309.40	St. Stefani, Esicuario corografico del Veneto. Milano 1854.	
Mo.	Lancuzza, stazione ferrovia	26.27	Co. Constanza des temps, 1837.	
W.	S. Leopoldo, N. di Tovernina	708.10	C.T. Carta topografica del P. lomb. do-venet. Milano. 1855.	
Mo.	Mogliano, stag. ferrovia	7.99	Mo. De Mortillet G. Ipsometria della rete delle strade ferrate lombardo-venete (atti della re. it. di sciog. nat. Alb. 1858)	
W.	Pederobba, albergo, 1° p.	200.09	J. Huchs. Die Venetianer Alpen, Wien 1845.	
W.	Piave, stag. ferrovia	70.56	B. Berlaquet, Des combustibles et forêts existants nella prov. Verona. Verona, 1816.	
W.	— 10 più al di sopra di Piner	184.03	Δ Baumgartner, Topographisch bestimmte Höhen von Oester- reich. Wien, 1832.	
J.	Pieve di Soligo, piazza Duomo	152.00		
Mo.	Preganziol, stag. ferrovia	12.26		
C.T.	S. Salvatore, torre	1.54		
W.	Serravalle, alb. imperator, 1° p.	140.97		
C.T.	— N. Col Vicentin	1754.40		
W.	— lago in Val di Mareud	236.96		
W.	Sonico, capo del guardabordo	417.52		
K.	Spresiano	42.04		
Mo.	— stazione ferroviaria	54.06		
W.	Tai, orrendo alla strada	850.31		
W.	Tre satti, detto tra Cortina e Amdaro	2114.70		
C.T.	Treviso, pie della torre della città	10.81		
1				
Mo.	— stazione ferrovia	14.34		
	Valdobbiadene. M. Maufe			
W.	vera	144.80		

Amoenitates zoologicae.

Insectorum mycetophagorum, Molluscorum et Reptilium
provinciae Taurinae catalogos vide retro. —

Catalogus Entomothraccorum in Venetis Provinciis
ad Deum detectorum.

Branchiopoda.

- Cypris* conchacea Latr.
 " rubra Desm.
 " aurantia Desm.
 ? " ornata Desm.
 " fusca Straus.
 " levis Müll.
Daphnia Pulox Latr.
 " rosea
 " brachiata Desm.
 " ~~maculata~~ bipinnata
 " simia Gruth.
Lynceus striatus
 " lyphaericus
Cyclops vulgaris Lach.
 — α . rubens
 — β . albidus
 — γ . fuscus
 — δ . prasinus
Cyclopsina Castor M. Edw.
 — α . ceruleus
 — β . rubens
 — γ . laciniatus
 " staphyglina M. Edw.
Cephalocyclops stagnorum Lnk.
Siphonostoma pataurinum Lac.
Branchipus stagnalis Lnk.
Argulus foliaceus Char.
Ayas canceriformis Latr.

- C. stigmata* Müll.
C. pubera Müll.
D. longispinus Müll.
D. quadrangula Müll.
D. Bavariensis Lac.
D. naja

2. marmoratus

Die XIII^a Junii in fatis circa Quatuordecim Sylq. Egr.
sequentes automata in varietatibus.

Daphnia quadrangula? sublimbea; choma anterior et posterior
obtusae acuminata (hanc anterior reflexa); fusca; *Daphnia*
Pulex dimidio minor. Tab. II^a fig. 4.

Cypris levis Müll.: globoso-ovata, levis, virens; oculis
duobus nigris. Tab. III^a fig. 1. a. b.

Nais digitata Müll. Volvox glabator L. cep. of. prima; (1). Tab. VII^a fig. 4. ha.

" *serpentina* Müll. Tab. I^a fig. 3.

" *litoralis* Müll.

" *barbata* Müll. In nova solita Sylq. Encycl. t. 56 fig. 1. 2. 3.

" *brunata* Nado

" *br. diandra* N. Charab. v. in MS. Tab. VII^a fig. 1.

" *barbata* N. Char. v. in MS. Tab. VII^a fig. 2.

Pedunculus columba L. Ped. Op. II. nat. p. 201. P. ad. Pinnagris

" *gallin.* - Th. gallin.

Daphnia Pulex palarum differt a *D. Pulex barbata*
hinc notis: aculeo caudali duplo longiore et fronte
minus prominula; ab utroque ventris habenda est.
Attentius *Daphnia palarum* observata, aculeus ejusdem
non tantum duplo longior patuit sed minime dent.
alio simulatus, unde haec *Daphnia* ~~haec~~ est species
distincta et referenda ad *Daphniam longispinam*
G. Mülleri.

Lyra la Paludosa impura haec vivente la *Vorticella*
annularis Müll. deui. Ross. Verui III p. 259. Encycl.
Tab. 24 fig. 23, 24.

Daphnia longispina Müll. ^{albo-argentea} ovato-lunularis, ^{caeteris aculeata} rostri nasiformi, aculeis
aculeo caudali tertium corporis partem aequante, aculeolato. Tab. II^a fig. 3.

Tubus interius loquax virens.

Daphnia pulex Müll. ^{oblique} ovato-ventrura posteriori, truncata, mutica, tenuissima
aculeolata, rostro subrecto, aculeolato. Tab. II^a fig. 2. a. b. c. d. e.

Obs. Cum clypeus in hac specie posteriori brevior sit ac in aliis
speciebus, facillime extremitas postica corporis exit et vix la pro-
baleis duobus majoribus terminata est et, dorsum versus, alio mino-
ri aculeis setae limbat. - *Tubulina virens*, ova fusca.

Cypris pubera Müll. globoso-elliptica, undique puberula, virens.

saep. obscura-zonata. Tab I fig. 1. a. b. et in Diario 1863.
Tab. in stagnis horti botanici. Patavini, ubi primum. Legi. 1863. Gulio.
Observ. sepe vidi hujus speciei animalcula molluscis planatilibus adhaesa,
signanter conche Valudius muricatus Linn., undiq. penetrare inter corpus
et concham ejusdem Valudius, ita ut illa ^{obscure} ^{molitur} afficeretur.

Daphnia Pulex Lats. Fac. Cat. Entom. Trid. p. 5. n. 4.
valvis ovatis, ^{postice in aculeum ~~productis~~} ~~enata~~ ^{postice suturae valvarum} ~~productis~~
~~persequi~~ ^{acuminatum}, breviss., ^{in integram} ^{in latitudinem} productis.

Daphnia longispina. valvis ovato-semilunatis, postice in acu-
leum ^{lineari-} ~~truncatis~~ ^{medium} ~~productis~~ ^{acutum}, tertio corporis
longiore, ^{productis}.

Daphnia Simia valvis ovatis, ^{postice} oblique truncatis et muti-
cis.

Daphnia nasuta. valvis ovatis postice subrecte truncatis
et ad utrumque angulum ventralem aculeo minimo, acuminato
donatis. — Vide Tab III^a fig. c. d.

Daphnia Pulex. Valvae ovatae inferius rotundato-ventricose,
superius medio ^{quadrangulae} reticulatae. Aculeus in extremitate postica
suturae dorsalis valvarum, dorso potius quam abdomini proxi-
mus, acuminatus, brevis, integer. Rostrum acuminato-acutum
nihil extorsum arcuatum. Oculi nigeri. Tergitum fuscum,
albida, roseae, Ova nigra, vel albida ^{placida} ^{centro} obscura.

Dimensiones variae. Exemplaria Patavina: Cetera long. 1.5–2 mill.
latit. 1: Sylvae lecta long. 2–2,3 lat. 1.3.

— Incedit lente, natans supra dexterum latus.

— Vorat animalcula minora: sepe vidi persequi *Synceum sphae-*
ricum et anaphe-^{tem} ^{prosequi} ^{edere}.

— Hab. in fossis ^{et} fluctantibus Selva et in piscinis h.
b. Patavini copiose sed rarius ab aliis *Daphniis*.

Cyclops. vulg. viridis long. 2^m lat 8^m obdutus vortellus
viridis. — *Cyclops* ^{viridis} ^{concolor} long. 1.8–2; lat 5^m
ova nigra viridia, centra fulva. (nra 8)

In stagnis Patavina: *Daph.* *Pulex*, *D. Simia*, *D. nasuta*, *D.*
hyalina in *D. barinensis* hexagono. circulari. distinctissimum.
in *D. Pulex* ^{in *D. longispina*} ^{quadratum}
in *D. Simia* ^{diminuat} ^{horizont. parallelum}.

Naup longistha: ~~o~~ linearis, albo-pellucens; capite ovato, bioculo
 to, ^{thoracico} thoracice segmentis duodecim; setis caudalibus duabus
 tertiam corporis partem superantibus. In Shapiro Bavaria

Cylops vulgaris var. albidus-pellucens, oribus angustis et dilatis
 auriculis - long. 3^{mm} lat. 3^{mm}.

Cylops vulgaris var. albidus et nigro marmoratus;
 cauda medio albida, extremitate nigra - long. 2^{mm} 5, lat. 6^{mm}
 ova fusa.

Daphnia sinuata, portice truncata ita ut angulum efficiat
 fere acuminatum. ova terrea

Lyncus sphaericus diametro 3-4^{mm}, sub sphaericus

Euprobella bioculata De Blain. L. Mar. Hist. 2. 467
 elongata, margine ^{sub}crenulato, cinerea, oculis duobus.
 In fossis aquarum Silva

Hemaphys piscium Sav. elongata, antice attenuata, extre-
 mitatibus dilatata, virenti-nigra punctulis subulatis
 confecta, oculis aut quatuor.

Daphnia marmorata valvarum rete nullum et pro eo
 adnunt punctuli papillares.

Planaria biornis: elongata, ex griseo cinerea nigro vari-
 gata ^{subtus pallidior} antice truncata et bicus corniculis, acutis, brevibus,
 retractilibus instructa; ocellarum sub-50. erig. fimbriati, senni-
 circulari; portice attenuato-rotundata. - Tanto Ehrenberg
 hunc nomen imperandum, est: *Polycelis bicornis*
 Fab. in fonte purissimo, nascenti. Del Foraneo, ubi
 copiosa exemplaria in versantes petris immeritis ad
 Geminarius pulch. ibi frequens haec planariam in fossis
 et ovata - L. Gm. Syst. p. 3089. Rose Verm. 2. 205
 Encyclop. tab. 80 fig. 23. - Long. 16^{mm} lat. 4^{mm}

? *Daphnia rotunda* Staur. ^{Testa ovata} sub sphaerica, mutica, antice su-
 perius sinuata, corniculis porrectis brevibus; setis duabus
 longissimis ac caudalibus.
 setae caudales medianae corporis partem exaequant
^{articuli unius dubius} ^{viscosa} rete nullum, velis papilla-

Eupodella testacea. *longata* (15^m) *testacea*; oculis octo
nigris, quatuor antici^{bus} & coniung^{untur} utrinque *latius* duobus
posticis. — *Xephelis testacea* Mull. in Dr. *Sup.* 2. 540
In aquis selva et Quinto. 1862. 1863.

Observavi generationem *Eupodellae bicalatae* Blainv., quae
ita evenit. Mater se medio corpore inferiori quatuor vel
quinque natas parit, qui illic movent adhaere aliquo
tempore, ut maiores et tutiores fiant; dehinc sese sepa-
rant et iterum abs ea gerunt.

Vidi etiam ~~*Lyman*~~ *Lyman* ~~*parvula*~~ novellae *Cyclopsinae* Castorij
qui bene conveniunt cum figuris *Schwanida* Doct. 103 f. 83. 6.

Osservatione rectius il *Siphonostoma* *gabarinum* Lac. ^{quod} ~~que~~ ^{est} ~~est~~
da varie tempore observato che fra i suoi ^{anteriori} ~~anteriori~~
di questo animalletto si vedeva giacere un corpuscolo testicolare
strinato, tripudiale, il quale ~~pareva~~ ^{pareva} comunicare col
tubo uterinale. Ora avviene che io dopo avere attenta-
mente osservato tal corpuscolo, val. comprimere l'animale
fra due vetri, e allora con mio grande stupore osservai
che quel corpuscolo si era risorto all'infiori inferius allo
esopageo, ed il tutto rappresentava il *Siphon*, cui io
non poteva vedere in alcuni individui e in altre specie.

Daphnia latiorata Desm. Conf. 375 pl. 54 f. 6. Monulus
latioratus ^{thunbergi} ~~thunbergi~~.
Testa ovata, ^{reticulata} ~~reticulata~~, ^{antice} ~~antice~~ ^{supra} ~~supra~~ ^{excavata} ~~excavata~~, clypeo occi-
picali acuminato, exserti, ^{postice} ~~postice~~ ^{breve} ~~breve acuminata.~~

D. cristallina Mull. Bas. 2. 275. Gmel. 3000.
Testa ovata, antice ^{supra} ~~supra~~ ^{excavata} ~~excavata~~, ^{postice} ~~postice~~ ^{in lobulum} ~~in lobulum~~
rotundum, brevem producta; ^{cauda} ~~cauda~~ ^{flexione} ~~flexione~~ ^{exserta} ~~exserta~~, uti
duis caudalibus, bistrutatis, longioribus.

~~*Lyman*~~
Siphonophorus.

Chelae duae anticales, ^{embraceae} ~~embraceae~~, articulis quatuor terminatae.
Oculi duo distincti, ^{sub} ~~sub ^{clypeo} ~~clypeo ^{cephalico} ~~cephalico~~. Os ^{hauspello} ~~hauspello ^{clavato} ~~clavato~~
infra porrecto. Corpus ^{elongatum} ~~elongatum~~, molle, ^{segmentis} ~~segmentis~~ ^{duo} ~~duo~~
decim. Ovaria quatuor, ^{semiformia} ~~semiformia~~, duo antica et duo
postica. Setae branchiales infra ^{posticum} ~~posticum~~ ^{porticam} ~~porticam~~, viginti,
pectinatae, natatorias: aliae quatuor ^{supra} ~~supra~~ ^{caudam} ~~caudam~~.
Cauda appendicibus quinque ^{lenti-cornuolis} ~~lenti-cornuolis~~, quatuor ^{ex} ~~ex ^{longis} ~~longis~~,
media brevior terminata.~~~~~~~~

Gordius aquarius 2 Long. 2 decimetr. et 4 centim. lat. 1^m
Dilute fatus, cauda trifida.
Gordius ater Long. 1¹/₂ — 1⁵/₈ lat. 0, 8^m
niger, cauda bifida in 1. Martello.

Brachionus Brachia.

Cephalopoda Mull. Rose. Ver. III. 236. Encycl. T. 29. 1792.

In aquis stagnantibus selva Aug. 63. Obs. 2 nostrae
partis postica lobulum conspicitur, qui desideratur in figura.
Tota pellucida, interanea filosa; etae lineares. truncatae
lae medium corpus exstantes.

En infusorii Monades quaedam, Proteum, Volvocum globato-
rum, Euchelesque novellae, Vibrionem angustulatum, Parame-
cium Chrysalideum (Siphonophori pullum multum) eque iter-

Hydra grisea Gm. 3870. Enc. 67. Polygus triareus Noy.
8, 13. 356. Vocabat Cyclopsinam latrem. Erat
statis juvenili. — Color griseus.

Nais amphitritea Latr. corpore elongato 9 segmentis di-
viso, interstanti, utrinque parce setulosa; cauda rotun-
datis, sinulo interjecto, pectinatum tenues setulae;
capite reflexo cithris linealibus et appendicibus elon-
gatis duabus instructis; ad utrumque latif 4, 5 fasci-
culis ramiformibus, setarum plumosis a centro usque egredi-
entibus, albis.

Nais Culmus Latr. corpore elongato (10^m) utrinque
valde attenuato, septantigato, glaberrimo, fusco;
segmentis 13 longioribus, distinctis, ad juncturas valde constan-
tibus, capitulo argentissimo, oculis duobus fere quatuor-
linariis, rubris, antennis minoribus, cauda setis sex termi-
nata.

Planaria torva: elongata, utrinque angustata rubro-alba
suffusa, oculis duobus nigris. — Per apert corpus obso-
lenter globuli fulvo-rubelli, majores; geminae fustulae
proliferi utriusque conspicitur in fig. 4 tab. 80 Encycl. descr.)

Exprobatella irregularis Blainv. ovata-elongata, margine
crenulata, latit. dualiter striata et operatum tuberculata,
fusca caerulea; oculis sex.

Observationes botanicae
autumno 1865.

7. Septemb. Lubini exarum Tabulam Tabulam,
Sicam decerpi. Pederni — Cam Stramari's
comparata, varietas tantum videtur, nec spec.
caulis cruleo-rubens viridi-punctatus, glauco-purpureus,
prospice p. costis, antheris nigricantibus p. v. Tabula
na in Stramario plantae etiam p. v. fronte tabulae
differt — Sperm. septalis, stam. structura etiam
microscopia observata.

In horto Pederni e Volpago retul. exemplar. *Pagetes*
Pagetes erecta L. pedunculis bristis superne valde incrassatis,
involucris inflato-campanulatis, haud angulatis, floribus
unicoloribus citrinis. — odor. debilis.

Pagetes patula L. pedunculis nudis, longis, superne parum
incrassatis, involucris cylindrico-campanulatis purpureis, flo-
ribus verticillatis croceo-purpureis. odor fetidus, gravis.

Sphagnum acutifolium Ehrh. var. typica h. purpurea — Rab. 266. 205?
cymulifolium Ehrh. — Utrumque a Lago.

Lycopodium inundatum L. Best. Lycop. 20. Vahl. LXXI fig. 11! 1862.

Sphagnum commutatum Hedr. Rab. 349. fertile! Calcedon.

1) *Urtica plantago* L. var. *microphyllum* — foliis ovatis parvis,
longepetiolatis — *Urtica plantago* Lago.

2) *Sanguisaba officinalis* Lem. Koch. 202. Th. capite.

3) *Hedera palustris* L. folia inferiora alterna, superiora opposita
verticillata — Lago.

4) *Polygonum minus* L. — Lago.

5) *Cirsium defloratum* L. Koch. Catena — In M. p. p. Lago.

6) *Prunus Mahaleb* L. (al. Lycop. Mott.)

Colocasia arvensis robustifolia. 1.

7) *Bupleurum ranunculoides* L. foliis radicalibus et inferioribus
lineari-lanceolatis, gramineis, rigidis, valde chlorophyllis
superioribus ex parte amplex. cauli. basi. acuminatis, minus
chlorophyllis brachyformibus, involucrum 1-3-l. phyllo
inequali. umbellae brevior. involuella 5 phyllo, maxima
umbellula subglob. — *Bupleurum ranunculoides* Lago.
Lago. — Spec. polymorpha h. deprim. v.
St. Tradr. 4! 151.

- 2 *Euphorbia palustris* Zuck. — In sax. Lagonotis.
 2 *Teucrium Botrys* L. — Ibid.
 2 *Molinia muricata* L. — In marshes ad lacum mortuum.
 2 *Potamogeton lacus* L. — a Lago.
 2 *Teucrium Scordium* L. — In Lago — Cum *T. Scordide confusum* Murr. propter folia in petiolum alternatim in parte vivam, loco videtur (*T. Scordide* in maribus).
 2 *Rhynchospora alba* Vahl. (*Chorizanthe alba* L.) — In paludibus turfosis a Lago.
 2 *Mercurialis annua* L. — Lago in turfosis.
 2 *Linaria palustris* L. — Turra (*L. rotundifolia* L.) =
 2 *Drosera septentrionalis* Turra (*D. rotundifolia* L.) =
 2 *Senecio paludosus* L. — Pollin. 2. 692! — Ibid.
 2 *Menyanthes trifoliata* L. — Ibid.
 2 *Hydrophyllum peltatum* L. — Ibid.
 2 *Senecio oreolus* L. — Pollin. Achl. DC. Prodr. — In montibus ad lacum mortuum.
 2 *Hieracium parvifolium* L. — In marshes prope Lagonotis.
 2 *Carduus summanus* Pollin. — ad alvum Mexici.
 2 *Thyselinum palustre* Hoffm. (comparatum cum spec. Bractearum!) — In paludibus a Lago.
 2 *Hypnum cordifolium* Hedw. — (Reber. Bryoth. !!) — a Lago.
 2 *Lepidium Thelypteris* Sw. — In paludibus Lago, abunde.

Linum catharticum L. var. *pseudo-galicum*: Differt
 foliis plerisque caubris, oppositis (paucis oppositis) flora-
 libus foliis (paucis oppositis), 17 probrone ramoribus
 hanc ex parte *chamaecrista*. *Linum catharticum* spec. in
 L. *galicum* et *catharticum* etiam folia acutiora
 sunt. — Al. Caldeira pro *Cuscuta*.

Agave americana Linn. Plante dell' America vera affatto
 diversa dalla *Delmonia* e nelle parti meridionali della Sicilia
 e proprio sulle rupi attorno il lago di Garda. Nel Veneto
 si trova in gascia, dove un ipso alcuni anni, ma
 fiorita assai di rado. In provincia di Treviso
 presso il villaggio *Gracimeth* a *Marin*.

Scirpus controversus Steud. = (*S. tridactylus* L. var. β
alveola Don. In diff. a *S. tridactyla* *petalorum*
 forma truncata, inquantum *maris*, *radix* *hum.* 2 l.
Campsis legit *Steud.*
Organum vulgare Pers. — α

Mai 1866

O. ovata Pers. var. β *citrina*
 Fl. pr. 309. *Fl. pr. 316* (coll. *form.*)

Est varietas *citrina* *Orbanii* *ovata*

Orbania aurea: apali plurimae, profunde bifidae
 tubum subquadratus; corolla tubulato-campanulata, tubo
^{parum} *curvata*; lobis inaequalibus dentulatis, superior bilobis,
 lobis rotundatis supra stylum partem accumbentibus; inferior
 lobis angulatis, lobis, in medio maiori; *staminibus*
ⁱⁿ *lobis* *inferioribus* glabris, ut apice saepe pilosis, ibi *antheris*
 stylo subglabris, glabris *lobis* *flavo aurea*:
stamen stylus obliquus; glandulosa-velutina: *sepalis*,
brachy *sepalis* cito *junior* *maioribus*.
 Alti 20 cent., corollae *maioribus*.
Orbania *O. longicauda* *maioribus*:
 sup. *patentibus*, *staminibus* *sub medio tubo inferis*, *caulis* *verrucosus*,
corolla *grano-striata*, *stigmata* *stigma* *purpurea*.

O. flava differt: *sepalis* *subulatis*, *staminibus*
in medio tubo inferis, *lobis* *dense pilosis*, *stigmata*
non verrucosus *cicatricosus*.

O. lucorum differt: *sepalis* *humeris*, *lobis* *sup. lobis*
patentibus, *staminibus* *ob* *sup. medio* *dense pilosis*,
color *flavo rubente*.

O. brachysepalis *sepalis* *staminibus* *tubum* *egregiis* *staminibus*
altius *inferis* *stylis* *superioribus* *subnatis*.

O. purpurascens differt: *lobis* *sup. staminibus*, *lobis*
inf. lobis *inferis*, *staminibus* *altius* *inferis*, *stylis*
apice *purpureis*, *color* *tubulatis*.

In parte *Namig* prope *Namig*.

Ophrys apifera Hud. (Vaill. 30-9) - In collibus
calcareo - longis humidif - et cunctis partibus

Ophrys Bertolonii Moreti (Koch. 599 - *O. Speculum* Ledeb.
am. it. 201) - Labium ut dicunt auctores, non
vartum apice breviter trilobum, sed ad apicem
lateri duobus aliis lobis, convexis et reflexis
instructum. Macula lucida in speciminibus nostris
pene cordata, duobus acuminibus instructa
In colle Cellata dicto h. Tombola

Ophrys arachnites Persh. In pratibus Namque prope
Narum

Ophrys arachnites Hud. In pratibus abijis

Ophrys apifera Hud. var. *reflexa*: labello ovali
in apicem acuminato, in diis latitudine latissimum apice
conius perzonum ^{ovum} ~~latissimum~~ ^{multa} ~~latissimum~~ ^{multa}
pictum, linea media lata roseo rubro cincta, antibus
lateralibus pille et ulgo - limbo. In
collibus Calcareo.

Orchis latifolia L. (Koch. 596) -

" *varegata* alt.

" *Morici* L.

" *marula* L.

" *papilionacea* L.

" *rustulata* L.

Ancampylus pyramis Daley Rich

Gymnadenia conopsea R. Br.

Platanthera bifolia Rich.

Hermipodium Maroccanum R. Br.

Limnorchis abortivum L.

Epipactis latifolia alt.

Orchis graecina L. Calcareo

Trifolium pallidum Link. - In horto Graecum Paderno

Galium hirsutum - G. lucidum

Fragaria vesca

Alchemilla vinealis L. In campis a Volpago, Selva, Narum

Eractis, *Stachys officinalis* - *Stachys officinalis* - *Stachys officinalis*

Bromus *agrostis* L. In pratibus
det. Palagon a Lebot, forma *hirsuta*.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Stachys officinalis</i> | 8. <i>Trifolium pallidum</i> | 11. <i>Valerianella officinalis</i> |
| 2. <i>Ophrys apifera</i> | 9. <i>Callactis muricata</i> | 12. <i>Bromus erectus</i> |
| 3. <i>Ophrys</i> | 10. <i>Rhinanthus agrostifolius</i> | |
| 4. <i>Ophrys Bertolonii</i> | 11. <i>Orchis latifolia</i> | |
| 5. <i>Alchemilla vinealis</i> | 12. <i>Galium parviflorum</i> | |



X *Ergimum orientale* R. Brown. (*Str. orientale* L. Sav.
Flor. bras. p. 19). In paludib. horti cum
graminibus.

X *Rosa agrestis* Sav. (Pollin. cum 186). *R. subspina* va-
riabilis. In ripibus collinis et montibus.

X *Epiphi. coloratum* Vahl. — In partibus collinis et montibus.

Plantae hae in paludibus circa Pinaras, Le Pelas,

X *Ranunculus Lingua* L. —
X — *Flammula* L. —

X *Veronica subellata* L.

X — *Amagallia* L. foliis pubescentibus —
X — *acutifolia* L. foliis paulo longioribus et acutioribus.

X *Iris pseudo-acorus* L.

X — *foetidissima* L.

X *Rosa gallica* L. — Joviana! R. gallica
et una flos non habet.

X *Caulis muricata* Biscoff. (Hoch, 269) — Nostra a
dracena. recedit aculeis, fructus basi non subglobosa
sed conica. Nova pro flos italica! — In glareis
prope Purgatorio, sicut et deinde prope fructuum
indole obrevata, facile promutata.

X *Euphorbia exigua* L. Inter ligulas et Purgatorio.

X *Melampyrum barbatum* W. K. Folia non inflexa.
In superioribus basi utroque 2-3 dentata; flos
non semper hians, tubo.

X *Rosa arvensis* Huds. — In ripibus Purgatorio: ut
in horti Martello.

X *Valerianella auricula* DC. [V. dentata pl. auctor. K
tub. ligulas totius, provinciae — V. dentata Pollin.
quae V. *flor. jonis* DC. habet fructus antica planiuscula
habet utroque excavatis, cum loculis cherubim. argenteis flammis
negue fertili. greges maioresque, et in nostra
V. *auricula*, quae utroque puncta et limbo laciniis
maioribus, denticulis, multisque circumdata.

Die VI Juni.

Die VI Lani.
Lep. in partibus circa Kornfelden virosas formas Rhinoc. Hornum

Rhinanthus minor ^{genuina} ~~fl. pale~~ ^{fl. pale} *coraculi* *peritro-*
truncatus, *albicaulis*, *fl. ipso* *pama* *ex calyce*
ovato *bracte* *incoloribus* *triangulari* - *acuminatis*
bracte *capis* *dentibus* *triangulatis* - *acutis* - *capsulis*
reti *incoloribus* *areolatis* - *flor* *calycem* *exterior* *superior*

Rhipanthus *maia* - *gemmae*. *galeae* *coniculis* *longiusculis*,
innatis *univitis* *fructibus* *longioribus*, *barbis*
subulcatis, *triangulatis*, *hinc* *acuminalis*
triangulatis *imparibus* *interdum* *subacuminalis*
hinc *acutis* *dentibus* *triangulatis* *acutis*, *capulis*
rob. validis, *fovea* *areolatis*. *calyx* *unilobatus*.

Rhinanthus *medeolae* - *nithi* - *galei* *corniculif.* *longicaule*
a. curvicaule *truncat.* *recti* *alticaulis*, *flor.* *longus*, *exsert.* *brachy*
diadelph. *triangular.* *longe* *acuminat.*, *in* *ap.*
dent. *triangular.* *longe* *curv.* *subglab.*
densum *curv.* *videtur* *omnino* *Rh.*
angustifolius *Gmel.* *pro* *bono* *specie* *a* *Peuthanico*
acanthus *in* *DC* *Prodr.* *X.* *558.*

Pithe caprulus debili, dense-areolatis. Flycatchera dimidi-
Hic caprulus debili in probris, collibus montanorum. Cumbriae, 1847.

Silene gallica L. in anj Bavarica; in hortis a Helva
Lithographum officinale in parcesis Camulo, Bavaria.
Rosa rubiginosa; arvensis, caerulea in septis, Bavaria.
Rosa sic Rosa gallica
Ficus glauca et F. effusus - In finis Bavarica.

Impatiens patens, et *Orob.*, *carophora* in part.
Impatiens — *Utr.* itam, et *part.* *Repsol.*
Quefens et *pin.* in *part.* *subhum.* *Cecid.*
Papaver *hyb.* *non* *mut.* *nisi* *var.* *Argem.* *nub.*
Utr. *can.* *an* *P. dubium* *var.* *Rochad.*
Cappula *Impatiens* *var.* *forma* *nun* *substant.*
nunc *clavata*, *stigmat.* *Discus* *nun* *planus* *nun*
lanceus, *modo* *major* *int.*, *modo* *crenulat.* *j.*; *pedunc.*
Utr. *jil.* *adpress.*, *mod* *altem* *patentissim.*
Orob. *nun* *stigma* *variabilissim.* *in* *omnib.* *num.*
rastatum. 4-20.

Gracia Costa XIII junio; Hypoch. maculeta, Gent. uterale
Annu. in copiam, quod copiosius. haec in partibus maris, Guayaquil
oblatifera, Inf. ruber.

Clasificación. Acotyledoneae (Vasculares -)

Ordo Equisetales DC.

Equisetum Linn.

E. arvense L. Frequentissimo nei campi e prati umidi o paludosi. Vulgo: *Coda-mus* (coda d'asino) e cap. ~~testa~~ l'altra specie, per la forma, non differisce da una coda d'asino o di cavallo.

E. telmateia Ehrh. [*E. fluviatile multorum*, var. L. monente di Kochis] Capraio nelle vallate del Bosco Montello e presso i fossati a Selva, Gravara etc.

E. sylvaticum L. Nelle vallate umide del B. Mon-
tello associate all' *E. telmateia*.

E. palustre L. Frequente nell'alveo del Piave e nelle zone attorno Treviso.

E. simplex. Nell'alveo del Piave.

E. ranosum Schlecht. [*E. hiemale*, var. *elongatum* Döll] Al margine dei fossati nelle regioni colline.

E. hiemale L. Frequente nelle sabbie e ghiaie dei fiumi e torcate. Vulgo: *Erba rasparola*, *Dall'uso* che ne fanno alcuni a pulire metalli, legni, e vasi di terra e di vetro.

E. variegatum Schlecht. [*E. ranosum* (multi-focum) var. Vahl] Fra le sabbie del Piave.

Ordo Marsileales R. Brown.

Marsilea Linn.

M. quadrifolia L. Nei fossati di Leno corso presso Treviso. (Franchia).

Salvinia Michel.

S. natans Michel. Nei fossati a S. Lazzaro presso Treviso (Franchia).

Ordo Lycopodiaceae DC.

Lycopodium Linn.

- L. Selago L. Frequente nei luoghi boscati dei monti più elevati; nel B. Casaglio.
L. inundatum L. Nei prati paludosi attorno il lago di Tago, associato agli sfagni, alle Drosera, Rincospora etc.
L. complanatum L. Frequente nelle spignate erbose ed aride del B. Morello e dei monti.
 — β Chamaecyparissus. Insieme alla specie Pitheciandra io colli ch. Bertoloni che il L. Chamaecyparissus di Braun non fu altro che una forma del complanatum.
L. clavatum L. Abbandante nei declivi erbosi del Morello e dei monti, ugualmente verso settentrione.
L. annotinum L. Nel B. Casaglio frequentemente.

Selaginella Spring.

- L. spinulosa A. Braun. Nel B. Casaglio (Brenzger) e nel M. Grappa (Montini).
L. helvetica Spring. Copiosa sulle rupi umbrife e umide dei colli, specialmente lungo il Rave a Roncapovera etc.

Ordo Filices Linn.

Botrychium Swartz.

- B. Lunaria Sw. Nel M. Grappa (Montini). nel B. Casaglio (Brenzger in Rob. Jacomelli).
B. matricariaefolium A. Braun. Nei pascoli elevati sopra Valled'Adone (Brenzger e Rob. Jacomelli).
Ophioglossum Linn.
uligatum L. Nei pascoli alpini presso Valled'Adone

Grammitis Swartz.

- G. Ceterach Sw. Nelle fessure delle rupi e delle montagne a Terravalle, Nove, Fregona etc.

Polypodium Linn.

- P. vulgare L. Frequente appie' Degli alberi e sulle rupi nel B. Montello e nei monti e colli tutti. Valgo: Pimpinimpugno (forse corrotto di Polipodio). Il suo rizoma dolciastro ^{maizga} da fanciulli.
— P. Barrelieri [Polyp. vulg. β Portal.] Nel B. Montello non molto frequente.

P. Phlegopteris L. Nelle vallate umide ed ombrose del B. Montello, non frequente.

P. Dryopteris L. Nelle fessure delle rupi nel B. Montello, a Corvò, Cornuda, Quenda, Senavalle etc. etc. Ess. Lo ritengo specie stessa col P. calcareum Smith, non ritengo alcuna costanza nei caratteri assegnatigli per distinguerlo. Vedi Portal. flor. it. cryp. p. 48.

Aspidium R. Brown.

A. Lonchitis Swartz. Sulle rupi dei monti più elevati.

A. aculeatum Swartz. Frequente nel B. Montello.
— β lobatum [A. lobatum Sw.] Nei siti rupestri del B. Montello.

Polystichum Roth.

P. Thelypteris Roth. Negli stagni ombrosi del B. Montello, nei siti paludosi a Quindo, Navasica, Lago.

P. Oreopteris DC. Nei declivi ombrosi delle colline del B. Montello, non da per tutto.

P. Filix mas Roth. Nel B. Montello, nei colli e presso qualche siepe ombrosa a Selva, Gravara.

P. spinulosum DC. [Aspid. dilatatum Sw.] Comune nel B. Montello e Castiglio.

— β muticum ^{A. L. Swartz}, Nel B. Montello, raro.

P. rigidum DC. Nel B. Caspoglio [Peregrino] in B. Jacometti.

Cystopteris Bernh.

- C. fragilis* Bernh. [*Polypodium fragile* L.] Nei siti
ruperstori, umidi.
— α *cynapifolia* [*Polyp. cynapifolium* Hoffm.]
Nei colli a Cornuda.
— β *angustata* [*Polyp. fragile angustatum* Hoffm.]
Nel B. Montello etc.
C. regia Presl. — *Palpinum* Nel B. Causiglio (Berenger)
C. montana Link. [*Polyp. montanum* Winkler] Nel
B. Causiglio (Berenger).

Asplenium Linn.

- A. Filix femina* Bernh. [*Polyp. Filix femina* L.]
Nei siti ombrosi dei colli e dei monti, frequente.
A. Trichomanes Linn. frequentissimo fra le fessure
delle rupi e delle muraglie ovunque.
A. viride Huds. Fra le fessure dei muracci costeg-
gianti la Pieve a Navessa, assai raro.
A. Breynii Retz. Sulle rupi calcaree fuori di porta
Belluno a Terravalle, raro.
(*A. fissum* Hitchc. Fra le fessure dei muracci
costeggianti la Pieve a Navessa.)
A. Ruta muraria L. frequentissimo fra le fes-
sure delle muraglie e delle rupi, ovunque.
— β *tripinnata*. Sulle rupi, non infrequente
A. Adiantum nigrum L. Frequente alla radice
degli alberi umidi, e più le rupi nel B. Montello e
nei colli.
— *paucum*. Nel B. Montello fra le rupi.

Scelopendrium Smith.

- S. officinarum* Swartz. Frequente nei luoghi sanosi
ombrosi del B. Montello, dei colli.
— β *crispum*. Nel B. Montello, raro.

Blechnum Linn.

B. Spicant Roth. [*Osmunda Spicant* L.] Nel B. Montello
in una vallata ombrosa detta Val de l'aque, rarissima.

Pteris Linn.

P. aquilina L. Copiosissima nel B. Montello e meno
frequente sui colli e per le siepi della pianura.
Valgo: Spelida (felce). Ne usano i contadini per
appressare i griccioli agli animali domestici.
Nel B. Montello, ove abbonda e raggiunge un'altezza
salvo di 2 metri, fruttifica assai di rado, mentre
spesso si vedono fertili gli umidi esemplari in
inter che crescono per le siepi.

Adiantum Linn.

A. Capillus-veneris L. Frequente nelle pelonche, calcaree
dei colli e dei monti, e così anche nei poggi antichii
e presso i mulini.

Antyridium 43.

Feb. 27.

Ca. Bot. fl. crypt.

Botrychium lunaria - subalp. Veron. (Poll.) Baldo (Torin)

Cheilanthes Gortizii - pol. et May. - Baldo (Torin)

Metopochloa Marantae - Eugai. (Mayer)

Cephaelis aff. Veron. (Torin) Eugai. a Masel. (Mayer)

Polyg. vulgaris - Vern. - Geyau (Torin)

— *Protopteris* - Baldo. Cinthia (Poll.) Limmans (Mayer)

— *Dryopteris* - subalp. Veron. (Poll.)

— *P. calcareum* - alta di Geyau presso Ver. (Torin)

Aspidium subulif. - mont. bapau. (Vij.)

— *Oreopteris* - bapau. Vern. (Poll.)

— *Helipteris* - bapau. Vern. (Poll.)

— *aculeatum* - Baldo, Limmans (Poll.)

— *filix mas* - Rocogno (Torin)

— *P. cristatum* - Baldo (Poll.)

— *distatum* - Mont. Ver. (Poll.)

— *rigidum* - Limmans (Mayer) mont. Vern. (Poll.)

Struthiopteris germanica - nell'agro Taverle e Torin (Poll.)

Asplenium septentr. - Baldo (Torin)

— *Frühmanni* - Veron. (Torin)

— *inde* - M. Veron. (Poll.)

— *Ad. nigr.* - Geyau (Torin)

— *P. serpentin.* - Eugai. Cas. di pete presso Lymda (Mayer)

— *P. sordid.* - Dal mont. di Campobasso Veron. (Torin)

— *Valpau.* (Poll.)

Observations botaniques — annis 1866.

Spicularia hybrida Distencha est a *S. Spicula*
sepalis lanceolatis, atropurpureo attenuatis, corollam repraesentantibus
bracteis, per sub flore casticeo, eorum sicut dubio
inserti ad eam sicut speculo adiacentem, sed
samen nudi non nisi nuda speculo vixit videtur
habiles propriis istis: sepalis longior, latior et
formis intermedie habentur, ovarium sub flore
constitutum. Est in omnes *Spicularia* ita est.
Altera forma super legitur ante, pedunculis, ovario
sepalibusque multo et brevis pilosa. Sed
des. de fructu. *S. Spiculum* var. *β. hybrida*,
var. *γ. puberula*, et *δ. candidissima*, flore pulchra
alba, quam inter speciosas Cuckens legi XIV. annis

Gladolus quem in pratis ubi collinis Costa legi
juni. pro. *aff. alicuius* est, a *G. communis*
quem *cf. Volpago*. Necesse est, hoc: foliis
multo angustioribus, fere linearibus, reticulatis
nerviis laxioribus, capsula fere sexangulari, statura
valde cunctorum. Sed tamen pro varietate accepta
vel natura tantum habet (*G. polystachys* Gaert.)

Gymnadenia odoratissima Rich. — In pratis mont.
Cuckensibus cum *G. conopsea*, et varieg.

Trifolium hirta, var. *pubescens*. id. 3-4-5
flor. in collibus sub Costa.

Thalictrum populeum L. var. *anemifolium* — corolla
et calice novemfidis, non descript. Costa

Briza media vulgaris, id. omni parte glabra
in sylva Mabetto

Polygonum lucidum All. — In montibus Cuckens. differt
a *S. lucido* pro. hum. tunc foliis linearibus, petalis
intermedie late plate debilibus.

Driftacanth laciniatus L. — foliis sessilibus, ciliatis, distichis
in forma pinnatis. In *S. lyvestry*, in *palustris*
sub populo Ponceade

Gabium parisiense L. (forma *leiocarpa*): *G. anglicum* Walp.
id. et in muris. Dom. Grillo a Salvo. 23/jun/1866.

Trifolium patens Schreb - Koch / vide obs. in Herb.
et *Trif. procumbens*? frequently in *patens*, and a lemon.

Infolium medium L. *spod* *in parte* Tr. *alpestris*
an *humana* bene ab hac distinctione est: calyce
~~velut~~ glabo decummario, nec illis inquit nervis
foliis ellipticis, neque elliptico-lanceolatis, ~~spicatis~~
capitulis evidentibus sub aethus-pedunculatis, ~~ut~~
sub glabris. — *Distinctionem* optime ideo, *comprehens*
specimen *transjici* *hif.* *medi* *cum* *spec.* *hixicibus*
Tr. alpestris *class.* *De Bracht* — *spec.* *De Bracht*
habere *spec.* *junior* *alpestris* *pro* *medi* *habuit*
ex *medium* *pro* *alpestris* *pro* *medi* *habuit*
in *Pub.* *De* *alpestris* *diploma*; *optime* *sunt* *ad*
celeberrimus *Roche*.

Cirsium pannonicum Gaud.

C. f. pannonicum Guss.
- β *sinuatum*: foliis grossi dentatis; dentibus. spissiusculis
dentulatis; caule glabro. 3-5 cephalo.
Nec coll. a Colpino nisi longe distat. C. Toulouza.

Corfium arvense — *l. nite* *no. camp.*
B. horridum — *longo* *l. Pinar a Mare* *f.* —
f. Canaliculatum — *no. camp.*

B. horridum - lungo C. Pave a Nave /
X. Canalic. - in campi.

J. Cassin — *no camp.*

Carduus defloratus L. - & *raethicus* DC. M. monte
penn. Ferravalle - p. 2

β -summarum [Card. summarum Pollin. - Flor. Geo.
p. 80] R. - mont. turgidum. (Puchtinger, Fest.
Pollin.); nel M. Cro. (S. Viane) (Faulstich).

Carlina vulgaris - β *lanceolata*: foliis utrinque,
caule, involucri & ordinibus lanatis - In
collibus Tomprij

Consaurea Calitropa L.

— var. antraxifolius, S.E. filius inf. Apurimac 16000 ft.
humilis, prostratellus, spadix involucri cauli infra
 in pinis longis prodictis bas. parum. Stet.
atque 1-2 pinis lign. Ha lign. prostrat.
the prostrat. prostrat. Ha lign. prostrat. prostrat.
var. prostrat. prostrat. prostrat. prostrat. prostrat.

Centauria maculosa Smk. (*Cent. paniculata* Tey.
et per omnium auctor. non Smk.) - *Longa* sub
paniculata sua drap. pluresque spec. combinant
videtur. - *Stem* mentis in *graculis* a *Lebon*.

Nullam *divinam* invenio inter *C. Duran*, *joceana* p.
e. *pharibol* auctorum et in specimen. *Diffinita*
videtur, foliorum *nunc* latitudine et *etiam* per
idem specimen. *id.*

Allium odoratum L. - var. *capuliferum*: umbella
densissima, capulifera - Petala obscura, iuncta, nervo
salutari, tacto notata, apice notanda nonnullis
apertis acuminatis. *Stem* etiam bene ab *A.*
fratellente L. in *Roche* descriptis. *Diffinita*, sed probabilitate
pro illo a nonnullis auctoribus descripta, reg-
is *horto* proprio *florens* in *hio* *inlii*.

~~*Crepis setosa* Hall. *nunc* *pubes*, *varia* *tenus* ab
auctoribus accepta est. *C. setosa* DC. *setosa*
non *quidam*, *notata*, *etiam* *quidam* *A. Roche* *descriptis*
in *hio* *apertis* *pag. 376* - *Ullmann* *descriptis*
etiam *tenus* *Wall* *et* *auctor* *DC.*~~

Horacum lactans Berthel. *transitum* *in* *hio* *inlii* *factus*
at *hio* *umbellatum* L.

Crepis pulchra Z. - *Freunthof* *pubes* - *Determino*
quidam *fore* *absque* *drap.* - *In* *avis* *Varago* - *Drap.*
provenit *descriptum* et *descriptum* non *nunc* *certitudinem*
nonnullis *convenit*.

Scordium crispum Vill. (*Roche*. 360) in *pratis*, *panis*
montanis *Schavallen* *id.*

Une nouvelle espèce du genre *Ophrys*.

C. integræ Lam.

Strochimys *Labello* obovato in apicem acuminato integro,
 plano, linea verticali media glabro, lateribus velutino,
 laciniis perisomi interioribus ^{basil. transverse} anguste lanceolatis hirs., exterioribus
 simpl. brevioribus.

Da due bulb. ovali ^{o post. glob.} permanentemente fibrosi. Sorge il caule
il caule quasi rotondo, ma spesso ottusamente angu-
lato, grosso (4 mill.) alto da 3 a 4 decimetri.
riverdito ^{nelle parti} inferiormente da 4-6 foglie oblungo-lan-
ceolate ^(oblongues), le superiori gradualmente più anguste
ed acute, la base con pochi e radi fiori brattati.
Parathee lanceolate acute, canaliculate verdi,
le inferiori più lunghe, le altre poco superant
l'ovario. Fiori masculi da 3-5 per spiga.
Ovario esagono. Le lacinie esterne del perigonio sem-
pre obovate ^{obtusangole}, adnate all'apice; concave, glan-
dosee col nerv. medioo distinto verde. Le lacinie
interne sono ^{sempre} lanceolate ^{anguste}, quelle volte più corte delle
esterne, verdi, intatte e bianche, irruite.

Il labello è quasi elliptico, alla base rotundato,
e ottusamente acuminato all'apice intero
piano e col margine piano. Dalla base all'apice
è segnato da una linea ^{mediana} verticale glabra, rossa
l'intale lateralmente da due strisce più o meno regolari
verdognole. I lati del labello sono colorati
in castagne chiare e leggermente vellutati.

Glinostemon modicus, largamente rostrato - Rostr.
glossuoso - sigmoides, verde Pollinaris, giallo - interni,
posteriori di lungo caudicolo. L'ovario pami-
ni una capsula molto grande, oboato-oblusca,
sottile, eretta.

Opp. Del portamento e dei caratteri di *Inbercol*;
del caule e delle foglie f' avvicina molto alla
Ophrys apifera Huds, ma a form. grande e tronc diff-
rente alla nome ipocoridee dei fiori. Il loro labello
è fatto: o il tutto caratteristico, distinguendosi da quello
dell' affine *O. apifera* e da ogni altra specie del genere.
In tutte le specie del genere il labello è più o meno
convesso, talora ang. ventricoso, ed il margine ripiega

64. III. Cum hae planta in omnibus partibus bellum exacte conveniat cum *Op. spiffera*,
nisi: aliam exaltat et cum *hybrida* form sit inter *Opomyx* et *formam serpyllidis*,
species quorundam vltima formae mantio: Sed cum plura plura specimenibus inveni-
sit, hae vero specimine,

Plantae ex sylva Causilii.
die 4 et 5 sept. 87.

- Lonicera alpigena*
nigra Linn. *L. nigra* L.
Valeriana tripteris L. *Virg. glabrata* H. et Horn.
Campanula capitata *Viola palustris* L.
Lythrodium bellagi *Impatiens noli-tangere* L.
Rebustum paniculatum - *Chlorophyllum hirsutum* Villarsii
 — *vulgare* *Convolvulus vestitus*
Cirsium corymbosum *Polygonum Bonif. Hurni* C. A. Mey.
 — *acule* *Urtica granata, granum*
Senecio Saxifraga
Gentiana germanica W!
 — *ciliolata* L.
Galopis Hebrabit L. normalis!
 et *versicolor*
Erigeron glabratus Hoppe et Horn.
Rhynchosium pumila L.
Viola palustris L.
Sonchus oleraceus L.
Coturniculus *affinis*
Chlorophyllum hirsutum L. var. Villarsii
Cardamine hirsuta
Saxifraga rotundifolia
Cirsium alpinum
Saxifraga *Cotyledon*
Cirsium peltatum *Apocynum* *nude*
 — *oleraceum* *Asp.* *flex mag*
Arenostyles alpina *temula*
Anemone cordata *Potentilla*
Luzula nivalis *aculeata*
Gentiana anemone *fragilis*
 — *emula* *Dryas*
Helianthus nemorum *Phrygia*
Epilobium Dodongi
 — *Sesneria*
 — *montanum*
Pentstemon purpureus
Senecio rotundifolius
Juncus nana
Valeriana *urj. idca*
Lythrodium hirsutum
Polygonum rotundifolius
Majanthemum hirsutum

Cryptogamiae vasculares ab gr. p. f. Pirone

1. *Equisetum arvense* L. ad agrorum aggeres circa N. Me.
2. " *Telmateja* Desig. var. *1. serotinum* et *Dracum* :
caule fertilis, porce folioso. In humidis syl-
vis collinis circa Carr. Indris, a Braggano,
Cormons.
3. " *patriae* L. in foris Foggia, Cusale, Morro, Neco etc.
- Selagella granulosa* L. in humidis adhaerens M.
- Monophloia* *fontinalis* *helvetica* L. in montibus circa M. Me. alb. p.
- Plechnum spicant.* L. in fontibus Cusale alb. p.
- Syngonium selago* - M. Cuch. Carnis
- annua.* - in subalp. et montan. Carnis alb.
- Polyp. sandria* L. in alpinis adhaerens Carnis - M.
- Varalba* *Pizzul* etc.
- Saxum* *Chernia* L. in montibus N. Me., Semone, Carnia
- Polyp. vulgare* L. in foris p.
- Pols. st.* *Dryopteris* (nec u. shed. *Thelypt.*) circa M. Me.
- " *Phaeopteris*, n. *syl.* *Passus* *fontinalis*
- Polyp. Dryopt. junceus*? M. Cuch
- Alpin.* *Luch.* L. in syl. mont. Carnis p.
- " *aculeatum* L. in syl. p. Carnis non frequ.
- Ap. unde* L. in mp. p. Carnis Carni, Tergo, Arta et
- Ap.* *plex ues* *syl.* Carnis
- Cysto. p. syl.* L. in humidis, p. u. syl.
- var. *pinnatis aculeatis* Carnis Polizza mp.
- Polyp. r. r. r.* L. in syl. subalp. Vallis
- Incarnio* Carnis var.
- Ap. septentr.* Carnis p. p. Satrio
- Orphic. leptanum* L. in montibus u. Satrio (Com.)
- Polyp. officinar.* ad sepes humid. u. syl.
- Ap. adhaerens* Carnis Braggano, Mangano, Cormons, etc.

et *Saxum* *Chernia* L. in montibus N. Me., Semone, Carnia
et *Polyp. vulgare* L. in foris p.
et *Polyp. r. r. r.* L. in syl. subalp. Vallis
et *Incarnio* Carnis var.
et *Ap. septentr.* Carnis p. p. Satrio
et *Orphic. leptanum* L. in montibus u. Satrio (Com.)
et *Polyp. officinar.* ad sepes humid. u. syl.
et *Ap. adhaerens* Carnis Braggano, Mangano, Cormons, etc.

paleopteryx d

[illegible]

Puccinia undulatifoliae
L'ep. delle pannocchie è munita di peli, e intesa in mezzo
questo graticcio. La veste bianca, lunga, un po' tolosa,
costa di uno strato epidermico a cellule prater subqua-
drate o poligonali a parte grossi i lenticoli e formato di
cellule allungate, primarie densamente stigate, linee
e queste intermeggiate da vasi scaturiformi, e un ligam.
L'interno della veste perduto, quindi da munita di sostit.
cuticola graticcia, la quale a uso delle gonime, si fa stendere
all'esterno, e si sposta all'esterno della superficie
sotto forma di una polta grossa e densa.
8 Febr. 71.

8 febr. 91.