

- 14 Lactarius Capsicum Schult. - Syll. V, 433 - Spore subglobosa, asperule 5-6 $\approx$ 5. Corrisponde bene alla tav. 977 di Cooke M. Hym. e si distingue dal L. tubulif. per le spore più piccole e pel margine del pileo ^(un po' inflato).
- 15 Russula galathea (Bull.) Fr. - Syll. V 466, Cooke M. H. t. 1089. Spore globulosa, muriculate, 6-7 $\approx$ 5, 5 - Novembre.
- 16 Hygrophorus spadiceus (Scop.) Fr. - Syll. V, 421 - Spore piuttosto grandi, 13-14 $\approx$ 6-8. La specie è stata raccolta in più luoghi dell'isola, sembra quasi comune. Novembre.
- 17 Volvaria glojocephala (D.C.) Gill. - Syll. V, 662 - Spore rosee, 14-16 $\approx$ 8. Ottobre. Novembre.
- 18 Entoloma prunaleoides (Fr.) Quel. Syll. V 680 - Spore 5-6 μ diam. angoloso-stellate. Novembre.
- 19 Photiota praecox (Pers.) Quel. - Syll. V 738 - Spore 8-9 $\approx$ 5, ^{per} vaghee. Novembre.
- 20 Inocybe perbrevis (Weinm.) Gill. - Syll. V, 777 - Spore 9-10 $\approx$ 5; in alcuni individui arrivano però fino a 14 e 7, ^{una} è un ferrugineo chiaro. La specie corrisponde bene alla tav. 519 di Cooke M. Hym. e alla tav. 14 f. 1 di Hoffmann, Le. anal.; ma il sinonimo che ne dà Quellet (Flore mycol. p. 107) di In. scabellata è tutto affatto diverso da Cooke M. Hym. ^{t. 402} e spore stellate. ^{Inoc. perbrevis} Questa specie sembra molto comune nell'Isola di Pianosa. Ottobre - Novembre.
- 21 Inocybe rimosa (Bull.) Quel. - Syll. V, 775 - Spore 9-11 $\approx$ 5-6, in qualche forma fino a 13 e 7. Comune. Novembre.
- 22 Nauconia verrucata (Fr.) Quel. - Syll. V 843 - Spore 12-15 $\approx$ 7-8. Marzo e Novembre.

- 23 Galera tenera (Schaeff.) Quel. - Syll. V, 860 - Spore 14-16 $\approx$ 8,5-9.
Maggio - Novembre.
- 24 Galera hypnorum (Batsch) Quel. - Syll. V, 868 - Spore 12 $\approx$ 7. Vi.
ha una var. a pileo che facilmente si lascia spogliare dalla
cubeta e appare ^{allora} biancheggiante; anche le sue spore sono un po'
magiori: 14-15 $\approx$ 9 - Maggio e la var. Ottobre.
- 25 Agaricus campestris L. - Syll. V 997 - Spore atropurpuree
5-6 $\approx$ 4-4,2. Nell'isola s'incontrano più forme, che
sul loco non si possono ben determinare - Novembre.
- 26 Panaeolus ^(anellaria) forniputris (Bull.) Quel. - Syll. V 1126 - Spore anari
grandi atro-fuliginee, 17-21 $\approx$ 9-11.
- 27 Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quel. - Syll. V, 1122 - Spore 16-18 $\approx$ 9-10, atrofuliginee
Novembre.
- 28 Panaeolus campanulatus (Bull.) Quel. - Syll. V, 1121 - Spore atro-
fuliginee, 14-15 $\approx$ 8-9 - Aprile.
- 29 Plathyra spadiceo-grisea (Schaeff.) Quel. - Syll. V, 1055 - Spore fulig-
inee, 11-12 $\approx$ 7, salore un po' minori - Maggio-Aprile e Novembre.
- 30 Plathyrella gracilis (Berk.) Quel. - Syll. V, 1127 - Spore atrofuliginee, 12-13 $\approx$ 5-6.
Maggio-Aprile e Novembre.
- 31 Coprinus sterquilinus Fr. - Syll. V, 1080 - Spore nereggianti 18-20
 $\approx$ 11-13; in una forma 14-16 $\approx$ 8-10 - Novembre. Frequenti.
(ex mss.) (5-5,5)
- 32 Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Syll. V, 1090 - Spore nereggianti. 9-11 $\approx$.
Novembre.

Polyporaceae

- 33 Boletus piperatus Bull. - Syll. VII, 8 - Spore 9,5-11 $\approx$ 4, gial-
licie - Novembre.

34 Polyporus brumetii (Pers.) Fr. - Syll. VI, 63 - ^{Maggio} - Novembre

35 Polyporus fuliginosus (Scop.) Fr. Fomes fuliginosus Fr. - Syll. VI

36 Polyp. bozianus (Wahlb.) Fr. Le. t. 183 ^{Syll. VI p. 137} Polyp. morotus Kalkb.
~~Le. t. 36 f. 7, Fomes bozianus Inodermus fuliginosus (Scop.) Quel.~~
 Fl. mycol. p. 393 - Spore alla fine atropurpuree, ellittiche, 6-7 x 5.
 - Gennaio - Maggio.

36 Polystictus radiatus (Cov.) Fr. - Syll. VI ²⁴⁷ - Spore globulose 4-4,5 μ .
 ferrugineo-chiare - Novembre

Thelaphoraceae

37 Stereum purpureum (Pers.) Fr. - Syll. VI, 563 - Spore 6-7 = 2-2,5 un po' curve,
 - Novembre.

Lycoperdaceae

38 Bovista lanosozantha (Vitt.) De Toni - Syll. VII, 100. - Spore globulose,
 asperule, olivaceo-ferruginee, 5-5,5 μ , turgidate, per lo più col
 pedicello aderente, 7-1 - Novembre

39 Lycoperdon hiemale Bull. - Syll. VII, 115 e 480 - Spore olivacee
 globulose, 2,5-3 μ diam. - Novembre

40 Lycoperdon purpureum Schöff. - Syll. VII, 110, L. polymorphum
 Vitt. - Spore olivacee, globulose, asperule, 3-4 μ diam. - Apr. - Nov.

41 Geaster hygrometricus Pers. - Syll. VII, 90 - Spore globose, gran-
 diolite, muriculate, rufa-fuliginee 8-10 μ diam. Ottobre

42 Geaster fimbriatus Fr. - Syll. - Syll. VII 82 - Spore globose, muni-
 colate, 4,5-5 μ diam., ocracee. - Ottobre

Perizaceae

43 Periza vesiculata Bull. - Syll. VIII, 83 - Spore ellittiche 20-22 = 11.
 - Novembre.

- 45 *Humaria granulata* (Bull.) Fiedl.-Syll. VIII, 129. Sulle mete variate, Margo - Archi: 110-115 $\approx$ 18; spore 20-24 $\approx$ 8-8,5, bisue.
- II
46 *Lachnea stereorea* (Pers.) Fiedl.-Syll. VIII, 183 - Insieme alla precedente, Margo - Archi. 200-240 $\approx$ 15-17; spore 19-20 $\approx$ 9-10; setole 300-400 $\approx$ 18-20.
- I
44 *Humaria nigrescens* (Saut.) Rehm, *Iconom.* p. 947 - Sulla terra argillosa, Nambe. Archi cilindrici, ottusi all'apice, largamente attenuati nella stipite, 170-190 $\approx$ 8-9, parte sporifera lunga 90-100 μ ; spore monostiche, all'etere rotolate ai poli, gl. ascomi: fond. di 2-3 mm. diam., glabri, tutti nereggianti. 11-12 $\approx$ 8,5, bisue, patine, per lo più 2-guttate. Corrisponde bene alla descrizione di tale specie, nota finora del Salisburgo.

Exoascaceae

- 47 *Exoascus deformans* (Berk.) Fiedl.-Syll. VIII, 816 - Potere lungo del Cardon, maggio 1901, sulle foglie di *Amygdalus*.

Perisporiaceae

- 48 *Capnodium Nerii* Rabenh. Fiedl.-Syll. I 77 - Sulle foglie di *Nerium Oleander*, maggio. Come al solito allo stato conidico e piconidico.
- 49 *Antennaria elaeophila* Mont. - Syll. I, 81. - Sul rami e foglie di *Olea europaea* a Sombolles; Margo. Allo stato conidico.

Bacteriaceae

- 50 *Bacillus Oleae* (Arc.) Trev. Fiedl.-Syll. VIII p. 982 - Sul rami di *Olea europaea* dove forma i noti tumori (muscicidi). Di-
cembre.

Mucedinaceae

- 91 Mycozonia rosea Link - Syll. IV, 183 - Sul pileo d- un
agaricico (Hygrophorus?) ^{Novembre} Coni di globulari; l'arredo sup. 25 μ
 diam., globoso, asperulo, roseo-gralliccio, l'inferiore globoso-
 ovoido, liscio, jalino, 14 μ diam.

Pseudo-funghi (Zooecidi)

- 92 Eriseum Salviae Vallot - Sulle foglie d- Salvia Verbenaceae
 aprile.
- 93 Eriseum Poterii Requien - Sulle foglie d- Poterium San-
guisorba, resto Belvedere, aprile e Maggio.

~~50 funghi~~
~~2 pseudo-funghi~~