

*Megaloneta verrucosa** A Möll. Phyc. et Anom. Bras. p. 298,
t. IV f. 55.

Peritheciis gregatis confertis, rubris, $\frac{1}{2}$ mm diam., verrucosis; a-
sis octosporis, 90 μ longis; sporidiis ovato-oblongis, 28-38 μ 10-12
crebre muriformi-septatis, sporidiosa globulosa 3 μ diam. ger-
minantibus. Stat. eruda ascophora similis; basidiis fasciculatis
fibriformibus, nonnullis sterilibus multo longioribus internodiis;
conidiis 5-6 μ 2-3

hab. in ramis secis in silvaticis Blumenau Brasiliae.

* Jach. Hysterodictyae.

2091

Diplodina Lippiae F. Tassi. Atti R. Acc. dei Lincei. Roma. 4 ser. VII. 1896. (Microm., III.
p. 7) et Rev. Mycol. 1896. p. 169. tab. CXXXII. fig. 8. — Peritheciis dense sparsis, ingris,
globosis, epidermide velatis, dein erumpentibus, $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{6}$ mm diam.; sporulis initio continuis,
ovatis, dein 1-septatis, leviter constrictis, ellipsoideis, hyalinis v. dilute chlorinis,
6-10 = 2-3 $\frac{1}{2}$ μ .

Glab. in ramulis emortuis Lippiae rubrodorae in horto bot. Ponensi. Thaliae.

602