

Antennaria Uuedonis Maire et ~~W.~~ sp. nov.

Epiphylla nec non epiclada; mycelio partim effuso crustoso e cellulis pallidis moniliformi-seriatis vel Coniothecii ad instar plus minusve congregatis, filamentis tenuibus intermixtis; per-
~~contexto~~ ^{contexto} tim e floccis erectiusculis vel subeffusis, aterrimis, contexto. Hyphis floccorum subarticulatis juvenilibus subtiliter verruculosis, adultis saepe sublobis, raze ramosis, aliquando a-nastomosantibus, sub lente fuscis, 5-8 μ cras-sis, cellulis plerumque cylindraccis, rarius oblo-n-gis vel subglobosis, spermogoniis biformibus, aliis minoribus piriformibus, fuscis, hyphis lateraliter adfixis, rarius acrogenis, super-ficie tuberculosis, spermatia cylindracea, hya-lina, 2,5-4 $\times$ 1-1,5 μ , emittentibus, 80-120 μ longis; alii autem majoribus cylindraccis vel corniformibus usque ad 300 μ longis, atris, superficie tuberculosis, spermatia ellipsoidea vel oblonga, hyalina, 2,5 $\times$ 1,5 μ emittentibus, conidiis forma variis, aliis Cladosporii, aliis rarissimis Tripasporii ~~ad inst~~ ^{ascophoriz} characteres exhi-bentibus; pycnidii peritheciisq^{ue} ^{ascophoriz} ignotis. verba

Hab. ad ~~ramulos~~ foliisque ~~ranulorum~~
Arbuti Urdonis, in Corsica (Jan. 1903)

Puccinia Romagnoliana Maier et Bacc.

Soris utriusque formae foliicolis vel culmi-
colis, semper epidermide tectis, elliptici
vel linearibus, sparsis, vel gregaris, saepe
confluentibus, longitudine rarissime 3 um
superantibus; soris uredosporiferis bullatis,
pallide cinnameis, paraphysatis; uredo-
sporis ovoides vel interdum subglobosis, 21-
28 ($\times$ 16-21 μ), episporio brunneo, aculeolato,
duobus poris germinationis praedito;
soris telentosporiferis bullatis, fusco-atris
paraphysatis; telentosporis inter paraphysas
nidulantibus, breviter pedicellatis, vel sub-
sessilibus, plerumque oblongis vel subda-
tatis, medio pauc vel parum constrictis,
episporio subtenui, levi, vilute brunneo,
nec poris germinationis praeditis, juveni-
libus ^{apice} apiculo incrassato saepe e pressione

lateraliter evolutis, adultis autem plus
minusve rotundatis, paullo incrassatis, 40-
60 $\times$ 13-20 μ .

Hab. in culmis foliisque Cyperilongi
in Corsica.