P. A. Saccardo

Flora Tarvisina renovata

1917

38/0030

Introduzione.

~~Prefazione~~

(corrivo
le pag. della Prefaz. e Bibliografia
si numerino con I. II. III. IV.....)

Il presente lavoro è come l'ampliamento e complemento di due miei vecchi contributi sulle piante trevigiane, già apparsi negli Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. L'uno è il Prospetto della Flora Trevigiana, pubblicato or sono 53 anni, cioè nel 1863-64[1]; l'altro, uscito 36 anni fa, cioè nel 1880[2], pel quale ebbi il diligente ajuto del mio compianto allievo Giacomo Biggozero.

Nella prefazione di dette Memorie esposi la ragione e le fonti onde furono compilate e sarebbe cosa soverchia e non necessaria di qui ripeterle. Qui solo mi piace ricordare e col più vivo sentimento di gratitudine, che fu per l'efficace e affettuoso incoraggiamento di tre illustri naturalisti, membri di detto Istituto, cioè Gio. Dom. Nardo (m. 1877), Giov. Zanardini (m. 1878) e Rob. de Visiani (m. 1878) se fu concesso a me diciottenne l'onore di vedermi pubblicato negli Atti dell'insigne Sodalizio il mio primo modesto lavoro; il che fu causa decisiva perchè la Botanica divenisse il mio studio prediletto e professionale.

Credo possa riuscire interessante per gli studiosi della patria Flora esibire una breve storia dello svolgimento di cotesti studi nell'agro Trevigiano dalle sue origini a noi, seguita dalla relativa bibliografia 3)

Prescindendo da qualche isolato** accenno fatto da vecchi botanici, come da Paolo Boccone (V)4) e da Antonio Turra (XXVIII) che rammentano alcune poche ~~qualche~~ piante trevigiane e dal March. Palamede De Suffren (sec. XVIII) che sulla fine del settecento trovò il Saccharum Ravennae al Piave presso il Ponte della Priula, noi dobbiamo arrivare al 1803 per incontrarci nel Co. G. de Sternberg (XX), che inizia le ricerche sulla Flora del celebre monte Grappa. Questo monte, situato al confine occidentale della nostra provincia sopra

---

1) Atti, vol. VIII, serie III.
2) Atti, vol VI, serie V.
3) Questi cenni sono in gran parte tratti dalla mia Memoria La Flora Trevigiana, notizie storico-bibliografiche, inserita negli Atti dell'Ateneo di Treviso, Nuova Serie Maggio 1910, il cui volume però non fu per anco distribuito.
4). I numeri romani fra parentesi (I, II, III....) si riferiscono agli autori, gli arabici (1, 2, 3...) alle pubblicazioni citate nella Bibliografia posta in fine della prefazione

i paesi d. Bosso e d. Crespano appartiene nel suo lato Nord alla provincia di Vicenza e confina a Nord col Bellunese. S'inalza col suo vertice principale a Metri 1770, precisamente ove sta il punto d. convergenza delle tre provincie. La sua natura mineralogica è calcarea o dolomitica ed il suddetto si diresse come secondario, onde è piuttosto da aversi per un completo gruppo di monti.

Fino dal secolo XVIII, e non prima, questo colosso delle nostre prealpi era famoso, sia per l'amenità dei suoi ridotti, sia per gli splendidi panorami che vi si godono e sia per la ricchezza e varietà delle piante medicinali che vi crescono. Già nel 1803 una certa signora Grassina di Bologna che vi faceva raccogliere coteste piante (ed essa stessa le conosceva bene) ed in tale quantità da farne commercio con le farmacie di Padova Vicenza, Bassano e paesi vicini. Se il Grappa era così noto e famoso per le sue erbe, è naturale che anche i fitologi volessero fare meta d. escursioni botaniche o di studi. Il primo che lo salì a tale scopo fu il ricordato co. de Sternberg. Vi fece due escursioni, una nell'estate ed autunno 1803, l'altra nel maggio, giugno e luglio del 1804, visitando non solo il Grappa, ma le località Collalti, Campo, Asolon, la valle d. S. Felice (S. Felà o S. Felicita), formanti parte dello stesso gruppo prealpino, e i paesi contermini. Vi raccolse e studiò un notevole numero di piante rare e interessanti, i cui nomi si trovano in due speciali sue relazioni (n. 59. 60).

Trent'anni appresso furono due bassanesi che ripresero le ricerche botaniche sul Grappa e luoghi limitrofi. Alberto nob. Parolini, un ricco e colto gentiluomo di Bassano (XXXV) e Giovanni Montini, un perito botanico-farmacista di Angarano presso Bassano (XXXIII). Non pubblicarono lavori floristici, ma delle piante raccolte fecero ricchi e progrediti erbari, ora conservati nel Museo civico di Bassano e ne fecero larga parte ad Antonio Bertoloni (III) e Filippo Parlatore (XV) per le varie loro "Flore italiane". Pare che intorno al 1840 anche due celebri

visitassero il Grappa, cioè: Roberto de Visiani (XVII) e Giuseppe Meneghini padovani (1811-1889); di certo sappiamo che di tal monte comunicarono alle predette "Flore italiane" qualche varietà botanica.

Che poi va ricordato fra i più operosi ricercatori delle piante Grappensi è Alessandro Spreafico, farmacista in Teggia di Bassano (XXXVIII), il quale fra il 1850 e 1860 perlustrò con molto fervore quel monte e delle piante raccolte arricchì il suo erbario, composto di oltre 4000 specie, fra indigene e esotiche. Questa raccolta nel 1903 fu acquistata dall'Orto botanico di Padova e incorporata nel suo Erbario generale. Molte piante dello Spreafico sono pure nell'Erbario Saccardo ora in deposito presso il Orto Padovano.

Escursioni botaniche sul gruppo di M. Grappa furono fatte dal Sig.r Domenico Montini intorno il 1872 (XXXIV); dal prof. Caro Massalongo (XII) nell'Agosto 1877; da Giacomo Bizzozero (IV) nell'agosto 1878; dal prof. Pio Bolzon (VI) dal 1889 in poi; dal prof. Adriano Fiori (IX) nell'aprile 1897; dal Dott. Rob. Cobau (XXVIII) nell'estate 1905 e 1906. L'Erbario Padovano possiede buon numero di esemplari di coteste raccoglitori; del Bizzozero anzi possiede l'intera pregevole raccolta; le piante invece di Dom. Montini e R. Cobau sono nello Erbario Saccardo.

Fra il 1890 e 1895 il professore Lino Vaccari (XXIV) fece parecchie gite sul Grappa e nel 1896 pubblicò una pregevole Flora casuale nella di coteste monte (n. 64) nella quale riassunse non solo le specie da lui raccolte, ma tutte quelle ricordate dai precedenti botanici. Non debbo dimenticare che un chiaro botanico irlandese, che passò molti anni in Italia ed ebbe in moglie una figlia di All. Parolini, John Ball (I) nelle sue "Alpine guide" (n. 1) ricordò parecchie piante da lui raccolte nel declivio coperto vasto gruppo montuoso.

Al merito di tanti egregi raccoglitori e botanici le ricchezze floristiche del rinomato monte ci sono in gran parte svelate; però una vera illustrazione monografica non è ancora venuta.

***

Se il Grappa ebbe numerosi ricercatori a cominciare da oltre un secolo, i lati settentrionali, orientali e meridionali della Provincia di Treviso non mancarono di validi illustratori, quantunque comparsi più tardi.

Dobbiamo infatti arrivare al 1837 per incontrarci in Adolfo de Bérenger (XXVI), oriundo francese, bavarese di nascita, ma italiano d'elezione, che, dopo compiuti gli studi nel celebre Istituto forestale di Marie Brun presso Vienna, giunse giovanissimo fra noi e tosto fu addetto all'ufficio forestale di Treviso. Cominciò poco più che ventiquattrenne a erborizzare con vera passione e attitudine in più luoghi della nostra Provincia, perseverando senza posa dal 1837 al 1847, segnatamente nei pressi di Treviso, di Motta, di Portobuffolè, del bosco Montello, a Conegliano, Serravalle, Fadalto, Miane, Follina, Valdobbiadene e in tutti i monti circostanti e in modo specialissimo nel bosco Cansiglio. Raccolse maggior numero di piante nei pressi di Treviso nel 1836-39, nel Cansiglio nel 1838-43, presso Valdobbiadene fra il 1844 e 1847, a Conegliano e Follina nel 1842 e 1843. A Valdobbiadene ebbe a collaboratore il giardiniere Pietro Favero (XXIX) che fece pure per sè un erbario in gran parte di piante esotiche; la parte salvata dal tarlo e migliore di questo trovasi ora intercalata nell'Erbario dell'Orto Padovano.

Promosso il Bérenger ai gradi più elevati degli uffici forestali, lasciò le escursioni botaniche e si dedicò a studi profondi di storia e giurisprudenza forestale e di selvicoltura, pubblicando ad un tempo anche qualche memoria di patologia vegetale. Nel 1869 fu promotore e fondatore dell'Istituto forestale di Vallombrosa 1) e visse poi in Roma come Ispettore generale delle foreste fino alla sua morte (1895). Il Bérenger per la copia e importanza delle raccolte fatte e per le non comuni cognizioni di botanica sistematica, quali appajono dalle accurate determinazioni delle sue piante, è da riguardarsi fra i più efficaci iniziatori della floristica trevigiana. Egli seppe infon-

1) In detto Istituto fu anche professore di selvicoltura e storia naturale (1869-1877). Allora l'Istituto aveva la sua sede a Vallombrosa; da due anni la sede principale fu trasferita a Firenze

Vera nei suoi amici Angelo Giacomelli (1816-1907) e Giuseppe Franchia (XXX) entrambi di Treviso l'amore a tali ricerche e così erborizzò più volte nel territorio. L'Erbario del Bérenger fu acquistato dal Giacomelli intorno al 1848 e accresciuto di qualche aggiunta propria e accuratamente conservato dal suo nuovo possessore, fu da questo ceduto nel 1903, per tenuissimo compenso, all'Istituto botanico di Padova, nel cui erbario generale fu tosto incorporato. L'erbario Bérenger constava di circa 6700 specie di fanerogame su 44 buste e circa 2000 specie di crittogame su 15 buste; quest'ultime trovansi tuttora mantenute separatamente. Le crittogame tutte e circa 3270 fanerogame sono d'Europa e più particolarmente dell'Italia superiore; le rimanenti sono esotiche.

Un altro benemerito della Flora trevigiana fu Giuseppe Franchia (XXX) già nominato. Colto farmacista e perito pure nelle chimiche, si dilettava anche dello studio botanico e, come dissi, guidato dapprima e incitato dal Bérenger erborizzò nei più luoghi dei contorni di Treviso e della parte più bassa della provincia. Un po' per volta andò preparandosi un erbario che, arricchito di non poche piante lombarde avute dal prof. Gius. Comolli (1780-1849) di altre avute dal Magg. Kellner (XXXI) e di assai più avute dallo stesso Bérenger, raggiunse la mole di 42 buste e circa 8000 esemplari. Quest'erbario fu da me accuratamente esaminato intorno al 1862-63 e fu di notevole ausilio alla compilazione del mio "Prospetto" (n. 50). Il Franchia determinava le piante con sufficiente accuratezza, per lo più colla scorta della "Flora italica" del Bertoloni. Dopo la morte del Franchia (1869) la raccolta fu acquistata dall'Istituto tecnico di Treviso, presso il quale si conserva tuttora.

Anche Federico Mayer (XXXII) merita di essere ricordato fra i floristi trevigiani. Egli materno del celebre Alessandro Braun di Berlino, nella sua lunga residenza in Mogliano come istitutore in casa del barone Bianchi, erborizzò con vivo fervore e diligenza tra nei dintorni di Mogliano che in altre località del Veneto. Nulla

pubblicò, ma gran numero delle piante raccolte comunicò al Bertoloni per la sua "Flora italica" onde in questa il basso Trevigiano è ben rappresentato. È notevole è pure il numero delle specie trevigiane raccolte fra il 1825 e 1830 sia intorno a Vittorio, che nei pressi di Salgareda e Ponte di Piave dal valente ornitologo ed entomologo veneziano Niccolò Contarini (XXVIII). Il di lui erbario si conserva nel Museo civico Correr di Venezia, che fu fuggevolmente esaminato da me nel 1861, ma diligentemente compulsato dal prof. Augusto Béguinot nel 1910 (II)

Non si deve dimenticare neppure Dionigi Stur (XXI) geologo dello impero austriaco, il quale intorno il 1855 fra le sue escursioni geologico-botaniche (nelle quali genialmente ricercava l'influenza del suolo sulla distribuzione delle piante (n. 61) visitò pure il Trevigiano, da Conegliano a Vittorio e Fadalto e nella sua memoria citò una dozzina di piante ivi riscontrate.

Il Maggiore Carlo Kellner de Koellenstein (XXXI) fu un dotto raccoglitore e conoscitore delle piante venete e nel 1839, 1840 e 1842 insieme al Giacomelli e al Fracchia raccolse piante presso Treviso, nel Montello e a Nervesa nel 1840-41, a Conegliano nel 1842, al Castello dei co. Collalto nel 1844 e a Tarzo nel 1845. Il suo ~~ricco~~ erbario ricco di 7000 specie fra italiane e straniere, acquistato nel 1848 dall'Istituto Veneto, fu compulsato per le piante trevigiane e veneziane dal prof. Béguinot nel 1910.

Parecchi dei botanici che ricordai più sopra come esploratori del Monte Grappa estesero anche altrove le loro erborizzazioni. Così il Bizzozero botanizzò pure meco nel bosco Montello, a Selva, Nervesa nel settembre degli anni 1872 e 1881. Il suo scelto erbario fu generosamente donato all'Istituto botanico di Padova dal fratello di lui; il valentissimo agronomo prof. Antonio, ora a Parma. Anche lo Zanardini (XXXX) erborizzò fra il 1827 e 1829 nei colli di Asolo e Possagno e fors'anco sul Grappa. Il suo ricco erbario fanerogamico conservasi

fra le raccolte del R. Istituto Veneto e più schedato nei riguardi della flora trevigiana dal prof. Béguinot nel 1910. Il Fiori (IX) nel maggio 1890 visitò alcuni luoghi del basso Trevigiano specie il bosco di Cà Tron presso Roncade e nella fine di luglio 1899 fece meco una breve gita a Vittorio che gli fruttò la scoperta dell'Heterospogon allionii.

Fra gli attuali e più benemeriti floristi del Trevigiano dobbiamo citare il prof. Pio Bolzon (VI) già ricordato che in seguito a numerose escursioni specialmente nel distretto di Asolo pubblicò una centuria di diligenti contributi (n. 8–28) ove figurano parecchie specie e moltissime località da aggiungersi alla Flora trevigiana e proprio in questi ultimi mesi riunì sistematicamente i suoi ritrovati tra del Trevigiano che del Bellunese in un pregevole MS. che ebbe la cortesia di comunicarmi in esame e dal quale ricavai molti dati che si troveranno contrassegnati coll'abbreviatura Bolz. MS.

Egualmente il dott. Renato Pampanini (XIV) che occupandosi più particolarmente delle vegetazioni del distretto di Vittorio (Cozzuolo, S. Bodo ecc.) ne pubblicò parecchie memorie illustrative (n. 36–48) e coi professori Adr. Fiori e A. Béguinot collaborò in una ben documentata escursione (n. 32) della "Flora italica", ricca già di 2200 numeri con molti duplicati e una xiloteca. Il prof. O. Penzig (n. 1856), mentre era assistente all'Orto Padovano fece il 24 giugno 1882 un'escursione nel bosco Cansiglio, riportandone qualche buona specie (vedi n. 6). Alcuni cenni sulle piante fanerogame proprie ai laghetti del distretto di Vittorio furono dati dal prof. Alessandro Trotter (XXII n. 62) e dal dott. G. Zanichelli (XXV. n. 65). Il primo poi mi comunicò non poche altre piante da lui raccolte sui colli di Vittorio e nei pressi di Conegliano, oltre di che, versatissimo nella cecidologia illustrò pure molte galle rinvenute sulle piante trevigiane, specialmente nel proprio periodico "Malpighia".

Un contributo assai rilevante alla flora trevigiana fu portato

nel 1909 dal mio Ajuto prof. Beguinot (II) con parecchie diligenti escursioni fatte per mio incarico intorno a Pederobba, Castelfranco e Resana e sopratutto nella bassa Trevigiana lungo il Piave, a Ponte di Piave, Salgareda, Jagarè, Zenson ecc. e assai copiose furono pure le raccolte eseguite nel 1915 dal mio allievo, Padre dott. Narsete Diratzouyan mechitarista (XXXVIII bis) nei dintorni di Cà Tron (Roncade) dove giace la grande tenuta dei Padri Armeni. Le raccolte del Beguinot e del Diratzouyan si trovano inserte nell'Erb. Saccardo. Merita anche speciale ricordo la accurata monografia del prof. M. A. Minio (XIII n. 35) "Sulla flora alveale del fiume Piave" nella quale naturalmente è compreso il lungo tratto che il fiume percorre nella provincia nostra.

Mi sia lecito ora finalmente ricordare anche l'opera mia a prò della patria flora trevigiana. Ero appena tredicenne, studente nel seminario di Venezia nel 1858, quando, passando le vacanze pasquali e le autunnali presso la mia famiglia abitante a Selva di Volpago, cominciai a raccogliere le piante di quei dintorni e a formarne un piccolo erbario. Abitando vicinissimo al bosco Montello, che allora era ancora folto di quercie, d'arbusti e di vegetazione erbacea nemorale, fui attratto a esplorarlo diligentemente, quasi palmo a palmo e coll'ajuto di pochi libri botanici, la "Flora Veneta" del Naccari, la "Summa plantarum" del Vitman, le "Species plantarum" di Linneo e il "Mattioli" imbastii fino dal 1859-60 una "Florula Montellica" ricca di circa 800 specie, compresevi quelle della campagna limitrofa. Premessi alcuni cenni geobotanici le specie seguivano accompagnate dal loro habitat. Questo lavoro giovanile rimase naturalmente inedito. Successivamente negli anni 1860, 61 e 62 1) avendo potuto procurarmi la Flora Veronensis del Pollini e l'imprestito dal mio vecchio e compiacente amico G. Fracchia del di lui erbario e della Flora italica del Bertoloni ed, inoltre, avendo potuto estendere le mie escursioni ai paesi di Nervesa, Colfosco, Ceneda, Serravalle, Cornuda, Pederobba, il materiale floristico si accrebbe assai e numerose davvero furono le specie trevigiane che potei ricavare sia dalle mie nuove erborazioni, sia dall'erbario Fracchiano e sia dalla magistrale

1) Nell'autunno del 1860 per meglio studiare le piante che andavo raccogliendo nel bosco Montello e dintorni piantai un piccolo orticello presso la mia abitazione di Selva con una minuscola roccia per le piante rupicole. Tengo ancora il catalogo delle 300 piante che coltivavo allora. L'orticello cessò alcuni anni dopo, quando mi trovai impegnato in altre ricerche.

e

opera del Bertoloni, dove, com'è noto, sono diligentemente registrati tutti gli habitat anche delle piante nostrali, specialmente quelle del M. Grappa inviategli dal Montini e Parolini e quelle dei pressi di Mogliano comunicategli dal Mayer. Così avvenne che [nel 1863 la flora trevigiana trovavasi ricca di 1387 specie (comprese le più comuni coltivate) ed io incoraggiato, come dissi in principio, dai dotti e compiacenti naturalisti Nardo, Zanardini, De Visiani, impresi con tutto l'impegno e assiduità a compilare il Prospetto della flora trevigiana (n. 50) pubblicato tosto negli Atti dell'Istituto Veneto.

Continuavo frattanto le ricerche sulle fanerogame, estendendo le mie erborazioni al ferace bosco Cansiglio e ai colli e monti circostanti a Vittorio; ma insieme raccoglievo cospicuo materiale di crittogame vascolari muschi epatiche e licheni, di cui pochissimo era noto nel territorio. Così potei far uscire nel 1864 la Bryotheca tarvisina, nel 1867-68 la Breve illustrazione delle crittogame vascolari (n. 51) e nel 1872 i Musci tarvisini, mentre del materiale delle epatiche e dei licheni dovevano trar partito assai più tardi i professori Caro Massalongo e Franc. Sanardo.

Nominato nel 1866 assistente all'Orto botanico di Padova presso l'ill. prof. de Visiani, questi incaricavami di compilare — giusta una deliberazione del R. Istituto Veneto — il Catalogo delle piante vascolari del Veneto (n. 56). In questo lavoro, uscito nel 1869, io potevo così aggiungere, fra le piante trevigiane, 169 specie raccolte dopo la stampa del mio Prospetto (n. 50)

8 Accintomi contemporaneamente alla ricerca dei funghi, che spontaneamente pullulano nell'Orto padovano, mi avvidi tosto che grandissimo era il numero delle forme nuove o fino allora affatto trascurate. Per tutto il Veneto il bar. de Hohenbuehl Heufler nella Enumeratio Crypt. Italiae Venetae nel 1871 ne aveva registrato l'esiguissimo numero di 245, mentre se ne conoscevano più migliaja negli Stati contermini.

Questa umiliante constatazione fu l'incitamento a mettermi sulla via

delle ricerche micologiche e le mie laboriose e ininterrotte indagini in questo vastissimo campo furono compensate. Oggi nel territorio Veneto (dell'Hayek) le 245 specie di funghi sono diventate oltre 4600 e di queste almeno 3000 sono trevigiane. Le pubblicazioni da me fatte riguardano in generale i funghi del Veneto, ma le specie illustrate derivano per la maggior parte (oltre che dal Padovano) da esemplari da me raccolti nelle ripetute esplorazioni dei boschi Montello e Cansiglio e nel tratto della provinciale da Montebelluna a Vittorio.

Immerso in queste assorbenti ricerche micologiche, delle quali gran parte del frutto trovasi riunito nella Flora Veneta crittogamica del compianto mio discepolo G. Bizzozero più volte citata (IV), non trascurai del tutto le piante vascolari, onde nel 1880 coadiuvato, come dissi, dal medesimo Bizzozero e obbligando pure alcuni cultori di piante tecniche di Dosson (Montini (XXXIV), Arturo Rossi (XXXVII), ma sopratutto di Abil. Spranzi (XXXVIII) già rammentati, potei pubblicare le Aggiunte alla Flora trevigiana (n. 57) comprendenti 324 specie, le quali sommate alle 1387 del Prospetto (n. 50) portavano a 1700 le specie fanerogame indigene e più comunem. coltivate, numero considerevole ove riflettiamo che il territorio nostro manca di monti altam. elevati e di regioni salse e marine.

Ma anche dopo il 1880 le ricerche floristiche non si arrestarono, ma continuarono attive, sia per le mie erborazioni, sia per quelle diligenti ed a volte attraenti del botanico Bolzon, Pampanini, Béguinot, Diedrichsen, Micoli, Cotton, Domenico e Francesco Saccardo.

Era quindi giunto il tempo perchè il lavoro di tanti si riepilogasse nella pregiata Flora Tarvisina rinnovata, nella quale ho creduto opportuno di comprendere, come nella Flora analitica d'Italia, anche le crittogame vascolari che nella facies si accordano tanto colle fanerogame.[1])

1) Nella mia memoria del 1910 (atti del Ateneo di Treviso) sono dati dei cenni storico-bibliografici anche sulle crittogame cellulari (Muschi, Epatiche, Alghe, Licheni, Funghi) della Flora Trevigiana; ~~dove qui~~ ma li omettiamo trattando qui solo di piante vascolari.

* * *

Ed ora faccio seguire le avvertenze indispensabili a conoscersi da chi userà la presente Flora.

I. Sono stampati in caratteri del solito corpo gli articoli che si riferiscono alle specie sicuramente indigene ovvero diffusissime e del tutto naturalizzate anche le di notoria origine esotica (come Elsholtzia cristata, Helvadea canadensis, Erigeron canadensis, E. annuus, Bidens bipinnata, Galinsoga parviflora e poche altre). Tutte sono munite di numero progressivo, seguito, per quest'ultime, dalla lettera N (naturalizzate)

II. Sono stampati in caratteri più minuti gli articoli comprendenti: a) le specie esotiche comunemente coltivate o per usi economici o per ornamento, sia che non si riproducano e diffondano spontaneamente, sia lo facciano in modo molto limitato e sporadico; b) le specie esotiche avventizie abbastanza diffuse di cui le comparse è accidentale; c) le specie che vivono per l'incertezza della determinazione, non per la volontà non bene accertata lasciano dei dubbi e richiedono conferma. Tutte queste specie non sono numerate, ma contrassegnate dalla lettera C e CA se coltivate o coltivate insieme e avventizie ~~insieme~~. Le ultime sono munite della lett. R. (da ricercare e riconfermare)

III. Quanto a citazioni bibliografiche mi limito a citare il mio Prospetto (Bibl. n. 50), le Aggiunte (Bibl. n. 57) e, per le Pteridofite, la mia Breve illustr. Crittog. vascol. (Bibl. n. 51). Riguardo ai sinonimi citati (fra parentesi) la ~~diversa~~ nomenclatura, che ~~eventualmente~~ adoperano i lavori ora nominati; e che eventualmente diversa dalla presente.

IV. Seguono a dette citazioni due numeri in parentesi. Il primo corrisponde all'eguale numero portato in comune dalle specie: a) nella Flora analitica di Fiori, Paoletti e Béguinot, b) nella Iconographia Florae italicae di Fiori e Paoletti, c) nella mia Cronologia della flora italiana. Il secondo numero, stampato in grosso, segna la data del più antico accertamento, finora noto, della specie in Italia, preso per lo più dalla mia Cronologia.

V. Sotto il titolo Var. (varietà) debbono intendersi non solo le varietà p. d. ma altre gradazioni delle specie, cioè sottospecie, forme, razze lusus, i cui limiti non sono sempre precisi. È da osservarsi inoltre che seguendo io in generale i criteri della Flora analitica, non poche entità tenute specificamente distinte da più botanici, ivi e da me sono considerate semplici varietà.

VI. I numeri romani I–IV si riferiscono alle attitudini alle quali normalmente le specie vegetano. E così:

Il I. indica la zona subplaniziale che da 5 m. sale fino a 80 m. s. l. m. e abbraccia i distretti di Treviso, Oderzo, Castelfranco e parte di Montebelluna.

Il II. indica la zona dei bassi colli del Montello, Biadene, Caerano, Colfosco, Conegliano ecc. cioè da circa m. 80 a 200.

Il III. indica la zona che ascende fino a circa 500 m. colle colline un pò più alte di Vittorio, Cornuda, Pederobba, Asolo, Possagno, Valdobbiadene, Miane, Campea ecc.

Il IV. finalmente indica la zona montana o prealpina che da 500 m. ascende fino a 1200 e raramente fino a 1500–1700 ~~cioè la zona montana o prealpina~~ e comprende fra i più alti i monti del gruppo del Grappa (fino a 1779 m.) ~~il Monfenera e l'Endimione~~, il M. Cesen (m. 1570) il M. Cresp (m. 1346), il M. Pizzoc (1572 m.), il Col Vicentin (m. 1765) M. Cimone (1292 m.), M. Croce (1551 m.) B. Cansiglio (fino a m. 1200) il M. Endimione (m. 1212) e tutti i minori.

VII Quanto ai confini del nostro territorio botanico non mi attenni con assoluta precisione ai confini politici della provincia, ma li estesi un pò per abbracciare ~~certe~~ talune zone naturali limitrofe e così pel Grappa, pel Cansiglio, pel passo S. Boldo accettai tutte le specie di piante raccolte, quantunque qualche settore spetti alle province confinanti di Vicenza, Belluno, Udine.

VIII. Gli aggettivi indicanti le stazioni delle piante sono quelli generalmente usati e di chiaro significato. Mi piace qui precisare soltanto il significato di taluni, quale io lo intendo:

Pascolive: le piante dei pascoli e luoghi erbosi naturali.

Pratensi: le piante dei prati e luoghi erbosi coltivati, quindi più pingui.

Ortive: piante spontanee negli orti, ortaglie e giardini.
Ortensi: piante coltivate in essi.
Nemorali: piante arborescenti costitutive dei boschi.
Nemofile: piante minori viventi sotto gli alberi de' boschi (il c. d. sottobosco)
Sepiane: piante costituenti le siepi
Sepincole: piante viventi presso e lungo le siepi.
Dumali: piante formanti i cespugli o dumi e viventi fra essi.
Marginali: piante che amano i ciglioni delle vie
Stradali: piante che vivono sulle strade (simili alle ruderali e alveali)
Domofile: piante nascenti presso i muri e nei cortili delle case (simili alle precedenti)
Foveali: piante più o meno immerse nell'acqua dei fossati.

IX. Circa la documentazione delle località in cui le piante furono raccolte, avverto che i nomi dei paesi seguiti da una semplice data (anno) si riferiscono ad esemplari da me trovati; se invece i paesi sono seguiti da nome d'autore, per lo più accompagnato da data e punto!, si riferiscono ad esemplari da me non raccolti, ma controllati.

X Degli autori e raccoglitore che contribuirono alla conoscenza della Flora Trevigiana, diedi qualche cenno nella presente prefazione. Qui a più facile intelligenza di chi userà di questa formula riassumo i luoghi ove si conservano le loro piante. Ripeto adunque:

a. che l'Erbario dell'Autore trovasi in deposito presso il R. Istituto botanico dell'Università di Padova

b. che gli Erbari de Bérenger, Bizzozero, Favero, Spranzi si conservano intercalati nell'Erbario generale del predetto Istituto, con alcune poche piante di Art. Rossi e P. Bolzon.

c. che gli Erbari de Kellner e Zanardini si custodiscono fra le raccolte del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in Venezia.

d. che l'Erbario del Co. Contarini si conserva nel Museo Civico Correr di Venezia.

e. che l'Erbario Fracchia trovasi presso il R. Istituto tecnico di Treviso.

f. che gli Erbari principali di Gio Montini e Alb. Parolini si trovano al Museo Civico di Bassano

g. che le piante trevigiane di F. Mayer e molte di Gio. Montini e Parolini si trovano nell'Erbario Bertoloni a Villa Piedosa presso Bologna e parecchie anche nell'Erbario Centrale italiano di Firenze.

h. che le piante di P. Bolzon e R. Pampanini si trovano presso i proprietari.

i. che le piante trevigiane raccolte da A. Béguinot, R. Coban, N. Divatzouyan, Dom. Montini, Art. Rossi, Dom. e Fr. Saccardo, G. Venturi, insieme a numerose di G. Fracchia e A. Bérenger e Al. Spranz. si conservano nell'Erb. Saccardo.

XI. Sarebbe stato forse conveniente ch'io accompagnassi il mio lavoro con un quadro, che ci desse la fisionomia fitogeografica della Flora; ma debbo candidamente confessare che occupato negli ultimi decennii prevalentemente delle ricerche micologiche, non rivolsi particolare attenzione all'argomento 1), e d'altro canto essendo nel frattempo stati pubblicati ottimi lavori fito-geografici e fito-ecologici per le tre provincie confinanti: Udine 2), Padova 3) e Venezia 4) tanto meno mi sembrò urgente simile trattazione per l'agro Trevigiano. E si aggiunga che anche per questo abbiamo già ora tre pubblicazioni illustranti le piante di zone particolari della provincia, cioè il Montello 5), l'alveo del Piave 6) e la flora cacuminale del Grappa 7)

(Mano mano che detta strada si consolidava e si usava le piante apparse andavano scomparendo onde)

1) Come documento della rapida comparsa e scomparsa di piante per effetto di movimenti di terreno operati dall'uomo credo opportuno, eccezionalmente, di riportare in calce alla prefazione l'elenco delle piante che vidi e annotai nei margini e nell'area di via Cavallotti in Vittorio durante la sua costruzione nel 1905 e 1907, per la quale furono apportati da luoghi vicini materiali vari (muricce, ghiaje, terra, ecc.) attualmente la massima parte ~~di quelle piante~~ di esse è scomparsa.

2). Gortani Luigi e Michele. Flora Friulana. Udine 1905-1906. 8°. I pp. X, 225 e mappa, II pp. 520

3). Béguinot A. Saggio sulla Flora e sulla Fitogeografia dei colli Euganei, Roma 1904 pp. 192 e mappa. Detto. Flora Padovana. Padova 1909-1914, 8° gr. pp. 764 e tav. 20.

4). Béguinot A. La vita delle piante superiori nella Laguna di Venezia. Venezia, 1913. 8° gr. p. 348, 1 mappa e tav. 64.

5). Saccardo Francesco. Florula del Montello. Padova, 1895, 8° pp. 15.

6 Minio M. A. Sulla flora alveale del fiume Piave. Firenze, 1910, pp. 84.

7 Vaccari Lino. Florula della cima del Monte Grappa. Bassano, 1896 pp. 21.

note

Tutto l'Elenco in caratteri piccoli

Elenco delle piante osservate nelle Vie Cavallotti e Vittorio negli anni 1905-1908, ora in massima parte scomparse. Vedi nota 1) pag. ...

Pag. 90 [illegible]

Le specie segnate coll'asterisco * sono evidentemente importate dagli orti vicini, quelle col segno × sono erratiche da molto tempo naturalizzate

4

17

Achillea Millefolium (alba e rubra)
Aethusa Cynapium
Agrimonia agrypyrum repens v. glaucum
Agrostis alba v. vulgaris
— stolonifera
Agrostemma Githago
Ajuga reptans
Alisma Plantago
Alopecurus agrestis
Amarantus retroflexus
— deflexus
— ascendens
~~Anagyris foetida~~
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
— Cotula
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis Vulneraria
Antirrhinum majus (album et rubrum)
~~* Aquilegia vulgaris~~
Arabis hirsuta v. sagittata
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
* Artemisia Absinthium
— campestris
— camphorata
— vulgaris
Astragalus glycyphyllos

Atriplex hastatum
* Avena sativa

Ballota nigra v. borealis
Bellis perennis
Bidens bipartita
* Beta vulgaris V. Cicla
Brassica Sinapistrum
— * — Napus v. oleifera
Briza media
Bromus erectus
— mollis
— arvensis
— — v. monostachyus
— sterilis
Baptisia tinctoria

Campanula Erinus
— Trachelium
~~— Speculum~~
* Cannabis sativa
Capsella Bursa-pastoris
— — var. elatior (50 cm. alta)
Cardus nutans
Centaurea Jacea v. vochinensis
Cerastium triviale
— — v. glandulosum
— semidecandrum v. glutinosum
— tetrandrum
Chelidonium majus
Chenopodium album
— murale

Chondrilla juncea
Chrysanthemum Leucanthemum
— — v. hispidum
Cichorium Intybus
Cirsium arvense
— lanceolatum
— oleraceum
Clematis Vitalba
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
— Lepsium
* Cucumis melo
Cynodon Dactylon
Cynosurus echinatus

Dactylis glomerata
Daucus Carota
— — v. roseus
* Delphinium Ajacis
Diplotaxis muralis
— tenuifolia
Dorycnium pentaphyllum

Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
× Eleusine indica.
Equisetum arvense
— palustre
Eragrostis pilosa
× Erigeron annuus
Erythraea pulchella
Euphorbia helioscopia
— Peplus
— Cyparissias
— amygdaloides
— verrucosa

(× — canadensis.

16

Festuca elatior
— gigantea
— rubra
Foeniculum vulgare
Fumaria officinalis

Galeopsis Tetrahit v. speciosa
— Ladanum v. angustifolia
× Galinsoga parviflora
Galium Mollugo
— verum
— palustre
— Cruciata
Glechoma hederacea

Helianthus echinodes
Heracleum Sphondylium
Holcus lanatus
Hordeum murinum
Humulus Lupulus
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum

* Ipomoea purpurea
Juncus glaucus
— tamprocarpus

Lactuca Sativa
— Scarola
Lamium album
— purpureum
Lappula Myosotis
Lepiana communis

Lathyrus Aphaca
— pratensis
Leontodon hispidus
Lepidium Iberis
— Draba
Linaria minor
Lithospermum arvense
Lolium perenne
— — v. italicum
— — v. ramosum
— temulentum
Lotus corniculatus
— tetragonolobus
Lychnis alba
— rubra
Lycopus europaeus

Malachium aquaticum
Malva silvestris
— rotundifolia
Matricaria Chamomilla
Medicago lupulina
— sativa
— — v. varia.
Melilotus officinalis
— — alba
— albissima
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
— silvatica

Nasturtium officinale
— amphibium
— silvestre

Bromus sterilis
Bromus tectorum
Panicum Crus-galli
* — capillare
* — sanguinale
Papaver Rhoeas
— — v. strigosum
* — somniferum
Pastinaca sativa
Petasites officinalis
* Petroselinum hortense
Peucedanum Oreoselinum
Picris hieracioides
* Phaseolus vulgaris
2 * Physalis pubescens
1 Pleum Boehmeri
Plantago major
— lanceolata
— media
Poa annua
— pratensis
— trivialis
Polygonum aviculare
— Persicaria
— lapathifolium
— mite
— Convolvulus
Potentilla reptans
* Prunus domestica
* — Persica
Ranunculus repens
— bulbosus
— acer
— sardous
— arvensis

Reseda lutea
Rhinanthus major
Rubus fruticosus v. almifolius
— — v. coryllifolius
Rumex pulcher
— obtusifolius
— Acetosa

Salvia pratensis
Sambucus nigra
Saponaria Vaccaria
~~Satureja Calamintha~~
Satureja vulgaris
— Calamintha
— Acinos
Scabiosa Columbaria
Sclerochloa rigida
Scirpus Holoschoenus
Scrophularia canina
— nodosa
— aquatica
Secale cereale
Senecio vulgaris
Sisymbrium officinale
— Sophia
— Columnae
— crepidifolium
Solanum Dulcamara
* — tuberosum
— nigrum
— — v. miniatum
Silene vulgaris
— nutans

Sonchus oleraceus v. asper
Sorghum halepense
Specularia Speculum
* Spinacia oleracea
Stachys recta
— silvatica
Stellaria media
Symphytum officinale

Taraxacum officinale
* Tetragonia expansa
Teucrium Botrys
Tragopogon pratensis
— — v. orientalis
Trifolium pratense
— repens
— — v. rubescens
— campestre
— rubens
Triticum flavescens
Triticum Spelta
— — v. hibernum
Tunica Saxifraga

Urtica dioica
— urens

Valerianella rimosa
Verbascum phlomoides
Verbena officinalis
Veronica persica
— arvensis
Vicia Cracca
— Sativa
— — v. angustifolia

Oss. Merita di essere ricordata anche l'improvvisa comparsa in gran copia delle Amarantus altre delle America Sett., in seguito allo sterro eseguito nel 1912 del cimitero di S. Andrea (Vittorio) di Bigonzo, che da oltre 50 anni era rimasto e inerbato. I semi avevano mantenuto la vitalità per quel lungo periodo. Dopo tre anni le piante scomparvero in seguito al rimboschimento della superficie. Del resto tale pianta è trovata avventizia in altri luoghi del Veneto, non però nel Trevigiano.

Bibliografia della Flora Trevigiana

I Autori ed insieme raccoglitori ~~[illegible]~~

I Ball John (n. Dublin 20 Agosto 1818, m. S. Kensington 21 Ott. 1889)

1. A guide to the eastern Alps. London Longmans, Green and C. 1868, 8° p. 639.

II Béguinot Augusto (n. Pabiano 17 Ott. 1875). Ajuto e incaricato di Botanica e della Direzione del R. Orto botanico in Padova

2. L'area distributiva della Saxifraga petraea ed il significato biogeografico delle sue variazioni. Padova P. Prosperini (Atti dell' Anad. Scient. Veneto-trentino-istriana I pp. 81-96.

III Bertoloni Antonio (n. Sarzana 11 Febbr. 1775, m. Bologna 17 Apr. 1869)

3 Flora italica. Bononiae, Ricc. Masi, 1833-1854, 10 vol. 8°

IV Bizzozero Giacomo (n. La Longa [Vicenza] 1852, m. Padova 1 Apr. 1885)

4 Alcune piante da aggiungersi alla Flora Veneta. Padova, Prosperini 1879 (Boll. Soc. Veneto-trentina Sc. nat. n. 2 pp. 36-40)

5 Seconda aggiunta alla Flora Veneta. Venezia, Antonelli, 1882 (Atti R. Ist. Veneto di Sc. L. ed Arti Serie V, vol. VIII pp. 423-433)

6 Contribuzione alla Flora Veneta, III aggiunta. Venezia, Antonelli, 1883. (Atti come sopra Ser. VI vol. I pp 575-587)

V Boccone Paolo [Padre Silvio] (n. Palermo 24 Apr. 1633, m. ivi Dec. 1703)

7 Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania. Venetia, J. B. Zuccato 1697, 4° p 196+20, tav. 132.

VI Bolzon Pio (n. Asolo 21 Luglio 1867), professore nel R. Liceo di Belluno.

8 Di un raro Narciso esistente nel Veneto. Siena 1891, Lazzeri (Rivista ital. Sc. nat. XI pp. 39-40.

9 Una nuova località di Fragaria indica Andr. Siena, Lazzeri (Bollettino del Naturalista XI pp. 65-66.

10 Appunti alla Flora Trevigiana. Firenze 1892 (Bull. Soc. bot. it. pp. 261-269).

11 Contribuzione alla Flora Trevigiana. Firenze 1895 (Nuovo G. bot. it. Serie nuova II pp. 189-216.

19

12 Contribuzione (I) alla Flora Veneta. Firenze 1896 (Boll. Soc. bot. it. pp. 128-135)
13 Contribuzione (II) alla Flora Veneta Firenze 1896 (l.c. pp. 171-176)
14 " (III) " " Firenze 1897 (l.c. pp. 51-56)
15 " (IV) " " " 1899 (l.c. pp. 134-139)
16 " (VI) " " " 1900 (l.c. pp. 274-283)
17 " (VII) " " " 1902 (l.c. pp. 332-338)
18 " (IX) " " " 1902 (l.c. pp. 25-29)
19 " (X) " " " 1903 (l.c. pp. 33-39)
20 " (XI) " " " 1904 (l.c. pp. 32-34)
21 " XII " " " 1905 (l.c. pp. 60-64)
22 Addenda ad Floram italicam. Firenze 1908 (l.c. pp. 5-10)
23 Supplemento generale alle Piante vascolari del Veneto (e Mantovano) di R. De Visiani e P.A. Saccardo. Venezia, 1898 (Atti del R. Istituto Veneto di Sc. Lett. Arti IX pp. 481-501).
24 Nuove aggiunte alla Flora Veneta. Firenze 1910 (Boll. Soc. bot. ital. pp. 69-77)
25 Emendande in Flora italica. Firenze 1913 (l.c. pp. 41-45).
26 Note di Fitogeografia. Firenze 1913 (N. Giorn. bot. it. XX pp. 302-332)

VII. Bolzon Pio a De Boni Antonio (n. Rovigo 28 apr. 1862, m. Treceata 7 magg. 1901)
27 Contribuzione (V) alla Flora Veneta. Firenze 1900 (Boll. Soc. bot. it. pp. 87-95)
28 " (VIII) " " " 1901 (l.c. pp. 73-83)

VIII De Toni Ettore (n. Venezia 18 Marzo 1858) Professore nel R. Liceo M. Foscarini in Venezia
29 Nota sulla Flora e Fauna Veneta e trentina. Udine 1898 (Atti della Accad. di Udine. Ser. II, Vol. V pp. 1-34, estr.
29bis Nota sulla Flora friulana, III (1895) (pag. 16) Prof. nel R. Istituto sup. forestale in Firenze

IX Fiori Adriano (n. Castelnuovo [Modena] 17 Dec. 1865); Paoletti Giulio (n. Venezia 28 Nov. 1865) e Régnoust Augusto.
30. Flora analitica d'Italia. Padova, tip. Seminario. Vol. I, 1896-1898; vol. II, 1900-1903, vol. III, 1903-1904, vol. IV, 1907.

Fiori Adriano, Beguinot Augusto e Pampanini Renato (n. Valdobbiadene [Treviso] 20 ott. 1875.

31 Flora italica exsiccata. Florentiae. Cent. I e II, 1905; Cent. III–IV, 1906; Cent. VI–VII, 1907; Cent. VIII, 1908; Cent. IX–X, 1908; Cent. XI–XII, 1910, Cent. XIII–XIV, 1910; Cent. XV–XVI, 1911; Cent. XVII–XVIII, 1912; Cent. XIX–XX, 1913; Cent. XXI–XXII, 1914.

32. Schedae ad floram italicam exsiccatam. Florentiae 1905–1913 et Patavii 1914. Fasc. I in N. giorn. bot. it. XII (1905) pp. 141–216 (Cent. 1–2)

Fasc. II " " " XIII (1906) pp. 5–50, 166–205, ~~289–346~~ (Cent. 3–4)
Fasc. III " " " XIII (1906) pp. 289–346 (Cent. 5–6)
Fasc. IV " " " XIV (1907) pp. 69–116, 248–292 (Cent. 6–7)
Fasc. V " " " XV (1908) pp. 307–354. (Cent. 8)
Fasc. VI " " " XV (1908) pp. 445–543 (Cent. 9–10)
Fasc. VII " " " XVI (1909) pp. 463–695, XVII (1910) pp. 61–122 (Cent. 11–12)
Fasc. VIII " " " XVII (1910) pp. 563–668 (Cent. 13–14)
Fasc. IX " " " XVIII (1911) pp. 279–319, 459–512 (Cent. 15–16)
Fasc. X " " " XIX (1912) pp. 517–608 (Cent. 17–28)
Fasc. XI " " " XXI (1913 pp. 15–109 (Cent. 19–20)
Fasc. XII Padova, Gallina (1914) pp. 1–94. (Cent. 21–22)

X Mari Girolamo (n. Concordia [Modena] 1 Agosto 1836; m. Terni 30 agosto 1909)

33 Catalogo di un erbario alpino. Viterbo, Monarchi, 1898, 8° p. 39.

XI Marinelli Giovanni (n. Udine 1846; m. Firenze 1900).

34 Al Cansiglio, lettura tenuta a Vittorio il 24 Giugno 1882 con due appendici. Udine, Doretti, 1883 (Cronaca della Soc. alpina friulana, anno II pp. 1–31, estr.

XIII Nimis Michelangelo (n. Venezia 11 Luglio 1872) Prof. nel R. Liceo di Parma.

35 Sulla flora alvesle del fiume Piave. Firenze 1910 (Nuovo Giorn. bot. Ital. XVII pp. 469–528.

XII Magalongo Caro (n. Verona, 25 marzo 1852) Prof. nell'Università di Ferrara

34bis Saxifraga Rochebrunei Sternb. eine neue Phanerogamen der ital. Fl. Centralbl. bot. Centralbl. 1882 – Intorno a varietà di Saxifraga Iguarrica e S. caesia Bull. soc. bot. it. 1911 p. 26: In questi due articoli viene illustrata una nuova varietà di S. caesia. Vedi a suo posto.

4

XIV Pampani Renato (n. Valdottavo 20 ott. 1875) aiuto e lib. Doc. di Botanica nell'Istituto di Studi superiori in Firenze.

36. Erborizzazioni primaverili ed estive nel Veneto. Firenze 1903 (Nuov. Giorn. bot. it., X pp. 576-581)

37. Carex Nicolotti Pamp. Roma 1903, Voghera (Annali di Botanica I p. 153-141, con 1 tav.)

38. Essai sur la Géographie botanique des Alpes et en particulier des alpes sud-orientales. Fribourg, typ. Fragnière, 1903, 8° p. 215 planch. 10.

39 Una forma rara di Asplenium Ruta-muraria. Firenze 1906 (Nuov. Giorn. bot. ital. XIII pp. 229-235, 2 tav.)

40 Fioriture invernali. Firenze 1906 (N. Giorn. bot. it. XIII pp. 207-228.

41. Intorno a due Aquilegie della Flora italiana. Firenze 1909 (N. Giorn. bot. ital. XVI pp. 5-22)

41bis L'Iris Cengialtii Ambr. e le sue forme. Firenze, 1909 (N. Giorn. bot. it. XVI pp. 1-36)

42 Il Cirsium oleraceum x canum Bolz. (non Al.). Firenze 1910 (Bull. Soc. bot. it. pp. 41-48)

42bis La Medicago Pironae Vis. nel Passo di S. Ubaldo. Firenze (Bull. c.s. 1910 p. 58.

43. Alcune varietà e forme nuove o poco note. Firenze 1911 (Bull. c.s. pp. 78-83)

44. Contributo alla conoscenza della Flora delle Prov. di Treviso (Bull. c.s. pp. 165-173)

44bis Vaccari L. Plantae ital. criticae fasc. III. Roma 1911 in Annali di Bot. IX p. 15.

45. La Genista sericea Wulf. Firenze 1912 (Bull. c.s. pp. 327-348)

46. Due felci rimarchevoli nella prov. di Belluno (Canisghi) Firenze 1912 (Bull. c.s. pp. 173-174 c. fig.)

47. Intorno a tre piante del Veneto. Firenze 1913 (Bull. c.s. pp 32-36)

48. Due piante interessanti della Prov. di Treviso. Fir. 1915 (Bull. c.s. pp. 64-66)

XV Parlatore Filippo (n. Palermo 1816; m. Firenze 1877) e Caruel Teodoro (n. Cinderniagora 1830; m. Firenze 1898) ed altri

49. Flora italiana. Firenze, Le Monnier, 1850-1896 vol. 10. 8°

L2

XVI Saccardo Pier Andrea (n. Treviso, 23 apr. 1845)

50 Prospetto della flora Trevigiana. Venezia, Antonelli 1863-64 (atti del R. Istituto Veneto di Sc. Lett. arti, ser. III vol. VIII pp. 1087-1152 [1863], vol. IX pp. 427-445, 481-497, 605-638, 837-877 [1863-64])

51 Breve illustrazione delle crittogame vascolari trevigiane, aggiuntavi la enumerazione di quelle fino ad oggi note nella flora Veneta. Venezia, M. Visentini, 1867-68 (Commentario della Fauna, Flora e Geol del Veneto e del Trentino N. 1 pp. 24-40 [Luglio 1867])

55. La Flora Trevigiana, notizie storiche e bibliografiche. Treviso 1910 (atti dell'Ateneo di Treviso. Nuova Serie pp. 1-28, estr.

52 Nova species italica ex genere Ophioglossum. Firenze 1871 (N. Giorn. bot. ital. III pp. 165-167 con fig.)

53 Addenda ad Floram italicam: pro Flora Veneta. Genova, Ciminago 1891 (Malpighia V pp. 234-235).

54 Due felci rare della provincia di Treviso. Firenze, 1891 (Bull. Soc. bot. ital. p. 187)

XVII Saccardo Pier Andrea e de Visiani Roberto (n. Sebenico 9 apr. 1800 m. Padova 4 maggio 1878)

56 Catalogo delle piante vascolari del Veneto e di quelle più estesamente coltivate. Venezia, Antonelli, 1868-1869 (atti del R. Istituto di Sc. Lett. Arti Ser. III, t. XIV pp. 71-117; pp. 303-343; pp. 477-519; pp. 703-737; pp. 1091-1139; pp. 1503-1545; pp. 1735-1776)

XVIII Saccardo Pier Andrea e Bizzozero Giacomo

57 Aggiunte alla Flora Trevigiana. Venezia, Antonelli, 1880 (atti del R. Ist. Ven. Ser. V v. V pp. 681-719)

XIX Saccardo Francesco (n. Selva [Treviso] 7 luglio 1869; m. Avellino 6 ott. 1896).

58 Florula del Montello. Padova, Prosperini, 1895 (Boll. Soc. Veneto-Trentina Sc. nat. VII pp. 5-18)

XX. Sternberg Kaspar conte de (n. Praga 6 genn. 1761; m Brezina 20 Dec. 1838)

59 Botanische Ausflüge in die Rhetischen Alpen. Regensburg 1804, 12°, pp. 1–65 (Botan. Taschenbuch d. Hoppe)

60 Reise in die Rhetischen Alpen vorzüglich in botanischer Hinsicht im Sommer 1804. Nürnberg, 1806, 12°, p. 64 (come Beilage zu Botan. Taschenbuch d. Hoppe)

XXI. Star Georg (n. Beczko Ung. 5 apr. 1827; m. Vienna 9 Okt. 1893)

61. Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen als Beitrag zur Kenntniss der Flora von Oesterreich, der Geographie und Geschichte der Pflanzenwelt. Wien 1856–57 (Sitzungsb. der K. akad. d. Wiss. Math.-Nat. Cl. XX pp. 71–143, (1856) e XXV pp. 349–421 (1857)

XXII. Trotter Alessandro (n. Udine 26 luglio 1874)

62 Osservazioni sulla Macroflora dei laghetti d. Reina. Roma tip. Voghera, 1906 (Annali d. Bot. IV pp. 279–286

XXIII. Turra Antonio (n. Vicenza 1730; m. ivi 1796)

63 Vegetabilia Italiae indigena methodo Linneana disposita MS. fol. (circa 1780–1790) ora nella Bibl. civica d. Vicenza.

XXIV. Vaccari Lino (n. Crespano [Treviso] 23 agosto 1873)

64 Flora della cima d. Monte Grappa. Bassano, R. Silvestrini, 1896 (Boll. annuale del Club Alp. Bassanese, II. pp. 56–72)

XXV. Zanicol Giovanni (n. Pieve d. Soligo [Treviso] 27 agosto 1878)

65 Idrografia del circondario d. Vittorio. Treviso, Soc. tip. edt. 1904, 4°. pp. IV 1–95, 8 tav. e inc. nel testo

24 II Raccoglitore (che non ~~scrittori~~ ~~autori~~ sulla Flora Trevigiana) (pubblicarono scritti)

XXVI Bérenger (de) Adolfo (n. Monaco di Baviera 25 Febbr. 1815; m. Roma 8 Marzo 1895) Ispettore ~~sup.~~ forestale generale, prof. di Selvicoltura e botanico.

XXVII Coban Roberto (n. S. Nazario [Vicenza] 25 Ott. 1883) Assistente di Botanica nella Scuola sup. di Agricoltura di Milano.

XXVIII Contarini Niccolò conte (n. Venezia 26 Sett. 1780; m. ivi 16 Aprile 1849) Ornitologo ed entomologo egregio e botanico.

XXVIII bis Diratzouyan Narsete, padre Mechitarista (n. Artwin [Armenia russa] 22 Giugno 1875), ora ~~[illegible]~~ Redattore ~~[illegible]~~ nel Convento di S. Lazzaro (Venezia). Erborizzò intorno a Ca' Tron (Roncade) e a S. Zenone degli Eremiti.

XXIX Favero Pietro (n. Valdobbiadene 1813; m. ivi 1889). Giardiniere, botanofilo.

della rivista armena Polyhistor

XXX Fracchia Giuseppe (n. Dolo [Venezia] 29 Nov. 1797; m. Treviso 6 Febbr. 1869). Perito farmacista e botanico, specialmente micologo.

XXXI Kellner Carlo de Koellenstein (n. Leitmeritz [Boemia] 1807; m. Comorn 1849). Maggiore dei Granatieri nell'esercito austriaco; esperto botanico raccoglitore nel Veneto.

XXXII Mayer Federico (n. Hessen, 1788; Mogliano 21 Dec. 1828). Istitutore e botanico raccoglitore.

XXXIII Montini Giovann. (n. Bassano 1802; m. Angarano [Bassano] 1852). Farmacista e raccoglitore peritissimo.

XXXIV Montini Domenico di Bassano. Raccoglitore delle piante del Grappa intorno 1872.

XXXV Parolini nob. Alberto (n. Bassano 14 Giugno 1788; m. ivi 15 ~~[illegible]~~ Genn. 1867) Viaggiatore e zelante botanico raccoglitore

XXXVI Rossi Arturo (n. Possagno 1859; m. ivi 24 Febbr. 1891). Professore liceale, geologo e botanico.

25

XXXVII Saccardo Domenico (n. Padova 14 Nov. 1872). Direttore agrario della Società Concimi di Roma, ~~micologo~~ specialmente cultore di micologia.

XXXVIII Spranzi Alessandro (n. Vicenza 25 Maggio 1802; m. Tezze [Bassano] 10 Sett. 1890. Farmacista e botanico-raccoglitore.

XXXIX Venturi Gustavo (n. Rovereto 1830; m. Trento 5 Giugno 1898). Avvocato, botanico e specialmente briologo.

XXXX Zanardini Giovanni (n. Venezia 12 Giugno 1806; m. ivi 24 Aprile 1878). Medico, botanico e specialmente algologo

Div. I Pteridophytae
cl. I Filicinae
fam. 1 Filices

Ceterach Adans.

1 C. officinarum W. – Cr. vasc. p. 24. (1 – 1415)
III. Rupestre, murale, xerofila. Vittorio, Fregona, Lago (1862–1915); Maren (Pamp. 44). Asolo, radici del grappa presso Fietta (Bolz. n. 11).

Polypodium Linn.

2 P. vulgare L. – Cr. vasc. p. 25 (4 – 1532)
I–IV Rupestre, murale, arboricola, eliofoba. Tutta la provincia, più frequente nel Montello e nei colli (1862–1914) Cansiglio sui faggi (Contarini 1825! ~~[illegible]~~); Asolo (Bolz. MS.)
Vulgo: Pimpirimporio (corrotto di Polipodio)

3 P. Phegopteris L. – Cr. vasc. p. 25 (5 – 1785)
II–IV. Nemofilo, eliofobo, igrofilo, alveale, Montello fino dal 1862; bosco Collungo pr. Valdobbiadene, 1870; alveale nel greto del Piave, sez. Trevig (Min. 35); Grappa a Domadòr a m. 1900 (Bolz. MS.)

4 P. Dryopteris L. – Cr. vasc. p. 26 (6 – 1566)
II–IV. Rupestre, nemofilo, arboricola, eliofoba. Cansiglio (Contarini 1825! Bérenger 1839!, Sacc. 1869), Boccaor (Bolz. MS.) – β Robertianum (Hoffm.). Rupestre, calcicola, eliofobo. Montello fino dal 1862; Grappa (Bizzozero 1878!, D. Montini 1872!); Corolo, ~~Pederobba~~, Cornuda (1869 ~~Sacc.~~), Pederobba (Béguinot 1909!; San Martino, Castelli pr. Asolo (Bolz. MS.)

Aspidium Sw.

5 A. Lonchitis (L.) Sw. – Cr. vasc. p. 27 (Hypopeltis) (11 – 1532)
IV–V. Rupestre, eliofobo. Cansiglio (Bérenger, 1839!, Sacc. 1869); Col Vicentin (Pamp. 44) Grappa (Sternb. n. 59, Bolzon 1895 h. Pat!, Colau 1905!)

6 Aspidium aculeatum (L.) Sw. Cr. vasc. p. 28 (Hypopeltis) (12 – 1532)
Nemofilo, eliofobo, igrofilo. Montello e colli dal 1862; Cansiglio: Contarini 1825! Sacc. 1865, Grappa (Bolz. MS.) – β lobatum (Sw.). Col tipo: Consiglio Millifret (Pamp. 36 Montello al Forame (Sacc. 1862)

NB I numeri premessi alle specie (1. 2. 3. 4. ecc) sono progressivi. Prego il Compositore di correggere i molti errori che troverà nell'ordine degli stessi.

Nephrodium Rich.

7 N. Thelypteris (L.) Stremp. (vitt. vasc. p. 29 (Polystichum) (13. 1550)
I–III. Idrofilo, lacustre, palustre, eliofobo. Quinto pr. Treviso, Bavaria al Montello, Lago pr. Vittorio (1863–1868); Cà Tron pr. Roncade (Divatzouyan 1915!)

8 N. Oreopteris (Ehrh.) Kunth. Cr. vasc. p. 29 (Polystichum) (14. 1723)
II. Eliofilo, nemofilo. Montello (1864); Valdobbiadene nel bosco Collungo (1870)

9 N. Filix-mas (L.) Rich. Cr. vasc. p. 30 (Polystichum) (15. 1415)
I–IV. Nemofilo, eliofobo, ~~[illegible]~~ sepiario. Montello, dal 1862; Cansiglio (Bérenger 1839! Sacc. 1865), Masèr (Bolz. ms.); colli, siepi di pianura di rado
Valgo: Sfeldin (felcetta)

10 N. rigidum (Sw.) Desv. Cr. vasc. p. 31 (Polystichum) (17, 1718)
IV–V. Rupestre, nemofilo, eliofobo: Cansiglio (Bérenger, 1839! Sacc. 1869); Grappa (Bizzozero 1878 herb. Pat.)

11 N. spinulosum (Sw.) Stremp. Cr. vasc. p. 30 (Polystichum) (18. 1790)
II–IV. Nemofilo, eliofobo. Montello (Béreng. 1839, Sacc 1866) Cansiglio (Sacc. 1869); colli di Valdobbiadene (Béreng. in herb. Pat.); sopra Serravalle di Vittorio (Contarini, 1825!) – Var. dilatatum (Desv.) Koch. Montello, VIII, 1862! – Fm. erosum Milde. Cansiglio dal Piano alla Casera Schiossi (Pamp. 48).

12 Cystopteris Bernh.
C. montana (Lam.) Bernh. Cr. vasc. p. 33 (19. 1785)
IV–V. Rupestre, eliofoba. Palentina. Val Bona del Cansiglio (Bérenger 1839); Cansiglio (1869 anche Bér. 1846!, ~~Sacc. 1869~~, Penzig 1882, in herb. Pat!)

19 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Cr. Vasc. p. 32 (20. 1550)
II–V Rupestre, nemofila, eliofoba, arboricola. Montello e colline dal 1862 (abbastanza Bizz. 1881!); greto del Piave (Minio 35); Pontegno (Contarini, 1825!, Bizz. 1878!); Grappa (Sternb. 59) – Var. pumila (Bert. Vis. et San. (1824) Grappa (Montini e Vaccari in Vacc. 64.) – Var. alpina (Desv.) Milde (1595). IV–V. Rupestre, eliofoba. Canseglio verso le Valentine e Valbona (Bérong. 1859 h. Pat!); Grappa (Vitman e Spranji in herb. Pat!, C. Massal. 1877, Bizz. 1878 in herb. Pat!). Le fm. anthriscifolia (Hoffm.) e cynapifolia (Hoffm.) del tipo vivono comuni sotto le rocce umide dei colli ove fm. angustata (Hoffm.) nel M. Ado e valle S. Pietro (Belg. ms.)

Asplenium Linn.

14 A. Filix femina (L.) Bernh. Cr. Vasc. p. 34 (Athyrium) (21. 1595)
II–III. Nemofilo, eliofobo, igrofilo. Montello e colline (forma pumila) dal 1862; Valdobbiadene 1870; Vittorio, 1880; Grappa (Vacc. n. 64).
Sono comuni le fm. dentatum Döll. e multidentatum Döll. Vulgo: Speldria.

15 A. Adiantum-nigrum L. Cr. Vasc. p. 37 (24. 1532)
II–IV. Nemofilo, sepiario, arboricolo. Montello e colline, dal 1862; Vittorio. Var. (Onopteris (L.) Heuff.) acutum Bory Pollini (1757). Montello e colline dal 1862 – Var. angulatum Heuff. Asolo al Forestiggo (Belg. ms)

16 A. Ruta-muraria L. Cr. Vasc. p. 36 (27. 1415)
I–IV. Murale, nemofila, xerofila – Var. α Brunfelsii Heuff. Tutta la provincia: Montello, Vittorio, Torena, Canseglio, Castelfranco, Treviso ecc. dal 1862 – Var. β pseudogermanicum Heuff. (= A. germanicum Sacc. Cr. Vasc. p. 35, non Weis.) Vittorio 1862, muraglie del Piave a Nervesa, 1864. fm. depauperatum Roselt. Rupestre a S. Ubaldo di Vittorio (Camp. 39) – Var. γ elatum Lange (= A. R.-m. v. Pseudoserpentini Milde). Muraglie del Piave a Nervesa, 1864. – Var. lanuginosum Nees, Sac. Milde, Christ Hedw. 1903, p. 166 fig. 20 (= A. germanicum fil. polyphyllum Sacc. Cr. Vasc. p. 36.)
δ fm. alcicorne Camp. Canseglio pr. Spert (Camp. 48)

Vittorio, fuori Serravalle 1862, murazzi del Piave 1864 – Var. concinnum Rosenst. Torena al Passo S. Uboldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 1602a) – Var. ε. ellipticum fm. microphyllum Wallr. S. Uboldo (Pamp. l. c. n. 1602b) – Var. leptophyllum Wallr. S. Uboldo (Pamp. l. c. n. 1603a, 1603b; due forme). La mia var. polyphyllum fu identificata da Ascherson colla var. pseudogermanicum, ma basta vedere la fig. 18-19 del Christ l. c. per riconoscere che quest'ultimo corrisponde bensì al mio A. germanicum (e non Weiss), ma non alla var. polyphyllum da me attribuita allo stesso: la quale invece corrisponde sufficientemente bene alla v. tenuifolium (Nees) Christ. l. c. Del resto le infinite forme dell'A. Ruta-muraria (Dalla Torre e Sarutheim in Fl. Tir. ne enumerano 24!) insensibilmente passano l'una nell'altra.

17 A. viride Huds. Cr. vasc. p. 35 (30. 1790)
II – IV. Rupestre, truncicolo, muricolo, xerofilo o mesofilo. Cansiglio tanto nel faggeto che nell'abetina dal 1867; raro sui murazzi del Piave a Nervesa, 1863; Grappa (Vaccari 64; Bizzozero 1878 e Bolzon 1895 in herb. Pat.!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. ms.)

18 A. Trichomanes L. Cr. vasc. p. 35 (31. 1415)
I – IV. Murale, rupestre, truncicolo, xerofilo o mesofilo. Tutta la provincia, copiosamente. *) – Var. microphyllum Milde. Asolo al colle Bacciocco (Bolz. ms.) – Var. umbrosum Milde. S. Boldo (Pamp. in Bolz. ms.)

qui

Scolopendrium Smith.

19 S. vulgare Sm. Cr. vasc. p. 38 (35. 1532)
I – IV Rupestre, murale, truncicolo, nemofilo, eliofobo. Tutta la provincia specialmente la collina e montana dal 1860 – Fm. crispum (W.) Montello (Bérenger, Sacc.) – Var. integrum Wahl. Montello (Bérenger 1844) – Var. minus Fée, presso Asolo (Bolzon, 26)

R A. septentrionale (L.) Hoffm. Cr. vasc. p. 37 (33. 1563.)
IV. Rupestre. Vagamente indicato dei monti e prealpi del Trevigiano, si trova realmente nei mont. limitrof. Bellunesi, ma finora non consta di località trevigiane.

Blechnum Linn.

20 B. Spicant (L.) With. Cr. vasc. p. 39 (38. 1550)
II. Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello, rarissimo, 1861

Struthiopteris Willd

21 S. germanica Willd. ~~Cr. vasc. p.~~ (40. 1785)
II Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello, raro nelle vallette rocciose (Ant. Saccardo 1888! Fr. Saccardo 1894). (Cfr. Sacc. n. 54).

Pteris Linn.

22 P. aquilina L. Cr. vasc. p. 40 (43. 1415)
II–IV. Nemofila, eliofoba [sterile]; campestre, dumale, eliofila [fertile]. Montello, Cansiglio, colli e monti di Vittorio, Pederobba, alveo del Piave. Vulgo: Sfelda (corrotto di felce)

Adiantum Linn.

23 A. Capillus-Veneris L. Cr. vasc. p. 40 (46. R. 1415)
I–IV. Rupestre, murale, igrofila, eliofoba. Tutta la provincia. Montello, Colfosco, Covolo, Vittorio ecc. dal 1862. Caldieron pr. Vittorio (Sacc., Pamp. in Fl. it. exs. n. 707). Vulgo: Capelvenere (i Asolo (Bolz. MS.) – Var. trifidum W. Crespignaga di Asolo (Bolz. MS.)

Botrychium Sw.

24 B. Lunaria (L.) Sw. Cr. vasc. p. 22. (48. 1415)
IV–V. Pascoliva, xerofila o mesofila. Grappa (Sternb. 59, Montini, Bizzozero 1878 in herb. Pat.; Cansiglio (Bérenger 1843, Sacc. 1869); i sopra Valdobbiadene (Bérenger 1843) cadolten (Pamp. in Bolz. MS.)

25 ~~Botrychium~~ matricarifolium A. Br. Cr. vasc. p. 22. (49. 1867)
IV Pascolivo, eliofilo. Pascoli alti di Valdobbiadene, raro (Bérenger, 1843, in herb. Sacc.)

Ophioglossum Linn.

26 O. vulgatum L. Cr. vasc. p. 23. (51. 1532)

III-IV. Pascolivo, igrofilo, eliofilo. Sopra Valdobbiadene (Béreng. 1843, in herb. Sacc.), Mt Pizzoc in Cadolten (Pamp. in Fl. it. exs. n. 207), Lago di Lago (Pamp. 36; una forma teratologica), Cozzuolo, raro (Pamp. 44); Conegliano (Bizz. 1876 in herb. Pat.: fm. macroglossa); Grappa, Bizz. 1878 in herb. Pat. Montini in herb. Sacc.)

Osmunda (Tourn.) Linn.

27 O. regalis L. Cr. vasc. p. 62. (52. 1550)

II Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, est. 1888 (Ant. Sauardo! Cfr. Sacc. n. 54)

Fam. 2. Marsiliaceae.

Salvinia (Mich.) L.

28 S. natans (L.) All. Cr. vasc. p. 15. (54. 1553)

I. Idrofila, palustre. Treviso presso S. Lazzaro (Fracchia, 1850! Sacc.)

Marsilia (Mich.) L.

29 M. quadrifolia L. Cr. vasc. p. 14 (55. 1565)

I. Idrofila, palustre. Presso Treviso, (Sacc. 1864); distr. di Motta (Béreng. 1844 in herb. Pat. et Sacc., fruttificante)

Cl. II Equisetinae

Fam. 3 Equisetaceae

Equisetum (Tourn.) L.

30 E. arvense L. Cr. vasc. p. 9 (59. 1550)

I-III Campestre, igrofilo. Tutta la provincia dal 1862. Selva, Vittorio; asolo (Bolz. ms.); Salgareda (Contarini 1825!); Resana, Ponte di Piave (Bég. 1909!) Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!) – Var. pseudosilvaticum Milde (= E. silvaticum Sacc. Cr. vasc. p. 10, non L.). Montello al Forame, Selva dal 1862, Treviso 1868 – Volgo: Codamùs (coda d'asino), e così tutte le specie del genere.

91 E. maximum Lam. Cr. vasc. p. 10 (E. Telmateja) Ehrh. (60. 1550)
I – III. Nemofilo, eliofobo, igrofilo. Montello e luoghi prossimi dal 1861, Vittorio e Treviso (Sacc. 1868) – Var. serotinum A. Br. strada da Confin a Corbanese (Pamp. 36). Colle Bacciocco di Asolo (Bolz. MS.)

92 E. palustre L. Cr. vasc. p. 11. (63. 1726)
I – III Igrofilo, palustre, alveale. In quasi tutta la provincia dal 1861, alveo del Piave, Vittorio; Salgareda (Contarini! 1825); Resana e Ponte di Piave (Béguinot! 1909), Cà Tron (Diraz. 1915) – var. polystachyum Vill. Lago di Lago (Pamp. 36); Orsago (Pamp. in Bolzon 17) – Var. verticillatum Milde. Colle S. Giustina di Asolo (Bolz. MS.); Var. tenue Doell. Asolo (Bolz. MS.)

93 E. limosum L. Cr. vasc. p. 59. (64. 1551, noto anche ai Romani)
I – III. Palustre, lacustre, eliofobo ~~alveale~~. Presso le sorgenti del Meschio sopra Vittorio (Sacc. dal 1870.)

94 E. hiemale L. Cr. vasc. p. 11. (65. 1415)
I – III. Alveale, ripario. Alveo del Piave, frequente dal 1862. Ceggia presso Motta (Bérenger in herb. Pat, 1842!), Cozzuolo in De Toni, 29)

95 E. ramosissimum Desf. Cr. vasc. p. 12 (E. elongatum W.) (66. 1550)
I – III. Ripario, alveale, sepiario, igrofilo. Greto del Piave dal 1864; Conegliano (Béreng. 1842!) – var. polystachyum Lierss. Lungo il Brentellone del Montello, ~~[illegible]~~ e rivoli delle colline trevigiane dal 1862 – Var. ~~po~~ simplex Döll. Montello, 1875; boschi di Ceggia presso Motta Béreng. 1842 in herb. Sacc. – var ~~[illegible]~~ gracile A. Br. alveo del Piave fra Pederobba e Fener (Bég. 1909!)

96 E. variegatum Schleich. Cr. vasc. p. 12. (67. 1550)

I–III Alveale, igrofilo. Alveo del Piave dal 1864; Conegliano 1842 (Bereng. herb. Pat.!); medesimo alveo a Pederobba, fra Ponte di Piave e Negrisiola (Bég. 1909!). Var. pseudo-elongatum Milde. Alveo del Piave, 1869!

Cl. III Lycopodinae.

Fam. 4 Lycopodiaceae

Lycopodium (Rupp.) Linn.

37 L. complanatum L. Cr. vasc. p. 17. (68. 1713)
II–IV. Nemofilo, dumale, eliofobo. Montello dal 1862, Monfenera 1862; Valdobbiadene (Bérenger 1843 in herb. Pat.!); bosco Medean fra Guia e Combai (Pamp. 44) — Var. Chamaecyparissus (A. Br.) Luerss. Montello 1869. Quivi incontrasi pure ~~trovasi~~ una forma intermedia fra quest'ultima e il tipo. Cfr. Critt. vasc. p. 17 e 61; castagneti di Fonte (Bolz. MS.)

38 L. clavatum L. Cr. vasc. p. 18. (70. 1551)
II–V. Nemofilo, pascolivo, dumale, igrofilo. Montello, dal 1862, freq. Grappa (Bizz. 1878, in herb. Pat.!) al Cason del Sol

39 L. annotinum L. Cr. vasc. p. 19 (71, 1532).
IV. Nemofilo, igrofilo, pascolivo. Cansiglio tanto nelle faggete che nelle abetine, dal 1867; Col Vicentin (Pamp. 44).

40 L. inundatum L. Cr. vasc. p. 16 (72. 1808)
II–III. Palustre, idrofilo. Al Lago di Revine insieme a Sphagnum, Drosera, Rhynchospora, Agosto 1865. ~~[illegible]~~
L. Selago L. Cr. vasc. p. 16 (73. 1726)
Nemofilo, pascolivo, igrofilo. Cansiglio, 1867 e 1869; Monti sopra Miane (Pamp. n. 44) — Volgo: Erba pedocina.

41 Selaginella Spring
S. spinosa P. B. Cr. vasc. p. 20 (74. 1532)
IV–V. Nemofila, pascoliva, igrofila. Cansiglio (Béreng. in herb. Sacc. Sacc. 1869; Col Vicentin e Cadolten (Pamp. 44); Grappa (Sternb. (803. n 59), Montini herb. Sacc.; Bizz. 1878 in herb. Pat!, Bolz. MS.)

42 Selaginella helvetica (L.) Spring. Cr. vasc. p. 20 (75. 1713)
II–IV Nemofila, igrofila, eliofoba, riparia. Montello, Piave, Cansiglio, Vittorio.... dal 1862.

Div. II Phanerogamae
Subcl. 1 Gymnospermae
Fam. 5 Coniferae

Pinus (Tourn.) Linn.
C P. Pinea L. Prosp. p. 124 (83. 1415)
I–III. Spontaneo nel litorale mediterraneo; coltivato qua e là. Vulgo: Pignèr; il seme: pignol, pignoi.

C P. Laricio Poir. (86. 1827) e var. nigricans (Host) Richt. (1835)
I–III. Dal mezzodì d'Italia, e di Corsica; coltivate qua e là sia la specie che la varietà.

43 P. silvestris L. Prosp. p. 124 (87, 1554)
II–IV. ♈ Montello, margine sett. raro, Cansiglio e monti vicini. Anche coltivato. Vulgo tana, pin. ♈ Rupestre, xerofilo.

44 P. montana Mill. (1768) Du Roi (1771) (88. 1558) Prosp. p. 124 (P. mugus Scop. 1772)
IV–V Rupestre, xerofilo. Mt. Pizzoc, raro (Pamp. 36), Mt. Grappa (Parolini, Vaccari 64). Vulgo: Muga, Buga.

Larix (Tourn.) Adans.

45 L. decidua Mill. Prosp. p. 124 (L. europaea DC.) (89. 1532, conosciuto anche ai Romani)
IV–V. Nemorale, rupestre, xerofilo. Cansiglio, non frequente. Coltivato spesso. Vulgo: Larese.

Abies (Tourn.) Linn.

46. A. alba Mill. Prosp. p. 125 (A. pectinata DC.) (90. 1532. R.)
IV. Nemorale, rupestre, xerofilo. Cansiglio, non frequente. Spesso coltivato. Vulgo: Avedin (corrotto di abetino)

47. A. excelsa Poir. Prosp. p. 125 (91. 1415 R.)
IV–V. Nemorale, rupestre, xerofilo. Cansiglio, frequente; anche coltivato. Vulgo: Pez, Pezzo.

Thuya Linn.

C T. orientalis L. (Prosp. p. 124 (T. occidentalis) (92. 1762). Del Giappone e della Cina. Coltivata comunemente e talora avventizia. Vulgo: Tuja o Zipressina)

Cupressus (Tourn.) Linn.

C C. sempervirens L. – Prosp. p. 124. (93. 1415 R.). Oriundo d'Asia e di Creta, coltivato frequentemente e spesso avventizio. Vulgo: Ziprès, Avziprès, Cipresso.

Juniperus (Tourn.) Linn.

48 J. communis L. Prosp. p. 124. (94. 1415)
II–IV Rupestre, dumale, alveale. Montello, colli, letto del Piave da Pederobba e Colfosco a Nervesa (Sacc., Béz. 1909) Vulgo: Zenèvaro, Denèvaro.
– Var. nana W. Prosp. p. 124. IV–V. Rupestre, xerofilo. Grappa Montini, Bizz. 1878 in h. Pat.!, Zanardin. 1829!, Cansiglio 1869 (Bér.!, ~~Sacc. 1869~~ anche 1839!) Dai monti di vado discende per l'alveo del Piave fino a Covolo ecc.

Grappa (Bolz. MS.)

C J. Sabina L. (98. 1415. R).
Delle Alpi ed Apennini, coltivasi e trovasi talora avventizio qua e là p. e. nel colle di S. Rocco a Vittorio (Trott. 1906!). Vulgo Sabina

C J. virginiana L. (99. 1796)
Dell' America settentrionale, coltivasi frequentemente nei giardini e boschetti.

Taxus L.
49 T. baccata L. Prosp. p. 124 (100. 1415. R.)
IV Nemorale, eliofobo. Cansiglio, raro (indigeno?). Coltivato qua e là nei giardini e boschetti. Vulgo: Tasso

Subd. 2 Angiospermae
I Monocotyledones

Fam. 6 Graminaceae

Zea Linn.
C Z. Mays L. Prosp. p. 142 (104. 1532)
Dell' America merid., coltivata nella prov. di Treviso fino dal 1592 (Spesso sporadica. (Cfr Bailo in Atti Ist. Ven. LXII p. 1364) — Var praecox Pers. Coltivasi. Vulgo Zinquantin
Vulgo: Sorgoturco, Suturco, Souturco (parti: panoce, botoli, kartogi, zime)

Coix Linn.
C C. Lacrima L. (105. 1532)
Delle Indie orientali e Nubia. Coltivasi negli orti qua e là. Vulgo: Erba da rosari

Andropogon Linn.
50 A. Ischaemum L. Prosp. p. 143 (110. 1583)
I—III. Pascolivo, marginale, stradale, xerofilo. Tutta la provincia dal 1861. Salgareda (Conterini 1825!)

Heteropogon Pers. Agg. p. 37.

51 H. Allionii (DC.) R. et S. (112. 1785)

III. Pascolivo, rupestre, xerofilo.. S. Michele d'Angarano (Montini!); colle di S. Martino a Vittorio (Fiori e Sacc. 1899!), colle di S. Paolo, luogo detto i Palasi a Vittorio (Pamp. in Fl. it. exc. n. 3, Bolzon 27).

Chrysopogon Trin.

52 C. Gryllus (L.) Trin. Prosp. p. 143 (Andropogon) (113. 1719)

I–IV. Pascolivo, pratense, eliofilo, xerofilo. In quasi tutta la provincia, dal 1860; Castelfranco, Resana, Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59) Asolo (Bolz. ms.)

Sorghum (L.) Mönch

53 S. halepense (L.) Pers. Prosp. p. 143 (114. 1561)

I–III. Campestre, ruderale, ~~marginale~~ ortense. Quasi tutta la provincia, ~~dal 1860~~: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso; Cà Tron (Diratz. 1915!) ecc. Vulgo: Sorghetta.

C S. vulgare Pers. Prosp. p. 143 (115. 1320. R.)

I–IV. Campestre. Oriundo dell'Apica tropicale, coltivato ab antico e spesso subspontaneo in tutta la provincia, ~~dal 1860~~ ~~Var. sacch.~~ Vulgo: Sorch, sorgo – Var. saccharatum (L.) ~~Pers.~~. Coltivato dovunque in provincia. Vulgo: Sorgo o Sorch sgirlo. Una razza è il S. glycychylum Passerini, talora coltivato pel copioso succo zuccherino, in più luoghi della prov. ed altra pur coltivata è il S. cernuum (Ard.) Roxb. o Dura.

Saccharum L.

54 S. Ravennae (L.) Murr. Prosp. p. 142. (117. 1676)

I–II Alveale, igrofilo, ~~pr.~~ Alveo del Piave fra Ponte di Piave e Zenson (Bég. 1909!), Salgareda (Contarini; 1825!), Ponte della Priula presso Nervesa (Suffren 1802)

55 S. strictum (Host) Spr. Prosp. p. 142 (118. 1864)
I–II Alveale, igrofilo, pratense. Nel greto del Piave a Susegana, Colfosco, Nervesa dal 1862 Sacc. Pamp. in Fl. it. ex S. n. 210. Lo trovai anche copioso in un prato a Selva, del Sig. Stoppani, nel 1905, da semi forse portati dal vicino canale Brentellone, proveniente dal Piave.

; da Susegana a Conegliano lungo la via

Setaria P. B.

C S. italica (L.) P. B. Prosp. p. 144 (123. 1415. R.)
I–IV Campestre, ruderale. Oriunda della Cina e del Giappone; largamente coltivata in tutta la provincia e spesso avventizia.
Vulgo: Paniz (panico) – Var. germanica (Mill.) Avventizia a Selva 1861!

56 S. glauca (L.) P. B. Prosp. p. 144 (124. 1583)
I–IV. Campestre, ortiva, ruderale, murale. Tutta la provincia dal 1860. Ca Tron (Diratz. 1915!) – Vulgo. Erba panocèla.
Asolo (Bolz. MS.)

57 S. viridis (L.) P. B. Prosp. p. 144 (125. 1415) (Vulgo: Erba panocèla
I–IV. Campestre, ortiva, ruderale, murale. Tutta la provincia dal 1860.
– Var. nodiflora Sacc. Prosp. p. 144. Ruderale ad Arcade, 1862 Varia inoltre coi culmi eretti o prostrati e le reste verdicce o rosso-brune.
nonchè a Masèr in fm. gigante (Bolz. MS.)

58 S. verticillata (L.) P. B. Prosp. p. 144 (126. 1550)
I–III. Campestre, ortiva, ruderale. Tutta la provincia, dal 1860.
Vulgo: Erba petacèla.

Oplismenus P. B.

59 O. undulatifolius (Ard.) P. B. Prosp. p. 143 (Panicum) (127. 1697)
I–III. Nemofilo, sepiario, eliofobo. Montello dal 1864. Cornuda (Trotter 1906!); Vittorio e Conegliano; dintorni di Asolo (Bolzon in herb. Pat.!) Romano (Montini!); bosco degli Armeni a S. Zenon di Ezzelini (Diratz.!) Cozzuolo e S. Pietro di Barbozza (Pamp. n. 44)
Feletto (Pamp. in Bolz. MS.)
anche Bèreng. 1844!, Bizz. 1872!)

Panicum Linn.

A P. capillare L. (131. 1772)

I-III. Ruderale. Originario dell'America sett. (subspontaneo) a Vittorio nel cimitero (Sacc. n. 53 e Via Cavallotti 1906!; Vie di Treviso (Trotter, 1910!); a Cognolo inselvatichito (Pamp. in Bolz. MS.)

C P. miliaceum L. Prosp. p. 143 (132. 1415. R)

I-III Campestre, ruderale. Originario delle Indie or. coltivato e qua e là subspontaneo in tutta la provincia. Vulgo Megio, Mei.

60 P. crus-galli L. Prosp. p. 143 (135. 1551)

I-III Campestre, ruderale, ortivo. Tutta la provincia. Vulgo Giaòn, Ànsega. Var. oryzoides (Ard.). Ripario, igrofilo. In tutta la provincia. La specie e la var. anche ad Asolo (Bolz. MS.)

Digitaria Scop.

61 D. sanguinalis (L.) Scop. Prosp. p. 143 (Panicum) (137. 1415)

2 (Var. ciliaris (Retzius) Selva e Vittorio, ~~Sacc.~~ 1910 ~~F~~.

1 (I-III Campestre, ruderale, marginale, eliofila. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Treviso, cornuda ~~[illegible]~~ dal 1860 ~~F~~; Mogliano (Montini, 1835), Asolo (Bolz. MS.) Vulgo. Erba rapegona (repente).

62 D. filiformis Koel. (138. 1824)

I-III Ruderale, marginale, campestre, xerofila. Montello (Bizz. 1881 in herb. Pat.! e Sacc. 1910), Vittorio lungo l'argine del Meschio 1908 ~~F~~.

Tragus (Hall.) Desf.

63 T. racemosus (L.) Desf. Prosp. p. 143 (140. 1676)

I. Murale, xerofilo. Sulle mura di Treviso (Fracchia 1861 in herb. Sacc.!)

Oryza Linn.

C O. sativa L. Prosp. p. 145 (141. 1468)

I. Idrofila, campestre. Oriunda delle Indie or. Africa e Australia. Coltivata nella bassa Trevigiana a Casale, Roncade, ora quasi abolita. Talora avventizia p. e. a Selva 1870. Vulgo Riso.

64 O. clandestina A. Br. Prosp. p. 145 (Leersia oryzoides Sw.) (142. 1718)
I – III. Idrofila, palustre. Tutta la provincia, dal 1862; Treviso (Kellner, 1840!) – Var patens (Wiesb.) – Orsago (Pamp. in Bolz. MS.)

Phalaris Linn.
65 Ph. arundinacea L. Prosp. p. 144 (144. 1717)
I – III Riparia, igrofila. Selva, Vittorio, Quinto, Treviso (Kellner e Fracchia 1841!, Sacc.); Ponte di Piave e Salgareda (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!)
Var. picta (L.). Coltivata nei giardini e avventizia qua e là a Selva, Vittorio; Cà Tron (Diratz. 1915!)

C Ph. canariensis L. Prosp. p. 144 (151. 1532)
I – III Delle isole Canarie. Coltivata spesso per i semi (scagiola) usati come cibo degli uccelli e ~~spesso~~ talora avventizia.

Hierochloë S. G. Gmel.
66 H. australis (Schrad.) R. S. Suppl. p. 38 (152. 1754)
III – IV Pascoliva, eliofila. Vittorio, Cansiglio 1868 (Sacc.), da Vittorio e Cansiglio al Piave (Pamp. 38); Romano e Valle S. Felicita (Montini) colli di Asolo, Castelcucco, Borso (Bolzon, 11)

Anthoxanthum Linn.
67 A. odoratum L. Prosp. p. 144 (155. 1696)
I – IV. Pascolivo, pratense, eliofilo. Tutta la provincia (Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860), Cà Tron (Diratz.) Varia a spighe giallastre e rossastre

Stipa Linn.
68 S. Calamagrostis (L.) Wahlb. Agg. p. 38 (158. 1718)
II – IV Rupestre, riparia, igrofila. Montello lungo il Piave, ~~[illegible]~~ a Vittorio dal 1861 (anche Béreng. 1842) ~~[illegible]~~, Valdobbiadene 1864; Pederobba (Bég. 1909!) Grappa (Zanard. 1827!, Vaccari n. 64)

69 S. pennata L. Prosp. p. 146 (164. 1550)
II–III. Pascoliva, alveale, igrofila. Alveo del Piave e luoghi prossimi a Corolo, Nervesa, dal 1862; Vittorio, 1905, Valdobbiadene (Favero, 1845, in herb. Pat.!), Masér, Asolo (Bolzon, 11), Valle di S. Fidà presso il Grappa (Sternb. 1804, 4. 59).

Milium Linn.

70 M. effusum L. Prosp. p. 146 (166. 1719)
II Nemofilo, eliofobo. Montello dal 1861; Castelli d'Asolo (Bolz. ms.)

Crypsis Linn.

71 C. aculeata Ait. Prosp. p. 145 (173. 1696)
I Alveale, arenicola. Alle sponde del Piave (Turra, MS Vegetab. It. indig. Cfr. Prosp. p. 68). Probabilmente il Turra raccolse la specie verso le foci del fiume, dove (al Cavallino) fu rinvenuta anche di recente dal prof. Fiori.

Phleum Linn.

72 Ph. asperum Jacq. (176. 1563)
I. Ruderale, campestre. Treviso (Bérenger, 1837 in herb. Pat.!) La specie data con questo nome (Colfosco, Cornuda) nel Prosp. p. 145, non è che una forma del Phl. Böhmeri.

73 Ph. alpinum L. Suppl. p. 38 (178. 1719)
IV–V. Pascolivo, xerofilo. Cansiglio 1869!; Possagno, Bérenger, 1840 in herb. Pat.!; Grappa (Spranzi!, Montini, Bizzozero 1879 herb. Pat.!) – Var. subalpinum Hack. M. Grappa a 1300-1400 m. (Bolzon ms.)

74 Ph. pratense L. Prosp. p. 145 (179. 1717)
I–IV. Pratense, pascolivo, xerofilo. Selva, Vittorio, Cornuda, Colfosco ecc. dal 1861; Mogliano (Mayer in Bertol.); Cansiglio (D. Sacc. 1897!) – Var. nodosum (L.). Montello ~~[illegible]~~ 1861 (anche Fr. Sacc. 1894!)

75 Ph. Boehmeri Wibel. Agg. p. 38 (= Ph. asperum Prosp. p. 145 Sacc. non L.)
(181. 1745).
II–III. Pascoliva, xerofila, murale. Montello, Selva, Volpago, Cornuda, Colfosco dal 1863; mura di Treviso!; Vittorio presso Serravalle e via Cavalletto, 1910.

Alopecurus Linn.

76 A. agrestis L. Prosp. p. 144 (184. 1717)
I–IV. Pratense, campestre, igrofila. Selva, Vittorio, Treviso, dal 1812, Mogliano (Mayer ai Bert. 1826), fra Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!) – Var. muticus Bertol. a Cà Tron di Roncade in seme al top (Diratz. 1915!)

77 A. geniculatus L. Prosp. p. 144 (187. 1719)
I–III Nemofila, riparia, igrofila. Montello, Casignana, Quinto dal 1864; Mogliano (Mayer in Bert.); Canisiglio, 1869.

Polypogon Desf

78 P. monspeliensis Desf Suppl. p. 38 (192. 1711)
I. Ruderale, ~~alofila~~ ostiva, subgrafila. Treviso, nel cortile del Seminario, 1867! (; a Cà Tron (Diratz. 1915!)
; Treviso pr. Porta Cavour (Parl. in Bolz. MS.)

Agrostis Linn.

79 A. Spica-venti L. Prosp. p. 146 (Spica S.V.) (197. 1717)
Campestre, ruderale, xerofila. Selva, 1862; Treviso; Mogliano; Canizzano (G. B. Zava, 1906); pr. Castelfranco (Bég. 1909!). Per solito ha l'infiorescenza rotticcia; la fm. di Mogliano è invece virescente e s'accosta alla var. interrupta.

80 A. alpina Scop. Suppl. p. 38 (199. 1785)
IV. Pascoliva, rupestre, oligrofila. Grappa (Montini! Spreng.!)

81 A. rupestris All. (200. 1785)
IV. Rupestre, pascoliva, eliofila. Grappa (Montini, Vaccari 64); sopra Valdobbiadene, nelle prese segative (Béreng. 1846 in herb. Pat!)

82 A. canina L. Prosp. p. 145 (201. 1785)
I–III. Pascoliva, igrofila. Selva, Montello, Bavaria dal 1862; ~~Bavaria~~ Presso Resana (Bég. 1909!). Vulgo: Losco

83 A. alba L. Prosp. p. 145 (202. 1785)
I–V. Pratense, pascoliva, raderale, eliofila. Montello, Selva, Volpago, Pederobba, Cansiglio, dal 1861. Var. vulgaris (With.). Montello, Selva, Grappa (C. Mass. 1877, herb. Pat.), Asolo (Bolz. ms.) Var. patula (Gand.) Grappa (Montini); var. violacea Roug. Cà Tron (Diratz. 1915!) var. stolonifera (L.) Selva, Volpago, Vittorio in via Cavallotti, 1910, Treviso (Béreng. 1838!) – Vulgo: Losco

Calamagrostis Roth (C. acutiflora et C. silvatica)
84 C. arundinacea (L.) Roth. Prosp. p. 146 (203. 1719)
II–IV Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello lungo il Brentellone e a Falzè dal 1862; Grappa (Gio. e D. Montini!, Vaccari 64); Crespan (D. Mont.!), Conegliano (Béreng. in herb. Sacc.!); Cornuda (Trotter 1906!). Per lo più è rappresentata dalla var. varia (P. B.) [= C. silvatica Host, = C. montana DC.)

85 C. Epigejos (L.) Roth Prosp. p. 146 (206. 1717)
II–III Riparia, idrofila. Lungo il Piave a Nervesa e Falzè, ~~[illegible]~~ e lungo il Brentellone del Montello dal 1861; Vittorio (Pamp. in De Toni 29); alveo del Piave a Pederobba e tra Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

86 C. littorea (Schrad.) DC. (207. 1785)
II. alveale, igrofila. A Pederobba presso il Piave (Bég. 1909!); greto del Piave nella sezione trevigiana (Minio. 35)

Arundo (Tourn.) Linn.
87 A. Donax L. Prosp. p. 146 (210. 1415. R.)
I–III. Riparia, igrofila. In tutta la provincia, dal 1860, completamente naturalizzata e assai spesso coltivata. D'origine orientale e mediterranea. Vulgo Caneviera o canevèra (canna vera)

Phragmites Trin.
88 Phr. communis Trin. Prosp. p. 146 (212. 1550. R.)
I–III Idrofila, palustre. Tutta la provincia: Montello, Vittorio, Treviso ecc. dal 1860; Cà Tron (Diratz. 1915!). Fm. flavescens (Custor (= Phr. isiaca Rchb. non Kth.). A Cordignano, Orsago alle rive del torr. Rott (Pamp. in Fl. it. exs. n. 718).
Vulgo: Canela.

Holcus Linn.
89 H. lanatus L. Prosp. p. 147 (215. 1719)
I–IV. Pratense, marginale, xerofila. Tutta la provincia dal 1860; Castelfranco (Bég. 1909!); alveo del Piave a Pederobba, fm. glabrescente (Bég. 1909!); Asolo (Zanardini 1827 herb.!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

Aira Linn.
90 A. caryophyllea L. Prosp. p. 147 (219. 1696)
I–III Nemofila, pascoliva, xerofila. Montello, dal 1862, frequente.

91 A. capillaris Host. Suppl. p. 36 (220. 1696)
I–III. Nemofila, pascoliva, xerofila. Montello dal 1862

Deschampsia P. B.

92 D. flexuosa (L.) Trin. Prosp. p. 147 (Aira f.) (226. 1719)
III–IV Nemorifila, pascoliva, xerofila. Montello, 1861, rara; sopra Valdobbiadene nelle prese degativa (Bérenger, 1846!), Canonica (D. Sacc. 1897!); Grappa (C. Massal. 1877!, Spreng.!)

93 D. caespitosa (L.) P. B. Prosp. p. 146 (Aira c.) (228. 1719) Camalò
II–IV. Nemorifila, igrofila, eliofobe. Montello, Selva, Giavera, Vittorio, Canonica, dal 1860; alveo del Piave a Pederobba (Beg. 1909!); Mogliano (Mayer 1826, in Bertol.); Caggiade e fra Vittorio e Pampe in Bolgon (Lam.); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. albiflora Fremden & Coppuolo fra Vittorio e Pampe in Bolgon (Lam.); Montello (Saccardo!); Bigogiero 1881!; Grappa (Sterni 1805. 59) – Var. Gaudini Richter (= Aira alpina Roth).
♀ = Aira c. v. pallida Koch, Prosp. p. 147.

Trisetum Pers.

94 T. distichophyllum (Vill.) P. B. Prosp. p. 147 (Avena) (232. 1785)
V Rupestre, pascoliva, xerofila. Grappa (Montini e in herb. Kellner, 1840!, Vaccari 64)

95 T. argenteum (W.) R. et S. (233. 1822)
V Rupestre, pascoliva, xerofila. Grappa (Montini, Parolini, Vaccari 64)

96 T. flavescens (L.) P. B. Prosp. p. 147 (Avena) (235. 1711)
I–IV. Pratense, pascoliva, marginale. Tutta la provincia, dal 1860.
Var. lutescens Rchb. Selva, Vittorio dal 1860. Var pauciflorum Sacc. Selva, Volpago, Camalò, Vittorio dal 1862. Var purpurascens (DC.) Arc. Grappa (G. Montini 1833!). Var. variegatum Rchb. Grappa Vaccari 64, ex Montini) – Var alpestre (P. B.) M. Pj sopra Cavaso (Bolg. MS)

Avena (Tourn.) Linn.

C A. sativa L. Prosp. p. 147 (242. 1415. R.)
I–III. Campestre, segetale. Coltivata e avventizia in tutta la provincia.
Var. orientalis (Schreb.) Fiori e Pari. Prosp. p. 147 (ut spec.) Campestre, segetale, coltivata e avventizia. Volgo: Vena, biava (spec. e var.)

97 A. fatua L. Prosp. p. 147 (243. 1554. R.)
I–III Campestre, segetale, ruderale. Selva, Volpago ecc. dal 1862. Vulgo: Vena mata.

98 A. pratensis L. Agg. p. 38 (244. 1719)
IV–V. Pascoliva, eliofila. Grappa (Zanard. 1827!, Bizzoz. 1877! „G. Montini, Vacc. 64) – Var alpina (Sm.). Cansiglio Bérenger 1839 in herb. Pat! e Sall!)

99 A. versicolor Vill. (= A. Schenchzeri All.) (245. 1785)
IV–V. Pascoliva, rupestre, xerofila. Grappa (G. Montini!, Vaccari 64, Zanardini herb.!)

100 A. pubescens L. Agg. p. 39. (246. 1785)
IV–V. Pratense, pascoliva. Grappa (de Visiani!) prati dei Collalti (Montini in Kellner herb.). Var. sesquiterta (L.) Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Zanardini herb.!)

Arrenathèrum P. B.
101 A. elatius (L.) M. et K. Prosp. p. 147 (250. 1532)
I–IV. Pratense, marginale, campestre. Tutta la provincia dal 1861. spontanea e coltivata. Una forma virescente d'origine entomogena a Vittorio presso villa Da Zara, VI. 1905. Cfr. Trotter in Marcellia 1905 pag. 97.

Cynodon Rich.
102 C. Dactylon (L.) Pers. Prosp. p. 145 (255. 1415. R.)
I–IV Campestre, marginale, ruderale, eliofilo. Tutta la provincia dal 1861. Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!); Asolo (Bolz. ms.) Vulgo: Gramegna.

Cleusine Gaertn.

103 NE. indica (L.) Gaertn. Agg. p. 38 (258. 1772)
I – III Ruderale, domosila, stradale. D'origine delle Ind. orient., ma ora completamente e largamente naturalizzata a Selva, Vittorio, Crespano, Treviso... dal 1888. Var. coracana (Gaertn.). Già coltivata in provincia nel 1870 e specialmente a Vittorio

Seslerza Scop.

104 S. caerulea Ard. Prosp. p. 146 (261. 1710)
III – IV – V. Rupestre, alveale, xerofila. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Zanard. 1827!, Vacc. 64); Asolo (Bolzon herb. Pat. 1895!); alveo del Piave a Falze discesa dai monti (Fr. Sacc. 1890 in herb.!); colli di Vittorio (1905!). Var. argentea (Savi) = S. elongata (Host) Prosp. p. 146. Rupestre a Covolo sulle rupi lungo il Piave 1862!; ~~sopra~~ a Vittorio! (~~Pamp. Sacc.~~)

Triodia R. Br.

105 T. decumbens (L.) P. B. Prosp. p. 147 (266. 1719)
I – III Pascoliva, nemosila, pratense. Montello dal 1861; Roncade 1864!; Mogliano (Mayer in Bertol.); Valdobbiadene (Bérenger 1844-47 in herb. Pat.; Pederobba (Bég. 1909!), Grappa (Montini, Parolini, Vaccari 64).

Diplachne P. B.

106 D. serotina (L.) Link. Agg. p. 39. (267. 1723)
II – IV Rupestre, igrofila. Fuori Serravalle (Vittorio) presso le sorgenti del Meschio 1876!; sorgenti di S. Zenone (Parolini herb.)

Molinia Schrank

107 M. caerulea (L.) Mönch. Prosp. p. 148. (268. 1717)
I – IV. Nemosila, igrofila, pratense. Selva, Giavera, Bavaria, Vittorio, Valdobbiadene, Q Cannigli, letto del Piave a Falzè, Treviso ecc. dal 1860 (anche Béreng. 1837-1842!, Béguinot 1909! – Var. littoralis Host. (= β major Sacc. Prosp. p. 149) Montello dal 1860., Vulgo Pajòn.

Q, Monfenera, (Grappa (Stern. 59)

Koeleria Pers.

108 K. phleoides (Vill.) Pers. Prosp. 146 (271. 1711)
I—III Arenaria, ruderale xerofila. Selva, Treviso dal 1864

109 K. setacea Pers. (272. 1787)
V. Pascoliva, xerofila. Grappa (G. Montini in Vacc. 64) Una var. forse l'alpicola (Gr. et Godr.) fu trovata sul Grappa dal Ball sec. Vacc. n. 64.)

110 K. cristata (L.) Pers. Prosp. p. 146 (274. 1719)
I—IV. Praterie, marginale, murale. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Treviso (anche Bég. 1909!) ecc. dal 1860; Cansiglio (Béreng. 1859!) fm. laxiflora (spica laxiora) Colli S. Vittorio 1906! fm. major (statura molto elatore) Muri vecchi S. Vittorio 1906!— Var. splendens (Pers.) [= K. grandiflora Bert. I. Grappa (Montini sec. Vacc. n. 64) — Var. cenescens Vis. Presso la cima del Grappa (Bolzon, n. 17)

Cynosurus L.

111 C. cristatus L. Prosp. p. 149 (276. 1415)
I—IV. Praterie, marginale, Tutta la provincia, in forme gracili e robuste. Selva, Vittorio, Montello, Cansiglio, Treviso (anche Béreng. 1838!), Romano, Grappa (D. Montini!), Resana (Bég. 1909!)

112 C. echinatus L. (277. 1696)
I—III Ruderale, domestico, campestre. Vittorio, lungo via Cavalletto e presso ville Franceschini, Giugno 1906!

Eragrostis Host

113 E. poaeoides P. B. Prosp. p. 148 (E. poaeformis Link) (282. 1717)
I—IV. Ruderale, campestre, murale. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Ciano del Piave, Treviso, dal 1862. Castelfranco e Montebelluna (anche Bég. 1909!) - Var. megastachya (Link) Prosp. p. 148 (come specie) Come il tipo, in tutta la provincia, dal 1869. Riolo (Bolz. ms.)

114 E. pilosa (L.) P. B. Prosp. p. 148 (283. 1685)
I–IV. Campestre, arenaria, domofila. Tutta la provincia, Selva, Camalò, Montello, Vittorio, Valdobbiadene (anche Bérenq. 1847!, Bizzozero 1872!), Salgareda (Contarini 1825!), Cà Tron di Roncade (Dirats. 1915!) — Var. verticillata P. B. Marginale pr. Asolo, 1910 (Bolzon, n. 24)

Melica Linn.

115 M. ciliata L. Prosp. p. 147 (285. 1719)
II–IV. Rupestre, murale. Conegliano, Vittorio, Asolo, Cornuda, Valdobbiadene dal 1870 — Var. Magnolii (Gr. Godr.). Grappa (Zanardini!), Pederobba verso Fener (Bég. 1909!) — fm. glauca (Schultz). M. Grappa sopra Borso lungo i Viadi (Bolz. MS.)

116 M. nutans L. Prosp. p. 148 (288. 1745)
II–IV Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello dal 1862 (anche Kellu. 1840!, Fr. Sacc. 1890!), Cornuda, Nervesa (anche Fracchia!); Romano (Sternb. 1804, n. 59)

117 M. uniflora Retz. Prosp. p. 147 (289, 1696)
II–IV Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello di Selva e di Nervesa, dal 1867 (anche Fr. Sacc.!); Monfenera (Bolz. 1895! in herb. Pal.), pr. Monfumo (Bolz. n. 11).

Briza Linn.

118 ~~Briza~~ media L. Prosp. p. 148 (290. 1563)
I–IV Campestre, pratense, pascoliva, marginale. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Treviso, ecc. dal 1861; Pederobba, Resana, Zenson (Bég. 1909!), Consiglio alt. 1200 m (D. Sacc. 1897!), Grappa (Bolz. MS.) fm. minoriformis Sacc. spiculis multo minoribus. Qua e là a Selva, Vittorio ecc. dal 1905.

A B. minor L. (291, 1678)
I–III Campestre. Presso Vittorio, avventizia sfuggita alla cattura da un prossimo giardino (Pampanini, n. 36) 1903,

Dactylis Linn

119 D. glomerata L. Prosp. p. 149 (294. 1719)
I–IV. Pratense, marginale, murale. Tutta la provincia. Selva, Vittorio ... dal 1861, Cà Tron di Roncade (Dirats. 1915!), Salgareda, Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909); Cansiglio (D. Sacc. 1897!) – Fm. abbreviata (Bernh.). Qua e là colle specie.

Poa Linn.

120 P. alpina L. ~~Prosp.~~ Agg. p. 39 (295. 1719)
IV–V. Pascoliva, eliofila. Grappa (Sternb. n. 59. Sprang.! Montim. in Vacc. n. 64.) Valdobbiadene (Béreng.!), Cansiglio 1869 (anche Bér. 1839 e Bég. in Fl. ital. exs. n. 1809 bis) – Fm. vivipara L. Grappa (Sternb. n. 59, Vacc. n. 64, Bolz. MS.)

121 P. bulbosa L. Prosp. p. 148 (296. 1719).
I–IV. Pratense, marginale, pascoliva, alveale. Tutta la provincia, ~~dal 1860~~ dal 1860, Selva, Vittorio, Treviso, ecc., Asolo (Bolz. MS.) – Fm. vivipara Koch. Colle specie, assai comune.

122 P. annua L. Prosp. p. 148 (297. 1719)
I–IV. Pratense, marginale, domofila, ortiva. Tutta la prov. Selva, Vittorio Treviso ... dal 1860, Fagarè, Zenson (Bég. 1909!); Cansiglio Béreng. 1839!, Asolo (Bolz. MS.) – Var. supina (L.) Valle di S. Fidà nel Grappa (Sternb. 1804, n. 59)

123 P. nemoralis L. Prosp. p. 148 (300. 1719).
I–IV. Nemofila, riparia, igrofila. Argini erbosi del Meschio 1906; Cà Tron (Fiori 1896 herb. Pat.); Q greto del Piave (Minio n. 35) Var. subuniflora Rchb. e var. firmula (Gaud.) Grappa (Montiur in Vacc. n. 64.)

Q Presso Resana (Bég. 1909!), Var. debilis (Thuill.) Bosch. di Asolo (Bolz. MS.) – ~~Var. uniflora Mad. K. e Alveo del Piave sotto e Mad. q. Bolzon. MS.~~

124 P. palustris L. Agg. p. 39 (P. fertilis Host) (301. 1816)
I Idrofila, riparia. Selva 1862; Cà Tron (Fiori, 1896!), Ponte di Piave (Bég. 1909!)

125 P. compressa L. Prosp. p. 148 (303. 1717)
I–IV. Marginale, domofila, murale, xerofila. Tutta la provincia Selva, Vittorio, Covolo ... dal 1860; Pederobba, Castelfranco (Bég. 1909!)

126 P. chaixii Vill. (304. 1789)
IV–V. Pascoliva, xerofila. Grappa (Montini in Vacc. n. 64 [P. sudetica Hke]).

127 P. pratensis L. Prosp. p. 148 (305. 1717)
I–IV Pratense, marginale, riparia. Tutta la provincia ... Selva, Vittorio, Treviso, dal 1860; Valdobbiadene e Treviso (Bérenger 1841!) Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. angustifolia (L.) Selva, Montello dal 1862

128 P. trivialis L. Prosp. p. 148 (306. 1563)
I–IV. Pratense, pascoliva, marginale. Tutta la provincia: Selva, Vittorio, Treviso, Valdobbiadene ... dal 1860; alveo del Piave pr. Pederobba (Bég. 1909!), Cà Tron (Diratz. 1915!)

Glyceria R. Br.

129 G. fluitans (L.) R. Br. Prosp. p. 148 (307, 1719)
I–III. Idrofila, palustre, riparia. Treviso 1864 (anche Giacomelli 1845!) Roncade 1864; Resana (Bég. 1909!) Salgareda (Contarini 1825!) Var. plicata (Fries) (1696) Selva, Vittorio dal 1905.

130 G. aquatica (L.) Wahlb. Prosp. p. 148 (308. 1719)
I–III Idrofila, palustre, riparia. Roncade, Quinto, Selvana, Treviso dal 1864; cà Tron (Diratz. 1915!)

Festuca (Tourn.) Linn.

131 F. ovina L. Prosp. p. 149 (310. 1785)
I–IV Pratense, pascolivo, marginale, murale. Var. α capillata Lam. (= F. tenuifolia Sibth.; Prosp. p. 149) Tutta la provincia, per lo più murale e fon. vispara. Rarissima nel Montello (Montello 1870, Selva, Volpago dal 1860 –
Var. β duriuscula (L.) Ponte di Piave, Salgareda, Negrisia ecc. (Béguinot, 1909!) var. γ glauca (Lam.) spesso coltivata nei giardini. – Var. ~~ε pedicellata Hack~~ Var. bivalvata (Host). Pascoli montani (Sacc., anche Béreng. 1845!) – Var. pannonica (Host)? Grappe (Sprangi) – Var. Halleri (All.) Grappe (Vacc. n. 64) – Var. alpestris (R. et S.) Grappe (Vacc. n. 64, sub F. varia β flavescens Koch), Sprangi e Tron in herb. Pat.); Valdobbiadene (Béreng. 1845!)

132 F. rubra L. Prosp. p. 149 (F. ovina var. heterophylla) (311. 1785)
I–IV Pratense, pascolivo, marginale. Selva, Vittorio, Montello dal 1862, Grappe (Vacc. n. 64) – Var. heterophylla Lam. γ gen. Nemofila pr. Vittorio 1905 – Var. violacea (Gaud.) IV-V. Grappe (Montini e Sprang. herb. Pat.) – Var. trichophylla (Ducros et Gaud.). Castelfranco, Salgareda e Ponte di Piave (Béguinot, 1909!)

133 F. gigantea Vill. Prosp. p. 149 (312. 1719)
II–IV Nemofila, chiofoba, igrofila. Montello dal 1861; Giavera e Falzè (F. Sacc.!); colle di Asolo (Bolz. in S.)

134 F. elatior L. Prosp. p. 149 (313. 1717)
I–IV Pratense, marginale, sepincola. Selva etc. dal 1862; Resana e Ponte di Piave (Bég. 1909!), Cà Tron (Strafs. 1915!) –
Var. arundinacea (Schreb.). ♀ Tutta la provincia: Treviso, Selva, Falzè, Vittorio dal 1860 (anche Bér. 1837!); Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!), Cà Tron (Strafs. 1915!)

♀ Prosp. p. 149 (come specie)

135 F. pumila Chaix (316. 1790)
Var. flavescens (Bellardi) III–IV. Rupestre, sassicola. Grappa (Montini in Kelln. 1846!, Fiori 1897!); sopra Valdobbiadene (Béreng. 1845!); alveo del Piave a Pederobba, discesa dai monti (Béguinot 1909!)

137 F. loliacea Curt. (F. elatior × Lolium perenne) (362. 1803) acapo III–IV Pratense. Grappa (Sternb. 1803, n. 59)

136 F. spectabilis Jan (319. 1826) [= F. spadicea β nemorosa Poll.]
IV Nemofila, eliofoba. Torena al Passo di S. Boldo (Pamp. in Fl. ital. ex. n. 736), Fadalto (Pamp. n. 44)

Vulpia Gmel.
138 V. Myuros (L.) Gmel. Prosp. p. 149 (Festuca Pseudomyuros Will.) (326. 1719).
I–III. Murale, ruderale, marginale, xerofila. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Vittorio ... dal 1862 – Var. sciuroides (Roth) (= F. bromoides Gm. non L.) Prosp. p. 149. I Campestre, pascoliva, xerofila. Montello dal 1860, rara.

Sclerochloa P. B.
139 S. rigida (L.) P. B. Prosp. p. 149 (Festuca rigida Kunth) (338. 1719)
I–III Murale, domofila, xerofila. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Valdobbiadene (anche Béreng. 1846!) ... dal 1860.

Bromus Linn.
140 B. asper Murray. Prosp. p. 150 (340. 1785)
I–III Nemofilo, eliofobo, sepincola. Montello (anche Bér. 1841!) e Selva ... dal 1862.

141 B. ~~Schraderi~~ erectus Huds. Agg. p. 39 (341. 1717)
I–III Marginale, pascolivo, murale, xerofilo. Selva 1862, Vittorio 1903, Valdobbiadene (Béreng. 1844!); mura di Treviso (Béguin. 1909!) Var. pendens: culmo tenuiore, subnutante. Murale a Serravalle di Vittorio, esposto ai venti, 1905.

142 B. rubens L. Agg. p. 39 (B. rigidus Rchb.) (343. 1551)
I–II Murale, domofilo, xerofilo. Mura di Treviso 1866; presso il Grappa (Stern. 1803, n. 59)

143 B. sterilis L. Prosp. p. 150 (344. 1563)
I–III ~~Tutta la p~~ Ruderale, domofilo, marginale. Tutta la provincia: Selva, Vittorio, Treviso... dal 1861; Castelfranco, Zenson, Fagarè, alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!) – Var. madritensis (L.) Vittorio nelle ghiaie alla stazione ferrov. 1906.

144 B. secalinus L. Prosp. p. 150 (346. 1717)
I–III. Segetale, marginale. Selva, Belvedere, Montello dal 1861, parcamente.

145 B. arvensis L. Prosp. p. 150 (347. 1554)
I–III Campestre, marginale, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Montello, Vittorio, Cornuda... dal 1861; Mogliano (Mayer in Bertol.); Valdobbiadene (Bérenger, 1845!), Treviso (Zanardini 1825!); alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!) – Var. patulus (M. et K.) Prosp. p. 150 ~~347~~ (come specie). Campestre a Volpago 1862, Vittorio, 1870, ecc.

146 B. mollis L. Prosp. p. 150 (348. 1717)
I–IV Ruderale, marginale, murale, pratense – Selva, Treviso, Vittorio ecc. dal 1861; Resana, Zenson, Ponte di Piave (Béguinot, 1909!)

Var. monostachyos Sacc. Prosp. p. 150. Nelle ghiaje aridissime a Selva 1862. – Var. racemosus (L.). Prosp. p. 150 (come specie). Pratense, marginale, sassicolo. Selva dal 1862; Ponte di Piave, Zenson (Béguinot, 1909!) – Var. commutatus (Schrad.) Agg. p. 39! Pratense, marginale a Selva ~~dal~~ e presso Treviso dal 1869; Valdobbiadene (Bérenger!); Resana, P. di Piave (Bég. 1909!)

147 B. squarrosus L. Prosp. p. 150 (352. 1717)
I–III. Campestre, ruderale, marginale. Selva, Camalò, Treviso dal 1861 (anche Béreng., 1837–41!)

Ceratochloa P. B.
C C. unioloides (Humb.) P. B. Bromus unilioides Humb., B. Schraderi Kunth. (352 B. 1873) Oriundo dell'Amer. centr. e merid. coltivavasi nel Trevigiano nel 1875–78 e trovavasi di rado avventizia. Ora pare abbandonata e scomparsa.

Brachypodium P. B.
148 B. silvaticum (Huds.) P. B. Prosp. p. 149 (B. gracile P. B.) (354. 1717)
I–IV. Nemofilo, eliofobo, sepincolo. Tutta la provincia: Montello, (anche Kalln. 1841!) Selva, Vittorio, Valdobbiadene (anche Favero 1846!) ecc. dal 1861. Trovasi promiscuamente nelle due forme: glabrescente (glauco-virens Murbeck) e peloso (dumosum Vill.)

149 B. pinnatum (L.) P. B. Prosp. p. 150 (355. 1696)
I–IV. Pratense, marginale, eliofobo. Tutta la provincia: Selva, Montello, Vittorio, Valdobbiadene (anche Béreng. e Favero 1845!); Cà Tron (Divatz. 1915!) – Var. glabrescens (rupestre Koch?) Prosp. p. 150. Nel Montello; ~~Po~~ Ponte di Piave, Salgareda, Resana, Castelfranco (Bég. 1909!) – Var. ramosum (R. et S.). Agg. p. 39. arenario, xerofilo presso Possagno (Visiani, Mayer in Bertol.) – Var. ~~humile~~ ~~Bolz~~ setifolium (Schur.) a Mezér e sopra Asolo (Bolzon n. 26).

Nardus Linn.

150 N. stricta L. Prosp. p. 151 (356. 1719)
IV–V. di rado discende ad I. Pascoliva, eliofilo. Cansiglio (San. 1869, anche Bérenq. 1846; Valdobbiadene (Bérenq. e Favero 1845!); Grappa (Montin., Zanardini herb.!); Mogliano (Mayer in Bertol.). Il Koch, Syn. p. 721, dice che la specie dai pascoli torbosi ascende sulle Alpi, ma è cosa più probabile che essa dalle Alpi discenda alla pianura ~~in basso~~.

Psilurus Trinius

151 P. aristatus (L.) Duv.-Jouv. Prosp. p. 151 (Ps. nardoides Trin.) (357. 1696)
I–II Pascolivo, xerofilo. Luoghi aprichi del Trevigiano (Mayer in Bertol.). Il Mayer raccolse la specie probabilmente nei pressi di Mogliano; finora io non ve l'ho raccolta.

Lolium Linn.

152 L. temulentum L. Prosp. p. 151 (360. 1696. R)
I–IV. Campestre, segetale, Tutta la provincia: Selva, Camatò, Volpago, Vittorio ... dal 1862; Resana (Bég. 1909!) – Var. speciosum (Bieb.) (1551), Prosp. p. 151 (come spec.). Treviso (anche Bér. 1837! e Mayer in Bertol.), Selva 1862, Via Cavallotti di Vittorio, 1907. Vulgo. Imbriaga (abbriacante); Zizania. (Scomigo (Pamp. in Bolz. MS.)

153 L. perenne L. Prosp. p. 151 (362. 1585)
I–IV. Pratense, marginale, ortivo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Vittorio, Treviso dal 1860; Resana (Bég. 1909!), Ca Tron (Divatz. 1915!) – Var. tenue (L.) Qua e là nei luoghi più magri – Var. italicum (A. Br.). Erbosi più pingui Selva 1870, Vittorio, Treviso Resana (Bég. 1909!), Mogliano (Mayer in Bert.) – Var. ramosum Cocc. Via Cavallotti a Vittorio 1906, Ogliano (Pamp. n. 36) – A Selva 1906 raccolsi una fm. a spica breve, contorta, forse per opera d'insetti. Vulgo (tutte le forme): Lojo, Raigras.

Agropyrum Gaertn.

154 A. caninum (L.) P. B. Prosp. p. 151 (Triticum) (363. 1711)
III Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Presso Valdobbiadene (Bérenq. 1844!); Pederobba, Ponte di Piave, specialmente nel greto (Bég. 1909!) Varia a spighette rosseggianti e pallide.

155 A. repens (L.) P. B. Prosp. p. 150 (Triticum) (365. 1583)
I – IV. Campestre, Sepincola, arenario. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Vittorio, Mogliano ... dal 1862; Castelfranco, Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!) Trovasi aristato e mutico ♀ Var. glaucum (R. S.) Alveale, sassicolo, sepincola, Selva, Corolo, Falzè, Treviso, Vittorio ... dal 1861; pr. Valdobbiadene nell'alveo del Piave (Favero, 1844!) – Var. littorale (Host). Letto del Piave a Corolo, Vittorio. Varia a color glauco e a spighe aristate – Var. Sepium (Thuill.) Alveo del Piave fra Ponte di Piave e Salgareda (Béguinot 1909!) Questa fm. conviene con esemplari di Hechtritz in herb. Pat.
♀ Vulgo: Gramegna.

A A. cristatum (Schreb.) Gaertn. Agg. p. 39 (Triticum) (368. 1848). ~~Ra~~
V Rupicolo. Vette del Grappa (Meneghini in Parlat., Sprang.) Dubitasi che sia fra noi soltanto avventizio, essendo d'origine balcanica e non più rinvenuto di recente.

Triticum (Tourn.) Linn.
C T. aestivum L. Prosp. ~~p.~~ 150 (371. 1415. R)
I – IV. Segetale, ovunque coltivato e spesso avventizio, nelle varietà hibernum (L.), turgidum (L.), Spelta (L.) ed altre. Vulgo. Froment, Margiòl, Spelta

C T. monococcum Linn. Agg. p. 39 (371 c. var., 1554)
I – IV. Segetale, coltivato. Talora frammisto all'Avena sativa, a Selva, 1863.

Aegilops Linn.
R Ae. ovata L. Prosp. p. 151 (378. 1550)
I. ~~Indicata~~ Ruderale, xerofila. Indicata l. c. come probabile inquilina della parte inferiore della provincia, ma finora non constatata.

~~Sorghum Pers.~~

~~S. vulgare~~

Secale (Tourn.) Linn.

C S. Cereale L. Prosp. p. 151 (380. 1550. R.)

I–IV Segetale. Tutta la provincia. ~~Estesamente~~ spesso coltivata e talora avventizia, come a Vittorio in via Cavallotti 1906. Oriunda d'Oriente. Vulgo. Segàla.

Hordeum (Tourn.) Linn.

C H. vulgare L. Prosp. p. 151 (381. 1415. R.)

I–IV Segetale. Tutta la provincia, coltivato comunemente e talora avventizio. D'origine orientale – Vulgo Orzo, ordo Var. hexastichum (L.). Coltivato qua e là specialmente in collina.

156 H. murinum L. Prosp. p. 151. (385. 1550)

I–IV. Ruderale, domofilo, xerofilo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Vittorio .... dal 1861; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915); Asolo (Bolz. MS.)

~~Lex Linn.~~

~~Z. Mays L. Prosp. p. 142~~

Fam. 7. Cyperaceae

Cyperus (Tourn.) Linn.

157 C. flavescens L. Prosp. p. 138 (391. 1550)

I–IV. Idrofilo, palustre, ripario. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1860; Asolo Monfumo (Bolz. 1894, herb. Pat. e n. 11); Valdobbiadene (Bérenger 1844, herb. Pat.) – Var. monostachyus Sacc. Prosp. p. 138. Arenario, alveale nel letto del Piave, 1861.

158 C. serotinus Rottb. Sacc. Prosp. p. 139 (C. Monti L.) (390. 1685)

I–IV. Idrofilo, palustre, ripario. Tutta la provincia, dal 1861

Treviso (anche Bérenger e Trachia 1837), Selva, Nervesa, Vittorio; Forame nel Montello (Fr. Sacc.!); Varia nel colore più o meno bajo chiaro od oscuro delle squamette. Asolo e Treviso (Bolz. n. 11)

159 C. fuscus L. Prosp. p. 138 (395. 1696)
I—IV. Idrofilo, palustre. Tutta la provincia dal 1861: Selva, Volpago, Montello, Piave, Vittorio ecc.; Mogliano (Mayer in Bertol.), Asolo e Monfumo (Bolz. in herb. Pat.!), Valdobbiadene (Bérenger 1864 herb. Pat.!) — Var. virescens (Hoffm.), Prosp. p. 138. Lungo la Brentella a Selva, raro, 1861 — Var. elatior Sacc. Prosp. p. 138. Luoghi umidi, piagge, Selva, 1861!

R C. teretiusculus L. var. distachyus (All.) (389. 1696)
III Igrofilo. Versante meridionale dei colli detti Piai (m. 300 c.) presso Cozzuolo di Vittorio 1894 Pamp. in herb. Bolz. sec. Lett. Bolz. apr. 1910). In raccolto un unico esemplare malgrado ulteriori ricerche; il trovato è perciò bisogno di conferma.

160 C. longus L. Prosp. p. 138 (401. 1415)
I—IV. Idrofila, palustre. Tutta la provincia dal 1861: Selva, Paderno, Treviso, Falzè, Cà Tron di Roncade (Dirat. 1915!) — Var. badius Sacc. Prosp. p. 138 (non Desf.). Spicatis longioribus e floribus copiosioribus efformatis, castaneis potius quam rufis.

Eriophorum Linn.

161 E. polystachyum L. Rgg. p. 37 (404. 1565)
α angustifolium Roth. IV Palustre, idrofilo. Canneto (Sacc. 1862 e Bérenger 1842!); Grappa (Zanardini herb.!) — β Var. latifolium (Hoppe). I. Igrofilo, palustre. Ospedaletto, Badoere, Cornuda, 1862; Asolo (Bolz. 1895 herb. Pat.!), Cozzuolo (Pamp. in De Toni n. 29); Resana (Béguinot, 1909!)

Monfumo (Bolz. ms.)

162 E. alpinum L. (405. 1719)
IV Palustre. Presso il M. Grappa (Zanardini herb.!)

Scirpus (Tourn.) Linn.
163 S. silvaticus L. Prosp. p. 140 (410. 1719)
I – III Nemofilo, igrofilo, subpalustre. Presso Treviso (Kettner in Bertol.); Montello al Forame, ~~[illegible]~~ (Fr. Sacc. 1890!); presso Resana 1909 (Béguinot! 1909!)

164 S. maritimus L. Prosp. p. 139 (411 1550)
I – III. Igrofilo, ripario, subpalustre, Treviso (Mayer in Bert.), Fracchia!) Melma (Bérenger, 1838!) Q Var. compactus ~~[illegible]~~ (Krock.) Prosp. p. 139 (var. anaxaeus Sau.). Alveale nel greto del Piave a Falzè, Nervesa; a Ponte di Piave, Zenson, Salgareda (Béguinot, 1909!)
Q Vulgo: Tagiòn, Quarèlo (nel basso Trevigiano).

165 S. Caricis Retz. Prosp. p. 140 (S. compressus Panz.) (412. 1729)
II – IV. Arenario, igrofilo, alveale. Letto del Piave fra Covolo e Nervesa, 1862, raro

166 S. Holoschoenus L. Prosp. p. 139 (413. 1550. R.)
I – IV Igrofilo, subpalustre, alveale. Tutta la provincia dal 1862: Nervesa, Ciano, S. Palè (Pelagio), pr. Treviso, Mogliano (anche Mayer in Bertol.) Vittorio ecc. – Var. australis (Murr.). Salgareda (Contarini, 1825!), Ponte di Piave, Negrisia (Béguinot, 1909!)

167 S. lacuster L. Prosp. p. 139 (414. 1550)
I – III. Palustre, lacustre, alveale, idrofilo. Quasi tutta la provincia dal 1863. Treviso, Quinto, Cessalto (anche Fracchia e Bérenger 1837!) Falzè lungo il Piave (Fr. Sacc. 1891!), Cà Tron (Diratz. 1915!), Ponte di Piave (Bég. 1909!) – Var. Duvalii Hoppe (= S. lacuster × triquetrus Gr. Godr.) Nel greto del Piave e presso Treviso, 1868.

168 S. triquetrus L. Prosp. p. 139 (416. 1551)
I – IV. Igrofilo, palustre, ripario, alveale. Nervesa, Falzè lungo il Piave, dal 1861; Cantiglio (Béreng. 1842 herb. Pat.!)

169 S. pungens Vahl Prosp. p. 139 (417. 1729)
I Igrofilo, palustre, ripario. Treviso lungo il Sile, fuori Porta Portello, 1863; Ponte di Piave, Negrisia, Zenson (Béguinot, 1909!)

170 S. mucronatus L. Prosp. p. 139 (418. 1719)
I – III Igrofilo, palustre, ripario. Bavaria, Colfosco dal 1862; S. Maria del Rovere pr. Treviso (Fracchia, Béreng. 1837!); Asolo (Parolini, Bolz. MS.)

171 S. caespitosus L. (422. 1785)
IV – V. Igrofilo, subpalustre. Pascoli ai piedi del Grappa (Sprang.! Montini, Vaccari n. 64); ai confini del Trevigiano verso Tamai (Contarini herb.!)

172 S. setaceus Linn. (420. 1719)
I – II. Igrofilo, alveale. Alveo del Musone a Pagnano presso Asolo (Bolz. MS.)

173 S. pauciflorus Lightf. Agg. p. 36. (424. 1804)
II Arenario, igrofilo. Sabbie dell'alveo del Piave a Nervesa, 1862; fra Ponte di Piave e Negrisia nello stesso alveo (Bég. 1909!)

Heleocharis R. Br.

174 H. acicularis (L.) R. Br. Prosp. p. 139 (426. 1694)
I – III. Alveale, arenario, igrofilo, ripario. Alveo del Piave freq. dal 1861, Cordignano, Orsago (Pamp. 44 e in Fl. it. exs. n. 746); Motta 1841 Béreng.!), nel Trevigiano (Contarini 1825 herb.!)

175 H. palustris (L.) R. Br. Prosp. p. 139 (428. 1696)
I – III. Ripario, alveale, igrofilo. Selva, Giavera, Quinto, alveo del Piave dal 1861; fra Conegliano e Sacile (Contarini 1825!); Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!) pr. Castelfranco (Bolz. MS.) – Var. uniglumis (Schultz) Nervesa al Piave, 1862; Negrisia e Ponte di Piave e Zenson (Bég. 1909!)

176 H. ovata (Roth) R. Br. Prosp. p. 139 (430. 1801)
I – III Arenaria, igrofila, alveale, riparia. Bavaria, 1862; Montello, Fr. Sacc. 1890!; Nervesa (Bizz. 1881!); Ca Tron (Dirats. 1915!)

Fimbristylis Vahl

177 F. dichotoma (L.) Vahl. Prosp. p. 140 (434. 1792)
I. Riparia, eliofoba, igrofila. Treviso (Mayer e Kellner in Rchb. Icon. Gl. germ. Cyp. p. 44 tab. CCCXV; Mogliano (Mayer in Bertol.); Secondo stesso Rchb. l.c. è specie appena distinta da F. annua, alla quale si riferiscono alcune delle località del Prosp. l.c.; Carpenia pr. Vittorio (Bolz. MS.)

178 F. annua Roem. et Schulth. Agg. p. 37 (435. 1729)
I. Palustre, igrofila, riparia. Treviso a Porta Portello (Bérenger e Fracchia 1839 – 1841!); lungo il Piave presso Nervesa (Bizz. 1881!); Motta (Bérenger 1842!)

Schoenus Linn.

179 S. nigricans L. Prosp. p. 139 (436 – 1711)
I – III Arenario, alveale, igrofilo. Nervesa al Piave, S. Palé (Pelagio), Quinto, Cornuda, Vittorio dal 1862; Resana, Ponte di Piave, Negrisia (Béguin. 1909!), Asolo (Bolz. MS.) – Var. minor Bolz. MS. subpalustre al colle di Pinmaco di Asolo (Bolz. MS.)

R S. ferrugineus L. (437. 1804)
IV – V Igrofilo, subpalustre. Grappa (Spranz.). Non vidi gli esemplari quindi la specie è da confermarsi, quantunque probabile, crescendo nelle contigue alpi.

Cladium R. Brown

180 C. Mariscus (L.) R. Br. Prosp. p. 139 (438. 1550)
I. Igrofila, palustre. Roncade 1865; S. Donà di Piave (Contarini 1825!); Meolo 1868; presso Treviso al Sile (Fracchia e Bérenger 1837!); Bosco Cà Tron (Fiori 1896 h. Pat.!) – Vulgo: Marisco, Strame.

Rhynchospora Vahl.

181 R. alba (L.) Vahl. Agg. p. 36 (439. 1729)

III Igrofila, palustre. Laghi di Revine, 1865, associata a Drosera rotundifolia e fra gli Sfagni, non comune.

Cobresia Willd.

182 C. myosuroides (Villars) Fiori (441, 1785). Cobresia scirpina W., Carex Bellardi All., Elyna spicata Schrad.

V. Pascoliva, rupestre, igrofila, a M. Grappa (Zanardini 1827, herb!)

Carex Linn.

183 C. Davalliana Smith Prosp. p. 140. (443. 1729)

I – II Igrofila, riparia, alveale. Treviso alle Corti (Fracchia 1841!); lungo il Piave a Nervesa 1862; Resana al luogo detto Palù (Béguinot, 1909!); ai confini del Conegliano verso Tamai (Contarini 1825 herb!) Ad Asolo presso il Casonetto (Bolz. MS.) – Var. glabrescens Pach. Castelcucco (Bolz. MS.)

R C. baldensis L. (450., 1620)

IV – V Pascoliva, xerofila. Grappa. Esiste nell'Erbario Sprangi coll'indicazione di questa località, ma non è confermata da altri floristi.

184 C. paniculata L. Agg. p. 37 (458. 1719)

III Igrofila, riparia, subpalustre. Presso Vittorio, 1865 – Var. paradoxa (W.) Intorno ai laghetti di Revine (Pamp. in Bolz. MS.)

185 C. vulpina L. Prosp. p. 140 (459. 1551)

I – III Igrofila, riparia, marginale. Selva, Vittorio ... dal 1865; Mogliano (Mayer in Bertol.); presso Treviso (Fracchia, 1841!); Ca' Tron (Diratz. 1915!); Resana nel sito detto Palù (Béguin. 1909!); Valle di S. Fida (Stern. 1804, n. 59)

186 C. muricata L. Prosp. p. 140. (460. 1563)

I – III Igrofila, marginale, riparia. Selva, Volpago, Vittorio dal 1861; Mogliano (Mayer in Bertol.); Treviso (Trotter, 1890!)

ed anche C. stellulata Sacc. non L.

-Var. divulsa (Good.) Prosp. p. 140 (come sp.) (460 β. 1696) ~~[illegible]~~
~~Nate bosco Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!) e Var. Pairaei~~
I–III. Igrofila, riparia, eliofoba. Selva, Volpago, Vittorio, Treviso dal 1862; Crespan (Montini in Bertol.) Castelfranco, Resana (Béguin. 1909!) — Var. Pairaei F. Schultz. (460 α) IV. Nemofila Bosco Cansiglio (Dom. Saccardo 1897!)

187 C. brizoides L. (462. 1729) — Var. praecox (Schreb.) (462 β. 1804), Prosp. p. 140 (C. Schreberi Schrank).
I–III. Pratense, marginale, subigrofila. Selva, Montello, 1862, Vittorio, 1867.

188 C. leporina L. Agg. p. 37 (463. 1729).
III–IV. Pascoliva, subigrofila, nemofila. Bosco Cansiglio, 1869.

189 C. elongata L. (465. 1785)
I Igrofila, riparia. Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!)

190 C. canescens L. Agg. p. 37. (467. 1785)
IV. Nemofila, igrofila, ~~eliofoba~~. Nel bosco Cansiglio (Bérenger 1842 herb. Pat.! e 1844 in herb. Sacc.!)

191 C. remota L. Prosp. p. 140 (468. 1563)
I–III. Igrofila, riparia, marginale. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Vittorio, Montello dal 1861; Tarzo di Vittorio (Kellner 1845!); Resana al sito Palù (Béguin. 1909!); fra Castelfranco e Valà (Bolz. MS.)

192 C. axillaris Good. (C. muricata × remota) (468 A. 1804)
IV. Igrofila, eliofoba. Valle di S. Fidà del Grappa (Sternb. 1804, n. 59)

193 C. caespitosa L. (470). Var. stricta (Good.) (1785) Prosp. p. 140 (come sp.)
I – III. Igrofila, riparia, palustre. Presso il Piave a Pederobba e tra Negrisia e Ponte di Piave (Bég. 1909!); laghetti di Revine e Savazza (anche Pamp. n. 37) – Var. acuta (L.) (1787) Prosp. p. 140 (come sp.). Nemofila, igrofila, Montello, Treviso – Var. Goodenowii (J. Gray) (1785) Agg. p. 37 (C. vulgaris Fr.). Sponde del Piave a Nervesa, 1863; Treviso alle Corti (Fracchia!)

194 C. digitata L. Prosp. p. 141 (474. 1729)
I – III Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, Selva, Vittorio.. dal 1862; Montello (Kellner 1844!); Susegana (Fracchia 1841!); Asolo, Monfumo, Castelli (Bolzon n. 12) – Var. ornithopoda (Willd.), Prosp. p. 141 (come sp.). II – IV. Alveale, pascolina, ~~alveale~~ Nervesa e Falzè lungo il Piave, 1862, ~~presso~~ Boccaor del Grappa (Montini in Bertol., Bolz. MS.)

195 C. alba Scop. Prosp. p. 141 (475. 1729).
II – III. Alveale, nemofila, igrofila. Nervesa lungo il Piave 1862 (anche Béreng. 1845!); Cozzuolo (Vittorio) (Pampanini) Bolzon n. 12; Valle di S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59)

196 C. humilis Leyss. Agg. p. 37 (476. 1729)
III – IV. Pascoliva, eliofila. Colli di Vittorio 1868; di Asolo (Fiori 1897 in herb. Pat.!); letto del Piave (Minio, n. 35); colle di S. Martino di Asolo (Bolz. MS.)

197 C. montana L. Prosp. p. 140 (e p. 141 (C. praecox var. nigricans)) (478. 1729)
III – IV. Pascoliva, nemofila e (discendendo) anche alveale. Sopra Vittorio, 1869; Crespan (Montini in Bert.); colli di Asolo (Fiori 1897 herb. Pat.!); letto del Piave presso il Montello 1863 – 66; Masèr (Bolz. MS.) e radici del Grappa

198 C. verna Chaix ap. Vill. Prosp. p. 140 (C. praecox Jacq.) (480. 1551)
I–III. Pratense, marginale. Selva, Volpago, Montello, Nervesa, Treviso, Vittorio, dal 1862; Mogliano (Mayer in Bert.); Valdobbiadene (Berenger, 1842!); Letto del Piave (Minio, n. 35) – Var. longistoba (Host). Bosco Ca' Tron a Roncade (Fiori herb. Pat.!) – Var. umbrina (Host). S. Martino presso Asolo (Bolg. MS.)

199 C. tomentosa L. Prosp. p. 141 (482, 1719)
I Pratense, igrofila. Mogliano (Mayer in Bertol.); Roncade 1866; bosco Ca' Tron (Diratz. 1915!)

200 C. pallescens L. Prosp. p. 141 (483. 1729) Zanardini,
II–IV. Paludosa, sparsa, igrofila, nemorale. Grappa (Montini e Bizz. 1878, herb. Pat.); Valdobbiadene (Béreng.!); Montello, 1868; Mogliano (Mayer in Bert.); Roncade, 1866; Resana (Béj. 1909!); presso Farzè di Vittorio (Keltner 1846!). Ha una distribuzione molto varia ed estesa, dai monti elevati alla bassa pianura – Var. erophila Briz. M. Archesàn del Grappa (Bolg. MS.)

201 C. pilosa Scop. Prosp. p. 141 (C. Michelii Sacc. non W.) (484. 1729)
II Nemorale, dioposta. Montello dal 1862, comune

202 C. capillaris L. Prosp. p. 141 (486. 1756)
IV Rupestre, pascoliva, igrofila. Grappa (Montini, Vacc. n. 64, Cobau 1906!, Bizzozero 1878!)

203 C. pendula Huds. Prosp. p. 141 (488. 1551) (C. maxima Scop.
I–II. Igrofila, riparia, nemorale. Selva, Canale, Montello dal 1861; ca Tron di Roncade (Diratz. 1915!); Fu casualmente omessa nel mio Prospetto. Asolo al Colmarion (Bolg. MS.)

204 C. nitida Host. Prosp. p. 141 (C. praecox β nitida) (490. 1818)
I–II Pascoliva, pratense, alveale. Presso Treviso, alveo del Piave a Nervesa, Serravalle di Vittorio dal 1861; Negrisia (1909!)
Bégunot

205 C. panicea L. Agg. p. 37 (491. 1726)
I–II Idrofila, palustre, riparia. Presso Treviso 1864; bosco Montello (Fr. Sacc. 1890!); Resana, Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!)

206 C. glauca Murr. Prosp. p. 141 (494. 1550) (I–III Igrofila, riparia.) Tutta la provincia: Treviso (anche Fracchia 1838!), Montello, Selva, Vittorio, ... dal 1862; Fonte (Montini!); Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!) (Asolo (Bolz. MS.)) Varia nella statura e nella larghezza delle foglie. A Vittorio, 1907, raccolsi una forma colle spighe femminee all'apice spesso maschili, colle bratte più ottuse, gli otricelli lisci ... forse un ibrido fra C. glauca e C. caespitosa – Var. cuspidata (Host) M. Archeion del Grappa (Bolz. MS.)

207 C. mucronata All. Prosp. p. 140 (496. 1729)
III–IV Rupestre, sassicola, ~~xeri~~elio fila. Boccaor di Crespan (Kellner in herb. Zanardini, Montini, Fiori, alt. 500 m. 1897 herb. Pat.!); Valdobbiadene (Béreng. 1846!). (Bolz. MS.)

208 C. brachystachys Schrank. Prosp. p. 141 (498. 1830)
IV–V. Pascoliva, ~~xeri~~elio fila. Boccaor di Crespan e Grappa (Montini in Bertol. ⚥ Vaccari, n. 64).

209 C. ferruginea Scop. Prosp. p. 141 (C. Scopolii Gaud.) (500. 1729)
IV–V. Pascoliva, eliofila. M. Grappa, Boccaor di Crespan e Solagna (Montini in Bertol.). Var. sempervirens (Vill.) (= C. ferruginea Schk. e W.). Grappa (Sternb. 1803, n. 59; Montini e Pasolini in Bertol., Spranzi herb. Pat.)

210 C. Michelii Host (non Sacc. cfr. C. pilosa)
IV Nemofila, igrofila. Monti ai confini fra il Trevigiano e Bassanese (Ball, Alp. Guide, 1868)

211 C. silvatica Huds. Prosp. p. 142 (C. Drymeia Ehrh.) (503. 1729)
II - III Nemofila, igrofila, eliofoba. Selva, Montello, Vittorio ... dal 1862; Valdobbiadene (Bérenger, 1844!); presso Targo di Vittorio (Kellner, 1846!); coll. di S. Martino della Rocca pr. Asolo (Bolz. MS.)

212 C. distans L. Prosp. p. 142 (505. 1551)
I - III. Igrofila, riparia. Selva, Montello, Vittorio, Quinto ... dal 1862; dintorni di Treviso (Fracchia 1841!); Resana, Ponte di Piave; Negrisia (Béguin. 1909!) - Var. Hornschuchiana (Hoppe). Resana al luogo detto Palù (Béguinot, 1909!)

213 C. flava L. Prosp. p. 142 (508. 1719)
II - III Igrofila, subpalustre, riparia. Treviso e dintorni (anche Fracchia 1841; Bosco di Cà Tron (Fiori, 1896, herb. Pat.!); Resana [fm. lepidocarpa] (Bég. 1909) - Var. Oederi Retz. Prosp. p. 142 (come sp.). Lungo il Piave a Nervesa (anche Bizz. 1881!), lungo la Brentella a Selva dal 1862; Vittorio (D. Sacc. 1890!); Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!) * Var. elatior Anders. Igrofila a S. Martino di Lupari (Bolz. in lett. 1910) (sotto il colle di S. Giustina di Asolo (Bolz. MS.)

214 C. Pseudocyperus L. Agg. p. 37. (509. 1719).
I - II Igrofila, riparia. Da Treviso, a S. Pelagio e Selva dal 1864.

215 C. rostrata With. Agg. p. 37 (C. ampullacea Good.) (510. 1806)
IV Nemofila, palustre. Nei paludetti del Cansiglio 1869.

216 C. riparia Curtis. Prosp. p. 142 (512. 1551)
I - III Igrofila, nemofila. Montello, Selva e presso Treviso.. dal 1868; Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!) - Var. acutiformis (Ehrh.) Prosp. p. 142 (C. paludosa Good) Selva, Giavera, Treviso.. dal 1862; Bosco Cà Tron (Fiori 1896 herb. Pat!) - fm. ramosa Pampanini. Laghi di Revine (Pamp. n. 37) - Var. Kochiana DC. A typo differt spicis ♂ parcioribus (1-2) bracteis florum ♀ praecipue inferiorum in mucronem serrulatum acicularem productis. Negrisia 2. VI. 1909 et Resana 19. VI. 1909 (Béguinot). Vulgo: Caresina, Paja (tutte le forme)

217 C. hirta L. Prosp. p. 142 (515. 1719)
I–III Igrofila, riparia, subpalustre. Selva, Montello, Vittorio Treviso... dal 1860; Resana (Bég. 1909!), Cà Tron (Diratz. 1915!)
Var. hirtiformis (Pers.), Alveo del Piave
Prosp. p. 142 (var. sublevis)

218 C. Nicoloffii Pamp. (= C. riparia ramosa × caespitosa stricta) (512 A, 1903)
III Igrofila, palustre. Laghetti di Revine (S. Maria) fra i parenti (Pamp., 1903)

Fam. 8 Typhaceae

Typha (Tourn.) Linn.

219 T. minima Funck. Prosp. p. 127 (519. 1550)
I–III. Igrofila, subpalustre, alveale. Alveo del Piave a Nervesa 1862 (anche Kellner 1841!, Bizzozero 1881); Oderzo, Motta, Roncade (Tracchia); Ponte di Piave a Zenson (Bég. 1909!); Valdobbiadene (anche Béreng 1844!)

220 T. angustifolia L. Agg. p. 32 (521. 1550)
I Igrofila, subpalustre. Prati paludosi fuori. Porta Portello a Treviso, 1864.

221 T. latifolia L. Prosp. p. 127 (522. 1415)
I Igrofila, riparia, palustre. Selva, Camalò, Volpago, Quinto, Roncade dal 1862; Cansiglio nelle lame m. 1050 (D. Sacc. 1897!)
Vulgo: Pavèra, Pavièra.

Sparganium (Tourn.) Linn.

222 S. erectum L. Prosp. p. 127 (Sp. ramosum Huds.) (523. 1550)
I–III. Idrofilo, palustre, ripario. Selva, Paderno, Vittorio.. dal 1862; Salgareda (Contarini, 1825!); Pagnano d'Asolo (Bolz. ms.)

NB pel compositore: Per ogni Fam. successiva si metta un numero progressivo; quindi nella seguente si metta 9 ecc.

223 S. simplex Huds. Agg. p. 33 (524. 1719)
I Idrofilo, palustre, ripario. Paderno, S. Palè (Pelagio), presso Treviso.. spesso associato a S. erectum, dal 1864; presso Resana (Bég. 1909!) – var. fluitans A. Br. Laghetto di Revine (l. di Lago) (Pamp. n. 44.

224 S. natans L. Prosp. p. 127 (525. 1785)
I Idrofilo, fluviatile. Nuotante nel Sile a Quinto e Treviso (anche Béreng. 1837! e Tracchia 1839!)

Fam. 9 Araceae

Acorus Linn.

A A. Calamus L. Prosp. p. 128 (536. 1551. R.)
I Igrofilo, subpalustre, ripario. Oriundo delle Indie, coltivato da più secoli e naturalizzato qua e là: fosse intorno Castelfranco (Turra, Montino Spranz. 1865! (Da alcuni è indicato dei laghetti di Revine (Zanich), da altri (farm. Rosso) di alcuni stagni del Montello (busa delle vane) ma queste due località domandano conferma)

Arum Linn.

225 A. maculatum L. Prosp. p. 128 (529. 1550).
I–IV. Sopra Serravalle di Vittorio nel Montello e nel Cansiglio (anche Béreng. 1842); presso il Grappa (Sternb. 1803, n. 59); inselvatichito nell'orto presso S. Niccolò a Treviso (Tracchia!). Nel ~~Cansiglio~~ Montello fu rinvenuta la fm. immaculatum (Schott).

226 A. italicum Mill. Prosp. p. 128 (530. 1415. R.)
I–III Igrofilo, eliofobo, ripario. Presso Roncade 1866; Conegliano (anche Béreng 1842); bosco di Salgareda (Contarini 1825!).

C. A. Dracunculus L. Prosp. p. 128 (531. 1554)
I Igrofilo, eliofobo. S. Bona presso Treviso (Tracchia 1850!) prob. avventizio. Coltivato non di rado a Selva, Vittorio ecc.

Fam. 10 Lemnaceae

Lemna Linn.

227 L. polyrrhiza L. Prosp. p. 127 (538. 1729).
I–III. Idrofila, natante. Treviso 1863 (anche Fracchia e Kellner 1840! Trotter 1909!), Selva, parcamente, 1862; Asolo (Bolz. ms.)

228 L. trisulca L. Prosp. p. 127 (539. 1563).
I–III. Idrofila, natante. Treviso 1867 (anche Fracchia e Bérenger 1837!, Kellner 1839!), stagn. del Montello, Selva, Vittorio.

229 L. minor L. Prosp. p. 127 (540. 1415. R)
I–IV. Idrofila, natante. Tutta la provincia dal 1861... Treviso, Selva, Volpago, Vittorio ecc.; Treviso (Kellner 1840!)

230 L. gibba L. Prosp. p. 127 (541. 1729)
I–III Idrofila, natante. Selva, parcamente, dal 1861; Treviso (Bereng. 1837!, Fracchia!); Asolo (Bolzon n 5)

Fam. 11 Najadaceae

Potamogeton (Tourn.) Linn.

231 P. pectinata L. Prosp. p. 126 (543. 1674)
I–III. Idrofilo, natante. Selva, Caerano, Treviso dal 1861, (anche Pamp. n. 44) nel Sile e Botteniga (Béreng. e Fracchia 1837!), Castel di Godego (Béguinot 1909!) Ponte di Piave, Salgareda, Negrisia,

232 P. pusilla L. Prosp. p. 126 (546. 1780)
I–III. Idrofila, natante. Selva dal 1861 (anche D. Sacc. 1990!); Treviso nel Sile (Béreng. 1837!, Fracchia 1840!, Kellner!); Resana (Bég. 1909!). Varia a foglie strettissime (fm. tenuissima M. K.) a Treviso.

233 P. natans L. Prosp. p. 126 (547. 1550)
I–III. Idrofila, natante. Stagni del Montello e Cansiglio, Quinto e Treviso dal 1861 (anche Bereng. 1837!) — Var. fluitans (Roth) Prosp p. 126 (come spec.). Presso Treviso (Fracchia 1840!), Biadene (Fr. Sacc. 1890!)

234 P. lucens L. Prosp. p. 126 (548. 1745)
I–III. Idrofila, natante. Sile a Treviso e Quinto 1868 (anche Bereng. e Fracchia 1837!); Lago di Revine 1869; Ca Tron di Roncade (Diratz. 1915!) — Var. acuminata (Schum.) Lago di Revine (Pamp. in Bolz. n. 6. MS.)

235 P. crispa L. Prosp. p. 126 (549. 1717) (anche Kellh. 1840!) (anche Fracchia)
I–III. Idrofila, natante. Tutta la provincia, Selva, Treviso, Vittorio... Dal 1861; Resana, Ponte di Piave, Negrisia (Béguinot, 1909!). Varia a foglie più anguste

236 P. perfoliata L. Prosp. p. 126 (550. 1745).
I–III Idrofila, natante. Quasi tutta la provincia: Caerano, Camalò, Vittorio... Dal 1861; Treviso (Fracchia 1839!); Laghetto di Revine e di Savassa (Trotter n. 62); Ponte di Piave e Negrisia (Béguinot 1909!)

Zannichellia (Mich.) Linn.

237 Z. palustris L. Prosp. p. 126. (553. 1553) (anche Kellh. 1840!)
I–III. Idrofila, natante. Sile a Treviso e Quinto 1868; Vittorio (Fr. Sacc. 1896!, Trotter 1906!); presso la Piave (Naccari in Bortol.); Asolo (Montini in Bortol.); Laghi di Revine (Pamp. in Bolz. MS. n. 44); Carpesica (Pamp.

Najas Linn

238 N. marina L. Agg. p. 32 (N. major Roth) (559. 1726)
I–III Idrofila, natante: Laghetto di Revine (Trotter n. 62, Pamp. n. 44); nel Trevigiano (Bérenger in herb. Pat. et Sacc.!)

239 N. minor All. Prosp. p. 126 (560. 1729)
I – III Idrofila, natante. Fossati a Selva dal 1861, a Vittorio 1866; a Treviso (anche Bracht!, Fracchia!, Bérenger, 1837!, Kellner, 1840)

Fam. 12 Hydrocharitaceae

Helodea Michx.
240 H. canadensis Michx. (562. Importata dal Canadà, e dal 1867 naturalizzata)
I – III. Idrofila, natante. A Selva ormai comunissima, ordinariamente ♀, dal 1906 (donde arrivata?); Treviso (Trotter 1909!); S. Michele del Quarto nel Sile (Fiori!); presso Resana (Béguinot, 1909!); a Pagnano, a Cà Falier pr. Asolo e a Riese (Bolz. MS. e n. 23).

Vallisneria Linn.
241 V. spiralis L. Prosp. p. 125. (563. 1697)
I Idrofila, natante. Sile e fossati vicini, presso Treviso (Béreng. 1839, Parolini, Montini, Trotter 1909); Melma (Fracchia!, Giacomelli!)

Hydrocharis Linn.
242 H. Morsus-ranae L. Prosp. p. 125 (565. 1550)
I – III. Idrofila, galleggiante. Lungo il Terraglio e a Quinto 1863; Treviso, fuori del Portello (Bérenger 1837!, Fracchia 1839!); Laghetto di Revine (Trotter n. 62!, Pamp. n. 44)

Fam. 13 Alismataceae

Sagittaria Linn.
243 S. sagittifolia L. Prosp. p. 125 (566. 1550 R.)
I Idrofila. Fossati di lento corso a Mogliano (Fracchia 1840!)

Alisma Linn.
244 A. Plantago L. Prosp. p. 125 (568. 1415. R.)
I – IV. Idrofila. Tutta la provincia, dal 1858. Cansiglio (Béreng.!, Don. Saccardo, 1897!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. lanceolatum (With.)

Selva 1861; Resana (Béguinot 1909!) — Var. graminifolium Wahl. Laghetti di Revine, 1867.

245 A. ranunculoides L. Prosp. p. 125. (569. 1802)
I–III Idrofila. Fonati di lento corso pr. Treviso e Roncade 1866; Orsago pr. ~~[illegible]~~ (Pamp. in Bolzon n. 7); Gorgo (Masè in herb. Sacc.!)

Butomus (Tourn.) Linn.

246 B. umbellatus L. Prosp. p. 125 (572. 1550)
I Idrofilo. Acque di lento corso presso Treviso dal 1861 (anche Fracchia); S. Lazzaro, Preganziol (Fracchia 1840!); Salgareda e Noventa di Piave (Contarini, 1825!).

Fam. 14 Juncaginaceae

Triglochin (Ruppius) Linn.

247 T. palustris L. Prosp. p. 126 (574. 1729)
I–III. Igrofilo, alveale, subpalustre. Sabbie del Piave a Nervesa, Falzè, dal 1861 (anche Bizz. 1881!); presso Treviso 1864 (anche Fracchia!) e Bérenger 1837!); prati subpalustri di Cornuda, 1861.

248 T. maritima L. Agg. p. 32 (573 ~~[illegible]~~ 1726)
I. Igrofilo, alofilo. Altino a Mogliano in lunghi salmastri (Meyer in Bertol.)
Volgo: Mazacavalo, Agiòlo.

Fam. 15 Commelinaceae

Commelina Linn.

A C. communis L. (578. 1703) Oriunda di Cina e Giappone, ~~naturalizzata dal 1890~~)
I–III. Marginale, ortiva. Selva, avventizia lungo le vie verso Camatò, 1904; Soligo (de Toffoli in Bolz. n. 23)

Fam. 16 Juncaceae

Juncus (Tourn.) Linn.

249 J. glaucus Ehrh. Prosp. p. 137 (580. 1563)
I – III Igrofilo, ripario. Tutta la provincia dal 1862: Selva, Giavera, Nervesa, Treviso, Vittorio; Mogliano (Mayer a. Bertol.); Cà Tron (Dratz. 1915!); Castelfranco, Resana (Béguinot 1909!)

250 J. conglomeratus L. Prosp. p. 137 (581. 1556)
I – III Igrofilo, ripario. Tutta la provincia dal 1861: Selva, Nervesa, Vittorio, Castelfranco ...; Romano (Montini a. Bertol.); Ponte di Piave e Salgareda (Bég. 1909!); Cantoglio (Dom. Savardo, 1894!) – Var. effusus (L.) Prosp. p. 137 (cum spec.). Tutta la provincia, dal 1861. Treviso, Selva, Vittorio ..., Cà Tron (Dratz. 1915!)

251 J. obtusiflorus Ehrh. Prosp. p. 137 (586. 1719)
I – III. Igrofilo, riparo, palustre. Treviso, Quinto, Pregarziolo, Servavalle di Vittorio, dal 1864; Selvana (Fracchia!); Ponte di Piave, Negrisia, Resana (Béguinot, 1909!); Romano (Montini a. Bertol.); Tamai ai confini del Coneglianese (Contarini, 1825!).

252 J. articulatus L. Prosp. p. 137 (J. lamprocarpus Ehrh.) (587. 1563)
I – IV. Igrofilo, riparo, subpalustre, alveale. Montello, Selva, Giavera, Nervesa (anche Bizz. 1881!) dal 1862; Treviso, 1864 (anche Kellner 1860); Cantoglio (Béreng. 1838!); Cà Tron (Dratz. 1915!); Monfumo (Bolz. MS.) – Var. cuspidatus (M. Brenn.) Lago di Resana (Parl. fl. 36) p. – Var. acutiflorus (Ehrh.) Col tipo, comunemente – Var. alpinus (Vill.) Agg. p. 36 (Var. microcarpus Sav. Prosp. p. 137) p. Alveo del Piave a Nervesa, Falzè 1862-71; e a Comuda, a Pederobba (Béguin. 1909!). È comune la f.m. vivipara nell'alveo del Piave.

253 J. compressus Jacq. Prosp. p. 137 (593. 1719)
I – III. Igrofilo, riparo. Tutta la provincia, dal 1861: Selva, Volpago, Vittorio, Treviso (anche Fracchia e Berengo 1833 Trotter!); Castelfranca, Resana (Béguinot 1909!), Mogliano (Mayer!) – Var. Gerardi (Lois.) Agg. p. 36. Nella bassa provincia un solo saltuario

Volgo: Sea.

p. pr. asolo (Bolz. MS.). Volgo e loc.

254 J. trifidus L. Prosp. p. 137 (594. 1718)
IV–V. Rupestre, pascolivo. Monte Grappa (Montini, Vaccari n. 64)
– Var. Hostii (Tausch) Agg. p. 36 e Prosp. p. 137 (J. castaneus Sacc. non Sm.)
= J. monanthos Jacq. Grappa (Stern. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Vaccari n. 64, Spranzi! Bolzon 1894! Zanardini 1827!); rupi del Cansiglio 1869 (anche Béreng.!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.)

255 J. bufonius L. Prosp. p. 138 (601. 1796).
I–III Igrofilo, ripario, subpalustre. In quasi tutta la provincia, dal 1861: Selva, Giavera, Vittorio, Treviso (anche Fracchia!), Mogliano (Mayer in Bertol.); Asolo, Castelli (Bolz. 1895 herb. Pat.!); Cà Trou (Dratz. 1915!); Valdobbiadene (Favero 1844 herb. Pat.!); Resana (Bég. 1909!); Cansiglio nelle aree carbonarie (Trotter!) – Varia assai nella statura da 4 a 20 cm. secondo i luoghi. – Var. pseudoranarius Bolz. MS. Grappa, sotto il Casòn d'oro (Bolz. MS.)

Luzula DC.

256 L. pilosa (L.) W. Agg. p. 36 (603. 1729)
I–IV. Nemofila, eliofoba. Montello, Cansiglio (anche Béreng. 1838) dal 1869; Asolo (Bolz. MS.) Collatti (Sternb. 1804, n. 59, Vacc. n. 64) – Var. Forsteri (DC.) (1571) Prosp. p. 138. Montello, Vittorio dal 1861; Grappa (Sternb. 1804, n. 59 [Juncus vernus], Spranzi!, Vacc. n. 64)

R. L. flavescens (Host) Gaud. (604. 1837)
IV–V. Nemofila, pascoliva. Grappa (Zanardini 1827 herb!). Gli esemplari lasciano qualche dubbio sulla esattezza della determinazione

R. L. spadicea (All.) DC. (605. 1729)
IV–V Pascoliva, rupestre. Grappa (Spranz. herb.!). La località merita di essere confermata.

257 L. nivea (L.) DC. Prosp. p. 138 (608. 1563)

IV Nemofila, eliofoba. Cansiglio 1867 (anche Dom. Sacc. 1897, Mari!) Asolo (Bolzon 1896!) Monfumo, Castelli (Bolzon n. 6); Valdobbiadene (Sacc. 1870), Grappa (Parolini, Trevisan, Vaccari n. 64) — Var. albida (DC.) Grappa (Montini in Bert., Vacc. n. 64, Zanardini 1827!) — Var. rubella (Hoppe) Grappa (Montini herb.) — Var. livida Rouy. Grappa sopra Possagno e sopra Borso (Bolz. MS.) (Bolz. MS.)

258 L. silvatica (Huds.) Gaud. Prosp. p. 138 (L. maxima DC) (607, 1719)
IV Pascoliva, nemofila. Grappa, Collalti (Parolini in Bert. Sternb. 1804 n° 59, Zanard. 1827!, Bizzoz. 1878! Spranzi!, Vaccari n. 64?, Bolz MS.)

259 L. campestris (L.) DC. Prosp. p. 138 (609. 1551)
I–IV. Nemofila, eliofoba. Montello dal 1861; Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!), Mogliano (Mayer in Bert.), Grappa (Montini in Bert.) Var. pallida Parl. Bosco Cà Tron di Roncade (Fiori 1906!) — Var. congesta (Thuill.) Grappa (Montini, Parol. in Bertoloni [il quale non la distingue dalla sag. var.], Vacc. n. 64. — Var. sudetica (W.) Grappa (Montini herb., Cobau 1906!, Vacc. n. 64) — Var. collina Meyer. Asolo al colle di S. Martino (Bolz. MS.) — Var. multiflora (Les.) Castelcucco e Val Melis del Grappa (Bolz. MS.) Probabilmente taluna di dette varietà confluiscono l'una coll'altra.

260 L. spicata (L.) DC. Prosp. p. 138 (610. 1723)
IV Rupestre, pascoliva. Grappa (Zanardini 1827!, Kellner!, Montini in Bertol., Vacc. n. 64) — Var. conglomerata Mielich. Pascoli della cima di M. Grappa (Bolz. n. 24).

Fam. 17 Liliaceae

Tofieldia Huds.

261 T. calyculata (L.) Wahlenb. Prosp. p. 136 (613. 1595)
II–IV. Igrofila, pascoliva, subpalustre. Falzè, Ciano, Covolo, Cornuda, Vittorio, Cansiglio (anche D. Sacc. 1897) dal 1862; Grappa (Cobau 1905!), Bocchette del Bocaor (C. Mass. 1877 herb. pat.!) — Var. capitata (Hoppe). Cornuda, Fregona, Cansiglio, 1869 — Var. collina (Schult.) Bosco di Fagarèa pr. Cornuda (Bolzon in lett. 1910) — fm. ramosa Hoppe (teratol.). Conegliano ~~1862~~ (Bérenger 1842!) — Lo Sternberg n. 59 indica pel Grappa l'Helonias borealis (= Tofieldia palustris Huds.) che assai probabilmente non è se non la var. capitata della T. calyculata.

Veratrum Linn.

262 V. album L. Prosp. p. 136 e. p. (615. 1415. R.)
III – IV Nemofilo, eliofobo. Colli di Vittorio e Cansiglio 1869-1912; Crespan (Montini in Bertol.); Grappa (Bolz. MS. Zanardini herb.! Sternb. 1803 n. 59). S'incontra per lo più nella var. Lobelianum (Bernh.)

263 V. nigrum L. Agg. p. 36, Prosp. p. 136 (V. album e. p.) (616. 1550)
II – III. Nemofilo, eliofobo. Vallate del Montello e di Cornuda, raro, 1870 (anche Fr. Sacc. 1890!); Grappa (Zanardini!); ai confini verso il Bassanese (Ball, 1868!, Alpine Guide).

Colchicum (Tourn.) Linn.

264 C. autumnale L. Prosp. p. 136 (620. 1415. R)
I – IV Pascolivo, Pratense, eliofobo. Tutta la provincia comune... dal 1860. Pederobba (Beg. 1909!), Asolano (Zanard. 1827! Bolz. MS.). Var. vernale (Hoffm.). Cozzuolo nel luogo detto Val di Scofa, a 100 m., rarissi. Apr. 1897 (Pamp. n. 44). Qui spetta quasi per certo il C. alpinum DC. (Pamp. in De Toni, n. 29 p. 24) rinvenuto a S. Lorenzo di Vittorio nel Marzo 1897 – Var. albiflorum Fiori, Colli intorno a Vittorio, p. e. S. Lorenzo (Trotter 1916!) Var. breviflorum Bolz. Montagnon di Masèr (Bolz. MS.)

Vulgo: Fior della brosa (brina) e Porata e Buàcoi (quando porta foglie e frutti)

Erythronium Linn.

265 E. Dens-canis L. Prosp. p. 134. (623. 1550)
II – III Nemofilo, eliofobo. Montello specialmente nei luoghi detti del Forame, Padovana, Strada nova... dal 1861; Asolo e Soligo (Bolzon n. 11) e alle radici del Grappa (Bolz. MS.) – Vulgo: Dente de can.

Tulipa Linn.

C. T. Clusiana DC. Agg. p. 35. (626. D'origine siriaca e persiana, coltivata e naturalizzata qua e là: erboli a Selva; S. Vito presso Asolo (Montini!). Vulgo: Dulipan.

C. T. Gesneriana L. Prosp. p. 133 (629. D'origine asiatica, coltivata comunemente qua e là in tutta la provincia. Vulgo. Dulipan. Duripan

Lilium (Tourn.) Linn.

C L. candidum L. Prosp. p. 133 (635. 1415. R)

I–III. D'origine orientale, coltivata assai spesso e qua e là subspontanea. Vulgo Gilgio, Gilio.

266 L. bulbiferum L. Prosp. p. 133 (636. 1551. R.)

II–IV Nemofilo, eliofobo. Montello verso il Piave, raro (anche Ant. Sacc. 1890!); Monfenera sopra ~~Valdobbiadene~~ Pederobba 1860; Cornuda, ~~sopra~~ colli di Vittorio 1870; M. Croce presso Vittorio (Stur. n. 61); Valdobbiadene 1870; Grappa (Vaccari n. 64)

267 L. Martagon L. Prosp. p. 134 (637. 1415)

III–IV. Nemofilo, pascolivo. Monfenera, collina di Cornuda; Cansiglio (anche Dom. Sacc.!); Grappa (Bizzoz.! Vaccari n. 64, Bolz. MS.)

268 L. pomponium L. (638. 1785 R.). Var. carniolicum (Bernh.). Prosp. p. 134 (L. chalcedonicum Sacc. non L.)

IV Rupestre, eliofobo. M. Crep sopra Miane e sopra Follina (Bérenger!, Fracchia!); Torena al passo di S. Boldo ~~Pamp.~~ e Montagne di Lago Revine (Pamp. n. 38).

Gagea Salisb.

269 G. lutea (L.) Ker Agg. p. 35. (642. 1745)

III–IV Nemofila. Cason del Sol (cima del Grappa) (Art. Ross. in herb. Pat!); M. Oro del Grappa (Vacc. in Bolz. n. 12 e n. 64), monti sopra Tarzo Pamp. in Bolz. n. 12) — Var. australis Lindem. Premaor di Miane (Pamp. in Bolz. n. 24 ~~herb.~~!)

270 G. arvensis (Pers.) Dum. Prosp. p. 134. (647. 1532)

I–III. Campestre. Selva al luogo detto le casette 1861; Madonna del Rovere pr. Treviso (G. Venturi 1866 in herb. Sacc.!); Pieve di Soligo (Pamp. in Bolzon n. 72); fra Riese e S. Vito d'Asolo (Bolz. MS.)

Ornithogalum (Tourn.) Linn.

271 O. umbellatum L. Prop. p. 134 (652. 1415. R)
I – III Campestre, marginale. Tutta la provincia ~~dal 1858~~ ... Selva, Volpago, Montello, Vittorio ... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.) – Vulgo: Agio mato, Ai mat.

C. O. narbonense L. Prosp. p. 134 (~~1550~~ 655. 1550)
II – III Campestre, pratense. Agro trevigiano (Mayer in Bertol.); Grappa (Montini ~~[illegible]~~ herb.). Specie da confermare; forse si tratta di una forma della seguente.

272 O. pyrenaicum L. Agg. p. 35 (656. 1550)
II – III Pratense, ripario. Vittorio lungo il Meschio presso Via Cavallotti, 1906; lungo la ferrovia Conegliano-Vittorio (~~Pamp. in Bolzon n. 12~~) e monti sopra Revine, Lago di Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 23); Collalti (Montini!, Zanardini 1827!); Grappa (Bolz. MS.)

Scilla Linn.

273 S. bifolia L. Prosp. p. 134 (665. 1550)
II – IV. Nemofila, eliofoba. Montello dal 1859; Valdobbiadene (Béreng. 1844!), Crespignaga, Castelcucco, Bouaor alle Teze (Bolz. n. ~~[illegible]~~ 10 e 11) – Var. albiflora Pamp. Millifert al Cansiglio (Pamp. n. 36)

CA S. ~~non-scripta~~ hispanica Mill. ~~[illegible]~~ (668.). Oriunda di Spagna ~~[illegible]~~, coltivata ~~[illegible]~~ e talora inselvatichita, come in qualche vigna presso Asolo (Bolzon ~~[illegible]~~ n. 24 e 25).

Hyacinthus (Tourn.) Linn.

CA H. orientalis L. Prosp. p. 135. (669) Di origine asiatica coltivato fino dall'era romana ed ora subspontanea qua e là, come a Rolle, Pieve di Soligo (Pamp. in Bolzon n. 12 o MS.), a Vittorio, Selva, Treviso ... 1861.

Muscari (Tourn.) Mill.

274 M. comosum (L.) Mill. Prosp. p. 136 (676. 1551. R)
I – III. Campestre, marginale, ripario. Tutta la provincia ~~dal 1861~~: Selva, Treviso, Vittorio, Conegliano, Nervesa... dal 1861

275 M. racemosum (L.) Mill. Prosp. p. 136 (680. 1583)
I – III. Campestre, marginale. Tutta la provincia ~~dal 1861~~: Selva, Treviso, Vittorio... dal 1861; Grappa (Sternb. 1804, n. 59) – Vulgo: Bocaletti.

276 M. botryoides (L.) Mill. Agg. p. 36 (681. 1640)
I – III Campestre, marginale, crastofilo. Spresiano e Vittorio 1868; Revine-Lago (Pamp. in Bolz. n. 12); Collalto (Montini, Vacc.ⁿ 64)

Allium (Tourn.) Linn.

C A. sativum L. Prosp. p. 135 (1415. R.) Oriundo dell'Asia centr. ma da secoli coltivato e spesso subspontaneo. Vulgo: Ajo, Agio; rust. Ai.

C A. ampeloprasum L. ~~Prosp. p. 135~~ (685. 1583 R) Var. Porrum (L.) Coltivato da secoli; il tipo è spontaneo in più luoghi dell'Italia spec.ᵗᵉ meridionale. Vulgo: Agio, ajo, Ai, Poro.

277 A. vineale L. Agg. p. 35 (688. 1583)
I – II. Campestre, segetale. Volpago, Selva, Nervesa... dal 1867; Castello di Godego (Béguinot, 1909!)

278 A. sphaerocephalum L. Prosp. p. 135 (689. 1415)
I – III Pascolivo, rupestre. Colli di Vittorio (Fiori 1899 herb. Pat.!); colli di Romano, Borso ecc. (Montini in Bertol.)

279 A. carinatum L. Prosp. p. 135 (691. 1785)
I – IV Sepincolo, dumale, sassicolo. Selva, Cornuda, Pederobba, Monte belluna (anche Fr. Sacc. 1894!); Cansiglio 1100 m. (Dom. Sacc. ~~[illegible]~~, 1897!); Grappa (Bolz. ms.) – Var. pulchellum (G. Don) Prosp. p. 135 (A. montanum Sibth.). Colli di Cornuda, Masér, Pederobba dal 1861; presso Asolo (Bolz. ms.) – Agio mato, Ai mat e così le specie comuni affini.

280 ~~Allium~~ oleraceum L. Prosp. p. 135 (692. 1804)
I–III Sepinculo, elsofobo. Selva, Giavera, Barbaria, 1863, 1912 – Var. paniculatum (L.) Rupestre sotto le Rocce d. Cornuda (anche Trotter!), (Bolz. MS.); anche Pederobba, Serravalle d. Vittorio dal 1861 – Fm. longipathum (Red.) Rupi lungo il Piave presso Segusino (Bolzon, n. 11); M. Baccisca pr. Asolo (Bolz. MS.) – Volgo Agio matto.

C A. fistulosum L. (697 R) ~~Coltivato dall'era romana~~ – Oriundo di Siberia; coltivato ab antico. Orti d. Vittorio. Var. viviparum: prolifico in corimbo abeunte. Frammisto al tipo a Vittorio.

C A. Cepa L. Prosp. p. 135. (698. R.) Oriundo d. Persia, coltivato ab antico. E tutte le provincie coltivato e qua e là subspontaneo. Volgo Zaola, Zevoline Zevolini (le giovani piante)

C A. ascalonicum L. Prosp. p. 135 (699. R.). Probabilmente oriundo di Palestine. Coltivato ab antico. Volgo: Zeola scalogna.

281 A. Schoenoprasum L. Prosp. p. 135 (700. 1562)
IV Rupestre. Grappa (Sterns. 1806 n. 59) presso il Grappa (Zanard!) Secondo il Parl. n. 64 la forma del Grappa dovrebbe essere la Var. alpinum DC. La specie si coltiva abbastanza frequentemente nelle orte ghe d. Treviso. Volgo Cipolline, Zepoline.

282 A. angulosum L. Prosp. p. 135 (A. fallax Don) (703. 1726)
II–IV. Rupestre. Juv. Serravalle d. Vittorio dal 1861, M. S. Augusta d. Serravalle 1870 (anche Bérenger 1846!); M. Cudinione e M. Mon fenera; greto del Piave (Micio, n. 35)

283 A. Guaresbeny Jacq. (705) var. ochroleucum (W. K.) Ags. p. 35
III–IV Rupestre, sepinculo. Rupi lungo il Piave a Covolo (1864); sopra Vittorio (anche F. Sacc.! e Pamp. 40); S. Floriano (Trotter!) Fadalto, Nove, Valdobbiadene (Bérenger 1842!); greto del Piave (Micio, n. 35); col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.)

284 Allium ursinum L. Prosp. p. 135 (712. 1569)
II–IV. Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello, comune sulle vallate dal 1859 ..., Vittorio 1866; Asolano (Zanardini 1827!); Monfumo, Castelli, Cavaso, Asolo (Bolzon n. 11). Vulgo: Agio de can, Ai de can.

Asphodelus Linn.

285 A. ramosus L. (716. 1789. R). Var. albus (L.) (1415).
III–IV Pascolivo, pratense. M. Endimione sopra Valdobbiadene 1862; Monfenera sopra Possagno (A. Rossi, 1874!); M. Ardosa sopra Crespan 1827 Zanard.!); monti di Follina (Béreng. 1843!); monti intorno Vittorio (Pamp. n. 38).

Asphodeline Reichenb.

C A. lutea (L.) Reichenb. Prosp. p. 134 (Asphodelus) (718. 1505)
Oriunda dell'Italia merid. Coltivasi qua e là come a Treviso ~~(Trombini)~~ nel Conglianese (Contarini 1825!) e Cenedese (Fracchia!) e pare che talora trovisi anche avventizia. L. 1864; Vulgo: Sparesi Faraoni.

Paradisia Mazzuc.

286 P. Liliastrum (L.) Bertol. Prosp. p. 134 (720. 1565)
IV–V. Pascoliva, pratense. Grappa (Zanardini!, Montini, Spranzi!) sopra Follina (Béreng. 1843!); M. Tavergheza sopra Fadalto 700 m. (Pamp. Fl. it. exs. n. 759);

Anthericum Linn.

287 A. ramosum L. Prosp. p. 134 (722. 1550)
I–IV Pratense, pascolivo, rupestre. Camato, Paderno, Cornuda, Montello, Susegana, Vittorio ... dal 1861; Fais sopra Serravalle (Contarini, 1825!); colli Asolani (Zanardini, 1827!); Pederobba (Béguinot 1909!).

Hemerocallis Linn.

CA H. flava L. Agg. p. 35 (724. 1550). Originaria dell'Ungheria fino alla Siberia. Coltivata e spesso avventizia lungo le acque p. e. a Motta; presso il Piave a Pederobba e lungo le Siepi fra Castel di Godego e Castelfranco (Béguinot, 1909!) – ~~Vulgo Gilio o Gilgio de S. Giuseppe~~

CA H. fulva L. Prosp. p. 135 (725. 1563). Oriunda come la precedente e coltivata e inselvatichita lungo i fossati a Selva, nel Montello nel luogo detto Ai Frati, 1864. Vulgo: Gilgio o Gilio de S. Giuseppe.

Paris Linn.

288 P. quadrifolia L. Prosp. p. 132 (727. 1532)
II – IV. Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, specialmente nei luoghi detti Forame e Tavaràn dal 1861; colli di Vittorio; Cansiglio (Contarini 1825! D. Sacc. 1897!, Mari 33; Asolo, Monfenera, Bocaon (Bolzon n. 11, 12); Valdobbiadene (Favero!)

Convallaria Linn.

289 C. majalis L. Prosp. p. 133 (728. 1550)
II – III Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello nelle vallate, rara, 1861; Vittorio a S. Lorenzo m. 365 (Pamp.n 44) Coltivasi comunemente e spesso s'incontra inselvatichita. Vulgo: Malgarète, Malgaritine, Lilo.

Ophiopogon ~~japon~~ Ait.

C O. japonicus (L.) Curt. (728 A. 1812). Originario del Giappone, coltivasi nei giardini assai frequentemente e talora trovasi inselvatichito. Vulgo: Convallaria. – Oltre a questo si coltivano comunemente nei giardini per ornamento: Funkia subcordata Spreng. (Giappone) (725. A); Agapanthus africanus (L.) Hoffgg. (Capo di B. S.) (725. B); Yucca gloriosa L. (Amer. merid.) (725. C). Vulgo: Giuca.

Majanthemum Web.

290 M. bifolium (L.) DC. Prosp. p. 133 (729. 1565)
III – IV. Rupestre, nemofilo, Colline di Cornuda 1861; bosco Cansiglio, 1869; sopra Valdobbiadene e Follina (Pamp. in Bolzon n. 12) M. Endimione (Bolz. 1895 herb. Pat.!); Grappa al Cason del Sol Brigg. 1858 herb. Pat.!; Grappa (Stern. 1804, n. 59 – Fm. bipartitum Bolz. M. Endimione sopra Valdobbiadene (Bolzon n. 26)

Streptopus Rich.

R. S. amplexifolius DC. (730. 1554)
IV. Rupestre, igrofilo, eliofobo. Grappa (Spranzi h. Pat.!, Bolzon n. 16) – La località deve essere riconfermata.

Polygonatum (Tourn.) Adans.

291 P. verticillatum (L.) All. Agg. p. 35 (731. 1563)
IV. Nemofilo, eliofobo. Bosco Cansiglio, alt. 1100 m., 1869 (anche Pamp. e Dom. Sacc.!); M. Grappa (Spranzi!) e Bolzon MS.)

292 P. multiflorum (L.) All. Prosp. p. 132 (sub Convall. latifolia Sacc. non Jacq.)
II – III Nemofilo, eliofobo. Montello, frequente, dal 1861 (anche Dom. Sacc. 1890!); Castelli d'Asolo (Bolz. MS.)

293 P. officinale All. Prosp. p. 132 (Convall. Polygonatum L.) (733. 1415)
II – III. Nemofilo, eliofobo. colli di Cornuda, ~~colle~~ colli e monti intorno a Vittorio, dal 1868. E' dubbia l'indicazione pel Montello, mentre n'è comune il precedente.

Asparagus (Tourn.) Lwin.

294 A. tenuifolius Lam. Prosp. p. 132 (734. 1550)
II Nemofilo, sepincolo, eliofobo. Montello, specialmente nel lato del Piave dal 1867 (anche Kellr. 1840!); colli di Cornuda e Vittorio 1864; S. Floriano fra le siepi (Fracchia!); Pederobba, Ponte di Piave, Zenson, lungo il Piave (Béguin. 1909!); Salgareda (Contarini, 1825!); Asolo e Coppuolo (Bolz. e Pamp. MS.)

295 A. officinalis L. Prosp. p. 132 (735. 1415. R)
I - III Sepincolo, ortivo, ripario. Presso il Grappa (Sternb. 1803, n. 59); siepi e lungo i fossati a Pederiva ~~1860~~, anche nel Montello, raro dal 1861; siepi di Ponte di Piave (Béguinot, 1909!). E' dubbio se in detti luoghi sia veramente spontaneo, o solo inselvatichito, essendo comunemente coltivato e le bacche di facile trasporto per mezzo degli uccelli. Vulgo: Spareso, Sparesi.

296 A. acutifolius L. Agg. p. 35 (736. 1532. R).
III Sepincolo, dumale. Costalunga presso Asolo (Parolini); Collalti (Sternb. 1804, n. 59)

Ruscus (Tourn.) Linn.

297 R. aculeatus L. Prosp. p. 133. (740. 1415. R.)
II - IV Nemofilo, sepincolo, dumale. Comune nel Montello e in quasi tutti i colli e monti, dal 1861. Var. lanceolatus Sacc. Agg. p. 35 ~~Var~~ B. Montello, 1871, raro; Targo fra le siepi (Parup. n. 36); radici del Grappa presso S. Andrea (Bolz. MS.) ; Asolo e Grappa (Bolz. MS.) - Vulgo: Rust, Rusto.

A R. Hypophyllum L. (741. 1415. R.)
II - III Sepincolo, nemofilo. Onigo (Favaro herb.) forse avventizio. Var. Hypoglossum (L.). Siepi presso Valdobbiadene (Béreng. 1842!) Dubito che questo pure sia da aversi come avventizio.

CA R. racemosus L. Prosp. p. 133 (741. 1678) Delle isole del Mare Egeo si coltiva talora nei giardini e fu rinvenuto inselvatichito in qualche siepe a Treviso, 1862.

Fam. 18 Dioscoreaceae

Tamus Linn.

298 T. communis L. Prosp. p. 133 (743. 1415. R.) (anche Kellner 1841!)
II - III. Nemofilo, eliofobo. Montello, Cornuda, Valdobbiadene (anche Favero 1842!), dal 1861, Selva e Treviso fra le siepi, raro; Pederobba (Béguinot, 1909!) - Vulgo: Tambar

Fam. 19 Amaryllidaceae

Galanthus Linn.

299 G. nivalis L. Prosp. p. 132 (744. 1571)
II-III. Nemofilo, eliofobo. Montello nel luogo detto ai Frati, raro, 1861; monte Praderadego di Cison (Pamp. n. 32 e in Fl. ital. ex S. n. 761) - Vulgo: Bucaneve.

Leucojum Linn.

300 L. aestivum L. Prosp. p. 132 (745. 1550)
I Palustre o subpalustre. Presso Treviso alla Marasana (Mayer in Bertol.)

301 L. vernum L. Prosp. p. 132 (746. 1550)
II-IV. Nemofilo, eliofobo. Montello, frequente, dal 1859, M. Monfenera 1862; Asolo, Castelli, Monfumo (Bolz. n. 10, 11) Miane (Pamp. in Bolz. MS.)

Sternbergia W. et K.

C S. lutea (L.) Ker-Gawl. (750. 1532)
Spontanea nella regione mediterranea; coltivata frequentemente a Vittorio, Selva e talora quasi naturalizzata.

Narcissus (Tourn.) Linn.

CA N. Jonquilla L. Prosp. p. 132 (753. 1565)
Spontaneo forse solo nella Spagna; coltivato frequentemente anche nel Trevigiano e talora ~~inselvatichito~~ subspontaneo, come a Selva, Treviso, Vittorio Vulgo: Giunchiglie, giunchirle (rust.)

CA N. Tazzetta L. ex p. Prosp. p. 132 (755. 1550)
Dell'Italia centr. e mediterr. Coltivato frequentemente a Selva, Volpago, Treviso, Vittorio e spesso subspontaneo; a Rolle pr. Pieve di Soligo (Pamp. in Bolz. MS.) (1858)

N. dubius Gouan (756) Var. Barlae (Parlat.) (= N. albulus Lev.)
II-III Asolo lungo la strada maestra di Pagnano, rariss. (Bolz. n. 8, 11) Anzano (Pamp. in Bolz. n. 14)

302 N. poëticus L. Prosp. p. 131 (757. 1550. R.)
I–III Campestre, pratense, nemofilo. Montello nel luogo detto ai Frati 1861; Monfenera 1862 (anche Béreng!); sopra Targo (Pamp. in Bolzon n. 12); sopra Crespan e nel Monfenera (Bolz. n. 11); appiè del Grappa (Sternb. 1804 n. 59 Fiori 1897!) – Var. radiiflorus (Salisb.) Presso il Grappa (Zanard. 1827!, Bolz. ms.) Fm. pollinensis N. Terr. Monti di Revino – Lago (Vittorio) rariss. insieme al tipo (Pamp. n. 36) – Var. biflorus Curt. (N. poeticus × Tazzetta) Selva, quasi spontaneo 1868; Prati di Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 12 e n. 44) – Var incomparabilis Mill. (N. Pseudonarcissus × poëticus) Coltivato e subspontaneo nei prati a Selva 1868; vigne presso Asolo e Castelli (Bolz. n. 11); Colle Umberto (Pamp. in De Toni n. 29) – Vulgo: Narziso, Narzisi (quasi tutte le specie e var. coltivate)

Agave Linn
2 C A. americana L. Agg. (761. 1561) Dell'America centr. coltivata frequentemente; talora anche fiorisce all'aperto nelle buone esposizioni, come a Masèr (villa Giacomelli) – Vulgo: Àgave e anche Aloe.

CA 1 N. Pseudonarcissus L. Prosp. p. 131 (758. 1532. R.)
Dell'Europa occid., ma coltivato e subspontaneo in tutta Italia e così nel Montello nel luogo detto ai Frati 1862, a Selva, Vittorio, Treviso ...; vigne di S. Martino presso Pagnano (Bolz. n. 10). Vulgo: Steloni gali.

Fam. 20 Iridaceae

Crocus (Tourn.) Linn.
303 C. biflorus Mill. Prosp. p. 131 (C. vernus Sacc., non L.) (762. 1583)
I–III. Pascolivo, pratense. Prati sterili a Visnadello (Spresiano) 1862.

304 C. vernus L. Prosp. p. 131 (C. vernus β grandiflorus Sacc.)
I–III Pascolivo, pratense. Prati di Fregona, 1863 – Var. albiflorus Kit. In valle Boccaor del Grappa (Bolz. MS.)

Iris (Tourn.) Linn.

305 I. germanica L. Prosp. p. 131 (777. 1415 R.)
I – III Rupestre, murale. colli di Colfosco, muraglie del Castello S. Salvatore di Susegana, di Vittorio ecc. dal 1861. Coltivasi anche comunemente. Vulgo. Spadon de S. Piero, Spade.

C I. pallida Lam. (776. 1858)
I – III Qua e là spontanea in Italia; largamente coltivata a Formeniga pei rizomi (Pamp. in Bolz. MS.)

306 I. Cengialti Ambrosi fm. Veneta Pamp. N. 41 bis
III Rupestre. ~~[illegible]~~ Passo di S. Boldo, di Vittorio, 1909 (Pamp. n. 41 bis e in Vaccari Pl. ital. crit. n. 229)

307 I. Pseudacorus L. Prosp. p. 131 (782, 1415 R.)
I – III Riparia, igrofila. Fossati a Selva, Volpago, Falzè, Treviso, Melma, Roncade, Biancade, dal 1862.

308 I. foetidissima L. Agg. p. 34 (783. 1550)
I – III Igrofila, subpalustre Bagajolo presso Roncade 1866; subspontanea a Vittorio 1896.

309 I. graminea L. Prosp. p. 131 (786. 1532)
I – III Rupestre, pratense. Colli di Colfosco, Cornuda, Possagno dal 1862; presso Nervesa (Kellner 1840!); Asolo verso S. Giorgio e Maser (Bolzon, n. 11); S. Lorenzo e Cozzuolo (Pamp. n. 44); presso i Collalti e il Grappa (Zanard. 1827; Sternb. 1804, n. 59) bosco Cà Trone (Fiori 1896!) Vulgo: Fior d'armelin, Bolz. MS.

310 I. sibirica L. (784. 1789)
III Pratense, igrofila. Prati di Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 11 e in Fl. ital. exs. n. 417 e n. 32)

Hermodactylus (Tourn.) Adans.
C A. H. tuberosus (L.) Mill. (792. 1565)
III Igrofilo, eliofobo. Originaria della regione mediterranea, avventizio e naturalizzato ad Asolo (Bolzon n. 23 27) presso la Torretta di Browning

Gladiolus (Tourn.) Linn.

311 G. paluster Gaud. Agg. p. 34. (793. 1726)
III – IV Pascolivo, igrofilo, subpalustre. Vittorio a Costa 1867; a Cornuda 1870; Cozzuolo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 772); Follina (Bérenger, 1843!); Frontale di Crespan (Zanardini 1827!); Grappa (Parolini herb.)

312 G. imbricatus L. (794. 1844)
II – III. Igrofilo, crastofilo. Bosco di Fagarè; Castelli d'Asolo, 18. VII. 1895 (Bolz. MS.)

313 G. segetum Ker-Gawl. Prosp. p. 131 (G. communis L. e. p.) (795. 1550)
I – III Campestre, ripario. Selva, Volpago, Cornuda, Pezzan... dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.); Crespano (Montini 1846! herb. Sacc.)

Fam. 21 Orchidaceae

Ophrys Linn.

314 O. aranifera Huds. Prosp. p. 129 (800. 1550)
I – III Pratense, pascoliva. Selva, Volpago, Camalò, Montello dal 1861; Carbonera (Fracchia!); Mogliano (Mayer in Bertol.) – Var. subfucifera Rchb. Montagnon di Maser (Bolz. MS.)

315 O. apifera Huds. Prosp. p. 130 (802. 1553)
II – IV Pascoliva, pratense. Colfosco alle Tombola, Serravalle di Vittorio, Monfenera... dal 1862; Conegliano (Béreng. 1842!); Susegana (Fracchia!).

316 O. integra Sacc. Agg. p. 33. (802 x)
III Pratense. Colfosco alle Tombola 1871, parcamente (Fu trovata dal Gelmi anche presso Trento). Pare un ibrido (Ophrys X Serapias? (Sacc.) o una deformazione fissata di O. apifera? (Murr)

317 O. Bertolonii Moretti Agg. p. 33 (803. 1532)
III Pratense, pascoliva. Colfosco alle Tombola, 1866; Susegana (Fracchia!); Asolo, a Castelli, rarissima, a Maser (Bolzon, n 12 MS.); Spresiano (Contarini!)

318 O. arachnites (L.) Lam. Prosp. p. 130 (804. 1754)
I–III. Pratense, pascoliva. Spresiano (Contarini 1825!, Fracchia, Gust. Venturi!); Nervesa 1866 (anche Kellner 1840!); Mogliano (Mayer in Bertoloni); colli intorno Asolo (Zanardini 1827!) Valle di S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59)

319 O. myodes (L.) Jacq. (808, 1776)
III Pascoliva, nemorale. Colli di Asolo, Castelli, Masér, Crespan (Bolzon n. 11); presso Asolo (Zanardini 1827!); alle radici del Grappa sopra Crespano (Bolz. MS.)

Serapias Linn. (S. Lingua L. e. p.) Agg. p. 33 (S. Pseudocordigera Moric.)

320 S. ~~Lingua~~ longipetala (Tenore) Pollini. Prosp. p. 130. (810, 1553).
I–III Pratense, pascoliva, igrofila. Selva, Giavera, Mogliano, Treviso (anche Mayer in Bert. ~~Spresiano~~ e Béringer 1841!), Vittorio... dal 1862, Castello S. Salvatore di Susegana (Kellner!); colli di Asolo Bolzon n. 11); Pederobba, Resana (Béguinot 1909!)

Orchis (Tourn.) Linn.

321 O. papilionacea L. Prosp. p. 129 (O. rubra All.) (817. 1553)
I–III Pratense. Presso Treviso, Paderno, S. Palè (anche G. Venturi 1862!); Valdobbiadene (Favero in herb. Sacc.!); colli di Susegana (Kellner 1844!); Cozzuolo di Vittorio (Pamp. n. 44); colli di S. Martino a Sessét e di Maser (Bolz. MS.)

322 O. Morio L. Prosp. p. 128 (818, 1550. R).
I–III. Pratense. Selva, Camalò, Giavera, Volpago, Vittorio... dal 1862; Treviso (Fracchia!), Cavaso, Asolo (Bolzon n. 11) – Var. alba. Colli di Asolo e Castelli (Bolz. n. 11); Caldieron, Cozzuolo, S. Lorenzo (Pampanini n. 36) – Var. variegata Caldieron, S. Lorenzo (Pamp. n. 36); ~~Castelli di Mafano~~ Castelli di Monfumo (Bolz. n. 11)

323 O. coriophora L. Prosp. p. 128 (821. 1745)
I – III. Pratense, pascoliva. Selva, Volpago, S. Palè, Preganziol, Nervesa, Vittorio .... Dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.); Conegliano (Bracht!) – Var. fragrans (Poll.) Colli di Vittorio 1905!, Grappa (Sprenger herb. Pat!).

324 O. ustulata L. Prosp. p. 128 (822. 1745)
I – III Pratense, pascoliva. Selva, Bavaria, Nervesa (anche Kalbra 1821!), Vittorio, bosco Montello .. Dal 1862; Asolo e Crespan (Bolzon n. 11); Grappa (Art. Rossi 1880!), M. Ardosa sopra Crespan (Zanardini 1827!).

325 O. Dietrichiana Rogenh. (O. ustulata × tridentata) (823 A. 1896)
III. Pascoliva, pratense. Colli di Mondragon pr. Corbanese, insieme ai parenti (Pampanini, n. 36)

326 O. tridentata Scop. Prosp. p. 128 (O. variegata All.) (823. 1627)
I – III Pratense, pascoliva. Selva, Bavaria, Nervesa, Montello, Vittorio, S. Palè .... Dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.); Colli di Asolo (Zanard. 1827, Bolzon n. 11); var alba. Asolo, rarissima (Bolz. n. 11)

327 O. purpurea Hudt. (826. 1532)
III Pratense, nemopla. Colli del Montello di Nervesa, rarissima (Bolz. n. 11)

328 O. militaris L. ex p. Prosp. p. 128 (825. 1532)
II – III Nemopla, pratense. Montello nei luoghi più elevati, 1861; nel Montello verso il Piave (Béreng.!); Vittorio, 1868; Asolo, Monfumo, Castelli, Crespan (Bolzon, n. 11); Caldiero pr. Vittorio (Pampanini n. 36).

329 O. tephrosanthos Vill. (O. simia Lam. e p.) (826. 1550)
III Pratense, nemopla. Colli asolani (Bolzon, n. 12)

330 O. pyramidalis L. Prosp. p. 129 (Anacamptis pyr.) (828. 1415)
I–III Pratense, pascoliva. Selve, Camatò, S. Palè, Pederobba, Vittorio... dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.); Cansiglio (D. Sacc.!); colli asolani (Zanard. 1827! Bolzon n. 11); Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Bizzoz. h. Pat!); Ponte di Piave (Bég. 1909!) — Var. bicolor Sacc. Agg. p. 33. Prati di Nervesa.

331 O. globosa L. Prosp. p. 128 (829. 1745)
IV–V. Pascoliva, nemofila. Grappa (Zanard. 1827!; Sternb. 1804 n. 59; G. Montini!); Collalti (Dom. Montini!); Passo di S. Uboldo (Boldo), Torena (Pamp. Fl. ital. exsicc. n. 420); M. Archesòn del Grappa e M. Piz sopra Possagno (Bolz. MS.)

332 O. laxiflora Lam. Prosp. p. 129 (831. 1550)
I Pratense, subpalustre. Mogliano (Mayer in Bertol.), presso Roncade 1866.

333 O. mascula L. Prosp. p. 128 (833. 1550)
I–III. Pratense, igrofila, nemofila. Montello, Colfosco... dal 1862; presso Treviso lungo il Sile? (Fracchia); Asolo, Masèr, e Val Manera sopra Cavaso (Bolz. n. 11) — Var. fallax Cam. ex Rouy. Val Boccaor del Grappa presso S. Andrea (Bolz. MS.)

334 O. pallens L. P (836. 1745)
IV Nemofila, pascoliva. M. Ardosa sopra Crespan (Zanardini 1827. 1829), Grappa (Stern. 1804 n. 59); sopra Fietta nel Grappa (Bolz. MS.)

335 O. sambucina L. Prosp. p. 128 (837. 1745)
IV–V. Pratense, nemofila. Grappa (Sternb. 1804 n. 59 [O. latifolia fl. luteis]); M. Sol del Grappa (Art. Rossi 1879!); M. Monfenera (Bolzon 1895!); M. Ardosa sopra Crespan (Zanard. 1827!); Cisòn sul Col de Moi e boschi pr. Susegana alt. 82 (Pamp. n. 44) — Var. purpurea Koch. Cisòn sul Col de Moi (Pamp. n. 44), Monfenèra, col tipo (Bolz. MS.)

336 O. maculata L. Prosp. p. 129 (839. 1550)
I–IV. Pratense, nemofila. Bosco Montello verso il Piave 1862 (anche Kellner) Asolo, Castelli, Monfumo (Bolzon, n. 11); Grappa (Bizzozero 1878!); Cansiglio (Béranger 1838!) (Boscon sopra Borso (Bolz. MS.)

337 O. latifolia L. Agg. p. 33. (840. 1780)
I–IV. Pratense, igrofila. Prati di S. Palè (Pelagio) e Nervesa 1863 (anche Gust. Venturi!) – Var. angustifolia (Lois.) (= O. Traunsteineri Sant.) Colli di Formeniga (Pamp. in Bolz. n. 23) – Var. incarnata (L.) (1415) Grappa (Zanardini 1829!)

Gymnadenia R. Br.

338 G. albida (L.) Rich. Prosp. p. 129 (841. 1729)
III–V. Pascoliva, igrofila. M. Monfenera, 1862; prese segative sopra Follina (Béranger, 1843!); Cansiglio, 1869; M. Grappa (Montini!, Zanardini 1827!, Bizzoz. 1878!, Bolz. MS.)

339 G. odoratissima (L.) Rich. Prosp. p. 129 (842, 1754)
III–V. Pascoliva, pratense. Colli di Ceneda e Serravalle di Vittorio, 1866, 1903; Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Montini! Spranzi!); Pederobba (Bég. 1909!); Resana al luogo detto il Palù, insieme ad Eriophorum polystachyum v. latifolium e Carex Davalliana. Per quest'ultime località ~~depressa~~ planiziale le tre specie sono certamente eterotopiche, essendo tipicamente monticole – Var. longibracteata: bracteis inferioribus flore subtriplo longioribus; ceteris iisdem. Cansiglio (Béranger!)

340 G. conopsea (L.) R. Br. Prosp. p. 129 (843. 1550)
I–IV. Pratense, pascoliva. Selva, Volpago, Camalò, Montello, Treviso (anche Fracchia!), Vittorio... dal 1861; Asolo (Bolz. n. 11); Cansiglio (Béreng.! Dom. Sacc. 1897); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Bizz. 1878!, Dom. Montini!), Collalt., Solagna (Dom. Mont.!); Resana, Pederobba (Bég. 1909!)

Nigritella Rich.

341 N. nigra (L.) Rchb. Prosp. p. 129 (844. 1565)
IV-V. Pascoliva, ~~agrofila~~ M. Cesèn su Valdobbiadene (Bolz. ms.) Grappa (Sternb. 1807. n. 59; Montini e Parolini in Bertol.; Coban, 1906!, Spranzi! ~~[illegible]~~ Bizz. 1878!, Art. Rossi, 1880!, Zanardini!) — Var. rosea Vis. et Sacc. sopra il Boccaor di Crespan (Montini in Bertol.) — Var. suaveolens (Vill.) Koch exp. Pascoli del Boccaor di Crespan (Parolini herb.)

Platanthera Rich.

342 P. bifolia (L.) Rich. Prosp. p. 129. (845. 1551)
II-IV Nemofila, pascoliva, eliofoba. Montello, Preganziol, Vittorio... dal 1862; colli Asolani (Bolz. n. 11); Monfenera (anche una fm. teratologica 3-calcarata) — Var. montana (Reich.) [= P. chlorantha Cust.]. Colli di Maser e Castelli (Bolzon n. 11. 12), Grappa nei boschi di faggio (Bolz. n. 17)

Coeloglossum Hartm.

343 C. viride (L.) Hartm. Prosp. p. 129 (846. 1745)
IV-V. Pascoliva. Prese legative sopra Follina (Bérenger 1843!); Grappa (Parolini e Montini in Bertol., Bolzon ms.)

Herminium (L.) R. Brown

344 H. Monorchis (L.) R. Br. Prosp. p. 129 (848. 1729)
II-III Pascoliva, pratense. Conegliano (Béreng. 1842!); erbosi lungo il Piave al Ponte della Priula, 1863; S. Palè (Pelagio) (G. Venturi 1862!); Pederobba (Béguinot, 1909!)

Corallorrhiza (Hall.) Lism.

345 C. Neottia Scop. Agg. p. 34 (C. innata R. Br.) (852. 1789)
IV Nemofila, eliofoba. Bosco Cansiglio, assai rara (Bérenger 1846!)

Spiranthes Rich

346 S. aestivalis (Lam.) Rich. Prosp. p. 130 (855. 1726)
I–IV. Igrofila, subpalustre. Quinto, 1863; Conegliano (Bérenger. 1846!) Cozzuolo (Pamparini in Bolz. n. 16 e n. 44.); Cansiglio (Bérenger 1846!)

347 S. autumnalis (Pers.) Rich. Prosp. p. 130 (855. 1696)
I–IV Pratense, pascolivo. Selva, Carnalò, S. Palè, Conegliano, Vittorio ..... dal 1861; asolo, Maser, Cornuda (Bolz. MS.)

Listera R. Br.

348 L. ovata (L.) R. Br. Prosp. p. 130 (856. 1532)
II–IV Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello e alveo del Piave a Falzè ... dal 1862; sieppe a Costa di Vittorio 1894; colli di S. Paolo e altre (Pamp. n. 36), Cozzuolo (Pamp. in De Toni n. 29); colli di Asolo a S. Martino (Zanardini 1827!); Castelli a Cà Balbi (Bolz. n. 11) – Var. bifoliata Bolz. (an bifoliata St. Lag.?). Foggate del Grappa pr. l'osteria del Forcelletto (Bolz. MS. e n. 24) – Var. stenoglotta Peterm. Carbognano presso asolo (Bolz. MS.)

Neottia Linn.

349 N. Nidus-avis (L.) Rich. (858. 1595) e Pamp. in Bolz. n. 15
IV Nemofila. Cansiglio verso il M. Pizzoc (Bérenger 1846!)

Limodorum (Tourn.) Linn.

350 L. abortivum (L.) Sw. Prosp. p. 130 (860. 1550)
III–IV Nemofilo, igrofilo. R. Montello, raro, Caerano .. dal 1861; Montebelluna (Bérenger, 1846!); Asolo (Bolzon. n. 11); bosch. sopra Lago (Pamp. n. 44); Frontal d. Crespan (Martini in Bertol.)

351 Cephalanthera Rich.

C. rubra (L.) Rich. Prosp. p. 130. (861. 1551)
II–V. Nemofilo, eliofobo. Montello, raro; Cansiglio (Mari n. 33); Sieppe (Parolini in Bertol.); Collalto d. Solagna (Martini!)

352 C. ensifolia (Ehrh.) Rich. Prosp. p. 130 (862. 1563)
II – IV Nemofila, eliofoba. Montello dal 1861 (anche Kellner 1840!) Crespan (Montini in Bertol.); Campo al Grappa (Sternb. 1804, n. 59) Asolo, Masèr, Crespan (Bolz. n. 11); Forcal sopra Serravalle di Vittorio (Contarini 1825!); colli Asolani a S. Martino (~~Cont.~~ Zanardini, 1827!) – Var. longifolia Goir. Colli sopra Masèr (Bolzon n. 24)

353 C. pallens (W.) Rich.
IV Nemofila, eliofoba. Castagneti nella valle della Chiesa del Grappa sopra Possagno (Bolzon, n. 14 e 23 sub C. grandiflora Bab.); colli di S. Martino presso Asolo (Zanardini 1827! Bolz. MS.)

354 Epipactis Rich.
E. palustris (L.) Crantz Prosp. p. 130 (864. 1631)
I – III Pratense, subpalustre. Falzè, Nervesa alle Campagnole dal 1860, Serravalle di Vittorio sul M. Altare ... dal ~~1860~~ 1907; Mogliano (Mayer in Bertol.); Valdobbiadene e Conegliano (Bézenger 1842! 1844!); Salgareda (Contarini 1825!); Resana, Pederobba nell'alveo del Piave (Béguinot 1909!); San Martino di Lupari (Bolz. MS.)

355 E. latifolia (L.) All. Prosp. p. 130 (865. 1550)
II – IV. Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello, specialmente al Castellar di Selva 1861; Serravalle di Vittorio, Colfosco, 1864; Carpanè ai confini Asolani (Zanardini!); Cansiglio (Mari n. 33) – Var. rubiginosa (Gaud.). Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Art. Rossi e G. Biggogero 1878!); Cansiglio alt. 1100 (D. Sacc. 1897, Mari n. 33, Bolzon n. 23)
frontal del Grappa (Bolz. MS.)

2ª parte

II Dicotyledones

40

fam. 22 Juglandaceae

Juglans Linn.

356 J. regia L. Prosp. p. 120 (866. 1415 R.)
I – IV. Originaria della Grecia e dell'Asia centrale, coltivata dovunque in provincia e talora avventizia. Volgo: Noghera; noxe, anche (il frutto)

fam. 23 Salicaceae

Salix (Tourn.) Linn.

CA S. babylonica L. Prosp. p. 123 (867. 1935)
I – III igrofilo. Originario dell'Asia centrale e grappone. Coltivato in tutta la provincia, specialmente lungo le acque. Volgo: Salèz piandènt (rustico) Salese piangente.

CA S. alba L. Prosp. p. 122 (868. 1415. R.)
I – IV Ripario, igrofilo. Coltivato in tutta la provincia e qua e là subspontaneo. Volgo: Salgher da late Var. vitellina (L.) Coltivato e subspontaneo, come il tipo. Volgo: Salghèr, Salghèr da strope, Sachèr. Salese.

357 S. fragilis L. Prosp. p. 122 (869. 1785. R.)
I – IV Riparo, igrofilo. Lungo qualche fossato a Salsa e Vittorio. Volgo: Salèz, salghèr sfrasso (fragile)

358 S. triandra L. (870. 1550 R.)
I – III. alveale, igrofilo. Letto del Piave a Covolo, Nervesa 1862 (anche Béreng.); a Ponte di Piave, Zenson, Negrisia (Bég. 1909!) Salgareda al Piave (Contorsini 1825!) – Var. amygdalina (L.) Lungo i fossati a Selva, 1905 e nei Dintorni di Vittorio 1907; presso Portobuffolè (Béreng. 1845!)

359 S. purpurea L. Prosp. p. 122 (872. 1717. R.)
II – IV. Igrofila, alveale, arenicola, riparia. Letto del Piave a Nervesa, Falzè, Covolo, dal 1862; Salgareda, Zenson (Bég. 1909!); riparo a Vittorio e Selva, 1880 – Volgo: Salegher (a Vittorio)

366 *S. vicana* Schrank. Prosp. p. 122 (874. 1769)
II–IV Igrofila, alveale, arenicolo. Letto del Piave in più luoghi dal 1865 (anche Contarina 1825!); Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!); colli di Romano (Gio. Monti!); Grappa (Spreng.!); Serravalle di Vittorio (anche Contar. 1825!); alveo del Piave presso Pederobba (Bég. 1909!)

361 *S. hastata* L. (877. 1785)
IV–V Igrofila, ripetrice, dunale. Rovere sulla punta Nord (Grappa) Lago Cavaso (Bolz. MS.)

CA *S. viminalis* L. (875. 1320)
I–III Originaria dell'Europa centr. e d'Asia, coltivata qua e là. Volgo. Salghèr da stropa.

362 *S. daphnoides* Vill. (876. 1791)
I–IV. Ripario, alveale. Letto del Piave a Bigolino di Valdobbiadene (Minio herb. 1914! e n. 35)

363 *S. phylicifolia* L. (878. 1550)
Var. *nigricans* (Sm.) Prosp. p. 122 (come sp.). IV–V. Igrofila, nemorale. Grappa (Sternb. 1803 n. 59); Boccaor e Borso (Montini in Bertol.) + Var. *eriocarpa* Koch. Collalto (Dom. Montini!) – Var. *glabra* (Scop.). Agg. p. 31. III–V Igrofila, nemorale. Grappa (Montini, Martens in Bertol.); Boccaor (Fiori 1897!); Canigliano, 1867; Vittorio, Ciano, Follina, Miane (Reichenb.!); Montello (Fr. Sacc.!)

364 *S. aurita* L. (879)
Var. *caprea* (L.) (1561). Prosp. p. 122 (c. spec.), q 1–IV. Igrofila, nemorale, alveale, riparia. Quasi tutta la provincia. Treviso, Selva, Vittorio lungo il Piave, Montello dal 1862 – Var. *grandifolia* (Ser.) (1754). Prosp. p. 122. I–IV. Vallate dal Montello dal 1862 (anche Fr. Sacc.!), Selva e lungo il Piave 1890 (Fiori 1897!) IV– Var. *cinerea* (L.) Prosp. p. 122 (c. spec.) I–IV Igrofila, riparia. Treviso, Selva (anche Dom. Sacc.); Ca Tron (Strafp. 1915!); Conegliano e Follina (Bér. 1843!); Canigliano (Dom. Sacc. 1897!); Grappa – Boccaor (Montini in Bertol.), alveo, fm. ordinaria (Gand. Bolz. MS.); fm. obovata Gand. Montagna di Meaè (Bolz. MS.)

Pederobba (Bég. 1909!) X Rocca d'Asolo

Fiumi di Asolo e Maser (Bolz. MS.) fm. lanceifolia Wimm. Grappa (Bolz. MS.)

365 S. repens L. Agg. p. 32 (880. 1745)
I – IV. Igrofilo, alveale, riparia. Alveo del Piave nella sua parte prossima alla foce (Contarini, 1825) verso Cortellazzo (Bég. La vita di piante Lag. Venez.). Probabilmente l'area ove fu raccolta la specie appartiene alla prov. di Venezia. È da notare altresì che da alcuni floristi la specie viene confusa con la S. incana — Var. ambigua (Ehrh.) (S. aurita × repens). Agg. p. 32. IV. M. Grappa (Spranz. e Montini, Vacc. n. 64); colle S. Martino di Asolo a m. 250–300, nel luogo detto Sassèt (Bolz. MS.)

366 S. Myrsinites L. Prosp. p. 123 (882. 1718)
IV Igrofila, rupestre, pascoliva. Grappa (Sternb. 1804, n. 59), Moretti Gio. e D. Montini!; Cansiglio (Béreng.!); Col Vicentin (Pamp. n. 44) — Var. arbuscula (L.) Agg. p. 32 (1754). Grappa (Sternb. 1804 n. 59, Vacc. n. 64, Spranz.!, Montini!, Cobau 1907!) — Var. Waldsteiniana (W.) Koch. Grappa (Montini herb.) — Var. foetida Koch Archeson del Grappa (Bolz. MS.)

367 S. reticulata L. Agg. p. 32. (883, 1742)
IV Rupestre, pascoliva. Grappa (Spranz.!); Cansiglio alla Palantina (Dom. Sau. 1897!) — Var. sericea Andr. Agg. p. 32. Grappa (Spranz., Vacc. n. 64.)

368 S. herbacea L. Agg. p. 32 (884. 1697)
IV–V Rupestre. Grappa (Parolini, Vacc. n. 64)

369 S. retusa L. Prosp. p. 123 (885. 1697)
IV–V. Rupestre, pascoliva. Grappa (Moretti, Montini in Bertol., Sternberg. 1804, n. 59, Spranz.!); Campo del Grappa (Sternb. 1804, n. 59); Col Vicentin (Pamp. n. 44).

Populus (Tourn.) Linn.

370 P. nigra L. Prosp. p. 123 (888. 1415)
I – IV. Igrofilo, ripario, campestre. Tutta la provincia: Selva, Vittorio, Treviso, Valdobbiadene ... Dal 1861; Salgareda (Contar. 1825)
Volgo: Talpon.
Var. italica (Duroi) Prosp. p. 123 (c. spec.). (1745). Coltivato e subspontaneo in tutta la provincia. Volgo: Talpona.

C P. monilifera Ait. (887. 1806)
I – III. Oriundo dell'America sett. Coltivato qua e là.

C P. angulata Ait. (886 A. 1815)
I – III. Oriundo dell'America sett., coltivato qua e là lungo i viali.
Volgo: Talpon de la Carolina o american.

371 P. tremula L. Prosp. p. 123. (888. 1550. R.)
II – IV. Nemorale. Montello, Colfosco, Pederobba, Vittorio, Follina .. Dal 1862. Volgo: Trèmol –

372 P. canescens Sm. (P. alba × tremula) Prosp. 123 (889 A. 1808)
II – IV. Nemorale, sepiario, arenicolo. Montello, Selva, alveo del Piave, Vittorio. – Dal 1862.

373 P. alba L. Prosp. p. 123 (889. 1550 R.)
I – IV Ripario, sepiario, igrofilo. Treviso a Porto, Cornuda, Selva, Vittorio, Mogliano, Dal 1862; Ponte di Piave e Negrisia (Béguinot, 1909!). Volgo: àlber.

Betula (Tourn.) Linn.

374 B. alba L. Prosp. p. 123 (890. 1572. R)
II – IV. Nemorale, ripestre. Comune nei colli e monti intorno a Vittorio (anche Frontera, 1910!); bosco di Fagarè presso Cornuda (Trott. 1906!) raro nelle parti più elevate del Montello, 1862 – Volgo: Beola
Var. verrucosa (Ehrh.). Bosco presso il Colle di S. Boldo (Campanini herb. 1903!)

Alnus (Tourn.) Gaertn. (892. 1532)

375 A. Alno-Betula (Ehrh.) Hart. Prosp. p. 123 (A. viridis (Chaix) DC.)
IV. Nemorale, igrofilo. Monti sopra Valdobbiadene, 1870; bosco Cansiglio (anche Béreng.!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Montini!, Vaccari n. 64)

376 A. glutinosa (L.) Gaertn. Prosp. p. 123 (893. 1415. R.)
I – IV. Igrofilo, ripario, nemorale. In quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Vittorio, Treviso .. dal 1862; Ponte di Piave e Salgareda (Bég. 1909!). Vulgo: Onèr, onèra (al Montello), Arnèr o Arnèr negro (Vittorio) – Var. pubescens Tausch (893 B. 1898) (A. glutinosa × incana) Ripario al Col di Stella e lungo il Monticano pr. Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 12 e in n. 30) – ~~Var. denudata~~

377 A. incana (L.) Med. Prosp. p. 123 (894. 1550)
I – IV. Ripario, alveale, igrofilo. Comune nell'alveo del Piave e nelle siepi lungo i fossati a Selva, Cornuda, Vittorio. dal 1863; Ponte di Piave e Zenson (Bég. 1909!) ♀ Var. denudata Minio Greto del Piave nel Trevigiano (Minio, n. 35) forse questa forma corrisponde all' A. montana Brügg. dato come A. incana × viridis dal Koch Cfr. Dalla Torre e Sarnth. Fl. Tir. VI p. 54.

Vulgo Onèra o Arnèr de montagna o bianc

Fam. 24 Cupuliferae

Carpinus (Tourn.) Linn.

378 C. Betulus L. Prosp. p. 121 (895. 1565. R.)
II – IV. Nemorale, dumale, sepiario. Quasi tutta la prov. specialmente la collina e montana: Montello, Selva, Vittorio, Cornuda .... dal 1860. Vulgo. Càrpen, Càrpene

Ostrya (Mich.) Scop.

379 O. carpinifolia Scop. Prosp. p. 122 (897. 1550)
III – V. Nemorale, dumale, rupestre. Colfosco, Covolo, Valdobbiadene, Vittorio ecc. Vulgo. Carpen negro, o carpene nero.

Corylus (Tourn.) Linn.
380 C. Avellana L. Prosp. p. 121 (898. 1415. R.)
I – IV Nemorale, sepiario, dumale. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Montello, Vittorio.. dal 1862; ♀ Pederobba (Bég. 1909!); Cà Tron di Roncade (Dratz. 1915!) – fm. capitata. amentis masculis pluribus in capitulum densa congestis (abnormiter). S. Boldo ~~[illegible]~~ di Vittorio (Trotter 1914!). Una fm. purpurea è spesso coltivata nei giardini.
♀ Asolo. Grappa (Bolz. MS.)

Quercus (Tourn.) Linn
381 Q. Robur L. Prosp. p. 121 p.p. (899. 1415. R.)
I – IV Nemorale, dumale, sepiario – Var. pedunculata (Ehrh.) Prosp. p. 121 c. sp. In quasi tutta la provincia, la var. più diffusa nel Montello e in tutti i colli e monti, ma non manca in pianura. Cà Tron (Dratz. 1915!), Treviso ecc. Vulgo. Roro (rust.), rovero e pedal (i giovani polloni) – Subvar. intermedia Béreng. ♀ Nei boschi cedui a Conegliano (Bér. h. pat. 1845!) e Bracht in Bertol. – Subvar. pseudorubra Béreng. Nelle colline Asolane (Bér. h. pat.!) – Subvar. pseudalba Béreng. Nelle fustaje Asolane (Béreng.) – Subvar. ~~sessiliflora~~ Raineri Béreng. Presso Conegliano (Béreng 1842!) – Var. lanuginosa Lam. Prosp. p. 121 (Q. roburoides Béreng. c. sp.). Comune nel Montello verso il Piave e in quasi tutte le colline e monti a Vittorio, Cornuda, Valdobbiadene, Conegliano e nella stessa pianura a Selva ecc. dal 1862 – Subvar. pinnatiloba Béreng. Boschetti di Colfosco, 1863.

Var. sessiliflora Salisb. (Q. Robur Béreng) Nei colli boscati a Colfosco, Asolo, raro nel Montello (Bér., Sacc.)

♀ (Q. Robur var β Bertol.)

382 Q. Cerris L. (escl. Prosp. p. 121) (900. 1532. R)
II Nemorale. Montello (Béreng. sub Q. austriaca var. lobata, 1858, herb. Pat.). La specie citata sotto Q. Cerris nel mio Prospetto non è che Q. Robur var. lanuginosa subvar. pinnatiloba. Quanto agli esempl. Béreng. debbono essere riesaminati. Le molte forme distinte da quest' aut. e in parte figurate nel suo dotto Saggio sulla Giurisprudenza forestale in Italia Treviso-Venezia 1859-1867, sono in buona parte raccolte nel Trevigiano e si trovano rappresentate in esemplari dissecati nell' Erbario dell' Istituto bot. di Padova.

383 Q. Ilex L. Prosp. p. 121 (904. 1532. R)
I-IV. Nella provincia non credo sia spontanea, ma essendo spesso coltivata nei giardini ed ambulacri, trovasi non di rado avventizia, come a S. Artemio presso Treviso (Kellner), Pederobba, Possagno, Conegliano, Vittorio. Vulgo: Elese.

Castanea (Tourn.) Adanson.

384 C. vesca Mill. Prosp. p. 121 (C. sativa Scop.) (905. 1415. R)
II-IV Nemorale. Montello, colli e monti, comunemente ed eziandio coltivata qua e là. Vulgo: Castagnér; castagne, maroni (i frutti).

Fagus (Tourn.) Linn.

385 F. silvatica L. Prosp. p. 120 (906. 1532. R.)
II-IV. Nemorale. Montello, parcamente, colli e monti intorno Vittorio, Cornuda, Valdobbiadene ecc. dal 1862; Cansiglio, copiosamente (anche Kellner, 1840!, Dom. Sacc.!); Grappa (Zanard. 1827, Bolz. ms., Cobau 1905!, Vaccari n. 64) Vulgo: Faghér

Platanus (Tourn.) Linn.

C. P. orientalis L. Prosp. p. 120 (907. 1532. R)
I-III. D'origine orientale, coltivato dovunque e subspontaneo - Vulgo. Platano

C P. occidentalis L. (908. 1551)
I–III. D'origine boreali-americana; coltivato anche più frequentemente del precedente e spesso subspontaneo – Volgo: Platano.

Fam 25 Urticaceae

Ulmus (Tourn.) Linn.

386 U. campestris L. Prosp. p. 120 (910. 1415. R)
I–IV Campestre, nemorale, sepiario. Tutta la provincia. Volgo: Olmo – Var. suberosa (Mönch) Qua e là.

387 U. montana With. Prosp. p. 120 (U. campestris var latifolia Mönch)
I–III. Nemorale. Montello qua e là dal 1862; boschi di S. Maria di Feletto, alt. 180 m.; Cà Tron (Dirat. 1915!, coltivato?)

Celtis (Tourn.) Linn.

388 C. australis L. Prosp. p. 120 (912. 1415. R)
I–IV. Nemorale, rupestre, sepiario. Montello, Selva, Volpago, Camalò, Vittorio dal 1862; colle di Ravina e Tovena (Camp. n. 36); Arolo (Bolz. M.). Volgo: Pisolèr.

Broussonetia L'Hérit.

C B. papyrifera (L.) Vent. Prosp. p. 120 (914. 1796)
I–III. Della Cina e Giappone; coltivato anche frequentemente nelle siepi ~~subspontaneo~~ a Selva, Nervesa, Vittorio, Treviso e spesso inselvatichito. Volgo: Morèr forest.

Morus (Tourn.) Linn.

C M. alba L. Prosp. p. 119 (915. 1551)
I–IV Di origine cinese, ma introdotto in Italia fino dal 1300 (Targioni-Tozzetti). Coltivato in tutta la provincia e spesso inselvatichito
Volgo: Morèr

C M. nigra L. Prosp. p. 120 (916. 1415. R.)
I–III. Originario dell'Armenia e Persia sett. Coltivaj. frequentemente, ma meno spesso del precedente; trovaj. anche avventizio. Vulgo: Morèr dalle more negre.

Ficus (Tourn.) Linn.
389 F. Carica L. Prosp. p. 119 (917. 1415. R.)
I–IV. Campestre, ruderale, murale – Var. sativa (Fuchs) Fiori (Var. hortensis Sacc. l.c.). Coltivato e subspontaneo in tutta la provincia – Var. Caprificus (Risso). Murale e ruderale in tutta la provincia. Al Caldieron di Vittorio (Pamp. in Fl. it. exs. n. 784). Vulgo: Figher e il frutto fic (rust.) e figo; il caprifico: fighèr salvàdego.

Humulus Linn. (Lupulus Tourn.)
390 H. Lupulus L. Prosp. p. 119. (918. 1415. R)
I–IV. Sepincolo, nemofilo. Tutta la provincia. Selva, Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene ecc. dal 1860; Castel di Godego, Castelfranco (Bég. 1909!) — Vulgo Bruxandol, bruxandui (rust.), bruxandoli. (i Asolo (Holz. ms.)

Cannabis (Tourn.) Linn.
C C. sativa L. Prosp. p. 119 (919. 1415. R)
I–IV. Campestre, ortiva. Originaria dell'Asia centrale; coltivata frequentemente e spesso avventizia. Vulgo: Cànio, Càneo (rust.) canevo (♁), canevela (♂).

Urtica (Tourn.) Linn.
391 U. urens L. Prosp. p. 119 (922. 1558)
I–IV. Ruderale, domofila, stradale. Tutta la provincia. Selva, Vittorio, Treviso; Ca' Tron (Diratz. 1915!); Grappa (Vacc. 64) Vulgo: Ortiga

392 U. dioica L. (Prosp. p. 119 (924. 1415. R)
I–IV. Ruderale, sepincola, domofila. Tutta la provincia: Selva, Treviso, Vittorio ecc. dal 1860; Cansiglio (Dom. Sacc. 1897); Cà Tron (Dratz. 1915!); Grappa (Vacc. n. 64.) – Var. pubescens (Le Deb.) Vidor, boschetti lungo il Piave (Bolz. MS.)

Parietaria (Tourn.) Linn.

393 P. officinalis L. ~~erecta~~ Prosp. p. 119 (P. erecta M. et K.) (926. 1415. R) Tutta la provincia; Selva, Treviso, Vittorio ecc. dal 1861; Valdobbiadene (Favaro 1845!) Asolo (Bolz. MS.) Var. judaica (L.) Prosp. p. 119 (P. diffusa M. et K.) I–IV. Murale, ruderale, domofila. Tutta la prov. Vulgo: Veriol (Vetriola) tanto la spec. che la var., Bavàri (nel Canal di Brenta) ec. Cobau) I–IV. Sepincola, ruderale.

Fam. 26 Elaeagnaceae

Hippophaë Linn. (Rhamnoides Tourn.)

394 H. rhamnoides L. Prosp. p. 116 (931. 1532)
II–IV. Alveale, arenicolo. Copioso nel letto del Piave dal 1860 (anche Bizz. 1881), nello stesso alveo a Zenson, Ponte di Piave, Salgareda, Pederobba (Bég. 1909!); Valdobbiadene (Favero 1843!); a Cozzuolo (Pamp. in Bolzon, n. 12). Vulgo: Gianes de Piave.

Laurus (Tourn.) Linn.

C L. nobilis L. Prosp. p. 116 (932. 1415. R)
I–III. Spontaneo nell'Italia merid., ma ~~naturalizzato~~ spesso avventizio quasi in tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1860. Vulgo: Orèr, lauro.

Fam. 27 Calycanthaceae

Calycanthus Linn.

C C. floridus L. (932 C., 1801). Dell'America sett., Anzi spesso coltivato nei giardini; a Treviso (anche Bézeng. 1840), Selva, Vittorio ecc. Vulgo: Calicanto.

C C. (Chimonanthus) praecox (932 D. 1812). Del Giappone. Coltivato frequentemente nei giardini a Treviso, Selva, Vittorio ecc. dal 1862. Vulgo: Calicanto.

Fam. 28 Thymeleaceae

Daphne Linn.

395 D. Cneorum L. Prosp. p. 115 (935. 1565. R)
III–V. Rupestre, xerofila. Grappa (Contarini 1825!, Spranzi!, Montini in Bertol.); Cison di Valmarino 1 Agosto 1913 (Elisa Zamolo) dove sembra del tutto spontanea
Var. striata (Tratt.) Grappa (Dom. Montini in Vacc. n. 64)

396 D. Mezereum L. Prosp. p. 115 (938. 1550)
II–IV. Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello dal 1861; Valdobbiadene (Favero 1842!, Bérenger 1844!); Cansiglio 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!) Asolo, Fietta, crespignaga (Bolzon n. 11); Collalti (Dom. Montini!); Costa del Grappa (Contarini 1825!), Grappa (Bizz. 1878!); Boccaor, a 700 m. (Fiori 1897!), Bolz. n. 11.) – Vulgo: Dàrfana.

397 D. Laureola L. (937. 1415)
III–IV Nemofila, igrofila. Boschi presso Solagna ai confini del Trevigiano (Dom. Montini, Apr. 1872!)

Thymelaea (Tourn.) Scop.

398 T. Passerina (L.) Lange. Prosp. p. 115 (Passerina annua Wickstr.) (939. 1595)
I–III. Ruderale, alveale, campestre. Nell'alveo del Piave a Falzè e nei campi a Belveder di Volpago, rara, dal 1862.

Fam. 29 Santalaceae

Thesium Linn.

399 T. alpinum L. Agg. p. 31 (946. 1563)
IV. Pascolivo, sassicolo. (Grappa, Sternb. 1803 n. 59, Montini, Vacc. n. 64, Bizzoz. 1878!); Mont. di Valdobbiadene (Favero e Bérenger 1844!) – Var. contractum Alph. DC. Val Melin del Grappa (Bolz. ms.) pratense fm.

400 T. Linophyllum L. Prosp. p. 116 (T. divaricatum Jan.) (941. 1678)
~~Var. divaricatum~~ II–III Alveale, arenicolo, rupestre. Alveo del Piave Sal 1861 fm. diffusa (anche Béreng. 1845!, Bizz. 1881); Asolo (Bolz. ms.); Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 16); fm. ascendens Fais di Vittorio (Contar. 1825!); Costa di Vittorio e M. Altare 1860 — Var. intermedium (Schrad.). Nemofilo. Vittorio (anche Fr. Sacc. 1894!); Cornuda 1861; Monte Oro verso la valle di S. Fidà (Bolz. n. 11) — Var. montanum (Ehrh.) Prosp. p. 116 (c. spec.) (1595) Pascolino, dumale: Cornuda, Pederobba, (anche Bég. 1909!) Valdobbiadene, Vittorio dal 1862. Fais di Vittorio (Cont. 1825!); Grappa (Bizz. 1878!)

Fam. 30 Loranthaceae

Viscum (Tourn.) Linn.

401 V. album L. Prosp. p. 65 (949. 1415)
II–III. Arboricolo. Selva, Giavera, sui Peri, Meli e Robinia, dal 1859; sui Meli a Combai (Pamp. n. 44). Vulgo: viscio.
fra Asolo e Casella lungo il Foresto nuovo (Bolz. ms.)

Fam. 31 Aristolochiaceae

Asarum (Tourn.) Linn.

402 A. europaeum L. Prosp. p. 117 (953. 1415)
II–IV Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello, frequente, dal 1861 (anche Bizz. 1881!); colli di Vittorio e Cornuda; Crespan e Cima Ardosa (~~Contar.~~ Zanard. 1827. 1829!) — Vulgo: Erba pevaro.
bosch. di S. Pietro di Feletto (Bolz. ms.)

Aristolochia (Tourn.) Linn.

403 A. Clematitis L. Prosp. p. 117 (954. 1550)
I–IV. Sepincola, nemofila, eliofoba. Quasi tutta la provincia: Treviso, Selva, Vittorio, Cornuda .... dal 1860; Colle Umberto (Pamp. n. 44); Pederobba, Castel di Godego, Fagarè, Zenson (Bég. 1909!) Vulgo: Erba zuchèra, Zuchèra.

404 A. rotunda L. Prosp. p. 117 (951. 1415)
I–II Pratense, sepincola. ~~Prosp. p. 117~~ Mogliano (Mayer in herb. Parolini) S. Florian. (Callalta) Fracchia!; presso Treviso (Béreng. 1836–39!), Gorgo (Mazé!); Salgareda (Contar. 1825!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave (Béguinot, 1909!)

405 A. longa L. (958)
Var. pallida (W.) Prosp. p. 117 (C. spec.) (1415)
II – IV. Nemopla, eliofoba. Montello, comune dal 1862 (anche Dom. Sacc. 1890!); Valdobbiadene (Bérenq. 1846!), colli di Asolo (Adr. Fiori 1897!), Tezze sopra Fietta (Grappe) (Bolz. n. 11) e al M. Piz (Bolz. ms.)

Fam. 32 Polygonaceae

Polygonum (Tourn.) Linn.

C. A. P. Fagopyrum L. Prosp. p. 115 (959. 1532)
I – IV Campestre, ortivo. Originario dell'Asia centr. e bor. e coltivato frequentemente e spesso pure avventizio, come a Selva, Vittorio, Montebelluna ec. dal 1862; a Pederobba (Bég. 1909!) Vulgo: Formenton, Sarezin (Saraceno)

406 P. Convolvulus L. Prosp. p. 115 (961. 1550. R.)
I – III Sepincolo, campestre. In tutta la provincia: Selva, Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene .. dal 1859; Castelfranco, Resana, Castel di Godego, Fagarè, Zenson (Bég. 1909!); Cà Tron (Dirats. 1915!)

407 P. dumetorum L. Prosp. p. 115 (962. 1550)
I – III. Sepincolo, campestre. In quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Corolo, Vittorio ... dal 1861; colli di Asolo (Zanard. 1826!)

C A P. orientale L. Prosp. p. 114 (963. 1713).
I – III. D'origine delle Indie orientali: Coltivato frequentemente e spesso avventizio a Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1861. Vulgo: Codete. subspontaneo ad Asolo (Bolz. ms.)

408 P. Bistorta L. Agg. p. 30 (964. 1532)
III – IV. Pascolivo, pratense. Monti sopra Valdobbiadene, 1870 (anche Bérenq. 1842); Loc a mezzo monte Pizzoc (Trotter 1915!); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Vacc. n 64, Bizzoz 1878!, Contarini!), Collalt. (Dom. Montini!)

409 P. viviparum L. Prosp. p. 114 (965. 1595)
IV. Pascolivo, pratense. Sopra il Consiglio 1869; sopra Valdobbia deve (Fracchia!); Grappa (Stern. 1803 n. 59, Coban 1906!, Montini ~~[illegible]~~ in Bertol, ed in herb. Pat!, Vacari n. 64, Bolz. (MS.) ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

410 P. amphibium L. Prosp. p. 114 (966. 1745)
I–III. Idrofilo, palustre. Fm. natans (Mönch). Fossati alle Badoere 1863; presso Treviso a Dosson (Bereng. 1838–39!), attorno al lago di Lago (Pamp. n. 44) – Var. terrestre (Leers). Agg. p. 31. Argini der fossati presso Treviso, 1864.

411 P. lapathifolium L. Prosp. p. 115 e Agg. p. 31 (968. 1550)
I–III Igrofilo, ripario, alveale. Presso Treviso 1864 (anche Bereng. 1837!); presso Conegliano (Bereng. 1837!); alveo del Piave a Nervesa, Covolo ed a Vittorio 1863; Asolo, al Casonetto (Bolz. MS.) – Var. incanum (Schmidt). Alveo del Piave 1864; presso Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. Persicaria (L.) [1551] Prosp. p. 115 c. sp. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Nervesa, Vittorio.... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!). Vulg. Ingonassa (Montello); Biadoi (Vittorio).

412 P. Hydropiper L. Prosp. p. 115 (969. 1415)
I–III. Ripario, igrofilo. Treviso, Selva, Vittorio e tutta la prov. dal 1862. – Var. mite (Schrank) [1830] Agg. p. 31. Comune: Treviso lungo il Sile (anche Bereng. 1837!), Selva, Montello, Cornuda, Vittorio, ai laghetti.. dal 1869.

413 P. minus Huds. Prosp. p. 115 (970. 1550)
II–III. Ripario, igrofilo, palustre. Stagni del Montello comune e fossati a Selva, raro, dal 1861; lago di Revine, 1867; Roncade 1866.

414 P. aviculare L. Prosp. p. 115 (973. 1415. R)
I–III. Ruderale, sassicolo, domicolo. Tutta la provincia: Treviso (anche Kellner 1840!) Selva, Vittorio, Cornuda.... dal 1861; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. Bellardi. Als. a S. Bona pr. Treviso (Fracchia) e a Selva – Vulgo: Erba porgelina (sì la spec. che la var.).

Rumex Linn.

415 R. alpinus L. Prosp. p. 114 (978. 1550)
IV–V. Pascolivo, igrofilo. Grappa (Montini vis Bertol., Vacc. n. 64)

416 R. Hydrolapathum L. Agg. p. 30 (980. 1785)
I Palustre. Paludi di Roncade 1867; Cà Tron (Diratz. 1915!); presso Asolo nei rovesci del monte della Rocca (Bolz. ms.)

417 R. crispus L. Prosp. p. 114 (981. 1640)
I–IV. Igrofilo, ripario, pratense. Quasi tutta la provincia: Selva, Cornuda, Vittorio.. dal 1861; Resana, Castelfranco (Béguinot 1909!) Cà Tron (Diratz. 1915!)

418 R. conglomeratus Murr. Prosp. p. 114 (983. 1566)
I–IV Ripario, igrofilo, marginale, pratense. Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Vittorio.... dal 1861; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Vulgo: Lengua de vaca (questa e le specie affini)

419 R. obtusifolius L. Prosp. p. 114 (985. 1415)
I–IV Igrofilo, campestre, ripario. Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Cansiglio 1867; Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. silvester (Wallr.) Koch A typo differt foliis longioribus et dentibus perigonii brevioribus et minus copiosis. Sturm VI. 3. Treviso 1868; Cansiglio 1869; Vittorio, 1890.

420 R. pulcher L. Prosp. p. 114 (986. 1583)
I–IV Igrofilo, campestre, ripario. Quasi tutta la provincia: Treviso, Mogliano, Selva, Vittorio.... dal 1861; Ponte di Piave (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Conegliano e Cansiglio (Béreng. 1842!)

421 R. bucephalophorus. L. (988. 1606. R.)
III Campestre, marginale. Tovena di Vittorio (Pampanini, verb.). Se si trovi colà come idiotopico o eterotopico diranno le ulteriori ricerche.

422 R. Acetosella L. Prosp. p. 114 (989. 1532)
I–IV Pratense, campestre. Tutta la provincia: Selva, Valpago, Montello, Vittorio..... dal 1861 — Var multifidus (L.) Montello 1908 e altrove. Vulgo: Panevela (spec. e var.)

423 R. Acetosa L. Prosp. p. 114 (R. Pseudacetosa Bertol.) (991. 1415)
I–IV. Pratense, pascoliva. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa Vittorio, Treviso, Mogliano, Cansiglio .... dal 1861; Asolo (Bolz. NV.); Cà Tron (Diratz. 1915!) Vulgo Pan-e-vin e sgambugie (i germogli) — Var. arifolius (All.)
IV Pascoliva, nemofila. Monti di Valdobbiadene sopra Segusino e fra Miliés e Col de Tache (Bolz. n. 17)

424 R. scutatus L. Prosp. p. 114 (993 – 1583)
III–IV Rupestre, sassicolo, alveale. Monti di Valdobbiadene (Fracchia) Cansiglio 1869; alveo dei torrenti Piave presso Pederobba, Orrigo (anche Bég. 1909!) e del Tegorzo presso Fenèr (Bég. 1909!)

Fam. 33 Chenopodiaceae

Atriplex (Tourn.) Linn.

CA A. hortense L. Prosp. p. 113. (997. 1415. R.)
I Ortiva e ruderale. Oriunda della Siberia e Tartaria. Coltivato qua e là e talora avventizio p. e a Motta (Fracchia, 1862!), sulle rive del Livenza (Béreng.!). Vulgo: Rèpes (corrotto di Atreplice)

425 A. hastatum L. Prosp. p. 114 (998. 1550)
I–IV. Ruderale, sepincola. Selva, Vittorio... dal 1862 – Var. patulum (L.) Prosp. p. 113 (c. spec.). Treviso, Selva, Vittorio, 1868.

426 A. portulacoides L. (1000. 1558)
I Tipicamente, alofilo, talora eterotopico ruderale come a Treviso (Berenger, 1837). Forse fu trovato all'approdo delle barche che vengono da Venezia; ma non consta che sia ricomparso posteriormente. Vulgo: Olive

Spinacia (Tourn.) Linn.
427 S. oleracea L. Prosp. p. 113 (1003. 1415)
I–III Originaria del Caucaso, della Persia ecc., ignota a Romani. Coltivata in tutta la provincia e spesso ~~[illegible]~~ avventizia a Selva, Vittorio, Treviso. Vulgo: Spinazi.

Beta (Tourn.) Linn.
C A B. vulgaris L. Prosp. p. 113 (1004. 1583. R.)
Var. Cicla (L.) Dell'Europa merid. Coltivata in tutta la provincia e qua e là inselvatichita. Vulgo Erbete – Var. Rapa (Dm.) [1415. R.). Coltivata e inselvatichita qua e là, Vulgo: Erbete rave.
(p. e. a Treviso (anche Kellner 1840!).

Chenopodium (Tourn.) Linn.
428 C. Bonus-Henricus L. Rgg. p. 30. (1007. 1532)
III–IV. Ruderale, ortivo. Cansiglio 1867; sopra Valdobbiadene, a 900 m. 1870; m. Colletti sopra S. Nazario (D. Montini!); Grappa (~~[illegible]~~ Zanardini!, Vacc. n. 64, Sternb. 1803, n. 59, Bizz. 1878!) – Vulgo: Grassole.
(Bolzon MS.

429 C. polyspermum L. Prosp. p. 113 (1008. 1550)
I–III Campestre, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Vittorio, Treviso... dal 1860 (Asolo! (Bolz. MS.) – Var. ~~[illegible]~~ cymosum Chev. Orsago pr. Vittorio (Pamp. in Bolzon n. 12).

430 C. Vulvaria L. Prosp. p. 113 (1009. 1550)
I–III. Ruderale, domofilo. Treviso, 1862–68, comune, a Vittorio parcamente, 1890 (anche Pamp. in Bolz. MS.)

R C. hybridum L. (1010. 1717)
I–II Ruderale, domofilo. Nel Trevigiano (Tracchia). Da confermarsi e precisarsi la località; essendo facile lo scambio con C. urbicum.

431 C. murale L. Prosp. p. 113 (1011. 1551).
I–II. Ruderale, domofilo. Vie e lungo i muri a Selva (anche D. Sacc. 1890!) e Treviso.... dal 1862.

432 C. urbicum L. Prosp. p. 113 (1012. 1696)
I–II. Ruderale, domofilo. Vie e mura di Treviso (anche Béreng. 1837! e Tracchia!); Selva, Nervesa, comune... dal 1862.

433 C. glaucum L. Prosp. p. 113 (Blitum glaucum Koch) (1014. 1785)
I–II Ruderale, domofilo. Spresiano e Conegliano 1866–67; Treviso presso il ponte S. Margherita (anche Tracchia!) e a Porta Cavour (Pamp. in Bolz. MS.); Montello verso il Piave (Fr. Saccardo 1890!).

434 C. album L. Prosp. p. 113 (1015. 1550)
I–III Campestre, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Resana, Castelfranco (Bég. 1909!) Var. viride (L.) Prosp. p. 113 (c. spec.) [1566]. Treviso, Camalò, Selva, Conegliano, Vittorio.... dal 1861; Grappa (Vacc. n. 64) – Var. opulifolium (Schrad.) [1550]. Presso i muri a Selva, 1907. Forma coi racemi ascellari decomposti. Vulgo. Farinazi, Farinèle.

435 C. ambrosioides L. Prosp. p. 113. (1016. 1673)
I–III. Ruderale, domofilo. Originario dell'America tett. e tropicale ma da molti anni inselvatichito in quasi tutta Italia. A Nervesa, Spresiano, Soligo presso i muri, copiosamente.. dal 1861.

Kochia Roth

C.A K. scoparia (L.) Schrad. Prosp. p. 112 (1021. 1532)
I–III. Della Russia e dei Paesi Danubiani. Coltivata assai frequentemente e spesso avventizia presso i muri come a Treviso (anche Bérenq. 1837!), Vittorio Selva, Volpago... dal 1860. Vulgo: Scoe.

Fam. 94 Amarantaceae.

Amarantus (Tourn.) Linn.

CA A. caudatus L. Prosp. p. 112 (1045. 1583)
I–III. Delle Indie orient. e Nubia. Coltivato frequentemente e qua e là naturalizzato lungo le vie e i muri, come a Selva, Giavera, Vittorio... dal 1862. Vulgo: Code rosse

496 A. retroflexus L. Prosp. p. 112 (1046. 1532)
I–III. Campestre, ruderale, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Volpago, Treviso, Vittorio... dal 1862; Cà Tron (Dirabz. 1915!) Var. patulus (Bertol.) (1717) Prosp. p. 112 (A. laxiflorus Cornelli). Campo a Selva, Treviso ecc. 1862–66, meno comune del tipo, dal quale si distingue per le brattee più lunghe e cuspidate e per la spica più evidentemente lunga delle laterali; ad Asolo (Bolz. MS.) — Vulgo: Viadòn (corr. di Biedone)

C A. tricolor L. Prosp. p. 112 (1049. 1551)
I–III Delle Indie orient. e Cina e Giappone. Coltivato comunemente, p. e. a Treviso, Selva, Caerano, Vittorio e talora avventizio.

497 A. graecizans L. Prosp. p. 111 (A. Blitum L. e.p.) (1050. 1551)
I–III Ruderale, campestre, domofilo. In quasi tutta la provincia: Selva (anche Bizz. 1883!), Vittorio, Treviso... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.)

A A. albus L. (1051. 1723)
III. Ruderale. Originario dell'America sett. Avventizio e subspontaneo in più parti d'Italia; comparve in copia in seguito ad uno sterro del vecchio cimitero di S. Andrea di Serravalle nell'estate e aut. 1912; dove i semi dovettero rimanere sotterrati per oltre 50 anni. Nel 1914 era già scomparso.

438 A. ascendens Lois. Prosp. p. 111 (A. flexuosus Ambr.) (1053. 1415)
I – III. Campestre, ruderale, ortivo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Vittorio, Valdobbiadene (anche Bereng. 1844), Pederobba... dal 1861; Cà Tron (Dirats. 1915!)

439 A. deflexus L. Prosp. p. 112 (A. prostratus Balb.) (1054. 1789)
I – III Ruderale, domofilo. Treviso, Selva, Conegliano, Vittorio... dal 1861; Castelfranco (Bég. 1909!)

Celosia Linn.

C. C. cristata L. Prosp. p. 112 (1056. 1532)
I – III. Delle Indie orientali. Coltivata frequentemente e qua e là avventizia. Vulgo: Cresta de gal.

Gomphrena Linn.

C. G. globosa L. Prosp. p. 112 (1056 B. 1640)
I – III. Delle Indie orientali. Coltivata frequentemente e qua e là, di rado, avventizia. Vulgo: Semprevivi rossi.

Fam. 35 Phytolaccaceae

Phytolacca (Tourn.) Linn.

C. A. Ph. decandra L. Prosp. p. 112 (1058. 1642)
I – III. Oriunda delle due Americhe. Frequentemente coltivata ed ora qua e là avventizia a Selva, Volpago, Venegazzù, ~~[illegible]~~ persino nell'interno del Montello, dal 1862 ad Asolo (Bolz. ms.) Vulgo. Amaranto, Maranto.

Fam. 36 Nyctaginaceae

Mirabilis (Riv.) Linn.

CA M. Jalapa L. (1059 A. 1583)
I – III. Originaria del Perù. Coltivasi e si riproduce spontaneamente, p. e. a Selva, nella via che conduce al Castello di Conegliano, 1907.
Vulgo. Meravegie.

Fam. 37 Aizoaceae

Tetragonia Linn.

CAT. expansa L. (1061. 1786)
I–III Dell'Australia e Nuova Zelanda. Coltivata talora a Sebra e a Cozzuolo (Pamp. verbal.); le raccolsi avventizie lungo la via Cavalletto a Vittorio, 1905.

Fam. 38 Begoniaceae

Begonia (Plum.) Linn.

CAB. discolor R. Br. (1061 A. 1820)
I–III Delle Cina e delle Mauritius. Coltivata frequentemente nei giardini e si riproduce spontaneamente qua e là a Sebra, Vittorio. Volgo: Begonia.

Fam. 39 Portulacaceae

Portulaca (Tourn.) Linn.

460 P. oleracea L. Prosp. p. 56 (1068. 1415. R.)
I–IV. Ruderale, sabulicola, domestica. Tutte le provincie: Sebra, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso... dal 1860; Asolo, Maser (Bolz. n. 10)
Volgo: Porzolàna, Grassola.

CA P. grandiflora Hook. Prosp. p. 56 (P. Gillesii Hook.) (1069. 1836)
I–III Del Brasile e Argentina. Coltivata spesso nei giardini; si rinselvatichisce qua e là fra i sassi. Volgo: Portulàca, Portulachia.

Fam 40 Paronychiaceae

Scleranthus Linn.

4411 S. annuus L. Prosp. p. 57. (1076. 1563)
I–III Campestre. Sebra, Giavera, Volpago, Montebelluna, Vittorio dal 1862.

Herniaria (Tourn.) Linn.

442 H. hirsuta L. Agg. p. 18, Cfr. Prosp. p. 56. (1087 β. 1532)
II. Sassicola, ruderale, campestre. A Selva di Volpago sulla ghiaja, rarissima, 1861.
Var. permixta Jan. Camp. di Mussolente ai confini della Provincia (Montini in herb. Zanardini e Kellner!)

Polycarpon (Loefl.) Linn.
443 P. tetraphyllum L. Prosp. p. 57 (1091. 1551)
I–III Sassicolo, ruderale, domofilo. Treviso 1861, Vittorio 1866 (anche Pamp. n. 44).

Fam. 41 Caryophyllaceae

Spergula (Ruppius) Linn.
444 S. pentandra L. Agg. p. 11 (1095. 1772)
III Campestre. Camp. di Mussolente ai confini colla provincia (Montini in herb. Kellner!). L'indicazione nel Grappa (a Montinio) data dal Bertoloni deriva da un lapsus calami perchè nell'herb. Montini la specie è notata di Angarano presso Bassano. Cfr. Vacc. n. 64.

Sagina Linn.
445 S. procumbens L. Prosp. p. 29 (1096. 1563)
II–III. Igrofila, rupestre, nemofila, stradale. Montello, vie e colli di Vittorio 1863; Cansiglio 1869; M. Grappa (Parolini in Bertol., Vacc. n. 64) — Var. apetala (L.) Prosp. p. 29 come spec. (specialm. la fm. ciliata Fr.) I–III. Ruderale, domofila, murale. Selva, Treviso 1862; Mogliano (Mayer in Bertol., Bég. 1909!) — Var. brysides (Fröl.). Grappa (Montini, Parolini, sec. Vacc. n. 64.) (q; Asolo (B. Ag. ms.)

446 S. Linnaei Presl | Prosp. p. 29 (S. saxatilis Wimm.) (1097. 1735)
IV. Igrofila, rupestre. Grappa (Montini, sec. Vacc. n. 64.), Cansiglio 1869 (anche Béreng.!) — Var. subulata (Presl). (1819) Cansiglio (Béreng. 1878!) — Var glabra (W.) (1785). Campo pr. il Grappa (Sternb. 1804, n. 59)

Alsine (Tourn.) Linn.

447 A. tenuifolia (L.) Crantz. Prosp. p. 29 (1100. 1696)
I–IV. Murale, campestre, domofila. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio, Treviso... dal 1860; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) — Var. triquetra Sacc. Agg. p. 11. Vie di Treviso 1864 — Var. arvatica (Presl). ~~Agg. p. 11~~ Agg. p. 11 (A. viscosa Schreb.) Sulle mura a Treviso, 1863.

448 A. verna (L.) Wahlg. Agg. p. 11 (1102. 1745)
IV. V Rupestre, pascoliva. Grappa (Sternb. 1804 n. 59, Spranzi!, Montini, Cobau 1905!, Vaccari n. 64; Cansiglio 1869 (anche Bérenger 1838!) Var. semiglandulosa Strobl. Col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.)

449 A. laricifolia (L.) Crantz. Agg. p. 11 (1105. 1785)
III–IV Pascoliva, rupestre. Monte Praderatico sopra Maren di Follina (Béreng. 1842!); Corbanese (Pamp. n. 36); Grappa (Sternb. 1803 n°. 59 [Stellaria striata], Zanardini!) — Var. liniflora (Hegetsch.) M. Pizzoc (Pamp. in Bolz. n. 12)

450 A. Cherleria Fenzl. Agg. p. 11 (Cherleria sedoides L.) (1108. 1754)
IV. Rupestre, xerofila. B. Cansiglio alla Palantina nelle fessure delle rupi, 1869.

Arenaria Linn.

451 A. serpyllifolia L. Prosp. p. 29 (1115. 1551)
I–IV. Murale, domofila, campestre. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Montello, Vittorio, Treviso... dal 1861; Faìs (Contarini 1825!) Ponte di Piave, Salgareda, Pederobba, Fenèr (Bég. 1909!) — Var. tenuior Koch. Castelcucco (Bolz. MS.); Vittorio (Varietà poco distinta)

452 A. ciliata L. Agg. p. 11 (1116. 1745)
IV.–V. Rupestre, sassicola. Grappa (D. Montini sec. Vaccarini n. 64)

Moehringia Linn.

453 M. trinervia (L.) Clairv. Prosp. p. 29 (1121. 1551)
I - IV Nemofila, sepincola, eliofoba. Selva, Volpago, Vittorio, Cansiglio dal 1862; presso S. Maria di Lago (Pamp. n. 36); colle della Rocca ad Asolo (Bolz. ms.).

454 M. muscosa L. Prosp. p. 29 (1123. 1606)
II - IV Igrofila, eliofoba, nemofila. Sorgenti del Meschio pr. Vittorio 1861; Savazza (Trotter 1906!); bosco Cansiglio 1869; M. Zoel sopra Cenedi (Contarini 1825!); sopra Fregona (Bég. in Fl. it. exs. n. 2035; Crespan e M. Ardosa (Zanardini 1827!)

455 M. Poriae Fenzl (1122. 1595) Var. collina Goir.
IV - V. Rupicola, eliofoba. Valle Scalarè verso Boccaor ~~alle Tezze~~ del Grappa 700-800 m (Bolzon n. 27); scogli sotto i Collatt. (Montini in herb. Kellner!). Si tratta anche qui della var. collina Goir. assai probabilmente.

Stellaria Linn.

456 S. nemorum L. Prosp. p. 29 (1125. 1563)
II - IV. Nemofila, igrofila. Montello dal 1862; Cansiglio, 1869; (anche Dom. Saccardo 1897!); presso Asolo (Bolz. n. 11); Grappa nella valle dei Pezzi (Contarini, 1825!), Grappa (Vacc. n. 64) — Var. glabra: tota glabrata. Montello, 1863.

457 S. media (L.) Cirillo. Prosp. p. 29 (1126. 1550)
I - IV Campestre, ortiva, domofila. Tutta la provincia: Selva, Treviso, Vittorio, Valdobbiadene .... dal 1860; asolo (Bolz. ms.) — Var. apetala Ucria. Selva (Dom. Saccardo, 1890 — Var. pallida (Dum.). Vie di Treviso (Bég. 1909!) — Var. alpicola Lamotte. Cima del Grappa, m. 1773, presso il Sacello (Bolzon 1907!) — Vulgo: Rega (nel Canal di Brenta, sec. Cobau), Intivel o Intivel da oseleti (in qualche distretto)

458 S. graminea L. Prosp. p. 29 (1130. 1713)
II - IV. Nemofila, igrofila. Montello dal 1861; Cansiglio, m. 1300 (anche Dom. Sacc. 1897!); ~~presso~~ nel Grappa (C. Mass. 1877, Vacc. n. 64., Bolzon, n. 11)

Collatt. (Dom. Montini!) — Var. hispidula Goiran. Cansiglio, a m. 1100 (Pamp. in Bolz. n. 24).

459 S. holostea L. Prosp. p. 29 (1132. 1532)
II – IV Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, colline di Valdobbiadene .. dal 1861; Collatt. (D. Montini 1871!); Crespan e M. Ardosa (Zanardini 1827!)

Holosteum (Dill.) Linn.
460 H. umbellatum L. Prosp. p. 29 (1133. 1713)
I – III. Campestre, segetale, murale. Selva dal 1862; Treviso (anche Favero, 1845!)

Malachium Fries
461 M. aquaticum (L.) Fries. Prosp. p. 30 (1134. 1701)
I – IV. Igrofilo, sepincolo, ripario, ortivo. Tutta la provincia. Treviso, Selva, Giavera, Vittorio .... dal 1862; Ponte di Piave, Resana, Pederobba, Castelfranco (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

Cerastium Linn.
462 C. brachypetalum Desp. Agg. p. 12 (1138. 1785)
I – III. Campestre, ortivo, murale. Selva, Treviso, Vittorio ... dal 1861.

463 C. glomeratum Thuill. Prosp. p. 30 (1139. 1553)
I – III Campestre, Ortivo, marginale, murale. Selva, Vittorio... dal 1862; Cà Tron (Diratz. 1915!), Resana, Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!) — Var. apetalum (Dum.) Presso Targo (Pamp. n. 36)

464 C. semidecandrum L. Agg. p. 12 (1140. 1816)

1–III Campestre, pratense, ortivo. Selva, dal 1864; Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 13; Asolo (Bolz. n. 13); letto del Piave (Minio, n. 35).
– Var. glutinosum (Fr.) (1830). Selva, 1864; letto del Piave (Minio n. 35)
– Var. pumilum Curt. fm. alsinoides (Pers.) colle Piumadela verso Monfumo (Bolz. MS.)

465 C. triviale Lk. Prosp. p. 30 (C. viscosum L. herb.) (1142. 1745)
I–III Campestre, ortivo, pratense, ripario. Selva, Treviso, Vittorio... dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.); Cà Tron (Diratz. 1915!)

466 C. silvaticum W. K. Prosp. p. 30 (1143. 1826)
I–III Nemofilo, igrofilo, ripario. Selva e Montello e Treviso dal 1861; Vittorio, 1907; Cansiglio, 1869; Asolo e vicinanze Colmarion (Bolz. n. 11); Cà Tron, Fiori 1896!, Diratz. 1915!); Tarzo (Pamp. n. 44); letto del Piave (Minio, n. 35); valle del Bocaòr (Bolz. MS.)

467 C. carinthiacum Vest, Prosp. p. 30 (C. alpinum Auct. Venet.) (1144. 1851)
IV–V. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64, Sprangi!, Massal. 1877!); Cansiglio (Béreng. 1838!). Cfr. Bég. Il Cerast. alp. e le sue vicende nella Flora italiana in Atti Acc. sc. Ven. trent. istr. V p. 3 (1908).

468 C. arvense L. Prosp. p. 30 (1145. 1563)
III–V. Rupestre, pascolivo. Grappa in Val dei Pezzi (Contarini 1825!) Grappa (Sprangi!, Coban, 1905!, Vacc. n. 64); Collalti (Dom. Montini!) Val Malin del Grappa e M. Cesèn sopra Valdobbiadene (Bolz. MS.)
Var. strictum (Haenke) Agg. p. 12. Rupi del Cansiglio 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!), Grappa (Sprangi!)

469 C. manticum L. Prosp. p. 30 (1147. 1703)
I–II. Pratense, campestre. Mogliano (Mayer in Bert.); S. Palè (Pelagio) (Gust. Venturi 1864!); Selva dai Coduri 1866; Treviso in piazza del Duomo 1869; pr. Resana (Bég. 1909!)

Agrostemma Linn. (Prosp. p. 28 (1148. 1415. R)

470 A. Githago L. a qui
I–III. Campestre segetale. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Treviso, Vittorio... dal 1860; Castelfranco, Ponte di Piave (Bég. 1909!) – Volgo: Giotòn (corr. di Gittone)

Lychnis (Tourn.) Linn.

C L. coronaria (L.) Desr. Prosp. p. 28 (1149. 1415)
I–III. Spontanea nei divi soleggiati d'Italia, parcamente. Coltivata spesso in provincia e talora avventizia, 1866. Vulgo: Veludini.

471 L. flos-cuculi L. Prosp. p. 28 (1151. 1532)
II–IV. Pratense, pascoliva. Selva, Montello, Vittorio ... dal 1858; Cansiglio (D. Sacc. 1897); S. Maria di Lago (Pamp. n. 36), Romano (Sternb. 1804, n. 59); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. plena. Di rado spontanea, p. e. a Selva, 1867; talora coltivata.

C L. chalcedonica L. Prosp. p. 28 (1151 A. 1583)
I–III. Oriunda dell'Asia minore e del Grappone. Coltivata qua e là. Vulgo: Scarlatèa.

472 L. alba Mill. Prosp. p. 28 (L. vespertina Sibth.) (1156. 1415)
I–IV. Sepincola, nemofila, marginale, campestre. In quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Vittorio ... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!); Castelfranco (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. ms.). Vulgo: Recie de lievaro.

473 L. rubra (Weig.) P. M. et E. Prosp. p. 28 (L. diurna Sibth.) (1157. 1532)
III–IV. Nemofila, rupestre, eliofoba. Serravalle di Vittorio dal 1861; Valdobbiadene 1865; Asolo, Monfumo, S. Fidà sotto il M. Oro (Bolz. n. 11); Collath. (Dom. Montini!); S. Boldo di Vittorio (Trott.!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59; Vacc. n. 64, Antonio Saccardo 1883!) – Var. plena. Coltivata nei giardini, in passato più che al presente come a Selva, 1861. Vulgo: None.

Cucubalus (Tourn.) Linn.

474 C. baccifer L. Prosp. p. 27 (1158. 1550)
I–IV. Sepincolo, nemofilo, ripario. Selva, Volpago, Montello (anche Bizz. 1881!), Vittorio ... dal 1859; Cornuda (anche Favero 1844!); Asolo (Bolz. ms.)

Silene Linn.

475 S. vulgaris (Moench) Garke Prosp. p. 27 (S. inflata Sm.) (1159. 1415)
I–IV. Pratense, campestre, marginale, murale. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Volpago, Treviso, Vittorio... dal 1858; Fagarè, Zenson, Pederobba (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. angustifolia (Guss.) Qua e là nei luoghi più magri – Var. pubescens DC. Monti di S. Maria di Lago (Pamp. n. 36) – Var. alpina (Thom.) (1718). Grappa (Vaccari n. 64). Valgo: Carleti, Carlini (specialmente il tipo), e Ussèl (nel Canal di Brenta sec. Cobau)

476 S. quadrifida L. Prosp. p. 28 (1163. 1532)
IV. V. Rupestre, sassicola. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Zanardini 1827!, Montini in Bert. e in herb. Pat.!, Vacc. n. 64, Massal. 1877!, Bizzozero, 1878!); Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); letto del Piave e Tegorzo, certamente discesa dai monti (Bég. 1909!) – Var. villosa Gelmi presso la sommità del Grappa (Bolz. MS.) e in valle Archeson

477 S. alpestris Jacq. ~~Agg. p.~~ (1164. 1806)
IV–V. Rupestre, pascoliva. M. Cesèn sopra Valdobbiadene (Bolzon n. 13).

478 S. rupestris L. (1165. 1754)
IV–V. Rupestre, sassicola. Grappa (Parolini in herb. Contarini!)

479 S. acaulis L. Agg. p. 11 (1166. 1595)
IV. Rupestre, sassicola. Cansiglio alla Palantina 1869 (anche Béreng. 1838! Dom. Sacc. 1897); Grappa (Montini!, Vacc. n. 64).

480 S. saxifraga L. Prosp. p. 27 (1167. 1565)
IV–V. Rupestre, sassicola. Monti sopra Vittorio, 1862; rupi del Cansiglio 1867–69 (anche Béreng. 1838!); Bocaor del Grappa (Bizz. 1878!, C. Massal. 1877!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Montini in Bertol., Cobau 1906!, Vaccari, n. 64 – Var petraea Weld. Grappa (Bizzoz. 1878!, Favero 1845!)

481 S. Armeria L. Prosp. p. 27 (1173. 1553)
II–III Eliofila. Nei clivi soleggiati del Trentino e Tirolo; in provincia soltanto coltivata e talora avventizia, come a Selva 1858. Vulgo: Becheti da çelega.

482 S. linicola C. C. Gmel. Prosp. p. 27 (1176. 1839)
I. Campestre, segetale. Specialmente fra i lini in prov. di Treviso (Mayer in Bertol.); a Martellago presso Mogliano (Zanardini!)

C A S. pendula L. (1189. 1696)
I–III. Oriunda dell'Italia centr. o merid. È spesso coltivata e talora avventizia, come a Treviso, Vittorio. Vulgo: Silene.

483 S. gallica L. Prosp. p. 27 (1192. 1563. R.)
I–III. Campestre, segetale, ortiva. Selva, Bavaria, S. Croce del Montello sopra Nervesa, Caerano fino dal 1861; Mogliano (Romano in herb. Pat.!); Treviso (Béreng!), presso Tarzo (Pamp. n. 36) — Var. anglica (L.) Agg. p. 11. Colline presso Caerano 1861.

484 S. nutans L. Prosp. p. 28 (1201. 1563)
I–IV. Pratense, nemofila, rupestre. Montello, Selva, Giavera, Vittorio, Conegliano, ~~Vittorio~~ fino dal 1861 (anche Braht!. Béreng!); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64, Bizzoz. 1878!) Asolo (Bolzon n. 13) — Var. livida W. sulle rupi a Serravalle col tipo, 1906; Conegliano (Béreng. 1842!); colli di Asolo (Bolz. MS.)

485 S. Otites L. Prosp. p. 27 (1204. 1551)
III–IV. Rupestre, muricola. Monti e muraglie fuori Serravalle dal 1861; Miane (Fracchia e Béreng. 1842!); S. Boldo di Vittorio (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 814!); Savazza di Serravalle (Contarini 1825!); Grappa (Bolz. n. 13.). La fm. tipica è xerofila; la fm. eliofila corrisponde alla S. Pseudotites Bess.

Saponaria Linn.

486 S. officinalis L. Prosp. p. 26 (1207. 1563. R.)
I–IV Sepincola, riparia, alveale, ruderale. Selva, Volpago, Nervesa, Treviso, Vittorio.. dal 1858; Cà Tron (Dirabz. 1915!), Pederobba nell'alveo del Piave (Bég. 1909!) ♀ – Var. plena. Copiosa in un prato e lungo un rivolo a Lancenigo pr. Treviso ~~1894 R. Rogger~~ (R. Rogger, 1894!) Vulgo: Saponaria.
♀ – Var puberula Syme. Asolo e Vidòr (Bolz. MS.)

487 S. ocymoides L. Agg. p. 10 (1208. 1532).
IV Sassicola, rupestre. M. Croce ~~presso~~ sopra Serravalle di Vittorio (Stur n. 61). Questa specie non fu qui raccolta da altri botanici, benchè nulla osti per la sua presenza fra noi.

488 S. Vaccaria L. Prosp. p. 26 (1212. 1532)
I–III. Segetale, ruderale. Selva e Vittorio, non molto comune dal 1861.

Gypsophila Linn.

489 G. muralis L. Prosp. p. 25 (1214. 1785)
II. Nemofila ed anche marginale. Montello 1862, e margine delle vie a Selva, rara (anche Fr. Saccardo 1890!)

490 G. repens L. Prosp. p. 25 (1215. 1697)
II Alveale. Alveo del Piave a Nervesa, Corolo, Falzè (anche Bizz. 1881!); lo stesso alveo a Negrisia, Salgareda, Zenson di Piave; Pederobba (Béguin. 1909!)

Tunica (Ruppius) Scop.

491 T. saxifraga (L.) Scop. Prosp. p. 25 (1219. 1550)
I–IV Murale, marginale, campestre, Tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Treviso, Vittorio.... dal 1861; Conegliano (Bérenq. 1842!); Pederobba, Castelfranco, Ponte di Piave, Negrisia (Béguinot, 1909!) Asolo (Bolz. MS.)

492 T. prolifera (L.) Scop. Prosp. p. 26 (Dianthus prolifer L.) (1220. 1532)
I – III. Campestre, sassicola, xerofila. Selva, Camatò, Montello ... dal 1861; Grappa (Sternb. 1803, n. 59)

Dianthus Linn.

493 D. Armeria L. Prosp. p. 27 (1222. 1532)
I – IV. Pratense, pascolivo, marginale, xerofilo. Montello, Selva, Volpago, Camatò ... dal 1860.

494 D. barbatus L. Prosp. p. 26 (1223. 1415)
II – IV. Nemofilo, pascolivo, eliofobo. Montello (anche Bizz. 1872!: e 1881!), Cornuda, Vittorio, Pederobba ... dal 1858; Grappa (Spranz.!), Romano (Sternb. 1804, n. 59) asolo, Monfumo (Bolz. MS.) Var. angustifolius Pers. Qua e là nel Montello. Vulgo. Garofoli, garofui de montagna e ad Asolo (Bolz. MS.)

495 D. Mikii Reichardt (D. monspessulanus × barbatus) (1223 A. 1867)
II Nemofilo. Montello, raro fra i parenti. Ha pure tutto l'abito del D. Courtoisii, che sarebbe, sec. Wohlfart, l'ibrido di D. superbus e D. superbus β speciosus; ciò che pel nostro, per l'assoluta assenza di tali parenti, è da escludersi.

496 D. Carthusianorum L. Prosp. p. 26 (1224. 1532)
II – IV. Pratense, pascolivo. Covolo, Colfosco, Vittorio ... dal 1862; Collalti (Dom. Montini!), Fais sopra Serravalle (Contarini, 1825!) – Var. atro-rubens (Allioni) (1785) Prosp. p. 26. Selva, Paderno, Pongano, Colfosco, Vittorio ... dal 1861; Asolo e Valdobbiadene (Bolz. MS.)

497 D. Caryophyllus L. Prosp. p. 26 (1233. 1415)
La razza ortense, molto variabile, si coltiva dovunque e talora incontrasi avventizia. Vulgo. Garofol, garofui (rust.) – Var. virgineus (L.) (1805), II – III

Alveale, rupestre. Coll. di Vittorio dal 1866; alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); M. Crep (Bereng. 1842) — Var. inodorus (L.) (1532) Prosp. p. 26 (D. silvester Wulf.). Murale, xerofilo. Conegliano, Vittorio (anche D. Sacc. 1890!); Miane (Fracchia!); Fais (Contarini 1825!); Grappa (Contar. 1825!, Bolz. in Vacc. n. 64). Sembra che queste due varietà passino insensibilmente l'una nell'altra.

498 D. superbus L. (non Sacc. Prosp. p. 26 che è = D. monspessulanus e var.) IV–V. Rupestre. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Cobau 1906, Vacc. n. 64)

C A D. plumarius L. Prosp. p. 26 (1235. 1760).
E' indigeno in alcuni luoghi dell'Italia boreale; ma si coltiva frequentemente e compare talora avventizio, come a Selva, Treviso, Cornuda, Vittorio. Anche la località del Grappa (Sternb. sec. Vacc. n. 64) si riferisce probabilmente a individui sfuggiti dai giardini. Vulgo. Garofoleti-rapeghini (striscianti)

409 D. monspessulanus L. Prosp. p. 27 (anche D. superbus l. c.) (1237. 1532) II–IV Pascolivo, nemofilo. Montello, Vittorio, Cornuda, Covolo... dal 1861; Bosco Fagarè (Bolz. ms.); Fais (Contarini 1825); Asolo (Visiani!); S. Martino pr. Asolo (Zanard. 1827!); Pederobba (Bég. 1909!) ♀ — Varia a foglie un po' più larghe e più verdi del tipo corrispondendo in tale caso al D. Waldsteinii Sternb. I petali possono essere leggermente barbati, passando però insensibilmente fino ad essere imberbi. Vulgo: Garofoleti de bosc.

♀ — Var. marsicus (Ten.) Castagneti di Asolo (Bolz. ms.)

Fam. 42 Tamaricaceae

Myricaria Desv. Prosp. p. 55 (1242. 1415)

500 M. germanica (L.) Desv.
II–III Alveale, ripario. In tutto l'alveo del Piave a Nervesa, Falzè Covolo... dal 1861; lungo il Monticano a Conegliano (Bereng. 1842!), a Cozzuolo (Pamp. n. 36); Ponte di Piave, Zenson, Pederobba (Bég. 1909!), presso il Grappa (Zanardini 1825!) — Vulgo: Tamaris, tamarisco.

Tamarix Linn.

501 T. gallica L. (1240. 1551)
I. Nelle sabbie del Litorale prossimo ai confini della Provincia; trovato a Cà Tron, coltivato? (Dratz. 1915!)

Fam 43 Hypericaceae

Hypericum (Tourn.) Linn.

CA H. calycinum L. Prosp. p. 32 (1249. 1780)
I – II. Oriundo della Grecia e dell'Asia occid. Coltivato nei giardini e non di rado inselvatichito, come a Selva, Caerano e nell'area della demolita Certosa del Montello, fino dal 1861.

502 H. Androsaemum L. Prosp. p. 32 (1250. 1532)
II – IV. Nemofilo, eliofobo. Montello, colli di Vittorio ... fino dal 1862; Asolo (Zanard. 1827!); Masèr, Borso, Asolo (Bolz. n. 10. 11); Valle di S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59)

503 H. quadrangulum L. Agg. p. 12 (1252. 1532)
IV. Nemofilo, igrofilo. Grappe (Montini, Sprangi!, Bolz. MS.); Collalti (Dom. Montini 1872!); Canrighi 1869 (anche Mari n. 24 e Dom. Sacc. 1897!) — Var. acutum Moench, Prosp. p. 32 (H. tetrapterum Fr.) I – III Nemofilo, igrofilo, ripario, sepincolo. Treviso (anche Bérenq. 1838! e Trotter 1909!), Selva, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.)

504 H. perforatum L. Prosp. p. 32 (1254. 1415)
I – IV Marginale, sepincolo, nemofilo. Treviso, Selva, Vittorio, Cornuda, Montello dal 1859; Asolo (Bolz. MS.), Pederobba (Bég. 1909!). Nel Montello notai due forme crescenti promiscue: macropetalum (petali 12–14 ≃ 4–5 mm.) e micropetalum (pet. 9–10 ≃ 3 mm.) — Var. prostratum Sacc. Prosp. p. 32. Alveo del Piave, luoghi sassosi alle Campagnole, Vittorio ecc. dal 1861.

505 H. montanum L. Prosp. p. 32 (1261. 1551)
II – IV Nemorifilo, sepicolo. Montello, Giavera, Barbana, sopra Vittorio Cavg. e Cr. Dal 1861; Arcolo e San Boldo (Bolzon MS.); Valdobbiadene, 1870. B. Fagarè pr. Cornuda (Bolg. MS.

506 H. hirsutum L. Prosp. p. 32 (1262. 1563)
III – IV Nemorifilo, eliciofobo. Montello, colle S. Vittorio e Cornuda Dal 1861; Arcolo (Bolg. n. 10); Grappa, Bizzg. 1878! – Var. majus P. Gor. Montello e S. Boldo (Bolg. MS.)

Fam. 44 Cistaceae

507 Helianthemum (Tourn.) Adans.
H. Fumana (L.) Mill. Prosp. p. 23 (1267. 1553)
I – IV. Salicicolo, pascolivo, alveale. Tutta la provincia Selva, Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene ... Dal 1861; Arcolo (Zanard. 1827, Bolg. MS.); Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!)

508 H. canum (L.) Dun. (1273. 1595)
III – IV. Pascolivo, rupicolo. Grappa (Sternb. 1804, n. 59) – Var. italicum (Pers.) fm. pericellatum (Thib.) Passo S. Boldo, m. 350 (Carp. H. it. exs. n. 820) Var. alpestre (Dun.) Grappa (Parolini, Sprengel!) – Var. villosum R. et Fouc. Grappa (Bolg. MS.)

R (H. apenninum (L.) Mill. (1276. 1745) var. pulverulentum (DC.)
IV Rupicolo. M. Grappa (Sprengel, H. Pat.). Da confermare.

509 H. Chamaecistus Mill. Prosp. p. 23 (H. vulgare Gaertn.)
I – IV. Pratense, pascolivo, alveale. Selva, Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene ... Dal 1859; Serravalle (Contarin. 1825!), Cavaglie (Dom. Sacc.), Grappe (Cobau 1906! Massal. e Bizz.!); Ponte di Piave, Negrisia, Zenson (Bég. 1909!) – Var. glabrum Koch. Selva 1862; Pederobba (Bég. 1909!), alveo del Piave (Minio n. 35) – Var. grandiflorum (DC.). Pederobba, Vittorio dal 1862; Crespan, 1865; Grappe (Cobau 1906!, Vacc. n. 64, Bolg. MS., Sternb. 1803, n. 59)

Fam 45 Violaceae

57

Viola (Tourn.) Linn.

510 V. canina L. Prosp. p. 24 (1292. 1551)
II–IV. Nemofila, sepincola, eliofoba. Montello, Vittorio... dal 1861; Cansiglio, 1869; Monfumo, Asolo, Castelli, Grappa (Bolz. n. 11 e MS.) – Var. Roppii (All.) Prosp. p. 24. Montello e sepincola a Selva (I nostri esempl. non sono ben distinti dal tipo) – Var. elatior Fr. Prosp. p. 24 e Agg. p. 9 (V. montana L. ex p.). Sepincola pr. Treviso (Giacomelli in herb. Sacc.!) – Var. silvatica (Fr.) ~~Prosp.~~ Agg. p. 9 (V. silvestris Lam. ex p.) Nemofila. Montello, Valdobbiadene, ~~dal~~ 1864, anche colla fm. albiflora – Var. arenaria (DC.). Agg. p. 9. Montello, rara, 1863; Grappa (Kellner in Parlatore).

511 V. mirabilis L. (1293. 1742)
III. Dumale. Cespugli presso Cozzuolo di Vittorio, m. 138 (Pampanini in Bolzon MS.)

512 V. hirta L. Prosp. p. 23 (1294. 1532)
II–IV Dumale, pratense. Selva, Giavera, Vittorio, Pederobba.. dal 1861; Monfumo (Bolz. MS.) – Var. alba (Bess.) Agg. p. 9 Sepincola, riparia a Selva, 1866; Asolo (Bolz. MS.) – Var. odorata (L.) [1415]. Prosp. p. 24. come specie. I–IV. Sepincola, nemofila, eliofoba in tutta la provincia: Selva, Treviso, Vittorio, Montello, Volpago.. dal 1859; Cà Tron (Diratz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.). Cresce promiscuamente la fm. albiflora. Vulgo. Viola, Viola zota.

513 V. palustris L. Agg. p. 9 (1295. 1785).
IV Nemofila, igrofila. Cansiglio 1867 (anche Béreng. 1843!)

514 V. pinnata L. Agg. p. 9. (1296. 1766)
IV Pascoliva, sassicola. M. Praderatico sopra Follina (Béreng. 1843); San Boldo di Vittorio (Pampanini in Bolz. MS.)

515 V. biflora L. Agg. p. 10 (1297. 1532)
IV–V. Rupicola, igrofila, eliofoba. Cansiglio 1869 (anche Bereng. 1841!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Contarini 1825!, Bolzon MS.)

516 V. tricolor L. Prosp. p. 24 (1301. 1532)
I–IV Campestre, segetale, eliofila. Var. arvensis (Murr.) Tutta la provincia: Selva, Camalò, Volpago, Vittorio, Treviso ... dal 1859; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) ♀ Var. hirsuta: caule foliis stipulisque omnibus hirtellis (an = var. hirta Hausm.?). Cansiglio (Bereng. 1841!) — Var. saxatilis (Schm.) Grappa (Art. Ross. in Vacc.n. 64) — Var. hortensis DC. [1696]. Derivata dalle var. selvatiche, coltivata ovunque e spesso fuggiasca dai giardini. Vulgo: Pansè ♀ Vulgo: Fratini.

Fam. 46 Resedaceae

Reseda (Tourn.) Linn.

517 R. lutea L. Prosp. p. 24 (1304. 1551).
I–III Ruderale, sassicola, campestre. Camalò, Belveder, Ponzano, Vittorio (anche Trotter, 1909!) ... dal 1862; alveo del Piave (Minio n. 35); mura di Treviso, 1864; Ponte di Piave, Salgareda, Negrisia (Béguinot, 1909!) Var. crispa Ten. Qua e là, p.e. Ponzano e Paderno, 1863 — Var. latisecta Schm. Colle Umberto (Pamp. in Bolz. MS.)

518 R. Phyteuma L. (1305. 1595).
I–III. Ruderale, xerofila. Tamai al confine del Conegliano col distretto di Sacile (Contarini, 1825!) — Var. odorata (L.) Prosp. p. 24, come specie (1750). Coltivata assai sovente e avventizia su muri vecchi a Selva, al Portello di Treviso, a Vittorio .... dal 1861. Vulgo: Amorin, amorini, Milionet, Reseda.

Fam. 47 Capparidaceae.

Capparis (Tourn.) Linn.

C. rupestris S. et S. [1806]. 58 (1563)

519 C. spinosa L. (1307 – ~~[illegible]~~ 1415). Var. inermis Turra, [1780] Prosp. p. 23
II – III. Murale. antiche muraglie del Castello di S. Salvatore a Susegana 1859; mura di Asolo (Bolz. M.S.). Vulgo: Caparo, Capari

Fam. 48 Cruciferae

Matthiola R. Brown.

CA M. incana (L.) R. Brown. Prosp. p. 16 (1308. 1415. R.
Propria del litorale mediterraneo. Coltivata frequentemente nei giardini e spesso fuggiasca e avventizia anche sui muri vecchi. Vulgo. Viole rosse e Viole bianche.

Malcolmia R. Brown.

CA M. maritima (L.) R. Brown. Agg. p. 8 (1313. 1666)
Dell'Italia centr. e merid. Coltivata nei giardini e spesso fuggiasca e avventizia, p. e a Treviso, 1867.

Hesperis (Tourn.) Linn.

CA H. matronalis L. Prosp. p. 18. (1318. 1532)
I – III. Spontanea qua e là in Italia, ma coltivata nel Trevigiano nei giardini e spesso avventizia come a Selva, Vittorio ... dal 1861. Vulgo: Samberi, forse perchè i primi individui provennero da Chambery – Var. pumila Sacc. l.c. Campi ghiajosi a Selva, 1861 (Una forma magra, xerofila).

Cheiranthus Linn.

520 C. Cheiri L. Prosp. p. 17. (1319. 1415. R.)
I – III Xerofilo, murale. Probabilmente oriundo di Grecia, ma coltivato ab antico nei giardini e spessissimo avventizio e come spontaneo nei muri vecchi o nei tetti a Selva, Treviso, Susegana, Vittorio ... dal 1861; Asolo sulle ~~mura~~ torre della Regina Cornaro, copioso (Bolz. M.S.). Vulgo Viole zale o dale (a fiori semplici o doppi).

Erysimum Linn.

521 E. crepidifolium Rchb. (1322. 1849)
III Ruderale, xerofilo. Vittorio, via Cavallotti VI. 1966, raro, fra le macerie portate di fresco. Corrisponde benissimo alla figura 4386 delle Icones di Rchb. e del Fiori. Questa è la seconda località italiana della specie, la prima essendo Valpolicella, ove fu scoperta dal Kellner. Fra noi probabilmente è un avventizio d'origine germanica.

522 E. hieracifolium L. (1323)
Var. lanceolatum R. Br. Prosp. p. 19 (E. Cheiranthus Pers.) (1595)
II–III Murale, rupicolo, ruderale. Rupi del M. Praderatico sopra Follina (Béreng. 1843!); sopra Borso (Bolz. MS.); Valle di S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59) — Var. helveticum (DC.). Lungo la Brentella a Selva, probabilmente trasportato dai monti, Apr. 1863.

Arabis Linn.

523 A. glabra (L.) Bernh. Agg. p. 7 (Turritis glabra L.) (1325. 1553)
III–IV. Rupestre, sassicola. Monti di Valdobbiadene (Béreng. 1847!); Grappa sopra Possagno (Bolz. MS.); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); monti sopra Valdobbiadene (Béreng. 1847!); Grappa sopra Possagno (Bolz. MS.)

524 A. pauciflora (Grimm.) Garcke. Agg. p. 7 (A. brassiciformis Wallr.) (1326. 1785)
IV–V. Pascoliva, rupicola. Grappa nel Boccaor di Crespan (Parolini herb.)

525 A. alpina L. Prosp. p. 17 (1328. 1563)
II–V. Rupestre, sassicola. Cansiglio 1861 (anche Béreng. 1838!); Grappa (Montini, Bizz. 1878! Vacc. n. 64); alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); Cima Ardosa sopra Crespan (Zanard. 1827!)
Val. albida (Stev.) Muri muscosi dell'antica torre, forse fuggita dalle colture (Bolz. MS.)

526 A. Turrita L. Agg. p. 7 (1327. 1565)

II–IV Rupicola, murale. Serravalle di Vittorio 1866 (anche Béreng. 1839!); Valdobbiadene (Béreng. 1846!); Nogarolo di Vittorio (Pamp. n. 44) – Var. lasiocarpa Uechtr. Valle della Chiesa del Grappa, sopra Possagno (Bolz. n. 27).

527 A. hirsuta (L.) Scop. Prosp. p. 17. (1329. 1550)
I–IV. Murale, rupicola, ortiva. Quasi tutta la provincia: Treviso (anche Béreng. 1838!), Selva, Montello, Vittorio .... dal 1861; Fais di Vittorio (1825!); Asolo (Zanard. 1827!), Pederobba (Bég. 1909!) – Var. glaberrima Wahlbg. Boschi di Follina (Béreng. 1843!) Forse = A. glastifolia Rchb. Icon. II f. 4343.°

R A. bellidifolia Jacq. (1337. 1565) non Sacc. Prosp. p. 17 (= Thlaspi praecox!)
IV–V Pascolivi, rupestri. Grappa (Sprangi herb.). Da confermarsi la località.

528 A. Thaliana L. Prosp. p. 19 (Sisymbrium Thalianum Gaud.) (1341. 1673)
I–IV. Campestre, ortiva, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Covolo .... dal 1861; Valdobbiadene (Béreng. 1846!); Asolo, Crespano, Borso, Monfumo (Bolz. n. 11) – Var. pusilla E. Petit. Campi di Fratta pr. Tarzo (Pamp. n. 36); letto del Piave (Minio n. 35)

529 A. pumila Jacq. Agg. p. 7. (1336. 1745)
III–IV Rupestre, sassicola. Cansiglio, alla Palantina 1869 (anche Béreng. 1838!); sopra Valdobbiadene (Béreng. 1846!); Grappa (Montini, Sprangi!, Vacc. n. 64)

Sisymbrium (Tourn.) Linn.

530 S. strictissimum L. (1345. 1785)
III. Ruderale, marginale. Lungo la via Cavallotti a Vittorio, fra le macerie accumulate di recente, VI. 1907! Probabilmente avventizio, portatovi dalla regione montuosa di Lombardia o Trentino.

531 S. Columnae Jacq. (1351. 1606)
II–III. Ruderale, marginale. Vittorio, via Cavallotti fra le macerie portateci di recente, VI. 1906, e fuori porta Serravalle verso Longhere, sul margine della strada VIII 1906. Una forma minore dei siti più magri con foglie cauline angustissime e scarse accennerebbe a passare a S. altissimum.

532 S. altissimum L. e p. (1352. 1830) = S. pannonicum Jacq.
II–III Ruderale, marginale. Vittorio, via Cavallotti fra le macerie portateci di recente VI. 1906. La descrizione di Linneo si attaglia ai nostri esemplari, mentre nell'Erbario Linneano sta una forma di S. Columnae; per cui alcuni autori (Koch, Beck ecc.) preferiscono o il nome di Jacq. (S. pannonicum 1780) o meglio quello di Crantz (S. sinapistrum, 1769).

533 S. Sophia L. Agg. p. 8 (1354. 1550)
I–III Ruderale, campestre, marginale. Via Cavallotti a Vittorio, fra le macerie di recente importazione, VI. 1906; Treviso (Fracchia!).
Osserv. Con fondamento suppongo che le ~~quattro~~ cinque crocifere: Erysimum crepidifolium, Sisymbrium strictissimum, S. Columnae, S. altissimum e S. Sophia apparse nel 1906 a Vittorio nella nuova via Cavallotti dopo il trasporto di macerie e ghiaja dai dintorni, fattovi per la livellazione e consolidamento della via, e presto scomparse, siano da avervi colà come avventizie e non come idrotopiche.

534 S. officinale (L.) Scop. Prosp. p. 18 (1356. 1550)
I–IV. Ruderale, sassicolo, xerofilo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Resana, Zenson e Ponte di Piave (Bég. 1909!), Asolo (Bolz. MS.). Volgo: Barbèna (rustico), nome egualmente attribuito a Verbena officinalis.

Alliaria (Ruppius) Adans.

525 A. officinalis Andrz. Prosp. p. 19 (Sisymbrium Alliaria Scop.) (1358. 1554)
I – IV Sepincola, ruderale, campestre. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Treviso, Vittorio... dal 1861; Asolo (Zanard. 1827!); Crespano, Borso, Asolo, Monfenera (Bolz. n. 11).

Barbarea Beckm.

526 B. vulgaris R. Br. Prosp. p. 17 (1359. 1550)
I – IV Campestre, riparia, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Treviso, Volpago, Vittorio... dal 1859; Castelfranco, Pederobba (Bég. 1909!), Cà Tron (Dirotz.) – Var. Stricta Andrz. Valle di S. Fidà sotto il M. Oro (Bolzon n. 11); Castelli di Monfumo (Bolz. MS.); Cansiglio 1869.

Nasturtium (Linn.) R. Br.

527 N. officinale R. Br. Prosp. p. 17. (1301. 1415. R.)
I – IV. Ripario, idrofilo. Tutta la provincia: ~~Selva~~, Treviso, Volpago, Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Pederobba (Bég. 1909!) – Var. Lobelii Sacc. l.c. foliolis omnibus oblongo-lanceolatis. Fossi intorno Treviso 1861; Selva (Dom. Sacc. 1890!; Resana (Bég. 1909!)

528 N. silvestre (L.) R. Br. Prosp. p. 17 (1363. 1532)
I – IV. Campestre, marginale, ripario. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Conegliano (anche Béreng. 1846); Castelfranco, Resana (Beg. 1909!); Cà Tron (Dirotz. 1915!); Asolo, Castelcucco (Bolz. 11 e MS.). Anni variabile nelle lacinie fogliari più o meno anguste, più o meno dentate.

529 N. amphibium (L.) R. Br. Agg. p. 7 (1366. 1650)
I – III Palustre, idrofilo, ~~igrofilo~~, ripario. Treviso (anche Fracchia!); Salgareda (Contar. 1825!, Bég. 1909!); Roncade, Quinto, 1867; Ponte di Piave (Bég. 1909!), Cà Tron (Dirotz. 1915!)

560 N. palustre (Leyss.) DC. Prosp. p. 17. (1366 d. 1745)
I – III. Palustre, igrofilo. Lungo il fiume Meschio fuori Serravalle 1861 e 1870. Mi sembra una specie specificamente diversa da N. amphibium.

541 N. Armoracia (L.) Fr. Prosp. p. 21 (Cochlearia Armoracia L.) (1367. 1415. R.)
I – III. È originario della Russia orient., ma coltivato sovente negli orti e talora subspontaneo p. e. a Selva, Biadene, Caonada, Vittorio
Vulgo: Cren.

Cardamine (Tourn.) Linn.
~~II – IV. Nemofila, sassicola, igrofila. Montello~~

542 C. trifolia L. Prosp. p. 18 (1371. 1532)
II – IV Nemofila, sassicola, igrofila. Montello dal 1861; Cansiglio, fra gli abeti (Bég. in Fl. it. exs. n. 2056, Contarini 1825!); colli di Asolo (Zanardini 1827 ½ Bolz. MS.); Collalto (Sternb. 1804, n. 59); Targo (Pamp. in Bolz. n. 13)

543 C. amara L. Prosp. p. 18 (1372. 1532)
I – III Idrofila, riparia, subpalustre. Presso Treviso ~~dal 1860~~, Vittorio (anche G. B. Zava 1867!), Selva, Giavera ... dal 1862.

544 C. pratensis L. (1373. 1565) = C. Matthioli Moretti
I – II. Idrofila, subpalustre, riparia. Fra Castelfranco e Campolampiazo (Montini in Bertol.); Cà Tron (Dratz. 1915!). È la var. Hayneana Welw. che probabilmente passa nel tipo insensibilmente.

545 C. flexuosa With. Agg. p. 8 (C. silvatica Linn.)
I – III. Igrofila, eliofoba, riparia. Lungo il Meschio a Serravalle e Ceneda 1866; a Treviso e nel Cansiglio 1867–69.

546 C. hirsuta L. Prosp. p. 18 (1374. 1673)
I – IV. Campestre, ruderale, marginale, murale. Tutta la provincia: Selva, Treviso, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; Cà Tron (Dratz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.)

547 C. impatiens L. Prosp. p. 18 (1377. 1617)
II – IV. Nemofila, igrofila, ortiva. Montello (Forame e Valle dell'acqua), Vittorio... dal 1861; Susegana (Fracchia!); Valle S. ~~Jolì~~ Felicità verso Bassano (Parolini!); Asolo, Monfumo, Crespano (Bolz. MS.) – Var. patulipes Rouy. Asolo al Colmarion (Bolz. MS.)

548 C. resedifolia L. Agg. p. 7. (1378. 1697)
IV – V. Pascoliva, rupicola. Grappa (Montini, Sprangi, Dom. Montini in Vacc. n. 64).

Dentaria (Tourn.) Linn.

549 D. enneaphyllos L. Prosp. p. 18 (1382. 1585)
II – IV. Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello dal 1861; dossi ombrosi di Serravalle, Ardosa e Boccaor del Grappa (Bolz. n. 11); Cozzuolo e colli di Conegliano (Pamp. n. 38 e Bolz. n. 13); Boccaor a M. 700 (Fiori herb. Pat.!), Grappa (Vacc. n. 64, Stern. 1804, n. 59) – Var. bifolia Bolz. Passo S. Boldo e Boccaor alle Tezze (Bolz. MS.) – Var. alternifolia Hausm. Valle Boccaor alle Tezze (Bolz. MS.)

550 D. pentaphyllos Scop. Prosp. p. 18 (1383 [var. digitata (Lam.) I] 1565)
II – IV. Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, nei luoghi detti ~~et~~ Tavaràn e Buoro, 1861; Feletto (Pamp. in Bolz. n. 11); Monti di S. Maria di Lago (Pamp. n. 44); Cansiglio (Béreng. 1840!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59) – Var. pilosula Gelmi. Grappa e Canale S. Boldo (Bolz. n. 22).

551 D. bulbifera L. Prosp. p. 18 (1384. 1532)
II – IV Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, nelle valli dal 1861; Pederobba (Bég. 1909!); Asolo, Monfumo, e radici del Grappa (Bolz. n. 11 e MS.); Grappa (Sternb. 1804, n. 59); Cima Ardosa presso Crespan (Zanard. 1827!); monti sopra S. Maria di Lago (Pamp. in Bolzon, n. 13); Cansiglio (Dom. Saccardo, 1897!). Varia a fiori bianchi e rosei

Eruca (Tourn.) Adans.

552 E. sativa Mill. Prosp. p. 20 (1387. 1415

I–IV. Campestre, ruderale, ortiva. Spesso pure si coltiva e trovasi avventizia. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Camalò, Treviso... dal 1861. Vulgo: Rucola. Q, Vittorio lungo i muri.

Sinapis Linn.

553 S. alba L. Agg. p. 8. (1389. 1415 R.)

I–III. Ortiva, ruderale, segetale. A Treviso, Varago dal 1864 (avventizia o veramente spontanea?)

Brassica (Tourn.) Linn.

554 B. nigra (L.) Koch (1393. 1550)

I–II Qua e là in Italia spontanea e coltivata. A Treviso talora fuggiasca dagli orti e avventizia. Vulgo. Senape.

555 B. Sinapistrum Boiss. Prosp. p. 19 (Sinapis arvensis L.) (1394. 1558)

I–III Campestre, ruderale, sassicola, marginale. In quasi tutta la provincia: Selva, Cusignana, Quinto, Treviso, Vittorio dal 1862; Ponte di Piave (Bég. 1909!) Cà Tron (Durat.) – Var. Schkuhriana (Rchb.) Sav. Ruderale, marginale. Vittorio 1903–1910; Pederobba e Ponte di Piave (Bég. 1909!). Si trovano promiscue le due forme lejocarpa a silique nude e trichocarpa a silique pelose: quest'ultima è forse la var. villosa Mérat.

556 B. campestris L. Prosp. p. 19 (1399. 1550)

I–IV. Campestre, ruderale. Oriunda dell'Europa sett. e occid. Coltivata e spesso subspontanea a Selva, Volpago, Vittorio, Conegliano (anche Bezeng.!) Mogliano (anche Romano herb. Pat.)... dal 1861; nelle due forme oleifera e Rapa (L.) [1415 R]. Vulgo: la prima Ravizòn, Colzàt, l'altra: Rava.

557 B. Napus L. Prosp. p. 19 (1400. 1415 R.)

I–IV Campestre, segetale. Delle rive del Battivo. Coltivata ab antico e qua e là subspontanea anche nel Trevigiano, nelle forme oleifera (come a Selva 1861, Vittorio (Trotter 1916!) (Ravizòn) ed esculenta (vulgo Navòn). vulgo:

558 B. oleracea L. Prosp. p. 19. (1401. 1415. R.)
I – IV Campestre, ortiva. Originaria dell' Europa boreale e occident., ma coltivata ab antico a numerosa varietà e talora qua e là subspontanea. Volgo. Verze, Cavoli, Capuzi, Broccoli ecc.

Diplotaxis DC.
559 D. muralis (L.) DC. Prosp. p. 20. (1413. 1550)
I – IV. Ruderale, marginale, murale. Tutta la provincia: Treviso, Vittorio, Nervesa, Camalò, Pogiano, Covolo al Piave, ... dal 1862; Pederobba nel greto del Piave (Bég. 1909!) – Volgo: Ruvola mata, come la seguente.

560 D. tenuifolia (L.) DC. Prosp. p. 20 (1414. 1550)
I – IV. Ruderale, murale, alveale. Quasi tutta la provincia: Treviso (anche Bireng. 1837!), Nervesa, Covolo, Falzè al Piave, Vittorio... fino dal 1862; Ponte di Piave, Zenson, Salgarda (Bég. 1909!) – fm. subintegrifolia Koch. Qua e là come a Vittorio, Salgarda, Zenson (Bég. 1909!)

Conringia Heist.
A C. orientalis (L.) Andrz. Agg. p. 8 (Erysimum orientale R. Br.) Prosp. p. 19 (Brassica orientalis L.) (1418. 1595)
I – II Campestre. Qualche campo a Selva, 1866 di rado. Avventizia?

Raphanus (Tourn.) Linn.
CA R. Sativus L. Prosp. p. 23 (1420. 1415. R.)
I – IV. D'origine orientale e forse derivato per mezzo della coltura dal Raph. Raphanistrum L. Coltivato assai spesso negli orti e talora spontaneo qua e là nelle vicinanze. Volgo: Ravanel, Ravaner.
Oss. Il R. Raphanistrum L. fu citato per errore nel Prosp. p. 23.

Rapistrum (Tourn.) Medik.
561 R. rugosum All. Prosp. p. 22 (1422. 1551)
I – III Ruderale, sabbicolo, campestre. Quasi tutta la provincia: Selva,

Covolo, Treviso (anche Béreng. 1837!), Vittorio, Corunda... dal 1861; Ponte di Piave, Zenson, Resana (Bég. 1909!); Ca' Tron (Diretz. 1915!) Trovansi promiscuamente le forme scabrum Host, glabrum Host e indivisum Sacc. (foliis indivisis, ovenato-dentatis).

Bunias Linn.

562 B. Erucago L. Prosp. p. 22 (1428. 1745)
I–III Campestre, segetale, ruderale. Selva, Quinto, Camalò dal 1862; Monfumo (Bolz. n. 11).

Isatis (Tourn.) Linn.

CA I. tinctoria L. Agg. p. 9. (1432. 1550)
I–III. Nemofilo, sassicolo. Nel Trevigiano non spontanea, ma coltivata qua e là e di rado avventizia, p. e. a Selva, 1864.
Volg. Guado.

Alyssum Linn.

563 A. calycinum L. Prosp. p. 20 (1447. 1550)
I–III. Campestre, ruderale, murale. Selva e mura di Treviso dal 1861.

CA A. maritimum (L.) Lam. Agg. p. 8 (Lobularia maritima Desv.) (1450. 1673)
I–III Dell'Europa mediterranea. Domofilo, ruderale. Coltivato qua e là in provincia e spesso avventizio presso le case e nelle macerie a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1864; Ponte di Piave (Bég. 1909!) e Asolo (Bolz. n. 23)

Lunaria Linn.

CA L. annua L. Prosp. p. 20 (L. biennis Moench).
I–III. Indigena in più luoghi d'Italia, ma coltivata qua e là nel Trevigiano e talora fuggiasca dagli orti ed avventizia, come a Selva, Treviso dal 1861; Asolo nelle siepi presso la villa Dal Zotto (Bolz. MS.)

Draba Linn.

564 D. aizoides L. Prosp. p. 20 (1460. 1566).
IV–V. Rupestre, sassicola. Grappa (Montini in herb. Fracchia! Sprangi!) Vacc. n. 64

565 D. verna L. Prosp. p. 20 (1468. 1551)
I–III. Campestre, ortiva, murale, alveale. Tutta la provincia: Selva Volpago, Treviso, Vittorio (anche Pamp. n. 40), Covolo... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.). Varia a siliquette orato-oblunghe od ellittiche (fm. praecox Stev.); quest'ultima forma è più comune fra noi.

Petrocallis R. Br.

566 P. pyrenaica (L.) R. Br. Agg. p. 8 (1469. 1755)
IV–V. Rupicola. Cansiglio (Bérenger 1838!), Grappa (Gio. Montini herb.)

Cochlearia (Tourn.) Linn

567 C. saxatilis L. Agg. p. 8 (1470. 1595)
IV–V Rupestre, sassicola. Col Visentin di Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 13), sopra Fadalto (Pamp. n. 36); Grappa (Montini herb., Vaccari n. 64) – Var. sinuata Rouy et F. Ghiaje presso S. Croce a M. 400 (Pamp. in Bolz. MS.)

Chamaelina Crantz

C C. sativa (L.) Crantz. Prosp. p. 21 (1474. 1415 R.)
I–III. Campestre, segetale. Spontanea qua e là in Italia. Talora coltivata per l'estrazione dell'olio, p. e. a Nervesa, 1861.

Neslea Desv.

568 N. paniculata (L.) Desv.
II. Pratense, marginale. Montebelluna non lungi dalla stazione della ferrovia Maggio 1899

Calepina Adans.

569 C. Corvini (All.) Desv. Prosp. p. 23 (1476. 1673)
I. Ruderale, pratense. Mogliano (Mayer in Bertoloni)

Coronopus (Ruppius) Gaertn.

570 C. procumbens Gilib. Prosp. p. 22 (Senebiera Coronopus Poir.) (1478. 1532)
I-II. Ruderale, campestre. Selva, fra i sassi presso la mia casa Agosto 1861, raro.

Lepidium Linn.

571 L. Draba L. (1479. 1532)
I-III. Ruderale, marginale, domofilo. Vittorio lungo le vie a Serravalle (Pamp. 36. 1903); lungo i muri vecchi presso casa Croze a Vittorio 1906. Forma a stilo più esile e più lungo.

572 L. Iberis L. Prosp. p. 21 (L. graminifolium L.) (1483. 1532).
I-IV Ruderale, murale, domofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Biadene, Falze, Treviso, Vittorio .... dal 1858; Asolo (Bolz. 1835)

573 L. campestre (L.) R. Br. Prosp. p. 21 (1487. 1532)
I-III Campestre, xerofilo. Selva e Volpago, nella campagna bassa, 1861, raro.

L. sativum L. (1486. 1415 R.)
CA I-III Di patria non accertata. Coltivato e subspontaneo a Treviso e Varago, 1864.

Hutchinsia R. Br.

574 H. procumbens (L.) Desv. Prosp. p. 22 (1490. 1678)
I-II. Murale. Treviso sulle mura (Fracchia 1842!, de Bracht!, Kellner!, Bérenger!, Montini. È la fm. integrifolia DC. (Noccaea tarvisina Bér., N. Bérengeriana Vis.). Le foglie inferiore sono per lo più intere, e, più di rado, leggermente trilobe.

575 H. alpina (L.) R. Br. Agg. p. 9 (1488. 1553)
IV-V. Sassicola, rupestre. M. Grappa (Montin. e Parolin. herb., Vacc. n. 64).

Capsella Medik.

576 C. Bursa-pastoris (L.) Moench Prosp. p. 22 (1491. 1415)
I-IV. Campestre, ortiva, marginale, murale. Tutta la provincia...: Treviso, Selva, Conegliano, Vittorio.... Dal 1861; Consiglio (anche D. Sacc. 1893!). Varia forma comuni sono: apetala, rubicunda, canescens, integrifolia, coronopifolia — Var rubella (Reut.). S. Maria D. Lago, Coggiola, Cenedese D. Vittorio (Comp. n. 36) e certamente altrove — Var. agrestis (Jord.). Consiglio (D. Sacc. n. herb. Pat.!) — Var. ruderalis Jord. a Selva, comune — Var. major (Hagenb.). a Selva.

Aethionema R. Br.

577 Ae. saxatile (L.) R. Br. Comp. p. 22 (1495. 1606)
III-IV. Sassicola, alveale. Greto del Meschio e del Piave a Falzè... Dal 1861; Savagna fuori Serravalle (anche Cont. 1825!); sopra Conegliano (Comp. n. 36); Pass. S. Boldo (Trotter!); Pederobba sul Piave (Beg. 1909!); Valle S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59).

Thlaspi Linn.

578 T. arvense L. (1498. 1553).
II. Alveale, campestre. Letto del Piave nella regione trevigiana (Minio n. 35).

579 T. perfoliatum L. Agg. p. 8 (1500. 1532)
III. Erakense. Asolo, Monfumo (Roly. MS.); Romano, ai confini del Trevigiano (Parolin., herb.)

580 T. montanum L. (1503. 1780)

III - IV. Pratense, rupicolo. Grappa su Crespan (Parolin., Vacc. n. 64), Cima Ardosa (Zanard. 1827) — Var. praecox (Wulf.) [1606]. Colli ertosi o vecchi muri a ~~Vittorio~~ Ceneda e Serravalle di Vittorio, Fregona, sorgenti del Meschio ... dal 1863; sopra Fietta (Bolzon, n. 13); Grappa a 300-500 m. Fiori 1897!; passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n 825!) — Var. alpinum (Crantz) Monte sopra Crespano (Montini - in Bertol.), sopra Fietta e Borso (Bolz. n 11). Il Bolzon posteriormente, in MS., dubita che la sua var. si riferisca piuttosto alla var. praecox.

Iberis Linn.

C I. semperflorens L. Prosp. p. 21 (1506. 1563)
I - III. Spontanea nelle rupi dell'Italia mediterr. inferiore. È coltivata frequentemente per ornamento. Vulgo: Viole della Madona.

C I. sempervirens L. Agg. p. 9 (1508. 1773)
I - III Rupicola, sassicola nell'Italia merid. Coltivata come la precedente e talora subspontanea, a Selva 1866.
Vulgo. Viole della Madona.

CA I. umbellata L. Prosp. p. 21 (1514. 1563)
I - III. Rupicola, sassicola, qua e là in Italia. Coltivata per ornamento e talora avventizia, a Selva 1863, nelle varr. a fiori bianchi e rosei.

CA I. amara L. Prosp. p. 21 (1515. 1785)
I - III Pratense, arenicola. Boschetti a Mogliano (Mayer in Bertoloni); Crocetta, 1865. È anche coltivata per ornamento a Selva, Treviso ecc. È quindi probabile che anche a Mogliano e Crocetta non fosse che avventizia.

Ionopsidium DC.

CA I. acaule (Desf.) Reichenb. Agg. p. 8 (1494 A. 1865)
I - III Oriundo del Portogallo. Coltivato in qualche giardino e avventizio in quello ex-Giacomelli alle Barche in Treviso, Apr. 1865.

Biscutella Linn.

581 B. levigata L. Prosp. p. 21 (1520. 1553)
I–IV Pascoliva, praterse, sassicola, rupestre. Selva, Volpago, Vittorio.... dal 1861; Savazza (anche Contarin. 1825!); Grappa (Montini!) – Var. lucida (Bonato. 1812; DC. 1813). Grappa (Montini; colli di Vittorio (anche Dom. Sauardo, 1890). Var obcordata Rchb. (= var. integerrima Sacc. l.c.) Prati a Camalò e Selva – Var. coronopifolia (L.) Grappa (Contarin. 1825!) – Fra le diverse varietà esistono, a quanto sembra, tutti i gradi di passaggio. – Var. ambigua (DC.). Radici del Grappa e Boccaor (Bolz. MS.)

Fam. 49 Papaveraceae
Subf. Fumarieae

Fumaria (Tourn.) Linn.

582 F. officinalis L. Prosp. p. 16 (1522. 1415)
I–III. Ruderale, ortiva, sepincola, segetale. Tutta la provincia: Selva, Treviso, Camalò, Volpago, Vittorio.... dal 1861 – Var. parviflora Lam. (1550). Prosp. p. 16. Orti a Selva, 1861; fra Valà e Riese presso Castelfranco (Bolz. MS.)

R F. capreolata L. Agg. p. 7. (1521. 1583)
I–III. Ruderale, murale, sepincole. Nelle provincia di Treviso (Fracchia herb.!). Mancando l'indicazione precisa del luogo, è lecito dubitare dell'inquilinato nella provincia di Treviso.

Corydalis Vent.

583 C. lutea (L.) DC. (1525. 1561)
IV Sassicola. M. Grappa (Zanardini 1827!)

584 C. solida (L.) Sw. (1526. 1745)
III–IV. Nemofila, eliofoba. Fra Crocetta e il prato del Cansiglio (Pamp.

in Bolz. n. 13); M. Cimone sopra Vittorio, M. 1200 (Pampanini in Fl. ital. exs. n. 829). È sempre la var. digitata (Pers.)

585 C. cava Schw. et Koert. Prosp. p. 16 (1527. 1532)
II – III. Nemofila, sepincola. Pongano, Selva, bosco Montello ... dal 1861; Grappa (Zanard. 1827!); valle Boaaor alle Tezze (Bolz. MS.). La fm. albiflora vive promiscuamente colla rosea.

Subfam. Papavereae.

Chelidonium (Tourn.) Linn.

586 Ch. majus L. Prosp. p. 16 (1529. 1415)
I – IV Ruderale, murale, sepincolo. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Vittorio .... dal 1860. Volgo: Inzendonia (corr. di Celidonia o da inzèndar dar bruciore)

Papaver (Tourn.) Linn.

587 P. alpinum L. Agg. p. 6 (1533. 1773)
IV – V Sassicolo, rupestre. M. Grappa (Sprangi!); Collalti (Béreng.! A. Giacomelli!) — Var. flaviflorum Koch. Grappa (Sprangi 1833!)

588 P. hybridum L. Prosp. p. 15 e. p. (1534. 1640)
I – III Campestre, segetale. Selva, Volpago, Camalò ... 1861 — Var. Argemone (L.) (1583 R.). Segetale a Mogliano (Mayer in herb. Pat.!); a Treviso (Fracchia!) — Var argemonoides Ces. (P. apulum Ten.) Agg. p. 6. Monfumo (Bolz. MS.); Castelfranco (Béguin. 1909!); Selva, e presso Treviso, 1864.

589 P. Rhoeas L. Prosp. p. 15 (1535. 1415)
I – III Segetale, campestre, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Treviso, Vittorio ... dal 1861; Conegliano (Béreng. 1844!) — Var. integrifolium (DC.). Mogliano, raro (Mayer in Bertol.); Selva 1864 — Var. strigosum (Boenn.). Vittorio nella nuova via Cavallotti, 1910 — Volgo: Rosolina (tutte le forme)

CA P. somniferum L. Prosp. p. 16 (1556. 1415 R) Dalle Italie meridionali
I – III. Probabilmente derivata dal tipo selvatico setigerum (DC). È coltivato comunemente per ornamento in più varietà e spesso si inselvatichisce qua e là come a Treviso, Selva, Vittorio ... Dal 1862. Volgo Papavaro.

Fam. 50 Nymphaeaceae

Nymphaea (Tourn.) Linn.

5190 N. alba L. Prosp. p. 15 (1537. 1415 R.)
I – III Palustre, idrofila, natante. Comune nella provincia bassa, come a Roncade, presso Treviso ... Dal 1862; Cà Tron (Dirutz. 1915!); laghi di Revine (anche Trotter n. 62 e Zaniol n. 65. Volgo: Capelagi; Tazeri.

Nuphar S. et S.

5191 N. luteum (L.) S. et S. Prosp. p. 15. (1538. 1415.)
I – III Palustre, idrofila, natante. Comune nelle provincie basse, come a Roncade, presso Treviso ... dal 1862; Cà Tron (Dirutz. 1915!); laghi di Revine (anche Trotter n. 62., Zaniol n. 65). Volgo. Capelagi, Tazeri. Zali.

Fam. 51 Ceratophyllaceae

Ceratophyllum Linn.

5192 C. demersum L. Prosp. p. 54. (1539. 1754)
I – II. Idrofila, palustre, foveale. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Treviso, Vittorio ... dal 1862; Soligo, S. Bona (Facchin!) Resana (Beg. 1909!) — Var. submersum (L.). Qua e là colla specie.

Fam. 52 Ranunculaceae

Clematis (Ruppius) Linn.

593 C. alpina (L.) Mill. Prosp. p. 9 (atragene alpina L.) (1540. 1595)
IV–V. Sassicola, rupestre. B. Cansiglio e Col Vicentin (Pamp. in Bolz. n. 13; Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Parolini, Montini; Spranzi!, Visiani!).

594 C. Viticella L. Prosp. p. 9 (1542. 1320)
I. Sepincola, dumale: Mogliano, Preganziol, Moniego pr. Treviso.... dal 1861; Gorgo, Selvana (Fracchia!); Salgareda (Contarini 1825!); Cà Tron (Fiori 1896! Diratz. 1915!)

595 C. recta L. Prosp. p. 9 (1544. 1532)
II–IV. Nemofila, dumale. Corolo, Nervesa, Cornuda, Pederobba (anche Bég. 1909!), Vittorio .... dal 1862; Savassa, Piai e Cozzuolo (Pamp. n. 44).

596 C. Vitalba L. Prosp. p. 9 (1546. 1532)
I–IV Sepincola, dumale, nemofila. Selva, Montello, Cornuda, Vittorio .... dal 1860; Treviso (anche R. Rogger!) — Var. integrata DC. Prosp. p. 9. Promiscua, ma un pò più rara della specie: Selva 1862–1906; Cozzuolo (Pamp. in Bolz. MS.); Cà Tron (Diratz. 1915!) — Var. banatica Wierzb. (filamentis aureis!). Siepi da Mura a Tovena, rara (Pamp. n. 43 et Fl. ital. exs. n. 1685) — Vulgo: Videsòn.

Thalictrum (Tourn.) Linn.

597 T. aquilegifolium L. Prosp. p. 9. (1547. 1550)
I–IV. Ripario, sepincolo, eliofobo. Presso Treviso, Selva, Vittorio, Cornuda, Cansiglio (anche D. Sacardo, 1897!)... dal 1861; sopra Asolo e Crespan Bolz. n. 11, Zanard. 1827!)

598 T. foetidum L. (1550)
Var. minus (L.) Prosp. p. 9 (come sp.) (1583). III–IV Sepincolo, dumale, pascolivo,

Pederobba, Valdobbiadene, Vittorio ... dal 1861; sopra Borso (Bolz. n. 11); Frontal di Crespan (Bolz. MS.); Fais, Piai (Contarini 1825!) — Var. elatum (Jacq.) Agg. p. 5 (c. spec.) (1770). Colli di Vittorio 1870; Asolo (Bolz. n. 11); alveo del Piave (Minio n. 35)

599 T. angustifolium Jacq. Prosp. p. 9 (1551. 1532)
I – IV. Ripario, sepincolo, igrofilo. Selva, Volpago, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Cansiglio (anche D. Sacc. 1897!); Salgareda (Contarini, 1825!), Cà Tron (Dirat. 1915!); Ponte di Piave, Resana (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) — Var. flavum (L.) Prosp. p. 9 c. spec. (1320). Selva, Vittorio, Cornuda ... dal 1861; colli Asolani (Bolz. n. 10); sopra Borso (Bolz. MS.); Resana (Bég. 1909!) — Var heterophyllum (Lejeune) Colli di Masèr (Bolz. MS.)

Anemone (Tourn.) L.
600 A. alpina L. Prosp. p. 10 (1552. 1551)
IV – V. Pascoliva. Grappa (Sternb. 1804, n. 59; Pasolini, Montini, Sprangi!, Zanardini 1827!, Coban 1906!, Zanardini 1827!); Col Vicentin (Pamp. n. 44). Var. Burseriana (Scopoli). Cima del Grappa (Bolz. MS) — Var. sulphurea (L.). Grappa (Sternb. 1804, n 59, Montini herb. Vacc. n. 64)

601/71 A. vernalis L. Agg. p. 5 (1553. 1785)
IV – V Pascoliva, sassicola. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64).

602 A. Pulsatilla L. Prosp. p. 10 (1554. 1532)
I – III. Pratense, pascoliva, murale. Selva, Camatò, Belvedere, Volpago, Selva, Vittorio ... dal 1861; Conegliano (Béreng. 1843!); Crespan, Romano (D. Montini!); Ardosa (Zanardini 1827!); colli Asolani (Zanard. 1828, Bolz. n. 11); Cozzuolo, Carpesica (Pamp. n. 44) — Var. montana Hoppe. Vittorio 1903!; Masèr e Borso Fagarè, Asolo (Bolzon MS.) — Var pratensis (L.) (1566) Colli di Asolo (Bolz. n. 11).

603 A. narcissiflora L. Prosp. p. 10 (1555. 1563)
IV - V. Pascoliva, rupestre. Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Parolini, Montini, Spranzi!, Zanardini 1827!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.); Cansiglio (Bérenger 1840!).

604 A. ranunculoides L. Prosp. p. 10 (1557. 1583)
II - III. Pascoliva, nemofila, eliofoba. Montello nel luogo dell'antica Certosa, detto ai Frati, 1861; Asolo, Castelcucco, Monfumo, Crespan, Monfenera (Bolzon n. 11); Crespan, Ardosa (Zanard. 1827!); Vittorio, Conegliano (Pamp. n. 38); M. Zoel sopra Fregona (Contarini 1825!)

605 A. nemorosa L. Prosp. p. 10 (1558. 1532)
II - IV. Nemofila, sepincola, eliofoba. Montello, copiosa, Paderno dal 1861; Asolo, Fietta, Monfenera 1895 (Bolz. n. 11 e MS.) — fm. purpurea DC. Colli Asolani (Bolz. MS.)

606 A. trifolia L. Prosp. p. 10 (1559. 1532)
II - IV. Nemofila, eliofoba. Montello, Colfosco, Susegana, Pederobba... dal 1859; Asolo (Fiori 1897!, Bolz. MS.); Colli di S. Martino pr. Asolo (Zanard. 1827!); Monfumo, Castelli, Crespan, Monfenera (Bolz. n. 11); sopra Lago-Revine a 240 m. (Pamp. in Fl. it. exs. n. 834); Salgareda (Contar. 1825!) Var. minor Val di Lièvre. Boschetti di Nogarolo pr. Targo (Pamp. in Bolz. MS.)

607 A. Pittonii Glowaki (A. nemorosa × trifolia). ~~Pr~~ (1559. 1903)
III Nemofila. Vittorio (Pamp. in Fiori IV p. 104)

608 A. silvestris L. (1561. 1562)
IV. Pascoliva. Collalti, ai confini del Trevigiano (Spranzi! Cfr. Fiori I p. 497)

C A. hortensis L. (1563. 1551)
I–III Spontanea qua e là in Italia. Coltivata frequentemente per ornamento, specialmente la var. pavonina (Lam.) Vulgo: Anemolo.

C A. coronaria L. Prosp. p. 10 (1564. 1532. R.)
I–III. Nativa di Grecia e Turchia. Coltivata frequentemente per ornamento. Vulgo: Anemolo.

609 A. Hepatica L. Prosp. p. 10 (Hepatica triloba Volk.) (1565. 1415)
II–IV. Nemofila, lepincola, eliofoba. Selva, Giavera, Montello, Vittorio... dal 1859. Colli Asolani (Zanard. 1827!, Bolz. MS.) – Fm. roseiflora Sacc. (1863) (= rosea Neum. 1885). Nel Montello, rara, 1862 – Var. major Bolz. Asolo presso l'Acqua della Regina (Bolz. MS.) – Var. marmorata T. Moore. Asolo, sul colle Bacciocco (Bolz. n. 26)

Adonis (Ruppius) Linn.

610 A. annua L. (1568. 1563)
I–III. Spontanea in più parti d'Italia. Coltivata comunemente per ornamento e talora avventizia, a Selva, Treviso... dal 1862 Vulgo: Gioja de sangue – Var. aestivalis (L.). Prosp. p. 10. I–III. Segetale a Sant'Andrà di Povegliano, 1861, non comune

Ranunculus (Tourn.) Linn.

611 R. aquatilis L. Prosp. p. 10 (R. pantothrix Brot.) (1572. 1752)
Var. trichophyllus (Chaix) Agg. p. 5 (R. paucistamineus Tausch)
I–III. Idrofilo, natante. Selva, Volpago, Falze (anche F. Sacc. 1890!), Treviso, Vittorio... dal 1862; Pederobba (Bég. 1909!); Piave (Minio n. 35) – Var. caespitosus (Thuill.). Agg. p. 5. Sponde dei laghetti di

Revine, 1869 – Var. Cesatianus Cald. Laghetti di Revine (Trotter, n. 62!) – Var. foeniculaceus (Gibb.), Agg. p. 5 (R. divaricatus Schranck = R. circinnatus Sibth.). Selva, Paderno, S. Palè, Treviso e Roncade 1868, Cà Tron (Fiori 1897!)

612 R. Seguieri W. Prosp. p. 12 (1579. 1718)
IV Rupicolo. Grappa (Montini in Bertol. e in herb. Kellner!, Zanard!, Parolini in herb. Contarini!)

613 R. aconitifolius L. Agg. p. 5 (1580. 1550)
III–IV. Pascolivo, igrofilo. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); sul M. Cesen sopra Valdobbiadene (Bolz. n. 13) – Var. platanifolius (L.). Grappa nei rovesci dell' Archeson del Grappa (Bolz. n° 18 e MS.)

614 R. Lingua L. Prosp. p. 11. (1582. 1558)
I–III. Palustre, idrofilo. Quinto lungo il Sile (Fracchia 1837!); Treviso al Sile 1868 (anche Béreng. o Giacomelli 1837!); Laghetti di Revine (Trotter n. 41!, Pamp. n. 44).

615 R. flammula L. Agg. p. 5 (1583. 1563)
I. Palustre, foveale sipario. al Sile presso Quinto 1863; paludi di Roncade 1866 – Var. reptans (L.). A Quinto 1863, col tipo.

616 R. ophioglossifolius Vill. Prosp. p. 11.
I Palustre, foveale. Fossati di Mogliano (Mayer in Bertol.); Altino presso Roncade (Kellner!); paludi di Roncade 1866.

617 R. Ficaria L. Prosp. p. 12 (Ficaria ranunculoides Moench) (1586. 1532)
I–IV. Campestre, ortiva, marginale. Quasi tutta la provincia: Treviso, Ponzano, Selva, Vittorio ... dal 1861; Asolo, Monfumo, Castelli (Bolz. n. 11) Varia molto nella statura e nella grandezza dei fiori.

618 R. Thora L. Prosp. p. 11 (1588. 1415)
IV–V. Rupestre, pascolivo. Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Parolini, Montini in Bertol., Vacc. n. 64, Contarini, 1825!) Bouaor del Grappa (Fiori 1897!), Marcheson del Grappa (Bolz. MS.)

C R. asiaticus L. Prosp. p. 12 (1592.)
I–III Oriundo di Candia, Asia minore, Persia. Coltivato per ornamento e talora fuggiasco, dal 1862. Vulgo: Ranuncolo.

619 R. cassuticus L. (1598)
Var. auricomus (L.) Prosp. p. 11 (1785)
II–III Nemofilo, igrofilo. Montello, non comune, dal 1861; colli di Asolo (Fiori 1897!, Bolz. MS.)

620 R. repens L. Prosp. p. 11 (1599. 1554)
I–IV Igrofilo, ripario, pratense. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Vittorio .... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.) ♀ Var. plenus Sacc. Qua e là spontaneo, ma spesso coltivato per ornamento, come a Selva, Treviso, Vittorio. Vulgo: Boton d'oro. ♀ Vulgo: Piegorin, Pievorin.

621 R. geraniifolius Pour. (1602)
Var. montanus (L.) Prosp. p. 11 (1754)
III–IV Nemofilo, pascolivo. Grappa (Contarini 1825!, Spranzi! Montini in Bertol., Coban 1906!, Vaccari n. 64); Cansiglio (Béreng. 1838!) Collalti (Dom. Montini!); Valdobbiadene (Béreng! Fracchia!); Ardosa e Grappa (Zanard. 1827!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.) — Var. nanus Bouv. Grappa (Bolz. MS.)

622 R. polyanthemus L. (1603)
Var. nemorosus (DC.) Prosp. p. 12 (1821)
I–IV Pratense, nemofilo. Giavera, Montello dal 1862; Fais sopra Vittorio (Contarini 1825!); Asolo (Bolz. n. 11); Grappa (Vacc. n. 64); Pederobba, Ponte di Piave, Negrisia, Resana (Bég. 1909!) — Var. pauciflorus DC. (= R. aureus Schleich. Grappa (Montini in Vacc. n. 64)

623 R. acer L. Prosp. p. 11 (1604. 1415)
I – IV. Pratense, marginale, nemoflo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio, Treviso ... Dal 1860; Pederobba (Bég. 1909!) Grappa (Vacc. n. 64) – Varia secondo i luoghi e la stagione: mult. p.-dens (PC. Selva anche Grappa, Bolz. MS.), serotinus (Wimm. et Grab.) a Cogniolo (Camp. in Bolz. MS.) ed altrove) Trevigi: pare grantenera, le fm. pleniflora, d'orto. Volgo Piegorin, Pievorin.

624 R. sanguineus L. Prosp. p. 11 (1605. 1754)
II – IV. Nemoflo, igroflo, ehiofobo. Montello, Dal 1861; Asolo (Fior. 1897!, Bolz. MS.); Collalto (D. Montini!).

625 R. bulbosus L. Prosp. p. 11 (1607. 1550)
I – II Pratense, marginale, ripario. Quasi tutta la provincia. Selva, Giavera, Vittorio ... Dal 1861; Cogniolo (Camp n. 36); Ponte d. Piave (Bég. 1909!); Grappa (Vacc. n. 64) – Var. valid.-pubens (Jord.) Val Manera del Grappa sopra Cavaso (Bolz. MS.) – Var. Aleae (Willk.) (= R. neapolitus Cald.) Colle-Asolano (Bolz. n. 10) – Var. Bendocleae (Rouy) Grappa, Monfenera (Bolz. MS.) – Volgo: Piegorin, Pievorin

626 R. sardous Crantz. Prosp. p. 11 (R. Philonotis Retz) (1608. 1532. R)
I – IV. Ripario, marginale, igroflo. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Treviso, Pederobba ... Dal 1861; Ponte d. Piave, Zenson (Bég. 1909!) – Var. Tabarti (Zapegr.) [floribus dimidio minoribus] Ripario a Selva (Bolz.) Var. intermedius (Poir.) [major; fol. inferioribus minus profunde divisis]. A Selva, 1864, Vittorio 1909 – Var. pseudobulbosus Schk. Orto Asolo (Bolz. MS.)

627 R. parviflorus L. Prosp. p. 12 (1609. 1745).
II – III. Campestre, segetale. Selva, nei camp. al margine del Montello, 1862; Presso Asolo (Bolzon. n. 11).

629 R. arvensis L. Prosp. 12 (1611. 1550) [a cap. I – III Campestre segetale. Var. ~~spicatus (genuinus Koch)~~. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Vittorio ... Dal 1861; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) – Var. tuberculatus DC. Castelfranco Resana (Bég. 1909!), strada da Valla a Castelfranco (Bolz. n. 17), camp. d. Asolo (Zan

629 R. sceleratus L. Prosp. p. 12 (1612. ~~1602~~ 1550)
I–III Igrofilo, ripario. Selva, lungo la via Schiavonesca, raro, 1861.

Caltha (Ruppius) Linn.

630 C. palustris L. Prosp. p. 12. (1613. 1532)
I–IV. Igrofila, subpalustre, foveale. Montello, alle Campagnole 1861, Ceneda e Serravalle di Vittorio; sponde del Sile presso Treviso (Béreng. 1837!) Asolo, Pagnano, Castelcucco (Bolz. n. 11 e MS.); Sorgenti del Meschio (Pamp. in Bolz. n. 13); Cà Tron (Fiori 1896!, Diratz. 1915!) – Vulgo: Peca de mussa.

Trollius (Ruppius) Linn.

631 T. europaeus L. Agg. p. 6 (1614. 1550)
IV Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Bosco Cansiglio 1869 (anche D. Saccardo 1897!), Loc a mezzo monte Pizzoc (Trotter 1915!), M. Oro, M. Eudimione (Bolz. n. 13 e 17); Campo del Grappa (Sternb. 1804, n. 59), Collalti (Dom. Montini!) – Var. altissimus (Crantz) Cima del Grappa e Punta Brentale sopra Cavaso (Bolz. n. 17)

Eranthis Salisb.

632 E. hiemalis (L.) Salisb. Agg. p. 6 (1615. 1550)
II–III Campestre, eliofobo. ~~S. Felicita~~ Vallata di S. Felicita (S. Filà) ai confini fra il Vicentino e Trevigiano (Parolini herb.)

Helleborus (Tourn.) Linn.

633 H. viridis L. Prosp. p. 12. (1616. 1415)
I–IV Nemofilo, eliofobo, igrofilo. Montello, Vittorio dal 1862; Carbonera (Béreng. 1840); Asolo Bolz. 1896!; Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64) – Var. occidentalis Reut. Prati di Agnolezza sul M. Pizzoc (Pamp. n. 36) – Var. odorus (Kit.). Montello 1859; Pederobba (Béguinot, 1909!); Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.). È da verificarsi se la forma tipica citata non sia piuttosto da riferirsi interamente alla var. odorus.

604 H. niger L. Prosp. p. 12 (1617. 1528)
II–III Nemofilo, eliofobo, igrofilo. Montello nelle vallate umide e a Cornuda, dal 1861; Masèr, Cornuda, Vittorio (Pamp. n. 40); Monfumo (Montini in Bertol.); Corbanese di Vittorio (Pamp. n. 44) — Var. altifolius (Hayne) Boschi di Rolle pr. Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 18)

Isopyrum Linn.
605 I. thalictroides L. Agg. p. 6 (1620. 1673)
II–III. Nemofilo, eliofobo. Valdobbiadene (Bérenq. 1846!); Feletto (Pamp. in Bolz. n. 13); lungo il Piovison presso Revine (Pamp. n. 36 e in Fl. ital. exs. n. 449); Bocaor sopra Fietta (Bolz. n. 71); Grappa Fiori, 1897!)

Nigella Linn.
C N. damascena L. Prosp. p. 13 (1621. 1415)
I–III. Indigena in alcune regione d'Italia. Coltivata per ornamento e talora fuggiasca, come a Selva, Vittorio, 1861; presso Asolo (Bolz. n. 23)
Volgo: Panze de munega.*)

Aquilegia (Tourn.) Linn.
606 A. pyrenaica DC. (1625. 1713)
Var. Einseleana F. Schultz. Agg. p. 6 (A. pyrenaica), A. alpina, viscosa, pyrenaica di molti aut. Veneti.
IV–V. Rupestre, igrofila. Cansiglio (Bérenq. 1838!); Tovena al passo S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 203); Grappa (Vacc. n. 64, Bolz. MS.)
607 A. vulgaris L. Prosp. p. 13 (1626. 1415)
II–IV. Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello, Cornuda, Covolo, Vittorio, Pederobba... dal 1861; Colle di S. Martino di Ceneda (Contarini, 1825–!); Cansiglio, a m. 1000, Dom. Sacc. 1897!) — Var. atro-violacea Avé-Lall. Grappa (Bolz. MS.) Si coltiva spesso per ornamento in più varietà. Volgo: Aquilegia, Braghesse da prete**)

(Nota) *) e **) Ritengo che questi due vernacoli siano sorti ed usati esclusivamente nel paese di Selva.

Delphinium (Tourn.) Linn.

628 D. Consolida L. Prosp. p. 13 (1627. 1532)
I–III. Campestre, segetale. Selva, Camalò, Volpago, Giavera, Vittorio.... dal 1859, comune. Vulgo: Spironelle salvareghe o salvadeghe

CA D. Ajacis L. Prosp. p. 13. (1628. 1550)
I–III. Spontaneo in talune regioni d'Italia. Coltivata spesso per ornamento e frequentemente fuggiasca e avventizia p. e. a Selva, 1862, Vittorio nella via Cavallotti, 1907... Vulgo. Spironella. Spironele.

629 D. elatum L. (1633)
Var. montanum (DC.) Agg. p. 6 (1713). IV Pascolivo, dumale. Grappa (Spranzi!)

Aconitum (Tourn.) Linn.

640 A. variegatum L. Prosp. p. 13. (1634. 1532)
I–IV. Nemofilo, dumale, sepincolo. Montello verso il Piave, Colfosco, Covolo, Cornuda ... dal 1862; Asolo (Zanard. 1827!, Bolz. 1893!); Treviso lungo il Botteniga (Béreng 1837!, Kellner 1841, R. Rogger!); Cozzuolo (Pamp. n. 44.), letto del Piave (Minio n. 35). Var. paniculatum (Lam.). Prosp. p. 13 c. sp. (1565) Nemofilo, dumale nei colli di Vittorio (M. Altare 1915!); Cansiglio (anche Bereng!); Colli Asolani o di Cornuda (Bolz. n. 12 e MS.); Collalti (D. Montini!) – Var. Cammarum (L.) Prosp. p. 14 (var. cernuum (Wulf.)) a S. Palè (Pelagro) pr. Treviso (Fracchia!); Cansiglio 1867 (fm. Störkeanum Rchb.); Asolo e Grappa (Bolz. MS.); var. depauperatum Bonv. Colli di Masèr e Cornuda (Bolz. MS.)

641 A. Napellus L. Prosp. p. 13 (A. vulgare DC.) (1635. 1415)
III–IV. Nemofilo, dumale. Sopra Serravalle 1912; Grappa (Biggz. 1878!); Cansiglio 1869. Vulgo: Napel.

642 A. Anthora L. Prosp. p. 13 (1636. 1558)

IV Pascolivo, rupestre, Sassicolo. Monti sopra Ceneda e Serravalle di Vittorio (Fracchia!); M. Grappa (Zanardini, 1827!) — Ora la specie sembra quasi scomparsa dai luoghi indicati e da molti altri del Veneto e la causa, secondo il Goiran (Fl. Veron. II p. 30) sta nel fatto che i contadini e rizotomi l'hanno quasi distrutta per levarne le radici adoperate ad uso veterinario.

643 A. Lycoctonum L. Prosp. p. 14 (1637. 1550)
II–IV Nemofilo, dumale. Montello, Cornuda, Pederobba, Vittorio, Cansiglio... dal 1861; Grappa (Zanard. 1827!); M. Oro, M. Boscon, Val dei Labi del Grappa, Pieve di Soligo (Bolz. n. 11); Refrontolo (Pamp. n. 44) — Var. pyrenaicum (L.). Prosp. p. 14 (c. spec.). Grappa (Sternb. 1803, n. 59 e Sec. Rchb. Fl. excurs.; Montini, Vaccari n. 64) — Var. pauciflorum Bonv. Bosco di Fagarè, pr. Montumo e Cornuda (Bolz. MS.)

Paeonia (Tourn.) Linn.
644 P. officinalis Linn. (1638. 1533)
Var. peregrina (Mill.) Prosp. p. 14 (P. officinalis Retz).
III–IV. Dumale, pascoliva. Grappa (Stern. 1803, n. 59); M. Monfenera, M. S. Augusta di Serravalle... dal 1862; M. Crep, Follina, Miane (Béreng. 1843!); S. Lorenzo di Vittorio (Pamp. n. 44); canale S. Boldo e Grappa (Bolz. MS.) — Var. pleniflora. Coltivata frequentemente per ornamento. Vulgo: Peonia — Var. mascula L. Agg. p. 6 (P. corallina Retz). Monti di Pore (Parolini, Montini in Bertol.); M. Grappa ai Collalti e al Boscon di Borso (Vaccari in Bolz. MS.)

Actaea Linn.
645 A. spicata L. Prosp. p. 14 (1639. 1532. R.)
II–IV. Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello, nelle località dette Fondabis, Tavaràn, Castel sotto-terra, 1861; Pederobba, 1864; Follina sul Praderatico (Béreng. 1842!); Cansiglio, m. 1100 (Dom. Saccardo 1897!); Grappa Ant. Saccardo, 1884; Vacc. n. 64); alla malga Domadòr del Grappa (Bolz. MS.)

Fam. 53 Berberidaceae

Berberis (Tourn.) Linn.

646 B. vulgaris L. Prosp. p. 14 (1641. 1415)
II – IV Nemofilo, sepiario, dumale, alveale. Montello verso il Piave, Covolo, Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene ... dal 1861; Asolo, Monfumo, M. Oro (Bolzon MS.). Vulgo: Spin dalle crose, Berberi.

Epimedium Linn.

647 E. alpinum L. Prosp. p. 15 (1640. 1566)
II – IV. Nemofilo, eliofobo. Montello, Cornuda, Vittorio ... dal 1862; Asolo Monfumo (Bolz. MS.)

Fam. 54 Droseraceae

Drosera Linn.

648 D. rotundifolia L. Prosp. p. 25 (D. septentrionalis Turra e.p.), Agg. p. 10
II – IV Igrofila, palustre. Fra gli Sfagni nei laghetti di Revine 1869; e del Cansiglio 1869 (anche Bérenger 1838!)

R D. longifolia L. Agg. p. 10 (D. septentrionalis Turra e.p.) (1643. 1835)
II – IV – Igrofila, palustre. Nelle paludi in prossimità del Piave (Turra, Veget. Ital. indig. MS.). Comprendendo la D. septentrionalis di Turra anche la D. longifolia, citai pure questa specie, che però rimane dubbia e da confermarsi.

Fam. 55 Saxifragaceae

Parnassia (Tourn.) Linn.

649 P. palustris L. Prosp. p. 24 (1646. 1532)
I – IV. Igrofila, pratensa, pascoliva, subpalustre. Covolo, Cornuda, Falzè, Montello (anche Bizz. 1881!), Vittorio ... dal 1861; Quinto, Carbonera (anche Fracchia!); Grappa (Vaccari n. 64); Asolo, Monfumo, M. Oro (Bolz. MS.)

Saxifraga (Tourn.) Linn.

650 S. rotundifolia L. Prosp. p. 59 (1648. 1532)
IV - V. Rupestre, sassicola. Cansiglio, 1869 (anche Béreng.! D. Sacc. 1897!); Collalt. (Dom. Mont. 1872!); Grappa (Gio. Montini in Bertol., D. Montini!, Bizzozero 1878!, Cobau 1905!, prof. Antonio Sacc. 1884!)

651 S. Tridactylites L. Prosp. p. 59 (1649. 1631)
I - IV. Murale, campestre, Selva, Volpago, Treviso, Vittorio ... dal 1861; Valdobbiadene (Favero 1842!); Asolo (Bolz. MS.) — Var. exilis Pollini Agg. p. 19. Col tipo nei luoghi più magri; Fratta di Tarzo (Pamp.) — Var. adscendens (L.), Agg. p. 19 (S. controversa Sternb.). Rupicola. Cansiglio (Bereng. 1843!: individui alti 16-18 cm!)

652 S. petraea L. Agg. p. 19. (1650. 1566)
IV - V. Igrofila, eliofoba, rupicola. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1842!); M. Pizzoc, S. Boldo (Pamp. n. 38); Valdobbiadene (Favero, 1846) Campo sul Grappa (Sternb. 1804, n. 59) — Var. rupestris Willd. Festone umide del Grappa (Bizz. 1878!) Cfr. per le specie e var. Béguinot n. 2.

653 S. muscoides All. Prosp. p. 59 (1658. 1553)
IV - V. Rupestre, xerofila. Cansiglio (Palantina) 1869; M. Cimone sopra il Cansiglio (Béreng. 1843!); Grappa (Montini in Bertol., Spranzi!)

R S. androsacea L. (1660. 1606)
IV - V. Rupicola, eliofoba. Grappa (Spranzi!). La località è da confermarsi.

R S. Stellaris L. (1664. 1553)
IV. Igrofila, eliofoba. Grappa (Spranzi!). Da confermarsi la località

654 S. bryoides L. (1667. 1606)
IV Rupicola. Cansiglio (Béreng. 1838! sub Sax. sedoides)

655 S. autumnalis L. (1666. 1563) Prosp. p. 58 (S. aizoides L.)
II – IV Rupestre, pascoliva, alveale. Grappa (Montini in Bertol., Sternb. 1803, n. 59, Favero!, Cobau 1905!, Sprauzi!, Bizzozero 1878!, Contarini 1825! Vacc. n. 64); Cansiglio 1869 (anche D. Sacc. 1897!); sopra Possagno (Favero 1844!); alveo del Piave a Covolo, certo discesa dai monti, 1863!

656 S. cuneifolia L. Prosp. p. 58 (1668. 1554)
III – IV. Rupestre, sassicola. sopra Possagno (Montini, Zanardini in Bertol.) Sprauzi! Fracchia!); Colli Asolani (Zanardini! Bolz. n. 16); M. S. Augusta sopra Serravalle 1867; Cansiglio, M. Crep sopra Miane (Béreng. 1843!) M. Castelet di Miane (Favero 1844!); Col maggior sopra Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 16).

657 S. mutata L. Agg. p. 19 (1672. 1760)
III – IV. Rupicola. Sopra Possagno (Béreng. 1844!); Grappa (Montini in Bertol., Bizzoz. 1878!, Contarini 1825!, Antonio Saccardo 1884!; Boccaor (Bolz. MS.)

658 S. crustata Vest. Prosp. p. 58 (1674. 1553)
III – IV. Rupicola, eliofoba. Sopra Serravalle e Tregona 1862; Cansiglio 1869 (e Béreng. 1840!); Col Vicentin e Pizzoc (Pamp. n. 38)

659 S. Aizoon Jacq. Prosp. p. 58 (1675. 1550)
IV – V. Rupicola, eliofoba. Grappa (Sternb. 1803 n. 59, G. Montini in Bertol., Dom. Montini 1872! Cobau 1906!, Bizzoz. 1878!, Bolzon, 1893!, Antonio Saccardo 1884!, Contarini 1825!); Cansiglio (Dom Sacc. 1897!) –
Var. carinthiaca (Schott). M. Pizzoc (Pamp. in Bolz. MS.)

660 S. Hostii Tausch (1828) Prosp. p. 58 (S. Cotyledon Sacc., Bolz. etc. non L.)

S. elatior M. et K. (1831)
III–IV Rupicola, murale, eliofoba. Vittorio a Serravalle 1862, Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); S. Lorenzo di Vittorio (Pamp. n. 38); Valdobbiadene (Favero, 1840!); Pederobba (Bég. 1909!); Grappa (Zanard. 1829!, C. Massal. 1877!, Bolz. n. 11, Vaccar. n. 64, Sprangi!) Collath. (Dom. Montini 1872!) — Sec. Engl. Monogr. Saxifr. p. 239 la S. Hostii potrebbe considerarsi come S. elatior × S. Aizoon.

661 S. caesia L. Agg. p. 19 (1680. 1595)
IV. Rupicola, igrofila. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838! e Dom. Sacc. 1897!); sopra Possagno al M. Domaor (Favero! Béreng. 1844!) — Var. ~~Rocheliana (Sternb.) fm.~~ minor C. Mass. Bot. Centralbl. 1882, IX, n. 73 ♀ Bocchette del Bocaor di M. Grappa (Bizzoz. 1877!) — Var. squarrosa (Sieb.) Grappa (G. Montini sec. Vacc. n. 64 ♯, Zanardin. 1827!)

662 S. Burseriana L. Prosp. p. 58 (1682. 1754)
IV–V. Rupicola. Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Montini e Kellner in Bertol.); Bocaor (Bizz. 1878!); rupi montane sopra Serravalle 1870; Col Vicentin, m. 1770 (Pamp. n. 44).

Chrysosplenium (Tourn.) Linn.
663 C. alternifolium L. Prosp. p. 59 (1687. 1415)
II–IV. Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello dal 1861; Cansiglio 1869 (e Bég. in Fl. it. exs. n. 2063!); Breda presso Asolo (Bolz. n. 10) M. Zoel sopra Fregona e Cansiglio (Contarini 1825!)

Hydrangea Linn.
C H. Hortensia DC. (1689 A. 1806)
I–III. Originaria della Cina. Coltivata comunemente per ornamento. Vulgo. Ortensia.

♀ (S. Rocheliana Sternb. fm. minor), S. squarrosa β Grappae Mass. Bull. Soc. bot. ital. 1911, p. 29.

Ribes (Ruppius) Linn.

C R. Grossularia L. Prosp. p. 58. (1690. 1550)
I–III. Nemofilo, sepiario. La var. indigena (R. Uva-crispa L.) cresce nelle Alpi: Nel Trevigiano si coltiva soltanto il tipo, assai comunemente, ed è talora subspontanea, come a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1861. Vulgo: Ua spina, Ua spinela, Ua grespina.

C R. rubrum L. Prosp. p. 58 (1694. 1550)
I–III. Nemofilo, sepiario. Nasce spontaneo sulle Alpi, ma è più spesso coltivato e talora inselvatichito, come a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1861. Vulgo Ua Ribes.

664 R. alpinum L. Agg. p. 19 (1695. 1785)
IV–V. Nemofilo, eliofobo. Cansiglio, comune 1869 (anche Pamp. n. 44); sopra Valdobbiadene (Béreng. 1844!); Col Vicentin, a M. 800 (Pamp. in Bolz. M.S.); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Sprang!)

Philadelphus (Rivinus) Linn.

665 Ph. coronarius L. Prosp. p. 55. (1696. 1532)
II–III Rupicolo, sepiario. Montello verso il Piave 1861, (pare assolutamente spontaneo); Cogiuolo (Pampanini in Bolz. n. 13). È spesso coltivato nei giardini. Vulgo: Filadelfo.

Fam. 56 Crassulaceae

Sempervivum (Ruppius) Linn.

R. S. Wulfenii Hoppe (1705. 1848)
IV Rupestre, sassicolo. Sopra Valdobbiadene (Favero 1846, sub S. hirsutum). Da confermarsi. ~~[illegible]~~

R. S. arachnoideum L. (1701. 1606)
IV–V Rupestre sassicolo. Grappa (Sprangi) Da confermarsi.

666 S. tectorum L. Prosp. p. 58 (1700. 1415)
I – IV. Rupestre, murale, tettajolo. Spontaneo nei colli e monti sopra Vittorio, come nel colle di S. Augusta 1862 (anche Pamp. n. 44); sui tetti di Selva, Volpago, Vittorio, forse originariamente coltivato... dal 1861. Vulgo Articiochi mati, Erba da cali

Sedum (Tourn.) Linn.

667 S. maximum (L.) Sut. Prosp. p. 57 (1707. 1415)
I – IV. Rupestre, sassicolo. Fuori Serravalle all'orrido, comune; Targo e Valmarino (Pamp. in Bolz. n. 13); Selva, nei campi, raro (fuggiasco?), 1861. Si coltiva anche talora. Vulgo: Erba da cali.

668 S. rupestre L. Prosp. p. 58 (S. reflexum L.) (1714. 1551)
I – IV. Rupestre, sassicolo, murale. Treviso, Arcade, Conegliano, Vittorio al colle di S. Augusta... dal 1861; Cansiglio (Béreng. 1839!) M. Monfenera, M. Endimione, 1861; alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. n. 14); Grappa (Sternb. 1803, n. 59).

669 S. sexangulare L. Prosp. p. 57 (1717. 1554)
I – IV Sassicolo, murale, alveale, campestre. Selva, Volpago, Valdobbiadene... dal 1861; alveo del Piave 1862 (anche Minio n. 35); Pederobba Resana (Bég. 1909!) — Var. acre (L.) Prosp. p. 57 come sp. (1415) Tutta la provincia: Treviso, Selva, Conegliano, Vittorio... dal 1861; Grappa al M. Oro (Bolz. n. 25); Cansiglio (D. Sacc. 1897!)

670 S. album L. (Prosp. p. 57 (1718. 1415)
I – IV. Murale, rupestre, sassicolo, tettajolo. Quasi tutta la provincia: Treviso, Selva, Pederobba (anche Bég. 1909!), Conegliano, Vittorio, Cansiglio (anche D. Sacc. 1897!) ...dal 1861; Asolo e Valdobbiadene (Bolz. MS.); Grappa (Ant. Saccardo 1884!) – Vulgo: Riseti

671 S. dasyphyllum L. Prosp. p. 57 (1720. 1563)
II – IV Rupestre, murale, igrofilo, briofilo. Serravalle, Valdobbiadene, Pederobba.... dal 1861; Molinetto presso Pederobba (Pampanini n. 44); Grappa (Bizzoz. 1878!)

R S. Cepaea L. Prosp. p. 57 (S. galioides Latour) (1724. 1550)
I – III. Rupestre, murale, xerofilo. Provincia di Treviso (Mayer in Bertol.) ~~a Cansiglio (Dalla Lac. 1897 (herb. Pol.))~~ Dubito che il Mayer abbia ~~equivocato forse~~ scambiato il Trevigiano col Padovano, dove la specie è comune negli Euganei.

R S. annuum L. (1728. 1785)
IV – V. Rupicolo. Alle cascine del M. Oro del Grappa (Bolz. n. 11). Posteriormente il Bolz. (n. 25) riferisce la specie al Sedum acre.

672 S. atratum L. Agg. p. 18 (1729. 1726)
IV. V. Rupicolo. Cansiglio, 1869 (anche Béreng. 1838!); Valdobbiadene nel M. Cesen (Bolz. MS.); Grappa (D. Montini 1872, Bizzozero 1878!) Grappa in Val delle Foie (C. Mass. 1877!)

673 S. villosum L. (1730. 1785)
IV – V. Pascolivo, igrofilo. Sopra Valdobbiadene (Béreng. 1844!); Forcella del Boaaor di Grappa (Bizzoz. 1878!)

674 S. hispanicum L. Agg. p. 18 (1732. 1557)
IV Rupicolo, eliofobo. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); sopra Valdobbiadene (Béreng. 1846!)

Fam. 57 Rosaceae

Prunus (Tourn.) Linn.

CA P. Amygdalus Stok. Prosp. p. 4 (Amygdalus communis L.) (1738. 1415. R.)
I – III. D'origine asiatica. Coltivato ab antico e qua e là inselvatichito, come a Selva, Vittorio... dal 1862. Var. fragilis (Hell.) (1554. R) Come il tipo. Volgo: Mandoler (mandole ~~dolci~~ amare (tipo) e mandole ~~amare~~ dolci (var.)

C P. nana (L.) Zucc. (1739 A. 1807)
I – III. Nativo di Russia, Balcania ecc. Coltivato non di rado per ornamento, a fiori doppi rosei e bianchi.

CA P. Persica (L.) Stok. Prosp. p. 47 (Persica vulgaris Mill.) (1739. 1415. R.)
I – III. D'origine orientale. Coltivato ab antico e assai spesso inselvatichito. Vulgo: Perseghèr. Var. levis (DC.) Arc. Prosp. p. 47 (Persica nucipersica Rchb.) (1561) Come il tipo, ma più di rado. Vulgo: Naspersego
Q in numerose razze (duracina [persego che se tien] e aganopersica [p. che se lassa]) suddivise nelle sottorazze: rhodocarpa, leucocarpa, xanthocarpa, haematocarpa cioè a carne e pelle rosea, bianca, gialla e sanguigna.

CA P. Armeniaca L. Prosp. p. 47 (1740. 1415 R.)
I – III. Oriundo della Cina, donde passò poi in Armenia. Coltivato ab antico e talora inselvatichito. Vulgo Armeliner

CA P. Domestica L. Prosp. p. 48 (1743. 1415. R.)
I – III. Spontaneo in Asia, ma fors'anco in qualche parte d'Europa. Coltivato in molte razze e sottorazze e talora inselvatichito come a Selva, Vittorio ... dal 1862. Var. oeconomica (Bork.) Vulgo: Susiner, Zucheter (i fr.: susini, cespe, zuchete) – Var. Claudiana (Poir.) Vulgo Amoler e amoli de Franza, Verdazi – Var. insiticia (L.) Prosp. p. 48 c. spec. Vulgo: Verioler, Orioler (i fr.: verioi, orioi)

6705 P. spinosa L. Prosp. p. 48 (1744. 1415. R.)
I – IV. Dumale, sepiario. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Vittorio .... dal 1861; Pederobba (Bég. 1909!); Ca' Tron (Divatz. 1915!). Vulgo Brombolèr, Spin (i fr.: Brombole) – Var. macrocarpa Wallr. in DC. Asolo, sul colle della Regina (Bolz. MS.)

CA P. Myrobalana (L.) Lois. (1745. 1807)
I – III D'origine asiatica. Coltivato spesso in più varietà e anche inselvatichito. Vulgo: Amolèr (i fr.: amoli zali, amoli rossi)

676 P. avium L. Prosp. p. 48 (1747. 1583. R.)
II – IV Nemorale, dumale. Spontaneo, inselvatichito e coltivato qua e là in più razze o varietà. Var. silvestris Rchb. Vulgo: Ossetti. Var. juliana (L.). Vulgo: Zaresèr, Zeresèr (i frutti: zarese o zerese bianche, more, rosse – Var. duracina (L.) Vulgo: i fr. Marostegane.

677 P. Cerasus L. Prosp. p. 48 (1748. 1415 R.)
I – IV. Coltivato e inselvatichito (e anche indigeno?) qua e là. Var. caproniana L. Vulgo: i fr.: Marinelle – Var. Marasca (Host). Vulgo: i fr.: Marasche – Var. pumila L. Agg. p. 15 (Prunus Chamaecerasus Jacq.). Colli intorno al castello di S. Salvatore a Susegana, 1866 (anche Béreng. 1858!)

678 P. Mahaleb L. Agg. p. 15 (1749. 1561. R.)
II – III. Rupestre. Rocce fuori Serravalle e colle S. Augusta 1865 (anche Pamp. n. 44); presso il lago Morto 1867; presso Conegliano (Béreng. 1838!); presso Pederobba (Béguinot, 1909!)

CA P. Laurocerasus L. Prosp. p. 48 (1751. 1563)
I – III. Originario d'Asia minore. Coltivato comunemente nei giardini e spesso inselvatichito, come a Selva, Vittorio ... dal 1862. Vulgo Pachetter o Bachetter, Lauroceraso.

Keria DC.

CA K. japonica (L.) DC. (1752 A. 1814)
I – III. Del Giappone. Coltivato e quasi naturalizzato nelle siepi e boschetti (sempre a fiori dopp.), come a Treviso, Selva, Vittorio ... dal 1861. Vulgo: Rose o Rosette del Giapon.

Spiraea (Tourn.) Linn

679 S. lancifolia Hoffm. (1825). Prosp. p. 48 (S. flexuosa Rchb. non Fisch.), S.

Hacquetii Fenzl et Koch (1854), S. decumbens Koch (1831), S. decumbens var. bellunensis Bizz. (1883).

II–IV. Rupestre, igrofila, eliofoba. Covolo, rupi lungo il Piave 1861; Cansiglio (Fracchia!); presso Fadalto (Pamp. n. 36); Passo S. Boldo (Uboldo) (Pamp. Fl. ital. exs. n. 95). Var. integrifolia Pamp. l. c. n. 96. S. Boldo e Fadalto (Pamp.) – Nella stessa località di Covolo la specie varia a foglie al di sotto glabre o tomentelle!

C S. chamaedryfolia L. (1753. 1837)

I–III Spontanea qua e là nell'Italia boreale. Coltivata spesso nei giardini del Trevigiano. Vulgo: Spirea e così le seguenti.

C S. lanceolata Poir. (1753 B. 1845)

I–III. Delle Isole Mascarene. Coltivata qua e là per ornamento e talora naturalizzata.

C S. opulifolia L. (1756 A. 1780)

I–III. Dell'America Sett. Coltivata qua e là per ornamento.

C S. salicifolia L. (1756. 1797)

I–III. Dell'Europa centr. e Asia. Coltivata spesso per ornamento e talora inselvatichita.

C S. sorbifolia L. (1757. 1798)

I–III. D. Siberia. Coltivata spesso e talora inselvatichita.

680 S. Filipendula L. Prosp. p. 49 (1758. 1532)

I–IV. Pratense, pascoliva, Camalò, Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio.... dal 1862; Cozzuolo (Pamp. Fl. it. exs. n. 848!); Pederobba (Béguin. 1909!); colli di Asolo (Zanard. 1827!, Bolz. MS.)

681 S. Ulmaria L. Prosp. p. 49 (1759. 1563)
II-IV. Riparia, igrofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Montebelluna, Nervesa, (anche Bizzoz. 1881!) Conegliano, Vittorio... dal 1862. Comune nelle due forme tomentosa e denudata.

682 S. Aruncus L. Prosp. p. 49 (1760. 1550)
II-IV. Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, lato settentr., Cornuda, Vittorio Masér... dal 1861; Cansiglio 1870 (anche D. Sacc. a m. 1100, 1879!); Grappa al Boccaor e Archesòn a m. 1300-1400 (Bolz. MS.). Volg. Sparesi de montagna.

Dryas Linn.
683 D. octopetala L. Prosp. p. 49 (1761. 1595)
II-IV. Rupicola, sassicola, alveale. Alveo del Piave, a Covolo, Ciano 1862; Costa di Vittorio nel colle della Madonna della Salute 1864 (anche D. Sacc. 1890!, Trotter!); Cozzuolo e Col Vicentin (Pamp. n. 44); Cansiglio 1869; Valdobbiadene (Favero 1844!); Asolo, Possagno (Pamp. e Bolz. n. 11) Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Parolini, Spranz.! Meneghini! Prof. Antonio Saccardo, 1883!)

Geum Linn.
684 G. rivale L. Agg. p. 15 (1762. 1595)
III-IV. Igrofilo, subpalustre, nemofilo. Cansiglio (Bérenq. 1838!); M. Cesen sopra Valdobbiadene (Bolz. n. 13), monti di Possagno (Bizz. 1879!); Grappa (Bolz. MS.)

685 G. urbanum L. Prosp. p. 49 (1763. 1320. R)
I-IV Nemofilo, sepincolo, eliofobo. Treviso, Selva, Valdobbiadene, Vittorio.... dal 1859; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!, Bolz. MS.); Ca' Tron (Diratz. 1915!)

686 montanum L. (1766. 1572)
IV Pascolivo. M. Cesen sopra Valdobbiadene (Bolg. n. 13); Grappa (Zanardini, 1827!) — Var ranum Gaud. Col Vicentino (Parop. in Bolg. n. 13)

Potentilla Linn.

687 P. sterilis (L.) Garke. Opp. p. 16 (P. fragariastrum Ehrh.) (1768. 1745)
IV Nemofila, eliofoba. M. Grappa (Sprang.!, Parolini, Sternb. 1803, n. 59 e 60)

688 P. alba L. Prosp. p. 50 (1769. 1566)
II–III. Pratense, nemofila, eliofila. Selva, Canalò, S. Andrà (Povegliano) Vittorio... dal 1861; Valdobbiadene, 1870; S. Boldo (Boldo) (Parop. n. Fl. ital. exs. n. 286!); colli di Pollagno (A. Rossi e Bgg. 1878!); Collalto (D. Montin, 1872!); Crespano, Cimardosa (Zanard. 1827!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59); Monfenera e sopra Pollagno (Bolg. MS); sopra Follina (Parop. n. 44).

689 P. nitida L. (1771. 1595)
IV–V. Rupicola, eliofila. Grappa (Dom. Montin. in Vacc. n. 64), M. Cimone sopra Valdobbiadene (Béreng.!), Col Vicentino (Parop. n. 38).

690 P. caulescens L. Prosp. p. 58 (1777. 1563).
II–IV. Rupicola, eliofoba. Montello sopra il Piave a Nervesa, 1862; Colvolo 1865-66; sopra Vittorio (Front. 1899!); Canaglia, 1869; Pollagno, Asolo (Bolg. n. 11); Valle S. Felice e Arcisa (Bolg. MS), Grappa (Vaccari n. 64); canale S. Boldo (Parop. Fl. it. exs. n. 288!, Trotter 1914!)

R P. Sibbaldii Hall. fil. (1778. 1697), Sibbaldia procumbens L.
IV–V. Rupicola, pascoliva. M. Grappa (Sprang.! Bolg. n. 15 sec. Sprang.) Dubito che sia esatta la località del Grappa indicata dallo Sprang.

691 P. erecta (L.) Hampe. Prosp. p. 50 (Potent. Tormentilla Sibth.) (1779. 1415)
II–IV. Pratense, pascoliva, eliofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Conegliano, Vittorio ... dal 1859; Asolo (Bolz. MS.); Pederobba e Resana (Bég. 1909!); Grappa (Vaccari n. 64). Varia a statura elevata eretta e procombente (come nel letto del Piave) a foglie più o meno anguste, più o meno pubescenti — Var. minor Goiran. Grappa, cima e Archeson (Bolz. MS.)

692 P. reptans L. Prosp. p. 50 (1780. 1415. R)
I–IV. Pratense, marginale, riparia. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio.... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.); Fagarè, Zenson, Resana, Pederobba (Bég. 1909!); Cà Tron (Dirabz. 1915!) ♀ Una forma a caule ascendente (e sitù) a Cà Tron (Dirabz. 1915!); una forma a corolla tetrapetala a Treviso, 1868.

♀ Vulgo: Fragole mate

693 P. subacaulis L. (1782)
Var. cinerea Chaix (1830) IV Pascoliva, xerofila. Cime dei monti sopra Lago-Revine, a 1150 m. alt. (Pamp.ni Fl. it. exs. n. 289).

694 P. aurea L. Prosp. p. 50 (1785. 1785)
III–IV Pascoliva. Sopra Valdobbiadene 1862 (anche Favero 1846! e Berenger.!) Follina (Bérenz. 1843!); Cansiglio 1869; Grappa (Bolz. MS. Sprangi!, Cobau 1906!, Collatti (Dom. Montini!) — Var. minor Lehm. Grappa (Bolz. MS.)

695 P. verna L. Prosp. p. 50 (1186. 1785)
I–IV. Pratense, pascoliva. Selva, Camalò, Covolo, Colfosco, Vittorio.... dal 1861; Asolo, Monfumo (Bolz.n. 10.11); Cà Tron (Dirabz. 1915!) — Var. Gaudini (Gremli) Fiori. Rupicola sul colle della Rocca a Cornuda (Trotter, 1907!) — Var. salisburgensis Haenke Agg. p. 16 (P. alpestris Hall.). Cansiglio 1869; Follina (Bérenz), Grappa (Montini!) — Var. baldensis (Kern.) Bocaor di Crespan e M. Endimione (Bolz. n. 18 e MS) — Var. hirsuta DC. alveo del Piave (Minio n. 35); radici del Grappa presso S. Andrea sopra Fietta (Bolz. MS.)

696 P. hirta L. (1788)
Var. recta (L.) Prosp. p. 50. (1563). I–III. Murale, sassicola, xerofila
Lungo il Piave a Ciano, rara e non sicura 1862; colle della Rocca ad Asolo (Bolz. MS.)

697 P. argentea L. Prosp. p. 50 (1790. 1532)
I–III. Murale, rupicola, xerofila. Mura di Treviso, specialmente presso la Porta Santi-Quaranta (ora Cavour) (Fracchia 1838!); prati di Asolo (Bolz. n. 11) — Var. cinerea Lehm. Colle della Rocca sopra Asolo (Bolz. n. 17 sub P. incanescens).

698 P. anserina L. Prosp. p. 50 (1791. 1558)
I–IV. Pratense, alveale, marginale. Alveo del Piave a Nervesa! e ciò di Treviso? 1862; presso Quero ai confini del Trevigiano 1866; presso il Montello (Kellner 1845!)

699 P. rupestris L. Agg. p. 16 (1793. 1785)
III Rupicola, sassicola. Fessure delle rupi presso Possagno (Sprangi!)

Fragaria (Tourn.) Linn.

700 F. vesca L. Prosp. p. 50 (1798. 1550. R.)
I–IV. Nemofila, sepincola. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1858; Cansiglio 1869 (anche Dom. Saccardo 1897!); Asolo, Grappa (Bolz. MS); Grappa fino a m 1600-1700 (Vacc. n. 64)
φ — Var. elatior (Ehrh.) (1842) Lungo il Soligo a Pieve di Soligo (Pamp. in Bolz. n. 13 e MS) — Var. collina (Ehrh.) (1615), Prosp. p. 50 c. spec. Montello, Cornuda, Colfosco, Paderno... dal 1862; lungo il Piaveson e a Lago-Revine (Pamp. n. 36) — Var. semperflorens (Duch.) (1822) Prosp. p. 50. Coltivata e subspontanea. Volgo Fragole d'ogni mese —

φ Volgo Fraga, Fraghe, Fragole

C F. grandiflora Ehrh. Prosp. p. 50 (1798 C. 1812) (F. chiloensis × virginiana)
I–III. Oriunda dell'America sett. Coltivata qua e là e ~~spesso~~ di rado inselvatichita. Vulgo: Fragolon.

C F. chiloensis (L.) Ehrh. (1798 A. 1780)
I–III Oriunda del Cile. Coltivata qua e là e ~~spesso~~ talora inselvatichita. Vulgo: Fragolon.

CA F. indica Andr. Prosp. p. 152 (Duchesnea fragiformis Sm.) (1799. 1821)
I–III Sepincola, ruderale, marginale. ♀ Treviso, vie presso il Convento degli Scalzi, orti Bativiera e Monterumico ecc. 1864; Selva, Vittorio, 1900–1915; Asolo (Bolzon n.n. 9. 11. 23) ♀ Delle Indie or. Cina e Giappone, ora largamente e pienamente naturalizzata.

Rubus (Tourn.) Linn.

701 R. saxatilis L. Agg. p. 16 (1800. 1595)
IV Nemofilo, sassicolo. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); Grappa (Bizzozero, 1878, Spranzi!); Bouaor (Bolz. MS)

702 R. idaeus L. Prosp. p. 49 (1801. 1550. R.)
III–IV Nemofilo, eliofobo. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1841!, Dom. Jac. 1897!); Grappa (Bizz. 1878!); M. Oro (Bolz. n. 11), Valdobbiadene sull'Endimione (Bolz. MS). Coltivato anche frequentemente. Vulgo Frambolèr e Frambole (il fr.)

703 R. caesius L. Prosp. p. 49 (1802 c. var. 1583)
I–IV Sepincolo, dumale, ruderale. Selva, Volpago, Montello (anche Bizz. 1872!), Vittorio ... dal 1861; Motta (Béreng. 1841!); Asolo, Castelli, Monfenera (Bolz. n. 11); Ponte di Piave, Zenson (Béguinot 1909!); Cà Tron (Dratz. 1915!) – Var. arvalis Rchb. Letto del Piave (Minio, n. 35) ~~Rchb.~~ Var. aquaticus Weihe et Nees. Letto del Piave (Minio, n. 35)

704 R. fruticosa L. Prosp. p. 49 sensu lato (1802. 1415. R.)
I - IV. Sepincolo, nemofilo, ruderale
Var. ulmifolius (Schott) Comune: Selva, Nervesa, Vittorio ... dal 1866; Ca' Tron (Dalla. 1915!) — Var. macrostemon (Focke). Siepi d. Castello, d. Montello (Bolz. MS.) — Var. thyrsoideus (Wimm.). Montello 1907 (talora nella fm. thyrsanthus Focke — Var. corylifolius (Sm.) Montello 1907; Vittorio (907; Castelfranco (Bolz. n. 23); Grappa (Bizz. 1878!) — Var. sulcatus (Vest) Ca' Tron (Fiori!); Montello, 1906-1907 — Var. Ballardi - W. et N. Grappa (Bizz. 1878!) — Var. Grabowskii Weihe (Engl. Bot. ed. III. t. 449!) (R. ulmifolius × corylifolius?). Montello, 1907 — Var Köhleri Weihe (Engl. Bot. ed. III t. 453!) = R. saltuum Focke? Montello 1907 — Var. glandulosus (Bell.) 1791) = R. hirta W. K. (1805). Canniglio, m. 1000 (Bérenger 1841! e Dom. Sacc. 1897!; M. Crep sopra Miane (Bérenger, 1842!) — var. bifrons (Vest) = R. speciosa P. J. Müll. Montello, 1906.
Volgo (tutte le forme): Roa, Roèr; Rovaj (Vittorio; More (il frutto)
Agrimonia (Tourn.) Linn.

705 A. Eupatoria L. Prosp. p. 50 (1803. 1415. R.)
I - IV. Nemofila, sepincola, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Tarzo ... dal 1859; Valdobbiadene (Favero, 1845!); Castelfranco, Resana, Castel d. Godego, Pedemontana (Béguinot, 1909!); Asolo (Bolz. MS.)

706 A. Agrimonoides L. (non agrimoniodes) (1804. 1551)
III - IV. Nemofila, eliofoba. Grappa (Zanardini, 1829!), boschi presso i Collalti (Montini in Zanard.!)

Alchemilla L.

707 A. vulgaris L. Prosp. p. 51 sensu lato (1805. 1415)
III - IV. Nemofila, pascoliva. M. Cimone, Canniglio dal 1862; M. Croce (Bérenger. 1838!); Valdobbiadene (Bérenger. 1846!); Grappa (Steren. n. 59, Montini, Spranger!, Bolzon 1889!, Arcesa sopra Crespan (Zanardini, 1829!); Canale S. Boldo (Trotter. 1914!) — Var. subcrenata Buser

M. Grappa all' Archeson (Bolz. MS.) — Var. montana (F. W. Schm.) Malga Ardosa del Grappa (Bolz. MS.) — Var. versipila (Buser). Cima del Grappa (Bolz. n. 17) — var. pratensis (F. W. Schm.) Sopra Segusin alla forcella del Doc (Bolz. MS.) — var. connivens (Buser). Cima del Grappa (Bolz. n. 17) — var. strigosula (Buser.) M. Eudimione e M. Grappa (Bolz. n. 18 e MS.); Col Vicentin (Pamp. n. 44) — Var. hybrida (F. W. Schm.). Grappa (Montini, Bolz. n. 23) — Var fissa (Schum.). M. Grappa (Spranzi!) — Var. flabellata Buser. Col de Moi sopra Cison e Col Vicentin (Pamp. n. 44). Non ho sufficente ~~prepa~~ esperienza ~~[illegible]~~ per giudicare sul valore delle indicate varietà.

708 A. alpina L. Agg. p. 16 (1807. 1563)
IV Rupicola, pascoliva. Monti elevati intorno il Cansiglio (Béreng. 1838!) Grappa (Spranzi, Zanardini). Da confermarsi quest' ultima ubicazione.

709 A. arvensis (L.) Scop. Prosp. p. 51 (1808. 1595)
I–III. Campestre, segetale. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Treviso, Vittorio.... dal 1862; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!)

Poterium Linn.

710 P. Sanguisorba L. Prosp. p. 51 (1810. 1415)
I–IV. Pratense, pascolivo, marginale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio ... dal 1862; Fagarè, Zenson, Pederobba (Bég. 1909!) — Var. polygamum (W. et K.). Comune come la specie: Vittorio 1907; Valdobbiadene fra Segusino e Milies (Bolz. MS.) — Vulgo (le due forme): Anguriera

711 P. officinale (L.) A. Gray. Agg. p. 16 (Sanguisorba officinalis L.) (1812. 1562)
III. Igrofila, subpalustre. Laghetti di Revine-Lago (Sacc. 1866, anche Pamp. in Bolz. n. 17). La forma di detta località corrisponde alla var. Sabaudum (Mill.).

Rosa (Tourn.) Linn. *)

712 R. arvensis Huds. Prosp. p. 50 (1815. 1785)
I–IV. Sepincola, remorale. Montello, Selva, Nervesa, Corrolo, Vittorio ... dal 1862; Mogliano (Mayer in Bertol.), Pregarziado 1865; Maser (Bolz. MS.) – Valg. Rojer salvadego o salvarega (come tutte le spec. selvatiche)

713 R. gallica L. Prosp. p. 51 (R. gallica et R. pumila) (1817. 1745. R.)
I–IV. Sepincola, dumale, ruderale. Selva, Volpago, Falzè, Nervesa ... dal 1861; Montello al Piave 1866 (anche D. Sacc. 1890!); Melma, Roncade 1866; Mogliano (Mayer in Bertol.)

714 R. Pollviniana Spr. (R. gallica × arvensis) (1811 B. 1813)
II–III. Sepincola, dumale. Refrontolo (Berag. Bolz. n. 19.), Crépin in Bull. soc. bot. Belg. XXXIII (1894) p. 84)

715 R. collina Jacq. (R. gallica × dumetorum Crep.) Fl. anal. I p. 588 nota.
III–IV. Dumale. M. Faè sopra Serravalle (Contarini 1825!)

716 R. canina L. Prosp. p. 50 (1818. 1550)
I–IV. Sepincola, dumale. Var. Lutetiana Lém. Selva, Montello, Serravalle ... dal 1861 – Var. dumetorum (Thuill.) qua e là (cfr. R. collina)

717 R. agrestis Savi Prosp. 20 (R. rubiginosa ex p.) (1826. 1745)
II–III. Sepincola. Colli di Montebelluna 1866.

718 R. tomentella Lém. (1819. 1870 herb. Sacc.)
III–IV. Monte sopra Valdobbiadene, a 800-900 m. 1870.

719 R. rubiginosa L. Prosp. p. 50 (1829. 1582)
II–IV Sepincola, dumale. Colli di Montebelluna, Valdobbiadene, a Nervesa. dal 1862 – Var. jenensis M. Schultz. Colli di Maser, M. Grappa e Monfenera (Bolz. MS.)

Nota
*) Le specie del mio erbario furono rivedute dall'ill. prof. Crépin

720 R. tomentosa Sm. (1832. 1842)
III-IV Dumale, sepincola. Col Vicentin a 700 m. (Pamp. in Bolz. MS.)

721 R. villosa L. (1833. 1875)
III-IV Dumale, sepincola. Col Vicentin a 700 m. (Pamp. in Bolzon MS.)
Var. recondita (Pug.). Col Vicentin a 700 m. e Grappa sopra Cavaso (Pamp. e Bolz. MS.)

722 R. pendulina L. (1753) Agg. p. 16 (R. alpina L. (1762)) (1837. 1532)
IV-V. Rupicola, dumale, nemorale. Praderatico sopra Follina (Béreng. 1843!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64) — Var. pyrenaica (Gouan). Boscon e Archeson del Grappa (Bolz. MS.); Grappa (Vaccari n. 64).

C R. indica L. (1819 D. 1798)
I-III. Oriunda della Cina e Bengala. Coltivata frequentemente nei giardini per lo più per ornamento dei muri. Vulgo Rosa Tea ecc. ~~sulla siepi. Var. ranunculiflora Hort. Coltivata frequentemente~~

CA R. semperflorens Curtis Agg. p. 16 (1839. C. 1806)
I-III Oriunda della Cina e Bengala. Coltivata nei giardini e nelle siepi e spesso inselvatichita. Vulgo: Roser, Rosa d'ogni mese, R. da Sieza
Var. ranunculiflora Hort. Coltivata spesso per ornamento. Vulgo: Rosa ranuncolata

C R. centifolia L. Prosp. p. 51 (1817 E. 1415 R.)
I-III Probabilmente derivazione culturale di R. gallica. Coltivata assai spesso pel passato, ora meno; talora inselvatichita. Vulgo: Rosa da odor.
— Var. muscosa (L.) Coltivata spesso nel passato, ora meno. Vulgo Rosa muscosa.

C R. damascena L. Prosp. p. 51 (1817. F. 1415 R.)
I-III. Probabilmente è un ibrido, modificato colla coltura, di R. gallica e R. canina, coltivato ab antico. Vulgo. Rosa damaschina.

C R. multiflora Thunbg. (1839 F. 1814)
I – III. Originaria di Cina e Giappone. Coltivata spesso in più varietà a fiori bianchi, rosei, cremisi (var. Crimson) principalmente per ornamento delle muraglie. Volgo: Rose rampicanti o da muro.

C R. Banksiae R. Br. (1839 B. 1822)
I – III Della Cina. Coltivata comunemente a fiori giallicci e bianchi per ornare i muri. Volgo: Rose rampicanti o da muro.

C R. microphylla Roxb. (1839 E. 1841)
I – III. Della Cina. Coltivata comunemente a formare dense siepi e talora inselvatichita. Volgo: Rosa foresta, da sieza.

C R. sulphurea Ait. Prosp. p. 51. (1839 A. 1713)
I – III Originaria d'Oriente. Coltivata non di rado per ornamento. Volgo Rosa zala.

Crataegus (Tourn.) Linn.

C A C. Azarolus L. Prosp. p. 52 (1841. 1550)
II – IV. Originario dell'Asia occidentale. Coltivato e qua e là naturalizzato, come a Colfosco, Vittorio. Volgo Pomèr Lazzariol, Pometi Lazzarioi (il fr.)

72 D C. Oxyacantha L. Prosp. p. 51 (1842. 1550 R.)
I – IV. Sepincolo, nemofilo, dumale. In quasi tutta la provincia spontaneo o coltivato: Selva, Volpago, Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio .... dal 1862; Asolo (Bolz. MS.); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. monogyna (Jacq.). Prosp. p. 51 (c. spec.) Selva, Vittorio, Treviso (anche Bereng. 1838!); Pederobba (Béguin. 1909!); M. Endimione 1870; Cà Tron (Diratz. 1915!) – Volgo (spec. e var.): Spin bianc o bianco; il fr.: Marendole (Montello) o Farenele (Vittorio)

C C. coccinea L. (1842 A. 1780)
I – III Dell'America settentr. Si coltiva non di rado.

Mespilus (Tourn.) Linn.

724 M. germanica L. Prosp. p. 52 (1843. 1415. R)

II–IV Nemorale, dumale, sepincolo. Quasi tutta la provincia spontaneo o anche coltivato: Montello, Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio... dal 1861; Cozzuolo (Pamp. Fl. it. exs. n. 861!); Asolo (Bolz. MS.) – Vulgo: Nespoler e il fr.: Nespole.

Cotoneaster (Ruppius) Med.

725 C. Pyracantha (L.) Spach (1844. 1532)

IV. Dumale. Colle del Castello S. Salvatore a Susegana, 1865 (spontaneo?) Col di Stella sopra Vittorio a 426 m. (Pamp. in Bolz. n. 14)

726 C. integerrima Med. ~~Pamp.~~ Agg. p. 17 (Cotoneaster vulgaris Lindl.) (1845. 1595)

IV Rupicola, nemofila, dumale. Grappa (Sprangi! A. Rossi e Bizz! in herb. Pat.)

Amelanchier Med.

727 A. vulgaris Moench. Agg. p. 17 (Aronia rotundifolia Pers.) (1846. 1595)

II–IV. Rupicola, dumale. Colle di S. Martino a Ceneda e sopra Solighetto (Contarini 1825!); Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 13); Follina (Béreng. 1843!); sulle rupi fuori Serravalle, 1866–1870; Grappa (Sprangi!, A. Rossi in Bizz. 1880!); Bouaor (Bolz. MS.) – Vulgo: Persingolèr (Vittorio)

Photinia Lindl.

C Ph. serrulata Lindl. (1847. 1822)

I–III. Oriunda di Cina e Giappone. Coltivata sempre più frequentemente e talora avventizia: Selva, Treviso, Vittorio, Ca-Tron... dal 1866.

Eriobotrya Lindl.

C E. japonica (Thunb.) Lindl. (1848. 1812)

I–III. Del Giappone. Coltivata sempre più frequentemente nelle plaghe più calde e difese, dove fruttifica, come a Vittorio, dal 1864 – Vulgo Nespolèr e Nespole del Giapon.

Pirus (Tourn.) Linn.

CA P. Cydonia L. Prosp. p. 52 (Cydonia vulgaris Pers.) (1849. 1415. R.)
I – III. Originario dell'Asia occidentale. Coltivato qua e là frequentemente e naturalizzato, a Selva, Treviso, Vittorio ... dal 1862. Vulgo: Pomèr Codòin o Codogno; pom o pomo codogno (il fr.)

728 P. communis L. Prosp. p. 52 (1850. 1415. R.) ancha Perer Codogno
I – IV. Var. Achras Gaertn. Nemofilo, dumale. Fm. Piraster L. Montello e tutti i colli. Arbor 2–3 m. alta; spinis longis; fructu minuto, 2,5 cm. diam., perfecte rotundo, duro, non umbilicato — Fm. montellica Sacc. Arbor 3–4 m. alta; spinis brevioribus (ex gemmis); fructu majori, 5 cm. diam., rotundo, apice leviter umbilicato et circa umbilicum circumvallato, basi quoque leviter umbilicato, carne nigricante demum dulci. Nel Montello, non comune (Vulgo (le due forme): Perèr salvadego) — Var. sativa DC. Coltivata in numerosissime varietà distinte con nomi volgari speciali (Vulgo: Perèr e Peri (in gen.)). Cfr. Paolo Botteselle. La frutticoltura campagnuola in provincia di Treviso. Ivi. 1914 con fig. Il volume contiene solo i Peri e i Meli. L'egregio autore (gloriosamente combattendo per la patria, fu ucciso dal piombo austriaco il 24 Agosto 1915) non potè pur troppo trattare delle altre nostre specie fruttifere.

729 P. Malus L. Prosp. p. 52 (1851. 1415. R.)
I – IV. Nemofilo, dumale (la var. austera Walt.). Montello e tutti i colli e monti frequentemente ... dal 1861. Vulgo Pomèr salvadego. La var. ~~domestica~~ mitis Walt. è coltivato ovunque in numerose varietà, distinte con nomi speciali. Cfr. P. Botteselle l.c. Vulgo: Pomèr e pomi (in gen.) — Var. dasyphylla B. et Fing. (1851 B. 1822). III – IV Nemofilo, dumale. Canale S. Boldo (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 453). Da questa var. o sottospecie derivano molte delle razze coltivate

730 P. torminalis (L.) Ehr. Prosp. p. 52 (Sorbus torminalis Crantz) (1852. 1532. R.)
II – IV. Nemofilo, dumale. Montello, 1861; Cansiglio e colli di Vittorio, 1869; Refrontolo (Pamp.); M. Eudimione (Bolz. n. 13); S. Maria di Feletto (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 454)

731 P. Aria (L.) Ehrh. Prosp. p. 52 (Sorbus Aria Crantz). (1852. 1532)
II – IV Nemofilo, dumale. Montello nel versante settentr., Corolo, Colfosco, Cornuda, Vittorio (anche D. Sacc. 1890!)... dal 1862; Grappa (Spranzi!, Sternb. 1803, n. 59; Ardosa s. Crespan (Zenard. 1827!); Colle S. Martino di Ceneda e M. Faìs (Contar. 1825!) – Var. longifolia Gren. Boschi nel Montagnòn di Masèr (Bolz. MS.)

Vulgo: Gata –

732 P. Chamaemespilus (L.) Ehrh. Agg. p. 17 (Sorbus Chamaemespilus Cr.) (1854. 1532 R?)
IV Rupicola, dumale. Cansiglio 1869 (anche Bereng. 1838!); Grappa (Art. Rossi e Bizz. 1880!)

733 P. aucuparia (L.) Ehrh. Prosp. p. 52 (Sorbus aucuparia L.) (1855. 1532)
III – IV. Nemorale. Masèr e Cansiglio 1863-69; Grappa (Spranzi!) Var. glabra Goir. Monte sopra S. Croce a m. 700 (Parup. e Bolz. MS.)

Vulgo: Sorbolèr salvarego o de monte.

734 P. domestica (L.) Ehrh. Prosp. p. 52 (Sorbus domestica L.) (1856. 1415. R)
II – IV. Nemorale, dumale. Montello e colli tutti dal 1861. Coltivaz. anche comunemente. Vulgo: Sorbolèr e Sorbole.

Fam. 58 Leguminosae

Albizzia Durazzo

CA A. Julibrissin Dur. Prosp. p. 47 (1857. 1749)
I – III. Originaria dell'Asia centr. e merid., Giappone e Abissinia. Coltivata comunemente nei giardini e ambulacri e talora subspontanea ... a Selva, Vittorio, Conegliano... dal 1862; a Treviso, 1837 (Bereng!) – Vulgo: Giuliopersin.

Acacia (Tourn.) Willd.

C A. Farnesiana W. Prosp. p. 47 (1857 A. 1611)
I – III. Nativa dell'isola di S. Domingo. Coltivata frequentemente nei giardini ma da noi non regge d'inverno all'aperto se non in luoghi protetti dal freddo. Vulgo: Gazia.

Gleditschia Linn.

C.A Gi. Triacanthos L. Prosp. p. 47 (1858. 1772)

I-IV. Dell'America settentrionale. Coltivata in tutta la provincia per le siepi e qua e là inselvatichita. Vulgo: Triacanto o Spin del Signor (1)

Ceratonia Linn.

C.A C. Siliqua L. (1859. 1415 R.) Prosp. p. 46

Di Siria ed Asia minore. Casualmente trovasi avventizio, nato da semi caduti a terra, come nel Montello (1861), ma per breve durata non sollevando il freddo de' nostri inverni. Vulgo: Carobòr, Carobèr, e il fr.: carobole, carobe.

Cercis Linn

C.A C. Siliquastrum L. Prosp. p. 46. (1860. 1532

I-III Spontaneo in più luoghi d'Italia, anche del Veneto, non però nel Trevigiano, dove si coltiva frequentemente ed è naturalizzato qua e là, come a Follina (Pamp. in Bolzon n. 13), Treviso, 1859 ecc. Vulgo: Albro o albaro de Giuda.

Sophòra L.

C S. japonica L. (1861. 1799)

I-III. Del Giappone e Cina. Coltivata spesso e talora ~~erratica~~ avventizia. Vulgo Sòfora.

Lupinus (Tourn.) Linn.

C.A L. albus L. Prosp. p. 40 (1864. 1415. R.)

I-III Spontaneo in più luoghi dell'Italia merid. Coltivato estesamente e spesso avventizio, come a Selva, Treviso... 1861. Vulgo: Fava o Fava luina.

(1) Si vede frequentemente nelle pitture di Cristo in passione la corona ~~fermata~~ formata di lunghe spine ramose rossicce del Triacanto, donde il nome volgare trevigiano e quello di Spinacristi nel Veronese (Goiran). È evidente che errano i pittori e sono errati i relativi vernacoli, perocchè il triacanto non potè trovarsi in Asia ed Europa prima della scoperta d'America, cioè almeno 1400 anni dopo la passione del Signore.

Cytisus (Tourn.) Linn.

725 C. Laburnum L. Prosp. p. 39. (1869. 1522)
III-IV. Nemorale, sepiario. Masèr, Monfenda, Endimione, Revine, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio .... fino dal 1861; colli Asolani (Zanard. 1827! e Bolz. MS.). Spesso pure coltivato negli ambulacri. Valgo: Igol, Igolo e Magio (quando coltivato).

726 C. alpinus Mill. Agg. p. 4 (1870. 1554)
IV. Nemorale, dumale. Monti elevati sopra Valdobbiadene, 1870; Grappa ai Collalti (Bolzon MS.)

727 C. nigricans L. Prosp. p. 39 (1871. 1532)
II-IV. Nemofilo. Montello, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Savazza di Serravalle (Contarini 1825!); Pederobba (Béguinot, 1909!); Asolo (Bolz. MS.).

728 C. purpureus Scop. Prosp. p. 40 (1878. 1697)
II-IV. Pascolivo, pratense, eliofilo. Montello verso il Piave, Nervesa nei prati, Cornuda, Ciano, Vittorio .... dal 1862; Sonego, Fadalto, S. Lorenzo, Cozzuolo (Pamp. n. 36); Asolo, Monfumo, Cornuda, Masèr (Bolz. MS.); Ardosa sopra Crespano (Zanard. 1827); Boccaor del Grappa a 400 m. (Fiori, 1897!); radici del Grappa presso S. Andrea (Bolz. MS.)

729 C. hirsutus L. Prosp. p. 39. (1879. 1532)
II-IV. Nemofilo, dumale, pascolivo. Montello, Colfosco, Vittorio .... dal 1862; Asolo, Crespano, Cavaso (Bolz. n. 11, 12) — Var. supinus (L.). Prosp. p. 39 (C. capitatus Scop.). Montello dal 1861; Crespano (Montini in Bertol.); Pederobba (Béguinot, 1909!); Grappa, Kellner 1845!, Bolz. MS.); colli Asolani (Zanard. 1827!, Bolz. n. 11) — Var. prostratus Scop. Montagnon di Masèr e radici del Grappa a S. Andrea (Bolz. MS.)

Genista Linn.

740 G. pedunculata L'Hérit. Prosp. p. 38 (G. procumbens W.-K.). (1827. 1884)
II – IV Pascoliva, pratense, nemofila. Montello, Bavaria, Nervesa, Ciano, Camalò ... fino dal 1861 – Var. diffusa (W.) Prosp. p. 38 (come sp.). Grappa (Zanard. in Bertol.) Ardosa sopra Crespano (Zanard. 1827!); Corbanese, rariss. (Pamp. n. 38), Cozzuolo (Pamp. in Bolz. MS.); ♀ letto del Piave (Minio, n. 35) – Var. Halleri (Regnier) Grappa (Vaccari n. 64)

741 G. tinctoria L. Prosp. p. 38 (1886. 1415. R.) ♀ colle della Madonna della Salute a Vittorio (Trott. 1916!)
I – IV. Nemofila, pascoliva, dumale. Montello e tutte le colline, dal 1861; Fais di Serravalle (Contarini 1825!); Cansiglio, a 1100 m. (D. Sacc. 1897!) Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. elatior Koch. Nel Montello o qua e là – Var. virgata (W.). Montello 1864; Ponte di Piave, Salgareda, Resana (Béguinot, 1909!) – Var. mantica (Poll.). Agg. p. 14 (G. lasiocarpa Spach). Frontale di Crespan (Montini in Bert.)

742 G. sericea Wulf. Agg. p. 14 (1887. 1788)
III – IV. Rupicola, pascoliva. Praderatico sopra Follina (Béreng. 1843!) Passo di S. Boldo a 370-500 m. (Pamp. in Fl. it. exs. n. 295); Praderatico, Sonego, Piai, Valmarino (Pamp. n. 45).

743 G. germanica L. Prosp. p. 39 (1892. 1532)
II – IV. Pratense, pascoliva, nemofila. Selva, Camalò, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; Foresto d'Asolo (Montini!); Piai presso Cerneda (Contarini 1825!) – Var. anaxaea Sacc. Prosp. p. 39. Alveo del Piave, freq. 1861 – Var. inermis Koch. Prati di Bavaria, Valdobbiadene, 1862; Asolo al colle Bacciocco (Bolz. MS) Qui spetta quasi per certo: G. pilosa Béreng. herb. (non L.) raccolta a Valdobbiadene – Var. humilis Bolz. Colli Bacciocco e S. Giorgio di Asolo (Bolz. n. 26)

744 G. radiata (L.) Scop. Prosp. p. 40 (Cytisus radiatus L.) (1897. 1551)

IV–V. Rupicola, dumale. Col Vicentin sopra S. Croce, a m. 850 (Pamp. in Bolzon MS.); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, ex exc. sub nom. G. linifolia; Art. Rossi, 1880 in herb. Bizz.; Montini! Vaccari n. 64); nei mont. Bassanep. confinant. cogli Asolani (Ball, n. 1).

Spartium (Tourn.) Linn.

745 S. junceum L. Agg. p. 14 (1903. 1415. R)

III. Rupicolo, nemofilo, dumale. Semonzo nell'Asolano (Parolini herb. in Mus. Bass.); boschetti presso il Castello S. Salvatore di Susegana, 1866, forse avventizio.

Ononis Linn.

746 O. spinosa L. Prosp. p. 40 (1906. 1550. R).

I–IV. Pascolivo, pratense, marginale. Selva, Camalò, Cornuda, Vittorio.... dal 1862; Cà Tron di Roncade (Diratz. 1915!); Castelfranco, Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda (Béguinot, 1909!); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897) — fm. albiflora Sacc. Prosp. p. 40. Alveo del Piave, Carpesica, Vittorio, non comune — Var. antiquorum (L.). Pederobba, lungo il Piave (Bég. 1909!) — var. mitis (L.) Prati umidi di Colfosco, 1862; Resana, ~~1909~~ (Bég. 1909!) — Var. parvifolia Rouy. S. Martino di Asolo (Bolz. MS.)

747 O. pusilla L. ~~Prosp.~~ Agg. p. 14 (O. Columnae All.), (1914. 1606)

III. Rupicola, xerofila. Colli di Valdobbiadene, 1870; colle di S. Augusta di Vittorio (Trotter, 1908!); Fais e Savassa (Pamp. n. 44); Colle ~~[illegible]~~ Bacciocco di Asolo (Bolz. n. 11) ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ — Var. pauciflora Rouy. Colle di S. Martino e all'Acqua delle Regina pr. Asolo (Bolz. n. 18)

748 O. Natrix L. Prosp. p. 40 (1916. 1532)

I–III. Sassicola, ruderale, sepincola. Arcàde, 1859; S. Cassano del Meschio (Fracchia!); Colle Umberto e Ogliano (Pamp. n. 36 e 44); Ponte della Priula (Piave) (Turra, Contarini 1825!); Ponte di Piave, Salgareda, Negrisia (Béguin. 1909!); letto del Piave (Minio, n. 35)

Medicago (Tourn.) Linn.

749 M. lupulina L. Prosp. p. 41 (1927. 1550)
I – IV. Pratense, marginale, sepincola. Tutta la provincia: Selva, Treviso, Cornuda, Vittorio.... dal 1861; Castel di Godego, Resana, Fagarè, Castelfranco, Pederobba (Béguinot, 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Grappa (Vaccari n. 64) – Vulgo: Trepola.

750 M. sativa L. Prosp. p. 40 (1930. 1415. R).
I – IV. Pratense, marginale. Tutta la provincia, spontanea o coltivata Selva, Treviso, Vittorio, Cornuda... dal 1860; Cà Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!) – Var. varia (Martyn). (M. sativa × falcata). Paderno, Vittorio ecc. 1907; Cà Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!). Vulgo (specie e varietà): Medica, Erba Medica, Erba Spagna. È detto che la specie è oriunda dall'Asia occid. e centrale e fu recata dalla Media in Europa all'epoca romana; ma ora è cotanto diffusa, anche ne' luoghi selvatici, che può aversi come pianta del tutto indigena.

751 M. falcata L. Prosp. p. 41 (1930 B. 1550)
I – IV. Ruderale, marginale, murale, pascoliva. Montello, Selva, Caerano Conegliano, Vittorio, Treviso, S. Palè (Pelagio), Cornuda..... dal 1861; Salgareda (Contarini, 1825!); alveo del Piave a Pederobba (Béguinot, 1909!) – Var. microphylla Cus. et Anob. Asolo, Monfumo, lungo il Musone (Bolz. n. 11 sub. M. prostrata Bolz. non Jacq.); Cornuda (Bolz. n. 18) – Var. viscosa Urb. Letto del Piave (Minio, n. 35)

752 M. Pironae Vis. Agg. p. 14 (1943. 1855)
III Rupicola, sassicola, dumale. Monti di Valdobbiadene, 1870; Valmareno di Follina Bereng. 1843 (sub M. carsiensi); S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 297); M. Pizzoc al sito Loc (Trott. 1915!).

753 M. minima Grufberg in L. Prosp. p. 41 (1946. 1726).
I – III. Murale, sassicola, marginale, xerofila. – Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Cornuda, Vittorio, mura di Treviso (anche Bereng. 1839!).... dal 1861; Ponte di Piave, Negrisia, 1909 (Bég. 1909!)

754 M. carsiensis Wulf. Prosp. p. 41 (1950. 1770)
I – IV. Nemofila, sciafila. Montello, freq. 1861; Cansiglio 1869; Asolo, Castelli, Monfumo (Bolz. herb. 1894 e n. 11); M. Cimone e Torresella al passo di S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 397!); boschi del Bassanese al confine dell'Asolano (Ball. 1868, n. 1).

Melilotus (Tourn.) Adans.

755 M. italica (L.) Lam. Agg. p. 14 (1959. 1561. R)
II. Riparia. ~~Presso~~ Lungo un fossato a Selva presso il Montello, nel luogo detto al Palazzon, 1868.

756 M. officinalis (L.) Lam. Prosp. p. 41 (1963. 1415. R).
I – IV. Riparia, sepincolo. Quasi tutta la provincia: Selva, Caonada, Venegazzù, Treviso, Vittorio..... dal 1861; Cà Tron (Dirakz. 1915!); Cansiglio (Béreng. 1843!, Dom Sacc. 1897!); Pederobba (Béguinot, 1909!); Conegliano (Bér. 1843!); Treviso (Trott. 1909!); Fontanelle (Co. Aless. Marcello: forma a legumini più distintamente tessellato-solcati) – Vulgo: Erba Spagna salvadega

757 M. alba Desr. Prosp. p. 41 (1963 A. 1563)
I – IV Riparia, sepincolo. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Falzè, Nervesa (anche Bizz. 1881!), Vittorio ... dal 1861; Pederobba e Salgareda (Bég. 1909!); Pagnano lungo il Musone e a Covolo (Bolz. MS. e n. 11)

758 M. altissima Thuill. Agg. p. 14 (M. macrorrhiza Pers.) (1964. 1844).
I – III. Riparia, igrofilo. Selva, 1868; Montello, 1906; Covolo, Treviso, 1869; Mogliano (Romano, in herb. Pat.!); Portobuffolè (Béreng. 1839!); Monfumo (Bolz. n. 11); letto del Piave (Minio, n. 35).

Trigonella Linn.

C T. Foenum-graecum L. (1966. 1415. R)
I – III. Dell'Asia occid. È coltivata qua e là come foraggio e talora forse subspontanea. Vulgo: Fien greco.

758 T. monspeliaca L. Prosp. p. 41 (1908. 1675)
I. Murale, ruderale. Mura di Treviso, 1862 (anche Favero, 1841!, Fracchia!, Kellner 1841-42!, Bérenger 1839!)

Trifolium (Tourn.) Linn.

760 T. arvense L. Prosp. p. 41 (1974. 1532. R.)
I-III. Campestre, Segetale, ruderale. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Camalò, Vittorio .... dal 1861; Treviso (Favero!) - Var. agrestinum (Jord.). Asolo, Monfumo (Bolz. MS.) - Var. Brittingeri (Weit.). Asolo, Monfumo (Bolz. MS.); letto del Piave (Minio n. 35) - Var. nanum Bolz. Aridi calcarei in cima al colle Bacciocco di Asolo (Bolz. MS.)

761 T. scabrum L. Prosp. p. 42 (1979. 1696)
I-II. Murale, sassicolo, marginale. Mura di Treviso (anche Bér. e Favero, 1842!), vie sassose di Camalò, Paderno, muraggi di Nervesa.... dal 1862; Monfenera e Grappa (Bolz. MS.).

762 T. incarnatum L. Prosp. p. 41 (1987. 1532)
I-IV. Marginale, nemofilo, campestre (avventizio?). Selva, Volpago, Camalò, Montello ... dal 1862; S. Maria di Lago (Pamp. Fl. it. ex s. n. 873. È largamente coltivato nella var. elatius Gib. et Belli. Vulgo. Strafusi ros (rust.) o Strafogio rosso. — È da escludersi per ora: T. stellatum Prosp. p. 41, non L., che è soltanto una forma magra di T. incarnatum (raccolta nel Montello)

763 T. ochroleucum Huds. Agg. p. 14 (1995. 1550)
II-IV. Nemofilo, pascolivo. Montello di Nervesa (anche Fr. Sacc. 1895) e Caerano 1862; colli di Asolo (Bolz. n. 11); Resana (Béguinot, 1909!)

R T. noricum Wulf. (1997. 1850)
III-IV. Pascolivo. Cansiglio (Mari n. 33). Da confermarsi, la specie essendo stata trovata pel Veneto finora soltanto in Friuli a Sutrio.

764 T. pratense L. Prosp. p. 41 (1998. 1415)
I-IV Pratense, marginale. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Conegliano, Vittorio.... spontanea e coltivata, dal 1860; Cà Tron (Dratz. 1915!); Cansiglio a m. 2050 (Dom. Sacc. 1897!) — Var. albidum Sacc. l.c. (1863) (= var. albiflorum Goiv. 1906). Qua e là colle specie, di rado a Selva 1863; a Sarzo (Pamp. in De Toni n. 29) — var. microphyllum (Desv.) foliis quam typi dimidio minoribus. Vie a Treviso, 1868; Grappa in Val Melin (Bolz. MS.) — Vulgo: Strafuoi, Strafogio

765 T. medium L. Agg. p. 14 (1999. 1550) (T. alpestre Sacc. Prosp. p. 41 ex p.)
II-IV. Nemofilo, marginale, pratense. Montello, freq., Selva, Giavera, Susegana.... dal 1861.

766 T. alpestre L. Prosp. p. 41 ex p. (2000. 1550)
III-IV. Pratense, pascolivo. Nel Trevigiano (G. Montini in Bertol.); prati dei Collalti ~~(Dom. Montini~~ verso S. Nazario ai confin. del Trevigiano (Dom. Montini 1872)

767 T. rubens L. Prosp. p. 41 (2001. 1532)
II-IV. Nemofilo, pascolivo, xerofilo. Montello, Monfenera, Endimione, Cornuda, Vittorio... dal 1861; Cansiglio, 1869; Asolo (Bolz. n. 11); Pederobba (Béguinot 1909!); Valdobbiadene fra Segusino e Milies (Bolz. MS.)

768 T. fragiferum L. Prosp. p. 42 (2006. 1550)
I-IV. Marginale, alveale, pascolivo. Alveo e muraggi del Piave a Nervesa, Treviso fuori della Barriera (anche Trott. 1909!) S. Palè, Selva, Spresiano,.... dal 1862; Cornuda e fuori Serravalle (Trotter, 1912!); Resana (Bég. 1909!); Asolo sul colle S. Martino (Bolz. n. 26) — Var. ericetorum Rchb. Castelli d'Asolo lungo la strada che conduce a Castelcies (Bolz. n. 11 [T. resupin.] e n. 26).

769 T. hybridum L. (2015. 1842)
II. Campestre, segetale. Montello, fra le biade (specialmente l'Avena sativa) nei campi, 1903 e 1912. Dubito che qui sia avventizio.

770 T. repens L. Prosp. p. 42 (2017. 1415).
I–IV. Marginale, pratense, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio, Treviso .... dal 1861; Cà Tron (Dirabz. 1915!); Castelfranco, Resana, Godego (Bég. 1909!); Cansiglio (D. Sacc. 1897!) – Var. rubescens Sacc. Selva 1906; Coppuolo (Pamp. in Detoni n. 29) – var pallescens (Schreb.). Cansiglio 1869. Vulgo: Strafogio mato o bianco, Strafogio ladin (tutte le var.)

771 T. Thalii Vill. (2018. 1532)
IV–V. Pascolivo, sassicolo. Grappa (Montini in Vacc. n. 64 [T. caespitosum Reyn)

772 T. montanum L. Prosp. p. 42 (2019. 1532)
I–IV. Pratense, marginale. Selva, Camalò, S. Palè, Nervesa (anche Bizzozero, 1881), Colfosco, Cornuda, Vittorio .... dal 1859; Resana, Ponte di Piave, Negrisia, Salgareda, Pederobba (Bég. 1909!); Collalti (D. Montini, 1872!); Asolo, colle di S. Martino (Bolz. MS.); letto del Piave (Bolzio, n. 35) – var. microphyllum Bolz. Erbosi, aridi del Montagnon di Masèr (Bolz. MS.)

773 T. alpinum L. Agg. p. 14. (2020. 1595)
IV–V. Pascolivo. M. Grappa (Spranzi!)

774 T. patens Schreb. Prosp. p. 42 (2025. 1532)
I–III. Marginale, pratense, igrofilo. Mogliano (anche Mayer in Bertol.), Selva, Montello, Treviso (anche Trott. 1909!), Cornuda (anche Trott. 1908!), Conegliano (anche Bereng. 1841!), Vittorio, Val Sobbiadene .... dal 1861; Resana, Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!); colli Asolani (Zanard. 1827!); Pederobba al Piave (Bég. 1909!) – Varia assai; talora è assai gracile e affetta l'abito di T. filiforme

775 T. campestre Schreb. Prosp. p. 42 (T. procumbens L.) (2026. 1583)
I–IV. Campestre, sassicolo, pratense. Selva, Vittorio, Nervesa (anche Bipp. 1881!), Conegliano, Cornuda... dal 1861; letto del Piave (Minio n. 35); Resana, Jagarè, Zenson (Bég. 1909!); Cà Tron (Diralz. 1915!) – Varia minus e majus. Vulgo: Strapgio zalo.

776 T. aureum Pollich. Prosp. p. 42 (T. agrarium L. ex p.) (2027. 1551)
II–IV. Pascolivo, pratense. Selva, Montello, Vittorio (anche Fr. Sacc. 1894!)... dal 1862; Cansiglio, 1869.

Anthyllis (Riv.) Linn.

777 A. Vulneraria L. Prosp. p. 40 (2032. 1532)
I–IV. Pascoliva, pratense, nemopla. Selva, Camalò, Cornuda, Vittorio, Colfosco... dal 1861; Savassa (Contarini, 1825!); Cansiglio (anche D. Sacc. 1897!); Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) – Var. bicolor Bert. fecit Grappa (Montini in Bert.) – Var. rubra L. Prosp. p. 40 (var. rubriflora Sez.). Prati secchi di Camalò, Cornuda, Covolo, Vittorio al colle di S. Antonio... dal 1861; Grappa (Montini in Bertol.); Resana (Bég. 1909!) – Var. alpestris Kit. Grappa (Kellner, 1845!) – Var. Pseudovulneraria Sagorski fm. unicolor Sag. (A. Vuln. f. unicolor G. Beck). Fregona a 300 m. (Béguinot in Fl. it. exs. n. 2109)

Dorycnium (Tourn.) Scop.

778 D. pentaphyllum Scop. Prosp. p. 42 (D. herbaceum Vill.) (2037. 1550)
I–IV. Pratense, nemofilo, dumale. Selva, Cornuda, Montello, Vittorio, Colfosco... dal 1862; Asolo (Bolz. n. 10); Ponte di Piave, Zenson, Pederobba (Béguinot, 1909!) – Var. hirsutissimum Sacc. Prosp. p. 42 (tota planta valde hirsuta). Coll. di Colfosco, 1862 – Var. angustifolium Bolz. S. Martino di Asolo (Bolz. MS.)

Lotus (Tourn.) Linn.

779 L. corniculatus L. Prosp. p. 42 (2043. 1415. R)
I – IV. Pratense, Campestre, murale. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda (Beg. 1909!); Asolo (Bolz. n. 10); Cansiglio (anche Dom. Saccardo 1897) — Var. hirtellus Sacc. Prosp. p. 42. Prati di Selva e Camalò, 1861 — Var. hirtutus Koch. Coppuolo (Pamp. n. 36) — Var. villosus Thuill. Grappa (Vaccari n. 64) — Var. decumbens Poir. Letto del Piave (Minio, n. 35) — Var. tenuifolius L. (L. tenuis W. K.). Selva, Montello, Vittorio, 1906; lungo il Musone a Monfumo e letto del Piave a Covolo e ad Asolo (Bolz. n. 10 e 13); Ponte di Piave, Negrisia, Resana (Béguinot, 1909!). Vulgo Vedriolo, Vedriol (tutte le var.)

780 L. siliquosus L. Prosp. p. 42 (Tetragonolobus siliquosus Moench) (2051. 1532)
I – III. Ripario, igrofilo, marginale. Treviso, Arcadia, Spresiano ... dal 1861; Vittorio, via Cavallotto, 1906; Monfumo, Castelli di Asolo Bolz. n. 11); Coppuolo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 878!); Ponte di Piave, Negrisia, Zenson (Béguinot, 1909!)

Astragalus (Tourn.) Linn.

A A. hamosus L. (2058. 1565)
II – III. Marginale, domofilo. Via di Vittorio (Pamp. in Fiori Fl. anal. e Bolz. n. 23). Avventizio?

A A. baeticus L. (2056. 1674)
Dell'Italia centr. e merid. Lungo la via a Vittorio (Pamp. in Fiori Fl. anal. e Bolz. MS.). Sfuggito probabilmente alle culture, giacchè coltivavasi per uso caffè.

781 A. glycyphyllos L. Prosp. p. 43. (2062. 1532)
I – IV. Sepincolo, nemofilo, dumale. Selva, Volpago, Camalò, Montello, Vittorio, Conegliano ... dal 1861; Salgareda (Contarini 1825!); Asolo (Bolz. n. 11); Castelfranco, Pederobba (Béguinot 1909!)

782 A. montanus L. Agg. p. 15 (Oxytropis montana) (2067. 1707)
IV–V. Pascolivo. Grappa (Parolini herb., Vacc. n. 64)

783 A. campester L. (2070. 1785)
IV–V. Rupicolo, pascolivo. Grappa (Vaccari, n. 64)

784 A. Onobrychis L. Prosp. p. 43 (2078. 1595)
II–IV. Pratense, pascolivo, alveale. Letto del Piave a Corolo, Falzè, Nervesa, a Sant' Andrà ... dal 1861; Valdobbiadene (Favero, 1844!); Cornuda (Trotter, 1908!); Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda (Béguinot, 1909!); Formeniga (Pamp. in Bolz. n. 13) — Var. microphyllus (Bess.), Letto del Piave ai confini fra il Bellunese e il Trevigiano (Bolz. MS.).

785 A. vesicarius L. (2080. 1785)
III–IV. Rupicolo, pascolivo, sassicolo. Sommità fra il M. Cimone e il M. Torresella, sopra Torena (Pampanini in Bolz. MS.). È la var. Pastellianus (Poll.)

786 A. leontinus Wulf. Prosp. p. 43 (2079. 1847)
IV Nemofilo, pascolivo. Boccaor del Grappa sopra Crespano (Montini in Bertoloni)

Amorpha Linn.

CA A. fruticosa L. Agg. p. 15. (2089. 1760)
II–III. Oriunda della Carolina. Naturalizzata a Selva, forse in seguito a precedente coltivazione.

Galega (Tourn.) Linn.

787 G. officinalis L. Prosp. p. 42 (2090. 1320)
I–IV. Riparia, sepincola. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Cornuda, Conegliano, Vittorio.... dal 1861; Cà Tron (Dvatz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.); Susegana (Pamp. n. 44) — Var. bicolor Sacc. Floribus violaceis, alis vero candidis. Lungo la Brentella a Selva, 1908.

Wistaria Nutt.

C. W. floribunda (W.) DC. (2091 (Kraunhia). 1842)
I – III. Della Cina e Mongolia. Coltivata e qua e là naturalizzata, come a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1865. Vulgo: Glicine.

Robinia Linn.

7808 R. Pseudacacia L. Prosp. p. 42 (2092. 1662)
I – III. Dell'America sett. Coltivata ovunque e del tutto spontaneizzata, persino nei boschi, come nel Montello, Cansiglio... dal 1861 – Var. umbraculifera DC. Coltivata comunemente, specie negli ambulacri. Vulgo: Gadia (rust.), acàzia, robina, gazia (tanto la specie che la var.) cassia

C R. hispida L. Agg. p. 15 (2092 A. 1794)
I – III. Della Carolina. Coltivata qua e là... dal 1865, ora assai meno

Colutea (Tourn.) Linn.

A C. arborescens L. Prosp. p. 43. (2093. 1532)
III – IV. Nemofila, sepiaria. Presso Pederobba e Valdobbiadene (Stevanin, 1861!). Dubito si tratti di individui avventizi in seguito a coltivazione.

Coronilla (Tourn.) Linn

7809 C. varia L. Prosp. p. 43 (2101. 1550)
I – IV. Sepincola, marginale, riparia. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Cusignana, Falzè, Montello, Covolo, Montebelluna... dal 1861; intorno ad Asolo (Bolz. n. 10); Salgareda (Contarini, 1825!); Castelfranco (Béguin. 1909!); Carpesica (Pamp. n. 44).

7810 C. coronata L. (2102. 1713). (C. montana Jacq.)
II – IV. Nemofila. Mondragon presso Corbanese (Pamp. n. 36); ai Piai presso Cozzuolo (Pamp. n. 44); passo S. Boldo (Pamp. in Fl. it. ex S. n. 883!)

791 C. minima L. (n. 2103) var. vaginalis (Lam.) Prosp. p. 43 (c. spec. 1651)
III – IV. Pascoliva, pratense. Cansiglio, 1861; sopra Crespan (Parolini herb.); Grappa (Zanardini 1827!); Semonzo, Col Vicentin a Faès (Pamp. in Bolz. n. 13 e n. 44 ed in Fl. ital. exs. n. 885!)

792 C. Emerus L. Prosp. p. 43 (2106. 1550)
II. IV. Nemofila, rupestre, dumale. Montello, specie lungo la Brentella (anche Kellner 1840), Colfosco, Covolo, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio ... dal 1861; Asolo e Masèr (Bolz. MS.); Pederobba (Béguinot, 1909!) Valle del Bonaor pr. S. Andrea (Bolz. MS.)

Hippocrepis Linn.
793 H. comosa L. Prosp. p. 43 (2107. 1550)
I – IV. Pratense, pascoliva, marginale, alveale. Camalò, Paderno, Falzè, Colfosco, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; Asolo (Bolz. n. 10); letto del Piave a Covolo (Bolz. MS.); Pederobba, Ponte di Piave (Béguinot, 1909!); Grappa (Vacc. n. 64); Ardosa di Crespan (Zanard. 1827!); S. Boldo (Trotter 1912)

Onobrychis (Tourn.) Adans.
794 O. vicifolia Scop. Prosp. p. 43 (O. sativa Lk) (2114. 1532)
II – III. Alveale, pratense. Alveo del Piave a Nervesa, Covolo, prati di Arcade, Nervesa ... dal 1862; letto del Meschio 1863 (anche Fracchia 1838!); Asolo (Bolz. n. 11); Ponte di Piave, Zenson, Negrisia (Béguinot, 1909!)

Cicer (Tourn.) Linn.
C C. arietinum L. Prosp. p. 43 (2119. 1415. R.)
I – III. Probabilmente di origine asiatica. Coltivato un tempo copiosamente, p. e. a Selva e talora erratica. Volgo: Pezzioi

Pisum (Tourn.) Linn.

C P. sativum L. Prosp. p. 45 (2120 – 1415. R.)
I – IV. Di origine probabilmente persiana e caucasica. Coltivato ovunque e talora sporadico – ~~Var.~~ Vulgo: Biso, bisi. – Var. arvense (L.) Coltivato ad uso di foraggio, p. e. intorno Treviso, 1868.

Lathyrus (Tourn.) Linn

795 L. aphaca L. Prosp. p. 45. (2121. 1550)
I – IV. Segetale, campestre, ortivo. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio.... dal 1858.

796 L. Nissolia L. Prosp. p. 45 (2122. 1696)
I – III. Segetale, campestre. Selva, Vittorio... dal 1861; Valdobbiadene (Bérenger, 1843!); colli Asolani (Zanard. 1827!); nel basso Trevigiano (Mayer in Bertol.)

797 L. hirsutus L. Prosp. p. 45 (2129. 1785)
II – III. Campestre, segetale, sepincolo. Selva, Cusignana, Valdobbiadene.... dal 1861; Salgareda (Contarini 1825!) ~~[illegible]~~ – Var. pinnatus Vis et Sacc. Mogliano (Mayer in Bertol., Romano in herb. Pat.)

798 L. silvester L. Prosp. p. 45 (2130. 1550)
I – III. Sepincolo, ripario, nemofilo. Montello e lungo la Brentella, Selva, Vittorio... dal 1861; Mogliano (Mayer, Romano in herb. Pat.); Savassa (Contarini 1825!); Segusino (Bolz. ms.) – Var. latifolius (L.). Col tipo qua e là ed anche coltivato per ornamento; Salgareda (Contarini 1825!) – Vulgo: Bisi mati

799 L. sphaericus Retz. Prosp. p. 45 (2136. 1745)
I – III. Segetale, sassicolo. Selva, Volpago, Vittorio... dal 1861; Mogliano (Mayer in Bert., Romano in herb. Pat.); Valdobbiadene (Favero in herb. Pat. 1844! – Var. stenophyllus Boiss. Qua e là.

800 L. pratensis L. Prosp. p. 45 (2138. 1532)
I – III. Pratense, pascolivo, ripario, nemofilo. Selva, Valpago, Montello, Conegliano (anche Bérenger 1843!), Vittorio, ~~Montello~~ Cornuda ... dal 1861; Grappa (Bizz. 1878! e in Bolz. MS.); Ponte di Piave e Salgareda (Bég. 1909!); Valdobbiadene (Bolz. MS.); Cansiglio, m 1100 (Dom. Sacc. 1897!). È comune e promiscua la var. sepium Scop. — Var. pubescens Strobl. Asolo al Foresto nuovo (Bolz. MS.) — Vulgo: Biseti zali.

801 L. niger (L.) Bernh. Prosp. p. 46 (Orobus niger L.) (2145. 1550)
II – III. Nemofilo, eliofobo. Montello e boschi dei colli di Cornuda, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; Castelli di Monfumo (Bolz. n. 11).

802 L. Linnaei Rouy. Prosp. p. 45 (Orobus luteus L.) (2144. 1726)
III – IV Nemofilo, pascolivo. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Parolini e Montini in Bertol., Spranzi!, Zanardini 1827!, Vaccari n. 64); Cansiglio (Mari n. 33); M. Tavergheza sopra Fadalto (Pamp. in Fl. it. exs. n. 888!)

803 L. vernus (L.) Bernh. Prosp. p. 45 (Orobus vernus L.) (2148. 1550)
I – IV. Nemofilo, eliofobo. Montello, colli di Cornuda e Vittorio .... dal 1861; bosco di Cà Tron (Fiori Fl. anal. ital.); Asolo, Monfumo (Bolz. MS.)

804 L. venetus (Mill.) H. et W. (2149. 1563)
I – III. Nemofilo, eliofobo. Boschi di Valdobbiadene (Favero, 1845!, Bérenger 1844!; bosco di Cà Tron (Fiori, 1896, in herb. Pat.!)

Vicia (Tourn.) Linn.

805 V. oroboides Wulf. Prosp. p. 45 (Orobus Clusii Spr.) (2150. 1595)
III – IV. Nemofilo, dumale, eliofobo. Boschi di Varga pr. Valdobbiadene (Favero e Bérenger. 1845!), Valdobbiadene (Bolz. MS.); S. Pietro di Feletto (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 303); Castagneti di Castelli, Monfumo (Bolz. n. 11)

C V. Faba L. Prosp. p. 44 (2151. 1415. R.).
I–III. Di origine orientale. Coltivata qua e là e talora erratica, p. e. a Treviso, Conegliano (anche Béreng. 1842), Castelfranco.... dal 1862. Vulgo Fava, Fava bona.

806 V. sepium L. Prosp. p. 44 (2153. 1554)
II–IV. Nemofila, eliofoba. Bosco Montello, comune, 1861; Cansiglio 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); Conegliano (Béreng. 1842!); Collalto (Dom. Montini, 1872!); Grappa (Montini in Bert., Bolz. ms.)

807 V. pannonica Crantz Prosp. p. 44 (2154. 1834)
II. Campestre. Nel Trevigiano (Fiori Fl. anal. it.); Grappa [prob. regione inferiore] (Montini in Bertol., Vacc. n. 64).

808 V. sativa L. Prosp. p. 44 (2160. 1532. R)
I–IV. Campestre, segetale. Tutta la prov.: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Cà Tron (Dratz 1915!) — Var. cordata (Wulf.) Qua e là colle specie — Var. angustifolia (L.). Prosp. p. 44 c. spec. Selva, Vittorio... dal 1861; Selvana (Fracchia!); Mogliano (Mayer in Bertol.) Conegliano (Béreng. 1842!) — Vulgo: Veza, Sesara, Zesara, Teghe, Teghete

809 V. dumetorum L. Prosp. p. 44 (2166. 1785)
II. III. Nemofila, eliofoba. Montello, comune dal 1861; Asolo (Béreng.!, Bolz. n. 11).

810 V. silvatica L. Agg. p. 15 (2168. 1785)
III–IV Nemofila, eliofoba. Bosco Cansiglio, 1869; sopra Valdobbiadene Béreng., 1845!

811 V. cassubica L. Prosp. p. 43 (2172. 1551)
II Nemofila, ~~eliofoba~~ dumale. Margini del bosco Montello, rara 1862; M. Crep sopra Miane (Béreng., 1842!)

812 V. Cracca L. Prosp. p. 44. (2174. 1563)
I–IV. Campestre, segetale, sepincola. Tutte le prov.: Selva, Volpago, Cornuda, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; Salgareda (Contarini 1825!) Valdobbiadene, Castelfranco (Bolz. MS.); Cansiglio (D. Sacc. 1897!); Grappa (Vaccari n. 64); Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!); Pederobba, Castelfranco, Godego (Bég. 1909!) — Vulgo: Veza, Zèsara, Zesarin — Var. tenuifolia (Roth). Campi a Selva, 1861, rara.

813 V. villosa Roth. (2176. 1822)
II Campestre, segetale. Margine del Montello a Selva, 1906 — Var. dasycarpa (Ten.) Prosp. p. 44 c. spec. Campi a Mogliano (Mayer in Bertol.)

814 V. tetrasperma (L.) Mönch Prosp. p. 44 (Ervum tetraspermum L.) (2180. 1694)
I–III. Segetale, campestre, dumale, sepincola. Mogliano (Mayer in Bertol.) margini campestri del Montello 1905 (anche D. Sacc. 1890!); ca' Tron (Dir. 1915!) Var. gracilis (Lois.) Qua e là nella provincia (anche in Erb. Guss. a Napoli)

815 V. hirsuta (L.) S. F. Gray. Prosp. p. 44 (Ervum hirsutum L.) (2181. 1551).
I–III. Campestre, segetale, dumale. Selva, Volpago, Conegliano (anche Bereng. 1842!), Vittorio ... dal 1861; Mogliano (Mayer in Bertol.); Asolo al Colle S. Martino e Monfumo (Bolz. n. 11); Asolo (Zanard. 1827!).

C V. Ervilia (L.) W. (2183. 1550. R)
I–III. Di patria incerta. Coltivata qua e là come foraggio e sovescio nei campi. Vulgo: Vezioi.

CA V. Lens (L.) C. et Germ. Prosp. p. 44 (Ervum Lens L.) (2184. 1415. R)
I–IV. Probabilmente indigena, ma, comunque, spesso avventizia e subspontanea, sfuggita alle colture, come a Selva, Treviso, Vittorio ... dal 1861; Asolo (Zanardini 1827!). Vulgo: Lent o Lente.

Phaseolus (Tourn.) Linn.

CA Ph. vulgaris L. Pisp. p. 46 (2187. 1550)
I – IV. Originario dell'Amer. merid. Coltivato ovunque e spesso avventizio qua e là. Coltivasi molte varietà e precisamente: α communis Tanb.; β romanus (Savi); γ oblongus (Savi); δ rhaeticus (Savi); ε tumidus (Savi); η nanus (L.) Pisp. p. 46. Volgo: Fasiol, Fasioi, Fasioi nani, tondi, bianchi ecc

C Ph. coccineus L. Pisp. p. 46 (Ph. multiflorus W.) (2188. 1642)
I – III. Originario del Messico e delle Ameri. Sett. Coltivato frequentemente nelle var. a fiori rossi e bianchi, come a Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1861 Volgo: Fasiol, Fasioi rossi o da giardin.

Vigna Savi.

CAV. unguiculata (L.) Walp. (2189. 1591. R)
Di origine asiatico-africana, coltivata ovunque in provincia, specialmente nelle var. Catiang (L.) Pisp. p. 46 (Dolichos Catiang L.). Volgo: Fasioleti dall'ocio o dell'acato e (il legume) cornete, cornetti.

Soja Moench.

C S. hispida Moench. Agg. p. 15 (2189. B. 1701)
I – III. Native del Giappone e Giava. Coltivasi spesso p.e. a Selva, Serotta ... nel 1864, come surrogato del caffè, ma meno o punto. Volgo Caffè forestò.

Fam. 59 Myrtaceae

Punica (Tourn.) Linn.

C P. Granatum L. Pisp. p 52 (2196. 1415 R)
I – III. Originario dell'Africa sett. Coltivasi spesso presso le case, segnatamente nella regione collinare. Volgo: Pom o pomo granà o ingranà.

Myrtus Linn.

C M. communis L. Prosp. p. 55 (2193. 1415. R).
I–III. Spontaneo nell' Italia mediterranea. Coltivasi frequentemente nei boschetti. Volgo: Mirto
I, p.e attorno al castello Colletto di Susegana, 1868.

Eucalyptus L'Hérit.

C E. Globulus Labill. (2190. 1845)
I–III. Dell' Australia. Coltivasi ora non di rado nelle esposizione protette da nord p.e a Vittorio, ma soffre spesso negli inverni. Con altre specie è copiosamente coltivata nel Mezzodì d'Italia, dove è rusticissima.

Fam. 66 Lythraceae

Peplis Linn.

816 P. Portula L. Agg. p. 18 (2197. 1697)
III–IV. Igrofila, palustre. Cogli Sfagni nel Cansiglio, 1869.

Lythrum Linn.

817 L. Salicaria L. Prosp. p. 55 (2199. 1532)
I–IV. Ripario, igrofilo. Tutta la provincia: Selva, Gravera, Conegliano, Vittorio, Cornuda.... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.) — Var. bracteosum DC. Agg. p. 17. Valdobbiadene (Béreng. 1846!) — Var. tomentosum (Mill.) Coll. presso Asolo (Bolz. MS.)

818 L. Hyssopifolia L. Agg. p. 17 (2202. 1651)
II. Igrofilo, nemofilo. Montello, raro, 1872 (anche Fr. Saccardo, 1890!); Chiarano pr. Oderzo (Béreng. 1839!)

Fam. 61 Oenotheraceae

Epilobium Linn.

819 E. Dodonaei Vill. Prosp. p. 53 (2204. 1532)
II–IV. Alveale, sassicolo, murale. Montello, Camalò, Paderno, Possagno

Cornuda, Vittorio.... dal 1861; Sarazza e Salgareda al Piave (Contarini 1825!); Collalt. (Dom. Montini, 1872!); Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1841!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Vacc. n. 42); alveo del Piave a Pederobba, Zenson, Ponte di Piave (Bég. 1909! Minio n. 35) – Varia a foglie più o meno anguste, da 2 a 4 mm.

820 E. angustifolium L. Prosp. p. 53 (2205. 1532)
II – IV. Nemofilo, igrofilo. Montello, al Fondaby, Vittorio... fino dal 1861; Cansiglio, 1867 (anche mari n. 33, Dom. Sacc. 1897!); Valdobbiadene, 1870; Conegliano (Béreng. 1842!); M. Cesen sopra Valdobbiadene (Bolz. n. 13); Grappa (Stern. 1803, n. 59, Coban 1906!, Bizzozero, 1878!, Bolz. n. 11) – Var. Substenophyllum Rouy et Cam. Grappa, valle di S. Filà (Bolz. MS.)

821 Epilobium montanum L. Prosp. p. 53 (2206. 1532)
III – IV. Nemofilo, dumale. Montello, raro 1861 (anche Fr. Sacc. 1890!); Cansiglio, 1869 (anche Contarini 1825!, Ang. Giacomelli 1841!, Béreng. 1838!, Dom. Sacc. 1897!, Bolz. n. 11, Vacc. n. 64) – Var. lanceolatum (Seb. et Mauri) Grappa (Dom. Montini, 1872!); presso Treviso [avventizio?] (R. Roggen in Bolz. MS.)

822 E. parviflorum Schreb. Prosp. p. 53 (2207. 1550)
I – III Ripario, igrofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Conegliano, Vittorio, Cornuda..... dal 1861; Pederobba (anche Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.)

823 E. hirsutum L. Prosp. p. 53 (2208. 1550)
I – III Ripario, igrofilo. Montello lungo la Brentella 1858; Treviso, Paderno, Vittorio, Conegliano (anche Béreng. 1842!), Cornuda... dal 1861; Tron (Dirats. 1915!) – Var. subglabrum Koch. Alveo del Piave a Pederobba (Béguinot, 1909!, Minio, n. 35)

824 E. palustre L. Agg. p. 17 (2209. 1713)
IV. - Subpalustre, igrofilo. Cansiglio, 1869.

825 E. trigonum Schrank (2213. 1697)
IV-V Nemofilo, dumale, pascolivo. Cansiglio (Pamp. in Bolz. n. 13) Col Santin a Faiz (Contar. 1825, sub E. alpino L.?); Grappa specialmente al Cason dell' Ardosa a 1600 m. e Ardosella (Bolz. 1894 herb. Pat.! n. 13 e MS) Grappa (Vacc. n. 64).

Ludwigia Linn.

826 L. palustris (L.) Ellis. Prosp. p. 53 (Isnardia palustris L.) (2214. 1697)
I-III. Igrofila, palustre. Montello dal 1861; pr. Treviso e Quinto, 1864; laghetti di Revine 1868 (anche Pamp. n. 44); Orsago (Pamp. in Bolz. n. 13)

Oenothera Linn.

CA Oe. biennis L. Prosp. p. 53 (2216. 1612)
I-III. Oriunda d' America. Coltivata per ornamento, ma ora totalmente naturalizzata in più luoghi. p. e nel Montello nel luogo detto ai Frati. (dove al principio dell' 1800 fu demolita la celebre Certosa del Montello) fino dal 1861; colli di Carpesica (Pamp. in De Tom. n. 29); Pieve di Soligo (Salvioni in Bolz. MS.). Vulgo Maravegie zale.

Fuchsia (Plum.) Linn.

C F. coccinea Ait. (2217A. 1806.)
I-III Oriunda del Cile. Coltivata frequentemente per ornamento, p. e. a Selva, Treviso, Vittorio... dal 1861. Vulgo. Fussia. Si coltivano anche altre specie, ma meno frequentemente

Circaea (Tourn.) Linn.

827 C. alpina L. Prosp. p. 53 (2218. 1606.) -
IV. Nemofila, eliofoba. Cansiglio 1869 (anche Contarini 1825!, Béreng. 1840!, Pamp. n. 44); Grappa (Stern. 1803, n. 59, Montini in Bertol.)

828 C. lutetiana L. Prosp. p. 53 (2219. 1532)
I – III. Nemofila, sepincola, eliofoba. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Nervesa, Montello, Vittorio.... dal 1858; Colli di Asolo (Bolz. n. 11) — Var. cordifolia Lasch. Tra Segusino e Milies (Bolz. ms.) — Var. mediterranea Asch. et Magn. Asolo sul colle della Rocca (Bolz. ms.)

Trapa Linn.

R T. natans L. (2220. 1415)
I – III. Idrofila, lacustre. Da ricercarsi e riconfermarsi nei laghi trevigiani dove sembra sia stata trovata e nei fossati della bassa provincia. È spesso coltivata nei laghetti artificiali. Vulgo: Castagna d'acqua.

Fam. 62 Halorrhagidaceae

Myriophyllum L.

829 M. spicatum L. Prosp. p. 54 (2221. 1720)
I – III. Idrofilo, acquatico, fluviale. Quasi tutta la provincia. Selva, Montebelluna, Volpago, Camalò, Vittorio, Falzè di Piave... dal 1861; Treviso 1868 (anche Bérenq. 1837!); Castelfranco (Bolz. ms.)

820 M. verticillatum L. Prosp. p. 54 (2222. 1563)
I – III. Idrofilo, acquatico, fluviale. Treviso 1862 (anche Bérenq. 1837!); Gorgo presso Odergo (Bérenq. 1842!); laghi di Revine (Zaniol, n 65); Cà Tron (Divatz. 1915!) — Var. pectinatum (DC.) Prosp. p. 54 c. spec. Acque intorno Treviso a S. Maria del Rovere (Fracchia!)

Hippuris Linn

821 H. vulgaris L. Prosp. p. 54. (2223. 1554)
I – II. Idrofila, acquatica, palustre. Acque del Sile in e presso Treviso 1861 (anche Tuora, Fracchia!)

Fam. 63 Araliaceae

Hedera (Tourn.) Linn.

832 H. Helix L. Prosp. p. 64. (2224. 1415. R)

I–IV. Murale, rupicola, arboricola. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Montebelluna, Cornuda.... dal 1858. Volgo Èrola, Edera, Edara.

Fam. 64 Umbelliferae

Eryngium (Tourn.) Linn.

833 E. campestre L. Prosp. p. 59 (2232. 1320)

I–III. Ruderale, sassicolo, marginale. Selva, Belvedere, Camalò, Veriegazzù, Montebelluna.... dal 1861.

834 E. amethystinum L. Prosp. p. 59 (2233. 1563)

I–III. Ruderale, sassicolo, marginale. Selva, Camalò, Cornuda, Montebelluna, Vittorio, Treviso (anche Béreng. 1837!), Paderno.... dal 1858; Pederobba (Béguinot, 1909!); Colli di Asolo (Bolz. MS.).

Astrantia (Tourn.) Linn

835 A. major L. Prosp. p. 59 (2240. 1595)

III–IV. Pascoliva, ~~nemofila~~ dumale. Monfenera, Eudimione, 1861, ~~(anche Bolz. MS.)~~; Grappa (Sternb. 1803, n. 59), Visiani herb. Pat., Vaccari n. 64, Bizzoz. 1878!, Cobau, 1905 [fm. involucris roseis et foliorum caul. laciniis angustioribus et longioribus — Var. carinthiaca (Hoppe) M. Grappa in valle Scalarè 1000–1300 m. (Bolz. MS.)

Sanicula (Tourn.) Linn.

836 S. europaea L. Prosp. p. 59 (2242. 1415)

II–IV. Nemofila, eliofoba, igrofila. Montello, 1859–61, Cornuda, 1861; Cansiglio, 1869; Faìs del col Visentin (Contarini, 1825!); Asolo vicino l'Ospedale (Bolz. MS.)

Bupleurum (Tourn.) Linn.

837 B. stellatum L. Prosp. p. 61 (2245. 1785)
III – IV. Rupicolo, pascolivo. M. Grappa (Montini in Bertol., Vaccari n. 64, Kellner!)

838 B. ranunculoides L. Agg. p. 19 (2252. 1697)
III – IV. Rupicolo, pascolivo. Intorno al Lago Morto e fuori Serravalle, 1865–1870 (anche Fiori, 1899! herb. Pat.); Fais (Contarini 1825!); M. Pizzoc (Pamp. in Bolz. n. 13); M. Favergherar sopra Fadalto (Pamp. in Fl. it. exs. n. 901!); Grappa (Bizz.!); Grappa a Ardosa (Bolz. MS.) Le sopradette citazioni debbono riferirsi alla fm. caricinum (DC.) – Var. elatum Gaud. S. Boldo (Pamp. in Bolz. MS.); Grappa (Montini herb., Art. Rossi 1880, in herb. Bizz.)

839 B. Odontites L. Prosp. p. 61 (B. aristatum Bartl.) (2254. 1606)
III. Pascolivo, xerofilo. Colli di Romano (Montini in Bertol.)

Trinia Hoffm.

840 T. glauca (L.) Rchb. Prosp. p. 60 (T. vulgaris DC.) (2259. 1563)
II – IV. Pascoliva, sassicola. Grappa (Montini in Bertol., Bizzoz. 1878, herb. Pat.); Cansiglio 1869; prati di Spresiano presso il Piave, dal quale probabilmente fu portato dai monti (D. Gustavo Venturi!)

Carum Linn.

841 C. Carvi L. Prosp. p. 60 (2267. 1558. R).
II – IV. Pascolivo, pratense. Colforco 1861, Nervesa 1862, Vittorio 1907 e certo in quasi tutti i colli; Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64); Collalti (Dom. Montini 1872!) – Vulgo: Comin, Carvese.

Petroselinum Hoffm.

CA P. hortense Hoffm. Prosp. p. 59 (P. sativum Hoffm.) (2273. 1415)
I – IV. ♀ Probabilmente è originario dell'Europa meridionale, ma coltivato dovunque e inselvatichito e sporadico qua e là come a Treviso, Selva, Vittorio .... dal 1858. Vulgo: Parsèmolo, Parsèmol.

♀ ortivo, domofilo, ruderale.

Apium (Tourn.) Linn.

842 A. graveolens L. Prosp. p. 59. (2276. 1415. R)

I–IV. Ortivo, igrofilo. Coltivato ovunque, ma, come sembra spontaneo o subspontaneo qua e là, come a Selva al margine di qualche fossato 1862; a Nogarolo (Vittorio) dove nel 1900 vidi presso un fossato una colonia d'individui, riveduti nel 1906 da Pampanini (n. 44). Volgo Séleno.

Sium (Tourn.) Linn.

843 S. erectum Huds. Prosp. p. 60 (Berula angustifolia (L.) Koch) (2280. 1551)

I–IV. Palustre, aquatico, ripario. Treviso, Selva (anche Bizz. 1881), Paderno, Conegliano, Vittorio ..... dal 1861; Savazza (anche Trotter, 1906!); Cà Tron (Dratz. 1915!); Resana (Béguin. 1909!) – Var. integratum Sacc. Bracteis involucri et involucelli plerumque integris nec pinnatifidis. Selva, nei fossati, 1906. – Il Sium latifolium citato nel Prosp. p. 60 è una forma macrofilla sterile della presente specie.

Pimpinella Linn.

844 P. major (L.) Huds. Prosp. p. 60 (P. magna L.) (2284. 1554)

I–IV. Pratense, pascoliva, marginale. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio ..... dal 1861; Montello (anche Bizz. 1881); Pederobba (Béguinot, 1909!) – Var. orientalis (Gouan) = laciniata Wallr. Sepincola e riparia presso Treviso, 1864.

845 P. saxifraga L. Prosp. p. 60 (2285. 1415. R.)

I–IV. Rupicola, sepincola, pascoliva, marginale. Selva, Camalò, Nervesa, Conegliano, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; alveo del Piave (Minio n. 35); qui Var. rotundifolia (Scop.). Asolo (Bolz. n. 26); Cansiglio (Béreng. 1840!) – Var. nigra (Mill.) M. S. Augusta di Serravalle, 1861; Fais (Contarini 1825! – Var. rubra Fiori. Grappa (Stern. 1803, n. 59) – Var. hircina (Mill.). Mura di Treviso, 1868 – Var. alpestris (Spr.) Koch. Cansiglio, 1869 (anche Béreng. 1840!); Grappa (Cobau 1906!, Vaccari n. 64)

Seseli (Riv.) Linn.

846 S. annuum L. Agg. p. 20 (S. coloratum Ehrh.) (2300. 1718)
III. Pascolivo, pratense, rupicolo. Colli di Colfosco, Vittorio ... dal 1863; raro nei prati a Selva, 1871.

847 S. montanum L. (2297. 1754)
III. Pascolivo, rupicolo ~~pratense~~. Colli di Cozzuolo (Bolz. n. 13). Da confermarsi; è forse una forma del precedente?

Pachypleurum Led.

848 P. simplex (L.) Rchb. Agg. p. 20 (Gaya simplex Gaud.) (2305. 1678)
IV-V. Pascolivo. Grappa (Sprangi!, Montini)

Selinum Linn

849 S. Carvifolia L. Prosp. p. 61 (2306. 1785)
II-IV Nemofilo, eliofobo. Montello, comune dal 1861 (anche Bizz. 1872!); Conegliano (Béreng. 1842!); Vittorio e Cansiglio, 1869.

Foeniculum (Tourn.) Adans.

850 F. vulgare Mill. Prosp. p. 61 (~~Ef.~~ (2318. 1415. R)
I-IV Rupicolo, murale, domofilo. Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio p. e al colle S. Augusta, Montello (raro, forse sporadico) ... dal 1858. È coltivato nelle due var. sativum Bert. (pei frutti aromatici) e var. dulce Mill. pei turioni mangerecci.

Ligusticum (Rivinus) Koch.

851 L. officinale Koch (2319. 1415) (Bolz. MS)
IV. Rupestre. M. Grappa, rupi calcaree in Val di Scalaré a m. 1200-1400. Per l'Italia la specie (di origine più meridionale) è indicata soltanto come naturalizzata: notevole quindi l'ubicazione ora citata.

Aethusa Linn.

859 Ae. Cynapium L. Prosp. p. 61 (2322. 1550)
I–IV. Sepincola, ruderale, margine, nemofila. Selva, Montello (anche Bigg. 1881!), Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio .... dal 1861

Angelica (Tourn.) Linn.

853 A. silvestris L. Prosp. p. 61 (2324. 1550)
I–IV. Riparia, igrofila, sepincola. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio ..... dal 1861; Castelfranco, Resana (Béguinot, 1909!). L. Archangelica? officinalis ricordata nel Prosp. p. 61, come raccolta nel Montello, è una forma anormale, fillomaniaca di Angelica silvestris L.

Ferula (Tourn.) Linn.

854 F. Ferulago L. Prosp. p. 62 (Ferulago galbanifera Koch) (2327. 1550)
III Pascoliva, pratense. Vittorio (Ceneda e Serravalle), Cornuda, Valdobbiadene ... dal 1861; Cozzuolo, Corbanese (Pamp. n. 48 e Fl. ital. exs. n. 472); colli asolani, Colle S. Martino ecc. (Bolz. ms.) Vulgo. Pastenagia, Pastenaja.

Pastinaca (Tourn.) Linn.

855 P. sativa L. Prosp. p. 62 (2333. 1532)
I–IV. Pratense, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio ..... dal 1861; Castelfranco e Castello di Godego (Bég. 1909!) — Var. bipinnatifolia Babey (1846) = var. subbipinnata Sacc. (1863) = var. laciniata Vis. et Sacc. (1869). Montello, nel luogo ai Frati, 1860; Asolo (Bolz. n. 26)

Peucedanum (Tourn.) Linn.

856 P. Carvifolia (L.) Vill. Agg. p. 20 (P. Chabraei Gaud.) (= Carum Carvi var. oenanthoides Sacc. Prosp. p. 60)
II. Nemofilo, sepincolo. Siepi presso il Montello a Selva e Giavera, raro, 1862 e 1870; Vittorio presso un muro lungo il Meschio, 1911; Collalti e S. Nazario (Dom. Montini, 1871!).

857 *P. Venetum* (Spr.) Koch. Prosp. p. 62 (2342. 1550)
I–IV. Sepincolo, nemofilo, marginale, pratense. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Montello, Conegliano, Vittorio, Cornuda ... dal 1861; Ponte d. Piave (Béguinot, 1909!); Pederobba, Fener (Bég. 1909: una forma eliofoba, lussureggiante, sterile traente al *P. alsaticum*) — Var. *angustisectum* Prosp. Cornuda, Coggiolo (Camp. Bolz. n. 26. 28).

858 *P. Cervaria* (L.) Lap. Prosp. p. 62 (2343. 1550)
II–IV. Nemofilo, paxoliro. Montello a Selva, Nervesa, Falzè ... dal 1861; Vittorio, Cornuda, 1870; Tamai ai confini del Coneglianese (Contarini 1825); Pederobba (Béguinot, 1909!)

859 *P. Oreoselinum* (L.) Moench. Prosp. p. 62 (2344. 1551)
I–IV. Pratense, nemofilo, marginale, dumale. Quasi tutta la provincia: Selva, Falzè, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Serravalle (Bereng. 1846!); Salgareda, ~~1825~~ Contarini, 1825!; Cà Tron (Strafg. 1915!); Pederobba, Fener (Béguinot 1909!); Asolo (Bolz. n. 26) — Volgo: Parsemolon. I nomi Argelina e Saor (Vittorio) designano il complesso delle erbe, spec. Umbelliferae, del taglio estivo, mentre quelle del taglio autunnale danno il foraggio detto Jan.

860 *P. palustre* (L.) Moench. Agg. p. 20 (*Thysselinum palustre* Hoffm.) (2345. 1726)
III Palustre, riparo. Laghetti d. Revine, 1865.

861 *P. austriacum* (Jacq.) Koch. var *rablense* (Koch) Agg. p. 20. III. Pratense, fassicolo Collina d. Asolo (Parolini herb.!)

862 *P. Ostruthium* (L.) Koch (2349. 1558)
IV–V. Parolivo, pratense. Grappa (Gio. Montini, herb. Bassan.)

863 *P. verticillare* (L.) M. K. (2348. 1551)
III. Nemofilo, rupicolo, alveale. Presso Pederobba al Piave, Negrisia Ponte d. Piave, Zenson al Piave (Béguinot, 1909!); Val d. Solagna, sotto i Collalti (Montini in herb. Zanardini!)

Heracleum Linn.

864 H. Sphondylium L. Prosp. p. 63 (2349. 1415)
I – IV. Nemofilo, sepincolo, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Nervesa, Conegliano, Cornuda, Vittorio... dal 1861; alveo del Piave a Pederobba (Béguinot, 1909!)

Daucus (Tourn.) Linn.

865 D. Carota L. Prosp. p. 63 (2355. 1320. R)
I – IV. Pratense, pascolivo, marginale, nemofilo. Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio.... dal 1861 (Cà Tron (Diretz. 1915!) – fm. roseus Qua e là, a Selva; Asolo (Bolz. MS.) – Var. sativus DC. Coltivato dovunque. Vulgo: Carotà.

866 D. grandiflorus (L.) Scop. Prosp. p. 63 (Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.) (2360. 1606)
I – III. Ruderale, marginale, campestre. Selva, Camalò, Ponzano, Paderno Vittorio... dal 1861; Asolo e presso l'Ardosa (Bolz. n. 11) – Var. platycarpos (Scop.). Da Valà a Riese (Bolz. n. 21) – var. argenteus Bolz. Colle di S. Martino presso Asolo (Bolz. n. 26).

Laserpitium (Tourn.) Linn.

867 L. marginatum W. K. Var. Gaudini (Moretti) Prosp. p. 63 (C. Sp.) (2364. 1837)
IV. Pascolivo. Grappa (Montini in Bertol., Bizzoz. 1878!, Spranzi!, Vacc. n. 64)

868 L. latifolium L. Prosp. p. 63 (2365. 1550)
III – IV. Pascolivo, nemofilo, alveale. M. Monfenera sopra Pederobba 1861; monte Barbaria di Valdobbiadene (Favero 1844!); Collalt. (Dom. Montini 1872!); Grappa (Montini in Bertol., Bizz. 1878!, Vacc. n. 64, Bolz. MS.); Passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 310!); alveo del Piave [disceso dai monti] a Pederobba 1862 (anche Bég. 1909!)

869 L. peucedanoides L. Prosp. p. 63 (2366. 1566)

III–IV. Rupicolo, pascolivo, sasticolo. Sponde ~~sup~~ rocciose del Piave a Covolo certo disceso dai monti 1861; passo S. Boldo (Camp. in Fl. it. exs. n. 310!) – Var. angustissimum Bolz. Rupi del Grappa in valle Scalarà a 1200–1400 m. (Bolz. n. 26).

~~Laserpitium (Tourn.) Linn.~~

870 L. Siler L. Agg. p. 20 (2364. 1415)
IV. Dumale, rupicolo. Cespugli nel Frontale di Crespan (Parolini herb.)

871 L. prutenicum L. Prosp. p. 63 (2369. 1769)
II–III. Nemofilo, eliofobo. Montello copiosamente 1861 (anche Béreng. 1837!, Bizzoz. 1881!)

Torilis Adans.

872 T. arvensis (Huds.) Lk. (2374. 1550)
II–IV. Sepincola, marginale, ruderale. Selva, Montello, Vittorio 1905–1909.

873 T. Anthriscus (L.) Bernh. Prosp. p. 63 (2375. 1551)
II–III. Sepincolo, marginale, ruderale. Selva, Camalò, Vittorio ... 1861; Asolo sul colle Bacciocco (Bolz. MS.). Facilmente scambiata colla precedente specie.

874 T. nodosa (L.) Gaertn. Agg. p. 20 (2377. 1565)
I. Ruderale, campestre. Treviso presso Porta S. Tomaso (ora Maggini) 1866.

Caucalis (Tourn.) Linn.

875 C. daucoides L. Prosp. p. 63.
I–II. Ruderale, campestre, marginale. Selva, Camalò, Belveder, Sant'Andrà, 1861; Spresiano 1866 – Var. muricata (Bisch.) Agg. p. 20 c. spec. Lungo la via ferrata a Spresiano, insieme al tipo, 1866.

Anthriscus Hoffm.

R A. silvestris (L.) Hoffm. Agg. p. 20, ex p. (2380. 1606)
IV Igrofilo, eliofobo. Cansiglio, 1869. Da confermarsi; la citazione di Vittorio si riferisce a Chaerophyllum aureum.

C A. Cerefolium (L.) Hoffm. Agg. p. 20 (2383. 1561. R)
I–III. Originario dell'Europa merid. Coltivato qua e là e talora subspontaneo, come a Conegliano (Béreng. 1843!)

Myrrhis Scop.

876 M. odorata (L.) Scop. Prosp. p. 63 (2383. A. 1550. R.)
III–IV. ~~Valdobbiadene~~ Nemofila, eliofoba. Monti sopra Valdobbiadene 1862; Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1838!); Fais (Contarini, 1825!); Grappa (Ant. Saccardo, 1884!); Ardosa e M. Oro (Bolz. n. 11); Collalti (Don. Montini 1872!)

Scandix Linn.

877 S. Pecten-Veneris L. Prosp. p. 63 (2386. 1550. R.)
I–III. Segetale, campestre. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Cusignana, Conegliano, Vittorio.... dal 1859; Castelfranco (Bég. 1909!)

Chaerophyllum (Tourn.) Linn.

878 Ch. hirsutum L. Prosp. p. 21 (2390. 1532)
III–IV. Nemofilo, dumale, pratense. Grappa (Montim. herb., Vaccari n. 64) – Fm. roseiflorum Pamp. Cansiglio (Pamp. in De Toni; n. 29) – Var. Villarsii (Koch) Agg. p. 21, c. spec. Cansiglio 1867 e 69 (anche Béreng. 1838!); Grappa alla Punta Brental sopra Cavaso (Bolz. ms.) – Var. elegans (Gaud.). Grappa (Montini, Vacc. n. 64)

879 Ch. aureum L. Agg. p. 21 (2391. 1532)
III–IV. Nemofilo, dumale, pratense. Valdobbiadene, 1870; Vittorio

presso la cartiera de Mori, 1865 (sub Anthrisc. vulgari in Agg. p. 20, ex p.)
Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Sporangi!; Collatti (Dom. Montini 1872!)

880 Ch. temulum L. Agg. p. 20 (2392. 1415)
I–III. Sepincolo, dumale, marginale. Treviso a S. Artemio, 1866; Vittorio, Valdobbiadene, Montebelluna comune ... dal 1867; Castelfranco (Bolz. MS.); Resana e Castelfranco (Bég. 1909!).

Athamanta Linn.
881 A. cretensis L. Prosp. p. 61 (2395. 1415)
IV Rupicola. Grappa (Sternb. 1803, n. 59; Montini in Bertol.; Bizzoz. 1878!, Cobau, 1905!; ghiajoni del Grappa (Contarini 1825!); M. Pizzoc all' Agnelezza (Pamp. n. 44) — Var. mutellinoides (Lam.) Rupi del Grappa verso la malga Ardosa (Bolz. MS. e n. 24 [sub nom. var. vestina]).

Molopospermum Koch
882 M. peloponnesiacum (L.) Koch (2399. 1532)
IV. Nemofilo. Cansiglio nel luogo detto Cadalten (Pamp. n. 44
La specie citata con dubbio nel Prosp. p. 63 sotto il nome di Molop. cicutarium DC. rimane indeterminabile perchè in esempl. immaturi: sembra però piuttosto un Chaerophyllum.

Conium Linn
883 C. maculatum L. Prosp. p. 63. (2404. 1415 R)
I–IV. Sepincolo, ruderale. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Montebelluna, Treviso e Conegliano (anche Bereng. 1837! 1842!), Vittorio .... dal 1858; Cà Tron (Diratz. 1915!) — Vulgo Zicuta (ma poch. del popolo la conoscono bene)

Coriandrum (Tourn.) Linn
C C. sativum L. (2405. 1532)
I–III. Del bacino mediterr. e Africa sett. Coltivato qua e là — e talora sporadico. Vulgo: Coriandolo.

Bifora Hoffm.

884 B. radians M. Bieb. Prosp. p. 64. (2406. 1745)
I – III. Campestre, segetale. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Vittorio, Conegliano .... dal 1859; fra Valà e Castelfranco (Bolz. MS.); Resana, Castelfranco (Béguinot, 1909!); Mogliano (Mayer, Romano in Bertol.) Vulgo: Ànes (anice)

Oenanthe (Tourn.) Linn.

885 Oe. aquatica (L.) Poir. Prosp. p. 61 (Oen. Phellandrium Lmk.) (2414. 1550)
I Riparia, palustre, idrofila. Treviso 1863 (anche Fracchia! Bérenger 1837!; Quinto, 1866; Salgareda (Contarini, 1825!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

R Oe. fistulosa L. Prosp. p. 61 (2415. 1565)
I Palustre, riparia, idrofila. Suburbio di Treviso (Fracchia, MS). Da riconfermarsi; forse s'incontrava quando nella bassa Trevigiana si coltivava estesamente il riso.

886 Oe. pimpinelloides L. Prosp. p. 61 (2416. 1415)
I – III. Nemofila, eliofoba. Comune nel Montello .... dal 1861; Valdobbiadene (Béreng. 1844!); Castelfranco, Resana (Béguinot 1909!)

Fam. 65 Cornaceae

Cornus (Tourn.) Linn.

887 C. sanguinea L. Prosp. p. 64 (2420. 1550)
I – IV. Sepiario, nemorale. Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Montebelluna, Conegliano, Vittorio .... dal 1858; Cà Tron (Diratz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.) Vulgo: Sanguanela, e nel Vittoriese: Cornostrel o Conostrel.

888 C. mas L. Prosp. p. 64 (2421. 1415. R).
II – IV. Sepiario, nemorale, dumale. Montello, 1857; Vittorio al Castello di S. Martino 1867; ai Piai presso Cozzuolo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 917!); Asolo (Bolz. MS.). Si coltiva ancora frequentemente. Vulgo: Cornolèr e il frutto: Cornole.

Aucuba Thunb.

C A. japonica Thunb. (2421 A. 1806)
I – III. Oriunda del Giappone. Coltivata assai frequentemente nei giardini ne boschetti e nelle case. Vulgo: Aucuba Acuba. Circa l'introduzione vedi Cronol. p. 190.

Fam. 66 Rhamnaceae

Paliurus (Tourn.) Linn.

889 P. Spina-Christi Mill. Prosp. p. 37 (Pal. aculeatus Lam.) (2422. 1532 R)
I – IV. Probabilmente di origine orient., ma ora completamente naturalizzato. Sepiario, dumale. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Giavera, Treviso, Conegliano, Cornuda, Vittorio ... dal 1859; Asolo (Bolz. n. 11); Cozzuolo (Pamp. in Bolz. MS.). È assai spesso coltivato nelle siepi. Vulgo: Spini capeleti

Zizyphus (Tourn.) Juss.

CA Z. sativa Gaertn. Prosp. p. 36 (2423. 1415 R.)
I – III. È originario della Cina boreale. Sepiario, ortivo. Coltivato frequentemente e quasi naturalizzato. Selva, Volpago, Treviso, (anche Romano herb. Pat.), Vittorio ... dal 1859; Cozzuolo (Pamp. in Bolz. MS.)

Rhamnus (Tourn.) Linn.

C Rh. alaternus L. (2425. 1550 R.)
I – III. Proprio dell'Italia mediterr. Coltivato nei giardini e boschetti e talora fuggiasco e avventizio.

890 Rh. cathartica L. Prosp. p. 37 (2428. 1320)
I – IV. Sepiario, nemorale, dumale. Quasi tutta la provincia. Montello, Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio ... dal 1859; Asolo (Bolz. n. 11). Vulgo: Spin negro o Spin nero o Biscorz (Vittorio)

891 Rh. saxatilis Jacq. Prosp. p. 37 (2429. 1565)
III – IV. Rupestre, dumale. Colli di Vittorio, M. Monfenera e Endimione ... dal 1861; Cansiglio 1869 (anche Bérenq. 1838!); Collalto (Sternb. 1803, n. 59); Colli di Cozzuolo (Pamp. in Bolz. MS.) – Vulgo: Spinet.

892 Rh. pumila Turra, Prosp. p. 37 (2436. 1745)
IV–V. Rupestre. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Spranz.! Bizzoz. 1878! Art. Rossi in herb. Bizz., Bolz. MS.); Bovaor (Bolz. MS.); rupi intorno il Cansiglio, 1868; Col Vicentin all' Agnelezza sopra Sonego (Pamp. n. 44).

893 Rh. Frangula L. Prosp. p. 37 (2433. 1415)
I–IV. Sepiario, dumale, riparia. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Cornuda, Montello .... dal 1859; Ponte di Piave, Negrisia, Pederobba (Béguinot 1909!); Asolo (Bolzon MS.); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Volgo: Conostrela negra.

Fam. 67 Aquifoliaceae

Ilex Linn.
CA I. Aquifolium L. Prosp. p. 89 (2434. 1550)
I–III. Nemorale. Trovato di rado nel Montello e sui colli, probabilmente avventizio e sfuggito dai giardini; quantunque sembri spontaneo in più luoghi del Veneto.

Fam. 68 Ampelidaceae
Parthenocissus Planch.
CA P. quinquefolia (L.) Planch. Prosp. p. 33 (Ampelopsis hederacea Mchx) (2435. 1642)
I–IV. Dell' America sett. Domofilo, ruderale, nemofilo. Coltivato frequentemente ed erratico qua e là, come a Selva, Treviso, Vittorio, Conegliano e persino nell' interno del Montello .... dal 1858. Volgo: Vi o Vida del Canadà

Vitis Linn.
894 V. vinifera L. Prosp. p. 33 (2436. 1415. R)
I–III. α silvestris (C.C. Gm.) Pollin. Nemorale, dumale, sepiaria, veramente spontanea. Montello e tutti i colli della provincia .. dal 1858; Asolo (Bolz. MS). Volgo: Vi e Ua oseleta bianca e mora – β sativa DC. Coltivata ovunque e fuggiasca qua e là e subspontanea. Volgo: Vi, vida e il frutto: ua (in molte varietà coi relativi nomi volgari)

Q. È certamente una derivazione culturale della silvestris.

C V. Labrusca Mchx (2440, c. 1850).
I–III. Dell'America settentrionale. Coltivata frequentemente fino dal 1890 e. sotto i nomi volgari di: lla Fragola, lla Isabella, lla americana — Vitis Labrusca × V. riparia Mchx. Coltivata ora pure comunemente. Vulgo: Clinton, Crinton.

Fam. 69 Celastraceae

Evonymus (Tourn.) Linn.

895 E. japonicus L. fil. Agg. p. 13 (2442. 1841)
I–III. Della Cina e Giappone. Coltivato comunemente e talora sfuggito dai giardini e boschetti ad erratico.... a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1861.

896 E. europaeus L. Prosp. p. 36 (2443. 1550)
I–IV. Sepiario, nemorale, ripario. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Cornuda, Vittorio..... dal 1861; Pederobba (Béguinot 1909!); Asolo (Bolgon, n. 11).

Fam. 76 Sapindaceae

Staphylea Linn.

897 S. pinnata L. Prosp. p. 36 (2446. 1320)
II–III. Nemorale, dumale. Montello verso il Piave e boschetti di Colfosco .... dal 1861, non comune; siepi del Muletti a Salgareda (Contarini, 1825!).

Acer (Tourn.) Linn.

898 A. campestre L. Prosp. p. 33 (2448. 1532. R)
I–IV. Campestre, sepiario, nemorale, dumale. Quasi tutta la provincia: Montello, Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio, Cansiglio .... dal 1861; Cà Tron (Dirat. 1915!) – Vulgo Opio, Albro; Obol (Vittorio)

899 A. platanoides L. (2449. 1550)
I–IV. Spontaneo in più luoghi d'Italia; Coltivato frequentemente e da ricercarsi sui colli e monti del Trevigiano.

900 A. Pseudoplatanus L. Prosp. p. 32 (2451. 1532)
II – IV. Nemorale. Montello verso il Piave.. dal 1861; colline di Cornuda, Colfosco, 1862; Cansiglio (Béreng. 1838!). Anche coltivato abbastanza frequentemente, come a Selva; Ca' Tron (Dirats. 1915!) – Vulgo: Agere

C.A. A. Negundo L. Prosp. p. 32 (2452. 1780)
I – III. Della Virginia. Coltivato comunemente e talora anche sporadico, come a Selva, Vittorio ... 1861; Ca' Tron (Dirats. 1915!) Vulgo: Frassen american.

Aesculus Linn.

C.A. Ae. Hippocastanum L. Prosp. p. 33 (2453. 1565)
I – III. Di Tessalia, Epiro e Asia occid. Coltivato assai spesso negli ambulacri e naturalizzato; Treviso, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; talora sporadico persino entro il Montello .... ~~dal~~ 1862. Vulgo. Castagner mat o mato; il frutto: castagne mate, castagnoni.

Fam. 71 Anacardiaceae

Rhus (Tourn.) Linn.

901 Rh. Cotinus L. Prosp. p. 37 (2457. 1532. R.)
II Nemorale. Montello, assai raro, 1856; indi non più ritrovato.

C.A. Rh. hirta (L.) Sudw. Prosp. p. 37 (Rh. typhina L.) (2458. 1678)
I – III. Dell'America settentr. Coltivato e qua e là avventizio, come a Selva .. 1863.

C.A. Rh. glabra L. (2458 nota, 1780)
I – III Dell'America settentr. Coltivato e naturalizzato presso l'abbazia di Nervesa.

C.A. Rh. Toxicodendron L. Agg. p. 13. (2461 A. 1642)
I – III. Dell'America sett. e Giappone. Sepiario, nemorale. Coltivato e naturalizzato qua e là persino entro il bosco Montello, a Montebelluna, Selva ... dal 1861. Incontrasi pure la var. radicans (L.)

Fam. 72 Balsaminaceae

Impatiens (Ricinus) Linn.

902 I. Noli-tangere L. Agg. p. 13 (2462. 1532)
IV Nemofila, igrofila, eliofoba. Cansiglio 1867 (anche D. Sacc. 1897!); Monti di Valdobbiadene (Béreng. 1844); Grappa verso Val S. Lorenzo (Bolz. MS.).

I. Balsamina L. Prosp. p. 35 (2462. 1552)
I–III. Delle Indie orient. Coltivata frequentemente per ornamento in più varietà, e talora sporadica nelle vicinanze dei giardini, come a Selva, Treviso.... dal 1859 – Vulgo: Beiomeni.

Fam. 73 Polygalaceae

Chamaebuxus (Tourn.) Spach

903 Ch. alpester Spach. Prosp. p. 25 (Polygala Chamaebuxus L.) (2463. 1532)
III–IV. Rupestre. M. Monfenera sopra Pederobba e colli di Vittorio.... dal 1861; Cansiglio, 1869; Asolo, Maser e Bocaor (Bolz. n. 11); Ardosa sopra Crespan (Zan. 1825!); Grappa (Fiori, 1897!) S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 114!) – Var. grandiflora Gaud. coll. di Serravalle 1866; S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 115!); monti sopra Cavaso e Pederobba (Bolz. n. 11).

Polygala (Tourn.) Linn.

904 P. vulgaris L. Prosp. p. 25 (2466. 1563)
II–IV. Pratense, pascoliva, nemofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Nervesa, Vittorio.... dal 1861; Cà Tron (Dirab. 1915!); Asolo (Zanard. 1827!); Varia a fiori celesti, rosei e più di rado bianchi (come a Vittorio) e a foglie più o meno auguste – Var. serpyllacea (Weihe). Pederobba (Béguinot, 1909!)

905 P. amara L. Prosp. p. 25 (2467. 1785).
I–III. Pratense, alveale, igrofila. Prati intorno Treviso (Fracchia, Ventura Saccardo, 1863); Grappa (Visiani herb. Pat.); alveo del Piave a Nervesa, Falzè, 1861; Bavaria 1864 –
Var. alpestris Rchb. Cansiglio (Béreng. 1840!); Grappa (Cobau 1906!)

Fam. 74 Geraniaceae

Geranium (Tourn.) Linn.

906 G. macrorrhizum L. Agg. p. 12 (2470. 1532)
III–IV. Nemofilo, rupestre. Cansiglio (Béreng. 1844!); Pederobba verso Fenèr (Béguinot, 1909!); S. Eulalia? presso Borso (Parolini herb.)

907 G. Robertianum L. Prosp. p. 34 (2471. 1532)
I–IV. Sepincolo, nemofilo, eliofobo. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Nervesa, Montello, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Faiz (Contarini 1825!); alveo del Piave a Pederobba (anche Bég. 1909!); Cansiglio (Dom Sacc. 1897!); Grappa (Vaccari n. 64.)

908 G. phaeum L. Prosp. p. 34 (2473. 1595)
I–IV. Nemofilo, eliofobo, dumale. Cansiglio 1869 (anche Dom Sacc. 1897!) Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Bizz. 1878!, Parolini in Bert.) – Var. lividum (L'Hérit.) Selvana (Fracchia! eterotopico?); Cansiglio (Penzig!); Collalto (D. Montini 1872!)

909 G. molle L. Prosp. p. 34 (2474. 1415).
I–III. Pratense, marginale, ~~dumale~~ ortivo. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Montebelluna ... dal 1863 – Var. grandiflorum Vis. Agg. p. 13. Selva, Treviso, Vittorio ... assai comune, 1863; Conegliano (Béreng. 1843!)

910 G. pusillum L. Prosp. p. 34 (2476 [err. tip. G. cinereum] 1726)
I–III. Campestre, pratense, marginale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Vittorio, Cornuda, Treviso ... dal 1863.

911 G. rotundifolium L. Prosp. p. 34 (2478. 1532)
I–IV. Ruderale, murale. Colle S. Augusta di Vittorio, fra le pietre della gradinata davanti la chiesa, 1867, raro; Conegliano (Béreng. 1842!)

912 G. columbinum L. Prosp. p. 34. (2479. 1563)
I – IV. Sepincolo, dumale, campestre. Quasi tutta la provincia: Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio .... dal 1862; Pederobba (Béguinot 1909!); S. Martino presso Asolo (Zanard. 1827!); Asolo e Valdobbiadene (Bolzon MS.)

913 G. distectum L. Prosp. p. 34 (2480. 1415)
I – IV. Campestre, segetale, ortivo, sepincolo. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Cornuda, Conegliano, Vittorio .... dal 1863; Ca' Tron (Diratz. 1915!)

914 G. argenteum L. Agg. p. 13 (2482. 1566).
IV. Rupestre, sassicolo. Cansiglio, al Cimone della Palantina, 1869 (anche Bérenger 1838!)

915 G. sanguineum L. Prosp. p. 34 (2484. 1532)
II – IV. Sepincolo, nemofilo, dumale. Venegazzù, Caonada, Cornuda, Colfosco, Pederobba appiè del Monfenera (anche Bég. 1909!) ..... dal 1861; Asolo, Masèr (Bolz. n. 11) – Var. latifolium Parl. Valdobbiadene, 1870; Vittorio, 1890 (anche Dom. Sacc.!)

916 G. silvaticum L. Prosp. p. 34 (2487. 1551)
IV. Nemofilo, dumale. Grappa (Zanardin. 1829!, Spranzi!, Montini in Bertoloni, ~~[illegible]~~, n. 59), Faìs del Col Vicentin (Zanard. 1829!) – Var. rivulare (Vill.) Agg. p. 13 (G. aconitifolium L'Hérit.); Grappa (Sternb. 1803, n. 59)

917 G. nodosum L. Agg. p. 13 (2490. 1532)
III – IV. Nemofilo, eliofobo. Colle a S. Gusè presso Serravalle, 1903; boschi di Tarzo (Pamp.!); Cansiglio a 1300 m. (Dom. Sacc. 1897!); Faìs (Contarin. 1825!); bosco di Collungo sopra Valdobbiadene (Favero, 1841!); Grappa, Endimione, passo S. Boldo (Bolz. MS.)

Erodium L'Hérit.

918 E. cicutarium (L.) L'Hérit. Prosp. p. 35 (2502. 1550)
I–IV. Campestre, ruderale, alveale. Quasi tutta la provincia. Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Spresiano (Contarini. 1825!) Incontrasi nelle due forme: praecox DC. p.e. a Selva 1861; chaerophyllum DC a Selva, 1861; Ponte di Piave, Negrisia (Béguinot, 1909!)

Pelargonium L'Hérit.

C P. zonale (L.) W. Prosp. p. 34 (2502 A. 1760)
I–III. Del Capo di B.S. Coltivato comunemente anche dal contado. Vulgo: Geranio.

C P. Radula Ait. Prosp. p. 34 (P. roseum W.) (2502 D. 1793).
I–III. Del Capo di B.S. Coltivato come il precedente. Vulgo: Erba rosa.

C P. odoratissimum W. Prosp. p. 34 (2502. E. 1760)
I–III Del Capo di B.S. Coltivato come il precedente. Vulgo: Erba canela. Si coltivano pure abbastanza spesso: P. triste (L.) W. Prosp. p. 34 (2502 G. 1662) pure del Capo di B.S. Vulgo: Geranio notturno e P. grandiflorum Hort. (ibridi vari). Vulgo: Geranio de 5 macie, ed altre specie ancora.
P. hederifolium ~~Sabin.~~ Salisb. ~~(Pel. peltatum L.)~~ Vulgo: Geranio edera.

Oxalis Linn.

919 O. acetosella L. Prosp. p. 35 (2503. 1558)
II–IV. Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello, ~~Vittorio~~ Selva... dal 1861 (anche Bizz. 1881!); Vittorio 1864; M. Zoel sopra Fregona (Contarini. 1825!); Ardosa sopra Crespan (Zanardini. 1827!); Grappa (Vaccarini, n. 64); Asolo, Monfumo, Castelli (Bolz. n. 11) – Vulgo: Pan cuc.

922 O. corniculata L. Prosp. p. 35. (2505. 1415)
I–IV. Campestre, ruderale, domofila, eliofila. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio.... dal 1861; Cà Tron (Dirotz. 1915!) – Var purpurea Parl. Fra i ciottoli a Vittorio (Fr. Sacc. 1890!), ad Asolo (Bolz. n. 24) φ Var. villosa (M. Biab.); Mura di Treviso, 1864 (anche Fracchia!); colle di S. Martino di Asolo (Bolz. M.S.) – Var adscendens Moris. Vidor, boschetti lungo il Piave (Bolz. M.S.

Vulgo: Pan cucheto, Pan cuchet.

φ; Pieve di Soligo (Pamp. 1916!)

q921 *L. strida* L. Prosp. p. 35 (2505 f. 1532)

I – III. Sepincola, remopila, eliopba. Tutta la provincia: Treviso (anche Bésen. 1837!) Selva, Volpago, Conegliano, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Ca' Tron (Dalla Torre 1915!) Nogliano (Meyer, Romano herb. Pat.!); Ponte di Piave, Zenson, Castel di Godego, Castelfranco (Béguinot, 1909!); Asolo (Boly. MS.); S. Zenone (Bég. e Dalla T. 1911!) – Vulgo: Pan cucheto, Pan cuchet.

Linum (Tourn.) Linn.

q922 *L. catharticum* L. Prosp. p. 30 (2506. 1713)

I – IV. Pratense, remoto, igrofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Cornuda, Nervesa (anche Biasuz. 1851!) Vittorio .... dal 1861; Treviso (Trotter 1909!); Paderno, Ponte di Piave, Resana, Castelfranco (Bég. 1909!); Ca' Tron (Dalla T. 1915!); colli trevigiani (Zanardini, 1827!); Asolo, Monfumo (Boly. n. 10)

CA *L. asterbitiformum* L. Prosp. p. 30 (2509. 1415. R) domofilo.

I – III. Ignorasi se indigeno o di antichissima introduzione dall'Oriente. Campestre, e Coltivato frequentemente e spesso fuggiasco qua e là, come a Selva, Montebelluna, Vittorio .... dal 1861; Nogliano (Vidrani!) – Vulgo: Lin.

q922 *L. perenne* L. var. *alpicum* (L.) Rouy Agg. p. 12 (come sp.) (2508 B. 1742)

IV. Pascolivo, pratense: Grappa (Sterneb. 1803 n. 59; Montini in Bertoloni e in herb. Kellner!; Rossi in Bigg. 1880!) – Var *levis* (Scop.) Presso la cima di M. Grappa (Boly. n. 19).

q924 *L. angustifolium* Huds. Prosp. p. 30 (2509 f. 1550)

II – IV. Pratense, arenicolo. Grappa (Parolini in Bertol., Spranzi!); alveale a Ponte di Piave, Negrisia, Salgareda (Béguinot, 1909!)

q925 *L. narbonense* L. Prosp. p. 30 (2510. 1745) D. Martini, 1872

III – IV Pratense, sassicolo, Valle di S. Fidà e Collalto (Sterneb. 1804, n. 59); Grappa (Contarini, 1825!, Zanardini, 1828!, Spranzi!, Kellner 1840!); monti sopra Crespan (Fuga in herb. Fracchia!)

926 L. viscosum L. Prosp. p. 30 (2511. 1532)
II – IV Pratense, pascolivo, rupicolo. Montello verso il Piave e Selva nelle ghiaje, Nervesa, Vittorio, colli di Valdobbiadene ... dal 1861; ~~Asolo~~ ~~(Bolzon n. 11)~~; Crespan (Zanardini, 1827!); Asolo e Maser (Bolz. n. 11) Possagno (Bizz. 1879!); Grappa (C. Mass. 1877! Vacceri, n. 64); Fadalto (Pampanini Fl. ital. ex s. n. 928!)

927 L. tenuifolium L. Prosp. p. 30 (2512. 1550)
I – IV. Rupicolo, pascolivo, alveale, sassicolo. Selva, Paderno, Camalò, Nervesa e Covolo al Piave, Monfenera, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Possagno (Bizz. 1879!); Savazza fuori Serravalle (Contarini 1855!), Ponte di Piave, Negrisia, Zenson, Pederobba (Beg. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

928 L. gallicum L. (2515. 1550)
III – IV. Pascolivo, sassicolo. Intorno ai laghetti di Revine, 1866; colle Bacciocco e Montagna grande di Asolo (Bolzon n. 13).

Fam. 75 Tropaeolaceae

Tropaeolum Linn.

9 T. majus L. (2519 A. 1553)
I – III. Originario del Perù. Coltivato comunemente per ornamento in più varietà e talora sporadico. Volgo: Nastruzo.

Fam. 76 Rutaceae

Ruta (Tourn.) Linn.

929 R. graveolens L. Prosp. p. 36 (2527. 1415. R).
II – IV. Rupicola, murale, ortiva. Rupi e muri vecchi di Vittorio spec. al colle S. Augusta dal 1861; Conegliano e Valdobbiadene 1863. Coltivata spesso negli orti dei contadini. Volgo: Ruta o Ruda.

Dictamnus Linn.

93 D. albus L. (2529. 1415)
III Rupicolo, sassicolo. Passo di S. Boldo a 350-600 m. (Pamp. in Fl. it. exs. n. 316!); Fais del Col Vicentin (Pamp. n. 44).

Citrus L.

C C. medica Risso (2530. 1415. R)
I-III. Originario delle Indie orient. Coltivato, ma nell' inverno si tiene nelle arancere. Vulgo: Cedro — Var. Limon (L.) (1550). Come la specie, ma coltivato più copiosamente. Vulgo: Limòn

C C. Aurantium L. (2531. 1415. R) Come il precedente. Vulgo: Naranza — Var. nobilis (Lour.) Della Cina e Cocincina (1816). Coltivato meno frequentemente. Vulgo: Mandarin — Var. Bergamia (Risso) Dell' Oriente. Coltivato qua e là. Vulgo: Bergamoto.

Fam. 77 Simarubaceae

Ailantus Desf.

CA A. glandulosa Desf. Prosp. p. 37 (2532. 1760)
I-III. Originario della Cina ed Isole Molucche. Coltivato ~~fino~~ dalla fine del 1700 a Selva per cura del N.U. Nicolò Priuli e del parroco Don Giovanni Saccardo, ora diffuso e naturalizzato per tutto il paese ed altrove. Vulgo: Ailanto e (per equivoco ~~errore~~). Catalpa. Vedi Prosp. l.c. e Cronol. p. 200.

Fam. 78 Meliaceae

Melia Linn.

C M. Azedarach L. (2534. 1550)
I-III. Originario dell' Imalaja. Coltivata qua e là negli ambulacri e boschetti e talora sporadica.

Fam. 79 Malvaceae

Althaea (Tourn.) Linn.

92 A. officinalis L. Prosp. p. 31 (2538. 1415. R)
I-IV. Ruderale, sepincola, domofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Giaccera, Conegliano, Cornuda, Vittorio... dal 1859; Pinidello (Pamp. n. 44) — Vulgo: altea

932 A. rosea (L.) Cav. Prosp. p. 31 (2539. 1550. R)
I – III. Oriunda d'Oriente. Coltivata in più varietà per ornamento e spesso qua e là sporadica, in tutta la provincia: Treviso, Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio .... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.) Volgo: Malvon.
L'Athaea ficifolia (L.) Cav. di Russia (2540 A. 1532) è coltivata meno frequentemente. Volgo. Malvon zalo.

Malva (Tourn.) Linn.

933 M. Alcea L. Prosp. p. 31 (2552. 1532)
I – III. Ruderale, sepincola. Colfosco, Arcade, Montebelluna, Serravalle ... dal 1861; Colle Umberto (Pamp. n. 44) – Var. fastigiata (Cav.). Agg. p. 12 (= M. Morenii Pollini). Dumale, sepincola: Jollina (Martens) Castelli d'Asolo e Cornuda (Bolz. MS.); Crespan (Bég. e Dvalz. 1911!)

934 M. silvestris L. Prosp. p. 31 (2553. 1550. R)
I – IV Ruderale, domofila, sepincola. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio .... dal 1859. Varia glabrescente e irsuta, macrofilla e microfilla, erata e prostrata. Volgo: Malva, Nalba.

935 M. rotundifolia L. Prosp. p. 31 (2555. 1550)
I – IV. Ruderale, domofila, sepincola. Selva, Camalò, Paderno, Treviso, Vittorio .... dal 1861.

CA M. crispa L. (2553 A. 1591)
I – III. Originaria dell'Europa sett. e Russia. Coltivata per ornamento, e assai spesso fuggiasca ed erratica qua e là, come a Selva, 1868, Vittorio, 1896 ecc.

Abutilon (Tourn.) Linn.

CA A. Avicennae Gaertn. Agg. p. 12. (2558. 1532)
I – III. Oriundo de Balcani. Coltivato per ornamento e assai spesso avventizio qua e là, come a Selva, 1866.

Hibiscus Linn.

CA H. syriacus L. Prosp. p. 31 (2559. 1642)
I–III. Originario di America e Caucasia. Coltivato ed ora totalmente naturalizzato e subspontaneo qua e là, p. e. a Treviso, Selva, Onigo, Vittorio ... dal 1858. Volgo: Althea da giardino, Ibisco.

926 H. Trionum L. Prosp. p. 31 (2560. 1532).
I–III. Campestre, ruderale. Canalò, Selva, Paderno, Colfosco ... dal 1862; Ortigo, Lomigo (Parag. n. 44); Cozzuolo (Parag. in Bolg. MS. — Var. Lornatus (Cav.) Moriago (Mayer e Romano in herb. Pal.!)

Fam. 90 Tiliaceae

Tilia (Tourn.) Linn.

CA T. platyphyllos Scop. Prosp. p. 31 (T. grandifolia Ehrh.) (2564. 1563. R)
I–III. Coltivato e qua e là subspontaneo: Treviso, Vittorio 1862 ex 1 Ca' Tron (Diratg. 1915!). Volgo: Tiéo, Tiégio e così le specie coltivate seguenti.

927 T. cordata Mill. Prosp. p. 32 (T. parvifolia Ehrh.) (2566. 1532)
II–IV. Nemorale, dumale, sepestre: Montello Nord (862; Treviso, 1866, boschetto di Roncade (anche Diratg. 1915!); Valdobbiadene, 1867; Caustoglio (Bireng. 1859!). Coltivato pure in parchi. Volgo: Tiér e Tajér (Vittorio). Si coltivano pure frequentemente: T. americana L. (2567. 1798) dell'America sett.; T. alba Ait. (2568. 1802) pure nord-americano e T. tomentosa Moench (2569. 1812) d'Ungheria e Turchia.

Fam. 91 Euphorbiaceae

Euphorbia Linn.

928 E. nutans Lag. Agg. p. 31 (E. Preslii Guss.) (2570. 1752)
I–III. Ruderale, sabbiccola. Via ferrata a Spresiano 1871; Paderno (Trotter 1912!); Treviso (Roggen in Bolg. n. 11); Conegliano (Bolg. n. 28) Vittorio (Parag. in Bolg. n. 28); Montebelluna alla ferrovia (Beguinot, 1909!). — Fin. erecta, glabra. Presso la Stazione ferroviaria di Vittorio, 1910 — Var. pinguis Parag. Ortigo nel sito detto il Bosco (Parag. in Vacc. Pl. ital. exs. n. 771).

A E. maculata L. (2571. 1875)
I–III. sassicola. Oriunda dell'America sett. ed equator. Avventizia alla stazione di Vittorio 1908; e di Conegliano (Fiori, Fl. anal. II. p. 274).

939 E. chamaesyce L. Prosp. p. 117 (2574. 1532 R.)
I–III. Ruderale, sassicola, domofila. Treviso, Conegliano, Castello di Susegana, Vittorio ... dal 1862; Carbonera (Tracchia!); S. Zenone degli Ezzelini (Diratz. 1911!); Asolo (Bolz. n. 11) – Var. canescens (L.). Vittorio (Dom. Sacc. in Bolz. n. 23).

A E. humifusa W. (2575. 1855)
I–III. Ruderale, sassicola, ortiva. Oriunda dell'Asia temperata. Avventizia a Selva nel cortile di casa, 1906–1907; Via a Vittorio (Pamp. 1895 in Thellung); Paderno presso casa Giacomelli 1865.

940 E. Lathyris L. Prosp. p. 118. (2577. 1415. R).
I–III. Ortiva. Coltivata da noi negli orti e vigne qua e là e talora subspontanea (o veramente indigena?), come a Selva, Treviso ... dal 1862; Romano (Sternb. 1804, n. 59) e Montini in Bert.); Asolo (Bolz. MS.). Vulgo. Erba latera foresta.
~~Subspontanea qua e là in Italia.~~

941 E. palustris L. Prosp. p. 118 (2578. 1550)
I–II. Riparia, pratense, igrofila. Presso Motta (Tracchia!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Selva lungo la Brentella, 1862; S. Bruson (Treviso?) (Contarini. 1825!).

942 E. epithymoides L. (2582) Var. verrucosa (Lam.) (1532) Prosp. p. 118 (E. dulcis L. ex p.)
I–III. Nemofila, pratense, marginale. Montello, Selva ... dal 1861; Carbonera (Bérenq. 1841!); Mogliano (Mayer in Bertol.); Vittorio 1890 (anche Dom. Sacc.); Pederobba (Béguinot, 1909!); Asolo al colle S. Martino (Zanard. 1827!) e al Montagnon Grande (Bolz. MS.); Romano (Sternb. 1804, n. 59)

943 E. carniolica Jacq. Prosp. p. 118 (2584. 1595)
II–III Nemofila, igrofila, eliofoba. Montello 1863 (anche Kellner 1840!); S. Pietro di Feletto (Pamp. Fl. ital. exs. n. 477!); colli di Asolo (Fiori 1897! herb. Pat.); presso il Grappa (Sternb. 1804, n. 59); Romano (Montini herb.!); Pederobba (Béguinot, 1909!) – Var. longeradiata Goiran. Al Foresto nuovo presso Asolo (Bolz. n. 22)

944 E. dulcis L. (2585. 1551) Prosp. p. 118 (Euph. purpurata Thuill.)
II–III Nemofila, eliofoba, sepincola. Montello dal 1861 (anche Bereng. 1840!), Vittorio a Cenedà 1869; Pederobba (Béguinot, 1909! fm. luxurians)

945 E. pilosa L. Agg. p. 31 (2587. 1583)
II Nemofila, riparia. Montello, lungo la Brentella, Sett. 1863. Un solo esemplare poco sviluppato, un pò incerto.

946 E. platyphylla L. Prosp. p. 117. (2592. 1556. R).
I–IV. Ruderale, campestre, marginale. Tutta la provincia: Selva, Montebelluna, Conegliano, Vittorio.... dal 1861; Cà Tron (Dvatz. 1915!); Pederobba, Ponte di Piave (Béguinot, 1909!) – Var. micrantha Steph. Qua e là colla specie – Var. stricta (L.) qua e là dove la specie – Var. subciliata (Pers.). Presso Treviso (Bereng. e Fracchia, 1841!); Cozzuolo (Pamp. n. 44); Asolo (Bolz. MS.). Vulgo: Erba latèra, Latèra, Latarola, Late de vecia e così ~~molte altre~~ le due specie seguenti

947 E. helioscopia L. Prosp. p. 117 (2593. 1415. R).
I–IV. Campestre, ortiva, domofila. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio .... dal 1859; Asolo (Bolz. MS.); Cà Tron (Dvatz. 1915!).

948 E. Peplus L. Prosp. p. 118 (2595. 1532).
I–IV. Campestre, ruderale, ortiva, domofila. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Treviso, Conegliano, Vittorio... dal 1859; Susegana (Bereng. 1842!); Pederobba (Beg. 1909! fm. luxurians); Asolo (Bolz. MS.)

949 Σ. falcata L. Prosp. p. 118 (2596. 1550)
I - III. Campestre, ortiva. Borso d. Asolo (Martini in Bertoloni)

950 Σ. exigua L. Prosp. p. 118 (2598. 1415)
I Campestre, ortiva. Mogliano (Mayer in Bertoloni) — Var rebusa L. Campi a via ferrata a Preganziol, 1866.

951 Σ. Segnioriana Reck. (2610. 1554) = Σ. micaeensis All.
III Ruderale, xerofila. Farra d. Soligo (Agolini in Bolz. n. 28)

952 Σ. Cyparissias L. Prosp. n. 118 (2613. 1552)
I - II. Campestre, marginale, ruderale, sapricola. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio .... dal 1860; Fregona (Contarini 1861!); Montello (anche Kellner 1840!, Bizzoz. 1872!); Colli d. Asolo (Zanardini 1872); Pederobba, Fagarè, Zenson (Béguinot, 1909!). Volgo: Erba cadèra, Letèra). Varia a brattee esterne vivamente purpuree, come a Vittorio 1907; Asolo (Bolz. MS.)

953 Σ. amygdaloides L. Prosp. p. 118 (2617. 1552)
II - IV. Nemofila, sapricola, ehiofoba. Montello verso il Piave, Cornuda, Pederobba (anche Bég. 1909!), Vittorio ... dal 1861; Colbalti (Martini); Grappa (Sternb. 1804, n. 59); Asolo, Borso, Fietta (Bolz. n. 11).
Boccaòr

Mercurialis (Tourn.) Linn.

954 M. perennis L. Prosp. p. 118 (2622. 1550)
II - IV. Nemofila, igrofila, ehiofoba. Vallate sul Montello, presso Vittorio .... dal 1859; Asolo (Bolz. n. 11).

955 M. ovata Sternb. et Hoppe. Prosp. 118 (2622 β, 1550)
III Damale, rupicola, ehiofoba. Colli di Cornuda 1862; Vittorio 1870; Asolo sulla Montagna grande (Bolz. n. 11)

956 M. annua L. Prosp. p. 118 (2623. 1415. R)
I – IV. Campestre, ruderale, ortiva. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Cornuda, Vittorio, Treviso.... dal 1859; Asolo (Bolz. MS.)
Vulgo: Bocarole, Mercorela.

Acalypha Linn.

A A. virginica L. (2624. 1760)
I – III. Originaria della Carolina e Virginia. Sepincola, ruderale, domofila. Avventizia e naturalizzata: Selva in via Avogari 1906; Santa Bona (Rugger in Bolz. n. 13); alla stazione di Castelfranco, 1905; Paderno (Tratter 1912!); Susegana lungo le siepi (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 933!)

Ricinus Linn.

C A R. communis L. Prosp. p. 117 (2625. 1415. R)
I – III. Probabilmente oriundo delle Indie orient. Frequentemente coltivato e talora avventizio, come a Treviso, Selva, Vittorio... dal 1861. Vulgo: Rizino.

Fam. 82 Callitrichaceae

Callitriche Linn.

957 C. palustris L. (2626) I – IV Palustre, lacustre, idrofila – Var. stagnalis (Scop.) (1798). Treviso 1868 (anche Kellner 1839!); Cansiglio, Savazza, 1869; Resana (Béguinot, 1909!); – Var. verna (L.) (1606). Prosp. p. 54 (C. vernalis K. e C. intermedia W.). Fosse intorno Treviso, 1868 (anche Béreng. 1837!); Piave (Minio n. 35) – fm. minima (L.) Cansiglio, 1868 – Var. hamulata Kütz. Prosp. p. 54 (C. autumnalis L.). Selva, Treviso 1868 (anche Fracchia e Béreng. 1837!); stagni del Montello 1861.

Fam. 83 Buxaceae

Buxus (Tourn.)

C. A B. sempervirens L. Prosp. p. 117 (2627. 1415. R)
I – IV. Spontaneo spec. nell'Italia centrale. Coltivato e naturalizzato (non veramente indigeno) in più luoghi della provincia, come Treviso, Selva, Conegliano, Vittorio di rado anche nell'interno del Montello .... dal 1859. Vulgo: Boss, Bosso.

Fam. 84 Ericaceae

Pirola (Tourn.) Linn.

958 P. uniflora L. Prosp. p. 89 (2632. 1595)
IV. Nemofila, eliofoba. Cansiglio, 1869 (anche Bérenger 1838!, Pamp. n. 44. e Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Spranz!)

959 P. secunda L. Prosp. p. 89 (2633. 1595)
IV. Nemofila, eliofoba. Cansiglio (Bérenger. 1838!, Dom Saccardo, 1897!); M. Cesèn sopra Valdobbiadene (Bolz. in herb. Pat. 1896! e n. 13).

960 P. minor L. Agg. p. 26 (2634. 1563)
IV. Nemofila, eliofoba. Cansiglio 1869 (anche Bérenger 1838!, Pampan. n. 44)

961 P. rotundifolia L. (2635. 1561)
IV Nemofila, dumale, eliofoba. Grappa (Sternb. 1804 n. 59, Vacc. n. 64.) Var. media (Sw.) Prosp. p. 89 (P. rotundifolia), Agg. p. 25 (1562). Montello verso settentrione, rara 1861 (anche Dom. Sacc. 1890!); Cansiglio, 1869.

962 P. chlorantha Sw. (2636. 1844)
IV Nemofila, eliofoba. Cansiglio (Kellner sec. Caruel Fl. it. VIII p. 743); Grappa nei faggeti (Bizzoz. 1878!)

Rhododendron Linn.

963 Rh. hirsutum L. Prosp. p. 88 (2637. 1553)
IV. Rupicolo, dumale. Cansiglio 1869 (anche Dom Sacc. 1897); Torena al passo di S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 124); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini, Parolini, Visiani!, Spranz! Bolz. MS.); Endimione sopra Valdobbiadene (Bolz. 1895!, herb. Pat.). Di rado discende col Piave p. e. a Covolo, 1859! — Var. microphylla Briquet. Col Vicentin, a m. 1750 (Pamp. in Bolz. MS.) — Var intermedium Tausch (R. ferrugineum × hirsutum) Col Vicentin (Pamp. Fl. it. exs. sub n. 125)

↑ (2637 A. 1853)

, Trott. 1914!

964 Rh. ferrugineum L. Prosp. p. 88 (2638. 1532)
IV. Rupicolo, dumale. Cansiglio, 1869; Col Visentin (Pamp. in Bolz. n. 13 e Fl. it. exs. n. 125; Grappa (Parolini, Montini in Bertol., Sternb. 1803. n. 59, Spranz.!, Bolz. MS.

Rhodothamnus Rchb.
965 Rh. Chamaecistus (L.) Rchb. Prosp. p. 88 (Rhododendron Chamaec.) (2639. 1651)
IV. Rupicolo, sassicolo, dumale. Cansiglio 1869 (anche Bereng. 1838!); Passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 126); M. Pizzoc (Pamp. n. 36); Grappa (Spranz.!, Vaccari in Bolz. n. 13)

Loiseleuria Desv.
966 L. procumbens (L.) Desv. Agg. p. 25 (Azalea procumbens L.) (2641. 1697)
IV-V. Rupicola. Grappa (Parolini e Mont. herb., Spranz.! Parolini in herb. Contarini, 1825!).

Erica (Tourn.) Linn.
967 E. carnea L. Prosp. p. 88 (2648. 1563)
II-IV. Rupicola, sassicola, dumale. Lungo il Piave a Nervesa, Falzè, Covolo, colli di Cornuda, Vittorio .... dal 1861; colli di Asolo (Fiori 1897! e Bolz. MS.); Cansiglio 1869 (anche Bereng. 1842!); Grappa (Vaccari n. 64) — Var. fastigiata Bolz. Monte S. Giorgio sopra Masèr (Bolz. MS.).

Calluna Salisb.
968 C. vulgaris (L.) Salisb. Prosp. p. 88 (2650. 1532)
II-IV. Pascoliva, nemofila, eliofila. Montello, copiosissima (anche Bizz. 1872 e 1881!), colli di Cornuda, Vittorio (anche Cont. 1825!), Susegana .... dal 1859; Collalt. (D. Montini 1872!); Cansiglio (D. Sacc. 1897!); Grappa (Ant. Saccardo, 1884!, Bolz. MS.); Asolo, Monfumo, Fonte (Bolz. MS.) — Var. ~~pubescens~~ ciliaris (Huds.) Vis. et Sacc. Colli asolani (Montini in Bertol.)

Vulgo: Freza (Montello), Pezola (Vittorio)

Arctostaphylos Adanson.

969 A. Uva-Ursi (L.) Spr. Prosp. p. 88 (A. officinalis W.G.) (2652. 1532)
III-IV. Rupicolo, dumale. Grappa (Parolini in herb. Contar. 1825, Vaccari n. 64); monti sopra Revine a 915 m. (Pamp. n. 44); a Ciano nelle ghiaje del Piave, rariss., disceso dai monti, 1862.

970 A. alpina (L.) Spr. Agg. p. 25 (2653. 1742)
IV. Grappa (Sprang!, Montini!)

Vaccinium (Ruppius) Linn.

971 V. Vitis-idaea L. Prosp. p. 88. (2656. 1532)
II-IV. Nemofilo, rupicolo, dumale. Montello nella valle detta Val Franzòs, 1861, rariss.; Cansiglio appiè dei ginepri e altre conifere, comune 1867. 1869 (anche Bérenq. 1838!); San Boldo sopra Cison (Pamp. in Bolz. n 16); Grappa (Vissan. e Montin. herb. Pat., Antonio Saccardo, 1884!)

R V. uliginosum L. (2657. 1563)
IV Nemofilo, igrofilo. Grappa in herb. Pat. Da confermarsi la località.

972 V. Myrtillus L. Prosp. p. 88 (2658. 1532)
II-IV. Nemofilo, eliofobo, dumale. Montello, raro, 1861; Cansiglio, comune, 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Montini in Bertol., Antonio Sacc. 1884!, Cobau 1905!); Ardosa sopra Crespano (Zanardini, 1827!) ♀ — Var. lancifolium Bolz. Studi fitogr. Jurea, 1815. M. Oro del Grappa (Bolz. MS.), M. Federa sopra Miane a 1000 m. (Pamp. in Bolz. MS.) — Var. microphyllum: Bolz. l.c. Grappa presso la cima (Bolz. MS.)

Fam. 85 Ebenaceae

♀ Vulgo: Giànes, Giàsene

Diospyros Linn.

CA D. Lotus L. Prosp. p. 110 (2659. 1550)
I-III. D'origine orientale ma del tutto naturalizzato in Italia; coltivato e subspontaneo a Selva Volpago, Treviso, Vittorio.... dal 1862. Vulgo: Legno santo e ua santa (il frutto)

Fam. 85 Primulaceae

Hottonia (Boerhave) Linn.

973 H. palustris L. Prosp. p. 109 (2661. 1554)
I – III. Idrofila, palustre, foveale. S. Zeno, S. Angelo, Canizzano, Quinto dal 1863 (anche Fracchia!); laghett. di Revine 1865; Scomigo e Revine (Pamp. n. 44); presso Piombino Dese al Palvi (Béguinot 1909!)

Primula Linn.

974 P. acaulis (L.) Jacq. Prosp. p. 109 (2662. 1415)
I – III. Riparia, sepincola, pratense. Treviso, S. Palè (Pelagio), Selva, Giavera, Montello ..... dal 1861; Cà Tron (Dratz. 1915!); Asolo, Monfumo (Bolz. ms.) ♀ Var. calycantha (Retz). Prat. di Campea e Follina (Pamp. in Bolz. n. 17) – Var. gracilis Cald. Siepi di Cozzuolo (Pamp. n. 36); Asolo (Bolz. ms.) ♀ Vulgo: Oci de bò o buò, Primavera –

975 P. elatior (L.) Jacq. Prosp. p. 109 (2663. 1550)
III – IV. Nemofila Coltivata frequentemente, ma certo spontanea anche sulle colline – Var. intricata (Gren. Godr.). Presso Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 23)

976 P. officinalis (L.) Jacq. Agg. p. 30 (2664. 1551)
III Riparia, pratense. Romano (Arturo Rossi!); Grappa sul M. Oro e Val dei Leb. (Bolz. n. 11)

977 P. farinosa L. Prosp. p. 109 (2665. 1551)
III – IV. Pascoliva, pratense, igrofila. Mont. trevigiani (Fracchia!); Grappa (Spranz. herb. Pat!).

978 P. Auricula L. Prosp. p. 109 (2668. 1563)
IV. Rupicola. Sopra Revine – Lago (Pamp. in De Tom. n. 29); fessure delle rupi sul Grappa (Bizz. 1878!). Coltivata anche comunemente. Vulgo Auricole – Var. mollis Rchb. (P. superauricula × viscosa). Cima del Grappa (Bolz. n. 23) – Var. Balbisii (Lehm.) Prosp. p. 109 (P. Aur. var. ciliata Moretti, non Schrk.) Cansiglio, 1869; Grappa (Parolini, Montini in Bertol., Cotau, 1905!); sopra Revine a m. 1145 (Pamp. in Bolz. ms.) – Var. bellunensis Vengo. Coltipo sul M. Pizzoc (Pamp. n. 36)

R P. hirsuta All. (2675. 1855)
IV Rupicola. Grappa (Spranz. herb. Pat.). Da confermarsi la località.

R P. glutinosa Wulf. (2674. 1822)
IV. Pascoliva. Grappa (Spranz. herb. Pat.) Da confermarsi la località.

979 P. spectabilis Tratt. Agg. p. 30 (2677. 1561).
IV Rupicola, sassicola. Grappa (Sternb. 1803. n. 59, Kellner!, Spranz.! Bolz. MS.); Boccaor a m. 700 (Fiori, 1897, herb. Pat.!)

C P. sinensis Lindl. (2678 B. 1860)
I — III. Originaria della Cina. Coltivata ora comunemente. Ora è pur molto coltivata la Prim. obconica Hance della Cina (2678. C, 1890)

Androsace (Tourn.) Linn.

980 A. alpina (L.) Lam. (2680. 1768)
IV. Pascoliva, rupicola. Cantiglio (~~Da~~ però da confermarsi) ~~la località~~; Grappa (Spranz.)

R A. lactea L. (2684. 1606)
IV Rupicola, pascoliva. Grappa (Spranz.) Da confermarsi la località.

981 A. villosa L. (2683. 1785). Var. Chamaejasme W.
IV. Rupicola. Pallantina presso il Cantiglio (Béreng. 1839!)

Cortusa (Matt.) Linn.

R C. Matthioli L. Prosp. p. 109 (2689. 1532)
IV. Pascoliva, igrofila. Grappa (Fracchia herb.!) Da confermare la località.

Soldanella (Tourn.) Linn.

982 S. alpina L. Prosp. p. 110 (2690. 1532)
IV Pascoliva, igrofila. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Spranz.!, Zanard. 1827!, Bizzoz. 1878!); Boccaor (Bolz. MS.); Col Vicentin (Bolz. n. 13) — Var. pusilla (Baumg.) Grappa (Montini, Vacc. n. 64) — Var. minima (Hoppe) (Arcangeli in Vacc. n. 64.
L Grappa

Cyclamen (Tourn.) Linn.

983 C. europaeum L. Prosp. p. 110 (2693. 1415)

II–IV Nemofilo, eliofobo, rupicolo. Montello e tutti i colli di Cornuda, Conegliano, Vittorio, Valdobbiadene .... dal 1861; S. Martino d'Asolo (Zanard. 1827!, Bolz. MS.). Vulgo. Pamporgin.

Lysimachia Linn.

984 L. vulgaris L. Prosp. p. 109 (2694. 1532)

I–IV. Sepincola, nemofila, riparia, igrofila. Quasi tutta la provincia: Montello, Selva, Giavera, Pederobba, Conegliano, Vittorio, Cansiglio .... dal 1861; alveo del Piave (anche Minio n. 35); Ca' Tron (a foglie opposte, o ternate o quaternate) – Var. oppositifolia Bolz.) Colli di Asolo (Bolz. MS.)
(Stud. fitogr. moren. Jorea, 1915 p. 94)

985 L. nummularia L. Prosp. p. 109 (2697. 1532)

I–IV. Pratense, marginale, eliofoba. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Montello, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1861; Castelfranco (Béguinot 1909!); Monfumo (Bolz. MS.); Ca' Tron (Diratz. 1915!)

Anagallis Linn.

986 A. arvensis L. Prosp. p. 109 (2700). Var. phoenicea (All.) (1415)

I–III Campestre, marginale, domofila. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1860; Fagarè, Zenson (Béguinot 1909!); Ca' Tron (Diratz. 1915!) – Var. coerulea (Schreb.) (1415) I–III Marginale, campestre; assai più rara della precedente: Quinto, Varago (orto Caccianiga), 1863.

Samolus (Tourn.) Linn.

987 S. Valerandi L. Prosp. p. 110 (2707. 1563)

I–III. Pratense, igrofilo, ripario. Treviso, Mogliano, S. Palè (Pelagio), Vittorio .... dal 1863; Ca' Tron (Diratz. 1915!); Tamai ai confini del Coneglianese (Contarini 1825!)

Fam. 87 Plumbaginaceae.

988 Armeria Willd.

A. vulgaris W. (2721) Var. puberula Link, Prosp. p. 110 (Statice elongata Hoffm.)

I—III. Dall'Europa settentrionale. Coltivata nei giardini e talora subspontanea — Var. alpina (W.) (1745). IV. Rupicola. Palantina presso il Cansiglio (Dom. e Fr. Saccardo, 1892!)

Fam. 88 Oleaceae

Jasminum (Tourn.) Linn.

C.A J. officinale L. Prosp. p. 90 (2723. 1415)

I—III. S'originario del Caucaso, ma attualmente, sembra qua spontaneo qua e là come al Castello di Conegliano, sul M. S. Augusta, dalla Salute di Serravalle Vittorio, nelle siepi a Costa .... Dal 1863. Volgo Zansamin, Gelsomin.

C J. grandiflorum L. Prosp. p. 90 (2723 A. 1590)

I—III. Del Malabar. Comunemente coltivato. Gelsomin de Spagna.

C.A J. fruticans L. (2724. 1590)

I—III. Di Spagna, Portogallo e Val. merid. coltivato e talora subspontaneo a Vittorio .... 1896. Volgo: Gelsomin galo

C J. odoratissimum L. Prosp. p. 90 (2724. B. 1590)

I—III. Di Madera. Coltivato frequentemente, p. e. a Selva, Treviso, Vittorio. Volgo Gelsomin galo da odor.

Olea Linn

C O. europaea L. Prosp. p. 89 (2725. 1550. R)

I—III. di origine asiatica, ma coltivato dall'epoca romana o forse indigeno nella var. oleaster (Bertoloni) in provincia era da tempo coltivato da' nostri colli, poi smesso ed ora ripreso, come a Selva, 1890 .... Asolo, Monfumo, Maser, Fonte (Bolz. MS.). Volgo: Olivo, Olivèr

C O. fragrans Thunb. (2725 A. 1801)

I—III. Della Cina e Giappone. Coltivato comunemente e qua e là naturalizzato come a Treviso (Kellner 1879!), Vittorio .... 1870.

Phillyrea (Tourn.) Linn.

CA Ph. latifolia L. (2726 γ. 1532)

I – III. Spontanea in più luoghi d'Italia: Nemofila, dumale. Coltivata qua e là in provincia: Cà Tron, subspontanea (Dvatz. 1915!)

Ligustrum Linn.

979 L. vulgare L. Prosp. p. 89 (2727. 1415. R.)

I – IV. Sepiario, nemofilo, dumale. Tutta la provincia: Montello, Selva, Conegliano, Vittorio, Cansighi .... dal 1860; Cà Tron (Dvatz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.). Vulgo: Conostrela, Conostrela bianca (Montello); Maresemola (Vittorio)

CA L. japonicum L. (2728. 1821)

I – III Del Giappone e Cina. Ora è coltivato assai frequentemente nei boschetti e ambulacri e incontrasi anche sporadico, come a Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... 1870.

Syringa Linn.

CA S. vulgaris L. Prosp. p. 89 (2729. 1565)

I – III. Oriunda dell'Ungheria, Balcania e Asia occid. Coltivata e del tutto naturalizzata in tutta la provincia, come a Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861.; Cà Tron (Dvatz. 1915!). Più di rado la var. alba. Vulgo: Sicomòro, o Secomòro.

Fraxinus (Tourn.) Linn.

990 F. Ornus L. Prosp. p. 90 (2731. 1532. R)

I – IV. Nemorale, dumale, campestre. Spontaneo e coltivato in tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1860; Cà Tron (Dvatz. 1915!) Vulgo: Frassen, albro.

991 F. excelsior L. Prosp. p. 90 (2732. 1415 R.)

III – IV. Nemorale. Nei boschi montani qua e là, come sul M. Eudimione sopra Valdobbiadene 1862 – Var. microphylla Sacc. Agg. p. 25. I. Boschetto subpaludi a Roncade, 1866.

Fam. 89 Apocynaceae

Nerium (Tourn.) Linn.

CA N. Oleander L. Prosp. p. 91 (2733. 1415. R)

I – III. Spontaneo in Grecia e fors'anco nell'Italia ~~mediterr.~~. Coltivato e subspontaneo in quasi tutta la provincia, come a Treviso, Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio..... dal 1859. Vulgo: Leandro.

Vinca Linn.

992 V. major L. Prosp. p. 90 (2734. 1563)

I – III. Sepincola, dumale. Selva, Ceneda sul colle di S. Rocco, Cappella, Mezzavilla.... dal 1862; Cà Tron (Dirats. 1915!). Spesso anche coltivata. Var. serotina Fiori e Paol. Siep. di Formeniga (Pamp. in Bolz. n. 19). Vulgo: Erba da tagi

993 V. minor L. Prosp. p. 91 (2736. 1415. R).

I – IV. Sepincola, nemofila, dumale. Montello, Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio.... dal 1861; Asolo, Monfumo, Borso, Fietta, Monfenera ecc. (Bolz. n. 11) – Var. serotina Fiori. Laghetti di Revine (Pampan. n. 36); – Var. micrantha Goir. Valmarino e Corbanese (Pamp. n. 36) – Var. macrantha Goir. Laghetti di Revine (Pamp. n. 36)

Fam. 90 Asclepiadaceae

Cynanchum (L.) R. Brown

994 C. Vincetoxicum (L.) Pers. Prosp. p. 90 (2742. 1532)

I – IV. Nemofilo, sepincolo, dumale. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello (anche Bizz. 1881), Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene, Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!).... dal 1858; Grappa (Vacc. n. 64); Pederobba (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) – Var. laxum (Bartl.) Prosp. p. 90 (var. scandens). Montello 1862 – Var. petraeum Sacc. Prosp. p. 90. Sassicolo, xerofilo, a Selva, Belvedere, 1861.

Fam. 91 Gentianaceae

Gentiana (Tourn.) Linn.

995 G. lutea L. Prosp. p. 91 (2747. 1415).
IV. Pascoliva. Monti intorno al Cansiglio, 1861; copiosa nel M. Pizzoc all'Agnelezza a 1100-1200 m. (Pamp. in Fl. it. exs. n. 327!). Vulgo: Anziana.

R G. punctata L. (2749. 1785)
IV Pascoliva, nemofila. Grappa (Zanardini, 1827). Da confermare la località.

996 G. asclepiadea L. Prosp. p. 91 (2750. 1415)
II-IV. Nemofila, rupicola. Montello verso il Piave (anche Bizz. 1881!); Valdobbiadene, 1870!); Possagno (Bizz. 1878!); Grappa (Vacc. n. 64; Cobau 1906!, Bolzon, 1895!); Cansiglio (Dom. Sacc. 1892); Collalt. (Dom. Montini 1872!); bosco Fagarè di Cornuda (Trott. 1904!)

997 G. Pneumonanthe L. Prosp. p. 91 (2751. 1550)
I-IV. Nemofila, igrofila, pascoliva. Montello, verso il Piave 1861 (anche Bizz. 1881!); Vittorio (anche Fr. Sacc. 1890!); Monfenera (Favero 1844, herb. Pat.); Tamai (Contarini 1825!); Mogliano (Montini herb. Pat.); bosco Fagarè presso Cornuda (Bolz. 1910! e MS.) — Var. latifolia Lecoq. et Lamotte. Colli di Vittorio (Giuseppina Saccardo-Rasi, 1907!) — Var. minor Brot. Colli di Vittorio col tipo (Bolz. n. 26). [Pamp. in

998 G. acaulis L. Prosp. p. 91 (2753. 1532)
IV. Pascoliva, pratense. Monti sopra Vittorio 1897; M. Croce sopra Serravalle (Stur n. 61); Ardosa sopra Crespan (Zanardini, 1827!); Monfenera (Bolz. n. 11); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Cobau 1906!, Bolz. n. 11, Montini & Contarini in Bertol., Spranzi!); M. S. Rocco presso Possagno, 1860 — Var. Kochiana Perr. et Song. Prati presso Refrontolo (Pamp. in Bolz. MS.). Sec. Bolz. è qui probabilmente eterotopica, sporadica. Pamp. e

999 G. cruciata L. Prosp. p. 91 (2754. 1532)
II – IV. Pratense, pascoliva. Montello nel luogo detto Le Campagnole 1861; Serravalle (anche Contarini 1825!); Cansiglio, 1869 (anche Dom. Sauardo, 1878!); Sonego, a 800 m. (Pamp. in Bolz. MS.); Valdobbiade a Barberia (Pamp. n. 44); Valdobbiadene (Favero, 1845!); Grappa (Montini, Bizz. 1878!); Collalti (Dom. Montini 1872!); Borso (Bolz. n. 11); Fagarè (Bolz. 1895!); Pederobba (Béguinot 1909!)

1000 G. verna L. Prosp. p. 91 (2755. 1550)
II – IV. Pascoliva, pratense. Nervesa, Vittorio 1861; Asolo (Fiori 1893! e 1897!) Asolo, Monfumo, Castelcucco (Bolz. n. 10 e MS.); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol.), Ardosa sopra Crespan (Zanardini, n. 1827!); Collalt. (Dom. Montini 1872!); Monfenera (Bolz. n. 11) — Var. aestiva (Schult.) Prosp. p. 91 come sp. (1852). Vittorio (anche Trott. 1916!) M. Monfenera, M. Endimion ... dal 1863; Collalt. (Dom. Mont. 1872!); Grappa sopra Campo di Borso (Bolz. MS.) — Var. imbricata (Fröl.) Grappa (Montini e Vaccari n. 64) — Var. elongata (Hänke) Col Vicentin a 800 m. (Pamp. in Bolz. MS.); Grappa (Parolini, Sprangi!)

1001 G. uliculosa L. Prosp. p. 91 (2758. 1550)
I – IV. Pratense, igrofila. S. Palè (Pelagio) Nervesa 1862; Montello (Kellner, 1840!) Cozzuolo, M. Altare, colli di Serravalle, 1870 (anche Pamp.!); Valdobbiadene (Favero 1844!); Grappa (Montini, Zanardini, 1827!); Cansiglio (Dom. Sau. 1897!) Var. minor Bolz. Malga Ardosetta del Grappa (Bolz. MS.)

1002 G. nivalis L. Agg. p. 26 (2758. 1726)
IV. Pascoliva. Sopra il Cansiglio, 1869; M. Grappa (Montini, Sprangi!) — Var. brevifolia Rouy. Ardosetta del Grappa, a 1300-1500 m. (Bolz. n. 26.)

1003 G. ciliata L. Prosp. p. 91 (2760. 1606)
III – IV. Pascoliva, pratense. Vittorio e Cansiglio dal 1869; M. Pizzoc nel luogo Loc (Trott. 1915!); colli Asolani (Zanard. 1827!); Col Vicentin, Fadalto (Pamp. n. 44) Valdobbiadene (Favero 1844!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Bolz. MS., Montini, Parolini); Collalt. (Dom. Montini 1872!) — Var. biflora Bolz. Grappa in val dei Lebi (Bolz. MS.)
/ e; pascoli del colle Argenta sopra Masèr (Bolz. MS.)

1004 G. campestris L. (2761. 1697)
IV. ~~Pratense~~ Pascoliva. Grappa (Bizzozero 1878 u. herb Pat.)

Prosp. p. 91 (G. Amarella)
1005 G. calycina Kochs (2762 β, 1606).
II – IV. Pascoliva, pratense. Nervesa, Montello verso il Piave, Colfosco, Pederobba, Valdobbiadene, Vittorio .... dal 1858; Conegliano (Bérenq. 1842!); Col Vicentin, 1906; Cansiglio, 1869 (anche Dom. Sacc. 1892!) Collalt. (Dom. Montini, 1872!); Grappa (Bolz. n. 20) — Var. antecedens Wettst. Valmarino e Praderatico (Pamp. n. 36); Monfenera (Bolz. n. 25) — Var. pilosa Wettst. Passo S. Boldo (Pamp. in Bolzon n. 20) — Var. obtusifolia W. Grappa (Vaccari n. 64); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!)

Chlora (Renealm.) Adans.
1006 Ch. perfoliata L. (1767). Gent. perfoliata L. (1753), Prosp. p. 91 (2767. 1415)
I – IV. Igrofila, pratense, subpalustre. Quinto, Treviso 1861 (anche Bereng. 1839!), Nervesa, Cornuda, Colfosco, Vittorio, alveo del Piave (anche Minio, n. 35) .... dal 1861 — Var. grandiflora (Viv.). Vittorio a Serravalle. Sono esemplari maggiori a calice e corolle 9-10-fida.

Erythraea (Renealm.) Neck em. ~~Prosp.~~
1007 E. spicata (L.) Pers. Prosp. p. 92 (2769. 1620)
I – II. Presso il Piave (Turra MS. Cfr. Prosp. p. 68). Probabilmente la citazione di Turra si riferisce all'ultima sezione del Piave, verso il Cavallino, dove è indicata anche dallo Zannichelli.

1008 E. Centaurium (L.) Pers. Prosp. p. 92 (2770. 1415)
I – IV. Pratense, pascoliva, nemofila. Montello, Cornuda, Selva (anche Bizz. 1881!) Conegliano, Vittorio, Valdobbiadene .... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!); Pederobba (Béguinot 1909!); Asolo (Bolz. MS.); Grappa (Vaccari, n. 64) — Var. compacta Moris. Asolo alla Montagna grande (Bolz. MS.)

Q Volgo: Erba China.

1009 E. pulchella (Sw.) Horn. Prosp. p. 92 (2771. 1789)
I–III. Pratense, pascoliva, igrofila. Presso il Piave a Ciano 1862; Mogliano 1863; Cà Tron (Dirat. 1915!); Vittorio, prati e lungo via Cavallotto, 1910; Orsago e Cozzuolo (Pamp. in Bolz. ms. e n. 12); Piombino Dese (Bég. 1909!)

Menyanthes (Tourn.) Linn.
1010 M. trifoliata L. Prosp. p. 91 (2772. 1703)
I–III. Idrofila, palustre. Sile a Quinto 1863 (anche Fracchia!); laghetti di Revine, 1865.

Fam. 92 Borraginaceae

Cerinthe (Tourn.) Linn.
1011 C. minor L. Prosp. p. 94 (2775. 1415)
I–III. Sassicola, ruderale. Arcade e Vittorio ... dal 1861; Scomigo (Pamp. in Bolz. n. 12; Valdobbiadene (Favero, 1845!); Tamai ai confini del Coneglianose (Contarini, 1825!) — Var. Allionii Fiori. Prosp. p. 94 (C. maculata Bieb.). Montello, alle Murette, raro, 1864.

Onosma Linn.
1012 O. echioides L. ~~(2778. 1595)~~ Var. cinereum (Schreb.) Prosp. p. 93 (O. montana Sibth.) (2778 E. 1745)
I Sassicolo, ruderale, xerofilo. Nel Trevigiano (Mayer in Bertol.) — ~~Var. cinereum (Schreb.) Prosp. p. 93 (O. montanum Sibth.) (1745)~~

Echium (Tourn.) Linn
1013 E. vulgare L. Prosp. p. 94 (2788. 1415)
I–III. Ruderale, marginale, xerofilo. Selva, Camalò, Montebelluna, Vittorio ... dal 1859; Asolo (Bolz. ms.); alveo del Piave (anche Minio n. 35); Pederobba (Béguinot 1909!) — Var. pustulatum (Sibth.). Ghiaje del Piave a Falzè (Fr. Sacc. 1890!)

Lithospermum (Tourn.) Linn.

1014 L. officinale L. Prosp. p. 94 (2788. 1415)
I – III. Ruderale, sassicolo, xerofilo. Caerano, Camalò, Nervesa, Cornuda .... dal 1860; Tamai (Contarini, 1825!); presso il Cansiglio, 1869; Asolo (Bolz. MS.); Collalti (Dom. Montini 1871!); Ponte di Piave, Negrisia, 1909! Varie a foglie larghe e brevi (30 = 10 mm.) a Caerano e a foglie strette e lunghe (40 = 7 mm.) a Cornuda, P. di Piave.

1015 L. suffruticosum (L.) A. Kern. Agg. p. 26 (L. graminifolium Viv.) (2787. 1694)
IV. Rupestre. Grappa in Valle S. Fidà (Sternb. 1804, n. 59) Grappa (Sprangi!, C. Massalongo, 1877 herb. Pat.!); Grappa in Valle Scalarè a 1300 m. (Bolz. MS.); Collalti herb. Béreng.! e Kelln!).

1016 L. purpureo-caeruleum L. Prosp. p. 94 (2189. 1583)
I – III. Nemofilo, sepincolo, dumale. Montello a Nervesa e Colfosco ... dal 1862; Carbonera (Fracchia!); Asolo, Monfumo, Fiella, Borso (Bolz. n. 11); S. Lorenzo di Vittorio (Pamp. n. 44)

1017 L. arvense L. Prosp. p. 94 (2793. 1551)
I – III. Campestre, segetale, ortivo. Tutta la provincia: Selva, Montebelluna, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Godego e Castelfranco (Bég. n. 1909!)

Myosotis (Dillen) Linn.

1018 M. palustris (L.) Lam. Prosp. p. 94 (2794. 1583)
I – III. Palustre, riparia. Vittorio fuori Serravalle 1907; Cà Tron (Dratz. 1915!); Conegliano (Béreng. 1842!); Resana al Palù (Béguinot, 1909!) – Var. strigulosa Reichenb. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Vittorio, Cornuda ... dal 1862; Conegliano (Béreng. 1842!); Ponte di Piave, Salgareda (Béguinot, 1909!) – Var. pseudocaespitosa Bég. Agg. p. 27 (M. caespitosa Sacc.; non Schultz [A typo Schultz. differt calycibus angustius campanulatis, corollisque majoribus]. Montello 1864. Vulgo: Ferghis, Non ti scordar di me (tutte le var.)

1019 M. silvatica Hoffm. Agg. p. 27 (2796 γ. 1594)
I – III. Nemosila, igrosila, riparia. Selva, Montello (anche Kellner, 1848!), Vittorio... dal 1862; Cansiglio (Béreng. 1840!, Dom. Sacc.!); alveo del Piave (Minio n. 35) Pederobba (Béguinot, 1909!); Asolo (Bolz. MS.) ~~[illegible]~~; Collalti (Dom. Montini, 1872!) – Var. alpestris (Schmidt) Prosp. p. 94, come sp. Grappa (Montini in Bertol., Cobau, 1906!); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!. Béguinot in Fl. ital. exs. n. 1696, Bérenger 1838!)

1020 M. arvensis (L.) Lam. Prosp. p. 94 (M. intermedia Link) (2797. 1831)
I – III. Ortiva, campestre. Selva, Treviso, Vittorio... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!), Ponte di Piave, Salgarèda, Godego (Bég. 1909!) – fm. variegata Sacc. Prosp. p. 94. Qua e là colle specie – fm. albiflora Pamp. Carpatica (Pamp. in De Toni n. 29) – Var. collina (Hoffm.) Prosp. p. 94 (M. arvensis Link) [= M. hispida Schlecht.]. Campestre, pratense, xerosila. Selva, Camalò, Vittorio... 1863; Grappa (Bizz. 1878!) – Vulgo: Oceti dela Madona

Pulmonaria (Tourn.) Linn.

1021 P. officinalis L. Prosp. p. 94 (2799. 1551)
I – IV. Nemosila, sepincola, eliofoba. Selva, Giavera, Conegliano (anche Béreng. 1842!) Vittorio... dal 1858; Cà Tron (Diratz. 1915!); Grappa (Vaccari n. 64) – Var. saccharata (Mill.) Asolo a S. Martino nelle siepi (Bolz. MS.) – Var. tuberosa (Schrank) Asolo nei boschi di Cà Balbi e all'Acqua della Regina (Bolz. MS.) – Vulgo: Bocalòse, Erba pulmonera (tutte le var.)

1022 P. mollis Wolf. Agg. p. 26 (P. angustifolia β mollis Wolf).
II – III. Nemosila, eliofoba. Conegliano (Béreng. 1842!); Vittorio, 1866; Grappa e Monferrera (Bolz. MS).

1023 P. azurea Bess. Prosp. p. 94 (P. angustifolia L. ex p.) (2799 greco 1852)
II – IV. Nemosila, eliofoba. Montello verso il Piave, 1862; colli Asolani e Masèr (Bolz. n. 16); M. Cimone a 1200 m. (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 943!) Collalti (Dom. Montini, 1871!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59).

Borago (Tourn.) Linn.

CA B. officinalis L. Prosp. p. 93 (2814. 1415)

I–III. Spontaneo qua e là in Italia e spesso coltivato anche nel Trevigiano, ove talora è sporadico: Selva, Treviso, Vittorio.... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.); Cà Tron (Diratz. 1915!); Valdobbiadene (Pamp. n. 44). Volgo: Boraso, Boràsene.

Symphytum (Tourn.) Linn.

1024 S. officinale L. Prosp. p. 93 (2816. 1551. R)

I–IV. Sepincolo, ripario, nemofilo. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1858; Cà Tron (Diratz. 1909!); Salgareda (Contarini 1825!); Ponte di Piave Salgareda (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) Volgo. Erba pedocèra.

1025 S. tuberosum L. Prosp. p. 93 (2817. 1415)

I–III. Nemofilo, eliofobo. Vallate del Montello e pr. Vittorio... dal 1862; Asolo al Foresto nuovo (Bolz. MS.) — Var. bulbosum (Schimp.) (1550) Sepincolo, nemofilo. Agg. p. 26 c. sp. Selva lungo le siepi non comune, 1866; Mogliano (Mayer e Romano in Bertol.); Cansiglio, 1869.

CA S. asperum Lepech. (1805) = S. asperrimum Don (1808)

I–III. Di origine orientale. Coltivato solo di recente come foraggio e talora erratico, come a Cà Tron (Diratz. 1915!)

Cynoglossum (Tourn.) Linn.

1026 C. officinale L. Prosp. p. 93 (2819. 1415)

I–III. Sepincolo, ruderale, marginale. Bavaria, Belvedere, Camalò, Ciano, Montebelluna ... dal 1861; Valdobbiadene (Favero, 1844!); Grappa al Cason del Sol (Bizzoz. 1878!)

1027 C. creticum Mill. Prosp. p. 93 (C. pictum dit.) (2820. 1550)

I–III. Sassicolo, ruderale, campestre. Selva, Camalò... 1861; Conegliano (Bérenz. 1841!); Collalti (Dom. Montini, 1871!)

Omphalodes (Tourn.) Moench

1028 O. verna Moench Prosp. p. 93 (2825. 1768)

II – III. Nemofila, igrofila. Covolo presso il Piave, Montello al Forame e al Tavaran, Cornuda in Val de l'Acqua ... dal 1861; Montello (Béreng. 1840!); colli di Asolo, Castelcucco, Monfenera (Bolz. n. 11, Fiori 1897!); colli di Vittorio (Pamp. n. 38).

Lappula (Ruppius) Moench

1029 L. Myosotis Moench, Prosp. p. 93 (Echinospermum Lappula Lehm.) (2827. 1606)

I – III Sassicola, ruderale. Selva, Camalò, Conegliano (anche Béreng. 1842!) Crespano ... dal 1861; Cornuda (Bolz. MS.); Collalti (Dom. Montini 1872!)

Eritrichium Schrad.

1030 E. nanum (Vill.) Schrad. Agg. p. 27 (2829. 1697)

IV – V. Rupicolo. Grappa (Spranz. herb. Pat!).

Heliotropium Linn.

1031 H. europaeum L. Prosp. p. 92 (2830. 1554)

I – III. Ruderale, domofilo, sassicolo. Selva, Camalò, Belvedere 1861; Treviso (R. Roggar!)

C H. peruvianum L. (2831 A. 1762)

I – III. Originario del Perù. Coltivato comunemente e di rado avventizio. Vulgo. Vaniglia.

Fam. 93 Convolvulaceae

Convolvulus (Tourn.) Linn.

1032 C. arvensis L. Prosp. p. 92 (2842. 1551)

I – III. Campestre, segetale, ortivo, domofilo. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Treviso ... 1861; Ca' Tron (Dirals. 1915!), Jagarè, Zenson (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) – Var. lancifolius Prest. Selva, 1910. Vulgo: Sbordèa (tutte le forme) / Sbroegia

1033 C. sepium L. Prosp. p. 92 (2843. 1415. R.)
I – III. Sepincolo, dumale. Tutta la provincia: Selva, Montebelluna, Cornuda, Vittorio .... dal 1858; Zenson, Fagaré, Castelfranco, Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Dratz. 1915!). Vulgo: Sbordèa, Sbordèon, Bordegia, Sbroegia

C C. tricolor L. Prosp. p. 92 (2839. 1696)
I – III. Dr Sicilia. Coltivato frequentemente per ornamento.

Ipomoea Linn.

C I. Batatas (L.) Poir. (2847. 1630)
I – III. Dell'America centrale. Coltivato qua e là. Vulgo: Meriche.

C A I. purpurea (L.) Roth Prosp. p. 92 (Pharbitis hispida Choisy) (2848. 1642)
I – III. Dell'America merid. Coltivata comunemente per ornamento e spesso pure avventizia, come a Selva, Caerano, Vittorio ... dal 1863.

Cuscuta (Tourn.) Linn.

1034 C. Epithymum (L.) Murr. Prosp. p. 92 (2850. 1415)
I – IV. Parassita sul Thymus Serpyllum, Mentha longifolia, Satureja hortensis, Galium Mollugo e G. verum e G. purpureum, Helianthemum vulgare, Crepis setosa ecc. a Selva, Vittorio, Follina (anche Béreng. 1842), Cornuda .... dal 1861; Cantiglio (Dom. Saccardo, 1897); Asolo (Bolz. MS.) – Var. Trifolii Rchb. Sul Trifolium pratense, Medicago sativa, Cytisi sp. qua e là. Vulgo: Erba loa.

1035 C. europaea L. (excl. β). Prosp. p. 92 (2851. 1558)
I – IV. Parassita su Urtica, Humulus ecc. a Selva, Vittorio ... dal 1862; Asolo e Casera del Sol sul Grappa (Bolz. MS.)

Fam. 94 Solanaceae

Datura Linn.

1036 D. Stramonium L. Prosp. p. 96 (2857. 1585)

I–III Ruderale, campestre, ortiva. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1858, Cozzuolo (Pamp. n. 44). Certamente di antica origine esotica (prob. asiatica) perchè prima del 1500 non si conosceva in Italia. Cfr. Cron. p. 229. — Var. Tatula (L.) Prosp. p. 96 (2857A. 1675). Vie di Caselle, Paderno, S. Bona, Castelfranco ... dal 1863.

Hyoscyamus (Tourn.) Linn.

1037 H. niger L. Prosp. p. 96 (2859. 1415. R) (anche Pamp. n. 44)
I–III Ruderale, sassicolo, domofilo. Selva, Nervesa, Ciano, Treviso, Vittorio ... dal 1861. Vulgo: Erba Santa Polonia (Apollonia)

1038 H. albus L. Prosp. p. 96 (2860. 1565)
I–III. Ruderale, domofilo. Presso il castello di Conegliano 1862; Treviso 1866.

Nicotiana (Tourn.) Linn.

C N. rustica L. Prosp. p. 96 (2863. 1565)
I–III. Dell'America merid. Coltivaz. qua e là estesamente e talora incontrasi sporadica, come a Selva, 1858. Vulgo: Tabaco

C N. Tabacum L. Prosp. p. 96 (2864. 1570)
I–III. Dell'America tropicale. Coltivata e sporadica come la precedente ... 1861. Vulgo: Tabaco

Solanum (Tourn.) Linn.

1039 S. Dulcamara L. Prosp. p. 95 (2869. 1551).
I–III. Sepincola, dumale, nemofila. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1858; Cansiglio a m. 1150 (Dom. Saccardo) — Var. obovatum Rouy M. Eudimione in Pianesse (Bolz. MS.) — Var. laciniatum Dun. Asolo (Bolz. MS.) ed altrove. Vulgo: Dulcamara (tutte le var.)

C S. jasminoides Paxt. (1855)
I–III. Degli alti monti dell'America merid. Da pochi anni diffusamente coltivato e quasi naturalizzato, come a Vittorio. Vulgo Giasminoide. Cfr. Sacc. in Bull. Soc. Tosc. Ortic. 1916. p. 107.

CA S. tuberosum L. Prosp. p. 95 (2870. 1590)
I-IV. Oriundo dell'America merid. Coltivato ovunque e talora erratico ... 1858. Vulgo: Patata

1040 S. nigrum L. Prosp. p. 95 (2871. 1415)
I-IV. Campestre, ruderale, ortivo. Tutte le provincia ... 1858 - Var. villosum (Bernh.) Prosp. p. 95 c. spec. Selva, Camalò, Vittorio, Treviso (anche Bereng. 1837), Selvana (Fracchia!) dal 1862. Specialmente la fm. ochrolencum (Bast.) - Var. miniatum (Bernh.) Prosp. p. 95 c. spec. Sepincolo e ruderale a Colfosco, Conegliano al castello, Treviso (anche Fracchia!), Vittorio ... dal 1862. Vulgo: Erba bruna (specialm. la var. a bacche nere), Erba porcara (nel Canal di Brenta sec. Cobau)

C S. Melongena L. Prosp. p. 95 (2872. 1415)
I-III. Delle Indie orientali. Coltivato comunemente. Vulgo: Melanzana

C S. ovigerum Lam. Prosp. p. 95 (2872 γ. 1772)
I-III Dell'Arabia. Coltivato frequentemente per abbellimento: Vulgo: Melanzana bianca

C S. Pseudocapsicum L. (2872 A. 1553)
I-III. Di Madera. Coltivato frequentemente per ornamento.

CA S. Lycopersicum L. Prosp. p. 95 (Lycopersicum esculentum Mill.)
I-III Dell'America merid. Coltivato dovunque e fuggiasco bene spesso sui calcinacci, presso i muri, come a Treviso, Selva, Cavnada, Vittorio .... dal 1858. Vulgo: Pomidoro o Pomodoro.

Capsicum (Tourn.) Linn. ~~Prosp. p. 96 (2875. 1551)~~
C C. annuum L. Prosp. p. 96 (2875. 1551)
I-III. Dell'America tropicale. Coltivato frequentemente. Vulgo Pevaroni.

Physalis Linn.

1041 Ph. Alkekengi L. Prosp. p. 95 (2877. 1415)
I – IV. Nemofila, sepicola, dumale. Quasi tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1858; Cogniolo (Parag. n. 44). Volgo: Erba sciopa – Var. dentata Beck. Arsolo, alta Montagna Grande (Bolg. MS.)

CA Ph. pubescens L. p. 95 (2878. 1793)
I – III. Dell' America merid. Coltivata frequentemente e spesso avventizia, come a Vittorio presso via Cavalletto, 1916; Cogniolo (Parag. n. 36) Ca' Tron (Diratz. 1915!) – Volgo Chefani

Atropa Linn.
1042 A. Belladonna L. Prosp. p. 96 (2880. 1415)
II – IV. Nemofila, eliofoba. Nelle zone più elevate del Montello, rara, 1861; Cansiglio 1869 (anche Contarini, 1825! ?, Parag. in Bolg. MS., Dom. Saccardo a n. 1100, 1877!); Grappa (Sterns. 1805, n. 59, Zanardini. 1827!)

Fam. 95 Scrophulariaceae

Verbascum Linn.
1043 V. Thapsus L. Prosp. p. 96 (2883. 1550)
II – III. Ruderale, sassicolo, xerofilo. Nervesa "alle Campagnole" e Montello "ai Frati" ... dal 1860; Val Soligo (Bérenger, 1844!); Cansiglio 1869; Ca' Tron (Diratz. 1915!); Schiapetto (Contarini, 1825!) – Volgo Barbasco, Barabasco.

1044 V. montanum Schrad. (2884. 1415)
III. Ruderale, rupestre, nemofilo. Grappa (Vaccari, n. 64)

1045 V. phlomoides L. Prosp. p. 97 (2886. 1415. R)
I – III. Ruderale, marginale, domofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Vittorio, Conegliano, (anche Bérenger, 1842!) Camalò, Cornuda .... dal 1861 – Volgo: Barbasco.

1046 V. Blattaria L. Prosp. p. 97 (2888. 1550)
I – IV. Ruderale, sepincolo, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Montebelluna, Cornuda, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!). Var. albiflorum Sacc. Prosp. p. 97. A Venegazzù 1862 e altrove, raro – Var. viviparum Sacc. l.c. (vivescenza). A Selva 1861

1047 V. pulverulentum Vill. Prosp. p. 97 (V. floccosum W.K.) (2891. 1554)
I – III. Ruderale, sassicolo, xerofilo. Selva, Giavera, Bavaria, Treviso (anche Fracchia!), Conegliano, Vittorio ... dal 1861; S. Giacomo presso Vittorio (Fracchia, sub V. Lychnite 1838!); a Pederobba presso il Piave (Bég. 1909!)

1048 V. Lychnitis L. Prosp. p. 97 ex parte (2892. 1550)
II – III. Ruderale, xerofilo. Colli di Asolo (Bolz. n. 11); Grappa (Vaccari, n. 64)

1049 V. sinuatum L. Prosp. p. 97 (2895. 1550)
I – III. Ruderale, marginale. Pieve di Soligo sponde erbose del fiume Soligo, 1863.

1050 V. nigram L. Prosp. p. 97. (2896. 1554)
II – III. Ruderale, marginale, xerofilo. Pederobba (anche Béreng.!), Cornuda, 1862; Fenèr verso Pederobba (Bég. 1909!); Solighetto (Contar. 1825!); Conegliano (Béreng. 1842!); Ceneda (Fracchia!); Vittorio alla Pieve di S. Andrea 1909; presso il Cansiglio (Dom. Saccardo, 1897!) – Var. parisiense Monfenera sopra Cavaso (Bolz. Ms.) – Var. thyrsoideum (Host). Asolo al colle di S. Martino (Bolz. Ms)

Linaria (Tourn.) Med.

1051 L. Cymbalaria (L.) Mill. Prosp. p. 98 (2900. 1415)
I – IV. Murale. Treviso, Pederobba, Vittorio ... dal 1858; Asolo (Bolz. Ms.); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!)

1052 L. Elatine (L.) Mill. Prosp. p. 98 (2906. 1550)
I – III. Campestre, arenicola. Selva, Belvedere, Camalò, S. Palè .... dal 1861; Mogliano (Mayer, Romano, herb. Pat.!); Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.)

1053 L. vulgaris Mill. Prosp. p. 98 (2912. 1532)
I – III. Ruderale, sassicola, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Nervesa, Conegliano, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!); Pederobba (Bég. 1909!); Grappa (Bizz. 1878!)

1054 L. alpina (L.) Mill. Prosp. p. 98 (2914. 1713)
IV, accid. I – II. Rupestre, sassicola, alveale. Grappa (Montini in Bertol.); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); alveo del Piave a Ponte di Piave (Contarin. 1825!) e presso Valdobbiadene (Favero, 1844!)

1055 L. minor (L.) Desf. Prosp. p. 98 (2927. 1562)
I – III. Campestre, ruderale, sassicola. Selva, Camalò, Paderno, Falzè (anche Dom. Sacc. 1890!), Vittorio ... dal 1861; Conegliano (anche Bérenq. 1844); letto del Piave a Nervesa (anche Bizz. 1881! e Minio n. 35); Montebelluna e Salgarè (Bég. 1909!) Var. major Govran. Segusino (Bolz. MS.)
; Asolo, Treviso (Bolz. n. 11)

Antirrhinum (Tourn.) Linn.

1056 A. Orontium L. Prosp. p. 98 (2928. 1550)
I – II. Campestre, sassicolo. Selva, Belvedere, S. Andrà, Camalò, non comune .... dal 1861.

1057 A. majus L. Prosp. p. 98 (2930. 1532 R).
I – III Murale, ruderale. Treviso, Conegliano, Vittorio, copioso e versicolore dal 1861; Asolo (Zanard. 1825, Bolz. MS.). Vulgo: Boche da lou o lovo – Var. angustifolium Willk. et Lange. Muri vecchi di Vittorio, 1870

Scrophularia (Tourn.) Linn.

1058 S. vernalis L. (Prosp. p. 97 (2933. 1606)
III – IV Nemofila, igrofila. Presso il Grappa (G. Montini herb.); Collalti (Dom. Montini, 1872!); Campo del Grappa (Sternb. 1804, n. 64); Praderatico sopra Follina (Berenz. 1843!); Monte sopra Revine (Pamp. n. 44).

1059 S. aquatica L. (2936. 1551)
I – III. Riparia, idrofila. Pagnano d'Asolo lungo il torrente Erega (Bolz. n. 10) – Var. alata (Gilib.) Prosp. p. 97 (S. Ehrharti Stev.). Fossi a Selva, Giavera, Vittorio, Treviso... dal 1861 – Fm. viridiflora: floribus ubique viridibus. Vittorio, 1903, col tipo.

1060 S. nodosa L. (Prosp. p. 97) (2937. 1415)
I – III. Riparia, igrofila, sepincola, nemofila. Selva, Vittorio, Cornuda, Treviso, Cansiglio (anche D. Sacc. 1897!), Montebelluna... dal 1860; Ca' Tron (Diratz. 1915!) – Var. chlorantha: floribus totis viridulis. Vittorio, 1903.
Vulgo: Erba per le marcale.

1061 S. canina L. Prosp. p. 97 (2940. 1550)
I – III. Alveale, ruderale, riparia. Covolo, Nervesa, Falzè nell'alveo del Piave, Vittorio, Cornuda.... dal 1861; alveo del Cervan (Corbanese) (Contarini, 1825!); Ponte di Piave, Pederobba (Bég. 1909!); San Boldo (Trott. 1914!) – Var. bicolor (S. et S.) M. Croce pr. Serravalle (Star n. 61 sub S. chrysanthemifolia Bieb.); Lago Morto (anche De Toni in Bolz. n. 23); ghiaje al Grappa (Rizz. 1878!); alveo del Piave (Minio, n. 35) – Var. chlorantha: floribus totis virentibus. Vittorio, 1906 – Var. Hoppei (Koch). Val Paula dietro M. Cesen sopra Valdobbiadene (Bolz. n. 13); letto del Piave a Ponte di Piave, con transizione al tipo (Bég. 1909!)

Paulownia S. et Zucc.

CA P. tomentosa (Thunb.) Steud. Prosp. p. 97 (P. imperialis S. et Z.)
I – III. Del Giappone. Coltivata frequentemente e spesso avventizia (per trasporto dei semi) pertino sui muri vecchi, come a Selva, Vittorio... dal 1862
Vulgo: Paulonia.

Gratiola Linn.

1063 G. officinalis L. Prosp. p. 97 (2942. 1415)
I – III. Riparia, idrofila, subpalustre. Selva, Montello, Falzè, Bavaria, Cornuda (anche Trott. 1906!), Vittorio ... dal 1861; Treviso (Kellner, 1839!); Godego, Ponte di Piave (Bég. 1909!); Cà Tron (Di Italy. 1915!); Castelfranco (Bolz. MS.) – Var. prostrata Bolz. Studi fitog. Ivrea, 1915. Fossi di Pagnano d'Asolo (Bolz. MS.)

Veronica (Tourn.) Linn.

1063 V. lutea (Scop.) Wettst. ~~Sacca~~ Prosp. p. 99 (Paederota Ageria L.) (2945. 1726)
IV Rupicola. Cansiglio (Bereng. 1839!); Passo S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 147!); Grappa (Bolz. n. 11)

1064 V. Bonarota L. Agg. p. 28 (Paederota Bonarota L.) (2946. 1532)
IV, accid. II-III. Rupi lungo il Piave a Covolo discesa dai monti, 1870; Passo S. Boldo (Pamp. Fl. ital. exs. n. 148! e Trotter 1914!); M. Pizzoc all'Agnelezza e Cison sul Col de Moi (Pamp. n. 44); Cansiglio (Bereng. 1839!); Grappa (G. Montini! e Bolz. n. 11).

1065 V. Beccabunga L. Prosp. p. 98 (2947. 1415)
I – III. Idrofila, foveale, palustre – Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Romano (Dom. Montini, 1872!); Resana (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) – Vulgo: Grassum (in comune col Nasturtium offic.)

1066 V. Anagallis L. Prosp. p. 98 (2948. 1550)
I – III. Idrofila, foveale, palustre. Tutta la provincia: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860; Fratta di Turgo (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 149!); Segusino (Bolz. MS.); Ponte di Piave (Bég. 1909!); alveo del Piave pr. Pederobba (Bég. 1909!, Minio, n. 35); Cà Tron e Possagno (Diratz. 1911!, 1915!) – Var. aquatica Bernh. Laghetti di Revine (Pamp. n. 36).

1067 V. anagalloides Guss. Agg. p. 27 (V. Anagallis var. pubescens) (2949. 1826)
I – II. Palustre. Roncade, 1866.

Prosp. p. 99 (V. latifolia L. ex p.)

1068 V. Teucrium L. (2950. 1551)
II - III. Pratense, pascoliva, dumale. M. S. Augusta di Vittoria ed altri colli vicini 1861-66; Pagnano e S. Martino d'Asolo (Bolz. n. 10. 11); Monfenera sopra Cavaso (Bolz. MS.); Collalti (Dom. Montini, 1871!); Grappa (Vaccari n. 64, Bigg. 1878!) — Var. vestita Goir. Colle S. Martino di Asolo (Bolz. MS.)

1069 V. prostrata L. Prosp. p. 99 (2950 β. 1697)
II - III. Pratense, xerofila. Camalò, Volpago, 1861; S. Martino di Asolo (Zanard. 1827!)

1070 V. Chamaedrys L. Prosp. p. 98 (2951. 1532)
I - III. Sepincola, riparia, nemofila. Selva, Montello, 1858; Vittorio 1864; Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!); Valdobbiadene 1870; Romano (Dom. Montini, 1871); Cà Tron (Diratz. 1915!) ♀ — Var. nemorosa W. K. Prosp. n. 98 (var. glabrata) Murale a Selva, xerofila nel Montello, 1858; Grappa (Bolz. MS.) — Var. pilosa (Schmidt) Alla Forcella del Doc sopra Segusino (Bolz. MS.) ♀ — Fm. albiflora Sacc. Prosp. p. 99. B. Montello vaso, 1862.

1071 V. urticifolia Jacq. Prosp. p. 98 (2952. 1595)
II - III. Nemofila, igrofila, riparia. Cornuda, Covolo, 1860; Montello (Kellner 1841!); Cansiglio, 1869; Valdobbiadene (Favero, 1845!); Vittorio, sul muro arginale del Meschio, colle fm. roseiflora, 1906; Grappa, Monfumo (Bolz. n. 11); Collalti (Dom. Montini, 1871!); Pederobba (Bég. 1909!) — Var. latifolia Bolz. Grappa in Muschiè a 1100 m. (Bolz. n. 26)

1072 V. officinalis L. Prosp. p. 99 (2953. 1532)
II - III. Nemofila, murale, eliofila. Selva sui muri vecchi e nel Montello, 1860-61; coll. di Caerano e Vittorio, 1861; Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!)

1075 V. scutellata L. Agg. p. 27 (2955. 1772)
I Idrofila, palustre. Paludi presso Roncade, copiosa, 1866.

1074 V. montana L. Agg. p. 27 (2956. 1606)
IV Nemofila, eliofoba. Bosco Cansiglio (Bérenger 1847!)

1075 V. aphylla L. Agg. p. 27 (2957. 1532)
IV. Pascoliva, sassicola. Cansiglio, 1869 (anche Béreng. 1839!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. n. 13); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Spranzi!, Cobau 1906!)

1076 V. spicata L. Prosp. p. 99 (2959. 1550)
I – III. Pratense, pascoliva, ~~xenofila~~. Selva, Camalò, Volpago, Susegana, Cornuda, Vittorio.... 1859–61; San Martino e Crespan (Zanard. 1827!); Tamai (Contarini 1825!); Fagaré pr. Cornuda (Trotter, 1906!); Collalti (Dom. Montini, 1872!) – Var. Barrelieri (Schott). Nei colli herigiani, dove il tipo – Var. polystachya Sacc. Prosp. p. 99. Montello e colli, 1862; Montagna grande presso Asolo (Bolz. MS.) – Var. major Rchb. Montagna grande pr. Asolo (Bolz. MS.)

1077 V. fruticulosa L. Agg. p. 27. (2960. 1754)
III – IV. Rupicola. Col Vicentin (Contarini, 1825!, Pamp. in Bolz. n. 13); M. Cesen di Valdobbiadene (Béreng. 1844!); mont. di Valdobbiadene (Favero 1843, Bolzon, n. 23); M. Oro (Bolz. n. 13); Collalti (Dom. Montini, 1872!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Zanard. 1827!) – Var. fruticans (Jacq.) (1595), Agg. p. 27 (V. saxatilis Scop.). Grappa (Parolini, Spranzi!, Bolz. MS.); Cansiglio (Bérenger, 1839!).

1078 V. serpyllifolia L. Prosp. p. 99 (2962. 1563)
I – IV. Pratense, igrofila. Selva, Camalò, Vittorio... dal 1861; Cansiglio 1869; Grappa (Vacc. n. 64, Cobau 1906!); Col Vicentin (Bolz. n. 12) – Var. borealis Laest. Grappa (Parolini in Bertol., Montini)

1079 V. bellidioides L. Agg. p. 27 (2963. 1785)
IV. Pascoliva. Mont. presso il Cansiglio (Béreng. 1839!, Sacc. 1869!); Grappa (Vaccari n. 64, Dom. Montini 1872!)

1080 V. alpina L. Agg. p. 27 (2964. 1755)
IV. Pascoliva sassicola. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vaccari n. 64, Sprangi!)

1081 V. acinifolia L. Prosp. p. 99 (2965. 1697)
I – III. Campestre, pratense. Selva, Volpago, Camalò ... 1859; Santa Bona (Béreng. 1838!)

1082 V. arvensis L. Prosp. p. 99 (2965. 1551)
I – III. Campestre, ortiva. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso (anche Béreng. 1838!) ... dal 1860; Cà Tron (Diratz 1915!); Fagarè, Zenson (Bég. 1909!)

A V. peregrina L. Agg. p. 27 (2969. 1753)
I – III. Ortiva. Originaria dall'America merid., ma qua e là subspontanea in Italia fino dal tempo di Linneo. ~~Pr~~ Valdobbiadene (Béreng., 1846!)

1083 V. triphyllos L. Prosp. p. 99 (2970. 1745)
I – III. Campestre, arenicola. Selva, Volpago ... dal 1859; Treviso (Béreng., 1838!)

1084 V. persica Poir. Prosp. p. 99 (V. Buxbaumii Ten.) [V. Tournefortii Gm., V. filiformis DC.] (2972. 1550)
I – IV. Campestre, ortiva, domofila. Tutta la provincia: Selva, Camalò, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1858; Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Romano (Dom. Montini 1872!); Resana, Castelfranco, Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.); Grappa (Vacc. n. 64) – Vulgo: Oci de la Madona.

1085 V. agrestis L. Prosp. p. 99 (2973. 1701)
I – IV. Campestre, ortiva, murale, domofila. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1859 – Var. didyma Ten. Prosp. p. 99, c. specie. Qua e là non vara come Selva, Volpago ... dal 1867; Mogliano (Mayer in Bertoloni); alveo del Piave (Minio, n. 35) – Vulgo: Oci de la Madona.

1086 V. hederifolia L. Prosp. p. 99 (2974. 1563)
I – III. Campestre, murale, domofila, ortiva. Selva, Valpago, Conegliano, Vittorio ... dal 1858; Mogliano (Mayer in Bertoloni); Asolo, al Foresto nuovo (Bolz. n. 11).

1087 V. Cymbalaria Bodard. Agg. p. 27 (2975. 1802)
I Campestre. Mogliano (Mayer in herb. Parolini!)

Digitalis (Tourn.) L.

C D. purpurea L. Prosp. p. 98 (2979. 1561)
I – III. Spontanea in Sardegna, Corsica ed Europa occid. Coltivata qua e là come a Caerano, 1861.

1088 D. ambigua Murr. Prosp. p. 98 (D. grandiflora Lam.) (2980. 1532)
II – IV. Nemofila, igrofila, rupicola. Montello verso il Piave e nelle vallate, Cornuda, Valdobbiadene (anche Favero 1843!), Covolo ... dal 1861; colli di Asolo e Grappa (Bolz. n. 11); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Bizz. 1878!); Col Vicentin, Cansiglio e S. Pietro di Feletto (Pamp. n. 44) — Var. obtusiloba Rchb. Collalti e presso Segusino (Bolz. MS.)

1089 D. media Roth (D. ambigua × lutea G. Mey.) (2981 B. 1853). II – III Asolo presso la cima di San Martino (Bolz. MS.). La D. lutea non è stata ancora indicata in provincia.

Melampyrum (Tourn.) Linn.

1090 M. cristatum L. (2984. 1551)
I – III Sepincolo, nemofilo. Presso Treviso! (Kellner 1840!) — Var. angustissimum Bolz. Colli sopra Maser e bosco Fagarè presso Cornuda (Bolz. n. 19 e 23). La località del tipo è da confermarsi.

R M. arvense L. Prosp. p. 100 (2987. 1552)
I – III. Campestre, segetale. È assai probabile la sua esistenza in provincia, ma gli esemplari indicati per Selva l.c. spettano a M. barbatum W. K.

1091 M. barbatum W. K. Prosp. p. 100 (2986. 1817)
I – III Marginale, ~~ripario~~, ruderale. Preganziol lungo la via ferrata, 1866; Selva, 1859; Mogliano (Mayer in Bertol.); Treviso (Bérenger, 1837!).

1092 M. nemorosum L. Prosp. p. 100 (2987. 1532)
II – III. Nemofilo, dumale, sepincolo. Selva, Volpago, Montello dove è copioso, Cornuda, Vittorio .... dal 1862; bosco di Fagarè (Trott. 1906!); Pederobba (Bég. 1909!); Grappa (Bolz. MS.) – qui Var. angustifolium De Not. Alveo del Piave (Minio n. 35) – Vulgo: Culnegro.

1093 M. pratense L. Prosp. p. 100 (2987 β, 1595)
II – III. Nemofilo, sepincolo, pratense. Copioso nel Montello, dal 1860; Pederobba (Bég. 1909!); Collalti (D. Montini 1872!). Vulgo Culnegro. Nel Montello di solito forma sciami separati da quelli del precedente – Var. angustifolium Wk. et Lange. Montello, 1871.

Euphrasia Linn.

1094 E. Salisburgensis Funk. Prosp. p. 101. (2990. 1697)
II – IV. Pascoliva, arenicola. Colle di S. Paolo a Vittorio e San Boldo (Trotter 1906-1914); Fadalto (Béreng. 1840!); alveo del Piave (anche Bizz. 1881!) e del lago Morto 1867; Serravalle 1870 – Var. minuta Gremli. Grappa col tipo (Bizz. 1878!, Spranzi! Montini, Bolzon MS.) – Var illyrica (Wettst.) S. Boldo (Pamp. in Bolz. MS.)

1095 E. tricuspidata L. Prosp. p. 101 (2991. 1532)
III – IV. Rupicola, arenicola. Monti sopra Follina (Béreng. 1843!); Bosco Cansiglio (Fracchia!); Grappa (Spranzi!, Bolz. MS., Art. Rossi in herb. Bizz. 1880!) – Var. cuspidata (Host) Piai presso Vittorio (Pamp. in Vacc. Pl. ital. cr. exs. n. 91b); San Boldo (Pamp.) – fm integrifolia Vis. e Sacc. Grappa (Bizz. 1880! Vaccari n. 64)

1096 E. officinalis L. Prosp. p. 101 (2992. 1532)
I – IV. Pratense, pascoliva, nemofila, marginale. Selva, Montello, Vittorio, Cornuda.... dal 1861; Serravalle (Contarini 1825 e Béreng. 1842); Cansiglio, 1869; Collalti (Dom. Montini, 1872!); Grappa (Spranzi! Vacc. n. 64, Ant. Sauardo 1884!) Resana, Ponte di Piave (Bég. 1909!)
– Var. brevipila Burn. et Gremli, fm. tenuis Ch. Prati di Agnelezza del M. Pizzoc a 900 m. (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 339!) – Var. versicolor (A. Kern.) Fra S. Boldo e Col di Moi a 1150 m. (Pamp. in Vacc. Pl. it. cr. n. 92!) – Var. hirtella Jord. Pederobba verso Feuer (Bég. 1909!) – Var. flava (Gremli). Grappa (Bolz. MS.) – Var. pectinata Ten. M. Pizzoc nel luogo detto Loc (Trotter 1915!)

1097 E. alpina Lam. var. Rostkoviana (Hayne) (2993 δ. 1697 ~~1844~~)
IV Pascoliva. Grappa (Cobau 1905!) – Var. Kerneri Wettst. (2993 γ. 1849) S. Pietro di Feletto, Piai, Somera, Cozzuolo (Pamp. in Vacc. Pl. ital. cr. exs. n. 80, 80a, 80b, 80c).

Bartsia Linn.
1098 B. alpina L. Agg. p. 29 (2994. 1595)
III – IV. Pascoliva, igrofila. Bosco Cansiglio 1869 (anche Béreng 1841!); Grappa (Bizzoz. 1878! Spranzi!)

Odontites (Hall.) Linn.
1099 O. lutea (L.) Rchb. Prosp. p. 101 (Euphrasia lutea L.) (3000. 1553)
II – III. Pascolivo. Colfosco, Pederobba 1861; Tamai ai confini col Coneglianose (Contarini 1825!); Monfenera (Bolz. MS.); S. Pietro di Feletto (Pamp. in Bolz. MS.)

1100 O. serotina (Lam.) Dum. Prosp. p. 101 (Euphrasia Odontites L.) (3002. 1583)
I – III. Campestre, riparia, alveale. Selva, Belvedere e lungo la Brentella... dal 1861; alveo del Piave lungo il Montello e a Nervesa 1871 (anche Bizzoz. 1881!); Mogliano (Mayer in Bertol.) – Var. divergens (Jord.) Letto del Piave a Covolo (Bolz. MS.) – Var. minor Bolz. San Boldo sopra Trichiana (Bolz. MS.)

1101 O. verna (Bellard.) Dum. Prosp. p. 101 (Euphrasia verna Bell.) (3002 β. 1790)
II. Campestre, segetale. Fra le biadè a Selva e Conegliano rara 1861-63; Ponte di Piave e Zenson di Piave (Bég. 1909!)

Rhinanthus Linn. ex p.

1102 Rh. Alectorolophus (Scop.) Poll. Pal. p. 29 (3005. 1551)
III-III. Pascolivo, pratense. Rodo sul colle S. Martino (Roly. MS.) di Alba-ve (Montjac) — Var. Jeyneii (Sternb.) Colle intorno Vittorio, 1903-1907 ined.; sopra a Revine-Lago (Pamp. in Vaccari Pl. it. cr. exs. n. 112 e 112c); Bosco Cansiglio (Erb. Trav. loc. flora anal.) — Var. Sterneckii (Wettst.). Sopra il passo di San Boldo (Roly. MS.)

1103 Rh. Helenae Chab. 1907. Cfr. Pamp. l. infra cit.
III-IV. Pascolivo, pratense. Fra S. Boldo e il Col de Moi, alt. 1150 (Pamp. in Vacc. Pl. it. cr. exs. n. 113 sub Alectorolopho)

1104 Rh. major Ehrh. Prosp. p. 101 (3006. 1726. R)
I-IV. Pratense, pascolivo. Selva, Bavaria, Camalò, Mostiano (anche Mayer in Bertol.), Vittorio .... dal 1861; Cà Tron (Dalla Torre, 1915!); Cansiglio (Dom. Sacc. a n. 1200, 1897!); Grappa (Zanardini, 1827!); Castelfranco, Sedarotta, Resana, Ponte di Piave, Zenson, Salgareda (Bég. 1909!) — Varia nella forma e incisione delle brattee e nella larghezza delle foglie, ma sembra impossibile fissare delle varietà — Volgo Cantarela e così i seg.

1105 Rh. minor Ehrh. Prosp. p. 100 (3008. 1551) (anche Hellmar, 1844!)
II-IV. Pratense, campestre. Selva, Nervesa, Vittorio ... dal 1862, spesso frammisto al R. major; Cansiglio (Mari n. 33); Resana, Ponte di Piave (Bég. 1909!).

1106 Rh. angustifolius Gm. Prosp. p. 100 (come var.) (3007. 1822)
II-IV. Selva, Pratense, pascolivo. Selva, Nervesa, Vittorio ... dal 1861, per lo più a siami separati; Val Sottiadene (Favero, 1844!); Grappa alla Ardosetta (Roly. MS.)

1107 Rh. Pampaninii Chab. (3007 d. 1905)
III – IV. Pratense. Passo di S. Boldo e Cozzuolo insieme ad un ibrido (Rh. Freynii × Pampaninii?) (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 155! et in Vacc. Pl. ital. cr. exs. n. 118)

Pedicularis (Tourn.) Linn.

1108 P. verticillata L. Agg. p. 28 (3010. 1726)
IV. Nemofila, igrofila. Cansiglio nelle abetine, 1869 (anche Bérenger 1838! e Mari n. 33); e Bég. Fl. it. exs. n. 2149!
Grappa (Spranzi!); Collalti (Dom. Montini 1871!);

1109 P. tuberosa L. Agg. p. 28 (3011. 1707)
IV. Pascoliva, pratense, sopra Miane (Fracchia!), monti di Valdobbiadene (Béreng. 1846!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Bizzoz. 1878!, Cobau, 1906!, Parolini e Montini herb., Dom. Montini 1872!) – Var. minor Ten. Grappa in Val Melin (Bolz. MS.) – Var. hirsuta Stein. Vertice di M. Grappa (Ball. Cfr G. Bonati in Bull. Soc. bot. Genève, V (1913) p. 201).

1110 P. rostrata L. Agg. p. 28. (3014. 1713) (= P. rhaetica Kern. sec. Stadlmann)
IV. Pascoliva, igrofila. Grappa (Parolini, Montini, Spranzi! sec. determ. di Stadlmann

1111 P. gyroflexa Vill. Prosp. p. 100 (3015. 1595)
IV. Pascoliva, igrofila. Monti sopra Follina e Valdobbiadene (Béreng. 1839. 1843!)

1112 P. palustris L. Prosp. p. 100 (3016. 1768)
I – II. Palustre, idrofila. Quinto, 1863; Canizzan (Fracchia!); Treviso nelle fosse (Pamp. in Fl. ital. exs. n. 345!); lungo il Piave a Nervesa, 1866. Bérenger 1837!,

1113 P. silvatica L. Agg. p. 29 (3017. 1713)
IV Nemofila, igrofila. Grappa (Spranzi!)

1114 P. comosa L. Agg. p. 29. (3018. 1415)
IV Pascoliva, pratense. M. Croce sopra Serravalle (Stur, n. 61). Da confermarsi la località.

1114 P. foliosa L. Var. summana (Spr.) (3021 β. 1756)
IV. Pascoliva, pratense. M. Grappa (Kellner, 1845!)

Fam. 96 Orobanchaceae

Kopsia Dum.

1115 K. ramosa (L.) Dum. Agg. p. 28 (Orobanche ramosa L.) (3025. 1550)
II–III. Campestre. Sulle radici di Nicotiana a S. Nazario e Campolongo (Montini!); su radici di Cirsium arvense nei campi di granoturco presso Revine-Lagò (Bérenger 1843!) – Vulgo: Solfari, Erba lupa (nel Canal di Brenta, sec. Coban)

Orobanche (Tourn.) Linn.

1116 O. caryophyllacea Sm. Prosp. p. 100. (3034. 1808)
I–III. Campestre. Campi a S. Palè (Pelagio) (Venturi 1863!); radici di Galium purpureum a Valdobbiadene (Béreng. 1846!).

1117 O. gracilis Sm. Prosp. p. 100 (O. cruenta Bertol.) (3037. 1550)
II–IV. Pratense, nemofila. Montello (anche Bizz. 1881!), Selva, Bavaria sulle radici di Lotus corniculatus ecc. ... dal 1862; sul Dorycnium a Conegliano (Béreng. 1842!); Cansiglio (Dom. Saccardo, 1897!, Mari, n. 33); M. Crep (Bérenger, 1843!) Grappa su Lotus (Bizz. 1878!) – Var. citrina (Coss. et Germ.) Prati presso il Ponte Priula pr. Nervesa, 1866. – Vulgo: Tetavache.

1118 O. alba Steph. Prosp. p. 100 (O. Epithymum DC.) (3040. 1818)
IV. Rupestre. M. Grappa sui Thymus (Montini in Bert.); Conegliano (Béreng. 1842!)

1119 O. cruenta Forsk. (non Bertol.) Agg. p. 28 (O. congesta Rchb. fil.) (3042. 1696)
III. Pratense. Sui Trifolium presso Serravalle (Venturi in Rchb. Iconograph.); Asolo e Monfumo (Bolz. n. 10). Il Bolzon mi scrive che bisogna confermare quest'ultimo reperto, non conservandone più i saggi in erbario.

1120 O. Rapum-Genistae Thuill. Prosp. p. 99 (3049. 1827)
II. Remofila. Sui Cytisus e Genista nel Montello dal 1861. – Vulgo Tetavache.

1121 O. minor Sutton Prosp. p. 100 (3053. 1563)
I. Campestre. Sulle radici di varie piante nel Trevigiano (Mayer in Bertol. ¡G. Venturi!)

1122 O. Hederae Duby. Agg. p. 28 (3055. 1819)
III. Sepincola, domofila. Sulle radici di Hedera appiè dei muri a Serravalle 1870, e Costa di Vittorio 1910.

Lathraea Linn.

1123 L. Squamaria L. ~~Prosp.~~ Agg. p. 28 (3059. 1664)
III. Sepincola, riparia. Costa di Vittorio, rara (G.B. Zava 1865!); rocca d'Asolo e colle S. Martino d'Asolo (Bolz. n. 10-11); Caselle d'Asolo, riparia (Aless. Trotter, 1907!); colle di S. Martino di Ceneda sulle radici dei pioppi (Pamp. n. 44); Mussolente ai confini del Trevigiano (Gio. Montini ed in herb. Kellner!)

Fam. 97 Bignoniaceae

Catalpa Scop.

CA C. bignonioides Walt. Prosp. p. 108 (Catalpa syringaefolia Sims) (3061. 1633)
I – III. Dell'America Sett. Coltivata qua e là nei boschetti e ambulacri e talora avventizia, come a Selva, Conegliano... dal 1861. Vulgo: Catalpa

Tecoma Juss.

C T. radicans (L.) Juss. (3062. 1633)
I – III. Dell'America Sett. Coltivata frequentemente per ornare le muraglie e di rado sporadica, come a Selva, Vittorio, Conegliano, Treviso... dal 1863. Vulgo Bignonia.

Fam. 98 Labiatae

Ajuga Linn.

1124 A. reptans L. Prosp. p. 107 (3064. 1415)
I–III. Pratense, marginale, campestre. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; Cà Tron (Diratz 1915!); Asolo (Bolz. MS.) ♀
Var. rosea Frori. Col tipo, ma assai più rara, come a Selva... 1861 –
Var. albiflora Zersi. Costa di Vittorio rarissima, 1867; Cà Tron (Diratz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.) – Var. alpina (Vill.) Cansiglio (Béreng. 1838!); Grappa (Montini, Bolz. MS.)

♀ Volgo: Brusadiaol, Erba da tagi.

1125 A. genevensis L. Prosp. p. 107 (3066. 1550)
II–IV. Nemofila, pascoliva. Montello, rara, dal 1859; Asolo (Frori 1897!, Bolz. 1895! e n. 10); colli di Vittorio, 1870; Monfumo (Bolz. MS.); Pederobba (Bég. 1909!) – Var. rosea Sacc. Vittorio nei prati collini, 1903 – Var. grossidens Briq. Colle di S. Martino di Asolo (Bolz. MS.) – Var. elatior Fr. (= var. longebracteata Bizz.). Asolo (Bolz. n. 21.)

R. A. pyramidalis L. (non Prosp. p. 107) (3067. 1768)
IV. Pascoliva, pratense. È assai probabile che si incontri nelle prealpi trevigiane, ma ~~nelle~~ gli esemplari citati di Selva e Camalò sono di forme di A. genevensis.

1126 A. chamaepitys Schreb. Prosp. p. 107 (3069. 1415)
I–II. Campestre, marginale, xerofila. Lungo le vie a Trevignano, assai rara, 1860.

Teucrium Linn.

1127 T. Botrys L. Prosp. p. 107 (3078. 1532)
II–III. Ruderale, alveale, arenicolo. Alveo del Piave a Corolo 1861; via Cavallotti a Vittorio, 1909; Savazza fuori Serravalle (Contarini 1825!); Fais e sponde del Lago Morto (Pamp. n. 44); Valdobbiadene 1870 (anche Fracchia!); Pederobba (Bég. 1909!)

R. T. scorodonia L. non Prosp. p. 107 (3072. 1532)
II–III. Sassicola, ruderale. È probabile non manchi nell'agro trevigiano, ma gli esemplari citati di Corolo rispondono ~~ad esemplari~~ a uno stato abnorme, sterile di Stachys recta.

1128 T. Scordium L. Agg. p. 29 (3079. 1532. R)
III. Palustre, lacustre. Laghetti di Brevine, 1866.; fossi di Orsago di Conegliano (Pamp. n 44)

1129 T. Chamaedrys L. Prosp. p. 107 (3082. 1415. R)
I-IV. Marginale, rupestre, murale. Selva, Camalò, Paderno, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Faìs di Serravalle (Contarini 1825!); Grappa, Borso, Segusino (Bolz. MS.); Pederobba (Bèg. 1909!). Volgo. Erba dela Madona.

1130 T. montanum L. Prosp. p. 108 (3085. 1551)
II-IV. Rupestre, marginale, xerofilo, alveale. Nervesa e Falzè al Piave Vittorio, Pederobba (anche Bèg. 1909!).... dal 1861; Monfenera (Bizz. 1879!); Valdobbiadene (Favero, 1844!); Faìs, Savazza, Castello S. Martino di Ceneda (Contarini, 1825!); Asolo (Zanardini 1827!) — Var. supinum (L.). Non lung. da Treviso (Bèreng. 1840!); Grappa (Bolz. MS.) — Var longifolium (Rota) Asolo al Colle S. Martino (Bolz. MS.)

Rosmarinus (Tourn.) Linn.
C R. officinalis L. Prosp. p. 102 (3086. 1415. R)
I-III. Spontaneo nel litorale mediterraneo. Coltivato ovunque e quasi naturalizzato. Volgo: Osmarin

Scutellaria Linn.
1131 S. galericulata L. Prosp. p. 107 (3091. 1583)
I-IV. Riparia, igrofila, sepincola. Selva, Volpago, Nervesa, Montello, Treviso (anche Bèreng. 1837!), Conegliano.... dal 1861; laghetti fuori Serravalle 1870; Castello di S. Martino e S. Giacomo di Vittorio (Pamp. n 44)

Lavandula Linn.
C L. Spica L. Prosp. p. 101 (Lavand. vera DC) (3095. 1415)
I-III. Spontanea in più luoghi rocciosi caldi d'Italia. Coltivata qua e là in provincia, come a Treviso, Selva... dal 1862. Volgo Lavanda,

Marrubium Linn.

1122 M. vulgare L. Prosp. p. 106. (3098. 1415)
I–II. Ruderale, domofilo. Treviso (Fracchia!) Non ritrovato recentemente

Dracocephalum Linn.

C. D. Moldavica L. (3108 A. 1571)
II–III. D'origine asiatica. Coltivato qua e là ~~come~~ e talora sporadico come nei dintorni del Grappa (Zanardini, 1827!) – Vulgo: Melissa turca. È coltivata tuttora nel Padovano per l'estrazione dell'essenza, che passa per Melissa.

C. D. virginianum L. (3108 B. 1694)
I–III. Dell'America Sett. e Messico. Coltivata qua e là per ornamento e di rado sporadico, come a Caerano .... 1866.

Nepeta Linn.

1123 N. Cataria L. Prosp. p. 104 (3113. 1415)
I–IV. Ruderale, sepincola, dumale. Selva, Paderno, Cavalò, Vittorio ... dal 1861; Conegliano (Béreng. 1845!); Pederobba (Favero 1844, Bég. 1909!); Asolo, Pagnano (Bolz. n. 10, 11), Conegliano e Negrisiola di Vittorio (Pamp. n. 44); alveo del Piave (Minio n. 35!); Faìs (Contarini, 1825!) – Vulgo: Erba gata.

1124 N. nuda Jacq. Agg. p. 29. (3112 β, 1532)
IV. Nemofila, dumale. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64), Valle Scalarè e M. Muschiè del Grappa (Bolz. MS.); Grappa e Collalt. (Dom. Montrin, 1872!) – Secondo la Fl. anal. è rappresentata dalla var. pannonica (Jacq.)

Glechoma Linn.

1125 G. hederacea L. Prosp. p. 104 (3117. 1415)
I–IV – Sepincola, marginale, pratense. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860; Cà Tron (Diratz. 1915!) – Var. major Gaud. Qua e là come ad Asolo (Bolz. MS.) – Var. pubescens Ces. herb. (~~an~~ vix G. hirsuta W. K.). ~~Xerofila~~ Nei luoghi più assolati a Selva, Vittorio, Asolo .... (anche Bolz. MS.) – Var. minor Sacc. Cà Tron (Diratz. 1915!) – Vulgo: Erba torondela.

(Omnibus partibus minor

Brunella (Tourn.) Linn.

1136 B. vulgaris L. Prosp. p. 107 (3120. 1415)

I – IV. Pratense, pascoliva, marginale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano (anche Béreng, 1842!), Vittorio, Treviso .... dal 1861; Mogliano (Montini!); Ca' Tron (Dratz., 1915!); Cansiglio (anche Dom. Sauardo, 1897!) Pederobba, Ponte di Piave, Castelfranco, Godego (Bég. 1909!); Colle Umberto ~~[illegible]~~ (fm. recta, glabrescens, Pamp. n. 43 e in Vacc. Pl. it. orit. exs. n. 127!) – Var. laciniata (L.) Prosp. p. 107 c. spec. (3120 β. 1550). Montello, Selva, Camalò, Mogliano (anche Mayer in Bertol.), Vittorio, Valdobbiadene, Colfosco .... dal 1861; Masèr (Bolzon ms.); Resana (Bég. 1909!) – Var. subintegra Hausm. (P. alba Mult.). Pederobba (Bég. 1909!) – Var. intermedia Lk (P. pinnatifida Pers.) (3120 A. 1822). Montello, rara, 1861 – Vulgo: Erba Brunela.

1137 B. grandiflora Jacq. Prosp. p. 107 (3120 γ. 1713)

II – IV. Pascoliva, xerofila. Cornuda, Pederobba (anche Bég. 1909!), Montello verso il Piave .... dal 1861; Asolo e Grappa (Bolz. ms.); alveo del Piave, comune (anche Minio, n. 35); Collalt. (Dom. Montini, 1872!) – Var. pinnatifida (Gaud.) Collalt. (Dom. Montini 1872!)

Melittis Linn.

1138 M. Melissophyllum L. Prosp. p. 104 (3121. 1550)

I – IV. Nemofilo, sepincola, dumale. Montello, copiosam., Selva, Paderno, Ponzano (eterotopica?), Vittorio (anche E. De Toni in Pamp.); colli Asolani (Mayer in Bertol.); colle S. Martino ~~[illegible]~~ (Contarin. 1825!); Asolo, Castelli, Masèr, Boscon (Bolz. n. 11); Pederobba (Bég. 1909!). Nel Montello, nell'Asolano ecc. prevale la fm. albiflora (Var. albida Guss.)

Galeopsis Linn.

1139 G. Tetrahit L. Prosp. p. 105 (3126. 1550)

II – IV. Ruderale, ortiva. Montello (anche Bér. 1837!); Vittorio (anche D. Sacc. 1890!) Cansiglio 1867 (anche Mari n. 33); Asolo (Zanard. 1825!); Grappa al Cason del Sol (Bizz. 1878!) – Var. parviflora Pollini. Grappa (Montini in Bertol.)

Var. speciosa (Mill.) (3126 g. 1802) ~~I–IV~~. Prosp. p. 105 (G. versicolor Curt.) (anche Bizzoz. 1881! Kell. n. 1844!) Riparia, sepincola, nemofila. Selva, Montello, Cornuda, Treviso, Vittorio ... dal 1861; Grappa (Contarini, 1825 [fm. pusilla], Vacc. n. 64, Sternb. 1803, n. 59); Collalti (Dom. Montini, 1872!) — Varia a caule più o meno peloso-ghiandoloso e a fiori giallastri o porporini.

1140 G. Ladanum Linn. Prosp. p. 105 (3128. 1550)
I–IV. Ruderale, campestre. Selva, Camalò, Valdobbiadene, Covolo, Cornuda, Treviso.... dal 1861; Crespano (Montini in Bertol.); Cà Tron (Dirals. 1915!); ~~alveo del Piave (Contarini 1825!)~~; Asolo, Borso, Covolo (Bolz. n. 10.11) — Per lo più è la fm. intermedia Vill. (= latifolia Hoffm.) — Var. angustifolia (Ehrh.) Alveale in quasi tutto il letto del Piave e del Meschio 1861 (anche Contarini 1825!, Dom. Sacc. 1892!, Minio, n. 35, Beg. 1909!)

Lamium Linn.

1141 L. Orvala L. Prosp. p. 105 (3129. 1552)
I–III. Sepincolo, nemofilo. Selva, Volpago, Montello, Vittorio, Nervesa ... dal 1861; Feletto e lungo il Pioveson a Lago (Pamp. n. 36); Asolo (Bolz. MS.); alveo del Piave (anche Minio n. 35); Cà Tron (Dirals. 1915!) — Var. albiflorum Sacc. Selva, varo 1868; Asolo al Foresto nuovo (Bolz. MS.); Laghetti di Revine (Pamp. n. 44).

1142 L. amplexicaule L. Prosp. p. 105 (3133. 1583)
I–III. Ortivo, campestre. Nervesa, Cusignana, S. Artièn (Artemio) presso Treviso, 1863; Cà Tron (Dirals., 1915!)

1143 L. purpureum L. Prosp. p. 105 (3135. 1552)
I–IV. Campestre, domofilo, ortivo. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1862; Grappa (Vacc. n. 64); Cà Tron (1915!)

1144 L. Galeobdolon (L.) Crantz. Prosp. p. 105 (Galeobdolon luteum Hudt.) (3130. 1550)
II–III. Nemofilo, eliofobo. Montello, Vittorio, Cornuda ... dal 1861; Faìs (Contarini 1825!); Cà Tron [eterotopico?] (Fiori 1896!); Asolo, Monfumo, Castelli (Bolz. n. 11); Grappa (Bizz. 1878!); Monfenera (Art. Rossi, 1879!) Cansiglio (anche Dom. Saccardo a m. 1200, 1897!); Pederobba (Bég. 1909!) — Var. albifolium Bolz. foliis superne albo-argenteis. Monfumo (Bolz. n. 11); Follina (Pamp. n. 44)

1145 L. album L. Prosp. p. 105 (3136. 1552)
I–IV. Ruderale, ortivo, domofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Cornuda .... dal 1859; Cà Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave (Bég. 1909!); Asolo, Borso, Grappa (Bolz. Ms.) — Var. acutifolium Bolz. Presso Castelfranco (Bolz. Ms. Vulgo: Ortiga mata

R L. maculatum L. Prosp. p. 105. (3137. 1561)
I–III. Ruderale, sepincolo, ortivo. Serravalle (Contarini 1825?). Benchè la specie è detta volgare in quasi tutto il Veneto, pel Trevigiano deve essere confermata; giacchè gli esemplari finora veduti spettano a forme del precedente.

Leonurus Linn.

1146 L. Cardiaca L. Prosp. p. 107 (3138. 1415)
I–III. Ruderale, sassicolo. Conegliano, Susegana presso il Castello S. Salvatore, Biadene, non comune ... dal 1860.

1147 L. Marrubiastrum L. Prosp. p. 107 (Chaiturus Marrubiastrum Rchb.) (3139. 1697)
I–II Ruderale, domofilo. Nervesa, via che conduce al Montello 1861 (anche Fracchia!); Selva presso la casa Marchi 1905; Orsago (Pampanini in Bolz. n. 12).

Ballota Linn.

1148 B. nigra L. Prosp. 106 (3142. 1550)
I–III. Ruderale, sepincola, domofila. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Asolo (Bolz. n. 23); Castelfranco (Bég. 1909!). Per lo più è la fm. borealis — Var. alba (L.) Qua e là più di rado.

Stachys Linn.

1149 S. (Betonica) officinalis (L.) Trev. Prosp. p. 106. (3146. 1532)
I – III. Nemofila, pratense, marginale. Quasi tutta la provincia. Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso (.. dal 1861); Cansiglio (anche Dom. Sau. 1897!); Resana, Castelfranco, Pederobba (Bég. 1909!); Grappa (C. Mass. 1877!) – Var. glabrata Koch. Prosp. p. 106. Qua e là, igrofila.. 1861 – var. albiflora Sau. Prosp. p. 106. Montello, rara 1861 (anche Dom. Sacc. 1890!) – Var. latifolia Koch Grappa e colli d'Asolo (Bolz. MS.) – Var. hirta (Rchb.). Grappa e colli Asolani (Bolz. MS.) – Vulgo: Betonega (ma pochi del contado la distinguono.

1150 S. (Betonica) Alopecuros (L.) Benth. Prosp. p. 106 (3147. 1697)
IV. Nemofila, pascoliva. Sopra Serravalle 1870; Cansiglio 1869 (anche D. Sacc. 1897, Mavi n. 33); M. Pizzoc al luogo detto Loc a 700-800 m. (Trott. 1914!); Palantina (Béreng. 1838!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bert., Bizzoz. 1878!, Cobau, 1906!, Ant. Saccardo, 1883!); Collalt. (Dom. Montini, 1871!); M. Endimione (Bolz. in Pamp. n. 44)

1151 S. germanica L. Prosp. p. 106 (3148. 1415)
I – III. Ruderale, marginale. Selva lungo lo stradone del Montello, 1858, Camalò. S. Palè (Pelagio); entro il Montello (anche Bizz. 1872!); Osago presso Conegliano (Pampanini in Bolz. MS.)

1152 S. alpina L. Prosp. p. 106 (3151. 1532)
IV. Nemofila, dumale. Grappa (Montini in Bertol., Zanardini 1827!); appiè dei monti sopra Pederobba (Bég. 1909!)

1153 S. palustris L. Prosp. p. 106 (3152. 1532)
I – III. Riparia, idrofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Volpago, Conegliano, Vittorio, Treviso (anche Trotter 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!); alveo del Piave (anche Minio, n. 35) – Var. ambigua (Smith). Resana (Bég. 1909!). Passa insensibilmente al tipo.

1154 S. silvatica L. Prosp. p. 106 (3153. 1551)
I–IV. Sepincola, riparia, nemofila. Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!); Ponte di Piave, Zenson, Castel di Godego, Castelfranco (Bég. 1909!); Grappa (Bolz. MS.) — Var. pubescens Grogn. Asolo (Bolzon MS.)

1155 S. annua L. Prosp. p. 106 (3158. 1551)
I–II. Ruderale, sassicola. Selva rara nelle sassaje 1861; presso Vittorio (Dom. Saccardo, 1890!)

1156 S. recta L. Prosp. p. 106 (3161. 1550)
I–IV. Pratense, dumale, sepincola. Vittorio, Cornuda, Valdobbiadene, Falzè, Susegana ... dal 1861; Conegliano (anche Bereng. 1841!); Pederobba (Bég. 1909!) Varia più o meno irsuta e a foglie più o meno ottuse e più o meno larghe — Var. labiosa Bert. Cornuda 1870; Grappa (Montini, Vacc. n. 64) — Var. major Ten. Grappa allo Scalarè e Boccaor (Bolz. MS.) — Vulgo: Erba de la Madona.

Horminum (Tourn.) Linn.

1157 H. pyrenaicum L. Prosp. p. 104. (3164. 1595)
IV. Pratense, pascolivo, xerofilo. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montin. in Bertol., Cobau, 1906!, Bolz. MS.); Cansiglio, 1869; Valdobbiadene (Favero 1844!); sopra Follina, S. Boldo, Col Vicentin (Pamp. n. 38) — Var. majus Bolz. Grappa e Punta Brental sopra Cavaso (Bolz. MS.)

Salvia Linn.

C/A S. officinalis L. Prosp. p. 102 (3165. 1415. R)
I–III. Spontanea nelle regioni merid. d'Italia. Coltivata dovunque e spesso subspontanea come a Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1861. Vulgo: Salvià, Salvia da osolati.

1158 S. glutinosa L. Prosp. p. 102 (3172. 1415)
I–III. Nemofila, sepincola, eliofoba. Montello (anche Bizz. 1872!), Selva, Giavera, Vittorio ... dal 1861; Campo di Borso sul Grappa (Sternb. 1803, n. 59); Asolo nel colle S. Martino (Zanardini, 1827!, Bolz. MS.); Alveo del Piave (anche Minio n. 35)

1159 S. pratensis L. Prosp. p. 103 (3175. 1415)
I–IV. Pratense, marginale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Cornuda ..... dal 1858; Ca' Tron (Dralz. 1915!); Valdobbiadene (anche Bereng. 1846!); alveo del Piave (anche Minio, n. 35); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!) — Var. vulgaris Rchb. fil.: Selva, 1910 — Var. rosea Moric. Selva, 1862, rara; Treviso (Bereng. 1845!); Valdobbiadene, 1870; laghetti di Revine (Pamp. n. 44) — Var. albiflora Sacc. Prosp. p. 103. Biadene, varissima, 1862; Corbanese (Pamp. n. 36) — Var. caeruleo-alba Sacc. Vittorio, 1903 — Var. roseo-caerulea Pamp. in De Toni n. 29. Vittorio (Pamp.) — Var. Sauardiana Pamp. in Fl. it. exs. n. 160 (e in Vacc. Pl. it. or. exs. n. 95) al Passo di S. Boldo (Pamp.) — Var. eglandulosa Bolz. Grappa (Bolz. MS.) — Sulle mura di Treviso fu rinvenuta una fm. xerofila, diminutiva (Bég. 1909!)

1160 S. verticillata L. Prosp. p. 103 (3177. 1698)
I–III. Ruderale, sassicola, alveale. Nervesa, Covolo, Cornuda, Vittorio ... dal 1861; Conegliano e a Faès (Contarin. 1825!); Selvana (Fracchia!); Treviso (Kellner 1839, Trotter 1909!); Fadalto (Pamp. in Bolz. n. 12); Pederobba, Castelfranco (anche Bég. 1909!); S. Floriano di Vittorio (Pamp. n. 44); Segusino e Milies (Bolz. MS.)

C S. splendens Sellow. Prosp. p. 103 (3177 E. 1829)
I–III. Del Brasile. Coltivata comunemente per ornamento, come a Treviso, Selva, Vittorio .... dal 1861.

C S. Graham. Benth. (3177 G. 1842)
I–III. Del Messico. Coltivata e talora rustica in Vittorio in buona esposizione, 1910.

Melissa (Tourn.) Linn.

1161 M. officinalis L. Prosp. p. 104 (3178. 1415)
I–IV. Sepincola, ruderale. Selva, Volpago, Paderno, Valdobbiadene, Conegliano (anche Bereng. 1842!); Falzè (anche Fr. Saccardo 1890!); Asolo (Bolz. MS. n. 11) — Vulgo: Erba naranzata, Melissa.

Satureja (Tourn.) Linn.

1162 S. hortensis L. Prosp. p. 103 (3180. 1532. R)
I–III. Spontanea ai più luoghi d'Italia, ma in provincia coltivata comunemente e solo naturalizzata sui muri, nei luoghi incolti, come a Selva, Vittorio ... dal 1860; sui muri a S. Biagio di Callalta (Fracchia!); subspontanea ad Asolo (Bolz. n. 11) – Volgo: Sedulia

1163 S. montana L. Prosp. p. 103 (3181. 1415.)
II–IV. Rupicola, murale, alveale, xerofila. Colfosco, Pedavena, Possagno, Vittorio ... dal 1860; Valdobbiadene fra le ghiaie del Piave (Favero 1840!); Nervesa nell'alveo del Piave, 1861 – Var. carneo-alba Sacc. sopra Serravalle, 1870 – Var. stenophylla Borb. Rupi di S. Floriano (Parag. in Bolz. MS.)

1164 S. (Calamintha) grandiflora (L.) Scheele. Ag. p. 29 (Calamintha grandiflora (L.) Moench) (3191. 1532)
IV. Nemorale, damale. Monte sopra Valdobbiadene, 1873 (anche Favero, 1844!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Ard. Rossi in Vaccari n. 64, Bolz. MS.); sopra Miane e Follina e S. Boldo e sul Grappa (Parag. n. 44).

1165 S. (Calamintha) Calamintha (L.) Scheele. Prosp. p. 104 (Calam. officinalis Moench) (3192. 1415)
I–III. Sepicola, marginale, nemorale. Selva, Venegazzù, Montello (anche Bizz. 1872!), Vittorio, Cornuda ... dal 1861; Pedavena (anche Rég. 1909!) Asolo (Bolz. MS.) – Var. albiflora Sacc. Formeniga, 1907.

1166 S. (Calamintha) Nepeta (L.) Scheele. Prosp. p. 104 (Calam. Nepeta L.) (3193. 1532)
I–III. Marginale, sepicola, ruderale, damale. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.); Castelfranco, Resana (Rég. 1909!) – Var. albiflora Sacc. Prosp. p. 104. Marginale a Selva, 1864–1906 – Var. nepetoides (Borb.) alveo del Piave (Marin, n. 35) – Volgo Puniol mat.

1167 S. (Clinopodium) vulgaris (L.) Rég. Prosp. p. 104 (Clinopodium vulgare L.) (3194. 1532)
I–III. Marginale, sepicola, nemorale. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Salgareda, Castelfranco, Ponte di Piave (Rég. 1909!); Ca' Tron (Dalla Torre 1915!); Collalto (Mont. 1872!); Tamai (Contarini, 1825!) → Var. albiflorum Sacc. Prosp. p. 104. Raro in colli di Cherano, 1861.

1168 S. Acinos (L.) Scheele. Prosp. p. 103 (Calamintha Acinos (L.) Clairv.) (3195. 1550)
I – III. Alveale, ruderale, murale. Camalò, Belvedere, Nervesa, Covolo, Possagno, Valdobbiadene (anche Favero, 1844!) Vittorio dal 1861; Conegliano nel Convento di S. Domenico (Contarini, 1825!) – Var. lancifolia (Brig.) Colli di Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 23); Asolo (Bolz. MS.) – Var. villosa (Bég.) Monti sopra Valdobbiadene in Pianezze (Bolz. n. 23)

1169 S. alpina (L.) Scheele Prosp. p. 104 (Calamintha alpina (L.) Lam.) (3196. 1595)
III – IV. Rupestre, alveale, murale. Alveo del Piave a Covolo (discesa dai monti) 1861; Serravalle 1864; sopra Ceneda (Contarini 1825!); muri del Castello di S. Salvatore, eterotopica (Fracchia!); Cansiglio 1869 (anche Béreng 1838! Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Sprangi!, Dom. Montini 1872!, Bizzy. 1878!, Coban 1906!); Ardosa (Zanardini 1827!) – Var. suaveolens Brig. (Calam. patavina Ces. Pass. Gib. non Host) Grappa (Bolz. in Vaccari n. 64); Monti sopra Borso (Bolz. n. 10); ghiaje d'un torrentello presso Valdobbiadene (Favero 1844!)

Thymus Linn.
C Th. vulgaris L. Prosp. p. 103 (3202. 1415. R)
I – III. Spontaneo nel litorale mediterraneo. Coltivato frequentemente e naturalizzato. Vulgo Timo.

1170 Th. Serpyllum L. Prosp. p. 103 (3203. 1532. R.)
I – IV. Pascolivo, marginale, rupestre, murale. Quasi tutte le provincia: Selva, Paderno, Ponzano, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!) – Var. glabratus H. et L. Grappa (Vaccari, n. 64) – Var. ovatus (Mill.) = Th. citriodorus Schreb. Montello 1890–1908 [fm. micranthus, longistylus ♀ et macranthus, brevistylus ♂]; alveo del Piave (Minio n. 35); Ponte di Piave, Negrisia, Resana, Pederobba (Bég. 1909!); Vittorio, 1910; Colli di Asolo e Grappa (Bolz. MS.); Var. lanuginosus (Mill.), Prosp. p. 103, come sp. Bosco Montello, Belvedere 1861; Romano (Dom. Montini, 1872!) – Var. istriacus (Braun) Grappa (Bolz. MS.) – Var. polytrichus Kern. San Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 1552!); Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!); Grappa (Zanard. 1827!); Masèr (Bolz. MS.) – Var. subcitratus Schreb. Montello 1861; Collalt. (Montini, 1872!); Grappa (Zanard. 1827! Coban, 1906!) – Var. Chamaedrys Fr. San Boldo, Tovena (Pamp. in Fl. it. exs. n. 1548!) – Vulgo: Timo salvadego.

Origanum (Tourn.) Linn.

1171 O. vulgare L. Prosp. p. 103 (3204. 1415)
I–III. Rupicolo, dumale, sepincolo, marginale. Selva, Nervesa, Montello, Conegliano, Vittorio ... dal 1861 – Var. glabrescens G. Beck – Grappa e Monfumo (Bolz. n. 21) – Var. semiglaucum Boiss. Monfumo (Bolz. n. 21) – Var. creticum (L.) (1554) [≡ O. heracleoticum Rchb. non L. ≠ O. megastachyum Link]. Rupestre presso Vittorio, Selva (anche Dom. Sacc. 1890!); Valdobbiadene 1870 (anche Béreng. 1844!) – Vulgo: Majorana salvadega.

1172 O. Majorana L. Prosp. p. 103 (3206. 1532)
I–III. Originario dell'Asia centrale e dell'Africa sett. Coltivato frequentemente negli orti e subspontaneo come a Selva, Vittorio ... dal 1861. Vulgo: Mazorana

Lycopus (Tourn.) Linn.

1173 L. europaeus L. Prosp. p. 102 (3207. 1550)
I–III. Igrofilo, ripario, sepincolo. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Falzè, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Canizzan (Fracchia!); Cà Tron (Dirab. 1915!); Asolo, Altivole, Fonte (Bolzon. n. 11) – Var. elatior Lange. Selva, Volpago ... dal 1861 – Var. glabrescens Schmid. Fra Vidor e Segusin (Bolz. n. 11 e 19) – Var. pubescens Benth. Lungo il Piave a Pederobba (Bég. 1909!, Minio n. 35)

Mentha Linn.

1174 M. rotundifolia L. Prosp. p. 101 (M. macrostachya Ten.) (3209. 1550)
I–III. Riparia, igrofila. Selva, Vittorio, Nervesa ... 1861–1871; Asolo (Bolz. MS); Cà Tron (Dirab. 1915!). Varia a fiori porporini e bianchi, longistili e brevistili. Raccolsi lungo la Brentella a Selva, 1906, una fm. canescente, forse ibrida fra M. rotundifolia e M. longifolia.

1175 M. longifolia (L.) Huds. Prosp. p. 101 (M. silvestris L.) (3210 1415).
I–III. Riparia, marginale, ruderale. Tutta la provincia. α vulgaris Koch. Selva, Pederobba, Treviso (anche Béreng. 1837!) ... dal 1861; Cansiglio

1869 (anche Dom. Sacc. 1897!), Grappa (Bizz. 1878, Antonio Sacc. 1884!); alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); Asolo e Bocaor (Bolz. MS.) — Var. pubescens Koch. Come la precedente, assai comune. Queste due varietà presentano le fm. brevistile e longistile e la fm. albiflora — Var. grisella (Brig.) M. oro del Grappa (Bolz. MS.) — Var. leptostachya Sacc. Prosp. p. 106. Ruderale xerofila a Belvedere, 1861 — Vulgo (tutte le var.): Puniol mat, Pugión (a Vittorio) e così le specie affini.

1176 M. viridis L., Benth. Prosp. p. 102 (3211. 1550)
I—III. Riparia, marginale, sepincola. Selva, Montello lungo la Brentella 1861—1871; Treviso (Martius in DC. Prodr.); Vittorio ~~presso~~ alla Pieve di S. Andrea, 1909. Vulgo: Puniol bon, Menta

1177 M. dumetorum Schott. (3211 A. 1853) (M. aquatica × longifolia × rotundifolia)
I—III Marginale, campestre. Selva, Volpago, comune, 1906. Varia longistila e brevistila. Per le foglie brevi e picciuolate si accosta a M. aquatica, per le spighe a M. longifolia.

1178 M. piperita L. (3212 C. 1551. R) (M. aquatica × viridis × citrata)
I—IV. Nemofila, riparia, sepincola. Selva e Montello 1906-8 (anche ~~Dom.~~ Fr. Sacc. 1890!); Cansiglio (Mari, n. 33). Vulgo: Puniol bon, Menta.

1179 M. aquatica L. Prosp. p. 102 (3212. 1320)
I—III. Riparia, igrofila e idrofila, alveale. Tutta la provincia: Montello (anche Bizz. 1881), Selva, Treviso, Conegliano, Vittorio.... dal 1861; Vidor e Altivole (Bolz. MS.); Cà Tron (Diratz. 1915!). Varia a fiori brevistili, macranti, purpurei e a fiori longistili, micranti, pallidi. S'incontrano promiscuamente le var. hirsuta Koch e glabrata Koch.

1180 M. verticillata L. (= M. sativa L. exp.) (M. aquatica × arvensis) (3212. 1842)
II—III Igrofila. Nervesa 1869; Vittorio appiè del M. Altare (Nora Sacc. 1916!)

1181 M. arvensis L. Prosp. p. 102 (3213. 1551)
I–III. Campestre, ruderale, xerofila. α hirta (vulgaris) Selva, Volpago, Falzè (anche Fr. Sanardo 1890!), ~~Montello (anche Bizz. 1872!)~~ ... dal 1861; Vittorio, Treviso, 1890 – Var. nitida Host. Prosp. p. 102 (M. arvensis γ. Benth. = M. gentilis L.?). Marginale e riparia a Selva al Montello (anche Bizz. 1872!), Giavera, Nervesa dal 1861 al 1908; Caselle di Asolo e Borso (Bolz. MS.); siepi presso Asolo (Trott. 1912!) Probabilmente ibrida: M. arvensis × viridis – Var. parietariaefolia Beck, Rchb. Icon. Vittorio a Costa 1870 – Var. palustris Moench. Alveo del Piave (Minio, n 35)

1182 M. austriaca Jacq. Prosp. p. 102 (3213 β. 1822)
II–III. Eliofoba, igrofila. Montello, comune: dal 1861; margine del lago di Revine, 1906 – Fm. minor (paludosa). Lago di Revine col tipo. 1865.

1183 M. Pulegium L. Prosp. p. 102 (Pulegium vulgare Mill.) (3214. 1415. R)
I–III. Marginale, riparia, igrofila. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.) – Var. albiflora Sacc. Prosp. p. 102. Qua e là, non rara – Vulgo. Puniòl, Pugiòn

Ocimum Linn.

C A O. Basilicum L. Prosp. p. 101 (3216. 1550. R)
I–III. Originario d'Asia e d'Africa. Coltivato frequentemente negli orti e talora sporadico, come a Selva, Vittorio, Conegliano, Treviso ... dal 1861. Vulgo Basilicò, Basegò.

C O. minus L. (3216 A. 1320)
I–III. D'origine orientale. Coltivato come il precedente ma meno comunemente, a Selva, Treviso, Conegliano .. dal 1861. Vulgo. Basilicò.

Perilla Linn.

C A P. ocimoides P. Ard. Agg. p. 29 (P. nankinensis Dcne) (3216. c. 1712)
I–III. Originaria delle Indie orient. Ruderale, dromofila. Avventizia presso le case a Paderno 1864 e a Vittorio 1904; probabilmente sfuggita da qualche giardino

Fam. 99 Verbenaceae

Verbena (Tourn.) Linn.

1184 V. officinalis L. Prosp. p. 108 (3218. 1415 R.)
I – IV. Marginale, sepincola, ruderale, domofila. Tutta la provincia: Selva, Caonalò, Conegliano, Vittorio ... del 1858; Treviso (anche Kellner 1839!) Cà Tron (Dratz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.); Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) – Var. albiflora Sacc. Prosp. p. 108. Marginale a Selva, rara.

C V. chamaedryfolia Lindl. Prosp. p. 108 (3219 A. 1836)
I – III. Del Brasile. Coltivata comunemente in più varietà nei giardini. Volgo: Verbena.

Lippia Houst. ex Linn.

C L. nodiflora (L.) Rich. (3220. 1599)
I – III. Indigena del mezzodì d'Italia. Coltivata qua e là e rustica nelle buone esposizioni, p. e. presso Vittorio, 1900.

C L. citriodora (Lam.) H. B. K. Prosp. p. 108 (3220 A. 1793)
I – III. Del Perù e Cile. Coltivata quasi dovunque e quasi naturalizzata, p. e. a Selva, 1858, a Treviso (anche Kellner 1839!). Volgo. Erba Luigia.

Clerodendron Linn.

C C. fragrans Vent. (3220 B. 1806)
I – III. Della Cina. Coltivata frequentemente nei giardini, ma non del tutto rustica. Volgo. Dulcameria (corrotto di Volkameria)

Buddleja Linn.

CA B. variabilis Hemsl. Journ. Linn. Soc. XXVI (1889) p. 120, Vilmor. Frutic. Vilmor., Paris 1904, p. 189 c. ic.
I – III. Del Tibet. Coltivata ora qua e là, come a Vittorio, Crespano e subspontanea in un muro di una villa tra Crespan e S. Zenone (Bég. e Dratz. 1911!)

Fam. 100 Lentibulariaceae

Pinguicula (Tourn.) Linn.

1185 P. vulgaris L. Agg. p. 29 (3224. 1595)
IV. Igrofila, pascoliva. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini, Sprangi!, Contarini 1825!, Bizzozero 1878!, Cobau 1905!); Cansiglio (Béreng. 1840!) Socia Ping. alpina. — Var. grandiflora (Lam.) (1830) Grappa (Vaccari, n. 64)

1186 P. alpina L. Prosp. p. 108 (3225. 1595)
II – IV Igrofila, pascoliva, rupestre. Montello, al Tavaran, verso il Piave 1862; Vittorio 1864–1900; Cansiglio (Béreng. 1842!); Ardosa sopra Crespano (Zanard. 1827!); Piai di Cozzuolo (Pamp. n. 44); Colli Asolani (Fiori 1897!, Bolz. n. 11); Grappa (Sprang.!, Gio. Montini, Art. Rossi, 1879!) — Var. pantoleuca (fl. totis albis). Grappa (Vacc. n. 64).

Utricularia Linn.

1187 U. minor Linn. Prosp. p. 108 (3226. 1697)
I Idrofila, foveale. Fossi intorno Treviso (Boccone, 1697, Turra); fossi ad Orsago di Conegliano (Pamp. n. 44).

1188 U. vulgaris L. Agg. p. 30 (3228. 1550)
I Idrofila, foveale. Fossi a S. Palè (Pelagio) 1866; S. Bona (Fracchia!), Orsago di Conegliano (Pamp. n. 44); presso il Piave a Falzè (Fr. e Dom. Saccardo, 1890!)

Fam. 101 Globulariaceae

Globularia (Tourn.) Linn.

1189 G. vulgaris L. Prosp. p. 110 (3229. 1532)
I – III. Pascoliva, pratense. Selva, Nervesa, Montello, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Asolo e Fietta (Bolz. MS.); Valdobbiadene (Favero, 1840!); Romano (Dom. Montini, 1872!) — Var. roseiflora Pamp. Cozzuolo (Pamp. in De Toni, n. 29) — Var. subacaulis A. DC. Asolo nel Montagnon grande (Bolz. MS.)

1190 G. nudicaulis L. Prosp. p. 110 (3230. 1532)
IV. Pascolivo, pratense. Grappa e Ardosa sopra Crespano (Zanard. 1827! Spranzi!); Frontale di Crespano e Bocaòr del Grappa (Fiori, 1899! Gio. Montini!, Bolz. MS.) ~~presso Landea~~

1191 G. cordifolia L. Prosp. p. 110 (3231. 1532)
II–III. Rupestre, alveale. Alveo del Piave a Nervesa, Ciano, Covolo, Falzè ... dal 1861; colli di Vittorio, Cornuda 1864; Possagno (Art. Ross. 1879!); Valdobbiadene (Favero, 1845!); Asolo al colle S. Martino e Ardosa sopra Crespano (Zanard. 1827!); Bocaor, Masèr, Segusino (Bolz. MS.); Grappa (Dom. Montini, 1872!)

Fam. 102 Plantaginaceae

Plantago (Tourn.) Linn

1192 P. major L. Prosp. p. 111 (3234. 1415. R.)
I–III. Marginale, domofila, ortiva, pratense. Tutta la provincia. Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1858; Ca' Tron (Diratz. 1915!) ♀ Var. sinuata (Lam.) Revine-Lago, Cozzuolo (Pamp. n. 36) — Var. caulescens Bég. Cortanese (Pamp. n. 36). La specie varia assai nelle dimensioni.

♀ Vulgo Piantàjen; Piantai femena (Vittorio)

1193 P. media L. Prosp. p. 111 (3236. 1550)
I–III. Pratense, marginale, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1861; Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!); Grappa (Vacc. n. 64, Cobau 1905!); alveo del Piave (anche Minio n. 35); Fagarè, Lenson (Bég. 1909!); Ca' Tron (Diratz. 1915!) — Var. magnidentata Sacc. Prosp. p. 111. Sassicola. Ripe del Sile, alle Barche, in Treviso 1863 (anche Fracchia 1846!) — Var. oblongifolia (Schur.) in Oest. bot. Zeitschr. 1860. p. 249 (= P. media var. Monnieri (Gir.) Rouy, Fl. Fr. X p. 133. Fra Resana e Castelfranco e pr. Palù (Bég. 1909!)

1194 P. montana Lam. Prosp. p. 111 (3238. 1697)

III–IV. Pratense, pascoliva. Monti sopra Valdobbiadene (Favero in Fracchia!); Grappa (Sprang.!); Collalt. (Dom. Montini 1872!); Cansiglio alla Palantina (Béreng. 1839!)

1195 P. argentea Chaix Agg. p. 30 (P. Victorialis Poir.) (3241. 1606)
III–IV. Rupestre, pratense. Monti sopra Vittorio, rara 1869; sopra Serravalle sul M. Croce (Stur, n. 61); Grappa (Zanard. 1821!, Vaccari n. 64); sopra Crespano e Masèr (Bolz. n. 23) — Var. capitata (Hoppe et Horns.) Passo S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 963!); sopra Crespan (Bolz. Ms.)

1196 P. lanceolata L. Prosp. p. 111 (3242. 1415)
I–IV. Pratense, pascoliva, domofila, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio Treviso... dal 1858; Cà Tron (Dirats. 1915!), Castel di Godego, Castelfranco, Fagarè, Zenson (Bég. 1909!) — Var. sphaerostachya W. et Gr. Prosp. p. 111 (Var. capitata Ten.) Xerofila a Camalò, Selva, 1862; Resana, Pederobba nell'alveo del Piave (Bég. 1909! anche Minio n. 35) — Var. polystachya W. et Gr. Prosp. p. 111 (var. composita Vacc.). Pratense a Selva, rara, 1861; Confin e Cozzuolo (Pamp. n. 44) — Var. maritima Gr. Godr. (1785) Ponte di Piave e Zenson di Piave (Bég. 1909!) — Var. pumila Neibr. Colle di S. Martino di Asolo (Bolz. n. 26).
Vulgo: Piantàzen; Piantai mas'cio (Vittorio).

1197 P. altissima L. (3242 δ, 1785)
I. Pratense, igrofila. Tra Ponte di Piave e Negrisia (Bég. VI. 1909!)

1198 P. Coronopus L. Prosp. p. 111 (3245. 1532)
I. Arenicola, riparia. Lungo il Sile a Treviso nel sito alle Berche 1861–66 (anche Fracchia!); Vittorio (Pamp. 1915, n. 48)

1199 P. maritima L. Prosp. p. 111 (P. serpentina Auct. Ven.) (3249. 1558)
II–IV. Rupestre, igrofila ed anche (eterotopica?) alveale, marginale. Sopra Valdobbiadene e Vidor (Favero, 1845); Vittorio 1906; alveo del Piave a Nervesa,

Corolo, Falzè, copiosamente, 1861; Grappa (Spruy.!); Mazzè, Asolo, Castelli (Rchy. 1895 e n. 11) — Var. serpentina (Vill.) (1785). Vittorio, marginale e igrofila, 1906 — Var. Walfenii (Wild.) Asolo sul M. grande (Rchy. MS.).

Fam. 103 Rubiaceae

Galium (Tourn.) Linn.

1200 G. cruciata (L.) Scop. Prosp. p. 66 (3258. 1550)
I–IV. Sepincolo, nemofilo, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Gravere, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1860; Ca' Tron (Dirats. 1915!); Valdobbiadene 1870 (anche Favero, 1845!); Cavaglia (Dom. Saccardo, 1897!); Asolo, Grappa (Rchy. MS.); Godego, Castelfranco (Bég. 1909!) — Var. brutium N. Terracc. Grappa pr. Borso e Col Dell'Orso, a 1600 m. (Rchy. MS.) — Var. chersonense Ster. Grappa al Muschiè a m. 1100-1200 (Rchy. MS.) — Var. kirschlegianum F. Ger. et Rouy. Val Bovaro pr. S. Andrea (Rchy. MS.)

1201 G. vernum Scop. Prosp. p. 67 (3259. 1552)
I–IV. Nemofilo, sepincolo. Quasi tutta la provincia. Montello, Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Meglianno (Mayer in Bertol.); Ca' Tron (Dirats. 1915!); Asolo, Castelli; Borso, Crespano (Rchy n. 11); Pederobba (Bég. 1909!); Cavaglia 1869 (anche Dom. Sacc. a 1100 m., 1897!) — Var. longifolium Gaud. Colle S. Martino N. Asolo (Rchy. MS.) — Var. trichophyllum Gaud. Xerofilo presso Asolo (Rchy. MS.) — Var. Halleri (Gmel. Rchy.) Coll. Asolani, Strada del Grappa a Bovaro (Rchy. MS.)

1202 G. verum L. Prosp. p. 67 (3265. 1415)
I–IV. Pratense, sepincolo, marginale, pascolivo. Tutta la provincia: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio, Treviso ... Dal 1858; Valdobbiadene (Bérenger. 1844!); Cavaglia 1869 (anche D. Sacc. 1897!); Grappa (Briss. 1878!); alveo del Piave (anche Minio, n. 35); Pederobba, Ponte N. Piave, Zenson, Resana (Bég. 1909!); Salgareda (Contarini 1825!)

1203 G. purpureum L. Prosp. p. 67 (3266. 1532)

II - III. Ruscicolo, murale. Covolo al Piave, Colfosco, Valdobbiadene, Vittorio, Cornuda .... Dal 1861 ; Postagno (Magar in Bertol.) ; strade al colle S. Martino N. Asolo (Contarini, 1825!) ; Pederobba (Bég. 1909!) ; Collalt. (Dom. Montini, 1871!).

1204 G. asperatum L. Prosp. p. 67 (G. scabricum Auct. non L.) (3268. 1551).
II - IV. Nemofilo, elciofobo. Montello, Montebelluna (anche Pi 22. 1881), Vittorio ... Dal 1861 ; Falzè (Fr. Sacc. 1890!) ; Asolo, Monfumo, Cornuda (Bolz. 10. 11) ; Grappa (Bolz. l.c. Rigg. 1878!) ; Pederobba (Beg. 1909!) ; alveo del Piave (Minio n. 35) ; Ca' Tron (Dratz. 1915!) — Var. Schultesii (Vest). Bosco S. Fagarè presso Cornuda (Bolz. MS.)

1205 G. lucidum All. Prosp. p. 67 (3270. 1550)
I - III. Sassicolo, marginale, parcolivo, xerofilo. Var. α Gerardi (Vill.). Pascoli N. Valdobbiadene 1870 (anche Béreng. 1846!) — Var. β. corrugatum (Vill.) = Camalò (1785), Nervesa, Paderno, Vittorio, Monfumera ... Dal 1861 ; Ca' Tron (Dratz. 1915!). Questa var. è più comune del tipo.

1206 G. Mollugo L. Prosp. p. 67 (3271. 1572)
I - IV. Pratense, sepincolo, marginale, dumale. Tutte le provincie : Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... Dal 1861 ; Cantiglia (anche Dom. Sacc. 1897!) ; alveo del Piave (anche Minio, n. 35) ; Fagarè, Zenson (Bég. 1909!) ; Ca' Tron (Dratz. 1915!) ; Asolo (Bolz. MS.) — Var. tirolense W. (= G. insubricum Gaud.). Selva 1861 ; Pederobba (Beg. 1909!). Elciofobo. — Var. macrum Sacc. minutum, parcius ramosum, inflorescentia arctiore. Alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!)

1207 G. rubrum L. Prosp. p. 67 (3272. 1756)
II - III. Sepincolo, nemofilo, sassicolo. Muri vecchi a Vittorio e Olarigo e pascoli a S. Lorenzo presso Vittorio ... 1899 - 1905 ; Montebelluna (Fracchia!) ; Asolo e Borso (Bolz. n. 10) ; Valdobbiadene (Favero, 1845!) ; Pederobba (Bég. 1909!) ; Collalt. (Dom. Montini, 1872!) — Var. glaberrimum Ces. Pass. Gib. Val della Chiesa sopra Postagno (Bolz. MS.)

1207 G. pusillum L. Prosp. p. 67 (G. pumilum Lam.) (3274. 1803)
IV. Rupicolo. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Bizz. 1878! Cobau 1906!)

1209 G. silvestre Pollich, Agg. p. 21 (3275. 1678)
I. Campestre, pratense. Selva, Bavaria, Camalò, Merlengo, 1866; Cansiglio, 1869; Grappa (Bolz. MS.) — Var. anisophyllum (Vill.) (1785). Agg. p. 21 (G. alpestre Gaud.). Grappa (Montini!)

1210 G. baldense Spr. (3279. 1806)
IV Rupicolo. Grappa (Montini sec. Vaccari n. 64)

1211 G. palustre L. Prosp. p. 67 (3281. 1552)
I–III. Palustre, foveale, ripario. Tutta la provincia. Selva, S. Bona, Quinto, Treviso (anche Fracchia!), Vittorio .... dal 1861, Ponte di Piave, Resana, (Bég. 1909); lungo il Sile (Bérenq. 1837!) — Var. rupicola Desm. Selva, frequente 1906 — Var. elongatum (Presl) (1822). Prosp. p. 67 (var. Witheringii (Sm.) Nel basso Trevigiano (Mayer in Bertol., Bérenq. 1838!)

1212 G. parisiense L. Agg. p. 21 (3284. 1532)
I–II. Sassicolo, domofilo. Selva, lungo il muro della tenuta Grollo, 1866. 1903 (posteriormente scomparso). È la fm. lejocarpa (G. anglicum Huds.)

1213 G. Aparine L. Prosp. p. 67 (3285. 1550 R)
I–IV. Sepincolo, ripario, dumale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Montello, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1860; Godego, Castelfranco (Bég. 1909!) — Var. tenerum (Schl.) Agg. p. 21. Lungo la Brentella a Selva 1861. Vulgo: Erba petacela.

1214 G. tricorne With. Prosp. p. 67 (3287. 1711)
I–II. Campestre, sassicolo. Paderno, Preganziol, 1866; Mogliano (Mayer in Bertol., Fracchia!); Angarano (Gio. Montini!); Crespano (Zanardini 1827!)
Le due specie G. rubioides e G. saccharatum date nel Prosp. sull'autorità di Fracchia sono da escludere: il primo è fondato sopra un esemplare imperfetto indeterminabile; il secondo è il Galium tricorne

Sherardia Linn.

1215 S. arvensis L. Prosp. p. 66 (3292 - 1696)
I - III. Pratense, campestre, marginale. Tutta la provincia: Selva, Valpago, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.) — Var. hirta Uechtr. Colle S. Martino di Asolo (Bolz. MS.)

Asperula Linn.

1216 A. taurina L. Prosp. p. 66 (3294. 1551)
II - III. Nemofila, eliofoba. Montello 1861 (anche Kellner 1840!); Montebelluna, Valdobbiadene (Bérenq. 1844! e Fracchia!); Asolo (Bolz. 1893!); Crespano (Bolz. n. 11); Vittorio alle sorgenti del Meschio e Savazza, 1866 (anche Trott. 1908!); Serravalle (Pamp. in Bolz. MS.); Fregona (Contarini 1825!); Revine-Lago nel luogo detto Piovison (Pamp. n. 44); Val Bucaór presso S. Andrea (Bolz. MS.)

1217 A. odorata L. Prosp. p. 66 (3295. 1532)
I - III. Nemofila. Comune nel Montello, dal 1861; mura di Treviso, eterotopica? (Fracchia!).

1218 A. cynanchica L. Prosp. p. 66 (3304. 1563)
I - III. Sassicola, pratense, marginale, murale, alveale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Nervesa, Colfosco, Cornuda, Vittorio .... dal 1861; Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!); Valdobbiadene (anche Favero, 1844!); Corbanese (Contarini 1825!); alveo del Piave pr. Pederobba (anche Bég. 1909!); Grappa (Montini, Bizz. 1878!) Var. aristata (L. fil.) Valle Scalarè del Grappa (Bolz. MS.) — Var. scabrida Freyn. San Martino di Asolo (Bolz. MS.) — Var. capillacea Willk. et Lange. Resana, igrofila (Bég. 1909!) — Var. longiflora (W. et K.) Prosp. p. 66 (c. spec.) Grappa (Montini herb.)

Fam. 104 Caprifoliaceae

Adoxa Linn.

1219 A. moschatellina L. Prosp. p. 65 (3309. 1745)

II – III. Nemofila, sepincola, eliofoba. Montello, Serravalle, 1864-65; Onigo (Fracchia!); Valdobbiadene (Béreng. e Favero 1844!); Mussolente (Zanardini, 1827!); M. Pizzoc e Fratta di Tarzo (Pamp. n. 44).

Sambucus (Tourn.) Linn.

1220 S. Ebulus L. Prosp. p. 65 (3310. 1415)

I – III. Sepincolo, ruderale, marginale. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Treviso.... dal 1861; Asolo, Bocaor ecc. (Bolz. MS.) – Vulgo: Geole.

1221 S. nigra L. Prosp. p. 65. (3311. 1415. R).

I – III. Sepiario, ripario, nemorale, dumale. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Conegliano, Cornuda, Vittorio..... dal 1861; Asolo (Bolz. MS) – Vulgo: Sambughèr, Sambùc.

1222 S. racemosa L. Prosp. p. 65 (3312. 1561)

IV. Nemorale, dumale, rupestre. Cansiglio 1869 (anche Dom. Saccardo 1897!) Monti di Valdobbiadene, 1863; Grappa (Sternb. 1804, n. 59; Ant. Saccardo, 1883!); al Cason del Sol di Grappa (Bizz. 1878!) – Vulgo: Sambughèr de montagna.

Viburnum Linn.

C V. Tinus L. Prosp. p. 66 (3313. 1532. R).

I – III. Spontaneo nell'Italia inferiore. Coltivato frequentemente negli orti e boschetti come a Selva, Vittorio, Treviso..... dal 1861; Ca' Tron (Diratz. 1915!) Vulgo: Viburno.

1223 V. Lantana L. Prosp. p. 65 (3314. 1532. R.)

I – III. Sepiario, nemorale, dumale: Montello, Selva, Colfosco, Conegliano, Vittorio, Onigo, Pederobba... dal 1859 (anche Bég. 1909!); colli Asolani (Zanard. 1827!); Monfumo, Asolo (Bolz. MS.) – Vulgo Pagogna (a Vittorio)

1224 V. Opulus L. Prosp. p. 65 (3315. 1550. R).
I – III Sepiario, nemorale, dumale. Montello, Selva, Colfosco, Vittorio .... dal 1859; Monfumo, Asolo, bosco Pagarè (Bolz. n. 11); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Vulgo Pagogna (al Montello) – Var. roseum L. Prosp. p. 65 (1642). Coltivato comunemente. Vulgo: Puine.

Lonicera L.

1225 L. Caprifolium L. Prosp. p. 66 (3317. 1550)
I – IV. Sepiaria, nemorale, dumale. Quasi tutta la provincia, specialmente nella zona collinosa: Montello, Selva, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Cà Tron (Diratz. 1915!) – Vulgo: Corni de càvara, Madresilva, Madreselva.

CA L. Periclymenum L. (3319. 1595. R)
I – III. È spontanea qua e là in Italia. In provincia è spesso coltivata per ornamento delle muraglie ed è qua e là subspontanea, come a Vittorio, Treviso ... 1867; Collatti (Sternb. 1804, n. 59). Vulgo: Madreselva.

1226 L. nigra L. Agg. p. 21 (3321. 1785)
IV Nemorale, dumale. Cansiglio, comune 1867 (anche Béreng. 1840!, Pamp. in Bolz. MS., Trotter! – Osserv. Il Vaccari (n. 64) cita sec. Sprang. la Lon. pyrenaica L., pel Grappa, ma nei nostri erbari gli esemplari di Sprang. non provengono dal Grappa.

1227 L. Xylosteum L. Prosp. p. 66 (3322. 1550)
II. Nemorale, dumale, sepiaria. Montello, comune, Cornuda, Masèr, Vittorio ... dal 1861; Pederobba (anche Bég. 1909!); Ardosa su Crespano (Zanardini 1827!); Grappa in Scalarè (Bolz. MS.); Collatti (Sternb. 1804 n. 59); siepi di Salgareda (Contarini, 1825!); Cà Tron (Diratz. 1915!)

1228 L. alpigena L. Prosp. p. 66 (3323. 1552)

IV. Nemorale, dumale. Cansiglio, comune dal 1863 e monti intorno al Lago Morto 1869; boschetto sopra la Secca fuori Serravalle (Pamp. in Bolz. MS.); Grappa (Spranzi!, Bizz. 1878!), Campo del Grappa (Sternb. 1804, n. 59).

C L. japonica Thunb. (3324 B. 1820)
I–III Della Cina e Giappone. Coltivata attualmente qua e là e quasi naturalizzata, come a Vittorio, Treviso, Conegliano ... dal 1900; Ca' Tron (Diratz. 1915!)

Symphoricarpus (Dillen) Adans.
CA S. racemosa Michx (3324 E. 1820)
I–III. Del Canadà. Coltivato comunemente nei giardini e talora sporadico, come a Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1867. Volgo: Lagrime d'Italia.

Fam. 105 Valerianaceae

Valeriana (Tourn.) Linn.

1229 V. officinalis L. Prosp. p. 67 (3326. 1532)
I–IV. Riparia, nemofila, igrofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Montello, Cornuda, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Salgareda (Contarini, 1825!); Resana, Pederobba (Bég. 1909!); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!); Grappa, Borso e Possagno (Bolz. MS.); Ca' Tron (Diratz. 1915!) – Var. tenuifolia Vahl. Prosp. p. 67 (var. minor Koch). Vallete del Montello, 1861; M. Grappa (Bolz. MS.) – Volg. Valeriana –

1230 V. dioica L. Prosp. p. 67 (3328. 1562)
I–III. Riparia, igrofila. Selva, Giavera, Santa Bona, Conegliano, Vittorio ... dal 1860; Treviso (anche Fracchia!); Ca' Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave, Negrisia, Resana (Bég. 1909!); colli di Asolo (Bolz. MS.)

1231 V. tripteris L. Agg. p. 21 (3330. 1550)
IV. Nemofila, rupestre. Cansiglio 1867 (anche Bérenger 1838!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59, C. Massal. 1877!, Bizzozz. 1878!, Ant. Sacc. 1883!); Boccaor di Grappa (Fiori, 1897!, Bolz. MS.); Collalt. (D. Montim., 1872!); monti sopra Crespan (Zanardini 1827!) — Var. intermedia (Vahl) Agg. p. 21. Cansiglio (Bérenger 1839!)

1232 V. montana L. Agg. p. 21. (3331. 1673)
IV Rupestre, nemofila. Grappa (Sternb. 1803, n. 59)

1233 V. saxatilis L. Prosp. p. 67 (3333. 1553)
IV Rupestre, sassicola. Cansiglio 1869 (anche Béreng. 1839!); Passo di S. Boldo (Parmp. in Fl. ital. ex s. n. 365!); Grappa (Montini, Bizz. 1878!, Bolz. MS.)

Centranthus DC.

1234 C. ruber (L.) DC. Prosp. p. 68. (3337. 1551)
I–III. Murale, rupestre, xerofila. Muraglie vecchie a Vittorio, Treviso, Castello S. Salvatore a Susegana, rup. di M. S. Augusta .... dal 1861; Grespignaga (Fracchia!); Tarzo (Pamp. in Bolz. MS.) – Var. albiflorus Guss. Col tipo qua e là p. e. a Vittorio. Si trova talora una fm. a foglie un po' più anguste, non è però il ben diverso C. angustifolius (All.) DC.

Valerianella (Tourn.) Pollich.

1235 V. olitoria (L.) Pollich, Prosp. p. 69 (3342. 1606)
I–III. Campestre, segetale, ortiva: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio .... dal 1861; Cà Tron (Dirabg. 1915!) – Volgo: Galinelle, Galeti, Molesina; Panèle (nel Canal di Brenta sec. Cobau)

1236 V. rimosa (Willd.) DC. Agg. p. 22 (V. Auricula DC.) (3345. 1606)
I–III. Campestre, segetale, ortiva. Quasi tutte le provincie: Selva, Santa Bona (anche Fracchia!), Treviso, Vittorio ... dal 1861; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!)

1237 V. dentata Pollich [non Sacc. Prosp. p. 68] = V. Morisonii DC. Agg. p. 21 (3347. 1745)
I–II. ~~Badoala~~ Campestre, ortiva, viale a Spresiano, lungo la via ferrata 1866; Treviso negli orti, 1868. Di solito è la fm. dasycarpa (Stev.)

Fam. 106 Dipsaceae

Dipsacus (Tourn.) Linn.

1238 D. silvester Heuff. Prosp. p. 68 (3358. 1415. R).

I – III. Marginale (anche Bisogno 1845!) campestre, ruderale. Quasi tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1858; Cà Tron (Dralg. 1915!); Adda (Bolz. MS.) – Var. pinnatifidus M. et K. Marginale a Selva, raro 1861 – Var. sphaerocephalus Sac.: capitulis minoribus subsphaericis. Selva e Treviso, 1868. Forma autunnale, dopo tagli delle piante. Volgo Salata del diàol o Diavolo

1239 D. laciniatus L. Prosp. p. 68 (3359. 1726)

I. Riparie, subpalustre, igrofila. Lungo il Piave (Tutta MS. Gl. Prosp. l.c. nota); Folli a Bagajolo presso Roncade, 1866; presso Serravalle (Contarini in herb. Parolini); Portobuffolè (Bérenger. 1841!); Cà Tron (Dralg. 1915!)

1240 D. palustre L. Agg. p. 22 (3361. 1572)

I – III. Sepincolo, riparie. Selva, 1878, lungo una siepe, rara; Pedagno (Spreafi!); Valdobbiadene e Biadene (Trotter 1906!)

Succisa (Mathioli) M. et K.

1241 S. pratensis Moench. Prosp. p. 71 (3367. 1415)

II – III. Pratense, pascoliva, marginale. Selva, Saviore, Montello, Conegliano, Vittorio ... dal 1861, nelle due fm. glabrata Sweet e hirsuta Rchb. – Var. albiflora Pamp. in de Toni a. 29. Targo (Pamp. l.c.) – Var. oblongifolia Roug. Bosco di Fagarè di Cornuda e pr. Montfumo (Bolz. MS.)

1242 S. australis (Wulf.) Rchb. Agg. p. 22 (3368. 1572)

I – II. Igrofila, subpalustre, nemorale. Zerbi boschivi presso Motta (Bérenger 1841!)

Knautia Coult.

1243 K. arvensis (L.) Coult. Prosp. p. 70 (3370. 1415)

I – III. Pratense, marginale, nemorale. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Collalt. (S. Mont. 1872!) – Var. integrifolia M. K. Qua e là a Selva, Quinto (Lanche Fiocchi!), Treviso, M. Sudiniane, ... dal 1859; S. Zenone degli Scudilini (Dralg. e Bég. 1911!) – Var. calycina Bég. Boccaor del Groppo (Bolz. MS.) – Var. carpathica (Heuff.). Groppo (Bolz. MS.)

1244 K. velutina Brig. Ann. Cons. Jard. bot. Genève, 1902 (3372 D - 1907)
III Pratense, nemofila. Sopra Miane, nella località detta Mont (Pamp. n. 44 e in Fl. anal. IV p. 216)

1245 K. silvatica (L.) Duby. Prosp. p. 69 (3372. 1550)
I-IV Nemofila, sepincola, eliofoba. Selva, Montello, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Cornuda ... dal 1861; colli di Asolo (Zanardini, 1827, Bolz. MS.); Masèr (Bolz. MS.); Portobuffolè (Béreng. 1841!); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!), Fais (Contarini 1825!); Pederobba al Piave (Bég. 1909!); Grappa (Vacc. n. 64) — Var. banatica Heuff. Montagna di Maser (Bolz. MS.).

1246 K. longifolia Kock Cfr. Vis. e Sacc. Cat. Vascol. Ven. p. 87.
IV. Pascoliva. Pascoli dei monti del Trevigiano. È probabile la sua presenza nella provincia, ma non essendo precisata la località, abbisogna di conferma.

1247 S. gramontia L. Prosp. p. 71 (S. columbaria ex parte) (3377. 1532)
I-III. Pratense, sassicola. Selva, Treviso, Camalò, Vittorio (anche Pamp. n. 40) ... dal 1861. È forse più comune della S. Columbaria, alla quale è assai prossima — Var. agrestis W.K. Selva lungo le vie, 1907; Portobuffolè Béreng. 1847!

1248 S. columbaria L. Prosp. p. 71 ex p. (3378. 1550)
I-III. Pratense, pascoliva, sassicola. Serravalle (anche Contarini 1825!); Ponte di Piave, Resana (Bég. 1909!); alveo del Piave (anche Minio, n. 35); mura di Treviso (Fracchia!); M. Crep sopra Miane (Béreng. 1843!) — Var. pachyphylla Gaud. Asolo sul colle S. Martino (Bolz. n. 26) — Var. Columnae Ten. Prati magri di Selva, 1861 — Var. integrata Sacc. Prosp. p. 72. Prati magri di Camalò 1861 — Var. uniseta Savi. Alveo del Piave n. 35. Forse alcune di dette forme sono piuttosto da riferirsi alla precedente specie

CA S. atropurpurea L. Prosp. p. 72 (3379. 1620)
I – III. Raramente spontanea nel mezzodì d'Italia. Coltivata di spesso nei giardini e talora sporadica. Vulgo. Vedovela, Vedoela.

1249 S. graminifolia L. Prosp. p. 72 (3382. 1550)
IV. Rupestre, sassicola. Cansiglio 1867 (anche Bérenq. 1839!); sopra Bosso lungo i Viadi (Bolz. 1896! n. 11); M. Pizzoc, Col. Vicentin, S. Boldo (Pamp. n. 38); M. Crepsopra Follina (Bérenq. 1843!); Loc a metà monte Pizzoc e S. Boldo (1914. 1915!); Grappa (Vacc. n. 64) – Var. latifolia Goir. Frontal del Grappa e Valle Scalarè (Bolz. n. 26).

Fam. 107 Cucurbitaceae

Lagenaria Seringe
CA L. vulgaris Ser. in DC. Prosp. p. 56 (Cucurbita lagenaria) (3388. 1415. R)
I – III Delle Indie e Abissinia. Coltivata comunemente e talora sporadica come a Selva.... Vulgo: Zuca da vin.

Bryonia (Tourn.) Linn.
1250 B. dioica Jacq. Prosp. p. 56 (3392. 1415)
I – II. Sepincola, dumale. Selva e Montello, non rara ... dal 1859.

Cucumis Linn.
C C. Citrullus (L.) Ser. Prosp. p. 56 (Cucurbita Citrullus L.) (3395. 1320. R)
I – III. Dell'africa intertropicale. Coltivato qua e là spesso, e talora sporadico, ...1858. Vulgo Anguria.
C C. sativus L. Prosp. p. 56. (3396. 1415. R)
I – III. Delle Indie orient. Coltivato frequentemente e talora sporadico, 1858. Vulgo Cucumaro, Cugumaro
C C. Melo L. Prosp. p. 56 (3397. 1415)
I – III. Dell'India or. e Guinea. Coltivato spesso e talora sporadico, 1858. Vulgo: Melon. Var. hibernus Poll. Vulgo Baciro – Var. moschatus Poll. Vulgo: Melon moscatello – Var.: scandens Poll. Vulgo: Meloncini rampeghini.

Cucurbita Linn

C C. moschata Duchesne. Prosp. p. 55 (Cuc. clodiensis Nacc.) (3398. 1558)
I – III. Probabilmente di origine asiatica. Coltivata frequentemente. Vulgo: Zuca santa, Zuca cogota.

C C. maxima Duchesne Prosp. p. 55. (3399. 1558)
I – III Probabilmente originaria dell'America merid. ~~Prosp. p. 55 (3399. 1558)~~
Coltivata qua e là. Vulgo: Zuca baruca – Var. ~~[illegible]~~ pileiformis Roem. Prosp. p. 55 (C. Melopepo) = C. clypeiformis Bauh. Pollini. Coltivata qua e là. Vulgo. Zuca turca o dal turbante.

C C. Pepo L. Prosp. p. 55 (3400. 1550 R.)
I – III Di origine asiatica. Coltivata frequentemente, specialm. in ogni campo, la var. oblonga Willd. Vulgo: Zuca porgelera (adulta); zucheti, zucoi (i frutti giovani) – Anche le varietà ornamentali: ~~Cucurbitella~~ italica Tod., orifera (L.), aurantia (L.) sono spess. coltivate negli orti. Vulgo: Zuchete da giardin

Fam. 108 Campanulaceae

Phyteuma Linn.

R Ph. hemisphaericum L. (3405. 1606)
IV. Sassicolo, pascolivo. Grappa (Spranz!). Da confermarsi la località.

Hegetschw.

1251 Ph. Sieberi Spr. Agg. p. 24 (3408. 1837)
IV. Pascolivo. Grappa (Spranz! C. Mass. 1877!, Bolz. MS.)

1252 Ph. orbiculare L. Prosp. p. 86 (3409. 1595)
IV. Pascolivo, nemofilo. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Cobau 1906!, Parolini in Bertol., Spranz!); Boccaor (Bizzoz. 1878!); M. Croce sopra Serravalle (Bérenz. 1838!); Cansiglio (Bérenz. 1839!); prati della Val d'Alta del Grappa (Zanard. 1827!) – Var. lanceolatum (Vill.) Grappa (Vacc. n. 64, Spranz!); monti su Valdobbiadene (Bérenz. 1842!) – Var. ellipticifolium (Vill.). Palantina del Cansiglio (Bér. 1842!); Grappa (Cobau, 1906!, D. Montini, 1872! Vacc. n. 64) – Var. longifolium Hegetschw. Cà Balbi nei Castelli di Monfumo (Bolz. MS.) ~~[illegible]~~

1253 Ph. Schenckzeri All. Prosp. p. 86 (3410. 1757)
II – IV. Rupestre, sassicolo, nemofilo. Montello verso il Piave 1863 (disceso dai monti?); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Sprangi!)

1254 Ph. Michelii All. Prosp. p. 86 (3412. 1563)
II – IV. Nemofilo, pascolivo. Montello, raro, 1861; Valdobbiadene (Bér. 1842!); Romano (Sternb. 1803, n. 59); Bocaor del Grappa (Brzgoz. e Mass. 1877!) — Var. scorzonerifolium (Vill.) Monfenera 1862; pascoli sopra Valdobbiadene (Bérenz. 1842!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59); Collalti (Dom. Montini 1872!) — Var. betonicifolium (Vill.) Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Precht in R. Schulz, Monogr. Gatt. Phyt. 1904)

1255 Ph. spicatum L. Prosp. p. 86 (3414. 1805)
III – IV. Nemofilo, pascolivo. Asolo al Foresto nuovo (Zanard. 1827, Bolzon MS.); monti di Valdobbiadene (Favero, 1850!); Grappa al Forcelletto e Punta Brental sopra Cavaso (Bolz. MS.)

1256 Ph. Halleri All. Agg. p. 24 (3415. 1563)
IV. Pascolivo, nemofilo. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montin. herb. Pat.! Sprangi!, Parolini, Zanardini 1827!); Collalti (Gio. Montin in herb. Kellu., Dom. Montini 1871!)

1257 Ph. comosum L. Prosp. p. 86 (3416. 1532)
IV. Rupestre. Grappa (Montin. in Bertol., Sprangi!), Valle di S. Fidà del Grappa (Sternb. 1803, n. 59); passo S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 164!) — Var. velutinum Ball. Passo di S. Boldo (Pamp. in Fl. it. exs. n. 165!)

Campanula (Tourn.) Linn.

CA C. Medium L. Prosp. p. 87 (3420. 1532)
I – III. Spontaneo qua e là anche nel Veneto. Coltivato nel Trevigiano e talora avventizio p. e. a Selva 1866. Vulgo: Campanale.

1258 C. sibirica L. Prosp. p. 87 (3423. 1785)
I – III. Rupestre, murale, di rado pratense. Vittorio sui vecchi muri, 1863; Conegliano (Béreng. 1841!); Spresiano e Nervesa (Fracchia!); Romano (Dom. Montini 1871!); colle di S. Martino di Ceneda (Contarini 1825!); Cornuda (Bolz. MS.) – La Camp. barbata del Prosp. p. 87, spetta a C. sibirica.

1259 C. Cervicaria L. Prosp. p. 87 (3428. 1620)
II – III. Nemofila, dumale. Alture del Montello, comune, dal 1861; colli di Conegliano (Béreng. 1844!); Farrò di Follina, 1864; S. Pietro di Feletto (Pamp. n. 44); bosco Fagarè (Bolz. MS.)

1260 C. glomerata L. Prosp. p. 87 (3429. 1532)
I – IV. Pascoliva, pratense, nemofila. Montello, Paderno, Sant'Andrà, Vittorio... dal 1861; Conegliano (Béreng. 1842!); Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); Valdobbiadene (Béreng. 1846!); Portobuffolè (Béreng. 1841!); Grappa (Vacc. n. 64); Asolo (Bolz. MS.); Pederobba (Bég. 1909!) – Var. pusilla DC. Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.) – Var. farinosa (Andr.). Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.) – Var. aggregata (W.). Montagnon di Masèr (Bolz. MS.)

1261 C. spicata L. Prosp. p. 87 (3432. 1595)
II – III. Rupestre, murale, alveale. A Serravalle 1862 (anche Contarini 1825!); Ciano e Nervesa al Piave 1861; M. Crep sopra Miane (Béreng. 1842!) Asolo (Bolz. MS.); Pederobba (Bég. 1909!); Grappa (Zanard. 1827!); Collalt. (Dom. Montin. 1871!) – Talora s'incontra una forma ramosa, derivata dal caule accidentalmente ~~tagliato~~ spezzato.

1262 C. Rapunculus L. Prosp. p. 87 (3433. 1415)
I – III. Pratense, marginale, nemofila. Camatò, Sant'Andrà, Quinto... dal 1861; Vittorio (anche Pamp. n. 40); Godego, Castelfranco (Bég. 1909!) Q – Var. lalycina (Boeb.). Bosco Fagarè pr. Cornuda (Trott. 1906) – Var. albiflora Pamp. in De Toni n. 29. Cozzuolo.

Q. Volgo: Respondol, Respondoi.

1263 C. pertusifolia L. Prosp. p. 87 (3436. 1532)
III – IV. Fralenze, nemorifila. Montenera, copiosa, 1861 ; Canossello, rara 1869; Faè (Cortesini, 1825 ! e Pamp. n. 44); Grappa alt. Cason del Sol (Rizz. 1878!) Grappa (Antonio Sacc. 1883!); Pederobba (Bég. 1909!); Valdobbiadene 1870; Asolo al colle delle Rocce (Bolz. MS.) — Var. plena Sacc. Prosp. p. 87. Coltivata. Volgo Baston de S. Giuseppe — Var. parviflora Paterm. Asolo sulle Montagne grande e di Barbisiera sopra Pellagno (Bolz. MS.).

1264 C. pyramidalis L. Prosp. p. 87 (3442. 1745)
II – III. Murale, nemorifila. Asolo (Bolz. 1894 in herb. Pat.!); colli trevigiani (Romano in Bertol.)

1265 C. caespitosa Scop. Prosp. p. 86 (3449. 1697)
II – IV. Rupestre, alveale, pascoliva. Alveo del Piave a Nervesa, Falzè, Carbonera ... dal 1861; pascoli del Canossello e sopra Vittorio, 1869; alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!, Micio, n. 35) — Var. Minii Pamp. Fedalto (Pamp. n. 48, 1915).

1266 C. Bellardii All. Prosp. p. 86 (C. pusilla Hänke) (3450. 1713)
IV Rupicola, igrofila. Montenera 1861; Grappa (Montin herb.) Cobau 1906!); M. Croce presso il Canossello (Bireng. 1842!)

1267 C. rotundifolia L. Prosp. p. 86 (3451. 1561)
III – IV. Rupicola, muricola, igrofila. Montello al Piave, Covolo, Collalto, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; S. Zenone, Crespan (Diratz. e Bég. 1911!); Grappe (Sprenger!, Vacc. n. 64, Bolz. MS.) — Var. Schenchzeri (Vill.) (1532) Aggr. p. 25 c. p. Pascoli del Canossello, 1869; Vittorio 1890; Grappa (Cobau, 1906!, Vacc. n. 64, Bizzoz. 1878!, Montini in herb. Kellner) — Var. hirsuta (L.) Aggr. p. 25 (C. carnica Schiede). Monti intorno Vittorio, 1880; Canossello (Don Saccardo 1897!); Grappa (Montini, 1872); Pederobba (Bég. 1909!); Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.)

1268 C. bononiensis L. Prosp. p. 86 (3453. 1550)
II – III. Nemofila, sepincola. Colli di Asolo (Parolini in Bertol.); Vittorio, Cornuda, Montello, Colfosco, Falzè... dal 1870 – Grappa (Sternb. 1803, n. 59); Portobuffolè (Béreng. 1841!); Piai di Cozzuolo (Pamp. n. 44) – Var. ramosissima DC. Asolo al colle S. Martino (Bolz. MS.)

1269 C. rapunculoides L. Prosp. p. 86 (3454. 1718)
II – III. Nemofila, dumale. Serravalle dal 1861 (anche Béreng. 1838!); Sorgenti del Meschio (Contarini 1825!); Pederobba, Castelfranco alla Stazione ferrov. (Bég. 1909!)

1270 C. Trachelium L. Prosp. p. 87 (3455. 1550)
I – IV. Sepincola, dumale, nemofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Montello, Conegliano, Vittorio, Treviso... dal 1861; Motta (Béreng. 1845!); Salgareda, Fais (Contarini 1825!); Grappa al Cason del Sol Bizz. 1878!) – Var. cordata (Peterm.). Asolo, Cornuda (Bolz. MS.) – Var. albiflora Sacc. Prosp. p. 87 [1864, N. Terr. ...] – Var. atropurpurea Sacc. Prosp. p. 87. Presso Serravalle 1861; Selva 1906. – Var. dasycarpa M. K. Siepi di Asolo (Bolz. MS.); alveo del Piave (Minio n. 35). – Vulgo (colle var.): Campanele salvadeghe, Respondol mato.
Oss. La Campanula elatinoides Morett fu indicata del Carisighò dal Carnel (Fl. ital. ...) e quindi dal Bolzon, n. 23 (come comunicata dal Siemoni); ma secondo le ricerche fatte dal prof. R. Pampanini, gli esemplari relativi mancano sia negli Erbari del Museo bot. di Firenze, sia nell'Erb. Siemoni e in quello del prof. Carnel a Pisa; onde, veduta anche la diversa area delle specie, non si può ammettere che o un errore di determinazione o uno scambio.

Adenophora Fisch.

1271 A. liliifolia (L.) Bess. Prosp. p. 86 (Campanula Alpini ex min. parte) (3457. 1620)
III. Rupestre, dumale. Cornuda 1861; Vittorio (anche D. Sacc. 1890!); Valmarino (Pamp. in Bolz. n. 12); Asolo e Masèr (Bolz. MS.); Miane e Piai di Cozzuolo (Pamp. n. 44); San Boldo (Trott. 1914!)) Grappa, Boccaòr e Scalarè (Bolz. n. 22) – Var. Alpini Bort. Prosp. p. 86 ex maj. parte. Cornuda, 1861; bosco Fagarè (Trott. 1906!, Bolz. n. 24); Asolo (Zanardini 1825!)

109

Fam. Compositae
Subfam. Tubuliflorae.

Eupatorium (Tourn.) Linn.

1272 E. cannabinum L. Prosp. p. 72 (3468. 1415)
I–III. Sepincolo, ripario, igrofilo. Quasi tutta la provincia. Selva, Gravera, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1858; Pederobba, Gorgo, Castelfranco (Bég. 1909!); Ca' Tron (Dratz. 1915! — Var. albiflorum San. Montello, raro, 1912 — Var. indivisum DC. Colli di Masèr (Bolz. MS.); alveo del Piave (Bolz. MS.).

Ageratum Linn

C A. caeruleum Desf. (3468 A. 1704)
I–III. Dell' America merid. Coltivato frequentemente per ornamento.
Vulgo: Agerato o Celestini.

Adenostyles Cass.

1273 A. alpina (L.) B. et Fing. Prosp. p. 72 (3469. 1532)
IV. Nemofilo, pascolivo, igrofilo. B. Cansiglio, 1861; Valdobbiadene (Bérenq. 1846!); Grappa (Contarini, 1825!, Dom. Montini 1812, Coban, 1905, Bolz. 1892!, Ant. Saccardo 1883!, Bizz. 1878! — Var. glabra (Vill.) = Ad. viridis Cass. Passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 371!); Archeson del Grappa (Bolz. MS.) — Var. albiflora Zersi Grappa (Montini, Menyghini in herb. Pat., Vacc. n. 64) — Var. pubescens Boiss. et Reut. Ghiaroni alla cima del Grappa (Bolz. MS.) — Var. Alliariae (Gouan) Kern. Prosp. p. 72 (A. albifrons (Linn. fil.) Rchb.). Cansiglio (Mari n. 33); Grappa (Montini in Vaccan. n. 64).

Cacalia Linn. em. DC

C A C. sonchifolia L. Prosp. p. 72 (3469 A. 1780) (Emilia sagittata DC.)
I–III Delle Indie orient. e Cina. Si coltiva qua e là per ornamento e si risemina da sè. Vulgo Fiocheti.

Petasites (Tourn.) Adans.

CA P. fragrans (Vill.) Rchb. Prosp. p. 73 (Nardosmia fragrans Rchb.) (3472. 1696)
I – III. Spontanea nell' Italia merid. Si coltiva con frequenza negli orti e giardini. Volgo: Vaniglion.

1274 P. officinalis Moench. Prosp. p. 72 (3473. 1550)
II – III. Ripario, nemofilo, alveale. Montello verso il Piave, Vittorio.... dal 1861; Salgareda (Contarini 1825!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Asolo, Castelcucco, Fietta (Bolz. n. 11)

1275 P. niveus (Vill.) Baumg. (3474. 1532)
I – IV. Ripario, nemofilo, alveale. Grappa (Fiori, 1897! Bolz. n. 11, Vaccari n. 64); Bocaòr nell' alveo dell' Astico (Bolz. 1895!); M. Zoel e Cansiglio (Contarini, 1825!); Ponte de Piave, Salgareda, alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909! e Minio n. 35). Discende al piano lungo i fiumi. – Var. subfeminens DC. Bocaòr presso il Capitello (Bolz. MS.)

P. albus (L.) Gaertn. Agg. p. 22 (3475. 1595)
IV Nemofilo, igrofilo. Collalti (Dom. Montini, 1872!); Cansiglio (Béreng.?)

Tussilago (Tourn.) Linn.

1276 T. Farfara L. Prosp. p. 72 (3476. 1532)
I – IV. Igrofila, arenicola, riparia. Quasi tutta la provincia. Selva, Montello, Giavera, Vittorio .... dal 1858; Pederobba al Piave (Bég. 1909!); Asolo, Monfumo (Bolz. n. 11); Fagarè, Zensòn (Bég 1909!); Grappa Bolz. n. 11, Vacc. n. 64), Ardosa (Zanardini 1827!); Collalti (Dom. Montini, 1872!); Cà Tron (Diratz. 1915!) – Volgo: Peca de oca.

Homogyne Cass.

1277 H. alpina (L.) Cass.). Prosp. p. 72 (3470. 1566)
IV. Pascoliva. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Spranj.!, Bolz. MS.); Busa delle neve del Grappa (Contarini 1825!, Bizzoz. 1878!) – Var. discolor (Jacq.) Agg. p. 22, c. spec. Rupicola e pascoliva nel B. Cansiglio, 1869 (anche Béreng.?)

Senecio (Tourn.) Linn.

1278 S. vulgaris L. Prosp. p. 78 (3477. 1415. R)
I–IV. Ortivo, campestre, domofila. Tutta la provincia. Selva, Nervesa, Conegliano, Treviso... dal 1860; Asolo (Bolz. MS.), Ca' Tron (Dratz 1915!)

1279 S. viscosus L. Agg. p. 23 (3480. 1768)
III. Sassicolo, alveale. Margine del Lago Morto e monti circostanti, 1865, raro.

1280 S. nebrodensis L. Prosp. p. 78 (S. rupestris W.K.) (3485. 1696)
II–III. Rupestre, nemofilo. Montello 1861 (anche Dom. Saccardo 1890!); M. Crep. sopra Miane (Béreng. 1845!); alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); Cansiglio 1869; Grappa (Sternb. 1804, n. 39, Bizzoz. 1878!, Antonio Saccardo, 1883!); Collalti e Grappa (Dom. Martini, 1872!) — Var. pinnatifidus Fiori. Grappa (Bolz. MS.)

1281 S. abrotanifolius L. Prosp. p. 78 (3487. 1713)
IV. Rupicolo, nemofilo. Cansiglio, 1861 (anche Béreng. 1838! e Mari n. 33), Col Vicentin (Pamp. in Bolz. n. 12); M. Cesen su Valdobbiadene (Bolz. n. 12) Grappa (Zanardini, 1827!). È specie bene figurata in Sturm Deut. Fl., ma assai male in Reichenbach, Ic. Fl. germ. Dal Sen. adonidifolius più occidentale differisce pei corimbi di pochi fiori e questi molto più grandi, ma l'abito è uguale.

1282 S. Jacobaea L. Prosp. p. 78 (3488. 1415)
I–IV. Ripario, campestre, sepincolo, nemofilo. Tutta la provincia. Selva, Treviso, Conegliano, Vittorio, Cornuda... dal 1861 — Var. barbareifolius (Krock) (1563). Prosp. p. 78 (S. erraticus Bertol.). Ripario, campestre, igrofilo. Fossati a Treviso (anche Fracchia!), Selva, Camalò... 1861; colli Asolani (Parolini herb.); Nervesa al Piave (Bizzoz. 1881); bosco Fagarè e Vidor la fm. angustisectus Fiori e la fm. erraticus Bert. (Bolz. MS.)

1283 S. erucifolius L. Prosp. p. 78 (3489. 1550).
II – III. Nemofilo, igrofilo. Asolo, Monfumo (Bolz. n. 11); S. Martino di Asolo (Zanardini, 1827!, Meneghini herb. Pat.!); Vittorio a Serravalle 1870 (anche Pamp. n. 40); Cansiglio 1869. — Var. tenuifolius (Jacq.). Faïs sopra Serravalle (Contarini 1825!) — Var. praealtus (Bert.) Prosp. p. 78 (come specie). Montello ~~di fianco~~ lungo il Piave e nell'alveo stesso ~~del Piave~~ a Nervesa, Falzè, Colfosco, dal 1861 (anche Bizz. 1881!); Pederobba al Piave (Bég. 1909!); Valdobbiadene (Favero 1844 e in herb. Fracchia!); Montagnon di Masèr (Bolz. MS.)

1284 S. paludosus L. Prosp. p. 78 (3493. 1726)
I – III. Palustre, ripario. Intorno a Treviso 1863 (anche Kellner 1840!); fuori Serravalle 1861; laghetti di Revine 1865 (anche Pamp. n. 44)

1285 S. Doria L. Prosp. p. 78 (3494. 1550)
I. Palustre, ripario. S. Palè (Pelagio) e Quinto presso Treviso 1861 (Guot. Venturi e Saccardo)

1286 S. nemorensis L. Prosp. p. 78 (3495. 1550)
II – III. Nemofilo, eliofobo. Montello, comunissimo, 1861 (anche Béreng. 1837!, Bizzoz. 1872!); colli di Cornuda, Vittorio, Valdobbiadene, Cansiglio (anche Dom. Saccardo 1897!), dal 1862; Asolo, Follina, b. Fagarè (Bolz. MS.); S. Martino di Asolo (Zanardini 1827!); Grappa (Vaccari, n. 64, Coban, 1906! Bolz. MS.) È specialmente rappresentato dalla var. Fuchsii Gm. — Var. Cacaliaster (Lam.) Prosp. p. 78 c. spec. (1802). Monti sopra Valdobbiadene (Favero, 1844! Béreng. 1844!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montin. in Bertoloni, Bizzoz. 1878, Bolz. MS.). Pare specificamente distinto dal tipo.

1287 S. alpinus (L.) Scop. (3497. 1532). Var. α cordifolius (Gouan) Rchb., Prosp. p. 78 (S. cordatus Koch). IV. Pascolivo, nemofilo. B. Cansiglio 1861 (anche D. Sacc. 1897!, Mari n. 33, Contarini 1825!); M. Mariec. di Valdobbiadene (Favero, 1842!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Vacc. n. 64, Bolz. n. 10, D. Mont. 1872! Parolini e Montin. in Bert., Coban 1906) — Var. appendiculatus Sacc. in Fl. anal. III p. 219, Prosp. p. 78 (S. subalpinus Auct.). Sopra Valdobbiadene (Béreng. 1844! sub "lyratifolius", e Favero 1850!)

1288 S. alpester (Hoppe) DC. (Prosp. p. 78 (Cineraria longifolia Auct. non Jacq.) (3498 1595)
Var. Gaudini (Grml.) = Cineraria spathulaefolia Gm.
IV. Pascoliva. Cansiglio 1869 (anche Bracht!, Béreng. 1842!); M. Zoel sopra Serravalle (Contarim. 1825!); Monfenera (Bolz. n. 11. 21); Ardosa (Zanardini 1827!); Grappa (Sternb. 1804, n. 59, Spranz!, Vacc. n. 64); sopra Valdobbiadene (Béreng. 1846!) — Var. brachychaetus (DC.). Grappa all' Archeson, Monfenera (Bolz. 11 e MS.) — Var. eradiatus Fiori. Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!)

C S. cruentus (L'Hérit.) DC. (3499 A. 1815)
I–III. Delle Isole Canarie. Frequentemente coltivato in più varietà per ornamento. Volgo: Cineraria.

Arnica Linn.

1289 A. montana L. Prosp. p. 78 (3507. 1558)
IV. — Pascoliva. B. Cansiglio 1867 (anche Dom. Sacc. 1897!); Monfenera, 1861; Grappa (Contarim. 1827!, Don. Montin 1872!, Bizzoz. 1878!, Coban, 1906!, Vacc. n. 64 — Var. angustifolia Duby (= A. alpina Auct. it. non DC.) Grappa (Montin. in Vacc. n. 64) — Var. alternifolia Car. et St Lag. Val Melin del Grappa (Bolz. MS.)

Bellis (Tourn.) Linn. Prosp.

1290 B. perennis L. Prosp. p. 73 (3509. 1558)
I–III. Pratense, pascoliva, marginale. Quasi tutta la provincia. Selva, Treviso, Conegliano, Vittorio, Cornuda ... dal 1858, Ca' Tron (Dirabz. 1915!); Asolo (Bolz. MS.). Var. rhodoglossa Sacc. in De Tom. n. 29. Presso Vittorio (Pamp.) — Var. plena Sacc. Prosp. p. 74. Coltivata comunemente. Volgo: Zopète, Supète, Pensiereti.

Bellidastrum Cassini.

1291 B. Michelii Cass. Prosp. p. 73 (3514. 1729)
II–III. Rupestre, pascoliva. M. Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64, Ant. Rossi, 1878! Coban, 1906!, Crespano (Montin. in Bert.); Cansiglio (anche Béreng. 1838!); rup. lungo il Piave a Corolo e a Cornuda, 1861; Asolo (Fiori 1897!, Bolz. MS.) — Var. medium Rouy. Grappa (Bolz. MS.)

Aster (Tourn.) Linn.

1292 A. alpinus L. Prosp. p. 73 (3515. 1552)
IV. Rupestre, pascolivo. Cansiglio (Béreng. 1841!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini, Parolini in Bertol., Favero 1844!, Vaccari n. 64, Coban 1905-1906!, Bizzozero 1878!)

1293 A. Amellus L. Prosp. p. 73 (3516. 1532. R)
I-II-III. Pascolivo, dumale, pratense. Montello, Cornuda, Colfosco, Pederobba nell'alveo del Piave, Vittorio ... dal 1860; Portobuffolè disceso col Livenza 1845; S. Martino di Asolo (Zanard. 1827!); Grappa, Corte, Asolo, Cornuda (Bolz. MS.) - Var. globulariformis Goiran Asolo sul colle S. Martino e S. Giorgio (Bolz. MS.) - Var. macranthus Brig. S. Floriano fuori Serravalle (Pamp. in Bolz. MS.)

1294 A. Novi-Belgii L. Prosp. p. 73 (A. Salignus Bertol. et Auct. non W.) (3517. 1701)
I-III. Originario dell'America Sett., coltivato un tempo ed ora del tutto naturalizzato. Ripario, sepincolo. Lungo i fossi a Selva, Bavaria, Crocetta, Falzè, Nervesa al Piave (anche Bizz. 1881!), Treviso (anche Kellner, 1840!) ... dal 1861; fra Valà e Castelfranco (Bolz. n. 21); Mogliano (Mayer in Bertol., Romano); Ponte di Piave e Zenson (Bég. 1909!); Cappella Maggiore di Vittorio (Pamp. in Bolz. MS.)

CA A. salicifolius Scholl (3518. 1793)
I-II. Originario dell'America Sett. Coltivato e qua e là naturalizzato. Presso le siepi in vicinanza di S. Donà di Piave ai confini col Trevigiano. 1906.

CA A. Novae-Angliae Ait. Prosp. p. 73 (ex err. calami sub A. Novi-Belgii) (3519 A. 1713)
I-II. Oriundo dell'America Sett. Coltivato qua e là nei giardini ed orti e quasi naturalizzato, come a Selva ... dal 1861.

CA A. Sinensis L. Prosp. p. 73 (3522. A. 1751)
I-III. Della Cina e Giappone. Coltivato assai spesso e talora sporadico presso i giardini, come a Selva, Vittorio ... dal 1861, ove rinvenni qualche individuo umile e monocefalo - Volgo: Astri.

1295 Aster Linosyris (L.) Bernh. Prosp. p. 73 (Linosyris vulgaris Cass.) (3532. 1550)

III – IV. Pascolivo, xerofilo. Salita al Cansiglio e sopra Serravalle ... 1861; colle della ~~Mante~~ Madonna della Salute (Trotter, 1907!); S. Boldo (Pamp. 1907!).

Solidago Linn.

CA S. canadensis L. Prosp. p. 74 (3523. 1713)

I – III. Originaria dell'America Sett. Coltivata per ornamento e non di rado fuggiasca sui vecchi muri e nelle siepi a Selva ed entro il Montello ... 1861; muri vecchi a Ceneda (Trotter 1916!).

S. serotina Ait. (3524. 1812)

A I Sepincola, riparia. Copiosa a Motta (E. De Toni, n. 29 bis). Note Fl. Friul. IV. p. 16 (1895).

1296 S. Virgaurea L. Prosp. p. 74 (3525. 1532)

II – IV. Nemofila, pascoliva, sepincola. Montello (anche Bizz. 1872), Cornuda, Conegliano, Vittorio, Valdobbiadene ... dal 1859; S. Martino d'Asolo (Zanardini 1827!); Cansiglio (anche Dom. Saccardo, 1897!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vacc. n. 64 – Var. monticola (Jord.). Bosco Cansiglio (Mari, n. 33.) – Var. minuta (L.) Grappa (De Visiani!) – Var. australis Pospich. S. Martino d'Asolo (Bolz. MS.)

Erigeron Linn.

1297 E. canadensis L. Prosp. p. 74 (3527. 1644).

I – IV. Originaria dell'America Sett. ma da due secoli diffusa ovunque come una malerba. ~~Selva~~ Campestre, ruderale, domofila, murale. Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1859; Asolo (Bolz. MS.); alveo del Piave (anche Minio n. 35); Tamai (Contarini; 1825) – Volgo: Icoe mate.

1298 E. annuus (L.) Pers. Prosp. p. 74 (Stenactis belli-diflora A. Br.) (3528. 1701)

I – III. Dell'America Sett. ora diffusa spontaneamente in tutta la provincia.

Selva, Volpago, Camalò, entro lo stesso Montello, Conegliano (anche Béreng. 1844) Vittorio ... dal 1858; Treviso (anche Trotter 1909!); Castelfranco, Godego, Resana (Bég. 1909!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Asolo (Zanardini, 1826!); Fagarè, Pederobba al Piave (Bég. 1909!, Minio n. 35).

1299 E. acer L. Prosp. p. 74 (3530. 1550)
I–III. Campestre, ruderale, alveale. Selva, Camalò, Sant'Andrà, alveo del Piave (anche Béreng. 1844!) ... fino dal 1861; Valdobbiadene (Favero 1844!); Asolo (Bolz. n. 10); Pederobba (Bég. 1909!); Vittorio (anche Pamp. n. 40); Collalti (Dom. Montini, 1872!); Grappa (Bizz. 1878! Bolz. n. 11) — Var. corymbosus (Weihe). San Martino d'Asolo (Bolz. MS.)

Matricaria (Tourn.) Linn.
1300 M. Chamomilla L. Prosp. p. 77 (3534. 1415. R)
I–IV. Ortiva, ruderale, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1859; Fagarè, Lenson, Resana, Castelfranco (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) — Vulgo: Camomila, Camamila.

Chrysanthemum (Tourn.) Linn.
1301 Ch. Leucanthemum L. Prosp. p. 77. (3541. 1550)
I–IV. Pratense, marginale. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Cornuda, Treviso ... dal 1858; Godego, Castelfranco, Resana, Pederobba, Ponte di Piave (Bég. 1909!); Salgareda (Contarini 1825!); Grappa (Vaccari, n. 64) ♀ — Var. hispidum Boenn. Montello, 1906; Vittorio, 1907; Cansiglio (Dom. Sacc. 1897!); Cà Tron (Diratz. 1915!); Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!); alveo del Piave (anche Minio, n. 35); Asolo, Fonte (Bolz. MS.) — Var. coronopifolium Rchb. Prosp. p. 78. Montello, 1861, Valdobbiadene (Béreng. 1845!) — Var. pallidum Fiori. Alveo del Piave (Minio n. 35) — Var. heterophyllum (W.) Prosp. p. 78 (Chr. atratum L. exp.) = Chr. Bauhini Tausch. Passo S. Boldo (Pamp. in Fl. ital. ex. n. 177.); Miane (Pamp. in Bolz. MS.); Grappa (Vacc. n. 64, Bolz. MS., Coban, 1906); Cansiglio (Béreng. 1841); S. Martino d'Asolo (Zanard. 1827!) —

♀ Vulgo: Me-utu-ben-me-utu-mal, Oci de bò, Margarite.

Var. montanum (L.) Monfenera (Art. Rossi in Bolz. n. 23); Grappa (Montini in Bertol., Contarini, 1825!, Bolzon MS., Bizzoz. 1878!)

C Chr. Balsamita L. (3344) Var. tanacetoides Boiss. Prosp. p. 77 (Tanacetum Balsamita L.).
I–III. Probabilmente d'origine asiatica. Coltivato comunemente e quasi naturalizzato. Vulgo: Salvia romana.

CA Chr. indicum L. (3545. 1796)
I–III. Della Cina e Giappone. Coltivato comunemente in numerose ~~varietà~~ variazioni. Var. sinense (Sabine). Coltivato come il tipo – Var. rusticanum Goiran. ~~Coltivato~~ si tiene comunemente anche negli orti del contado, dove si moltiplica spontaneamente. Vulgo: Autunnali (tutte le varietà)

CA Chr. Parthenium (L.) Bernh. ~~Prosp.~~ Agg. p. 23 (Pyrethrum Parthenium Smith) (3546. 1550 R)
I–III. Spontaneo in più luoghi d'Italia. Coltivato (spesso a capolini doppi) e quasi naturalizzato e talora sporadico qua e là, come Selva, Treviso, Conegliano, Vittorio .... dal 1861 ♀ Var. flosculosum DC. Subspontaneo sulle cime del colle S. Martino di Asolo (Bolz. n. 26).
♀ Vulgo. Erba de la mare e (per errore): Camamila romana.

1302 Chr. corymbosum L. Prosp. p. 78 (3547. 1554)
II–III. Nemofilo, rupestre. Montello, Colfosco, Valdobbiadene, Vittorio .... dal 1860; Asolo e Grappa (Bolz. n. 11); Piai di Cozzuolo (Pamp. n. 44); Collalti (Dom. Montini, 1872!); Pederobba (Beg. 1909!) – Var. Clusii (Fisch.). Asolo sul colle S. Martino (Bolz. MS.)

1303 Chr. vulgare (L.) Bernh. Prosp. p. 76 (Tanacetum vulgare L.) (3549. 1415)
I–III. Sepincolo, riparo: Selva, Giavera, Covolo, Vittorio, Montello ... dal 1858 ♀ Anche coltivato – Var. crispum Pers. Coltivato frequentemente
Vulgo: Erba Mus'cio.
(Resana (Beg. 1909!), Salgareda (Contar. 1825!)

Artemisia (Tourn.) Linn.

1904 A. camphorata Vill. Prosp. p. 76 (3551. 1415)

II – IV. Rupestre, sassicola, murale, alveale. Comunissima nell'alveo del Piave a Nervesa (anche Bizz. 1881), Falzè, Covolo, sui colli di Cornuda, Colfosco, Vittorio, Valdobbiadene, ... dal 1859; Ponte di Piave, Zenson, Pederobba (Bég. 1909!) – Var. saxatilis (W. K.). Grappa (Art. Rossi e Biggoz. 1880). Vulgo: Santonico falso o de monte.

colle S. Giorgio di Asolo e Masèr (Bolz. MS.)

CA A. Absinthium L. Prosp. p. 76 (2553. 1550 R)

I – III. Ortiva, domofila. Forse di origine orientale. Coltivata comunemente e spesso sporadica, come a Selva, Conegliano, Vittorio ... dal 1858; nel Grappa infer. (Sternb. 1803, n. 59); colli Asolani (Zanard. 1827!). Lo Sternb. l.c. ricorda anche l'Art. Abrotanum, ma sicuramente coltivata. Vulgo: Bon-maistro

1905 A. vulgaris L. Prosp. p. 76 (3557. 1415)

I – IV. Sepineola, riparia, marginale, nemofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Montello, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) – Var. aromatica Sacc. A typo recedit odore forti aromatico, foliis infra minus albo-canescentibus, statura graciliore. Nel basso Trevigiano, infesta alle colture, 1907 (Gius. Benzi) – Var. eriantha Gus. Altivole presso Asolo (Bolz. n. 26) – Var. angustisecta Fiori. Vidor lungo il Piave (Bolzon, n. 26)

C A. Dracunculus L. Prosp. p. 76 (3563. 1415)

I – III Originaria della Russia orient. e Asia sett. Coltivata qua e là negli orti, come a Selva, Vittorio, Treviso ... dal 1860 – Vulgo: Dragòn, Erba Dragòn.

1906 A. campestris L. Prosp. p. 76 (3565. 1554)

II – IV. Rupestre, murale, xerofila. Vittorio, specialmente comune a Serravalle, dal 1861 (anche Béreng. 1839!); sopra Solighetto (anche Contarin. 1825!); Nove, Fadalto (anche Pamp. in Bolz. MS.)

Anthemis Linn.

1307 A. Cotula L. Prosp. p. 77 (3569. 1415)
I–III. Campestre, marginale, ruderale, ortiva. Quasi tutta la provincia: Selva, Giavera, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso, Montello ... dal 1861; Ca' Tron (Dirat. 1915!); Pederobba (Bég. 1909!) Vulgo: Camamilla mata (ma spesso si confonde colla vera!)

1308 A. arvensis L. Prosp. p. 77 (3573. 1415)
I–III. Campestre, marginale, ruderale, ortiva. Quasi tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso, ... dal 1859. Cresce promiscua colla precedente. Vulgo. Camomila o Camamila mata.

1309 A. Cota L. (3584. 1532).
II–III. Ruderale, marginale. Serravalle intorno la cavallerizza della Caserma 1912, rara.

C A. nobilis L. Prosp. p. 77 (3577. 1586)
I–III. Indigena qua e là in Italia, ma spesso coltivata e talora sporadica. Vulgo: Camomila romana. Talora nelle farmacie ~~a questa~~ sono sostituiti a questa specie i capolini (doppi) del Chrysanthemum Parthenium.

R A. ~~[illegible]~~ alpina L. (3578. 1723)
IV. Sassicola, arenicola. Grappa (Sprangi!). Da confermarsi la località.

R A. tinctoria L. Prosp. p. 77 (3588. 1550. R)
III. Pascoliva, ruderale, xerofila. Nel Trevigiano (Trucchia MS.); colli attorno Vittorio (Pamp. in Bolz. n. 12). Da confermarsi ~~[illegible]~~ l'indigenato.

Achillea Linn.

1310 A. Clavenae L. Prosp. p. 77 (3592. 1595)
IV. Pascoliva, rupestre. Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Montini-Parolini in Bertol., Bigg. 1878!, Zanardini 1827!, Sprangi!, Cobau, 1906! — Consiglio alla Palantina 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); M. Pizzoc (Pamp. n. 38) — Var. intercedens Heimerl. Cima del Grappa (Bolz. MS.) — Vulgo: Assengio de montagna.

R A. atrata L. (3594. 1713)
IV. Rupicola, igrofila. Grappa (Spranzi!). Ubicazione da confermarsi — Nello Erbario Zanardini trovansi esemplari di A. Ageratum L., come provenienti dal Grappa, ma, evidentemente, si tratta o di uno scambio di schede o di pianta coltivata.

R A. tormentosa L. Prosp. p. 77 (3600. 1565)
II-III Pascoliva. Colli del Trevigiano (Fracchia MS.). Da confermarsi

1311 A. Millefolium L. Prosp. p. 77 (3601. 1415)
I-IV. Pratense, pascoliva, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Giavera, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso (anche Trott. 1909!) ... dal 1860; Ponte di Piave Pederobba, Fogare, Castelfranco, Resana, Lenson (Beg. 1909!); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!); Cà Tron (Dirals. 1915!); Collalti (Dom. Mont. 1872!); Grappa (Vacc. n. 64 Trovansi egualmente frequenti le fm. albiflora e rubra Sadl. — Var. lanata Koch (non Spr.) Monti intorno Vittorio, 1865 — Var. elegans Posp. Colli di Masèr (Bolz. MS.) — Var. scabra (Host) Intorno Asolo (Bolz. MS.)

1312 A. tanacetifolia All. Prosp. p. 77 (3661 η. 1550).
I-III. Marginale, sepincola, nemofila. Montello, Selva, Camalò, Vittorio .... dal 1861; Collalti (Dom. Montini, 1872!); Asolo al Foresto nuovo (Bolz. MS.) + Var. distans (W. K.). M. Grappa, M. Endimione (Bolz. MS.)

R A. macrophylla L. (3591. 1552).
III. Ortiva. È menzionata da E. De Toni n. 29, come nascente nel giardino Giariati in Vittorio. Ora non esiste più ed è da confermarsi.

Santolina (Tourn.) Linn.

C S. Chamaecyparissus L. (3604. 1532. R)
I-III. Dell'Italia meridionale. Coltivata nei giardini ed orti, come a Selva, Treviso, Vittorio .... 1870. Vulgo: Santolina

Filago Linn.

1913 F. germanica L. Prosp. p. 75 (3613. 1415)
I – III. Marginale, campestre, ruderale: Selvas, Camelo, Volpago, Montello ... dal 1858; al Forame del Montello (Fr. Sauardo, 1894!); Valdobbiadene (Bérenq. 1844!) – Var. canescens (Jord.). Corbanese, Tarzo (Pamp. in Bolz. MS.) – Var. spathulata (Presl). Asolo sul colle S. Martino (Bolz. MS.)

R. F. arvensis L. (3614. 1697)
II – III. Campestre. Colli di Asolo (Zanardini, 1827). Da confermarsi, benchè probabile.

Antennaria Gaertn.

1914 A. dioica (L.) Gaertn. Prosp. p. 76 (Gnaphalium dioicum L.) (3618. 1532)
IV. Pascoliva. Endimione, 1863; Cansiglio alla Palantina e Cadolten, 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); Grappa, Cansiglio e Faìs (Contarini 1825!); Grappa (Bizz. 1878!, Vaccari, n. 64, Dom. Montini, 1872!, Gio. Montini e Trevisan in Bertol., Coban, 1906!) – Var. gallica Camus. Prati nella sommità del Grappa (Bolz. MS.)

1915 A. carpathica (Wahlenb.) R. Br. Prosp. p. 76 (Gnaphalium carpathicum) (3619. 1595)
IV. Pascoliva, rupicola: Grappa (Montini in Bertol., Spranzi!)

Leontopodium R. Br.

1916 L. alpinum Cass. Prosp. p. 76 (Gnaphalium Leontopodium L.) (3620. 1532)
IV. Rupicolo, pascoliva, igrofilo. Cansiglio 1861, 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); Col Vicentin (Pamp. in Bolz. n. 12) (P. Rasi 1899!); M. Cesèn (Bolz. n. 12); Grappa (Parolini, Montini in Bertol., Spranzi!, Zanardini 1827, Vaccari n. 64) Scalarè del Grappa (Bolz. n. 12); Domaor del Grappa (Bizz. 1878!); fra Savassa e Faì, a soli 350 m. (Pamp. n. 44) – Var. dentatum Pamp. Col Visentin (Pamp. n. 36) – Vulgo: Stella d'Italia, Stela alpina

Gnaphalium Linn.

1917 G. luteo-album L. Agg. p. 23 (3622. 1532)

I – III. Ruderale, arenicolo, igrofilo. Vittorio alle sorgenti del Caldieron 1864; Camalò lungo un ruscello, 1866; presso Treviso (Moricand, Romano! herb. Pat.); Vittorio (Dom. Sacc. 1890!); Pagnano d'Asolo (Bolz. n. 10) Ca' Tron (Dratz. 1915!); Vittorio a S. Rocco e sponde del Lago Morto (Pamp. n. 44).

1318 G. uliginosum L. Prosp. p. 76 (3623. 1754)
II – IV. Nemofilo, igrofilo, eliofobo. Montello (anche Bizz. 1881!), Selva e Bavaria (sfuggito dal Montello); Grappa (Ant. Saccardo, 1883!); S. Pietro di Feletto (Pamp. in Bolz. MS.)

1319 G. silvaticum L. Prosp. p. 76 (3624. 1532)
II – IV. Nemofilo, xerofilo. Montello comune, 1861; laghetti di Revine (Pamp. in Bolz. n. 12); Cansiglio, comune, 1869 (anche Dom. Sacc. 1897!); Valdobbiadene, 1870 (anche Favero, 1845!); Val dei Pezzi sotto il grappa (Contarini, 1825!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vaccari n. 64, Bolz. MS.) Grappa e Collalti (Dom. Montini, 1872!) – Var. stramineum Beck. Boschi di S. Boldo verso il Pian della Corda (Pamp. in Bolz. MS.)

1320 G. supinum L. Prosp. p. 76 (3625. 1674)
IV. Pascolivo. Cansiglio 1869; monti di Valdobbiadene (Bérenq. 1844); Grappa Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Spranzi! C. Massal. e Bizz. 1877; Prevale la fm. allungata a capitoli pedicellati, cioè la var. fuscum (Scop.)

Inula Linn.

CA I. Helenium L. Agg. p. 22 (3634. 1415)
I – IV. Igrofila, ~~subpalustre~~ ortiva. Presso Castelfranco e Romano (Parolini herb.); presso il Grappa (Zanardini, 1827!). È probabile che le specie nelle ricordate località ~~fosse~~ si trovasse soltanto avventizia, sfuggita dagli orti, dove in passato assai di sovente si coltivava.

1321 I. hirta L. Prosp. p. 74 (3636. 1550)

I – III. Pratense, pascoliva, eliofila. Selva, Camelò, Paderno 1861; Serravalle 1870; Boccaor (Bolz. MS.) – Var. multiflora Spenn. Agg. p. 22 (var. plejocephala Heuff.). Monti sopra Serravalle 1870 – Var. rotundifolia Beck. Monti sopra Serravalle, 1871; Asolo, Cornuda (Bolz. MS.)

1922 I. ensifolia L. Prosp. p. 74 (3637. 1713)
II – III. Alveale, arenicola. Alveo del Piave a (alveo del Monticano) a Nervesa, Falzè, Covolo ... dal 1861; Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 12) Passo S. Boldo (Pamp. n. 38); Feletto (Fracchia!).

1923 I. spiraeifolia L. Prosp. p. 74 (I. squarrosa L.) (3638. 1550)
III. Pratense, pascoliva, xerofila. Sopra Vittorio 1861; Cansiglio (Mari n. 33) Viadi di Borso del Grappa (Bolz. MS.).

1924 I. salicina L. Prosp. p. 74 (3639. 1415).
II – III. Pratense, dumale. Montello ai margini, frequente, 1860; Castelfranco, Resana (Bég. 1909!) – Var. ~~polycephala~~ multiflora Spenn. Cà Tron (Divatz. 1915!)

1925 I. Britannica L. Prosp. p. 75 (3640. 1595)
I. Igrofila, ruderale, domofila. Appiè delle mura di Treviso 1864 (anche Fracchia!); lungo i muri della riviera Regina Margherita ed a Mogliano, 1866; lungo il Livenza presso Portobuffolè (Bérenz. 1841!)

1926 I. Conyza DC. Prosp. p. 74 (3644. 1550)
I – III. Riparia, sepincola, murale. Selva, Valpago, Giavera, Montello, 1858; mura di Treviso e presso Porta S. Tomaso (ora Mazzini) (Fracchia! Favero 1845!); Vittorio, Valdobbiadene 1868; Asolo (Bolz. MS.)

Palicaria Gaertn.

1927 P. vulgaris Gaertn. Prosp. p. 75 (3651. 1555)
I – III. Riparia, igrofila, subpalustre. Selva, Camelò, Falzè al Piave ... 1861; Treviso (anche Fracchia!), Vittorio, 1869; Orsago (Pamp. in Bolz. MS.)

1328 Galicaria dysenterica (L.) Gärtn. Prosp. p. 75 (3652. 1415)

I – III. Riparia, marginale, igrofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Valpago, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1858; Mogliano (Moger, Romano Herb. Pat.); Ca' Tron (Strafg. 915!); alveo del Piave (anche Mirio n. 35); Godego, Castelfranco, Ponte di Piave, Zenson (Bég. 1909!); Cogollo (Parm. in Fl. ital. exs. n. 380!); Salgareda (Contarini 1825!); Asolo, Montano Vidor (Bolz. MS.)

1329 Carpesium Linn.

C. cernuum L. Prosp. p. 75 (3654. 1553)

I – III. Sepincolo, eliofobo, marginale. Selva, Giavera, Montello (anche Bizz. 1832!), Vittorio ... dal 1861; Portobuffolè (Berieng. 1845!); Colli asolani (Zanard. 1827!); Segusino, Asolo (Bolz. n. 11. MS); fra Follina e Valdobbiadene (Parm. in Fl. it. exs. n. 1875!)

Buphthalmum Linn.

1330 B. salicifolium L. Prosp. p. 74 (3658. 1532).

I – III. Pratense, remofilo, dumale, sepincolo. Montello, Selva, Cornuda, Lancenigo, Vittorio (anche Fiori Herb. Pat.!); colli asolani (Zanard. 1827! e Bolz. MS.); S. Zenone (Bég. e Strafg. 1911!), Valdobbiadene (Favero 1845!); Pederobba e vicino alveo del Piave (Béguin. 1909!); Salgareda e Solighetto (Contarini, 1825!); Ponte di Piave a Negrisia (Bég. 1909!); Groppa (Bizz. 1878!, Vacc. n. 64). Varia a foglie caulinee più o meno anguste e a pubescenza più o meno pronunciata. – Var. microanthum Gouan. Mesòr (Bolz. n. 26).

Calendula Linn.

C. officinalis L. Prosp. p. 79 (3667. 1415 R.)

I – III. Il tipo ed alcune var. crescono spontaneamente in più luoghi d'Italia. Nel Trevigiano però si coltivano la var. hortensis Fiori e talora trovasi avventizia. – Volg.: Fior da morto

Rudbeckia Linn.

A R. laciniata L. Agg. p. 23. (3666. 1642)
II. Oriunda dell'Amer. sett. Avventizia presso le siepi a S. Croce Bigolina ai confini verso Castelfranco (P. Montini, 1872!)

Helianthus Linn.

C H. annuus L. Prosp. p. 75 (3667. 1568)
I–III Del Perù e Messico. Coltivato comunemente. Vulgo: Girasol.

C H. tuberosus L. Prosp. p. 75 (3668. 1606)
I–III. Dell'America sett. Coltivato ~~comunemente~~ qua e là. Vulgo Topinambur.

C H. multiflorus L. Prosp. p. 75. (3668 A. 1660)
I–III. Della Virginia. Coltivato qua e là per ornamento

Dahlia Cavanilles

C D. pinnata Cav. Prosp. p. 85 (Dahlia variabilis Desf.) (3669. 1798)
I–III Del Messico. Coltivata comunemente in numerose varietà. Vulgo: Dalia, Giorgina.

Bidens Linn.

1331 B. cernua L. Prosp. p. 75 (3670. 1583)
I–III. Idrofila, riparia. Tutta la provincia: Selva, Giavera, Conegliano, Vittorio, Treviso (anche Bérenq. 1837!), Cornuda.... dal 1858 – Var. radiata DC. Asolo verso Ca' Biadene (Bolz. MS.) – Var. minima (L.). Ner sit. meno umidi qua e là.

1332 B. tripartita L. Prosp. p. 75 (3672. 1551)
I–III. Idrofila, riparia. Tutta la provincia; Selva, Volpago, Cornuda, Treviso (anche Bérenq. 1837!), Montello (anche Bigg. 1881!), Vittorio, Revine ... dal 1858 – Var. hybrida (Thuill.). Asolo e Monfumo (Bolz. n. 26) – Var. minor W. et Gr. Asolo, lungo il Forestuzzo (Bolz. MS.)

1333 B. bidens bipinnata L. Prosp. p. 75 (3674. 1701)
I – III. Oriunda dell'America tropicale e boreale. Ora spontanea in tutta le provincia: Treviso (anche Bizz. 1881!), Paderno, Ponzano, Camalò, Volpago, Montebelluna, Selva, Montello (anche Bizz. 1872!), Conegliano, Vittorio... dal 1861. Nel Trevigiano deve essersi diffusa dopo il 1850, ~~giacchè~~ altrimenti si troverebbe nelle raccolte di Bérenger, Kellner, Fracchia, Favero ecc.

A B. heterophylla Ortega (3675. 1799)
III. Oriunda del Messico. Ora da più tempo è avventizia a Cozzuolo (Pampanini in Bolz. n. 21).

Galinsoga R. et Pav. (Agg. p. 22 (3676. 1801))
1334 G. parviflora Cav.
I – III. Originaria delle due Americhe; ora abbondantemente avventizia a Selva, Volpago (anche Fr. Sacc. 1890!), Corunda (anche Trott. 1906!), Treviso, Vittorio... dal 1864; Cozzuolo (Pamp. in Bolz. n. 12 e MS.); Fratta di Tarzo, copios. (Pamp. n. 44); Pederobba (Bég. 1909!); S. Zenone degli Ezzelini nell'orto degli Armeni (Bég. e Diratz. 1911!) e in Fl. ital. exs. n. 687 bis)

Zinnia Linn.
CA Z. violacea Cav. 1791. Z. elegans Jacq. 1793 (3676 A. 1780)
I – III. Del Messico. Coltivata frequentemente negli orti e talora fuggiasca p.e. a Selva, 1866, presso Treviso (Béreng. 1837!). Vulgo: Zinia.

Cosmos Cavanilles
C C. bipinnatus Cav. (3676 C. 1798)
I – III. Del Messico. Coltivato ora frequentemente per ornamento e talora sporadico. – Vulgo: Cosmea

Coreopsis Linn.
CA C. tinctoria Nutt. (3676 B. 1820)
I – III. Dell'America sett. Coltivata frequentemente ed ora spesso sporadica come a Selva, 1865, Vittorio 1866. Vulgo: Stelete.
presso le case,

Xanthium (Tourn.) Linn.

A X. spinosum L. Prosp. p. 86 (3678. 1704)
I. Originario dell'America merid. Di rado avventizio nel Trevigiano, come pr. Caerano, 1861.

1335 X. strumarium L. Prosp. p. 86. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Montello (anche Bizz. 1872!), Treviso, Vittorio... dal 1861; Salgareda (Contarini, 1825!)

1336 X. italicum Moretti. Prosp. p. 86 (3680. 1745)
I–II – Campestre, ruderale. Selva, Montello, Gravera, Spresiano, Fontane, Vittorio... dal 1861; Treviso fuori porta Cavour (Pamp. in Bolz. MS.)

Echinops Linn.

1337 E. sphaerocephalus L. Prosp. p. 79 (3681. 1532)
II–III. Rupestre, ruderale. Serravalle sulle rupi del c. d. Ovoido, presso l'Albergo Giraffe, 1861–1915 (ora scomparso); via Cavallotti in Vittorio, 1907 (ora scomparso). (anche Pamp. n. 44)

Carlina (Tourn.) Linn.

1338 C. acaulis L. Prosp. p. 80 (3690. 1550)
III–IV. Pratense, pascoliva. Cornuda, Pederobba, Vittorio, Cansiglio... dal 1862. Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Bolz. MS.); Collalti (D. Montini, 1872); Asolo al colle di S. Martino e Montagna grande (Bolz. MS.) — Var. alpina Jacq. Prosp. p. 80 (var. caulescens (Lam.). Colle specie qua e là — Var. plejocephala Rapin. Versante occidentale dei Piai di Vittorio (Pampanini in lett. 1916).

1339 C. vulgaris L. Prosp. p. 80 (3691. 1552)
I–IV. Pascoliva, ruderale, marginale, xerofila. Quasi tutta la provincia: Selva, Montello, Camalò, Volpago, Conegliano, Vittorio, Cornuda... dal 1861; colli asolani (Contarini 1827!); Asolo e Masèr (Bolz. MS.); Grappa (Art. Rossi, 1880!) — Var. semiamplexicaulis Form. Sopra Possagno e Crespan (Bolz. MS.).

Varia nell'indumento lanoso più o meno pronunciato.

Xeranthemum Linn.

C X. annuum L. Prosp. p. 81 (X. radiatum Lam.) (3699. 1745)
I–III Spontaneo qua e là in Italia. Coltivato per ornamento negli orti e talora sporadico. Vulgo: Semprevivo, nome che si applica pure all' Helichrysum orientale DC. (3626 A. 1762), spesso pure coltivato, oriundo di Creta e Grecia

Staehelina Linn.

R. S. dubia L. (3700. 1757)
Questa specie è ricordata dalla Fl. anal., da Bolzon n. 17 e Vaccari n. 64, sulla fede di Bizzozero e di Art. Rossi, come raccolta sul M. Grappa; ma nell' Erb. Bizz. manca e l' Erb. Rossi (già conservato nel Seminario di Treviso) andò guasto e disperso. Quanto all' habitat non sembra del tutto incompatibile, visto che la specie nasce nel Bergamasco, nel Pavese ecc., però pel Grappa ha bisogno di riconferma.

Arctium Linn.

1340 A. Lappa L. var. minus (Bernh.) Prosp. p. 80 (3704. 1415). ~~Le~~
I–III. Campestre, marginale, ruderale. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860. Finora le genuine var. majus e tomentosum (ricordate nel Prosp. p. 80) non sono confermate nel Trevigiano, trattandosi invece di semplici modalità del minus. Vulgo: Slavaz.

Serratula Linn.

1341 S. tinctoria L. Prosp. p. 80 (3707. 1415)
I–IV. Pratense, nemofila, sepincola. Montello, Cornuda, Valdobbiadene, Pederobba, Conegliano, Vittorio ... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.) – Var. albiflora. Montello, rara, 1871 – Var. indivisa (Poir.) Masèr (Bolz. MS.); Montello 1861 (anche Bizz. 1872!); Portobuffolè (Béreng. 1841!), Pederobba (Bég. 1909!); Bosco Fagarè (Bolz. MS.) – Var. heterophylla Wallr. Colli di Asolo (Bolz. MS.) – Var. germanica (Wiesb.). Crespignaga e b. Fagarè (Bolz. MS.) – Var. microcephala Rouy. B. Fagarè e nel Monfenera (Bolz. MS.) – Var. reducta Rouy. Colle S. Giorgio sopra Masèr (Bolz. MS.)

Centaurea Linn.

1342 C. Rhaponticum L. Agg. p. 23 (Serratula Rhaponticum DC) (3716. 1550)
IV. Pascoliva. M. Grappa presso il Cason del Sol (Bizzozero e A. Rossi!) Grappa (Bolz. MS.); sopra Fadalto sul M. Faverghera (Pamp. in Bolz. n. 29) — Var. lyrata (Bell.) (= helenifolia (Schulz. Bip.) Domador del Grappa (Bizz. 1878!); Grappa (Montini sec. Vacc. n. 64); M. Meata del Grappa, m. 1400-1500 (Bolz. MS.)

1343 C. Jacea L. Prosp. p. 81 (3719. 1785)
I - IV. Pratense, nemofila, sassicola, xerofila. Montello, Selva, Giavera, Vittorio, Cornuda, Pederobba ... dal 1858; basso Trevigiano (Béreng. 1841) — Var. amara (L.) (1666). Montello, Nervesa (anche Bizz. 1881!), Cornuda, Vittorio ... dal 1861; alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. 1892! e n. 10) — Var. virescens Caldesi. Cason d'oro e Scalarè del Grappa (Bolz. MS.) — Var. bracteata DC. Asolo al colle Arguta (Bolz. MS.) — Var. vochinensis (Bernh.) (1551) Prosp. p. 81 (Cent. nigrescens W. et Auct. Venet.). Quasi tutta la provincia (meno comune la fm. albiflora): Selva, Cornuda, Susegana, Vittorio, Treviso, Paderno, Vittorio, Pederobba, copiosamente ... dal 1861; Fagarè, Zenson (Bég. 1909!); Ca' Tron (Divatz. 1915!); Grappa (Coban, 1906, Vaccari n. 64) Collalto (D. Montin. 1872!); Asolo (Bolz. MS.) — Var. pratensis (Thuill.) (1869). Montello 1905 (fm. albiflora). Portobuffolè (Béreng. 1841); Conegliano (Béreng. 1842!)

1344 C. uniflora L. (3723. 1552)
IV sassicola, pascoliva. Vertice del Grappa (Meneghini! Zanardini 1827!) — Var nervosa (W.) Prosp. p. 81 c. spec. M. Grappa (Parolini, Montini in Bertol., Bizz. 1878!, Coban 1906!, C. Mass. 1877!, Bolz. n. 26) — Var. Thomasiana (Dalla Torre). Col Vicentin a 1700 m. (Pamp. in Bolz. n. 26)

1345 C. phrygia L. (3724. 1837)
IV. Pascoliva, Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Vaccari n. 64). La forma veneta è sec. Fiori Fl. anal. la var. pseudophrygia (C. A. Meyer).

1946 C. Cyanus L. Prosp. p. 81 (3726. 1532. R) 154

I – III. Campestre, segetale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, (anche Bér. 1842), Vittorio, Godego, Castelfranco (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. Ms.). Vulgo: Batisciosola, Batasciosola. (.... dal 1858;

1947 C. montana L. Prosp. p. 81 (3727. 1550)

III – IV. Nemofila, pascoliva. Monti sopra Serravalle e Valdobbiadene... dal 1861; Faìs (Contarini 1825!); Monfenera (Bigg. 1879!); sopra Asolo (Bolz. n. 10); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Zanardini 1827!); Collalti (D. Montini 1872!) — Var. Triumfetti (all.) (= C. axillaris W.). Monfenera (Bolz. n. 26); colli Asolani e Monfumo, Boscon sopra Borso (Bolz. n. 26); Campo del Grappa (Sternb. 1803, n. 59 (C. montana β) — Var. pallida Fiori (Boccaor e Borso (Bolz. Ms.) — Var. calvescens Briq. Montagna grande di Asolo e Grappa (Bolz. Ms.) — Var. stricta (W. et K.). Montagna grande di Asolo (Bolz. Ms.).

1948 C. paniculata L. Prosp. p. 81 (3732. 1631). Var. maculosa (Lam.)

II – III. Alveale, arenicola. Letto del Piave a Nervesa, Falzè, Corolo.. dal 1861; Conegliano (Béreng. 1842!); Pederobba al Piave (Bég. 1909!)

1949 C. Scabiosa L. Prosp. p. 81 (3734. 1551)

I – III. Marginale, ruderale, xerofila. Selva, Camalò, Pongano, Cornuda, Treviso, Vittorio.... dal 1861; Pederobba (Bég. 1909!) — Var. tenuifolia Schleich. Vittorio, 1869; Asolo (Bolz. Ms.); Pederobba (Bég. 1909!) Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!) — Var. integrifolia Gaud. Asolo (Bolz. Ms.) — Var. variifolia (Lois.). Pederobba, Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!).

A C. ragusina L. Prosp. p. 81 (3735. 1675)

II – III. Spontanea nell'isola Pelagosa (Adriatico). Da molti anni naturalizzata e subspontanea nelle mura del Castello S. Salvatore di Susegana 1866 (anche Bracht!, Montini, Fracchia 1843!, Bérenger 1842!, in Bertol.

1250 C. rupestris L. Agg. p. 24 (3736. 1550)
IV. Rupicola. Collalti (Zanardini 1827!); rupi di Solagna ai confini col Trevigiano (Ball n. 1).

1251 C. alpina L. (3741. 1620)
IV Nemofila. Gruppo del M. Grappa (Ball, n. 1 (1868)

1252 C. Calcitrapa L. Prosp. p. 81 (3747. 1551)
I. Ruderale, domofila. Mura di Treviso, 1868 (anche Fracchia 1850!); mura del Castello S. Salvatore di Susegana 1864 — Var. horrida Ten. Strade di Treviso, 1868.

Carthamus (Tourn.) Linn.
1253 C. lanatus L. Prosp. p. 81 (Centrophyllum lanatum Rchb.) (3752. 1550)
I–III. Ruderale, marginale, xerofilo. Selva, Valpago, Biadene, Treviso (anche Fracchia! e Zanardini 1827!), Vittorio ... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.)

Cnicus (Vaill.) Linn.
C. benedictus L. (3751. 1550)
C I–III. Campestre, nemofilo. Spontaneo in più luoghi d'Italia. Coltivato qua e là, come a Miane intorno 1843 (Béreng.!)

Carduus (Tourn.) Linn.
1254 C. nutans L. Prosp. p. 80 (3757. 1551)
I–IV. Ruderale, marginale, xerofilo. Quasi tutta la provincia: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Godego, Castelfranco (Bég. 1909!); Pederobba (anche Bég. 1909!); Grappa (Bizz. 1878!) Var. albiflorus. Ciano, Paderno, Selva, meno comune — Var. platylepis (Saut.). Margine a Selva, 1900-1901 (anche nella fm. albiflora); Cansiglio (Mari n. 33 sub C. spinulosus Bert.)
Vulgo: Salata del diaol o diavolo

1255 C. defloratus L. Prosp. p. 80, Agg. p. 23 (3759. 1552)

III - IV. Pascolivo, dumale. Intorno il lago Morto, lungo il Meschio, nel Cansiglio ... dal 1862; passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 991, Trott. 1914!); M. Crep sopra Miane (Béreng. 1845!); Grappa (Vacc. n. 64, Sternb. 1803, n. 59, Bizz. 1878!); Ardosa sopra Crespan (Zanardin. 1827!). La fm. più comune è C. summanus Poll. — Var. rhaeticus DC. Passo S. Boldo (Pamp. Fl. it. exs. n. 992!); M. Oro sopra Borso (Bolz. MS.) — Var. carlinifolius Lam. (= C. montosus Poll. ex p.). Boccaor di Crespan (Montini in Bertol.); presso Vittorio, 1861; Cansiglio (Béreng. 1838!, Kellner!); Cansiglio a fiori rossi e bianchi, 1869.

1956 C. Personata (L.) Jacq. (3762. 1563)
IV. Nemofilo, igrofilo. Cansiglio (Béreng. 1838! sub C. arctioides, D. Sacc. 1897!) Grappa (Bizzozero, 1878!)

R C. pycnocephalus L. Agg. p. 23 (3769. 1552. R.)
I - II Marginale, ruderale. Nell'agro Trevigiano, probabilmente presso Treviso (Fracchia!). Da confermarsi.

R C. acanthoides L. Prosp. p. 80 (3765. 1820)
I - III. Marginale, xerofilo. Camalò, S. Palè (Pelagio), 1861; Cansiglio 1897! Da meglio esaminarsi se sia piuttosto una forma di C. nutans.

Cirsium (Tourn.) Adans.

1957 C. lanceolatum (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3784. 1415)
I - IV. Marginale, ruderale. Tutta la provincia: Selva, Nervesa, Conegliano, Vittorio, Cornuda, Valdobbiadene ... dal 1860; Ca' Tron (Diralz 1915!); Grappa (Vaccari n. 64) — Volgo: Salata del diaol o diavolo

1958 C. eriophorum (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3785. 1552)
III - IV. Pascolivo, pratense. Monfenera, M. Endimione, Cansiglio, ove è copiosissimo ... dal 1861; Asolo, Monfumo (Bolz. n. 11); M. S. Augusta di Vittorio 1869; Collalto (D. Montini, 1871!); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Zanardini, 1827!, Bizz. 1878!) — Var. spathulatum Gaud. Presso Asolo (Bolz. n. 10); Grappa (Vaccari, n. 64) — Var. ferox (DC.) Grappa (Vaccari n. 64).

1959 C. arvense (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3788. 1550)
I – IV. Campestre, segetale, ruderale. Var. Setosum (M. B.) Prosp. l. c. (var. mite W. et Gr.) Comune in tutta la provincia: Selva, Volpago, Gravera, Conegliano, Vittorio, Treviso ... dal 1860; Cansiglio (Béreng. 1839! D. Sacc. 1879!) — Var. horridum W. et Gr. Colla var. precedente, ma un po meno comune; Grappa (Vacc. n. 64); Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.) — Var. incanum Fisch. Qua e là: Selva, Vittorio 1861; Conegliano (anche Béreng. 1842!); Cà Tron (Dratz 1915!)
Vulgo: Astòn.

1960 C. palustre (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3789. 1745)
I – IV. Palustre e subpalustre. Treviso e Quinto presso il Sile 1861 (anche Tracchia! e Kellner 1840!); siti subpalustri del Cansiglio 1867 (anche Béreng. 1838!); Boscon sopra Borso (Bolz. MS.) — Var. albiflorum Zersi: M. Crep sopra Miane (Béreng. 1843!)

1961 C. pannonicum (L. fil.) Gaud. Prosp. p. 79 e (sub C. serratulo Dg.) p. 80 (3793. 1713)
I – IV. Pascolivo e pratense. Selva, Camalò, Arcade, Spresiano, Cusignana, Montello verso il Piave (anche Béreng. 1841!), Valdobbiadene, Susegana ... dal 1861; Crespan (Montini in Bertol.); Collalt. (Dom. Montini 1871!); B. Fagarè, Cozzuolo, Asolo (Bolz. 10. 14 e MS.); Pederobba (Bég. 1909!)

1962 C. Freyerianum Koch (C. pannonicum X acaule Naeg.) (3793 A. 1899).
III. Pascolivo. Versante settentrionale dei Piai di Cozzuolo 1904 (Pamp. n. 44). Nel 1912 il Pampanini trovò nello stesso luogo un ibrido secondario, ch'egli interpretò come C. pannonicum X Freyerianum.

1963 C. acaule (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3794. 1415)
III – IV. Pascolivo. Comune nei colli intorno Vittorio, Valdobbiadene ... dal 1864; Cansiglio 1867; Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Meneghini!, Bizz. 1878!, Spranzi! Bolz. MS.); Collalt. (D. Montini 1872!); Fais sopra Serravalle (Contarini 1825!)

R C. triaphaloides (Lam.) DC. (3797. 1718)
II–III. Ripario Sponde del fiume Piave (Béreng. Agostr. 1844 sub C. rivulare Link).
Da riesaminarsi e confermarsi.

1964 C. Erisithales (Jacq.) Scop. Prosp. p. 79 (3798. 1551)
II–IV. Nemofilo, eliofobo. Vallate del Montello e di Cornuda, raro, 1861; Serravalle, Cansiglio, Valdobbiadene, 1869; Pederobba (Bég. 1909!); Cavaso, Asolo, Boscon, M. Oro (Bolz. n. 10, 11); Grappa (Sternb. 1803, n. 59, Montini in Bertol., Bizzoz. 1878!); Collalti (Dom. Montini 1872!); Faìs di Serravalle (Contarini, 1825!)

1965 C. Dollineri. Schulz. Bip. (3798 A, 1843) (C. Erisithales × pannonicum Heer)
III Monti dei Piai sopra Ceneda (Pampanini in Fiori Fl. anal. IV p. 191 e in Vacc. Fl. ital. ex. n. 75, 75a 76 e in Bolz. MS.). Trovato nelle due forme erisithaloides Huter e Portaè Hausm. sec. Bolz.

1966 C. spinosissimum (L.) Scop. (3799. 1713)
IV – Pascolivo. M. Endimione nel luogo detto Mariec, sopra Valdobbiadene (Pampanini in Bolz. n. 13).

1967 C. oleraceum (L.) Scop. Prosp. p. 79 (3801. 1595)
I–IV. Ripario, subpalustre. Quasi tutta la provincia: Selva, S. Palè (Pelagio) Treviso, Giavera, Montello (anche Bizz. 1881) Cornuda, Vittorio, Cansiglio... dal 1861; Asolo, Crespignaga, Masèr (Bolz. 1890 e n. 11); Pederobba presso il Piave (Bég. 1909!) – Var. integrifolium Bogenh. Prato a Formeniga (Pamp. in Bolz. n. 12 sub. C. oleraceum × canum). Sec. Pamp. in Fl. it. ex. n. 1386 e Bull. Soc. bot. ital. 1910, p. 41–48 è una forma stagionale tardiva del C. oleraceum, non un ibrido, anche perchè il C. canum manca nella località.

Cynara (Vaill.) Linn.
C. C. Cardunculus L. (3804. 1320. R)

I – III. Spontaneo nell'Europa merid. ed Africa sett. Coltivato comunemente. Vulgo Cardo – Var. Scolymus (L.) (1550. R.) Coltivato e forse derivato colla coltura dal tipo. Vulgo: Articioco.

Onopordon (Vaill.) Linn.

1968 O. – Acanthium L. Prosp. p. 80 (3805. 1415)

I – III. Ruderale, marginale. Vedelago, raro 1863; lungo le vie nuove Cavallotti in Vittorio, 1907 (ora scomparso).

Subfam. Liguliflorae

Cichorium (Tourn.) Linn.

1969 C. Intybus L. Prosp. p. 82 (3815. 1415 R.)

I – IV. Campestre, ortivo, marginale. Tutta la provincia: Treviso, Selva, Nervesa, Cornuda, Conegliano, Vittorio.... 1859; Asolo (Bolz. MS); Ca' Tron (Diratz. 1915!) – Var. albiflorum Sacc. Prosp. p. 82 (1864), Rod. e Ven. (1893) Qua e là, a Selva, Vittorio dal 1863; Cozzuolo (Pamp. in De Toni n. 29) ♀ – Var. indivisum Vis., Prosp. p. 82 (var. hortense Blackw.). Coltivato dovunque e subspontaneo ♀ – Var. pumilum (Jacq.) = minimum Post (~~1822~~). Vie a Treviso (Moretti. Cfr. Flora 1822, II p. 736. Probabilmente è la fm. camefitica. ♀ Vulgo: Radicio. ♀ Vulgo: Radicio bon.

C. Endivia L. Prosp. p. 82 (3816. 1415. R)

I – III. Probabilmente d'origine indiana. Coltivato dovunque e talora sporadico. Vulgo Indivia.

Lapsana Linn.

1970 L. communis L. Prosp. p. 82 (3817. 1532)

I – IV. Sepincola, marginale, ortiva. Quasi tutta la provincia: Treviso, Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio... dal 1860; Resana, Castelfranco (Beg. 1909!); Ca' Tron (Diratz. 1915!). Vulgo: Cui de vecia.

Apósteris Neckar.

1971 A. foetida (L.) Less. Prosp. p. 82 (3820. 1606)

II – IV. Nemorila, igrofila. Montello, Cornuda, Vittorio ... Dal 1861; Asolo (Fiori 1897!, Bolz. MS.); Grappa (Vacc. n. 64 / Grappa e Monfumo (Bolz. MS.); Collalto (Don. Montini, 1872!)

Hypochaeris Linn.

1972 H. radicata L. Prosp. p. 83 (3827. 1550)

I – III. Pratensa, pascoliva, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Falzè, Colfosco, Cornuda, Conegliano, Vittorio ... Dal 1861; Ponte di Piave e Negrisia (Bég. 1909!). La forma più comune ha le foglie lirnate-runcinate.

1973 H. maculata L. Prosp. p. 83 (3828. 1702)

III – IV. Pascoliva. Montenero, sopra Val Bobbiadene, sopra Serravalle (anche Contarina 1825!), Cansiglio (anche Marsi n. 33) ... Dal 1861; M. Cimone presso Vittorio (Pamp. Fl. ital. exs. n. 192!); sopra Crespano (Zanardini 1827!) – Var. uniflora DC. (1815) [non Vill.] = monocephala DC. (1838). Pass. S. Boldo (Pamp. Fl. ital. exs. n. 193!); sopra Segusino (Bolz. n. 19 sub H. uniflora Auct. non Vill.); colle sopra Tarzo (Pamp. in Bolz. n. 12 / H. uniflora

R H. uniflora Vill. (3829. 1713)

III. Pascoliva. Nella località citata da Bolz. n. 19 e in Fl. anal., sopra Segusino non trovo questa specie, ma la var. uniflora della H. maculata; però crescendo la specie in più luoghi delle alpi Bellunesi, non è improbabile la sua presenza nel Trevigiano.

Leontodon Linn.

1974 L. hirtus L. (3835. 1563) Thrincia hirta (L.) Roth

III. Pascoliva, marginale, igrofila. Savazza fuori Serravalle (Trotter 1906!); Pedemonte nell'alveo del Piave (Bég. 1909!)

1975 L. autumnalis L. Prosp. p. 82 (3838. 1554)
II – IV. Pascolivo, pratense, nemofilo. Grappa (Sprang.! Vacc. n. 64, Cobau 1905!); monti sopra Vittorio (Dom. Sacc. 1897!) – Var. runcinatus Kitt. Caerano, Montebelluna, Cornuda (anche Trott. 1907!)... dal 1861; Valdobbiadene (Béreng 1844!) Collalti (Dom. Montini, 1872!); alveo del Piave a Pederobba (Bég. 1909!) – Var. pratensis (Rchb.). Pederobba presso il Piave una fm. luxurians (Bég. 1909!) – Var. alpinus (Gaud.). ~~Gau~~ Agg. p. 24 (L. Taraxaci Nym. non Auct.) Pascoli del Cansiglio. 1869.

R L. pyrenaicus Gouan. Prosp. p. 82 (L. saxatilis Rchb.) (3840. 1785)
IV. Nemofilo, pascolivo. Grappa (Montini, Parolini in Bertol.). Da confermarsi: potrebbe essere una forma di L. crispus.

1976 L. hispidus L. Prosp. p. 82 (3841. 1606)
I – IV. Pascolivo, pratense, marginale. Tutta la provincia, comunissimo: Selva, Cornuda, Conegliano, Vittorio, Treviso, Nervesa (anche Bigg. 1881!) Crespano... dal 1861 – Var. pinnatifolius Fiori. Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!); colle S. Martino d'Asolo (Bolz. Ms.) – Var. major (DC.). Ponte di Piave (Bég. 1909!) – Var. danubialis (Jacq. 1762) Prosp. p. 82 (L. hastilis L. 1763) (1551). Comune negli stessi luoghi del tipo: Nervesa (anche Bigg. 1881!); Treviso (anche Trott. 1909!); Cansiglio (anche Dom. Sacc. 1897!) – Var. dubius (Hoppe). Cansiglio (Béreng. 1841!) – Var. hyoseroides (Welw.). Marginale, riparo a Selva Vittorio 1906; Cornuda (Trott. 1906!); Asolo, colle fm. lucidus DC (Bolz. Ms.); Zenson, special. nell'alveo del Piave e a Resana (Bég. 1909!) – Var. ericetorum Rchb. Asolo al colle di S. Martino (Bolz. Ms.)

1977 L. crispus Vill. Agg. p. 24. (3843. 1745)
III Pascolivo, rupestre. Sopra Serravalle 1865; intorno Vittorio (Parup. n. 40); ai confini trevigiani verso il Bassanese (Ball n. 1); var. tergestinus Fiori. Alveo del Piave (Minio, n. 35)

1978 L. incanus (L.) Schrank. Prosp. p. 82 (3844. 1772)
III – IV. Rupicolo, nemofilo, xerofilo. Frontale di Crespan (Montini in Bertoloni)

1979 L. Berinii (Bartl.) Roth, Rchb. Prosp. p. 82 (3845. 1820)
II – III. Alveale. Letto del Piave a Nervesa, Falzè, Covolo, lungo il Montello (anche Kelln. 1844! Bracht!, Montini in Bertol., Béreng. 1841!, Bizzoz. 1881!); Valdobbiadene (anche Béreng. 1844!); Zenson (Bég. 1909!); Segusino, Covolo (Bolz. MS.); ghiaje presso Vittorio (Fr. Sacc. 1894!). Qui spetta secondo lo stesso Bolzon n. 25: Hieracium stelligerum Bolz. olim non Froelich.

Picris Linn.

1980 P. hieracioides L. Prosp. p. 82 (3846. 1551)
I – III. Pratense, pascoliva, marginale. Quasi tutta la provincia comune: Selva, Volpago, Vittorio, Conegliano, Cornuda, Treviso ... dal 1861; Crespano (Montini in Bertol.); Grappa (Bizz. 1878!); Pederobba (Bég. 1909!); Asolo (Bolz. MS.); Salgareda (Contarini 1825!)

Helminthia Juss.

1981 H. echioides (L.) Gaertn. Sacc. n. 53. (3849. 1550)
I – III. Campestre, ruderale, marginale. Colle della Madonna della Salute e via Cavallotti a Vittorio, Olarigo, 1890-1907; Treviso a Porta Cavour (Pamp. in Bolz. MS.); Ca' Tron (Dirab. 1915!).

Tragopogon (Tourn.) Linn.

1982 T. pratensis L. Prosp. p. 83 (3854. 1415)
I – III. Pratense, marginale. Quasi tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso .... dal 1861; Passo San Boldo (Trotter 1914!) — Var. orientalis (L.). Vittorio e Cornuda 1890; Ponte di Piave, Salgareda (Bég. 1909!); Sacc. n. 53. Asolo e Grappa (Bolzon MS.)

C

T. porrifolium L. Agg. p. 24 (3856. 1550. R)
I–III Spontaneo qua e là in Italia. Nel Bergiano talora coltivato e accarezzato negli orti.

Scorzonera Linn.

1983 S. hispanica L. (3861. 1550)
III–IV. Pascoliva. Passo S. Boldo sulla cima N. Campo a 900 m. (Pamp. in Boly. MS.) — Var. glastifolia (W.) Passo S. Boldo (Pamp. in Boly. MS.)
nella form. asphodeloides Wallr.

1984 S. humilis L. Prosp. p. 83 (3863. 1846)
II–III. Pascoliva, remofila. Montello presso la Valle dell'agna 1864-6; Conegliano (De Bracht e Kellner 1861!, Bereng. 1862!); Coppolo (Pamp. in Boly. n. 12); sopra Cenedz (Contarini 1825!)

1985 S. austriaca W. Agg. p. 24 (3864. 1697)
III–IV. Pratense, pascoliva. Prati collinari N. Cenedz e Sovramonte copiosa. Dal 1865 (anche Pamp.!)

1986 S. purpurea L. (3865. 1595)
III. Pascoliva, pratense. M. Grappa sopra Valdobbiadene nel luogo detto Pianezza (Boly. n. 16, Bereng. 1846!); Grappa, alla Busa della neve (Bizz. 1878!, Boly. MS.) — Var. rosea (W. K) Prosp. p. 83 c. pic. M. Pizzoc e sopra Follina (Pamp. n. 38); Grappa (Montini in Bertol., Vacc. n. 64); pascoli sopra Cenedz (Contarini 1825!); sopra Valdobbiadene (Bereng. 1862! Boly. MS.)

Taraxacum (Linn.) Juss.

1987 T. officinale Web. Prosp. p. 83 (3867. 1415)
I–IV. Marginale, pratense, domofilo. Prati tutta la provincia: Selva, Conegliano, Vittorio, Treviso ... Dal 1858; Cà Tron (Stratt. 1915!); Grappa fino a 1700 m. (Vaccari n. 64) — Var. palustre (Scop.) Prosp. p. 83 (T. palustre DC.)

Volgo: Radicio de can, Radicio col buton.

Palustre, subpalustre o foveale a Treviso ~~1863~~ (anche Fracchia! e Meneghini!), Spresiano, Ceneda ... dal 1863; presso il Piave (Contarini 1825); Carbonera (Bérenq. 1840!); Crespano (Zanardini 1827! Montini in Bertol.); Castelcucco (Bolz. MS.); Resana, Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!) — Var. levigatum (W.) e Asolo al M. S. Giorgio (Bolz. MS.) — Var. obovatum Asolo sul colle S. Martino (Bolz. MS.)

Chondrilla Linn.

1388 Ch. juncea L. Prosp. p. 83 (3868. 1532)
I–III. Campestre, marginale, sassicola. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Giavera, Cornuda, Vittorio, Treviso ... dal 1861; Asolo (Bolz. MS.) — Vulgo: Latarioi, latisioi (nomi promiscui ad altre erbe di questa famiglia)

1389 Ch. prenanthoides (Scop.) Vill. Prosp. p. 83 (3869. 1664)
II–III. Alveale, arenicola, sassicola. Letto del Piave dal Ponte della Priula, a Covolo, Pederobba ... 1861 (anche Contarini 1825, Bracht! Bég. 1909!, Ball in herb. Pat.!); ghiaje ai confini del Bassanese coll'asolano (Ball!); rup. a Ceneda e Serravalle, 1869.

Sonchus (Tourn.) Linn.

1390 S. tenerrimus L. Prosp. p. 84 (3871. 1696)
I. Murale, ruderale. Mogliano (Mayer in Bertoloni)

1391 S. oleraceus L. Prosp. p. 84 (3872. 1550. R)
I–III. Ruderale, domofilo, ortivo, campestre. Tutta la provincia nelle forme integrifolius Wallr. e runcinatus Koch: Selva, Giavera, Conegliano (anche Bérenq. 1842!), Vittorio, Treviso .... dal 1858; Cà Tron (Dirabz. 1915!) — Var. asper (Hill) Prosp. p. 84 ~~pleasper~~ c. spec. Qua e là dove il tipo: Selva, Conegliano (anche Bérenq. 1842!), Vittorio ... dal 1858; Asolo (Bolz. MS.) — Vulgo: Latisioi, Letisioi, Latarioi, (Spec. e var.)

(Radicio da porchi

1392 S. arvensis L. Prosp. p. 84 (3874. 1554)
I – IV. Campestre, ortivo, ruderale. Mogliano 1864; Portobuffolè (Béreng. 1841!); orti nel Cansiglio 1867.

Prenanthes (Vaill.) Linn.

1393 P. purpurea L. Prosp. p. 83 (3876. 1552)
II – IV. Nemofila, eliofoba. Montello, copiosa, Vittorio, Valdobbiadene, Crespano ... dal 1861; M. Oro e M. Boscon del Grappa (Bolz. 1890! e n. 11); Cansiglio 1868 – Var. latifolia L. Vacc. Grappa (Bolz. MS.)

Lactuca (Tourn.) Linn.

1394 L. perennis L. Agg. p. 24 (3877. 1552)
III – IV. Rupicola, murale, xerofila. Fuori Serravalle presso le sorgenti del Meschio, 1870; M. S. Augusta, 1905; Fais (Contarini 1825!); Col Vicentin (Pamp. a Bolz. MS.); Borso e Campo (Bolz. n. 11).

1395 L. saligna L. Prosp. p. 84 (3879. 1720)
I – III. Sassicola, ruderale, marginale. Selva, Camalò, Montello, Treviso (anche Fracchia!), Vittorio ... dal 1861; Cavaso (Bolz. MS.) – Var. virgata (Tausch). Campestre, marginale a Selva, 1905 – Var. Wallrothii (Spr.) Cornuda (Bolz. MS.)

1396 L. Scariola L. Prosp. p. 84 (3880. 1551) Var. silvestris (Lam.)
I – III Ruderale, murale, sassicola. Zm. pinnatifida. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Camalò, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; al Piave (Fr. Sacc. 1894!) – ~~Var.~~ Zm. integrifolia Bogenh. Stazione ferroviaria di Castelfranco, 1906; Romano (Dom. Montin., 1870!) – Var. sativa (L.) (1415. R). Prosp. p. 84 come sp. Coltivata dovunque in più varietà e talora sporadica. Vulgo Salata.

1397 L. muralis (L.) Fres. Prosp. p. 84 (3884. 1563).
II – IV. Murale, sepincola, ~~[illegible]~~ nemofila. Selva, Giavera, Montello, Vittorio, comune .... dal 1860; al Forame del Montello (anche Fr. Sacc. 1894!), Pederobba (Bég. 1909!); Cansiglio (anche D. Sacc. 1897!)

Crepis (Vaill.) Linn.

1398 C. foetida L. Prosp. p. 84 (3896. 1696)
I – III. Campestre, marginale, rassicola. Quasi tutta la provincia. Selva, Volpago, Camalò, Spresiano, Falzè al Piave, Treviso, Vittorio.... dal 1861; presso il Grappa (Sternb. 1803, n. 59). Var. ambigua Fiori. Colle S. Martino d'Asolo (Bolz. MS.)

1399 C. setosa Hall. fil. Prosp. p. 84 (3903. 1551)
I – IV. Pratense, marginale, campestre, ruderale. Forse la più comune delle Cicoriacee trevigiane: Selva, Volpago, Conegliano, Vittorio, Cornuda, Treviso.... dal 1861 – Var. subintegrifolia Fiori. Via Cavallotti di Vittorio, 1909; alveo del Piave (Minio, n. 35) ecc. – Var. pinnatifida. Via Cavallotti, di Vittorio, 1909; Cà Tron (Diratz. 1915).

1400 C. virens L. (3905. 1785)
III. Campestre, pratense. Vittorio 1879 (Cfr. Sacc. n. 53); Selva, campi al margine del Montello, 1908, rara; Formeniga, 1907; Valdobbiadene (Béreng. 1844!); S. Zenone degli Ezzelini nel boschetto degli Armeni (Bég. Diratz. 1911!)

R C. biennis L. Prosp. p. 84 (3909. 1802)
III. Campestre. Vigne a Valdobbiadene (Fracchia). Da confermarsi.

1401 C. pulcra L. Prosp. p. 84 (3910. 1606)
I. Ortiva, ruderale. Varago di Treviso nell'Orto Ant. Caccianiga, 1864. La località di Calcignano ricavata nel "Prospetto" dalla Fl. it. di Bertoloni è invece, probabilmente, Galzignano in prov. di Padova.

1402 C. conyzifolia (Gouan 1773) Dalla Torre, Ogg. p. 24 (C. grandiflora (All. 1785) (3919. 1785)
IV. Pascoliva, pratense. Pascoli (prese segative) der monti sopra Valdobbiadene (Béreng., 1842!)

1403 C. paludosa (L.) Moench (3922. 1726)
IV. Igrofila, pratense, subpalustre. Grappa (Zanardini 1827!, Montini in Bertoloni et in herb. Bass!).

1404 C. praemorsa (L.) Tausch (3923. 1745)
III Pascoliva. Boccaor di M. Grappa a 500 m. (Fiori, 1897!) – Var. incarnata (Tausch) Prosp. p. 84 (comm. spec.). II–III. Prati e pascoli di Nervesa, Montello, Ceneda e Serravalle ... dal 1862; Cozzuolo (Pamp. in Fl. it. ex s. n. 199!); Possagno (Art. Rossi, 1879); castagneti collinari Asolani (Fiori 1897!); valle S. Fidà del Grappa (Sternb. 1804, n. 59); sopra Asolo, Boccaor e Frontal del Grappa, Maser (Bolz. MS.)

Hieracium L.

1405 H. staticifolium Vill. Prosp. p. 84 (3926. 1754)
III–IV. Rupicolo, sassicolo, alveale. Letto del Piave presso Colfosco e Covolo 1861; rupi sopra Valdobbiadene, 1870; colli trevigiani (Bereng. 1842!); sopra le cartiere di Savazza (Contarini 1825!); Grappa (Sternb. 1803 n. 59!)

1406 H. Pilosella L. Prosp. p. 84 (3929. 1532)
I–IV. Marginale, pratense, pascolivo. Quasi tutta la provincia: Selva, Camalò, Treviso, Conegliano, Vittorio, Cornuda ... dal 1861; Resana (Bég. 1909!); Grappa (Vaccari n. 64, Coban 1906!)

1407 H. Auricula L. ex p. Lam. Prosp. p. 84 (H. dubium L. ex p. Vill.) (3932. 1745)
I–IV. Pratense, pascolivo, marginale. Selva, Ciano, Vittorio ... dal 1861; Treviso (anche Bereng. 1838!); Mogliano (Mayer in Bertol.); sopra Valdobbiadene a m. 1080, anno 1870; Cansiglio 1869 (anche Bereng. 1838!); Grappa (Vaccari a 1600–1700, n. 64, Montini in Bertol.)

1408 H. florentinum All. (3944. 1415). Var. praealtum (Vill.). Prosp. p. 85, c. spec. (murale) Treviso (anche Bereng. 1838!); Serravalle 1870; Ponte di Piave, Zenson, Pederobba (Bég. 1909!); Mogliano (Mayer in Bertol.) – Var. pilosellaeoides (Vill.). Quasi tutta la provincia. Muri vecchi a Selva, Nervesa, Vittorio ...

dal 1861, comune; alveo del Piave a Nervesa, Covolo, Falzè.. dal 1861; Ponte di Piave, Negrisia (Bég. 1909!); fra Valà e Riese (Bolz. MS.) — Var. glareosum Koch. Letto del Piave (Minio n. 35)

R H. aurantiacum L. (3948. 1606)
IV. Pascolivo. Grappa (Spranzi!). Da confermarsi la località. Talora coltivati nei giardini

R H. alpinum L. (3956. 1606)
IV. Pascolivo. Grappa (Spranzi!) Da confermarsi la località.

R H pulmonarioides Vill. (3964. 1875)
IV. Pascolivo. Grappa (Zanardini, 1827). Da confermarsi e confrontare con H. amplexicaule.

1409 H. amplexicaule L. Prosp. p. 24.
IV Rupestre, pascolivo. Grappa (Montini!); muri vecchi inerbati lungo il Meschio a Serravalle presso il Duomo, 1912.

1410 H. polyadenum Arv. T. (3977) var. interruptum (Arv. T.) (1904)
III. Nemofilo. Valdobbiadene fra Guia e Combai nel bosco Medean (Pamp. in Vacc. Pl. ital. crit. exs. n. 186 a)

1411 H. villosum Jacq. Prosp. p. 85 (4013. 1595)
IV Pascolivo. Grappa (Sternb. 1803 n. 59, Montini in Bertol., Spranzi!, C. Massal. 1877!, Coban 1906!, Bolz. 1895!, Zangiacomi herb. Sacc.!, Contarini 1825; Col Vicentin (Pamp. in Bolz. MS.)

1412 H. porrifolium L. Prosp. p. 85 (4043. 1697)
III-IV. Rupicolo, sassicolo. Presso il Cansiglio 1861; Tremeacque presso Ceneda 1890; Passo S. Boldo (Pamp. in Vacc. Pl. it. crit. exs. n. 204a; a mezzo monte Pizzoc, al luogo detto Loe (Trott. 1915!); intorno il Lago Morto (Pamp. n. 40).

1413 H. glaucum All. Prosp. p. 85 (4044. 1785) (anche Frois 1899!)
III. Rupicolo, murale. Comune sui muri vecchi e rocce a Vittorio, 1870; colle della Madonna della Salute (Trotter 1907)

1414 H. murorum L. Prosp. p. 85 (4068. 1550)
I – IV. Murale, rupicolo, sepincolo. Quasi tutta la provincia: Selva, Volpago, Nervesa, Conegliano, Vittorio ... dal 1861; Cansiglio 1869 (anche Dom. Saccardo a 1100 m. 1897!); colle di S. Martino di Ceneda (Contarini 1825); Grappa Sternb. 1803 n. 59, Visiani! Montini in Bertol.) — Var. pictum Pers. Qua e là — Var. silvaticum L. Qua e là — Var. microcephalum Gremli. Montello, 1890.

1415 H. vulgatum Fr. Prosp. p. 85 (4069. 1696)
II – III. Nemofilo, sepincolo, dumale. Vittorio colli a Serravalle 1870; muri vecch. a Ceneda 1908.

1416 H. umbellatum L. Prosp. p. 85 (4084. 1532)
I – III. Nemofilo, dumale, sepincolo, pratense. Selva, Cornuda, ~~Crespano~~ (anche Trott. 1906!) Montello (anche Bizz. 1887!), Vittorio, Covolo ... dal 1861; Crespano (Montini in Bertol.); Motta (Bérenq. 1841!); Piai di Ceneda (Pamp. in Vaccari Pl. cr. exs. n. 218!) — Var. Lactaris (Bertol.) Prat. a Bavaria, Nervesa, Ciano, Treviso, Cansiglio ... dal 1861; Trevigiano basso (Mayer in Bertol.) Var. brevifolium (Tausch) S. Pietro di Feletto (Pamp. in Vaccari, Pl. it. cr. exs. n. 162, c. spec.); a mezzo monte Pizzoc nel luogo detto Loc (Trotter 1915!) Prosp. p. 85 c. spec.

R H. rigidum Hartm. (4086. 1853) = H. levigatum Koch. Ripario lungo il Sile a Treviso (Bérenq. 1837). Da confermarsi.
H. boreale Fr. Prosp. p. 85 ~~(4089. 1745)~~ (H. sabaudum L. exp.) (4089. 1745)
II – III. Nemofilo, sepincolo. Montello, Cornuda, Colfosco .... dal 1861; Vittorio (anche Pamp. n. 40); Portobuffolè (Bérenq. 1841!); S. Pietro di Feletto (Pamp. in Vaccari Pl. it. cr. exs. n. 161: forma) — Var. ovale Doell. Montello lungo la Brentella, 1910; Vittorio lungo il Meschio 1915 — Var. subsabaudum (Fr.) Montello 1869; a Nervesa e Selva (anche Dom. Saccardo 1890!); Vittorio, 1906; Monfumo (Bolz. MS.).

1417 H. heterospermum Arv. T. (4093. 1849)
III. Pascolivo, dumale. S. Pietro di Feletto (Pamp. in Vaccari Pl. ital. crit. exs. n. 185!)