

15

Arubenia

40/0011 -1

Arctenia Fr. Summa Veg. Scand. ^{II} (1849) p. 312; Hym. p. 461, Sav. Syn.

Fung. V. p. 499. (Etym. a Prof. Arctenio Upsal.)

Fungi membranacei tenerissimi, hymenio infero, lamella-
rum loco venis rarif, lenellis, paululum elevatis,
simplicibus, rectis, striato. Sporae pallidae, globoso-obiproductae.

Minute, sat persistentes, forme variae. Striae seu pliae
non decurrentes. (~~Conf. Antharellum Brownii~~)

^{Synonymus}
Compositus, Gouvierum.

I Pileus affuso-reflexus, lenellis

II Pileus conchatus, stipitatus

1 A. tenella

2 A. auriculatum

(DC)

Sacc. Syll. Fung. I pag. 499

1 *Arzhenia lenella* Fr. Summa veg. Sc. II p. 312 (1849), *Cantharellus lenellus*
Fr. S. M. I p. 325 (1821), *Merulius lenellus* DC. Fl. Fr. II p. 132 (1805)
Year. fl. Dan. t. 1295 f. 2 (1806) (agaric. v. Merul. spec.) Bull. 430 →

Hab. ad ligna putreda - Savoia Piemonte (Magnein in Colla Herb.
Fedem. VII p. 93)

Area distri. Europe

Other - Ripostomum le ^{indicate di Savoia} specie, essendo probabile se trovisi ^{pur} nel gruppo Piemontese

Effuso-reflexa, membranacea-mollis, nigrescens; demum
lobata ⁵⁻¹⁰ ~~2-3~~ mm. lata; veis pleriformibus, simplicibus,
immixtis, dividiatis, concoloribus.

(88)

Sacc. Syll. I p. 499

Arzhenia pinnata Bagl. 60, 245 (nota) ^{in Herb. (n. 245)} Sec. Pres. e un ^{simile} ^(note) discorn de Chano Realtella che ha
perduto l'imenio. Fu raccolta sulla fiume ovino (non horcino) sul M. Rosa (Caresia)

Senella

[Faint, illegible handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page.]

2 *Archeia auriscalpium* Fr. *Samm. Veg. Scand.* II p. 312 (1849), *Sau.*
Syll. V p. 499. *Cantharellus auriscalpium* Fr. *Stench.* p. 54 (1828)
Icon. Patouill. Ess. taxon. Hymén. p. 130 f. 63, *Mes. Fung. Turd.* I t. XXX
Bibl. 234 (I p. 26), 1715. (Fig. sinistra, ut matrix *Podosphaerae*)

Piles laterali, conchoides, 4-5 mm. lato, ~~rotundo~~ ~~et~~ ~~albo~~ ~~griseo~~ tenui.
crustoso griseo v. alutaceo; hymenio tenuiter ^{perce} plicato-^{venoso} ~~griseo~~, albo;
stipite brev. teret. ^{villoso} 3-5 mm. alto, albo v. griseo; sporis sphaericis,
glancis, guttulatis, 2-3 ^{inter muscos}
Hab. in siliis mistis ^{inter muscos} ambrosia - bentano. Val d'Isère (Pres.)

Area Diti. Europa.

Off. Sugh. esemplari d. questo fungibile il Guélet scopre e il Bresadola
descrive e figura col nome d. *Podosphaera Bresadolae* ^{Guélet} una Eristifacea che
vedute la strobilante matrice dev'essere interpretata come una probabilmente
come una *Micromyces albus* caduta o portata da insetti dall' ~~Alps~~ Alps
all' *Archeia*; ~~come~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~ormai~~ ~~dimostrato~~ per altre Eristifacee
(*Phyllosticta* ecc.) migrazioni simili sono