

20 Pannus

~~18 L. b. m.~~

~~19 Pannus
1965 Xerofus~~

~~20 L. b. m.~~

~~21 Schizophylla~~

~~1 Pannus 1.2~~

~~1 L. b. m. 1.7~~

49/0016-1

L'AVVENIRE AGRICOLO

Bollettino mensile della Cattedra Ambulante
d'Agricoltura di Parma

Stab. F.lli Goglio di P. - Rho

(OMAGGIO)

27

All' Illustre Professore
Cav. Pier Andrea Saccardo
R. Orto Botanico

PADOVA

omaggio

19
Pamus

Parus

Conspectus synopticus specierum italicarum.

I - *Parus recipinatus*, sessilis vel postice pinnatus

1 = Lamellae violaceae vel amethystinae

A = *Parus tenuis*, hygrophanus - - - 1. *P. violaceo-fulvus*

B = *Parus coriaceo-lapideus* - - - 2. *P. lithophilus*

2 = Lamellae nec violaceae nec amethystinae

A = Umbrino-nigricans, lamellae fusco-purpurascens - - - 3. *P. Delastreei*

B = Extus pallidus, lamellae obscure ochraceae 4. *P. patellaris*

II - *Parus stipitatus*

1 = Stipes definite lateralis

A = Albus dein cerinus; flabelliformis - - - 5. *P. flabellulum*

B = Fulvus vel cinnamonaceus, non flabelliformis

a = Beniformis, squamoso-purpureus; lamellae determinatae 6. *P. semipetiolatus*

b = Spatulatus, hirsutus, lamellae decurrentes - - - 7. *P. cochlearis*

2 = Stipes excentricus, pilae irregularis

A = Lamellae albae - - - 8. *P. fulvidus*

B = Lamellae coloratae

a = *Parus pinosus*, sordide albo-livido-violaceus;

lamellae carneo-roseae - - - 9. *P. vaporarius*

b = *Parus* non pinosus

a = *Parus* et stipes hirti - - - 10. *P. rudis*

B = *Parus* levis vel demum squamulosus

A₁ = Stipes basi pubescent, lamellae

ca. albo-carneo ochraceae 11. *P. flabelliformis*

B₁ = Stipes griseo-tomentosus; la-

mellae c. rubido-alutaceae - 12. *P. carneo-tomentosus*

+ Penny
+ Lenten
+ Lenten

Completed
and days

Panus Fr. Epicr. p. 395 (1838) Sav. Ich. fung. V p. 614
(Ehgm. nomen plinianum fungi arboris.)

Cotus fungus carnosus-coriaceus, lenax, arescens, contextu fibroso, in hy-
menium radiante. Lamellae cum hymenophoro concreatae, inaequales,
demum coriaceae, acie integerrima. Stipes subcentralis, excentricus,
lateralis vel nullus.

} Fungi epixyli, forma varii, diu persistentes.

Oront. ~~St.~~ Per la carne lenta, quasi coriacea (anche delle lamelle) questo genere ^{è assai affine a Lenticularia}
~~viene inserito in questa serie~~ ^{si può distinguere} ma ~~diversa~~ per le lamelle più consistenti,
coriacee ed integerrime, ~~si può distinguere in questa serie.~~
~~nelle specie di questo genere~~ ^{quelle che sono} ~~sono rilasciate~~ ^{non sono sufficienti} ~~base~~
~~sterili~~ ~~perché~~ ~~costano~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~troppo~~ ~~dura~~

Tolto il Panus stypticus che pel ~~to~~ principio acie irritante, che contiene,
è nocivo, le altre specie sono inoffensive, ma per la ^{loro} carne ~~troppo~~ dura
e tenace sono imangiabili o quasi.

1 *Panus violaceo-fulvus* (Batsch) Quél. Champ. Vosg. p. 205 t. 14 f. 2 (1872)
Sav. Syst. V p. 628

Icon. Quél. l.c., Batsch Sterch f. 39, Pers. Myc. Eur. III t. 24 f. 4.
Batsch. Presid. MS.

Hab. ad corticem *Abietis pectinatae* & *Abietis*, (Trentino) (Pres. MS.)

Area dist. Europa

(Austro = Hieronymus)

violaceo-fulvus
528

Resupinatus, levis, hygrophanus,
e cupulari expansus reflexusque;
pileo pruinoso, basi albo-tomentoso,
vixiter 0,5 cm. lato;
lamellis concurrentibus, ventricosis, reti-
culato-venosis, pallide violaceis
steret-^{steret-}allipinatis;
sporis $\wedge$ $\rho - \sigma = 2 - 3$, punctulatis


~~Oper. Secondo alcuni autori le
spore sono violaceo-fulve.
Aspetto di P. ringens. Cfr.
Fr. Icon select. da cui special-
mente e diversamente per le spore.~~

2 Panus lithophilus Fr. Epicr. p. 400 (1838)

Sau. Sym. fung. V p. 620.

Icon. Battara F. Arim. t. 24 B (Lithodermomyces)

Btl. 103.

Hab. ad saxa lophacea  Emilia: ^{Battara} Rimini (~~Emilia~~)

Area distr. Italia

Lithopitilus 620

~~(Valde insignis insignis)~~

Resupinatus, coriaceo-lapidus,
appianatus, semit-adnatus, ectus
Lomentosus, margine prominente
libero; lamellis concurrentibus
amethystinis.

~~Prosp.~~ Omnes in Jo. Hym. Eur..
Sembra molto distinto, ma de riconfermarsi.

3 *Panures Delarthei* (Mont.) Fr. Epier. p. 400, ⁽¹⁸³⁸⁾ *Aganurus Delarthei* Mont. in
Ann. Sc. nat. VIII (1837) p. 364.

Sac. Syll. fung. V p. 629, Michelia I p. 3.

Hb. 1043, 209.

Hab. ad corticem *Piceae communis* - Veneto:
pro Vittorio, Trento (~~Veneto~~) ^{Sac.}

Area distr Gelha, Haba

PM. Sec. Quat. Fl. myc. p. 324 non differisce dal *P. violaceo-fulvus* e ha l'aspetto
e il colore quasi l- in Cenangium, ne è molto maggiore

Delastre 629

P. crumpeus, caespitosus,
P. espinatus, coriaceus, unceolatus
turbinatus, pubescens, ^{umbrino-nigricans} vertice porrecto
 tomentoso stipitatus, marginis inflexo
 coarctatus; lamellis concurrentibus,
 fusco-purpureis, acie albo-
 pruinosis, integerrimis, confertis.

Ha
~~Prosp.~~ l'aspetto di *Cerangium*, anche
 se il colore è giallo e
 prop. di *Cerangium* né è molto
 massiccio.

4 *Panus patellaris* Fr. *Epicr.* p. 400 (1838)

Sacc. Syll. fung. V p. 629.

Icon. Fr. R. Hymen. t. 116 f. 3, Cooke *Ill. Br. Fung.* t. 1144 f. c.

Natl. 1032

Hab. ad ramos *fagineos* - *Veneto:* (D. Saccardo)
in silva Canisio, Treviso (~~Veneto~~)

Area Distr. Europe, Australia

(*Dubium* - *Heime*)

patellarius 629

Resupinatus, coriaceus, plano-cupularis, orbicularis, extus pallidus, furfuraceo-villosus, vertice vix porrecto adnatus, margine involuto; lamellis concurrentibus, obscure ochraceis, integerrimis. sporis 8 µ longis.

Observ. Simplicis, affine a P. stypticus


Le lamelle, ~~rispetto~~ come in P.

Delastrei integerrime, appassate.

la sostanza molto più resistente che negli analoghi Lentinus;

5 *Panicum flabellulatum* Lau. et Jpeg. in Michelis + p. 361 (1878)

Lau. Syll. fung. V p. 623

Bibl 1043, 209. 

Hab. in culmis putrescentibus Arundinis Donacis, Conegliano, Treviso (Veneto)

Aree distr. Italia sup.

flabellum

623

Pileo dimidiato, flabellato 1 cm diam.
membranaceo - penacello, subglabroso,
margine acutiusculo, in basin breve stipiti-
formi - attenuato, vivo albo dein ceriseo;
lamellis crebris, angustis, integris, dimi-
diatisque, distinctis, in basin decurrentibus,
acutis integris; trama hymenium anasto-
motico - filamentosa; sporis in basidiis
sive inclusis, sphaeroides 2,3 - 3,2 μ
diam., levibus, hyalinis;

(basidiis subclavatis 20 = 5.

A primo aspetto

~~guardato di uno sguardo superficiale~~

Invero

~~Per l'aspetto~~ ricorda *P. stypticum*
ma per caratteri è molto distante

6 *Panus semipatiolatus* (Schäff.) Lau. *Agaricus semipatiolatus* Schäff. Ic. fung. IV p. 47 t. 208 (1774)

Panus hypticus (Bull.) Fr. *Epion* p. 399.

Lau. *Syll. Fung.* V p. 622, *Agaricus hypticus* Bull. Champ. t. 140 (1782) et
557 f. 1 (1791)

Fr. *Schäff.* l.c., Bull. l.c. *Lam.* F. d. Roma t. 45 f. 1, Cooke *M. Br. F.* t. 1144 f. a
Gillet Champ. t. 248, Kromb. *Abb.* t. 14 f. 13-17.

Bist. 23, 51, 90, ^{101, 123} 209, 243, 244, 245, 357, 417, 418, 430, 434, ^{518?} 564, 585,

653, 656, 725, 802, 836, 858, 923, 983, 1133, 1171, 647, 1284, 1456, 1457, →
^{1920, 1965, 1301, 1663}

Hab. in *Francia*, et *lignis putrescentibus*: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
^{Inzanga, Rabb, ecc. (M. Br. F.)} Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Neapolitani, Vere-Ant. +.

Area distr. Europe, Amer. bor. Tamié, Australia ~~et Celestata~~

Ex. Mys. Ven. n. 4, Cavara F. Longob. n. 21, Erb. *onth. ital.* ^I n. 139.

semipetiolatus
= stipticus 622

Sapor stipticus;
Piles coriaceo, reniformi, e cinna-
momo expallenti, cute in squamas fur-
furaceas recedenti, 2-4 cm. lato

lamellis determinatis, brevibus, confertis reti-
culato-connatis, cinnamomeis;
stipite laterali, brevi, sursum dilatato, circiter
1,3 cm. longo
sporis ~~obovatis~~ ^{ovato-oblongis} ~~obovatis~~, dilutissime
flavescentibus ~~2-3 x 2~~ 5-6 = 2;
basidiis 18-20 ± 4 (Bresan. ms.)

7 *Panus cochlearis* (Pers.) Fr. Hym. Eur. p. 489 (1874)
Sacc. Syll. Fung. V p. 622, *Agaricus cochlearis* Pers. Myc. Eur. III p. 33 (1829)
Icon. Michx. N. P. G. p. 123a t. 65 f. 5-6 (1729) (*Agaricus caespitosus*... *Cochlearis*)
Willd. 785, 434 (n. 19-20) (forma...)
Hab. ad truncos *Quercus*, *Scandiaci* (*M. Michx.*) et *Quercus* *Cerris*, Prata, Napoli.
(Peda). Aestate. Aut.
Area distr. Italia austr., Gallia

cochlearis 622

Caespitosus, fulvus; pilei ovali, convexo,
spatulato, hirsuto, margine involuto, in-
segro, 2,5 cm. longis

lamellis decurrentibus;
stipite laterali, decursum subattenuato, 2,5 cm.
longo.

~~Orsini~~ Specis non fuit raccolta dopo
Michel, ma sembra insignire
affine a O. foliens

011. Una forma simile di fine Mord.
t. 55 f. 5 me col cappello
glabro, giallo sporco.

8 *Pannus fulvipes* Bres. F. Tr. D. II p. 56 t. 165 (1898)

Sacc. Syll. Fung. XVI p. 66

Loc. Bresad. l. c.

Hab ad asperes et pascos, imprimis ab ignis, in tota Regione Tridentina (Austria) ^{ms.}

Area dist. Ital. bor.

1883

Bibl. 1234

Trentino

Valle Lagarina,

Valle Sole, Trento, Rovereto et

(Vire - Austria)

fulvigenus

16-66

Caro leuta, odor subfarinaceus, sapor mitis;
Interdum subcaespitosus; plures species,
cui vix aliqua cognita proxime accedit;

filis carnosus - levis, tenuis, e convexo vel
subcampanulato expanso-gibboso vel umbon-
ato, fulvo, copiallente vel fulgescente, squamulis
fusculis eleganter ornato, margine fibrilloso-sulcato,
aetate glabrescente, 2-4,5 cm. lato; lamellis subdi-
stantibus, albis, acie integra vel primitus prominente,
postice emarginatis vel rotundato ^{apices} ~~liberis~~, fere
liberis; sporis stipite solido, basi attenuato-sub-
diato, tereti vel compresso, albo, apice sulcato
et tomentoso, deorsum fusciculis, subgranulosis,
2-2,5 cm. longis, 5-6 mm. crassis; velo albo
mox evanido; sporis hyalinis, subcylindricis,
uno latere subcompressis. 12-18 = 5-9; vari-
dis clavatis 45-60 = 8-10; cystidiis fusci-
dis ~~55~~ 55 = 80 = 4-8 — ↗

9 *Panus vaporarius* Baglietto in Comm. Soc. crit. ital. II p. 264 (1865)
Sacc. Sylt. fung. V p. 614

Icon.

Bibl. 60, 61, 983.

Hab. in vaporariis ^{Liguria in} Horto botanico Genova ~~(Liguria)~~ (Baglietto)
area diti. Ital. boreal.

vaporarium 514

Caespitosus, imbricatus; fulco nubecula
ceo, basi attenuata brevissime stipitato,
erecto, e spathulato utriculiformi, undu-
lato-lobato, -marginem primo involuto. Deis
inflexo -, pruinoso, e sordide albo tandem
livido-violaceo; lamellis decurrentibus,
simplicibus, perangustis, subsistentibus,
dilute carneo-roseis.

18 Panus rudis Fr. Epicr. p. 398 (1838)

Sacc. Syll. fung. V p. 616, Panus hirtus (¹⁸³³Secr.) Quél., na Fr. (1830)

Leon. Gonn. et Rab. Myc. Eur. Heft 8-9 t. 12 p. 2, Pat. Tab. anal. f. 637.

Quél. Champ. Vosg. I t. 14 p. 1.

Bibl. 61, 209, 245, 397, 398, 434, 639, 725, 866, 983, 1030, 754. →

Hab. ad truncos, tam aceros, quam frondos: Liguria, Piemonte, Lombardia,
Venetia, ^{Trentino (Bres. ms.)} ~~Emilia~~, Neapolitan, Siskia. Vere. aest.

Proe det. Europa, Siberia, Tamsil

Exs. Erb. meth. ital. I n. 140.

♀: Gocciadoro, lugo d. f. Tarsusa pr. Trento

♂: Vercelli =

rudij 5/6

Polymorphus, set pilis stipitisque indumento
facile distinctus Caespitosus;

~~Caespitosus~~ \ pilis integris, coriaceis, hirsutis,
depressis, sinuatis, setulis fasciculatis hirsutis,
alutaceo-subrufescente;

lamellis decurrentibus, angustis, confertis, ligneo-pallidis,
stipite brevissimo, hirsuto, demum obsolete;

^{vel 8-9 = 3, 5-4}
sporig 6-8 = 3, 5; bandij 35-40 = 5-~~6~~

(Pres. Ms.) -

11 *Panus flabelliformis* (Schäff.) Quel. *Fr. myc.* p. 325 (1888), *Ag. flabelliformis* Schäff. *Le. Fung.* ^{IV p. 20 & 43 (1874)}
Panus conchatus (Bull.) Fr. *Epier.* p. 398, (*Agaricus conchatus* Bull. *Champ.* t. 298 (1788))
Sacc. Sylv. Fung. V p. 615 &
Icon. Schäff. l. c., *Bull. l. c.*, *Krombh. Abb.* t. 42 f. 1-2, *Laup. F. d. Roma* t. 44/3.
Bull. 90¹⁰³, 209³⁹⁸, 430⁷¹², 585, 653, 656, 1253, 529, 243, 1284, 848, 693
Hab. ad truncos et ramos arborum fruticorum: Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia.
^{Liguria (Br. M.L.)}
^{Piemonte}, Emilia, Lazio, Sardegna, Corsica. Aust. Aust.
Area distr. Europa, Amer. bor. Australia

flabelliformis
= conchatus 615

~~pub.~~

Caespitosus;

(pileo carnoso-lento, tenui, inaequali, exen-
trico dimidiatoque, e uisnannomeo, capillente,
demum squamuloso;

lamellis lineatum decurrentibus, subramosis, ex
albo-carneo ochraceis;

stipite brevi inaequali, basi pubescente, 2 cm. longo.
sporig 5-8 + basidii 40-45 = 5-8

Usser. Ceraplo affine a P. de carneis - lomen

tray, ma più tenue, più concato e
lobato.

~~Ambesius già allo stato giovanile con detti~~

~~Pleur. salignus, e latra Plurcula ochracea~~

(Differisce da Pleuro^{ful}ostreatus e affini per la
sostanza finalmente coriacea, non pubescente,
o aluminosa, per le lamelle tenaci, solide,
seuche inrescate ~~Latro~~ posteriormente semplici.

12 Panus carneo-tomentosus (Natch) Lau. Agaricus carneo-tomentosus
Natch. Elench. p. 90 t. 8 f. 33 (1883), Panus torulatus ^(Pers.) Fr. Epier. p. 397
Agaricus torulatus Pers. Syn. p. 475 (1801) ← Sacc. Syll. fung. V 615 L. Syll.
Icon. Natch. l.c., Cooke M. Br. F. t. 1149 f. 6, Kromb. Abb. t. 42 p. 3-5.
Gill. Champ. t. 249.

Bibl. 245, 417, 418, 983, 848

Hab & fructos prodr.: Liguria, Piemonte, ^{Mesi. D'Amago ecc.} Trentino (Br. MS.). Ad. Aut.
Are distr. Europa, Amer. bor., Australia

² Quet. Fl. myc. p. 325

Pl. Sec. Br. MS. c. d. P. flabelliformis, junior girovane.

Cornu - tomentosum

615

Veriformis et vesicular, subcanti-lividus,
volagens (et le cornu tomentosum que se des-
cendit et se terminat in cornu tomentosum
Sambucus adhaerens longus; pileo e carnosu-
lento coriaco, plano
infundibuliformi dimidiatoque, levi, e
subcarneo ochraceo, margine volascente;
lamellis decurrentibus, subdistantibus, postice
discretis, e rutilo alutaceis;
stipite brevi, obliquo, griseo tomentoso, inter-
um violascente;

(Spore) 5-6 - 3-4 - (Cornu tomentosum)

(6-8 = 3-4 - Veriformis et vesti-
color, caro alba acida.