

23 Schizo

40/0018 - 1

Dultz & Co., Buchhandlung u. Antiquariat für Naturwissenschaften, München

Landwehrstraße 6.

Bis 1. Juli 1911 Teilhaber der Firma Ottmar Schönhuth Nachf.

Drucksache.

R. Orto ed Istituto Botanico dell' Università

Padova

Italia



213

Schizophyllum

7

Schizophyllum Fr. Obs. I pg. 103 (1815) <sup>Phyllum</sup>  
 (Elym. ~~sciza~~ <sup>schiza</sup> fissura et pectus folium seu lamella)  
 (Scaptophorum Spreng.; Schizonia Pers.)

*Pileus* exarvis, aridus, lamellae coriaceae, flabelliformi-ramosae, superne pelli-  
 tomentosa junctae, bifidae, acie longitudinaliter fissae

Ossea = Genere di Agarici <sup>in causa delle lamelle fesse ben distinto</sup> <sup>(della Agaricaceae)</sup>  
 molto lontano dal tipo consueto <sup>nella zona artica</sup>  
 non ha alcuna specie, nella temperata <sup>ne ha</sup> due e molte nella zona tropica

Conspectus synopticus specierum italicarum

- I = *Pileus* <sup>exarvis, subbellis</sup>  
 primo albo-villosus, dein hirtus, lamellae ex griseo fusco-purpurascens  
 1) *Pileus simplex* et <sup>ambitus</sup> ~~lobatus~~ <sup>subintegerrimus</sup> - - - - - f. alveum  
 2) *Pileus profunde laciniatus*, multifidus, ~~lobatus~~ var. multifidum
- II *Pileus* <sup>exarvis, subbellis</sup>  
 ad preme tomentellus, ~~aridus~~ et lamellae umbini 2 f. umbrinum
- III *Pileus* subcarneus, stipitatus, subtomentosus, cinereo-fuscus (marinus) 3 ? f. marinum

1. *Schizophyllum abneum* (L.) Schrot. *Pflzt. Rhles. I* p. 553 (1889), *Agaricus abneus*  
Linn. *Sp. pl. ed. I* p. 1176 (1753), *Schizophyllum commune* Fr. *S. M. I* p. 370 (1820)  
Ann. Bull. Champ. t. 346, 581 f. 1, Kromb. *Abb. t. 4* f. 14-16, *Grav. Crypt.*

*Fl. t. 61*, *Lamy. F. d. Rome*, t. 46 f. 2, *Micheli. N. P. G.* t. 65 f. 4, *Sacc. F. Ital.* 1123  
*N. Ill.* 49, 51, 90, 244, 245, 66, 85, 103, 357, 426, 417, 418, 430, 434, 518, 564,  
585, 638, 653, 656, 671, 725, 714, 745, 802, 836, 886, 923, 927, 930, 983, 995, 1091,  
1129, 647, 1284, 631, 1061, 1605, 1456, 1365, 1617, 1965, 693, 1133, 1170, 1253

Hab. ad cortices et ligna vetusta, frequens: Liguria, Piemonte, Lombardia  
C. Ticino, Veneto, Trentino, Eucalia, Forlana, Lazio, Neapolitano, Sicilia,  
Sardagna, Corsica, Toto annis.

Area distr. Europa, Amer. bor., Africa, Asia, Australia

Oss. Secondo Guignea Bull. Soc. Myc. Fr. 1901 p. 297 questa specie  
può rivelare grave danno agli alberi, p. o. all'ippocastano,  
su cui si sviluppa abbondantemente. ~~Stetata~~  
~~Coste del...~~

Var. *multifidum* (Balsch) Fr. - *Syll. F.* p. 655 - *Icon. Bot. Ed. Elench.* t. 24 f. 126  
(Essec. Myc. Ven. n. 795)

Exs. Myc. Ven. n. 5, Myc. Ital. n. 3, 1406, Thim. Myc. Univ. n. 304 (Parma)

Oss. Lo *Schizomyces murina* Borg. descr. di una nuova sp. di *Schizomyces*, in *Atti Ist. incor. Napoli. VI* p. 55  
con *tabula*, ora probabilmente è una forma dello *Schizomyces commune*.

Oss. Lo *Schizophyllum gossypium* Grav. in *Atti Ist. incor. Napoli. t. VII* (1840) p. 23 t. 1, le cond  
il *comet*, F. del *Napoli* 1855, è una forma mostruosa striatata (loco oscuro) dello *S. abneum*  
Una forma lamellata *indagini* è in *Atti Ist. incor. Napoli. t. VI* (1831) p. 6 *tab. Val des*; prob. mostruosa.

# alveum

C. var.

Species vere cosmopolita

postice saepe porrecto-pendulo

Piles postice adnato subporrecto,  
1,5-4 un. lato  
simplici lobatoque; lamellis  
rimo albo-villoso, dein hirsuto; lamellis e  
griseo fusco-purpurascensibus, acie

revolutis, sporis minutissimis,  
serotinis, ~~comis~~, 5-7 = 2-3, hyalinis  
~~multifidis~~ ~~2-3~~ ~~diam.~~

~~tabulae ante 546-548~~

(7)

var. multifidum

pileo profunde laciniato-multifido,  
v. connescente  
luteo, lutescente, laciniis sublinearibus;  
ceteris S. alvei

2 *Phzozryllum umbrinum* Berk. in Hook. Journ. of Bot. 1851 p. 15 t. 7 f. 1  
Lau. Myc. fung. V p. 655.  
Icon. Berk. p. c.

Berol. 1253.

Hab. ad truncos, Sardegna: Cagliari, ~~Sardegna~~ (Vogelia)

Area distr. Amer.-centr. e merid. Sardegna

Umbrinum, contextu concolore cartilagineum; files flabelliformi, adpresse tomentello, viscoso-lobato <sup>(2-14 numero lato;</sup>; lobis furcatis; lamellis initio villorulis, distantibus; spicula brevissima, basi radiato-villosa

*Lavatera distans*; poris oblongatis, 8-10 = 4-6. ~~Paripate bene~~  
alle diagen. del Barkley (Vogelia)

Det. La specie sarda corrisponde bene alla diagen. di Barkley, sec. di Vogelia.

Umbrosum 655



3 Schizophyllum muricatum Bozenti in Atti M. Lucorag, Nap. VI p.  
62 et tab. (1840) sub Schizonia  
Bibl. 257.

Tobitarium, parvum, cinereo-fuscum; pileo orbulari fere plano,  
centro umbilicato, subtomentoso, limbo regulari parum recurvo, flexuoso,  
lamellis laxis, simplicibus et parum decurrentibus, integris, alter-  
natis minoribus, in juncis orbis margine canaliculatis, demum  
fittis et revolutis; - Stipite rudis, breviusculo, fistuloso, com-  
presso, utrinque versus medium obsolete excavato, basi subtaben-  
culato, pileo concolore.

Hab. ad terram <sup>graminosam, vicullam</sup> ~~Napolethanam~~ <sup>nr. Napoli.</sup> ~~Noto non indicato~~ Autumnus -

Dim. Cappello 22-23<sup>3</sup> mm. largo, <sup>carneo.</sup> gambo 15 mm. lungo, 3-3,5 mm. diam.

Stipite e lamelle quasi nulli. Per la presenza di un gambo <sup>fistuloso</sup> distinto  
e di un pileo carnoso, la specie non può appartenere al genere  
quantunque le lamelle siano canalicolate. Forse è un Omphalia mostrosus?