

II Myxaciun

48-59

^{II}
(Myxaciace)

(1) Constrictus synopticus sectionum et specierum

I *Hipes floccoso-peronatus*

Sec. I Collinites

1. - *Hipes levis*
 A. - Lamellae ex argillaceo cinnamomeo - - - 48 C. *Collinites*
 B. - Lamellae ex albedo ferrugineae - - - 49 C. *mucosus*
 2. - *Hipes margine strabus vel plicato-rugosus*
 A. - *Hipes dorsum attenuatus*, lamellae distinctae - - - 50 C. *mucifluus*
 B. - *Hipes utrinque attenuatus*, lamellae venoso-connatae - - - 51 C. *clatus*.

II *Hipes non floccoso-peronatus*

Sec. II Collobuti

1. - *Hipes saltem primitus violaceus v. vel caeruleus*
 A. - *Hipes immato fibrillosus*, *Hipes* velo glutinoso coeruleo ad apicem latus
 a. - Lamellae griseo-violaceae - - - 52 C. *salor*
 b. - Lamellae e cyaneo argillaceae - - - v. *naevosus*
 B. - *Hipes glaber*, *Hipes* ad apicem nudus.
 a. - *Hipes* semum fusco-lividus vel griseo-albus - - - 53 C. *stipitatus*
 b. - *Hipes* demum griseo-albus - - - 54 C. *constrictus*
 2. - *Hipes nunquam violaceus v. caeruleus*
 A. - Lamellae primitus incarnatae v. cinereae
 a. - Lamellae ex incarnato argillaceo-cinnamomeo - - - 55 C. *illibatus*
 b. - Lamellae e cyaneo pallido argillaceo-ferrugineae - - - 56 C. *delibutus*
 B. - Lamellae nec incarnatae, nec cyaneae
 a. - *Hipes subaequalis* - - - 57 C. *pelliger*
 b. - *Hipes clatus* v. *conicus* - attenuatus
 a. - *Hipes mollissimus* - - - 58 C. *vibratilis*
 b. - *Hipes elastus*, tenax - - - 59 C. *nitidus*

48 *Corticarius collinitus* ^{Sect. *C. collinitus*} (Pers.) Fr. *Epicer.* p. 234

Sacc. Syll. fung. V n. 916, *Agaricus collinitus* Pers. *Syn.* p. 281 (1801)

Icon. Ventur. Mic. Pers. t. 32 f. 4-6, *Vician. F. d'Hal.* t. 48, *Cooke*

M. Br. F. t. 738, *Vogelw. u. N. Giron. bot. Stud.* XXX (1887) t. 9 f. 44

Bull. Champ. t. 549. 596 (*Ag. mucosus*), *Kromb. Schw.* t. 73 f. 16-18

Bist. 61, 90, 209, 397, 398, 411, 418, 430, 434, 446, 704, 725, 866, 923,

983, 1015, 1133, 1219, 1232, 1237, 647, 631, 1965

Hab. in hirs, ericetis, fragrans - Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,

Trentino, Emilia, Toscana, Neapolitana, Corsica.

Area dist. Europe, Amer. bor., Tunis.

Cxs. *Sib. critt. it.* I n. 488, *Rab. F. Eur.* n. 1402,

P. Valle Lagarina (Cob.), Tzengar,
Arnegò (Pers. MS.)

Sudurum - raro -

(Bolzano: Haupflor)



collinatus 916

pileo carnoso, e convexo-infracto expla-
nato, obtuso, levi, glutinoso, nitido, 5-11
cm. lato, aurantio-fulvo, glutine concolore persistente,
^{sicc. putido;} lamellis adnatis, ex argillaceo caesiove
cinnamomeis, 7-11 mm. latis;

Stipite firmo, cylindrico e velo floccoso-
glutinoso diffracto transversim squamato, 10-20
cm. longo, 8-10 mm. crasso, nunc caerulescente, nunc albo,
^{moll.} manifeste simul cortinato;
Sporis ellipsoideis, utrinque attenuatis,
flavidis 12-14 = 6-7 -

(Varr. plurimae: b) pileo repando, stipite lu-
cescente; (Patsch. f. 194) -

(c) parvus; pileo pallide luteo
v. stramineo, stipite concen-
trice flavo-squamato, lamel-
lis albis;

(d) pusillus; pileo spadiceo, stipite
vix 2,5 cm. lato.

49 *Cortinarius mucosus* (Bull.) Fr. Epicr. p. 274 (1836), ^{ut subsp. *C. collinensis*.} Van. Lyl. fung. v p. 917
Agaricus mucosus Bull. Champ. t. 549 f. D (1791)
Ter. Bull. l.c., Cooke M. Br. F. t. 439, Kromb. Schw. t. IV f. 4-5, t. LXXIII
f. 13-15.

Bibl. 1062, Pres. MS., Mass. in Bull. Soc. bot. it. 1912 →
Hab in sylvatib., praeis — Toscana: is. Gypho (Sommer)
Area Dist. Europa. Trentino: Varena (Mass. et Bress.)

~~Van. *Id.* *C. collinensis*.~~

mucosus 917

Ternior; ~~stipite~~ ~~levi~~, ~~sericea~~; lamellis
ex albido ferrugineis; stipite levi, se-
riceo, 5-10 cm. long~~ae~~, 1 1/4 - 2, 5 cm.

crasso, vulgo albo, interdum vero
coeruleo, ~~Caesera~~ C. collinoti

→ April 13-16 = 5-7 (Bataille)