


#1 Inoloma

60-80

(1) Conspectus synopticus specierum (1.)

I. - Lamellae ex albedo nigilataeae vel e pallido cinnamomeae		
1. - Stipes argenteo - splendens		60 C. argentatus
2. - Stipes nigilataeae - albus v. albivaceus		61 C. opimus
A. - Stipes acue crassus ac longus, f. illis cernuatus		62 C. longidus
B. - Stipes longior quam crassus, glaber		
II. - Lamellae nunquam albicae vel pallidae		
1. - Stipes nunquam violaceus vel caeruleus		
A. - Lamellae e purpurascens ferrugineae		[70 C. Bulliardii]
B. - Lamellae nunquam purpurascens		
a. - Stipes squamis dissolutoribus vestitus		
α. - Stipes rubro - variegatus		63 C. solaris
β. - Stipes fibris nigris hispides		64 C. phrygiamus
b. - Stipes nunquam variegatus		
α. - Stipes et stipes fusciscentis		
A. - Lamellae cinnamomeae		
a. - Lamellae lutescenti - cinnamomeae		65 C. arenatus
b. - Lamellae umbrino - cinnamomeae		66 C. lobato - repandus
β. - Lamellae olivaceo - lutescentis		67 C. sublanatus
β. - Stipes et stipes fulventes v. lutescentes		
A. - Caro, praevortum stipitis, lutescens		67 C. callistus
B. - Caro alba		68 C. sphaeraceus
2. - Stipes saltem ad apicem violaceus.		
A. - Lamellae nunquam violaceae v. caeruleae		
a. - Lamellae e purpurascens ferrugineae v. cinnamomeae		
A. - Stipes e violaceo umbrinus		69 C. violaceo - cinereus
B. - Stipes rufiscentis		70 C. Bulliardii
b. - Lamellae nunquam lutescentis		
α. - Lamellae primis croceo - ochraceae		71 C. amethystinus
β. - Lamellae cinnamomeae v. olivaceae		
A. - Stipes inferne albo - lanatus		72 C. scitellus
B. - Stipes inferne fusco - squamosus		73 C. sublanatus
B. - Lamellae primum violascentes v. caeruleascentes		
a. - Stipes cervinus v. cinnamomeus nunquam violaceus		74 C. lepidomyces
b. - Stipes fibris minus violaceus v. olivaceus		
α. - Lamellae primum lacte cyaneae v. caeruleae		
A. - Stipes vix succosus, sanguineo - rubens		75 C. cyanites
B. - Stipes exsuccus, basi intus albus		76 C. campobatus
β. - Lamellae violascentes		
A. - Fungus olivaceus		
a. - Caro demum lutescens; stipes violaceo - pallidus, basi intusque lutescens		77 C. barcinus
b. - Caro demum albicans; stipes violaceo - purpurascens		78 C. muricinus
β. - Fungus violaceus		
a. - Stipes violaceo - albicans; stipes clavatus		79 C. albo - violaceus
b. - Stipes obscure violaceus; stipes bulbosus		80 C. violaceus



60 Corticarius argentatus (Pers.) Fr. Epicr. p. 279 (1836)

Sacc. Syn. fung. V p. 924, Agaricus argentatus Pers. Syn. p. 286 (1821)

Leon. Kromb. Schw. t. 2 p. 27, Cooke M. Br. F. t. 745, Gill. Champ. Fr.
F. suppl., Lang. F. di Roma, t. 61 p. 2.

Bibl. 61, 397, 398, 653, 656, 661, 983.

Hab. in silvis, quaratis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino,
Lago.

Area distr. Europa.

Exsicc. Erb. cont. it. I n. 535.

argentatus 924

Magnus, validus, pallescens, subolidus, non vero foetens,

pileo carnosio, convexo, glabrescente,
argenteo-splendente, disco subgibbo pallescente,
circa marginem primo lilacino-sericeo,
dein leucophaeo, 10 cm. usque lato;

lamellis emarginatis, confertis, serratis,
e pallido aquose cinnamomeis;

stipite valido, albo, ^{et basi demum obsolete lutescente,} infus inconcolore; nunc
brevis, bulbosus, nunc 10 cm. longus, 1,5 cm.
crassus, subaequali, cortina fugax excepta
glabro; ~~to~~

Sporis ovoides 10-11 μ longis - \nearrow

51 *Corticarius opimus* Fr. Sp. v. p. 278 (1836)

Sau. Syst. Fung. V p. 923

Leon. Fr. Leon. Hymen. t. 151/1, Gr. U. Champ. Fr. t. Suppl.

Bull. Massat. in Bull. Soc. bot. Ital. 1912

Hab. in hlocting ad terram Trentino: Varena (Nes. et Mass.)

Area Distrib. Europa.

opuntia 923

Informis, ponderosus, caro albida;

obtusissimo pileo crasso, compacto, convexo-plano,
^{repando}
(inaequali, , sicco, tomento alutaceo adpresso,
rimose-rivuloso, alutaceo, ~~rep~~ margine saepe infracto,
lamellis emarginatis, subconfertis, ex albido
argillaceis, ob marginem infractum crispis,
stipite duro, obeso, fibrillis albis continato,
pallido 1,5-5 cm. longo et crasso, basi
attenuato, sporis 10, μ longis - \uparrow

~~At. Frey (Monogr. II pg. 45) nuda una
forma "fulvo-brunneus" pileo glabro,
demum sinuato "~~

62 *Corticarius surgidus* Fr. Epicr. p. 278 (1836)

Sau. Syn. fung. V p. 924.

Icon. Battarra F. Arim. t. 9 f. C (*Monomyces ventricosus*) Qual. in Frew. VII (1878) t. 109/1.

Hb. ~~103~~ 103. →

Hab. in litwaniis — Smiltia: pr. Rimini

Area disti. Europa.

SP

Obs. Specie da confermare quanto al tipo di Battarra.

Lurgidus 924

Caro albida, olida;

pileo compacto, obtuso, e carneo-atomato

glabrato, argillaceo-albo, nitente, margine pri-

mo sericeo; 5 mm. lato, demum glabro;

lamellis emarginatis, confertis, ex albido pal-

lide argillaceis; 4 mm. latij; ~~costina fibrillosa, obsolete~~

stipite valido, bulboso, rimoso-striato, vel in superficie
undulato,

glabro, argenteo-splendente, spongioso-elastico, valde

lunefante, ealy rigido;

Sporis 8-9 = 5 ovoideo-pruniiformibus, levibus, olivaceis
(Bataille)

Observ. Specie notevole, anormale in questa

tribuff, ma è messa qui per ragione

del cappello molto carneo; ~~costina fibrillosa,~~

~~obsoleta~~

62 *Corticium bolanig* (Pers.) Fr. Epw. p. 282 (1836)

Sau. Syn. Fung. V p. 931, *Agaricus bolanig* Pers. Syn. p. 291 (1801)

Urm. Pers. Urm. Fung. t. XIV f. 1, Berkeley Outl. t. 19 f. 1, Cooke

M. Br. F. t. 760, Quel. in Jew. V (1877) p. 79.

Bot. 434, 250. →

Hab. in silvis - Neapolitano

area dist. Europa

bolaris 931

Elegantissimus, nunc solitarius, stipite valido, lamellis demum
disantibus, nunc subcaespitosus, stipite tenui, flexuoso, subsolido;
pileo carnoso, obsolete umbonato, palles-

cente, squamis innatis, filosis, adpressis,

croceo-rubris variegato, 2-8 cm. lato, carneque compacta,
alba non hygrophanis;

lamellis subdecurrentibus, confertis, aqueose

cinnamomeis;

stipite e fureto cavo, subaequali, squamoso,

conicolore, 5-8 cm. longo, 6-11 mm. crasso.

sporis ovato-oblongis, 10 = 4 →

64 *Cochlearia strygianus* Fr. Spor. p. 283 (1836)

Sau. Syst. Jung. V p. 934

Icon. Fr. Icon Mycol. t. 153 f. 3.

Bill. 418

Hab. in silvis umbris - Trentino: Valle Lagarina (Cob.)

Area Dist. Europa

phrygiamy 934

Odor Kapkani;

pileo carnoso, obtuso, melleo,
fibris densis; simplicibus nigris
hispidis;

lamellis rotundatis, subconspertis,
sordide luteis;

stipite bulboso, fibris nigris
laxis reticulatis; sporig $\delta = 6 -$

Observ. Haec quasi l'aspetto
di Armillaria mellea.

65 *Cochlearia arenata* (Pers.) Fr. Epicr. p. 283 (1836)

Sacc. Sylt. fung. V p. 934, *Agaricus arenatus* Pers. Syn. p. 293 (1801)

Mon. Cooke Sm. Br. F. 783, Gillet Champ. Fr. t. 556, Dub. Champ. t. 586

Thell. ~~herb.~~, 418, 434, ~~434~~, ~~434~~, 983. →

Hab. in silvis mixtis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino: Valle Lagarina
(Cob.), Trienza (Br. M.S.)
Napoletono.

Area dist. Europe.

arenatus 934

Junior etiam olivascens;

pileo carnoso, convexo

perinis gibbo, squamulis floccosis

granuloso, helvolo-fuscescente, 8 cm. lato;

lamellis emarginatis, ventricosis,

subconfertis, lutescente-cinera-

moecis;

stipite clavato-attenuato, ultra

medium peronato, fusco-squa-

mulo, apice levi, pallido, 8 cm.

longo;

Sporis 6-7 = 4-5 (10-11 = 5-6;

basidiis 40 = 10 (pres. M.S.) - 4

Obs. Strettamente affine a


C. psoggianus, difficilmente di-

stinguibile dalle forme scolorate di

C. psolidicus, ^{lepidomyces} ma le lamelle non

sono mai violacee.

66 *Corticarius lobato-repandus* (Brig.) Conroy F. Nees p. 74 et 115 (1878)
Agaricus ^(Cort.) *lobato-repandus* Brig. F. Nees p. 60, t. 29 f. 1-2, ⁽¹⁸⁴⁸⁾ *Ann. Syst. V.* 1162
Icon. Brig. l. c.

Bull. 250, 434. 

Hab. ad terram silvaticam — Neapolitana: Buccino, Botte, Perrano, Lombrano
Are. Nati Urbis merid (Briganti)

oss. Specie poco chiara.

~~Agaricus~~

lobato-repandus 1142

pileo subcarnoso, e convexo expanso,
sicc, squamoso, spadiceo, margine
tenui, irregulariter crenulato; lamellis
stipitem attingentibus, latis, lobato-repandis,
umbrino-cinnamomeis; stipite
spongioso-farcto, subaequali, sordide
albo, ad basim fuscescente, annulo
obsoleto

67 *Corticium callitaeus* Fr. Epicr. p. 281 (1836)

Sacc. Syll. Fungi. V p. 930, *Agaricus callitaeus* Fr. S. M. I p. 228 (1821)

Yvon. Fr. Yvon. Hymen. t. 153 f. 2, Cooke M. Br. F. t. 774, 964.

Bot. 417, 418, Mass. in Ball loc. bot. st. 1912. →

Hab. in hirsutis abietis - Trentino: Valle Lagarina (lob.) Sarnon (Br. M. S.)
Varese (Mass. et Br.)

Area disi Europa.

Aestiva - cluvenna

Callistey 930

Integris, inodorus, luteo-fulvus;

fibris aequaliter carnosis, sed sat tenuis,
cavata, convexo-plano,

glabrato, levi, in natisque - squamulosis,
non hygrophanis, nitente, 5-6 cm. lato;

marginibus subsericeis, declivi vel infracto, vel concolore
fibrillosis primo appendiculatis;
carne albo-lutescente;

lamellis adnatis, portice floccoso-corneis, primo sub-
confertis dein subsistantibus, oblongis, planis, flosculo-
sum instar Poae inter se et stipite adnatis;
stipite elongato, bulboso, toto carnosio,

fulvo-fibriloso, extus intusque strabarbarino,
8-10 cm. longo, a basi molli clavata, ubi 2,5 cm. crasso,
attenuato, apice 6-9 mm. crasso,
sporibus ellipsoideis δ 8-5; basidiis 30-35-8-1

Obs. La figura di Saund. e Sm. t. 3 mostra
ottimamente la statura e i caratteri, ma
si scosta pel color ferrugineo.

68 *Corticarius tophaceus* Fr. Epicr. p. 281 (1836)

Sau. Syst. fung. IV p. 929

Icon. Fr. Icon. Fungum. t. 153 f. 1, Quél. in Gren. VII (1878) t. 109 f. 2

Sau. Myc. Ven. Spec. t. 5 f. 13-16.

Phil. 209, 12, 1133, Bres. MS.

Hab. in herbis, praecipue frondosis - Veneto, Trentino, Toscana

Area disti. Europa.

Val di Sella (Ambros. = Bres. MS.)

~~Ambros.~~

Toxhaceus 929

Subcaespitosus;

caro alba, odor non notabilis;

pileo carnosus, obtuso, ochraceo-filvo,
villoso-squamoso

lamellis emarginatis, distantibus, ful-
vo-cinnamomeis;

stipite bulboso, villosa-squamoso,
veloque fibrilloso lutescentibus;

sporis $6-8 = 5$ ($10-12 = 6$, basidia
 $30-35 = 7-8$: Bres. Mod.) — ↗

Osserv. Gli esemplari solitarii, più grandi,
corrispondono in tutto a C. violaceus
eccetto il colore di tutto il fungo
che è ocraceo; i caespitosi invece
sono alquanto più sottili col gam-
bo spesso piegato.

69 Cochlearium violaceo-cinereus (Pers.) Fr. Epur. p. 279 (1836), C. cinereus-violaceus Fr.
 Sac. Syst. fung. V p. 925, Agaricus violaceo-cinereus Pers. Syn. p. 279 (1801)
 Yun. ~~Exch. Hym. de~~ Schaff. Ex. Fung. t. 3 (A. violaceus), Richon et Roger
 Att. Champ t. 34 p. 22-24.

Pr. 90, 653, 661, 704, 1133, 1284, 1965 →

Hab. in silvis praecipue frondosis - Liguria, Canton Ticino, Lombardia, Tosca-
 na, Lazio

Area dist. Europa.

violaceo-cinereus 925

= cinereo-violaceus

Odor haud notabilis; ^{Caro pilis e sordido albicans, stipitis pallide violaceo-rubens} pilis carnosis, obtusis, e violaceo umbino, squamuloso-punctato, 5-8 cm. lato, juniori magis sericeo; lamellas adnatis, subdistantibus, purpurascenti-umbinis demum cinerascens; stipite clavato-bulboso, firmo, exsiccato, violaceo-pallescente, 5-8 cm. longo. Sporis praeformis-oblongis 10-12 = 5 laticibus, ochraceo-ferrugineis.

(Bataville) —

Observ. Specie avari mutabile, quibusdam loco concordans le descriptioni

70 *Cochinarius Bulliardii* (Pers.) Fr. Epicr. p. 282 (1836)

Sau. Syst. Fung. V p. 930, Agaricus Bulliardii Pers. Syn. p. 289

Icon. Bull. Champ. t. 431 p. 3 (*Ag. araneosus protens*), Guil. Champ. Fung.
I t. 9 p. 3, Cooke M. Br. F. t. 721, 722,

Bibl. 61, 393, 398, 411, 418, 430, 585, 737, 983, 1031 →

Hab. in silvis, praecipue fageis - Liguria, Piemonte, Lombardia,

Trentino; ~~Veneto~~ Valle Lagarina (Cob.) Sopramonte (Turco-Sapperi in Pers. ms.), Veneto

Area Disti. Europa.

Reclate - Anthenum

Bulliardii 930

Statura minor sed robustus, solidus,
caro alba, stipitis vero ad basin rufescens;
Pileo carnoso, campanulato - convexo,

Subobtus, levi, squamuloso, ^{→ vulgo glabro} rufe-
sed etiam toto fibrilloso,
rufescente, 5-6 cm. lato

Lamelis adnexis, latis, e purpurascens
ferugineis, 6 mm. latis;

Stipite bulboso, curvo, fuso, deorsum

fibrillisque cinnabarinis, apice albicante,
5-11 cm. longo, 1 1/4 cm. crasso;

Sporis 13 = 8 | ~~14-15 = 8~~
8-9 = 5.5-6; basidiis 25-30 = 7-8
Pres. M.S. ←

It. V' è una varietà che s'acosta a

C. muricinus e C. caninus, col
gambo violaceo superiormente, rosso
in basso, col cappello violaceo-ru-
fescenscente, colla carne cereulescente
presso le ^{alle} lamelle e queste più stipate;
Secr. n. 158.

71 *Cochlearium amygdalinum* (Schäff.) *Agaricus amygdalinus* Schöff. Ic. fung. IV p. 26, t. 56 (1774)
Cochlearium traganus Fr. *Epur* p. 281 (1836)

Sau. Syst. fung. V p. 929, *Agaricus traganus* Fr. *S. M. F.* p. 215 (1821)

Journ. Vent. Stud. micol. t. 9 p. 77-78, Schäff. l.c., Quét. in Grev.
VII (1878) t. 116 p. 3, Cooke *M. Br. F.* t. 757.

Herb. 209, 662, 1968, Pres. ms.

Hab. in silvis - Veneto, Lombardia, Canton Ticino, Trentino: Magras, Sopramonte

Area dist. Europe.

(Pres. ms.)

æstate-autumno.

+

amethystinus
= *traganus* 929

Ospor hircinus, Foelen

pileo carnoso, obtuso, e lilacino —
denuerectus intusque lutescente.
Fibrilla glabrata decoloraque, cretae &
in lato;
Lamellis emarginatis, crassis, crenatis,
distantibus, primis croceo-ochraceis,
stipite bulboso, spongioso, albo-violaceo,
intus croceo, 10 cm. circ. longo;

Sporis sphaeroides-ellipsoideis, fuscidulis
(sub lente) 8-10 = 4-6, basidiis 25-30 = 7-8

Not. Similissimo a *C. pulcherrimus*,
ma facilmente distinto pel color
delle lamelle mai violascente,
pel cappello quasi compatto
* * in fine entro e fuori
lutescente

Cochinarius sulleyi Fr. Epicon p. 281 (1836)

Lac. Synth. Jung. V p. 929.

Zoon. Fr. Zoon. Hymen t. 375 f. 191.

Bot. 12, Mes. M. —

Hab. in hinc abregus — Trentino: Valle d. Sella (Ambrasio & Mes. 105)
Area dist. Europa.

Suillus 929

Caro roridida; odor mere funginif;

pileo carnoso, convexo, obtuso, testaceo-pallescente,
marginem versus primo sericeo, dein innato-squa-
muloso, fragilibus, 8-10 cm. lato

lamellis adnatis, latis, subdistantibus, opacis,
cinnameis, fragilibus, basi venoso-connexis,
1 $\frac{1}{4}$ cm. et ultra latis;

stipite clavato, spongioso, inferne adpresso,
albo-lanato ~~sa~~, medio fibrilloso, apice sericeo-levigato,
violaceo ^{proridide pallente, tactu obscuriore}, valido, 10-13 cm. longo

sporis ellipsoideis, utrinque obtusis, 10-12 = 6-8
↳ basidiis 25-30 = 7-8 —

3 Cortinarius sublanatus (Sow.) Fr. Epur. p. 283 (1836)

Sau. Syst. Fung. V p 933, Agaricus sublanatus Sow. Col. pag. t. 224
(1799)

Icon. Sow. l.c., Cooke M. Br. T. 762, G. A. Champ. Fr. t. 323.

Bill. 430 (Ag. conopus), 585 (id.)

Hab. in silvis - Liguria, Piemonte (Cotta, Garbighella)

Area N. Europe

Sublanatus 933

Odor Kapskani, color saepe olivaceus,

pileo carnosio, campanulato - eapiano,
umbonato, alutaceo - fusciscente, ^{demum ferruginescente,} squamulis
filosis imbratis, 8 cm. late;

lamellis subadnatis, vix confertis, olivaceo-lute-
scentibus;

stipite bulboso - attenuato, ^{conico elongato,} sursum gla-
berrimo, ^{pallidato (violascente vel azyaneo)} deorsum tomento fusco squa-
moso; ^{8 cm. longo,} velo fusco passim sed unguato;

Sporis 10 μ longis \rightarrow

On: Per molte ragioni si accosta alle ^{Sottogen.} Telamonio

Corbinarius lepidomyces (alb. et Schw.) Schrot. Schles. II p. 596 ⁽¹⁸⁵⁹⁾ *Agaricus lepidomyces* Alb. et Schw. desat. p. 155, t. 12 f. 1 (1805)

Corbinarius pholidicus Fr. Spic. p. 282 (1836)

Sau. Syst. fung. V p. 937. *Agaricus pholidicus* Fr. S. M. I p. 219 (1821)

Zon. Quät. in Grev. VII (1878) t. 117 f. 1, Cooke Zool. Br. F. t. 261

~~Fr.~~ Alb. et Schw. l.c. ~~quät. europ.~~

Mitt. 1133.

Hab in Dumetis humidis - Toscana: prov. di Siena

Area dist. Europa.

Lepidomyces
= *pholidomyces* 933

† *Hobilis*, *subolivascens*

pileo carnoso, expanso, obtuse umbonato,
sensim lactiore, interdum cinnamomeo,
cervino, pilis fasciculatis, imatis, nigrican-

tibus dense squamuloso, 2-12 cm. lato, sat tenuis,
non hygrophanus.

lamellis submarginatis, confertis, e violaceo

argillaceo-cinnamomeis, 4-8 mm. latis.

stipite attenuato, squamis fusco-fuliginosis

transversim squarrosamulatogue, apice

levi, violaceo, 5-11 cm. longo;

sporis subsphaeroidis, flavidis (sub lente)

6-7 = 5-6. — ↗

75 *Cochinarius cyanus* Fr. *Epoc.* p. 279 (1836)

Sav. Syst. Fung. V p. 925.

Yen. - Fr. *Yen. Hym.* t. 152 f. 1; Gill *Champ. Fr.* t. 320.

Bibl. *Bresad. MSS* →

Hab. in silvis pondosis - *Trentino: Inzenga* (*Bres. MSS*)

Area sub.

Aestate - Autumno - raro.

Cyanites 925

filis carnosis, obliquo sericeo-ligato,
pallide caeruleo, ^{livido-fuscescente;} 6-7 cm. lato, demum
glabro; carne primo pallide caerulea dein
sordide alba et saepe rubente;
lamellis rotundatis, subconfertis, primum
laete cyaneis;

stipite bulboso, ligato, caeruleo, intus
succoso, sanguineo-rubente; 5-8 cm.
longo, 1 cm. crasso, compresso succum
sanguineum fundente

~~Var. major filis stipiteque compactis,
tardius rubentibus; lamellis subdis-
silibus cyaneo-inescentibus.~~

76 Cortinarius camphoratus Fr. Spic. p 286. (1836)

Sau. Syst. Fung. V p. 926, Agaricus camphoratus Fr. S. M. I p. 218 (1821)

Leon. Fr. Icon. Hymen. t. 152 f. 2, Cooke M. Br. F. t. 713, Griff. Champ.
Fr. t. 306.

Bittl. 430, 585. →

Hab. in silvis piceis montanis: Liguria, Piemonte

Area dist. Europa.

campboratus 926

Magnus, odore gravissimo

Pileo carneo, obuso ^{> 5-11 cm. lato,} e hinc sericeo
glabrato decoloratoque, neutquam hygrophanus
nec caeruleus, carne caerulea;

lamellis tenuibus, confertis, lacte caeruleis
dum purpurascuntibus, nunc decurrentibus, nunc
emarginatis;

Stipite bulboso, exsucco, basi intus albo, 5-14
cm. longo, 1 1/4 - 2.5 cm. crasso, juniore peronato-lanato,
lactinae caeruleiscentibus; bulbo non marginato;

sporis sphaeroides - ellipsoideis, fusciculis
(sub lente), $g = 6$ — ↗

77 *Cortinarius lividus* (Boltz) Fr. Hymen. Europ. p. 362 (1874)
Sav. Synth. fung. V p. 927, *Agaricus violaceus* Boltz. Fung. t. 52, non Linn.
Non. Bolton l.c., Lucant Suite Bull. t. 221.
Bibl. Bresad. MS.

Hab. in silvis — Trento: Pelt. prope aquas acidulas, Dimaro (Bres. MS.)
Area dist. Europa

Autumno

Ord. See. Guél. Fl. Mycol. p. 147, non è abbastanza diversa da Cort. amethystinus.

hircinus 927

(Odor, praecipue vetusti, foetidissimus);

pileo caroso, obtuso gibbove

fibrillis adpressis violaceis sericeo,

expallente, disco glabrato ferruginascente,

carne sordida, demum lutescente;

lamellis emarginatis, subdistantibus,

latis, integris, e violaceo cinerameis);

Sporis ellipsoideis, 1-guttulatis, flavidis (sub
micr.) $9-10 = 4-5$; basidiis $20-25 = 5-8$

Osserv. Esattamente intermedio tra gli
affini, minore di C. campboratus
e C. Clintonianus ma più vi-
cino a questo.

Secondo Bres. (~~de~~ M. S.) simile
a C. traganus.

→ stipite ~~bulboso~~ bulboso, esuoco, cortinato,
violaceo-fallido, basi intusque
lutescente;

78 *Corticium murcinum* Fr. Epicr. p. 279 (1876)

Sacc. Syll. Fung. V p. 925

Journ. Mich. N. pl. gen. t. 74 f. 1 (*Fungus esculentus bulbosus...*), Cooke DM.
Br. F. t. 815.

Dist. 785, 434, 704, 700, Pres. MS.



Lazio (Maratti)

Hab. in bulis, praecipue Coniferarum - Toscana (Maratti), Neapolitana (Cames)

Area Distr. Europa

Trentino. Mandola, Sopramonte (Pres. MS.)

Asiate = Subannuum

muricinus 925

Odor peculiaris; caro exsucca, e caeruleo. albicans;

pileo compacto, ^{crasso, spongioso, obtuso} ~~stipite~~, glabrescente, $\frac{1}{2}$

violaceo-rufescente, margine fibrilloso, 8-11 cm. lato,
variante naucoso-granulato;

lamellis emarginatis, subconfertis, violaceo-
purpurascensibus, ~~stipite~~ ^{et sublaevato} demum rufescenti-
hepaticis, $\frac{1}{4}$ cm. latis;

stipite bulboso, exsucco, villosa, ^{et sublaevato} violaceo-
purpurascens, valido, - sporis 11-12 = 6-7

79 *Corticium albo-velaceum* (Pers.) Fr. Epicr. p. 280 (1836), *Sau. Syst. Fung.* V
p. 925, *Agaricus albo-velaceus* Pers. Syn. p. 286 (1801)
Leon. Fr. *Icon. Hym.* t. 151 f 3, *Cooke M. Pr. F.* t. 747, *Gill. Champ. Fr.*
t. 321.

Atl. 209, 315, 430, 434, 585, 704, 1133, 1284, 101, 1301, 1965

Hab. in remoribus frondosis - Liguria, Piemonte, Lombardia; Veneto, Trentino (Muss.)
Toscana, Neapolitana

Area distri. Europa, Amer. bor.

↑
Saccardo
↓

~~Inobolus~~ 925
albo-violaceus

Inobolus, viscidulus, carne succosa, ~~caeruleo~~ ^{caeruleo-violaceo}.
caeruleo-alba;

fulco ramato, fibrillis innatis

sericeo, demum late gibbo

violaceo-albicante, 2-8 cm. lato;

lamellis adnatis, subsistantibus,

serrulatis, primo cinereo-violaceis;

stipite clavato, ^{subconico} medio subcingulato
et saepe peronato-annulato,
violaceo-albicante, 5-10 cm. longo;

sporis sphaeroideo-ellipsoideis,

flavidis vel fuscidulis 6-9 = 4-5

(12-14 = 7-8; basidiis 40-45 = 10-12)

Pres. M. S.) ↗

80 Cortinarius violaceus (Linn.) Fr. Epur. p. 279 (1836)

Sacc. Syll. Fung. V p. 924, Agaricus violaceus Linn. Sp. pl. I p. 1173 (1753)

Fr. Fr. Sverig. ätt. t. 58, Bull. Champ. t. 250, Cooke M. Br. F. t. 770

Lang. F. d. Roma, t. 61 p. 1, Pat. Tab. anal. p. 127, Venturi Mic. Presc. t. 38
fig. 1-4.

Dist. 61, 90, 123, 12, 398, 430, 434, 585, 653, 656, 836, 866, 983, 1219, 1258, 1072 1965. 1456 →

Hab. in silvis, frequens - Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Emilia, Lazio, Neapolitan

aree dist. Europa, Australia

(: Valle Lagarina (Cob.), Tergolas,
(Thes. MS.)

= Autumno - raro =

violaceus 924

Obscure violaceus, unicolor, inodorus; pileo
amoso, obtuso, villososquamoso, 8-16 cm. lato;
lamellis adfixis, latis, crassis, distanti-
bus, obscurioribus; stipite bulboso, spongio-
so, villosos, intus violaceo-cinereo;
sporis sphaeroideo-ellipsoideis, subin-
aequilateralibus, flavis (s. lente)
12-13 = 7-8; basidiis 30-35 = 8-10