

IV Dermocybe



2 81-102

(1) *Conspicuous synoptical spectrum*

- I. *Lamellae angillatae* v. ex albidis *angillatae*
1. — *Plus pallidescens* - albus v. ex albo - lutescent
 - A. — *Lamellae primum albidae, styges solidi* 81 *C. ochrobuccus*
 - B. — *Lamellae primum angillatae, styges e fardo cavi* 82 *C. decumbens*
 2. — *Plus fuscescens* - angillatae v. fusco - canescent
 - A. — *Lamellae ex albidis angillatae* 83 *C. labellaris*
 - B. — *Lamellae ex angillatae - griseo - fusciscent* 84 *C. canarum*
- II. *Lamellae nunquam albidae v. angillatae*
1. — *Lamellae primum caeruleascentes v. purpurascentes*
 - A. — *Styges albo - blacini, rufo - vel fulvo - variegati* 85 *C. philomeus*
 - B. — *Styges squamis rufo vel fulvis non variegatis*
 - a. — *Plus primo blacini deinde fusco - pallens* 86 *C. azureus*
 - b. — *Plus nunquam blacini*
 - a. — *Styges totus violaceo - pallidus* 87 *C. procerus*
 - b. — *Styges apice tantum violaceo, cordina fusco - conatus* 88 *C. caninus*
 2. — *Lamellae nunquam caeruleascentes nec purpurascentes*
 - A. — *Lamellae primum olivascentes*
 - a. — *Plus ochraceus* 89 *C. croceo - auratus*
 - b. — *Plus olivaceus*
 - a. — *Plus semper olivaceus, luteatus* 90 *C. cotoneus*
 - b. — *Plus ex olivaceo fulvescens v. lutescens*
 - A₁ — *Care pallida; flor Raphani* 91 *C. raphanoides*
 - B₁ — *Care viridi - lutea* 92 *C. venetus*
 - B. — *Lamellae rubrae, luteae, v. cinnamomeae*
 - a. — *Styges plus minime rubens*
 - a. — *Plus badillo - cinnamomeus* 93 *C. milthius*
 - b. — *Plus purpurascens vel castaneus*
 - A₁ — *Plus umbonatus, subcaespitosus* 94 *C. anthracinus*
 - B₁ — *Plus obtusus, coccineus vel obscure sanguineus*
 - a. — *Styges e fardo cavi, lamellae confusae, color fungi obscure sanguineus* 95 *C. sanguineus*
 - b. — *Styges fardis, lamellae substantes, color fungi coccineo - cinnabarinus* 96 *C. cinnabarinus*
 - b. — *Styges fulvus, lutescens, v. cinnamomeus*
 - a. — *Plus conico - campanulatus, persistenter acutus* 97 *C. croceo - conus*
 - b. — *Plus convexo - obtusus v. obtuse umbonatus*
 - A₁ — *Care rubens, styges fulvus* 98 *C. orellanus*
 - B₁ — *Care lutescens v. e luteo virescens, styges flavescens*
 - a. — *Plus fulvus, margini aureus* 99 *C. maticorius*
 - b. — *Plus cinnamomeus v. olivaceo - fusciscent* 100 *C. semisanguineus*
 - A₂ — *Lamellae sanguinae*
 - B₂ — *Lamellae cinnamomeae v. lutescentes*
 - A₂ — *Lamellae cinnamomeae* 101 *C. cinnamomeus*
 - B₂ — *Lamellae lutescentes* 102 *C. croceus*

81 *Cortharcus ochroleucus* (Schäff.) Fr. *Spicr.* p. 284 (1836)

Sac. Syst. fung. V p. 935, *Agaricus ochroleucus* Schäff. *ic. fung.* IV p. 24
t. 34 (1772)

Icon. Schäff. l.c., *Brig. F. Reap.* t. 31 f. 1-4, *Cooke 24. Br. F.*
t. 775, *Quél. n. Grav.* V (1877) t. 85 f. 1.

Brit. 209, 434, 250, 1091, 1284, 1617, 1965

Hab. in silvis — ^{Piemonte} Veneto, Lombardia, Neapolitano, Sicilia
Area dist. Europa, Amer. bor.

ochroleucus 935

Inodorus, sapore amaricans non ingratus;

pileo caruoso, convexo, e
gibbo obtuso, levi, glabell^o, ^{sub lente sericeo}, palliscenti-albo,
5-6 cm lato;

lamellis adnato-leberis, confertis, ex
albido arg; claceo-ochraceis;

stipite solido, firmo, ventricosso, albo,
apice fibrilloso-cortinato, 8 cm longo,
8-11 mm crasso.

sporis 7-8 = 4-5 (Bataille) - 1

Offens. Specie distincta e rara

82 *Cortinarius decumbens* (Pers.) Fr. Epur. p. 284 (1836)

Sac. Syst. fung. V p. 935, *Agaricus decumbens* Pers. Syn. p. 286 (1801)

Mon. Quél. in Grév. VIII (1879-80) t. 127 f. 3, Cooke M. Br. F. 6-816.

Brit. 1284, 1965

Hab. in graminosis liliaticis - Lombardia: prov. d. Brescia.

are distr. Europe.

Secumbar 935

primo saepe gibboso,
Filiis carnosus, convexo-expansus, levissimus, glabrato,
albo dein lutescente, ~~notatus~~, sericeo-nitente pellicula
fibrillosa, licet glabro, 2-4 cm. lato,
lamellis adnatis, confertis, primo argillaceis;
stipite e fureto cavo, clavato-bulboso, adscen-
dente, glabro, 5-6 cm. longo, demum inae-
quali, apice subpruinato.

sporis pruiniformibus 8 µ longis, utrinque (Bataille)

Diff. E minore di C. ochroleucus.

83 Cortinarius tabularis Fr. Episc. p. 284 (1836), Agar.

Lacc. Syll. fung. V p. 936: Agaricus ochroleucus Pers. (1801), Agaricus tabularis

Fr. S. M. I. p. 221 (1821)

Icon. Bull. ^{t. 431} ~~t. 431~~ t. 5, Cooke M. Br. F. t. 783.

Pib. 61, 983, Bres. M.

Hab. in silis, praecipue frondosis — Liguria, Toriana — Firenze (Marcelli.
area distr. Europe. in Bres. M.)

files carnosus, aequali, mox appianato,
 e flocculoso glabrato, fusciscenti-ar-
 gillaceo, falliscente, 8 cur. et ultra
 lato, singulari modo saepe humore aqueo pecto
 et cum floccis in zonam albam circa marginem in exsic-
 catis ~~confluentibus~~ lamellis emarginatis, confertis,
 ea albido argillaceis, 4 mm. latis;
 vel omnino albidis, vel fugacissime caesiis, se-
 mum etiam subferrugineis, 4 mm. latis;
 stipite farcto lenaci, elastico, albo,
 adpressi fibrilloso-squamoso, gla-
 brove, 5-8 cur. longo, 6-8 mm.
 crasso.

sponi sphaeroides - ellipsoideis,
 subflavis 10-16 = 7-9 (8-10 = 7-9 Pres. M.S.)

84 *Colinarion camurus* Fr. *Epicr.* p. 285

Sau. Syst. fung. V p. 936,

Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 154 f. 1, *Bull. Champ.* t. 431 f. 4 (*Ag. araneosus* Wittm.
Ag.) *Cooke M Br. F.* t. 784.

Bibl. 209, 1133, 983. →

Hab. in hirs. proscipue caeduis - Liguria, Veneto, Toscana.

Area distr. Europe

camuay 936

Singularis, admodum fragilis;

liles carnosus, tenui, gibbo, inaequaliter carnosus,
margine submembranaceo,
non glabrato, ~~inaequali~~ sed non hygrophanus, 5-8 cm. lato,

fusco canescente, exsiccante saepe rimose inciso,

carne alba; denuo lutescente disco saturatioris carnis

lamellis subadnatis, confertis, 4-7 mm. latis

ferrugineis, ex argillaceo-griseo

fuscescentibus, acie concolore integerrimis,
numquam caesiis;

stipite subcavo, aequali, curvato,

extus intusque albo, apice

argenteo, nitido, 8 cm. longo,

7-9 mm. crasso, torto, vel

adscendente, deorsum longitudinaliter

asprepe fibruloso. — ↗

85 *Corticarius pilomeus* Fr. ^{Monogr. Hymen. II p. 63}
~~Agaricus~~ (1863)

Sacc. Syll. fung. V. p. 939, *Agaricus pilomeus* Fr. S. M. I p. 220 (1821)

Loon. Fr. Icon. t. 154 p. 3, Brig. F. Reap. t. 28 p. 4-6 (*Ag. botaris*)

Bull 250, Bres. Ms. —————→

Hab. in herbosis umbrosis. — Napolitano:

area det. Europe.

{ Trentino: Zugger - Sopramonte (Bres. Ms.)

Autumn

Spilomeny 939

Subcaespitosus;

(pileo carnosulo, gibbo, ricco, glabrescente, fusciscente decoloraque, 2-3 cm. lato;

lamellis emarginatis, confertis, angustis, cyaneo-bilaternis, pallentibus, demum cinnamomeis; ~~sp.~~

stipite subcavo, tenui, albo-lilacino, squamis rufis fulvisve eleganter variegato, 5-11 cm. longo, 4-7 mm. crasso.

sporis subspheeroideis, flavescentibus (hist. micr.)

8-9 = 7-8 (6-7 = 5-7 Bres. M.S.)

Obs.: E' una tra le specie più gracile eleganti, simile per il gambo a C. bolaris, ma molto più tenue, subeguale; le squame sono simili a quelle di C. psolidens, ma la stessa cortina è bianca. Nei boschi d'abete si incontra solitario e un po' più grande.

86 *Cobbinarius azureus* Fr. Epicr. p. 288 (1836)

Sau. Syll. Jung. V p. 938.

Icon. Krombh. Schw. t. 2 p. 25 (Ag. violaceus), Cooke M. Br. F. t. 766.

Quél. ^{Champ.} Vosg. I t. 24 p. 4.

Bibl. 12, 398. →

Hab. in hirs, improvis faginetis - Piemonte

Sella.

Area dist. Europa.

Trentino. Val d.

fl

Solitarium, elegans, carne stipitis caerulea, pilei alba,
nec scissili, nec hygrophana;

pileo carnoso, (obtus, sericeo-nitente
convexo plano)

atomatogue, lilacino canescente, primo lilacino
dein fusco-pallente, 3-5 cm. lato;

lamellis subconfertis, laete caeruleo-violaceis
fimbriis, primo leviter emarginatis, dein decurrentibus,
4 mm. latis;


stipite fere to, glabro, striatulo, basi in-

crassato, villoso, albicante, subfragili, saepe
sorto, amoenae caeruleae, albicante, 8 cm. longo,
8-9 mm. crasso; sporis obovatis, granulosis,
10 = 8 - 7

24. Era le foglie ^{di solito} ~~di solito~~ minore e colto gambo
curvato.

Corticarius anomalus Fr. Ep. cr. p. 286 (1836) (Agaricus eumorphus Pers. Syn. p. 342 (1801))
Sacc. Sylt. fung. V p. 939, Agaricus anomalus Fr. Obi. myc. # p. 73 (1815) ✓
Don. Fr. Germ. Hymen. t. 156 f. 2, Cooke M. Pr. F. t. 776, Berk.
Dubl. t. 12 f. 4, Bull. ~~Champ. t. 431 f. 2 of Ag. arenaceus proteus (1788)
Britt. 61, 430, 585, 983, 101 →
Hab. in silvis et locis humilis muscis - Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino (Mey)
Area dist. Europe, Amer. bor.~~

Separat (Pers. Fr.)
 in forma



87 Corticarius proteus (Bull.) Sacc., Agaricus arenaceus proteus Bull. Champ. t. 431 p. 2 (1788)

protus = anomaly
939

Gregarious; pileo carnosio, tenui
convexo, obtuso, dein gibbo, fuligi-

neo-rufescente, fibrillis receden-

tibus rufescente decoloraque (fulvante); 3-11 cm. lato;

carni aquosa; cortina colorata

lamellis confertis, ^{→ nunc emarginatis, nunc}
lente decurrentibus,

et cyaneo-purpurascens cinnamonif nunc violaceis,
nunc purpurascens, nunc caesis, semper lenitibus,
angustis;

stipite subfereato, tenui, attenuato,

fibrillis, subsquamoso, violaceo pallido; 8-14 cm. longo,
2-7 mm. crasso;

Sporis ellipsoideo-sphaeroides, flavis,

8-9 = 5-7. (7-8 = 5, aculeatis, cineris nunc frumicis,
variabilis 40-45 = 7-10 Bres. M.S.)

Varietas gracilior stipite tenui, aequali, glabro, fle-
se xuro in pinetis.

Ex. = Benchè costantissime, per la gran affinità e pel
colore mutabile, C. caninus, Emyphillinus, C. azureus
e C. albo-cyanus si possono considerare come
sottospecie di questa. Ciò si deve ricordare nella deter-
minazione per non addurre introdurre forme
eterogenee.

88 Cochlearia canina ^(Bull. em.) Fr. Epian p. 285

La. Sylt. fung. II p. 937, Agaricus caninus } Bull. Chem. t. 544 f. 1 (mela) (1791) em.
Fr. S. M. I p. 221 (1821)

Icon. Bull. l. c., Cooke M. Br. Fr. t. 765, Gued. an. Grev. VII (1828) t. 110 f. 1.

Saund. et Sm. Myc. M. t. 15.

Natl. 61, Bres. Ms.

Hab. in silvis - Legumina:

Area didr Range

(Bochetto) Trentino: Sopramonte (Bres. Ms.)

Seslate - Suburno

— R —

Maior, firmior, sed colore etiam lamellarum mutabilis,
 pileo carnoso, convexo-applanato, ^{obtus.} aequali, non
~~et~~ ^{remoto}, circa marginem micore sericeo cano,
~~obtus.~~ glabrato, lateribus rufis, juniore fuscescente,
 fuscis fulvescente,
 decoloratogue; 8-11 cm. lato, carne molli, alba, non
 violacea, demum potius lutescente;
 lamellis emarginatis, latis, subdi-
 stantibus, ex purpurascente cin-
 namomeis, sed coloris intensitate admodum variis;

stipite clavato-bulbo, elastico, ad-
 presso fibrilloso, subperonato
 (passim cortina fusco-lanato)

pallide, apice violaceo, 5-8 cm. longo, 1 1/4 cm.
 crasso

Sporis sphaeroides ellipsoideis

flavids 8-10 = 7-8 (11-13 = 5-6 Pres. M.S.)

-1

SP.

89 *Corticarium croceum* - auratum (Brig.) ~~Cony.~~ F. Nees. p. 24 et 113 (1878) (Syll. Fung. VI. 1142.)
Agaricus ^(Cort.) *croceum* - auratum Brig. F. Nees. p. 92 t. 40 f. 1-3 ⁽¹⁸⁴⁸⁾ Fr. Hym. Eur. p. 318
Fron. Brzant. l. c.
Hab. ad terram - Neapolitanam: Salvitelle (Brzant.)
Arae distr. Gal. merid.

Sp. Dalt.

croceo-auratus 1142

fileo subcarnoso, e conico expanso,
sicc, glabro, ochraceo; lamellis
postice attenuatis, latius, subconfertis,
primo crispis, olivaceis, dein fusco-vi-
rescentibus, sinuato-undulatis;
stipite e farto fistuloso, nitido, amoene
aureo, velo fugacissimo.

90 *Cortinarius cotoneus* Fr. *Epier.* p. 298 (1836)

Sau. Syn. Fung. V p. 945.

Trin. *Quat. in Grav.* VII (1878) t. 111 f. 5, Cooke *M. Br. F.* t. 749.

Bibl. 244, 12

Hab. in silvis, praecipue quercetis — Trentino: Valle d. Sella (Ambr.) Varena (Moss) Toscana: Vallombrosa (Cavara).

Area dist. — Europa

Exl. *Sau. Myc. Hol.* n. 1409.

coloreus 945

~~Olivaceus~~ ^{Spectabilis, lachu mollis, calus intusque}
^{olivaceus, opacus, praecipue pileus laevis;}
pileo carnosio, campanulato-expanso,
bullato, subrepando, innato-velutino, 7,5-8 cm.
lato; indumento fere olivaceo, subpersistente;
lamellis subconfertis, ea olivaceo
brunneo-cinnamomeis;

Stipite solido, cortina fusca x cinque-
lato, basi incrassato, 7,5-8 cm.
longo.

Spores ovoides (7-9 = 5-6) vrenulatis
flavo-olivaceis (Bataille) - V

91 Corkharius raphanoides (Pers.) Fr. Epicer. p. 290 (1856)
Sau. Sylt. fung. V p. 945, Agaricus raphanoides Pers. Syn. p. 324
Tun. Micheli. N. gen. t. 75 f. 2 (Fungus odor. Raphan.), Quel. in fres. VII (1878)
t. 111 f. 6., Cooke M. Br. f. t. 833.

Bill. 61, 397, 418, 704, 866, 983. ^{Bres. ms.} →

Hab. in ^{procupina} hirsutis - Liguria, ^{Piemonte} Lombardia, Trentino, Emilia, Toscana,
Aree dist. Europe Valle Lagarina (Cob.), Inzenga & Tergolas,
Verzema (Bres. ms.)

(— aestate —)

raphanoides 945

Ex olivaceo decolorans, caro pallida & odor
Raphani, sapor aeris,

fileo carnosio, e campanulato expanso,

gibbo fibrillis unatis sericeo, 2-5 un. lato, semini
non fragili, primo fusco-olivaceo, sicco fulvescente
subnitente;

lamellis adnato-ventricosis, subconfertis,

ex olivaceo in cinnamomeis, sed ex aeris consti-
tutione colore, mutantibus;

stipite forato, primo, fibrilloso, opaco, dilutiore,
nunc aequali, nunc sursum attenuato (non bulboso)
saepe torto, 5-8 un. longo, 8 mm. crasso,
ortiva dilutione, olivacea

sporis 7-10 = 5 / globosis = 5-8 μ diam.

raro 8-9 = 7-8: Pres. M. s.) -

Des. *Statira* quasi di *C. cinnamomeus*

ma il gambo è più robusto

92 *Cortinarius venetus* Fr. *Spec. p.* 291 (1836)

Sacc. Syn. fung. V p. 966.

Agaricus venetus Fr. *Obs. myc.* II p. 76 (1818)

Ann. Fr. *Icon. Hymen.* t. 155 f. 4, Cooke *M. Br. F.* t. 833.

Nitt. 1801, 1862, Bres. *ms.*

Tergolas, Nagras (Bres. ms.)

Hab in nemoribus frondosis

Piemonte.

Valle Val d'Asti (pro ^{Trentino} _{Tyrol}) Karne pro. Breiten

Area Disct. Europa.

nova (v. Hühnel) - Aust.
(Ant.)

(Desmouglie)

venetus 946

Gregarinus; color venetus seu lacteus flavo-viridis; caro quo-
que viridi-lutea;

pileo carnosio, tenui, convexo-expanso, obtuse umbonato
sericeo-villoso, ex olivaceo lutescente, opaco; obt 4-5 cm.
lato;

lamellis rotundato-adnatis, subdistantibus

latis, venosis, luteo-olivaceis, dein olivaceo-
cinnamomeis;

stipite e farto cavo, firmo, fibrilloso-stria-

to, cortinaeque concoloribus pileo, sed stipite sae-
pe luteo-villoso;

sporis 10 μ longis.

vel 6-7 μ diam. (Presad. Mo. S.) — $\rightarrow$

~~Officinalis~~ Specie distinctissima, l'indumento del
giallo del cappello la distingue su-
bito dagli affini

Fu raccolto un individuo anormale
nella terra di un tronco col cappello
ombelicato.

93 *Corbinaria milbournii* Fr. Epicr. p. 287 (1836)

Sau. Syst. Fung. V p. 940

~~Base~~ Bst 1663, Pres. ms.

to pres. male' inter musc. (Pres. ms.)

Hab. in bluis coniferis - Trentino. Varua pro Brenanone (v. Höhnelt)

Area Distr. Europa.

Icon Quell. in Grav. VII (1878) t. 110 f. 63, Cooke M. Bot. F. t. 785.

Caro aquosa, dein lutescens;

pileo caroso, tenui, convexo, badio-cinnamo-

neo, mox glaberrimo, nitido, obliquo, vel late gibbo,
4 cm. lato, sicc. expallente, testaceo, disco subradio;
lamellis adnatis, angustis, planis, confertis
ferrugineis; stip

stipite fistuloso, tenaci, sursum aequaliter

attenuato, cinnamomeo, rubro-fibrilloso,

basi incrassato, albo, tomentoso; eximie

cartilagineo, 5-8 cm. longo, 5-7 mm. crasso,

apice costata rubella villosa; sporis 9-10 = 5

basidiis 30-35 = 8 - ↑

Omnino. Per colore si avvicina a C. cinnamomeo

96 *Cortarius anthracinus* Fr. *Ep. con p.* 288 (1836)

Sac. Syst. Fung. V p. 941

Trin. Cooke M. Br. F. t. 787, *Quél. u. Grev.* VII (1878) t. 111 f. 1.

Berk. 1301, *Bres. M.* →

Has in blue pines — *Piemonte*: *Valle* - *Val Sesia*, *Trentino*: *Arco* (*Bres. M.*)
Area distr *Europe* *Aestete*

anthracinus 941

Species elegans distinctissima;
Pileo disco carnosio, sterium tenui,
e convexo expanso, umbonato, fibril-
loso-levigato glabratoque subcastaneo;
lamellis adnatis, confertis, fuscis
fribis sanguineis;
stipite fistuloso, aequali, fibrillato
intense sanguineo, 5 cm. longo,
2-5 mm. crasso; carne concolore;
Sporis ovideo-elongatis 12-14 μ
longis, 8×4 ; basidiis 28-32 = 8
(Pres. M. C.) - ✓

95 Cortinarius sanguineus (Wulf.) Fr. Epicr. p. 288 (1856)

Sac. Syn. fung. IV p. 940, Agaricus sanguineus Wulf. in Fung. Coll. II p. 107,
t. 15 f. 3 (1880) Cooke M. Br. F. t. 786, Gill. Champ. Fr. t. 326, Quél.

in Frev. VII (1878) t. 110 f. 5, t. 111 f. 1 et t. 115 f. 4.

Icon. Wulf. l.c. ✓

Dist. 983, 209, 427, 1965, Pres. M.

→ Lombardia

Hab. in silvis, praecipue Coniferarum — Liguria, Veneto, Emilia.

Area distr. Europa, Australia

(Trentino: Vezzena d. male [var. *disputa* inter coccis] (Pres. M.S.)

~~scottata - subum~~

sanguineus 940

~~base flavo~~, ~~Caespitosus~~;
✓ pileo carneo, tenui, obtuso, immato sericeo
squamuloso obscure sanguineo, 2-3 cm. lato,

lamellis confertis, latiusculis, obscurioribus;

<sup>basidiosus attenuatus quam micrassatus, compresso
succum sanguineum fundente,</sup>
stipite e parvo cavo, tenui, aequali, veloque obscure
sanguineis, breviss.

sporif. ellipsoideis $5 = 4$

Obs. a) 8^a più sottile tra gli affini.

~~1) La carne gialla lo distingue~~

2) Bresadola (M.S.) cita una varietà col gambo
a carne gialla che lo distinguerebbe da tutti i simili
sanguinei; però egli stesso opina che appartenga
piuttosto a C. purpureus Bull.

96 Cochlearia crunatorum Fr. Eprov. p. 288

Sau. Syn. fung. V p. 940,

Icon. fr. Icon. Hymen. T. 154 p. 4, Quel. in fr. 7 (1818) t. 110 p. 4, Cooke

M. Br. F. t. 785, Gill. Champ. Fr. t. 327, Paton. Tab. an. t. 110 p. 4.

Ditt. 923. →

Hab. in silvis - Toscana: Massa Carrara (Pellegrini)

Area Dist. Europa, ~~Alaska~~ Australia

97) *Corticaria croceus* - *conus* Fr. Monogr. Hym II p. 67 (1863)

Sac. Syll. fung. IV p. 942

→ Det. 1863

Hab. in muscipis albarum - Trentino. ~~Werne~~ pro Brenanone (V. Höhn)

Area dist. Europa.

Icon. Quel. in freq. VII (1878) t. 117 p. 3, Cooke M. Br. F. t. 780, Syll. Champ. t. 562

Croceo-conus 942

Psiles carnosulo e conico campanulato, persistenter acuto, glabrato, fulvo-cinnamomeo;

lamellis ascendentibus, linearibus, confertis, cinnamomeis;

stipite fistulato, gracili, flexuoso.

Ps. Statura di *C. iliopodius*, ma affine a *C. croceus*.

Forse meglio sarebbe considerarlo sottospecie di *C. croceus*.

98 Cortinarius orellanay Fr. Epur. p. 288 (1836)

Sac. Symb. fung. V. p. 942

Ann. Quél. in fr. VII (1838) t. 111 p. 4, Cooke M. Br. F. t. 183, Gill.

Champ. t. 325.

Arb. 430, 483, 1301, Bres. MS. →

Hab. in hris - Liguria, Piemonte, Trentino, bosco confuso sopra il Ponderio

area disti. Europe.

(Bres. MS.)

Autumno

orellanus 942

Cero similis, rubens

pileo carneo, obtuse umbonato,
villosa - squamulosa fibrillosa, aurantio-fulva,
lamellis adfixis, latis, subdistantibus, semine
opacis;

stipite solido, firmo, subaequali, ^{etiam basi incrassato} striato-fibrillato
cartilagineo fulvis; sporis 9-10 = 5-6 — 1

Ps. = Facilmente distinto da C. croceo-conus

99 *Corbularia malicoray* Fr. *Epicr.* p. 289 (1836)

Sau. Syn. fung. V p. 963

Icon. Fr. Icon. Hym. t. 155 f. 1

Bill. Bresadola MS

Hab in silvis - Trentino: Val di Rabbi, altis agris acidulas (Bres. MS.)

Area Distr. Europe

Aspate, Aufmanno

Det. Sec. Bresadola (MS.) simile et affine a Cort. cinnamomea.

malcorum 943

Caro scissili, e luteo olivaceo - virescens;

pileo carneo, convexo - plano, obtuso, velutino,
fibrilloso, ~~aureo fulvo~~ colore fundamen-
tali fulvo, in disco obscuriore et ^{praecipue} circa margines
ex indumento eleganter aureo;

lamellis rotundatis, confertis, aureo - fulvis, acie.
demum flocculosis, digitoribus;

stipite cavo, crasso, fibrilloso ~~extinquo~~ aureo,
~~aureo~~, ~~1 1/4~~ ~~crasso~~, demum fuscescente et oliva-
ceo, 1 1/4 cm. crasso, cortina aurea; sporis

8-10 μ longis, aculeolatis, (6 = 4 Bres. M.) -

Oss. Specie elegante di sapore grato
affine anche a C. cinnamomeis

100 *Corticarius tenuisanguineus* (Fr.) Gll. Champ. Fr. p. 484 (1874)
Sacc. Syll. fung. V p. 942, at var. *C. cinereomorus*, *Agaricus tenuisangu-*
neus Fr. S. M. I p. 229.

B. L. Cooke M. Pr. F. t. 779, Quél. Grav. VII (1878) t. 111 f. 2, Brigant.
F. Nees. t. 30 f. 1-4, Gll. Champ. Fr. t. 329, Rolland Att. t. 66 p. 146.

B.M. 244, 250, Bres. Mss., Mass. in Bull. Soc. bot. ital.

Hab. in hirs. — Torone, Neapolitana, Trentino: Varena, boschi. d. Rabbi (Bres. Mss.)

Area Dist. Europa, Amer. bor.,

- *Exs.* Sacc. Myc. Hal. n. 1408

Autumnus
~

Semisanguineus 942
ut var.

Lamellis sanguineis, nec cinnamonis

~~Color lamellarum sanguineus~~
notis C. cinnamonis;

Spang-9 = 4-5

101 *Cortinaeus cinnamomeus* (Linn.) Fr. *Epicr.* p. 288 (1836)
Sacc. *Syll. Fung.* V p. 941, *Agaricus cinnamomeus* Linn. *Sp. pl.* ed. I
1753, p. 1173.

Icon. Kromb. Schw. t. 71 f. 12-15, Cooke *M. Br.* F. t. 777-778,
Gill. *Champ. Fr.* t. 328.

Mitt. 61, 90, 209, 244, 417, 418, 430, 434, 518, 525, 704, 866, 983, 1094,
1284, 528, 529, 1514, 1595, 1747, 1965.

Hab. in silvis valde frequens — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Trentino, Emilia, Toscana, Napoli, etc.
Area Dist. Europa, Amer. bor. J: Valle Lagarina (Lob.), Magas, Tergolas
(Bres. Mus.)
Autumno —

Cinnamomeus 941

pileo carnosio, tenui, obliquo, umbonato,
subcinnamomeo, fibrillis innatis lute-
scentibus sericeo squamuloso, se-
mum glabrato; 2-8 cm. lato;

lamellis adnatis, latis, confertis,
nitidis, ex ochraceo cinnamomeis;

stipite e faretto cavo, tenui, aequali,
cum carne veloque lutescentibus; 5-8 cm.
longo, 5-7 mm. crasso;

spor. $7-8 = 5-6$ ($8-10 = 4, 5-5$
basidiis $30 = 8$ Pres. M. S.)

RM. Comprende innumerevoli forme ab-
bastanza volanti ma troppo affini
per poterle separare.

~~Var. cinnamon~~

102 *Cortinarius croceus* (Schäff.) Fr. Hym. Eur. p. 371 (1874) Sav. Syll. Fung.

V. p. 942. *Agaricus croceus* Schäff. Ic. Fung.

Jur. Schäff. l. c. Batsch Elench. f. 119 (Ag. squamulosus), Cooke M.

Br. F. t. 780 f. a

2 Hab. in silvis - Lombardia, Veneto, Toscana

1 Lit. 209. 704. 1284. 528. →

area dist. Europe

011. Da considerarsi piuttosto come var. di C. cinnamon.

Crocey 942

Minor, pileo subsquamuloso, colore vario
etiam olivaceo-fuscescente; lamellis mi-
nus confertis, lutescentibus, in paludosis
cum stipite olivaceis.

Cetera C. cinnamomei.