

472)

2

2

Gomphidiinae

~~Where later
Obsoleta?~~

///

Gomphidiini

Conspectus synopticus specierum

- | | |
|--|-----------------|
| A ₁ - Pileus albus in seculi nigro-variegatus | 1 G. maculatus |
| A ₂ - Pileus nunquam albus | |
| B ₁ - Pileus viridis - fuscus | 2 G. gracilis |
| B ₂ - Pileus nunquam viridus | |
| C ₁ - Stipes basi intumescens incarnatus | 3 G. roseus |
| C ₂ - Stipes intus basi flavescens | |
| D ₁ - Pileus purpureo-fuscus | 4 G. glutinosus |
| D ₂ - Pileus rufus - fuscus | 5 G. viridis |

D. B. de B. B. de B. B.

Gomphidius Fr. Epicr. pg. 319
Facc. Syll. Fung. I 113^f (inter
melanopsporas)
(Etym. ~~gorgos~~ ^{gomphos} gomphus).

Hymenophorum in stipitem decurrentis. Lamellae
e membrana mucilaginea compaginatae, scissiles,
acie acuta, contiguae, sporis fusiformibus, ex ochraceo
nigrantibus pruinatae. Velum visco-flocco-
sum. -

Fungi terrestres, carnosi, putrefactentes, pilos demum
turbato; lamellis decurrentibus, distantiibus,
mollibus.

Dss. ~~Era~~ Generi esiguo, molto ~~discreto~~, per l'aspetto
intermedio tra Curtinaria e Hygrophorus.

1 *Gromph. dryas maculatus* (Scop.) Fr. Spic. p. 319 (1836)
Sau. Syst. Fung. IV p. 1138, *Agaricus maculatus* Scop. Fl. Carn. II p. 448 (1772)
Zur. Cooke M Br. F. t 882, Strauss ap. Sturm Denks. Kr. Fl. fasc. 37 p. 2
(Agar. stictatus).

Dt. 1284, 1965.

Hab. in Lingz muscosis — Somtarka: in gro. Brescia (Zandt dsch.). Autumno.
Area dict. Cornische, Helle, Armer. bor.

On. Sec. ^{quid.} _{"Bresadola ms.} na ^{abstange!} _{diviso} de *Gromph. granulig* Berk.

maculatus 1138

Pileo carnoso, convexo, viscido,
albo, semi maculif nigrif maculato,
variegato, 8 cm. lato; carne alba et crassa;
lamellif decurrentibus, ramosa,
crassif, umbrinif;
stipe firme cylindrica, flavo,
brevis, diametro pilei brevior, 3 mm. crasso,
medulla rubente.
Sporf oblongo-ellipticis, utriusque
nucleatis 23 = 8

Cps. Novi in officio Directo G. P. G. M. J. Maraff
Via La Storia L. 83 b. 2 Distante

2 Gomphidius gracilis Berk. Duttl. p. 196, t. 12 f. 7 (1860), Sacc. Syll. Fung.

I for 1138,

Icon. Berl. l. c., Cooke M. Br. F. t. 883.

Bitt. 137, 1031. Pres. MS., Mass. in Bot. Soc. Bot. it. 1912.

Hab. nr. blv. praeceps conferens - Veneto: provincia di Verona (Mass.), Trentino:
area dist. Brenta, Belfio, Staho, Germanie

Val d' Sole, comune (Pres. MS.)
Varena (Mass. et Pres.)

gracilis 1138

Pileo carnoso, unico - hemisferico, vinoso - fulvo,
glutine fuligineo obdureto, quo effusato praecipue
cica marginem nigro - maculata 1/215
cum lato

lamellis decurrentibus, furcatis, crassis, ex
albido aquosi nigris antibus & sub leviter
filiis brevibus vestitis;

stipe gracili, flexuoso, pallido, superne
albo - squamuoso, inferne virgato,

basi lateo, 5 cm. longo, 2 - 4 mm. crasso,
(in cione crassione); spif. 18 - 20 = 6 - 8; basidiif.
 $56 - 85 = 10$; cystidif. $120 - 140 = 13 - 15$ (Bres.)
(MS.)

D.H. Manifestamente affine a G. maculosa
(anche secondo Bresad. (N.S.) poise ne è una sottospecie), ma se ne
distingue per la natura granule
e il colore.



^(Bromell.) Schwa.
? *Gomphidius roseus*, Fr. Epicr. p. 219 (1836), *Agave glabrescens* Rose ex Krombh.

Sau. Syll. Fung. IV p. 1138, *Gomphidius roseus* Fr. S. M. I p. 315 (1821)

Iow., Gr. A. Champ. Fr. t. 403, Cooke M. Br. F. t. 880, Krombh. Schwa.

t 63 f. 13.

Bibl. 617, 618, Proc. M.S., Mass. in Bull. Soc. Bot. It. 1912.

Tab. in Libri congeris - Trentino: Valle Lagarina (Cobelli) } Separante
area dist. Europe, Japana / Bar^{ss}a Turco Lazzari in Proc. M.S.)
(Autumnus

rofeus 1138

Pilo roso; lamella lactif,
spipite albo, basi intusque vicar-
nato; sporif 20-23 = 6-7, (sec. Bref.
M.S. 18-20 = 5; basidif 50 = 10; cysti-
dif 100-120 = 15-16)
Diff. è minore di G. glutinopus

Quaternario

Gomphidius glutinosus (Schäff.) Fr. S.M. I p. 315 (*Gomphus*), Epicr. p. 219 (1836) (*Gomphus* Schäff.)
Sav. syst. fung. IV p. 113. *Agaricus glutinosus* Schäff. K. fung. IV p. 11, t. 36 (1774)
Trem. Schäff. l.c. Verbius Mic. Bresc. t. 42 f. 4-5, Cooke M. Br. F. t. 879,
S. U. Champ. Fr. t. 405, Quel. Champ. Jura I t. 10 f. 5.
Bfst. 90, 123, 209, 103, 244, 12, 617, 618, 630, 585, 725, 866, 1219, 1965 6
Hab. in siliis, praeceps coniferis - Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Triveneto, Emilia, Toscana. Aut.
Area dist. Europe

Dx. Sav. Myc. Ital. n. 210

~~Edulis sed non comestib.~~
A. peccariensis
genet' Bigeard

glutinopus 1137

Pileo carnoso, ottuso, glutinoso,
purpureo - fulvo, 5-14 cm. lato;

lamellae ex albido cinereis,
intervallum olivaceo-virens, brevioribus, adnatis, ab hymenophoro distans;
spicule 5-9 cm. longo, 1,25 cm. crasso, inter
sporif. luteo;
sporif. oblongatis, dilute flavis
vel fasciolutis, uniguttulatis
 $16 - 23 = 6 - 8$ (tham sec.
Prof. Mel. sporif. ut in *G. roseo*)

D.S. conf. ~~luteo lanuginosus~~
~~crassipes~~ Krombh. t. 4 113)

^(Sp. p. 1173)
5 Gomphidium viscosum (Linn.) Fr. Monogr. Fgm. II p. 150, ~~Agavea et Viscosa~~.

Sau. Sph. Flav. IV p. 1138, Agavea viscosa L. Sp. pl. I ed. p. 1173 (1753), Ag.
multilobus Schäff. Mon. Flav. IV p. 24 t. 55 (1774).

Icon. Schäff. l.c. Bresad. Fl. mang. t. 58, Cooke M. Br. Fl. t. 881, Lary. F.
di Roma t. 60 f. 1.

Bifl. 61, 90, 209, 242, 12, 430, 585, 617, 618, 656, 725, 866, 923, 983,
1015, 1183, 631, 848, 1617, Mass. in Bull. Soc. bot. it. 1912.

Hab. in Alpi, praecipue Cisalpina - Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Trentino e Friuli, Toscana, Lazio, Calabria. Autunno

Aree disto } Europe, Libia, Amer. bor., Iaponia
}: Valle Leganna (Loc.), Tezoleto, bosco del Faè ecc. (Bres. 115), Varena (Mass.).

Exs. Myc. Ven n. 810, Romm. Fl. gall.
h. 3815 (Nizza: Parla) } ~~R. v. Belgard~~ ^{et Bres.} ~~Autunno~~
(Educa si non commendanda)

Diff. da fm. multilobus Schäff. si può distinguere per le seguenti inferiormente e
per i fili propositi o violacei.

vijaidus 1138

Pileo carnoso, demum umbo rotato,
vistoso, fulvo-rufo, 5-8 cm. lato;
lamellif purpureo-umbonif, vere
carnosis, hymenophoro vixit lamella
rum laminis descendente.
~~inbas rhubarbarinae~~ stipite 8 cm. et ultra longo, 1,25-2 cm. crasso
~~spor~~ oblongatis, 1-guttulatis,
fuscidulis 16-23 = 6-8; basidiis
50-55 = 8-10; cystidios 100-130 = 15-17
Prof. M. S.

Aulurus