


10

Tubaria



folia



(*Eubaria*)

Conspectus synopticus specierum

- A₁ - Pipes 11-19 ann. longus; filis adus ferrugineis - - - 1 *E. stagnina*
B₁ - Pipes nunquam ultra 8 ann. longus; filis nunquam ferrugineis
C₁ - P. circa marginem squamulosus
D₁ - P. umbonatus, margine striatus - - - 2 *E. pellucida*
D₂ - P. domum umbonatus - - - 3 *E. circumscripta*
C₂ - P. glaber
D₁ - P. brevif - - - 4 *E. cupularis*
D₂ - P. saltem adus striatus
E₁ - Pipes flavo-fuscus, basi incrassatus *E. muscorum*
E₂ - Pipes spadicus, sorsum attenuatus *E. inquinata*

E. pallidula
}

Tubaria Worth. Smith in *Scm. Journ.*

1870, *Fr. Hym. Eur.* pg. 272,

Ann. Syst. Fung. § V pg. 872

(*Etym. tuba*)

Stipes subcartilagineus, fistulosus. Pili submembranacei, saepe velo universali floccoso vestitus. Lamellae subdecurrentes; sporae ferrugineae vel (in Phaeotis) fusco-ferrugineae.

Obs. Le specie ~~scritte~~ ^{ascritte} a questo genere, ~~staccate~~ ^{staccate} da *Raucoria* e *Galera*, corrispondono ad *Omphalia* ed *Oecilia*. In poche però il cappello è distintamente ombelicato o depresso; altre specie si riportano qui per le lamelle quasi decurrenti, posteriormente molto larghe, triangolari. Le specie ~~di~~ ^{di} questo genere per la tempra non sono mangerecce, ~~ma~~ ^{non} nemmeno nocive.

Conspectus synopticus sectionum et
specierum.

1 *Tubaria stagnina* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 539 (1874)
Sacc. Syn. Fung. V p. 873, *Agaricus stagninus* Fr. S. M. I p. 268 (1821)
Icon. Fr. Icon. Hymen. + 129 f 2, Cooke M. Br. F. t. 468.
Bol. Presl. M.S. ~~Agaricus stagninus~~
Hab. in pratis paludosis inter sphagnum - Trentino: Bellamonte d. Giemmo (Bey.
M.) *sestata*
area distr. Europa.

Stagnina 873

Pileo submembranaceo, e conico convexo, obliquo, udo subviscoso et striatulo, ladio-ferrugineo, siccis levis, subochraceo, circa marginem ornato squamis floccosis, concentricis, albis, 6-14 mm. lato, interdum disco depresso umbilicato; lamellis decurrentibus, latissimis, ferrugineis;

stipite fistuloso, rubiginoso-radicato, 11-19 cm. longo, 2 mm. crasso, basi albo-villoso, apice subperinato

sporif 14-16 = 6-8, vel 8-10 = 6-7, flavo-aureis, obvelle obovati (Bres. M.S.)

Det. Specie molto nobile e distinta

2 *Tubaria pellucida* (Bull.) Gill. Champ. Fr. p. 539 (1874)
Sacc. Syll. fung. V p. 823⁸⁴³, *agaricus pellucidus* Bull. Champ. t. 559/2
(1791)

Trom. Bull. l.c., Atkins. Mushr. p. 159 p. 153, Nees Syll. II^{ed} t. 36.
Bull. 245, 1091, b. ms. Trentino: Terzole (Bres. ms.)

Hab. ad vias, inter folia - Piemonte, Sicilia. ~~Aestete~~ : regione Etna (Scalia)
Area distr. Europe, Amer bor
| Valsesia (Careskin)
aestete

pellucida 874

Pileo submembranaceo, e conico campanulato, umbonato, cinnamomeo, hygrophanus, circa marginem striatum sericeo squamulosoque, 1,25 cm. lato;

lamellis subdecurrentibus, postice latissimis, triangularis, pallidioribus;


stipite tenui, brevi, } 3-4 cm. longo, 2-3 mm. crasso,
sursum attenuato, nitido,
apice fruticoso, juniore fereito, demum fistuloso,
spor. 7-9 = 4-4,5 vel ^{raro} 10-12 = 5; basidij 20-25 = 6-8 (Kres. M.S.)

Det. Affine a C. p. stagnina, galudofa ecc. per la forma delle lamelle e da tenersi per una Tabaria sebbene il cappello non sia depresso. Secondo Bresadola (M.S.) e molto affine a Raucoria confusa

3 *Tubaria circumscpta* (Batsch) Jan. *agaricus circumscptus* Batsch ⁽¹⁷⁸³⁾ ~~St. l. p. 119~~ ^{Sacc. Fgl. fung. V p. 872}
Tubaria fufpuracea (Pers.) Gith. Champ. Fr. p. 538 (1874) →

agaricus fufpuraceus Pers. Lyn. p. 454 (1801)

Fern. Batsch l.c., Bernard Champ. Roch. t. 24 f. 2, Pat. Tab. an. f. 348, no-
gling in Atth. W. Ven. IV (1886) t. 5 f. 37.

Det. 90, 207, 430, 434, 585, 737, 923, 983, 1236, 1253, 866. 

Hab. ad terram, frustula lignea, folia dejecta — Liguria, Piemonte,
Venetia, ↑ Emilia, Toscana, Neapolitana, Sardigna.

Area Distr. { Europa, ↑ ^{Tunisia} Africa, Amer. bor. et Mer., Australia

{ Trentino: Gocciadoro (~~Chenopod.~~), Megroz, Terzole (Brend. m.s.)

per annum

circumsepta | 872
= furfuracea

Pileo carnosulo, e convexo plano demumque
umbilicato, helvolo - cinnamomeo, hygrophano,
velo sericeo - squamulato cano praevi-
fue circa marginem luto, 2 cm. lato, vix alu-
taceo - canefcente, sericello, exoleto fragili;
lamellis adnato - decurrentibus, subdistantibus,
cinnamomeis;

stipite fistuloso, flocculoso, rigido, pallido, 2-5
cm. longo, basi albo - floccoso;
sporif. ferrugineis 7-9 = 3-5; basidiis
16-24 = 5-7; ex Pres. (M.L.) sporif. 7-10 = 5-10;
basidiis 25-35 = 6-8; anic. lamellarum 7-8 g. latis.

~~Det. La fig. ²¹⁵ de Saccch. e attestanza simile.~~

3 *Tubaria circumscripta* (Batsch) Jan. *Agaricus circumscriptus* Batsch *El. 1 p. 119* ⁽¹⁷⁸³⁾ *Sacc. Sph. fung. V p. 872*
Tubaria fufuracea (Pers.) Gith. *Champ. Fr. p. 538* (1874) →

Agaricus fufuraceus Pers. *Lyn. p. 454* (1801)

Fern. Batsch l.c., *Bernard Champ. Roch. t. 24 f. 2*, *Pat. Tab. an. f. 348*, *Bo-*
glios in Att. Bot. Ven. IV (1886) t. 5 f. 37.

Detl. 90, 209, 430, 434, 585, 737, 923, 983, 1236, 1253, 866.

Hab. ad terram, frutula lignea, folia dejecta — Liguria, Piemonte,
Venezi, ↑ Emilia, Toscana, Neapolitano, Sardinia.

Area Distr. Europe, ↑ Africa, Asia, Amer. bor. & Mer., Australia

Trentino: Gocciadoro (Bres. m.), Magro, Tergole (Bres. m.)

per annum

circumsepta | 872
= furfuracea

Pileo carnosulo, e convexo plano demumque
umbilicato, helvolo-cinnamomeo, hygrophano,
velo sericeo-squamulato cano praeci-
pue circa marginem lecto, 2 cm. lato, rufo alu-
taceo-canefcente, sericello, exoleto fragili;
lamellis adnato-decurrentibus, subdistantibus,
cinnamomeis;

stipite fistuloso, flocculoso, rigido, pallido, 2-5
cm. longo, basi albo-floccoso;

sporif. ferrugineis 7-9 = 3-5; basidiis

16-24 = 5-7; ex Pres. (M.S.) sporif. 7-10 = 5-10;

basidiis 25-35 = 6-8; anie lamellarum 7-8 x latiss.

~~Det. La fig. ²¹⁵ de Saccob. e abbastanza simile.~~

4 *Tubaria cupularis* (Bull.) Gilt. Champ. Fr. p. 538 (1874)

Sacc. Sylt. fung. V p. 872, *Agaricus cupularis* Bull. Champ. t. 554/2 (1791)

Icon. Bull. l. c., Krombholz. Schimm. t. 3 p. 15-18, Cooke M. B. F. t. 602

Dist 90, 417, 418, 430, 585.

Hab ad terram

- Liguria, Piemonte, Trentino: Valle Lagarina (Cobelli)

aree Distr Europa.

Nizzardo,

cupularis 872

Pileo carnosulo, plano-depresso, obtuso, lev.,
glabro, e rufescente flavido, hygrophanus, 2-2,5
cm. lato;

lamellis decurrentibus, confertis, fulvis;

stipite fistuloso ^{gracili}, nudo, sursum attenuato
alvido, ^(rufescenti sec. Pres. ~~et~~) et praesertim apice albo-fringente ^(Pres. M.S.)
2 unc. 6-7 cm. longo, 2-3 mm. crasso;

sporis brunneo-ferrugineis, ^{stramineis}, subglobosis, ~~ste~~
asperulo-subaculeatis 4-6 μ diam. (Pres. M.S.)

Oss. Questa specie presenta un tipo ottimo
di Onyphalia, ma le spore sono ^{bruno-ocracee} ~~isolate~~.
~~Dalla descrizione di Candolle sembra~~
~~ocrotroa.~~

5 *Tubaria Muscorum* (Hoffm.) Gr. A. Champ. Fr. p. 539 (1876)
Sav. Syn. Fung. V p. 874, *Agaricus Muscorum* Hoffm. Nomencl. ^Fp. 181
t. 5 f. 3 (1789)

Icon. Hoffm. l. c. Pinzel. Hymen. t. 229 p. 108.

Perf. 434, 836, 1965

Hab. inter muscos ad truncos vetustos - Lombardia: pr. Parva (Nocera)
Napoletono.

Area Distr. Europe.

Muscorum 874

P. lco membranaceo, e convexo centro depresso,
striato, glabro, flavo-fusco, 2 cm. lato;

larnellis subcurrentibus, horizontalibus,
pallidioribus;

stipite fistuloso, brevi, concolori, basi
incrassato;

Sporif 6-8 = 4

6 *Tubaria nigritinea* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 538 (1874)
Sacc. Syll. fung. V p. 876, *Agaricus nigritineus* Fr. S. M. I p. 264 (1821)
Icon. Cooke M. Br. F. t. 497, Bulz. Hymen. t. 242 p. 195.
Bolt. 866, 1301 *Trentina: sopra Arnaga (Bres. M.S.)*
hab ad ligna ^{praesectum alba} *mucida* *nigritinea* — Piemonte: valle Valsusa (Fayod), Lunghia,
Area distr. Europe, Australia, Argentine *Aestate*

(prov. di
Parma (Pass.)

inquitina 876

Pila Gregaria, pusilla;

(Pila submembranacea, e convexo plano,
glabro, viscidulo, udo striato, hydropicam, 1,25
cm. lato, demum umbonate, siccis nunc felvello, nunc
alutaceo-cano;
lamellis subsecurrentibus, subdistantibus,
triangulatis, ex argillaceo-fusco umbrinis;
stipite fistuloso, tenaci, deorsum attenuato,
radiceo, albo-fibrilloso, 2,5 cm. longo,
2 mm. crasso, basi albo-floccosa;
sporis 7-4; basidiis 25-30 = 6-7