

Specie Acanthocerum
Dubiae

40/0019-2-1

LES FILS D'ÉMILE DEYROLLE

46, Rue du Bac, PARIS (7^e)

M^r P. A. P. Saccardo

Professeur

faculté sciences

Université de

Padoue

Italie



tutta molecola Species Agaricacearum omnino dubiae.

(grande solido)

Agaricus acerostrobilus Bres. jun. apud Crome Fung. Rep. II p. 115 n. 28
Imbricato-caespitosus v. gregans; pilos carnos-membranaceo dimidato
setuloso; primus pallide flavo, deni flavo-pardus, margine tenuiter
undulato et inflexo; lamellae inaequilateris latiusculis libens, concavas.

Hab ad Trabes velutinas Pognoni albae - Napobetano: Vistri A Potenza
Anat.

Ott. M. Bresciani ascrive questo genere alla serie dei Leucopori
e al tipo Pleurotus, ma se le lamelle sono giallo-pardice resta
dubbio che si tratti veramente di un Pleurotus.

2 Agaricus angustus Brig. Fl. Neap. p. 101, t. 37 f. 6-7 (1848)
Caespitosus, paucus; pileo subarnoso ovato-conico, humido olivaceo-fusco
notente, ad latem oblate rotato, marginis vir involuto; la-
mellis confertis per liberis crenescens, aere dilatioribus; sti-
lo longissimo, flexuoso, procumbente albidissimo.

Bibl. 250 434.
Hab. super marciday radicey Coryli Avellano, Olt. - Napoletano.
Valle d. S. Mena Sic. Monti. - Petas 8 mm. alt., 6 mm. lat. stip.

5 cm. alt. fragilis, fistulos.

Ott. Collocato dall'aut. nella tribù Coprinarii, è probabilmente
una specie di Coprinus piuttosto che una Bathyphelle a cui disti-
tacchierende era stato assegnato. Cfr. Lytt. Fung. XXI p. ...

3 Agaricus Bertolonii Tzengae Fung. Sicc. I p. 9, t. 7 f. 3 (1865)
Pac. Syll. fung. IV p. 1142

Bibl. 638

Velo tomentoso albo-rosso, persistente, discreto, pileum convexum apicemque
cylindricum centralem obtegente; lamellis striatis, lanceolatis, annuliformibus
adhaerente atque hinc illuc inter eas penetrante

Hab. in silvaticis umbrosis - Sicilia pr. Palermo.

On. II Trich. lo giudica una specie paradosa, e non pare probabile
che si tratt di un endemico attaccato da un Hypomyces o altro
parassita.

Agaricus bulboso-pilosus Raddi in Atti Soc. L. Modena 1808 p. 351, t. 4/12.

Sauv. Syst. Fung. V p. 1142.

Albus; pileo subcampanulato, globoso, margine crenulato; Apice fuscato,
attenuato, ovato-bulboso, bulbo pilis longis obsesso; Smalti conferti

B.H. 928

Hab. in cultis — Toscane: Orto bot. di Firenze. Pilus $1\frac{1}{2}$ cm lat.
OM. Probabilmente me spicie Collybia.

5 Agaveus caeruleus Raddi in Att. Soc. it. Matena 1808 p. 350 t. 10 & 9

Pl. 998

Solitarius; pale convexo caeruleo, daphne ^{sub}plicata; lamellae fragiliter
nigrantes, serice deliquescentes; stipite praelongo, tenui, gracili, cavo,
paleo concorde.

Hab. in silvaticis - Toscana - Firenze, alle Casse.

On. Una specie di Corynus o Panaeolus.

6 Agaricus calyculus Fr. Arg. in Rendic. Accad. Sc. Nap I, n°.
3, anno 1842 p. 72.

Bibl. 253.

Sobrios, subparvus; pileo carnoso-membranaceo ^{fragile} (infundibuliforme), fuliginoso-nigrescente, velutino magis erecto undulato; lamellis inaequabilis parum decurrentibus, distantes, marginis v. obscuris; spuma fuscata hymenio concolor, apicem versus subcompresso, basi vero tuberculato.

Hab. ad terram usi ambulacris regni vivitarii Neapolitanus;
Apr. (prof. Mich. Tenore) - Cappello dissecente acquisita in colore rufo, 10-12 mm. long. e largo; lamelle d. ha lunghezza, appena 2,5 mm. larghe, gombo 18-20 mm. long., 2,5 mm. diam; carne grigiastra,
n. odore nigrato.

Uff. L'autore riferisce le specie alle seg. Omphalia et a proba-
bilmente affine ad Omphalia Orbiculus. Dal Cantharellus anthracophorus
(= carbonarius) a cui l'aut. fa rassomiglianza, sembra più discosta.

7 *Agaricus camadulensis* Pers. n. Ann. Acad. Agric. nat. ser II
vol. I p. 59 (1847) Tab. VIII (1847)

Bibl. 255, 634

Octobr.

Hab. ad ~~Leranum~~ ^{inter Almos, Costeas etc} Napolitanus: Camelotii (Oriente Gab. Costa)

Sobrias, mediane; pileo late campanulato, subcarnoso, ochrace-pallente, humido, microscopio ope grumoso, margine vix involuto; lamellae inaequibus, confortis libens arenatis, italo Demum sanguineo-nigricantibus, acie leviter crenato-flexuosa; stipite brevi, fistuloso, subcontuso, fulvo, apice parum expanso et longitudine rugoso, basi bulboso, fuso; anulo subpersistente, membranaceo, infero, albidus; odore
Photostae degeritae.

{ Ott. Cappello 3-4 cm. largo; Stipite, 3-4 cm alto, 7-8 mm. diam.

Ott. 2° dall'aut. n'fondo al letto. Pratelle quindi assai probabilmente
è un Agaricus sensu str., forse una semplice var. di A. campestris.

8 *Agaricus conordii* Radd. in Atti Soc. Ital. Modene, 1808, p. 351
f. IV f. 11.

Solitarius, pygmaeus; pileo conico partim subrostrato partim flavo praeoccupante at marginem; lamellae distantes albi; stipe gracilis, alba, subfistulosa.

B.B.I. 998

Hab. in Slovacia - Toscana: Firenze, nella Ragniera del Verchiello,

Nov.

On. Certamente una specie d' Hygrophorus.

9) Agaricus croceo-aureatus Eng. F. Repert. p. 92 t. 40 f. 1 (1868)
Tall. Syl. Fung. IV p. 1162.

Bibl. 250, 634.

Pileo subcarnoso e conico expanso, liso, glabro, ochraceo; lamellis portice
attenuatis, latis, subconvergentibus, primo crenatis, ochraceis, dein fuscocrenati.
by, sinuato-undulatis; stipe e fascio fistuloso, nitido, amoena aureo,
velo fugacissimo.

Hab. ad terram - napoletano : a Napoli. presso Salvo Lake

071. Anzi probabilmente in Hypoloma, affine all' H. lateristrum.

10 Agaricus dentato-crenatus Raddi - Atti Soc. it. Modena 1808, p. 348 t. IV fig. 2
Pileo conico-acuminato, flavo cuncto ochraceo-fusco, striato ad marginem
producti concoloribus rotatis, marginis dentato-crenatis, lamellis canadigi,
spite concavo, fistuloso, basim versu luteo violaceo.

Hab. Secus ^{aggers} ~~flavum~~ Arnon - Toscana: Fisiere per Alimpetto ~~a~~ Casone
lungo II Arno, Oct.

DN. Probabilmente affine a Myces galericulata.

II Agaricus Dentatus Radbr. in Atti Soc. L. Modena, 1808 p. 347
Tab. III f. 4.

Pileo subconico oblongo, non carnosso, sanguineo, subdaphano, magi-
ne dentato; lamellae flavib; stipite croco, intus albo, fistuloso, fra-
gili, subcontorto.
Hab. in silvula - Toscana: Freyre in vicinario Boboli, capi-
tulosa.

Op. Sembra vicino a Mycena acuta.

N. Agaricus *dicolor* Cumino in Mem. Acad. S. Tor. 1805 p. 205.

Abb. 511, 430.

Pileo fuscescente, levigato, piano-rotolato ad ora sericeo; lamellae albo-fuscescentes, orbites alternatae brevibus, ^{adnexis}, stipite base attenuato, farcto.

Hab. ad caudicem Castaneorum - Piemonte. Cuneo nella valle del Pô -
Caro ex albo fuscescens, scripta fusa; pileus 25 mm. lat. et ultra,
stipes 25-30 mm. alt.

Ott. Probabilmente una specie di Collybia.

13 Argarius elegans Raddi: in atti Soc. Ital. Modena, 1808 p. 369

Feb. III f. 2

Bott. 998

Pileo concavo, base riv. margini sublobato; lamellae fragili,
parvissime, leviter decurrentibus; sp. pardo partim pallido;
partim obscuriore, striis sanguinibus notata, basi in oras et
lunato

Feb. in Alchais - Tolosa: ^{for} Frang alle vigne del Vecchietti;

October.

On. Quer. senza dubbio una specie di Cochlearius.

16 *Argyranthus fagorum* Cuvier, in *Acta Societatis Naturalium Medicorum, Mem. Acad. Sc.*

a Torino, 1805, p. 204

Bibl. 511.

Ploso convexo, per acetalem planu ambonato, griseo-fusco, 5-8 cm. ^{long.}
latis; lamellis albis vix tenuitate rubescens, alternis brevioribus; stipite
fasciis, conicis, proceris, 18-20 cm alto; sapore et odore admodum fortibus.

Hab. ad terram et ad candidum - Piemonte: Valle di Pessio, Cuneo, a est.
et a west. - Forma terrestris distinguuntur stipite longiora, cujus media
pars in terra latet, et in mediis crescentibus; fm. truncata stipite
brevoe pilosaque latiore

Off. Forse una specie d. Phleas, affine al P. cornicinus

15 Agaricus farinotus Link. Descr. fung. Bresc. n. 29. A Frisia
di Brugnabelli, Parte IV (1824) p. 409, Coll. Fl. Veron. III p. 106
Bibl. 1284, 984.

Cochlearia; pileo membranaceo, campanulato, fuscus, carne solida & siccata;
tavelles luteo adnexis; stipe bas. bulbosa, tuberosa, alba farinosa
oblecto

Hab. in nemorum umbrosis — Lombardie prov. N. Brescia, Sept.

Orn. Viene asunto dall'aut. al gruppo Cochlearia ossia Corticarius, ma
dalle brevi segnali poco si può trarre.

16 Agaricus filiformis Radde in Atti Soc. Ital. Modena, 1808 p. 348
Tab. III f. 6.

Sobrario, pygmaeus, val de fraglia; pileo campanulato, flavo-ochraceo, margine piloso, pilis obscuris; lamellis albis; stipe filiformi, piloso, sanguineo.

~~Spec. B. B. 1~~ 998

Hab. ad folie putrida Quercos Itag - Toscane. Frende a Santa Maria a Montiglio.

Obs. Pare une spacie distinta à Karassing.

17 Agaricus fuscocano-tomentosus Radde in Acta Soc. Sci. Modena, 1808

p. 346, t. II f. 2.

Pileo planus, fuscescens, tomentoso, lumento albo; lamellae candidae,
crassis, at valde pectinatae; stipe cylindrico, fuscus aeneus tomen-
toso et pilis paucis obscurior.

B.G. 998.

Hab. in vindaria — Toscana — Firenze, giardino Boboli, Oct.
01. È una specie d. Clitocybe. A. Collybie.

18 Agaricus fuscus Radd. Att. Soc. Ital. Modena, 1808, p.
tab. IV f. 7.

Bil. 998

Folliarsus; pileo hemisphaerico, fuscus, levigatus; lamellis concoloribus;
stipe cylindrico, cornuto, pallido, ^{lineofus} punctato sanguineo
confusus.

Hab. in monte Valtorta - Toscana. Freugo alla Romola, Aut.

AN. Specie del tutto dubbia.

19 Agaricus involucratus Raddi in Atti Soc. Ital. Mod. 1808, p. 346 t. II f. 1.

Bll 998

Solitarius, stature medius; pileo convexo et fere conico, obtuso ar-
genteo-nitente; lamellis albis; stipite albo, farruto, ~~volvulus~~ annulus;
anulo ^{albo}, ~~riscis~~ v. involucro ^{albo} intus totum pileum obducens, dein ~~affinis~~
et in squamulas pileum convergentes diffusus, superficie pilosa:
glauca.

Hab. in slavonia — Toscana - Firenze alle Cascine presso la ghizzaja.
autunno

Osserv. Probabilmente una Lepiota male descritta e figurata.

v. Agaricus lobato-repandus Brug. Journ. Neerl. p. 60} (1868) tab. 29 f. 1-2.

Sauvage Journ. 1162.

Bol. 250, 434.

Melodone, solitarius, 25-30 mm. lat., polos subcarnoso, spadiceo, con verticinale, dein expanso; lamellae lobato-repandis, latis, umbonato-convexis; hymenio iugante longo subangusto, cordite albo 4-5 cm. long., 5-6 mm. cr., inde spongioso, ad basim fuscescens; anulo sen. velo obsoleto, (egregi) peculiaris, odore nullo.

Hab. sub querubus in Slovacchia - Napoletano: Bassino, Botte, Persiano, Longiano, sera autunno.

Ott. Dall'autore è riferita al lottoz. Telamonia di Fries, però la descrizione lascia qualche dubbio. L'ondulazione delle lamelle deriva quasi per certo dalle secheresse degli esemplari!

21 *Agaricus minutus* Otto, Verzeichn. seiner Arten. Agaricorum, Leipzig. 1816
p. 45.

A.B.I. 5'18.

Exiguus, folius candicans; pileo campanula; lamellis adscendentibus; spiculae
nudente pallide, 25-30 mm. altis, piloformi.

Hab. in *Naka borealis* (Jan)

Diff. Verisimiliter ave pie via d Marasmius; me le diagnostic. del
~~tutto~~ insufflante.

Agaricus monstruosus Raddi in Atti Soc. Ital. Modena, 1808 p. 347

Tab. III f. 5

Nucl. 998.

Solitarius, statim mediorum; pileo plano, irregulari, e carnoso subcoriaceo,
lento-fusco, margini involuto; lamellis admodum distantibus o pallido
carneis; stipite sumum sensim incrassato et (lamellis?) rufato a mediis deorsum cylin-
drico, parvo, e lento pallido; carne candida

Hab. in undarij - Toscana - Firenze al grande Boboli presso il
Laberinto Nov.

611. Pare una spec. di Chlorocybe algante deformata.

23 *Agaricus nanus* Camino, Mem. Acad. Sc. Torino, 1805 p. 213.

B. 61. 430, 511

Pileo brullo, alto caro et ferrugineo, in squati, subblakoroli; lev;
caroso, carne et lamellis albi lactiginosus; thute brevissima,
plena, 1,5-2 cm. cr., lacte acri.

Hab. in silvis faginis & Pinonete: Valle d' Peso (Camino)
Opp. Certamente una specie di Lactarius..

24 Agaricus niger Radde in Atti Soc. Ital. Modena, 1808 n 345

tab. II. fig. 1.

M.B.I. 918

Maximus, solitarius; pileo pleno ochraceo-ferrugineo, zonis concentricis interptibus rotatis, margine integrum; lamellis crebis, ligulis carnis, carnis, nubibus; stipite carnoso, pallido, gibbo, decurrente angustato.

Hab. in silvaticis - Toscana - Firenze, presso le Certose sul fiume Greve.

OM. E' impossibile pronunciare un giudizio su questa specie, fondata probabilmente sopra un esemplare incompleto o alterato.

75 Agaricus palleucus Cumino, Mem. Acad. Tor. 1805 p. 215

Bitt. 430, 511.

Pileo umbilicato, margine repando, lenerissimo, ^(5-6 cm. lato) albo-pallido; ✓
kernei abescensibus; spizite pilei conicolose, tubuloso, 5 cm. alto,
2,5 cm. cr.; lacte albo, ubaci.

Hab. in elevazio - Piemonte: Valle del Perio, Octotri.

BJ. Appartiene quasi per certi al gen. Lactarius.

26 Agaricus pellucidus Cossus, Mem. Acad. Sc. Torino, 1805 p. 205.

Btl. 511, 430.

Pileo tenuissimo pellucido, convexo-plano, 2,5-3 cm. lato e
centro ad medietatem usque alboscente, rufa pars moesta, mar-
gine (e lamellis perspicuis) striata; lamellae albi, levigatae
ex sporarum explosione imbutae; stipite alto, coriaceo,
fusiforme, ^{2,5-3 cm. alto} circa lamellae lineam albi pulverulentis rotata.

Hab. ad limitas Castaneearum silvarum - Premonte. valle A.

Terr., brumal tempore post pluvias.

On. Probabilmente una specie d. Leptotrichia.

27 Agaricus pycnocephalus Cuvier, Mem Acad. Paris, 1805, p. 208 Tab. I.

Bitt. 511, 430

Piles pycnophalo, griseo, raro plano, griseo, coriaceo, resistente; lamellis (Merulius ad instar) piles incoloribus; spuma ad mediotestem usque griseo, reliqua parte candido, quae nucore offens; carne alba, pesce, coriacea.

Hab. inter congesta folia putrida Pedem. aquilinum - Piemonte
in Valle Tr. Petio sul M. S. Antonio, Nov. Gemini v. Toliana
Ott. Probabilmente una specie di Cantharellus.

78 Agaricus peronii Cossat pilosus Radd., Att. Soc. Ital. Sc. Matene, 1808

B. 61. p. 349, tab. IV f. 4.

Lobularius; pileo hemisphaerico-globoso, lev, caeruleo; lamellis
simplicibus, carnis, rufosis; stipe teret, bulboso, falso,
incarnato ^{albo} piloso; carne aegre alba.

Hab. in Ibis — Toscana: Firenze prope Pratoli, autumno.

Ott. Probabilmente una specie della sez. Rhodopora.

29 Agaricus pygmaeus Raddi; Att. Soc. Ital. Sc. 1808, p. 369, t IV fig.
Bibl. 998
Solidius, carnosus, nanus; pileo plano-convexo, griseo, margini
sublobato-undulato; lamellis pallidis, duplicatis v. trinatis; spule
brevissima, farcta, tereti, obscurae.

Hab. in silvis — Toscana: bosco d' Monte Lenario, Masso

Ott. Sembra una specie d' Trocholoma

30 *Agaricus pyxidatus* Radde Atti Soc. Ital. Sc. ^{Modena} 1808 p. 347, t. III f. 3.
Bibl 998

Mitridas, *pyxidatus* (fore ut in Cladonia pyxidata); petro lithicque
rubro-schreco; lamellis simplicibus, planis, decurrentibus
Hab. in Abruzzo - Toscana - Firenze, nel bosco dei Cappuccini, Ank.
On. Probabilmente una specie di mitrida Chitocybe.

31 *Agaricus rubellus* Raddi, Atti Soc. Ital. Modena 1808, p. 351 ^{t. 4/10}
Solitarius, per exiguum; pileo pleno-convexo, subscerente; lamellis
albitis; spuma pilosa, gracilis, tereti et aegre alba.

B. 61 998

Hab. ad pedes Oleae - Toscana: Firenze pr. Trespiano, Oct.

Op. Rare una specie a Mycena.

32 *Agaricus rubro-maculatus* Radde, Att. Soc. Ital. Modena 1808, p. 349
tab. IV f. 3.

Bis. 998.

Solitarius; pileo hemisphaerico, levi, fuligineo; lamellis numerosis,
olivaceis, fragilibus; sp. elongatae, linearis, fragili, pilosae,
pallide, minutis maculis rubris adpersae.

Hab. ad terram? - Toscana. Firenze pr. Scandicci alto, Nov

03, Forse una specie d. Hypholome male descritta e figurata.

(21166)

33 *Agaricus sub-squamulosus* Radb; Atti Soc. Ital. Modene, 1808, p. 349 t.)

Ribb. 998

Solitarius, in panoplia formis, tota flava et superficie sub-squamulosa,
smalls decurrentibus et subramosis; spuma sericeo-parsa;
carnes flavo-aurea.

Hab. in aliis - Toscana, pr. Firenze, bosco N. Monte Senario, March.

Ott. Potrebbe essere una specie d' *Chlorocybe* o d' *Cantharellus*, ma
ancor male rappresentata.

34 Agaricus brunnato-undatus Bong. Fung. Neapol. p. 58 t. 27 (1848^{ed.} 1851)
Sau. Syll. fung. II h. 1143.

Bis 61. 250, 434

Melioris, sparsus; pileo subcarnoso, tenue, Rhizate basi, centrum versus
obscure patinoso, subvoro vel rotundo planiusculo, circumstylum ruguloso
et radiatione sulcato; lamellis ^{subadnexis} ^{lascivias} ^{bendatis}, pileo fore concoloribus, margine
brunnato-^{undatus}; stipite aequali longiusculo, albo, e parvo pubescente

Hab. in silvis - Napoletano: Buccino, Botte, Persano, Londrano, Lubanno.
On. Pare per certo una specie di Collybia.

35 Agaricus subaerig Cum. Mem. Acad. Torino, 1805 p.

B. 561. 5'11

Tilus convexo et per aetatem plano, repando, cinereo-subserente,
centro obscuriore; lamellis crebri, triplice ordine dispositis, ex
albo interstratis; spizie lamellis concolor, 3-4 cm. alto; lacte
albo. subac.

Hab. in muscosis — Piemonte, Valle d'Orco alla Corteza.

On. ^{è certo} per me specie di Lactarius.

76 *Agavea subangustifolia* Radd.; Atti Acad. Sc. Mod. 1808, p. 365 t. 1
Bibl. 998

Solitariae, maximae; petiole plana, rubro-ochracea, margine undulata,
rhizoma v. coipulo; lamellis carneis, agne undulatis; stipite
virescenti-olivaceo, carnosus, basi verius incrassatus.

Hab. ad aggeres - Toscana: pr. Firenze lungo il fiume Elsa, Ant.

Oss. Una probabilmente una forma del *Platycerium cervinum*.

77 Agaricus absgrennomy Radb., Atti Acad. Sc. Modena, 1808, p. 350, t. IV/8.

Bibl. 998

Sobrancas; pileo convexo, albo, squamu^{lo}, m^{bi}-languineo consperso;
cornelli alti; spile - segue albo, basi sublanato, cylindraceo, cavo.
Hab. in siliq - Toscana: pr Firenze, bosco della Fattoria d'la
de fiume Ema, Nov. — Odor forte, nauseosus. specie venerata
ex autre

77 Probabilmente una specie di Lepote (trascuro l'anelli), forse ~~affine~~
la Lep. crustata.

78 Agaricus subulatus Radb; Att. Soc. Ital. Sc. Mod. 1808, p. 368, t. IV f. 1.

Bil. 998

Filo umbelliforme, non carnoso, n. n. d. - olivaceo, fomentum, relativamente, margine revoluto; lamella simplicia, n. tantum; spore proæ longo, subulata, parco, flavido.

Hab. in Libanis - Toscana: Frene al pollaio delle Rose, Sept. Oct.

Ott. Sembra una specie di Mycena affine a M. aho-cyanea.

79 Agaricus tetradoxus Bory. in Atta R. Acad. Sc. Nat. III (1832) p. 135 t. 4
fig. 1-2.

BII. 434

Spissus, mediorum; petio carnosus, orbicularis, convexiusculus, latus, margine integrus;
lamellae subdistantes, primo dilute deinceps obscurae violaceae; nigritate mediorum, ad apicem
albo, superius pallentia, supra media annulo (arenosus?), praestans.
Hab. ad terram Neapolitanam: pr. Napoli, Nov. - In prime aetate
odore tetram spicrat.

BII. Semper me specie n. Cochinarius affinat C. debilis.

Uvarius tricolor Cuvier, Mem. Acad. Torino, 1805, p. 209 tab. I

Bitt. 511, 430

Pileo convexo ^{3-4 cm. lato,} bicolor, sen ex albo pallido flavescens, ex fulvo fulvo et ex fulvo ingensente, viscoso; lamellis fuscis, nonnihil undulatis, latis; stipite pilei concavo, farcto, cylindrico, 1,5-2 cm. or.
Hab. ad fragmenta lignea putrida fagi (na) — Remonate, in valle d. Persio alle Corton.

Pl. forse una specie d. Corthmaria.