

Comm.

11 24

R. 3


O. Annapolis

Continuum

~~*Ther...*~~

Volucra

Chantys



Premiato Stabilimento Tipografico LICINIO CAPPELLI - ROMA

Prove di stampa e relativi manoscritti

Illustrissimo Signor

Prof. Ab. G. Dalla Costa
Seminario Vescovile di
Padova



SECOND-CLASS MATTER FROM
The University of Chicago Press
Chicago Illinois

A

Ochrospora

conspectus synopticus generum.

- A₁ - *Lamellae liquescentes* Bolbitius (*)
 A₂ - *Lamellae non liquescentes*
 B₁ - *Sporae demum nigricantes, fusiformes, hymenophorum in stipitem*
 decurrentes; lamellae scissiles Gomphidius
 B₂ - *Sporae ochraceae vel sulfureo-fuscae*
 C₁ - *Lamellae ab hymenophoro cum stipite continuo, sponte*
 vel facillime secedentes Pasillus
 C₂ - *Lamellae ab hymenophoro sponte non secedentes*
 D₁ - *Velum universale araniosum, a cute discretum, hy-*
 menophorum cum stipite continuum Cortinarium
 D₂ - *Velum universale nunquam araniosum*
 E₁ - *Stipes excentricus (vel nullus) cum hymeno-*
 phoro continuus Crepidotus
 E₂ - *Stipes centralis*
 F₁ - *Stipes annulatus* Pholiota
 F₂ - *Stipes exannulatus et evolutus*
 G₁ - *Stipes carnosus*
 G₂ - *Lamellae decurrentes vel*
 sine sinu adnatae Flammula
 H₂ - *Lamellae subinnatae*
 I₁ - *Pilei cutis fibrillosa vel se-*
 ricca; sporae fusco-fuscae Inocybe
 I₂ - *Pilei cutis glabra, viscosa* Hebeloma
 G₂ - *Stipes plus minus cartilagineus*
 H₁ - *Lamellae decurrentes* Cubaria
 H₂ - *Lamellae non decurrentes*
 I₁ - *Pilei margo primitus inflexus* Naucoria
 I₂ - *Pilei margo primitus rectus,*
 stipite adpresso Galera
 et constrictus Pluteolus
 et nigellus Melanophora
 (*) A pag. 39 questo genere fu citato per la *Melanophora*, dove
 da mota. ~~veniva~~ ^{infatti} veniva riferito per la sua apparenza coi *Coprinus*
 in causa delle lamelle ligescenti, ma le spore non sono affatto
 nereggianti, ma ovacee. (Seguono disposizioni generum
 al verso)

(*) A pag. 39 questo genere fu citato per ^{la} ^{disposizione} Malanosporae, Tomi
da molti ^{istotti} ~~esisti~~ veniva riferito per la sua apparenza coi Coprinus
in causa delle lamelle liquorose, ma le spore non sono appette
nereggianti, ma ocracee. (Seguono ^{disposizioni} generale al verso.)

character
omne Leucopora
49

Sect. 3: Ochrosporae

(Derminae Fr. sensu
ampliori)

Sporae ochraceae vel subferrugineae; Spe-
cies omnes molles nec lentae.

Conspectus synopticus generum

Dispositio generum

~~Derminae~~

Corticarius

Gomphidia

Pantheria

Phaeota

Hebeloma

Dispositio generum.

- 1 Cortinarius — 2 Gomphidius — 3 Paxillus
4 Pholiota — 5 Hebeloma — 6 Truncatus
7 Hamulus — 8 Cephaelis
9 Naucoria — 10 Galerina — 11 Tabaria
12 Pluteolus — 13 Bolbitis

proposita
neglecta