Polyporaceae

T. Boletus

41/003-1

Bolelus

41/0003 - 2 - 1

(Boleti)

Conspectus synopticus sectionum et specierum

A_1 Sporae albidae, vel hyalinae (vel flavidae) sed tunc tubuli albi, liberi (1 Sectio Suillus)
- B_2 Tubuli sulphurei — 12 B. Lanzii
- B_2 Tubuli albi vel pallide flavescentes
  - C_1 Pileus carneus, cupreus vel lateritius — 2. B. pedemontanus
  - C_2 Pileus fuscescens vel fulvescens
    - D_1 Caro alba, fracta mox cyanescens — 3. B. cyanescens
    - D_2 Caro alba immutabilis vel lutescens
      - E_1 Pileus et stipes velutini, opaci — 4. B. castaneus
      - E_2 Pileus et stipes glabri, nitidi — 5 B. fulvidus

A_2 Sporae coloratae, vel hyalinae sed tunc tubuli flavescentes
- B_1 Sporae rubentes vel purpurascentes (2 Sectio Xylopilus)
  - C_1 Pileus velutinus, olivaceus — 6 B. porphyrosporus
  - C_2 Pileus glaber non olivaceus (3 Sectio Eu-Boletus)
    - D_1 Tubuli adnati, ampli, area stipitem breviores — Sect. I Favosi
      - E_1 Pileus siccus, floccosus, subsericeus — 8 B. asprellus
      - E_2 Pileus tactu viscidus vel glutinosus, glaber
        - F_1 Pileus lutescens, velo albo appendiculatus — 9 B. viscidus
        - F_2 Pileus rubescens, ad marginem flavescens — 10 B. Bresadolae
    - D_2 Tubuli liberi vel adhaerentes, minuti — Sect. II Versipelles
      - E_1 Tubuli flavicantes
        - F_1 Pileus et stipes rubri, caro flavida (Hypporrhodii) — 11 B. rubellus
        - F_2 Pileus rufo-pallidus vel rufo-olivaceus, caro alba — 12 B. tessellatus
      - E_2 Tubuli albi vel fusci
        - F_1 Stipes subaequalis, superne venoso-reticulatus, non squamosus — 13 B. Friesii
        - F_2 Stipes deorsum attenuatus, squamosus
          - G_1 Tubuli plani, pileus siccus — 14 B. rufus
          - G_2 Tubuli convexi, pileus udus viscidus — 15 B. scaber
  - C_2 Tubuli laete colorati, vulgo lutei nec albi griseive — Ser. II Luteorubri
    - D_1 Pileus viscosus, glaber, tubuli adnati — Sect. III Viscipelles
      - E_1 Stipes annulatus
        - F_1 Tubuli flavo-virescentes, pori lateritio-rufescentes — 16 B. tridentinus
        - F_2 Tubuli et pori aliter colorati
          - G_1 Tubuli decurrentes
            - H_1 Pori simplices, aureo-sulphurei, minuti — 17 B. elegans
            - H_2 Pori composite, sordide flavi, ampli — 18 B. flavidus
          - G_2 Tubuli non decurrentes
            - H_1 Pileus hemisphaericus, stipes fusco-squamosus — 19 B. sphaerocephalus
            - H_2 Pileus pulvinatus
              - I_1 Stipes supra anulum punctato-scaber — 20 B. luteus
              - I_2 Stipes supra anulum reticulatus — 21 B. flavus
      - E_2 Stipes exanulatus
        - F_1 Pileus sanguineus — 22 B. sanguineus
        - F_2 Pileus aliter coloratus
          - G_1 Stipes radicans et tubuli hexagonales — 23 B. Bellini
          - G_2 Stipes non radicans vel tubuli non hexagonales
            - H_1 Caro alba
              - I_1 Stipes squamuloso-reticulatus — 24 B. collinitus
              - I_2 Stipes non squamulosus — 25 B. lovinus
            - H_2 Caro saltem demum colorata
              - I_1 Caro caerulescens
                - L_1 Pori ex albo-flavo virescentes; pileus pulvinatus — 26 B. badius
                - L_2 Pori lutei, pileus conveso-planus — 27. B. viscosus

I_2 - Caro flavescens vel gilvo-pallida
L_1 - Stipes bulbosus, striatus — 28 B. corsicus
L_2 - Stipes nec bulbosus, nec striatus
M_1 - Tubuli et stipes granulati vel resinoso-lactescentes
N_1 - Stipes flavidus, punctato-granulosus — 29 B. granulatus
N_2 - Stipes alto-citrinus, sanguineo-verrucosus, resinoso-lactescens 30 B. Boudieri
M_2 - Tubuli et stipes his notis carentes
N_1 - Sapor mitis — 31 B. mitis
N_2 - Sapor piperatus — 32 B. piperatus

D_2 Fungus non simul pileo viscoso, glabro et tubulis adnatis praeditus
E_1 - Tubuli adnati vel decurrentes
F_1 - Stipes non bulbosus, nec venis reticulatus
G_1 - Pileus tomentosus — Subsect. IV Subfomentosi
H_1 - Pori rosei — 33 B. amarellus
H_2 - Pori numquam rosei
I_1 - Stipes levis, glaber
L_1 - Stipes aequalis, pileus obscure luteus — 34 B. variegatus
L_2 - Stipes ventricosus, pileus sulphureus — 35 B. sulphureus
I_2 - Stipes striatus vel floculosus
L_1 - Stipes striatus, sulcatus
M_1 - Caro lutea, infra cutem rubra 36 B. chrysenteron
M_2 - Caro numquam rubra
N_1 - Tubuli virescentes, cuticula intus ferruginea — 37 B. striipes
N_2 - Tubuli lutei, cuticula intus non ferruginea — 38 B. subtomentosus
L_2 - Stipes tomentosus vel floculosus
M_1 - Caro immutabilis — 39 B. ferrugineus
M_2 - Caro fracta caerulescens vel rosea
N_1 - Pileus pulvinatus, ex olivaceo-cinereo gilvus — 40 B. radicans
N_2 - Pileus convexus, incarnato-roseus — 41 B. armeniacus

G_2 Pileus pruinosus vel tericeo-glabratus Subsect. V^a Subpruinosi
H_1 - Species parasitica in Sclerodermate; pileus tericeo-glabratus 42 B. parasiticus
H_2 - Species non parasitica; pileus pruinosus
I_1 - Stipes costatus vel striatus
L_1 - Pileus sanguineus — 43 B. rubro-pruinosus
L_2 Pileus fulvo-cinnamomeus — 44 B. cinnamomeus
I_2 - Stipes levis
L_1 - Pori angulati, ampli — 45 B. versicolor
L_2 Pori rotundi, minuti 46 B. pruinatus

F_2 - Stipes primo bulbosus vel venoso-reticulatus Subsect. VI Calopodes
G_1 - Caro sanguinea — 47 B. cruentus
G_2 - Caro non sanguinea
H_1 - Pileus olivascens
I_1 - Pori lutei; pileus demum pulvinatus — 48 B. calopus
I_2 - Pori flavo-olivacei; pileus convexus — 49 B. olivaceus
H_2 - Pileus non olivascens
I_1 - Pori angulati, stipes radicatus — 50 B. appendiculatus
I_2 - Pori rotundi; stipes bulbosus — 51 B. pachypus

E_2 - Tubuli liberi vel semiliberi
F_1 - Pori primitus haud rubentes — Subsect. VII^a Edules
G_1 - Stipes levis
H_1 - Pileus glaber
I_1 - Pileus ochraceus — 52 B. citrinus
I_2 - Pileus albidus — 53 B. aestivalis

H_2 - Pileus fericeus, flocculosus vel tomentosus
I_1 - Stipes cyaneus vel rubro - variegatus
L_1 - Pileus convexus; stipes cyaneus — 54 *B. rimosus*
L_2 - Pileus pulvinatus; stipes rubro - variegatus 55 *B. fragrans*
I_2 - Stipes nec cyaneus nec rubro - variegatus
L_1 - Stipes pallidus, conicus — — — — 56 *B. obsonium*
L_2 - Stipes flavescens
M_1 - Stipes glaber, caro caerulescens 57 *B. pernicioses*
M_2 - Stipes pubescens, caro flavescens 58 *B. reticulatus*

G_2 - Stipes non levis
H_1 - Tubuli demum virescentes
I_1 - Stipes reticulatus — — — — — 59 *B. edulis*
I_2 - Stipes non reticulatus
L_1 - Pori semper ochracei, caro alba, fracta mutabilis — — — — — — — — 60 *B. meissanensis*
L_2 - Por demum cinnamomei, caro lutea — 61 *B. slavonicus*
H_2 - Tubuli nunquam virescentes
I_1 - Stipes apice vel basi purpurascens
L_1 - Pileus subsanguineus vel purpureus
L_2 vel olivascens — — — — 62 *B. regius*
L_2 - Pileus ochraceo - fuscus — — — 63 *B. siculus*
I_2 - Stipes non purpurascens
L_1 Pileus subvillosus vel subtomentosus
M_1 - Pori rotundi — — — — 64 *B. vaccinus*
M_2 - Pori flexuosi — — — — 65 *B. Briosianus*
L_2 - Pileus glaber
M_1 - Stipes lutescens, pileus olivascens — 66 *B. aereus*
M_2 - Nec stipes lutes, nec pileus olivascens [59 *B. edulis*]

F_2 - Pori primitus rubentes — — — Subgen. VIII *Luridi*
G_1 - Stipes nunquam rubro - tinctus nec purpureus - 67 *B. aetnensis*
G_2 - Stipes rubescens vel purpureo - punctatus
H_1 - Pileus olivascens vel e livido - virescente lutescens
I_1 - Pileus glaber, tubuli non virescentes 68 *B. lupinus*
I_2 - Pileus tomentosus, tubuli demum virescentes — — — — 69 *B. luridus*
H_2 - Pileus nunquam olivascens vel virescens
I_1 - Stipes non reticulatus
L_1 - Stipes cinereus rubens, extus sqva-mulose-punctatus — — — 70 *B. erythropus*
L_2 Stipes intus lutescens, extus pur-pureo-variegatus — — — — 71 *B. purpureus*
I_2 - Stipes rubro - reticulatus
L_1 - Caro caerulescens, pileus convexus 72 *B. panormitanus*
L_2 Caro albida, fracta rubescens vel violascens; pileus pulvinatus 73 *B. Satanas*

Linn. Sp. plant. ed. I (1753) p. 1176 em. (1815)

Boletus ~~Dill. tab. 106 tab. Gmel. pg. 1466~~ Fr. Obs. I pg. 109, Hym. Eur. pg. 495, Sacc. Syll. Fung. VI pg. 2. / Etym. *boletes* nomen graecum fungi esculenti / Suillus Mich. *Boleti pars* Linn. ~~et Auct.~~ (Nov. gen. p. 126 (1729)

Hymenium tubulosum ab hymenophorum discretum et facile separabile. Tubuli in stratum porosum absque trama stipati, a se invicem facile separabiles. Ost tubulorum sive pori rotundi vel angulati. Sporae normaliter fusiformes, raro ovales, subrotundae ♀ Fungi terrestres, carnosi, putrescentes, stipitati, centrales. Pauci venenatis rejectis, in cibariis maximi momenti.

Obs. Genere nobilissimo, bene limitato, ma molte specie difficilmente si riconoscono e si delimitano. Poichè le spore di molte specie sono sconosciute e del resto variano di colore nelle specie affini, si fa qui la classificazione partendo, come Fries, dal colore dei tubuli. N. Gmelet, Fl. mycol. / divide il Boletus in 8 generi, ~~ed~~ i più dei quali sono troppo affini fra loro per potersi conservare.

pp 409-427

♀ Basidi normalmente 4-sterigmatica; cistidi plerumque adsunt.

Boletus Langii Inzenga, Funghi Sicil. Cent. II p. 54 t. 10 f. 3 (1879)

Sacc. Syll Fung. VI p. 19

Icon. Inzenga l. c

Bibl. 639

Hab in silvis ibicatis — Sicilia: prope Palermo.

Area dicit. Sicilia.

Sectio I

~~Lubayen~~ Suillus Karst.

Lanxii 19

Pileo pulvinato, margine acuto,
sicco subtomentoso;
stipite pileo concolore, subventri=
coso, basi purpurascente;

tubulis subliberis, sulphureis,
poris concoloribus;
sporis albidis

Scarlet.

2 Boletus pedemontanus Fayod in Ann. Acad. Agr. Torino, 1893, p. 103.
Sacc. Syll. Fung. XVII p. 96.
Brig. 1301 Icon. deest
+ Hab. solitarius ad terram apricam in quercetis Bricherasio, Rocke-plate (Fayod)
Area Sist. Ital. boreal.

Piemonte: Valle Valdesi

pedemontanus 17-96

Pileo primo pulvinato, sicco stipitequo amoene carneo vel cupreo; carne alba leniter cyanescente; strato tubulifero libero, poris minutissimis tubulisque flavo-pallidis, deinde pileo (praecipue locis umbrosis) plus minusve lateritio, cute diffracta areolata vel squamosa, stipite glabro, concolori; cystidiis hyalinis, dispersis, parvis, piliformibus; sporis pallidis 12 = 4

3 Boletus cyanescens Bull. Champ. Fr. tab. 369 (1787)

Sacc. Syll. VI p. 44.

Icon. Bull. l.c., Barla Champ. Nice, t. 37, Gill. Champ. Fr. t. 421, Krombh. (Schw.) t. 35 f. 7–9, Lang. F. d. Roma t. 33, Rolland Atl. E. 88 / 195. Bibl. 90, 123, 362, 393, 398, 209, 342, 430, 434, 585, 653, 656, 690, 983, 1002, 1514, 1301

Hab. ut in locis arenosis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, ~~Lombardia~~, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia. Acet. aut. ~~Certo~~ Suspectus.

Area dist. Europa, Amer. bor.

(Trentino: bosco d'Ingonga (Bres. MS) Aug.

cyanescens 44

Pileo convexo-expanso, adpresse tomentoso, flocoso-squamoso, opaco, subfusescente vel alutaceo, carne rigida, alba, fracta mox cyanescente; 5-14 cm. lato;

stipite demum cavernoso, ventricoso, villoso-fibrinoso, concolore, apice constricto, levi, albo;

tubulis liberis, albis, demum flavis, → brevibus, junioribus ± 2 mm. longis poris minutis, rotundis;

sporis subfusoideis, albis vel dilute citrinis 15-16 = 5-8, vel (Bres. Myc.) 8-10 = 5-6

— Gummopere insignis, comprehensu sucum caeruleum fundens.

4

Boletus castaneus Bull. Champ. Fr. tab. 328 (1786), Sacc. Sylt. Fung VI p. 45

Icon. Bull. l.c., Barla Champ. Nice t. 32 f. 11–15, Gill. Champ. France t. 422, Krombh. Schw. t. 4 f. 28–30, Lang. F. di Roma t. 32 f. 3. Patouill. Tab. anal. t. 3 f. 12, Rolf. Atl. t. 79 f. 117.

Bibl. 39, 61, 209, 849, 397, 398, 430, 434, 568, 585, 653, 656, 866, 923, 983, 1015, 1090, 1133, 1284, 1502, 631

Hab. in silvis et campis pinguibus — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio, Toscana, Napoletano, Sicilia, Corsica. Aest. Aut. Edulis.

Area distr. Europa, Amer. bor., Australia. (Trentino: Male, Bolentina, Negray (Bres. MS)

Var. minor Bres. ai litt. quam typus statura minor.

Hab. ad terram sub Pinu pinea et Taxo in Horto bot. Patavino. Aug. 1908 (A. Valerio)

dis hyalinis

castaneus 45 var

Pileo convexo-expanso depressove

firmo ~~sicc~~, 8 cm. lato, primo basim stipitis amplectente,
(unde pic junior obsolete submarginato-bulbosus, nec apice constrictus)
stipiteque e farcto cavo, a basi
subbulbosa attenuato

levibus, velutinis, opacis, cinna-

momeis, carne alba, immutabilis;

lubulis liberis, curtis, albis, poris.

minutis, rotundis;
sporis ~~hyalinis~~ dein hyalinis, 9-10 = 5-7; basidiis 30-35 = 10 (Bres. Myc.)

→ odra nec ~~ad~~ ~~ad~~ in hoc, ad apicem
~~basim stipitis~~ stipitis constrictus,

— B. cyanescente minor, haud succosus,

inter proximos medius

5 Boletus pulvinus Fr. Obs. mycol. II p. 247 (1818)
Sacc. Syll. fung. VI p. 45
Icon. Inzenga F. Sicil. Cent. II t. 3 f. 2, Longi F. A. Rome, t. 32 f. 2.
— Rostk. Pilze t. 45
Obs. 653, 656, 679, 1090, 1301
Hab. in graminosis siccioribus — Piemonte: Vall. Valdesi, Lazio, Sicilia. dest. Aut. Italy.
Area distr. Europa.

Obs. Secondo Giel. Fl. mycol. p. 425 sarebbe sinonimo di B. castaneus Bull. ma il Longi lo ritiene diverso.

fulvidus 45

Pileo convexo-plano, rigido, 5-8 cm. lato, semper exserto (hinc stipes nec basi bulbosus, nec apice constrictus), stipitegue e farcto cavo, aequali, firmo, 3-6 cm. longo, 1 cm. et ultra crasso, levibus, glabris, nitidis, fulventibus;
carne alba, subludescente;

tubuli liberi, elongati, pori ex albo citrini; sporis ovato-ellipsoideis subhyalinis 9=6, oellatis.
— Color intensitate variat.

6 Boletus felleus Bull. Champ. Fr. t. 379 (1787)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 43.
Icon. Bull. l.c. Fr. Sver. ätl. Sv. t. 52, Gill. Champ. Fr. t. 423,
Pat. Tab. anal. fig. 674.
Bibl. 90, 263, 585, 983, 1133.
Hab. in silvis praecipue coniferis — Liguria, Piemonte, Lombardia
Toscana. Aest. Aut. Venenatus.
Area distr. Europa, Sibiria Amer. bor., Australia

Sect. II
Subgen. Tylopilus Karst.

Fellers 43

Pileo e pulvinato expanso, molli,

glabro, levi, subgilvo, variante castaneo et fulvo, 5-11 cm. lato;
Stipite solido, sursum attenuato,

reticulatoque; 8 cm. et ultra longo, concolore, passim olivascente, rarius squamuloso-punctato;
tubulis adnatis, convexis, elongatis,

poris angulatis carnegue fracta ex albo incarnatis;

Sporis fusoideo-oblongatis, rubro-lute-fluentibus, 12-16 = 4-5

Sapor amarus

Boletus porphyropoms Fr. Bolet ill. t. 36 (1835)
Jacq. Syll fung. VI p. 38
Icon. Gillet, Champ. Fr. t 426, Britz. Hymen. t 565 f. 23.
Bibl. Bresadola MS. (Bres. MS.)
Hab. in sabulosis calcareis — Tridentina: bosco d. Magras, rarius, Asst. Aut.,
Area Xstr. Europa. (Suspectus.

porphyrospora 38

Pileo explanato, amplo, sicco,

~~vel tino~~, olivaceo, vel nullo, spithamaeo usque, pube erecta velutino, contagio nigrescente;

stipite aequali, levi, sed superne

e punctis minutis stipatis fuligineo, 10-14 cm. longo, curvato-adscendente, non scabro, sed pruinato-punctato;

tubulis semiliberis, foris amplis,

pentagonis, griseis, tacte umbrinis;

sporis fusco-purpureis, 16-18 = 6 vel 15-17 = 5-8
(Bres. DNS.)

— Summum decus, nulli rite affinis, species nobilissima; odor gravis; caro crassa, nivea, ad tubulos caerulescens.

8 Boletus asprellus Fr. Epicr. p. 423 (1836)
Sacc. Syll. VII p. 39.
Icon. Barbara Rim. t. 30 f C. (Ceriomyces phragmitis cinereus), Krombh.
Schw. t. IV f. 26-27, Lang. Fungh. di Roma, t. 36 f 1.
Bull. 103, 653, 656.
Hab. in silvis frondosis — Umbria: presso Rimini (Barbara), Lazio: Canepina, Nepi e Osteria (Lang.)
Area distr. Europa.

Sectio III Eu-Boletus (Dill.), Karst. (Edulis.)
Series I Tephroleuci Fr.
Subsp. II Javosi Fr.

Asprella
39

Pileo convexo-plano, sicco, floccoso, rimoso-squamuloso, pallescente, sublivido, velo nullo, 5-8 cm. lato;

Stipite clavato-bulboso, squamuloso, albido, vulgo brevi, tubuliq. circa stipitem brevioribus, albidis, porif majusculis, angulatis, concoloribus; sporis fusoideis ochraceo-brunneis 18-19 = 7-7,5 (Zangi)

9 Boletus viscidus Linn. Sp. pl. I ed. p. 1177 (1753)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 38
Fron. Fr. Fon Hymen. t 178 f. 3, Gillet Champ. Fr. t. 424, Lenba Champ. comest. t 34 f. 5-7.
Bibl 209, 12, 417, 418, 250, 434, 737, 1153, Matt. u. B.S.B. ital. 1912.
Hab. in silvis, praetertim frondosis — Veneto, Trentino, Toscana, Napoletano, Alta Italia. Europa.
Autumno. Solis.
Syn. Sacc. S. Myc. Ital n. 1674.

viscidus 38

Pileo pulvinato, molli, glabro, viscido, sordide lutescente; velo subannulato, lacero, albo, subappendiculato, 4-5 cm. diam.;

Stipite viscoso, ex albo lutescente, basi in= crassato, superne reticulato, 5-8 cm. longo, ~~fortiter velo adglutinato lacero saepe apparente~~ tubulis adnatis, poris amplis, inaequalibus, lividis;

Sporis minutissimis, fusiformibus, elongatis, brunnescenti-viridibus, 9-10 = 3

— Fusculis veli adglutinati lacer saepe apparet.

Obs. Sembra forse troppo affine a B. laricinus

10 Boletus Bresadolae Quél. in Bres. Fung. Trid. I p. 13, t. XIV (1881)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 38

Icon. Bres. l.c. et in Rev. Mycol. III (1881) t. 24.

Bibl. 236.

Hab. in silvis abietinis subalpinis — Trentino: Ortisé in Val di Sole (Bresadola)
e sotto la Sega di Bolentina (Bres. MS)

Area distr. Ital. bor. Aestate-Autumno. Julio.

Var. Laricinus Britz., Master in B. S. Bot. Fr. 1910 p. CLXXIV. A typo differt
annulo albo et non flavo.

Hab. sub Laricibus — alp. Maritimae: Madonna delle finestre, Colmiana, Salera (Maire)

Pregadolae 38

Pileo pulvinato, glutinoso, e rugulosetto levi, rubescente, margine flavescente, 4-7 cm. lato, epidermide secernibili;

stipite solido, viscoso, subaequali, supra anulum pallido reticulatoque, infra subrubente, maculis saturatioribus variegato, basi albido, 5-7 cm. longo, 1-2 mm. crasso; anulo laete flavo, persistente, saepe appendiculato, membranaceo, infero; tubulis ex albo-cinereo subferruginascentibus, poris concoloribus, subrotundis, oblongatisque, mediocribus, adnatis;

sporis (coacervatis) fusco-ferrugineis, 11-13 = 5; basidiis 30-40 = 5-6 (Bres. Ms.)

Caro flavida, stipitis saturatior, fracta subrosea, dein cinereo-violacea; odor et sapor grati.

Obs. Affine a B. viscidus

11 Boletus rubellus Krombh. × Schwämme fasc. V p. 11, t. 36 f. 21-26 (1836)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 45.
Icon. Krombh. l. c., Quél. Alloc. Fr. avanc. Sc. 24 (1895) t. 6. f 11.
Lang. F. di Roma, t. 31 f 2.
Bbl. 653, 656.
Hab. in graminosis collinis — Lazio (boschi intorno a Roma (Lang.)) . Aest. aut. Innocuus
(Trentino: Gorciadora (Bres. MS.)

Area distr. Europa

× Subsect. II Versipelles Fr.

Obs. Sec. Bresadola MS le specie Bol. armeniacus Quél., Bol. communis Bull. ex p., Bol. versicolor Rostk., Bol. pruinatus Fr. sono poco distinte dal Bol. rubellus. E questo secondo Quél. Fl. mycol. p. 412 non è diverso dal Bol. sanguineus With. assai affini fra loro e

rubellus 45

Pileo convexo-plano depresso
stipiteque farcto, ad basim flavido,
attenuato, glabrij, opacij, rubrij,
carne flavida, mollj, immutabilj;
tubulis liberij, brevibus, flavidij,
poris rotundij; sporij 11-14 = 4-5; basidijs 35-40 = 10-12
(Bres. 9 n.)
— Minima hujus Hirpis speciej.

~~Lacio do Laelet spetta~~
~~a B. sanguinea~~

12 Boletus Lestellatus Gill. Champ. de France p. 636 (1874)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 41 (Quelet – et Arnould)
Icon. Gill. l. c. t. 429 – cf. Bull. Soc. myc. 9 (1893) p. 79 (Quelet)
Maire in Bull. Soc. myc. 18 (1902) Suppl. t V f. 1–3 et VII f. 15–16 (carpocin.)
Bibl. 1015, 631
Hab. in silvis — Corsica, Octobri.
Area distr. Corsica, Gallia.
Obs. Specie forse alla seg. Suillus?

Tessellatus 41

Pileo convexo, rimoso-tessellato, rufo-pallido, vel rufo-olivaceo, rimis albis (carnem ostendentibus), 4-6 cm. diam.;

stipite elongato, utrinque attenuato, pallido, minute squamuloso, carne alba dein leviter cyanescente et in stipitis basi rubello-maculosa, molli et mox corrupta; tubulis adfaerentibus, flavicantibus;

poris minutis, rotundis, albo-flavidis; sporis ovoideis, minutis, pallidis, 10 = 6 (Bourg. et Dem.)

13 Boletus Fristii Inzenga, Fungh. Sic. Cent II t. 1 (1819)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 39
Icon. Inzenga l. c.
Hab. in silvaticis sub Quercu Ilice Sicilia: Palermo alle Favorite (Inzenga)
Rbl. 639

Area Distr. Sicilia.

Friesii 39

Pileo e globoso convexo, molli, cute pulverulento-glutinosa, caeruleo-cinerea obtecto; passim verrucoso;

stipite subaequali, concolore, superne venoso-reticulato; juniore bulboso,

tubulis semiliberis, rotundis, fusciis, poris caeruleo-cinereis, saepe glandulosis

-Statura et coloribus valde insignis speciei; habitus omnino suis stirpis; color cinereus sine omni rubri vel lutei tinctura. Tubuli ex auctore fusco-ochracei, sed in iconibus brunnei.

14 Boletus rufus Schäff. Icon. fung. IV p. 75, t. 103 (1774)
Boletus versipellis Fr. Bol. ill. p. 13 (1835) Sacc. Syll. Fung. VI pag. 40
Icon. Schäff. l.c.; Battarra F. Arim. t. 30 f. A-B (Cerasomyces phragmites rufus), Bresadola
F. mang. t. 93, Gill. Champ. Fr. t. 428, Lang. F. d. Rome t. 35, Pat.
Tab. anal. fig. 665–667 (cum var.).

Bibl. S. 90 209, 242, 244, 103, 417, 418, 653, 656, 725, 836, 848 1133, 1284, Mall. B.S.B. VI. 1912.

Hab. (et alibi in montibus Populi, Betulae etc) in silvaticis – Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Umbria, (Toscana,) Lazio

(: Valle Lagarina (Cob.), Lizenga (Bres. MS.), Varena (Mass.)

Area distr. Europa, Amer. bor.

Cast. Aut. Sabalp.

rufus =
verisimilis 40

Pileo pulvinato, sicco, primo compacto tomentoso, dein squamoso levigatoque, velo annulari membranaceo, fugaci appendiculato, 5-20 cm. lato;

Stipite solido, deorsum attenuato, rugoso-squamoso;

Tubulis liberis, planis, minutis, sordide albis, demum griseis;

Sporis fusoideo-oblongatis, hyalinis, 14-20 = 5-7,5; basidiis 25-35 = 10-12

Color constanter rufus (Bres. Myc.)

Obs. Questo fungo e B. scaber appaiono veramente distinti ma per l'analoga variazione del colore - della statura e quasi pure entro limiti; il colore di ~~B. scaber~~ B. rufus tuttavia è più costantemente biondo, donde il nome.

15

Boletus scaber Bull. Champ. Fr. t. ~~369 (1786)~~ 132 et 489 f. 1 (1782)

Sacc. Sylt. Fung. VI f. 41.

Icon. Bull. l.c. Barla Champ. Nice t. 35 f. 6–12, Brevard. F. mang. t. 92, Lang. F. di Roma t. 34, Rolf. Ott. t. 87 f. 192, Sacc. et D'Anc. F. mang. t. 8 f. 1–3 et t. 15 f. 12, Venturi Mic. Brex. t. 9

Obs. 5, 23, 39, 51, 61, 90, 123, 209, 242, 244, 263, 66, 342, 357, 417, 418, 430, 434, 564, 585, 653, 656, 661, 699, 700, 725, 737, 836, 866, 923, 983, 1133, 1219, 1228, 647, 1284, 0

Hab. in silvis umbrosis, ericetis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano — Aest. aut. Solitario (Val di Sella, Lagorai, Tesero, Mazzin ecc. (Ambr., Cob., Bres.)

Area Obs. Europa, Libria atlantica, Asia bor.

Syn. Cavara F. Longob. n. 65.

Obs. Alcune delle sopradette citazioni si riferiscono promiscuamente anche al Boletus rufus.

Faber 41

Pileo pulvinato, glabro, udo viscido, demum rugulose rivulosove, margine primitus cortinato, 5-12 cm. et ultra lato;
stipite solido, sursum attenuato, squamis fibrosis exasperato, 15 cm. et ultra longo;
tubulis liberis, convexis, ex albo sordidis, poris minutis, rotundis;

sporis fusoideo-oblongatis, flavidis, 4-18 = 5-6 vel 15-20 = 5-6; basidiis 30-35 = 9-12 (Bres. MS.)

– Hanc robustior, nunc gracilior, quam maxime variabilis.

– Praecipuae varietates sunt:

A. pileo rubro vel aurantiaco: Bull. t. 489, f. 2, Gill. Champ. fr. ~~eric~~. t 431 –

B. pileo fuligineo vel cinereo: Fl. Dan. t. 833, Bull. t. 489 f. 1, Sow. t. 175, Krombh. t. 35 f. 1-6 –

C. pileo fusco-nigro, stipite floccoso-squamoso, tubulis candidis: Fr. Obs. 2, pg. 249, Schaeff. t. 104, –

D. pileo fusco-olivaceo: Bolt. t. 86 –

E. pileo omnino albo: B. niveus Fr. Obs. I pg. 111 cum forma aeruginea; Obs. II pg. 260, B. bolopus Rostk. t. 48. Cfr. Weinm. pg. 303, Clus. Curt. gen. IX, spec. 2, sed edulis est et magni in cibariis momenti.

16 Boletus tridentinus × Bres. Fungi Trid. I p. 13, t. 13 (1881)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 10
Icon. Bresadola l.c. et in Revue mycol. III (1881) t. 23.
Bibl. 12, 234, 418, 739, 1031.
Hab. in silvis consperis — Trentino: in tota ditione, Tergola, Cappella, Sopramonte ecc. (Bres. MS.)
Aree dist. Trentino.
Aestate - Autumno

× Sect. II Luridi - Fr.
Subsectio III Viscipelles Fr.

Obs. L'è comune nei luoghi erbosi e raro negli erbosi. L'affine a Bol. flavus.

tridentinus 10

Pileo convexo - plano, viscoso, lateritio - rubigi = noso, squamis subcompressis, secedentibus, concoloribus variegato, 6 - 10 cm. lato;

stipite farcto, subaequali, vel leviter basi incrassato, concolori, aetate expallente, supra annulum album, fugacem, cribroso, infra subsquamuloso squamulis compressis, 5 - 9 cm. longo, 1 - 2 cm. crasso;

tubulis flavo - virescentibus, stipiti adnatis vel subdecurrentibus;

poris angulatis aut sinuato - oblongis, amplis, lateritio - rufescentibus;

9 - 12 = 5 - 6 (M.S.)

sporis flavo - viridibus, ellipticis, 1 - guttulatis.

Mycelium fibroso - reticulatum, tenax, rubiginosum. Caro lateritia fracta subrubescens, odore et sapore grato.

Obs.: Affine a B. flavus

17 Boletus elegans Schum. Fl. Saell. II p. 376 (1803)
Sacc Sylt. Fung. VI p. 3.
Icon. Bresadola F. mang. t. 86, Fr. Svec. ätl. Svamp. t. 76, Krombh.
Schev. t. 34 f 1-10 (B. flavidus), Bull. Champ. t. 332, Venturi Micr.
Bresc. t. 47 f. 1-2 (B. luteus)
Syn. 242, 244, 245, 12, 417, 418, 661, 737, 866, 983, 1031, Rabh. Bot. S.E. 2 191

Hab. in silvis tam frondosis quam acerosis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana. Aest. Aut. Edulis

(: communissimo in tutta la Val di Sole (Bres. MS.) Piem. Aut.

Varese (Mass.)

Area Distr. Europa, Amer. bor., Australia.

elegans 3

Pileo convexo-plano, viscoso, aureo ferru-
gineascente, 8-12 cm. lato;

stipite firmo, inaequali, ex aureo rufe-
scente, supra annulum fugacem ex albo
flavescentem punctato, 5-11 cm. longo;

tubulis decurrentibus,

poris minutis, simplicibus, aureo-sulphureis,

sporis ellipsoideis vel oblongato-ellipsoideis,
chlorino-hyalinis, 8-9 = 3½-4, 5 —
raro 12 μ; basidiis 30 = 6-7 (Bres. M.S.)
Caro flavida.

18 Boletus flavidus Fr. Obs. mycol. I p. 110 (1815)
Jan.-Sykl. Fung. VI p. 4
Icon. Pers. Mycol. Eur. II t. 20 f. 1–3 (B. velatus), Krombh. Schw. t. IV fig. 35–37, Venturi Mic. Bresc. t. 47 f. 1–2? (potius B. flavi var. expallens teste Fr.), Quél. Bl. fr. advanc. Sc. 24 (1895) t. 6 f. 10.
Bibl. 866, 1219?
Hab. in alpinosis – Emilia: prov. di Parma (Passerini), Lombardia: prov. di Brescia (?) aestate.

Area distr. Europa, Siberia asiat.

flavidus 4

Tenuis; pileo e gibbo plano, viscoso, livido-flavescente, 3-5 cm. lato;

stipite tenui, subaequali, pallido, supra annulum mere viscosum glandulis fugacibus adsperso, 5-8 cm. longo, 4-7 mm. crasso;

tubulis decurrentibus, poris amplis, angulatis, compositis, sordide flavis;

sporis oblongato-ellipsoideis, rectis, subhyalinis 8-10 = 3,5-4 vel (Brés. MS.) 9-11 = 3-3,5; basidiis 25-30 = 5-7

— Distinctissimus inter affines, gracilior, velo mere glutinoso ab omnibus recedens; caro pallida.

Obs. E' molto diverso il B. flavidus Venturi t. 47 f. 1-3, Rost. l.c. t. 2 (varietà pallida, come sembra di B. flavidus).

19 Boletus sphaerocephalus Barla Champ. prov. de Nice p. 72, t. 36 (1859)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 3
Icon Barla l. c. et in Nov. Act. Leop. 27 (1860) t. 17.
Bull. 90.
Hab. in pinetis — Nizza (Barla). autumno
Area distr. Italia, Gallia.

Sphaerocephalus 3

Caespitosus, amplus; pileo compacto, hemisphaerico, glabro, humido ≠ viscido, disco luteo-fulvo, margine crasso, involuto, flavo;

stipite valido, squamis fuscis densevestito, apice determinate nudo, flavido; fistulis brevibus, e luteo demum obscurioribus; sporis minutis, rotundis, sporis ovoideis, pallide ochraceis.

— Caro primo lutea, mox vero caerulescens lineisque fuscis ferrugineisve variegata.

Fig. Dalla figura appare che il gambo è nella massima parte rivestito di un indumento squamante-squamoso, presso all'apice nettamente interrotto, che sembra una specie di velo. — Questo è una specie singolare del tipo.

20 Boletus luteus Linn. Sp. pl. ed. I p. 1177 (1753)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 3.
Icon. Barla Champ. Nice t. 31 f. 1-3, Bresadola F. mang. t. 85, Fr. Svensg. ätl. Champ. t. 22, Gill. Champ. Fr. t. 433, Rolf. Ath. t. 78 f. 174 Venturi Mic. Brex. t. 47 f. 3-4.
Bbl. 90, 209, 242, 244, ~~342~~ 342, 417, 418, 430, 585, 725, 848, 866, 923, 983, 1015, 1133, 1219, 1284, 631. 1605, 1617.
Hab. in silvis, imprimis pinetis — Liguria Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Toscana, Corsica. Asst Ant. Colli.
Pinè (Padre Giovanelli in Brex MS.), Sopramonte (A. Turcati in Brex. MS),
Area distr. Europa, Africa, Amer. bor., Australia

611. b. drebbe ~~in~~ il Bol. granulatus cu anello (Brex. MS.)

luteus 3

Pileo e gibbo pulvinato, glutine fusco
fecedente obtecto, 5-15 cm. lato, glu-
~~tine fecedente~~ tine fecedente pallidiore et virgato-
maculato;

stipite aequali, firmo, albido, supra
anulum amplum, membranaceum,
albo-fusfescentem punctato-scabro, flavido,
5-6 cm. longo, 12 mm. et ultra crasso;

tubulis adnatis, foris minutis, simpli-
cibus, luteis;

sporis ellipsoideis vel oblongato-ellipsoi-
deis vel fusoideis, luteseenti-brunneis,
6-8 = 3 vel 8-10 = 2-3; basidiis 24-28 = 5-8
(Rees. M.S.)

— Caro alba; in cibariis praestans.

21 Boletus flavus Wither. Arrang. IV p. 280 (1796)

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 4.

Icon. Bresad. F. Trid. II t. 132, Gill. Champ. Fr. t. 432, Pat. Tab. anal. fig. 662, Kromb. Schw. t. 36 f. 2.

Krbh. 209, 12, 234, 617, 618, 737, 1043.

Hab. ad Schio, adv. — Trentino; Veneto: prov. di Treviso (Sacc.) dest. Aut. Edaly?

(Val di Sella (ambr. in Bres. MS.), Valle Lagarina (Cobelli),

Area dist. Europa, Australia

flavus 4

Firmus; pileo fulvinato, compacto, glutine fusco secedente flavo, 5-14 cm. lato; stipite e luteo fuscescente, supra annulum membranaceum fugacem, sordide flavum reticulato, 5-8 cm. longo, 12-20 mm. crasso; tubulis adnatis, foris angulatis, luteis;

foris ovoideo-oblongis, basi acutatis, 8-10 = 3-4, granulosis, dilute ochraceis; basidiis (Bres. M.S.) 20-25 = 4-5

Obs. Si distingue dal B. luteus che è simile pei fori più ampii e angolosi. Il B. luteus Scop. Carn. n. 1587 e Lumn. Pol. p. 526 sembrano spettare qui come anche il B. collarius Pers. Myc. Eur. 2 p. 126. Si confronti il B. laricinus tra i Favosi

22 Boletus sanguineus With. Arrang. IV p. 419 (1796)
Sacc Sylt. Fung. VI p. 8
Icon. Gillet Champ. France t. 436, Richon et Roze Atl. t. 59 f. 4-6,
Sow. Col. fig. t 225.
Bibl. 638 D
Hab. in silvaticis - Sicilia: prov. di Palermo, imprimis (Cast. Aut. Σ Sabij.) sub Quercu Ilice.
Area Distr. Europa, Australia.

Obs. Vedi la osservazione al titolo di Bol. rubellus.

Sanguineus 8

Pileo convexo-plano, levi, glabro, viscido, sanguineo, 5-7 cm. lato; stipite aequali, levi, luteo sanguineoque variegato, 2,5-6 cm. longo, 9 mm. crasso. tubulis adnatis, luteo-aurantiis, poris amplis, inaequalibus; sporis 12-16 = 5-6; basidiis 30-35 = 8-10; cystidiis 50-70 = 12-18 (Bres. M.S.) — Colore eximio micat.

Obs. Et facilmente confuso colle forme di B. chrysenteron.

23 Boletus Bellini Ing. Fungh Sicil. Cent. II p. 25, t. 6 fig. 1-4 (1879)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 6
Icon. Inzenga l.c.
Atl. 639.
Hab. inter Pinos halepenses, Sicilia: pr. Palermo (Inzenga)
Area distr. Sicilia.

Obs. Sec. Quél. Flore mycol. p. 413 sarebbe eguale a Bol. Boudieri.

Bellini 6

Solitarius vel caespitosus; pileo convexo-
plano, viscoso, flavo-rubescente;
stipite flavo-sulphureo, brevi, firmo,
deorsum attenuato, rubescente, radi-
cante;
tubulis majusculis adnatis, ochraceis,
hexagonalibus, ore dentatis;
sporis lutescentibus, fusiformibus.

24 Boletus collinitus Fr. Epicr. p. 410 (1836)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 5.
Icon. Lucand Champ. Fr. t. 240 Rick. Hym. t. 582 f. 63.
Bibl. 35, 446, 866, 923.
Hab. in silvis umprimis conifer. — Emilia, Toscana. Aestate

Area Geogr. Europa

collinitus 5

Pileo pulvinato, levi, glutine fusco
fecedente pallescente;
stipite firmo, deorsum attenuato,
* exannulato, ex albo fufescente,
squamulis adpreſſis subreticulato;
ſubtilis adnatis, elongatis, poris
didymis, e pallido luteis, nudis 4 poris
8-10 = 4 (Guill.)
— Caro alba.

N.B. Questo fungo per la statura
e il colore ricorda B. luteus
ma è assolutamente senza anello
e i pori comunemente sono divisi
in due minori

25 Boletus bovinus Linn. Sp. plant. I ed. p. 1177 (1753)

Sacc. Sylt. Fung. VII p. 6

Icon. Gill. Champ. de France t. 576, Krombh. Schw. t. 75 f 1-6

Rolland Atl. t. 79 f. 178.

Rabh. 5, 61, 90, 66, 340, 434, 585, 671, 757, 866, 983, 1015, 1031, 1133, 1210, 631, 1061, Mass. in Bull. S. B. F. 1912. Vizzano (Barla in Bres. MS.)

Hab. in silvis praecipue pineis, subcaespitosus — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio, Toscana, Napoletano, Corsica, Aut. Edulis.

Trentino: presso Ala (Bon. Placido) e altrove (Bres. MS.), Varena (Mass.)

Exsicc. Erb. critt. ital. I n. 332.

Area Geo. Europa, Siberia, Amer. bor., Japonia.

bovinus 6

Pileo planiusculo, glabro, viscido, gilvo, 3–10 cm. lato;

stipite aequali, levi, unicolore, 3,5–10 cm. longo, 9–18 mm. crasso; tubulis subdecurrentibus, 4–7 mm. longis, concoloribus; sporis compositis, e griseo-flavo ferrugineis;

sporis fusoideis, sordide virescenti-ochraceis, 8–10 = 3 vel 9–11 = 3 (Bres. Myc.)

— Caro alba; gluten filei demum repandi tenue, haud discolor vel secedens.

26 Boletus badius Fr. Elench. Fung. I p. 126 (1828)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 7. Rostk. in Sturm Deutsch. Kr. Pilze t. 5
Icon. Fr. Sver. Aett. t. 50, Krombh. Schw. t. 36 f. 12-18, Gill. Champ. de France t. 437, Rolland Att. Champ. t. 80 f. 179
Bibl. 90, 103, 888, 417, 418, 661, 671, 631. Lombardia: Milano (Bres. MS.)
Hab. in silvis, praecipue pinet. — Liguria, Emilia, Trentino, Canton Ticino, Corsica, Toscana: Firenze (Martelli in Bres. MS.). Aest. Aut. Subtus.

Area dstr. Europa, Sibiria, Mongolia, Amer. bor., Australia.

badius 7

Pileo pulvinato, molli, vulgo viscoso, sed lutinoso sed sicco nitido, badio-fulvo; 8-16 cm. lato, juniore quasi villoso-viscoso, sed semper levi; carne 4-6 cm. crassa, ad tubulos caerulescente; stipite solido, subaequali, nunc sursum, nunc deorsum attenuato, nunquam bulbato, levi, pallidiore, brunneo-fruinato, 8 cm. longo, 2,5 cm. crasso, tubulis adnatis, sinuato-depressis, poris majusculis, sordidis, ex albo-flavo virescentibus, angulatis; sporis fusoideo-oblongatis, flavescentibus, 15-20 = 5-6 vel (Bres. M.S.) 12-15 = 4,5-5,5 raro 6 µ; basidiis 30-35 = 7-8.

— Distinctissimus, a praecedentibus valde diversus.

Obs. Secundo Bres. M.S. è bene distinto da B. cossicus.

27 Boletus viscosus Venturi Mic. Brescian. p. 42, t. 53 f. 1-2 (1863)
Sacc. Sylll. Fung. VI p. 7
Lem. Venturi l. c.
B. 61. 1219.
Hab. in Italia – Lombardia: prov. di Brescia (Venturi)

vigo Jey 7

Pileo compacto, convexo-plano, glutine fusco secedente colliuito; stipite crasso, aequali, fusco, superne sanguineo, exanulato, carne caeruleiscente; tubulis adnatis, poris minutis, luteis.

Obs. La descrizione data è incompleta, ma sembra appartenere a questa categoria pel glutine di Bol. luteus, il gambo superiormente sanguigno e la carne cerulescente.

28

Boletus corticus Roll. in Bull. Soc. mycol Fr. XII (1896) p. 1, t. I f. 5
Syll. Fung. XIV p. 165. Bol. sardous Belli et Sacc. Syll. Fung. XVII p. 95
in Bull. Soc. bot. ital. 1903 p. 225 et in Atti R. Acad. Tor. 1907, tab. 1

Icon. Rolland l. c. Belli l. c.

Brbl. 1014, 1015, 631, 1499 (B. sardous)

Hab. inter Cistos in pinetis — Corsica, Sardegna: hinc inde fragrans.

Area Dist. Corsica

dist. Ant. Edulis

Toscana: Pisa, nei luoghi sabbiosi (Barsali in Bres. MS.)
volg.te detto leccino
Lagnano

Obs. Alla probabilmente il Bol. fragrans di Inzenga, F. Sic. Cent. I p. 20, (non Vitt.) indicato dei Sicelii alle radici di Cistus cretica e C. salvifolius è lo stesso B. corticus
E del pari il Fungus crass. fusc. mosc., volg. detto fung. d. Rusedda e Fung. ebrei ad alcamo (Cfr. Cupani. Hort. Cathol.) non è diverso. Anche il Fungus Swilling es cent. crass. superne fulvus Michel. N. pl. g. p. 128 n. 10, volgo Leccino (Cisti sp.) raccolto da Michel. nel bosco dei Francescani detto la Doccia è la medesima specie see Bres. MS

Coffey 14-165

Pileo convexo, pulvinato, firmo, demum molli et expanso, subviscoso (bunedato), usque ad 10 cm. et ultra diam. aequante, brunneo, fusco-ferruginico vel fusco-rubescenti, cuto rimoso et inde carnem luteam praebente; tubulis levi nec squamuloso, nec granuloso, adnatis, longis, subpallescentibus, demum canescentibus, interdum subviscentibus, decurrentibus circum stipitem profunde sinuatis; poris amplis, minimis, rotundis vel stipite fere excentrato, ratione curti, fusiformi-bulboso radicoso, ad apicem striis notato, luteo, subpallide luteo vel flavescenti-straminco brunneo-maculato, fustulis squamiformibus, crassis, hymenii vestigiis, exasperato, carne lutea, versus superficiem pilei flavescente et in stipite fere inde brunnescente; sporis oblongis, pallide luteolis guttatis 15-18 = 5-7; cystidiis fusiformibus; ~~sc. Bres. Mich. sporis 10-22 = 6-7~~; basidiis 40-45 = 12-15, ~~et 30-35 = 8-9~~

Obs. Vicino a B. impolitus ne differisce ~~ob~~ pel gambo rugoso. Differisce da B. granulatus Fr. e B. badius Fr. specialmente pel gambo alla base costantemente bulboso, squamuloso e per la grandezza delle spore.

29 Boletus granulatus Linn. Sp. pl. Ed. p. 1177 (1753)

Sacc. Syll. Fung. VI p. 5.

Icon. Barla Champ. Nice t 31 f 4-12, Bresad. F. mang. t. 87

Fr. Svar. ätl. Sv. t. 23, Gill. Champ. Fr. t. 434, Lang F. di Roma, t 42 f 2,

Rolland Atl. t. 78 f 175, Venturi, Mic. Bresc. t. 50 f 3.

Brit. 23, 38, 39, 61, 90, 209, 242, 263, 12, 340, 357, 417, 418, 430, 434,

446, 585, 653, 656, 700, 725, 866, 923, 983, 1015, 1133, 1219, 1284, 570,

631. 1617

Hab. in silvis graminosis, inprimis pineis et in campestribus — Liguria

Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano,

Corsica. Rest. Aut. Italia (boschi di Roggiana, Terzolas, Sella, Campiglio (Bres. MS.)

Area distr. Europa, Libria Asiatica, Amer. bor., Australia

Exs. Roum. F. Gall. n 3823 (Borra: Barla), Erb. crit. it. I n. 290

granulatus 5

Pileo convexo-expanso, e glutine collinito fusco-ferrugineo eoque secedente lutescente, 5-8 cm. lato;

stipite exannulato, flavido, sursum punctato-granuloso, 5 cm. longo, 12 mm. crasso, sursum saepe attenuato;

tubulis adnatis, brevibus, luteis,

poris simplicibus, granulatis;

sporis fusoideis, luteo-citrinis, 8-10 = 2-3,5; ~~[illegible]~~ vel 7-8 = 3; basidiis 25-30 = 8; cystidiis 45-60 = 7-12 (Bres. 1903)

— Vulgo gregarius, sed minus caespitosus quam B. bovinus. Caro flavescens, in cibariis praestans.

Obs. Certamente è diverso da B. luteus col quale lo confondono Klotzsch ed altri.

30 Boletus Boudieri Quél. in Soc. bot de France, 1878 p. 289, t. 3 f. 3
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 5

Icon. Quél. l.c., Pat. Tab. anal. fig 130.
Bibl. Quél. l.c., Bres. MS.
Hab in silvaticis sub Pinus halepensis: — Nizzardo: Nizza e Mentone (Barla, etiam in Bres. MS.); Trentino: nei pineti Margone, S. Antonio, Sopramonte (Bres. MS.)
Area distr. Italia, Gallia

Exs. Rom. F. gall. exs. n. 3822 (Berra: Barla)

Sero autunno

Obs. Sec. Quélet- ma sarebbe diverso da Bol. Bellini e Soc. Bres. MS. forse Collima con Bol. placidus Bonorden, ed è affine a Bol. granulatus
(Gyroporus)

Boudieri 5

Pileo convexo, molli, glutinoso, albo-fu-
scescente, margine citrinello, 10 cm. lato;
stipite tenui, albo-citrino, sanguineo-
verraculoso; resinoso-lactescente;
carne uda, dulci, alba
dein citrina; tubulis curtis, latius-
culis, sinuosis, 1 cm. longis, flavis,
dein fulvis, resinoso-lactescentibus;
sporis ellipsoideis, angustis, 10 μ longis,
ochraceis vel (Bres. Mf.) 10 = 4; basi-
dia 25 — 30 = 6 — 8

31 Boletus mitis Krombh. Schw. V p. 10, t. 36 f. 8–11 (1836), non Pers.,
Sacc. Syll. Fung. VI p. 6 (B. boreus)

2 Bibl. 182. 848 Rostk. u. Sturm Deut Kr. Pilze t 4

1 Icon. Krombh. l.c. Gill. Champ. Fr. t. suppl., Lucand Champ. Fr. t. 29

Hab. in silvis pinetis Quercetis ~~Ulmis / loco non determinato~~

Liguria: San Remo (Panizzi). Autumno. Gobi.

mitis 6

Pileo e convexo plano depresso, viscido, alutaceo-carneo (sicco ferrugineo-rufo), 5-6 cm. lato;

stipite firmo, brevi, concolore, deorsum attenuato, 5-6 cm. longo.

tubulis brevibus,

poris compositis, ex olivaceo aureis;

sporis 13-14 = 4 .

— Sapor mitis; statura curta, firma; caro gilvo-pallida, color (ex icone) ferrugineo-gilvus.

Obs. Motto affine a B. bovinus (l'identico secondo Bres. Mss.) ma il colore e la statura ne sono diversi. La figura di Rost. differisce pel colore giallo, cosicchè è affatto diverso.

Boletus piperatus Bull. Champ. Fr. t. 451 f. 2 (1789)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 8
Icon.: Bull. l. c., ~~Bolet. piperatus Sacc. et Syd. exsicc.~~, Fr. Sverig. ätl. Svamp. t. 67, Gillet Champ. Fr. t. ~~455~~ 435, Lanzi F. di Roma t. 40 f. 2
Pat. Tab. anal. fig. 673.
Bibl. 90, 244, 263, 66, 342, 357, 419, 564, 848 1456, 1907.

Hab. in Silvis — Liguria, Lombardia, Trentino, Toscana, Viola Pianosa (Sommier), Lazio, Napoletano - Aestate,
(: Val di Sole (Bres. MS.), Valle Lagarina (Cob.),

Area Geogr. Europa, Amer. bor.

Obs. H Bol. piperatus d. Barla e Sacc. Quél. una specie distinta (Bol. amarellus ~~Barla~~ Quél.)

piperatus 8

Minor; pileo convexo-plano, glabro, viscidulo, luteo-gilvo, 2,5-8 cm. lato;

stipite tenui, levi, fragili, concolore, compresso, basi luteo-lactescente, 2,5-5 cm. longo, 6-9 mm. crasso;
tubulis decurrentibus, ferrugineis,

poris amplis, angulatis;

sporis ellipsoideo-oblongatis, 8-9=3-4; basidiis 30=7-8; cystidiis 50-60=12-13 (Bres. Rs.)

Ceteris minor, leviter viscidus, subinde rimoso-squamulosus, carne lutea, sapore piperato facile distinctus.

33 Boletus amarellus Quél. Suppl. Champ. Jura 11 p. 12 (1882), Sacc Syll. Fung. VI p. 10, Quél. Fl. myc. p. 419 (Xerocomus)
Icon. Barla Champ. Nice, t. 32 f. 5-10 (Bol. peperatus)
Bibl. 90. Bres. MS.
Hab. in silvis frondosis — Nizzardo (Barla l.c. et in Bres. MS.). Hieme Suspectus.

× Subtriens IV. Subtomentosi Fr.

Aurantiacus 10

Pileo convexo, 3-6 cm. lato, nitide ochraceo vel purpurascente, margine velutino, citrino;

stipite tenui, sursum flexuoso, citrino-aurantiaco, carne molli, acidulo-piperata, citrina, demum (fracta) vinosa;

tubulis decurrentibus, citrinis, poris sinuosis, majusculis, angulosis, roseis;

sporis oblongis $\frac{8-10}{5-6}$ μ longis, 2-3-guttulatis, flavidis.

Obs. Affine a Bol. piperatus

74 Boletus variegatus Swartz. in Vet. Ak. Handl. 1810 p. 8
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 12
Icon. Fr. Sver. ält. Svamp. t. 66, Gill Champ. de Fr. t 445, Harzer Pilze t. 15, Pat. Tab. anal. fig. 669, Rostk. in Sturm Deut. Pilze III t. 16.
Bbl. 417, 418, 661 (B. aureus), Matt. u Bull. Soc. bot. it. 1912.
Varena (Matt.)
(Cob.)
Hab. in silvis, praecipue pineis — Cant. Ticino, Trentino: Valle Leganina, Margone
Ville Salvadori (Bres MS.), Aest. Autumno. Italy?
Area Syst. Europa, Amer. bor
Myc. Eur. 2, pg. 129, Fr. Hym. Eur. p. 501, Britz. Bol. f 8, Sacc. Sylt. Fung. VI pg. 13.
Var guttatus Pers. : poris majoribus, ferrugineis centibus. — Cum priore mixtus et ulterius observandus: forma poris griseis (B. macropus Rostk.) forsan est status B. bovinii, huic similis.
sporis 10-12 = 2,5-3 (Bres MS.)
Hab. in silvaticis — Nizza (Barla in Bres. MS.) Aestate.
Obs. Se il Bol. aureus Schäff. Fc. Fung. IV t. 82, t. 115 (1774) è veramente sinonimo, come pare, della presente specie, il nome Schäfferiano dovrebbe ~~dettare~~ prefarsi.

variegatus 12

12

Pileo e convexo plano, obtuso, uvido,

obscure luteo, squamulis superficialibus,

fasciculato - pilosis (secedentibus) adperso, margine

acuto primitus floccoloso, 5 - 13 cm. lato;

stipite firmo, aequali, levi, 5-8 cm. longo, 18 mm. crasso,
obscure luteo, interdum rubente;
tubulis adnatis, inaequalibus,

poris minutis, e brunneo cinnamomeis;

sporis oblongato - ellipsoideis, hyalinis vel

dilutissime flavescentibus, 8 - 11 = 3 - 4. vel (Bres.
Mss.) 9 - 10 = 2,5 - 3; basidiis 25 - 35 = 6 - 8.
— Caro lutea, passim caerulescens.

35 Boletus sulphureus Fr. Epicr. p. 413 (1836)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 13
Icon. Quél. in Assoc. franç. avanc. sc. XVII (1887) t. 21 f. 9, Bres. Hymen.
t. 568 f. 32 (Matt. in Bull. S. B. F. 1912)
Bibl. Bresadola MS (at terminus)
Hab. in (at trunks) silvis – Tridentino: Magras al di là della Borrera e Varena, raro
(Bresadola, MS.). Sept. Aest. Aut.
Area distr. Britannia, Gallia, Italia

sulphureus 13

Pileo compacto e convexo plano, floccis innatis serico-tomentoso, sulphureo;

stipite firmo, ventricoso, levi, glabro, sulphureo, demum sordide ~~sulphureo~~ fuginascente, 2,5 - 5 cm. longo, 2,5 cm. crasso,

tubulis adnato-decurrentibus, brevibus, 2 - 4 mm. longis, solito arcteis adfarentibus, facta ~~mutabilibus~~, demum ~~sinuatis~~ fuginoso-maculatis, poris minutis, compositis, concoloribus, demum virescentibus;

sporis e luteo olivaceis, 8 = 3 (Bres. Ms.)

— Est ex elegantissimis; e mycelio lanoso, aureo, late expanso surgit valide caespitosis facie Pholiotae spectabilis; pileis repandi et concrescentes; caro flava, fracta flus minus caerulescens, sed aeri exposita aurea, sub tubulis passim rubens.

36

Boletus chrysenteron Bull. Champ. Fr. t. 490 f. 3 (1790)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 14
Icon. Bull. l.c. Gill. Champ. Fr. t. 446, Krombh. Schw. t. 76 f 15-17, Rolland t. 80 f. 180, Pat. Tab. an, t 671.
Bibl. 61, 123, 244, 315, 342, 434, 657, 656, 725, 836, 866, 985, 1015, 1031, 1133, 671, 1502, 1595. 1301

Hab. in graminosis, umbrosis, silvaticis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio, Napoletano, Corsica, Sett. Apt. Sard. Sicil.
Trentino: sopra Malè, bosco di Magras (Bres. Myc.)
Area distr. Europa, Amer. bor., Tunisia, Australia.

Exs. Cavara, Fung. Longob. n. 158.

Gyroporus 14

Pileo convexo-plano, molli, floccoso-squamuloso, fuscescente subtestaceove, carne lutea, infra cutem rubra; 5-8 cm. lato, saepe areolato-rimoso et sum rimis coccineis;
stipite subaequali, rigido, fibroso-striato, coccineo-flavove, 8 cm. longo, 6-12 mm. crasso;
tubulis subadnatis,
poris majusculis, angulatis, inaequalibus, luteo-virescentibus;

sporis fusoideis, dilute brunneis 12 = 4,5, vel (Bres. Mos.) 12-15 = 5; basidiis 35-40 = 8-9
— Variat ut affines statura, pileo glabrescente laetiore, carne subcaerulescente tubulisque circa stipitem depressis.

37

Boletus striipes Fr. Epicr. p. 414 (1836)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 13
Icon. Battarra F. Arim. t. 29 fig. C–D (Ceriomyces pileolo fornicato et C. crassus); Batsch. Hymen. t. 587 f. 77.
Bibl. 103, 866, 1301
Hab. in silvis et sylvulis pinetis — Piemonte: Valli Valdesi (Fayod), Emilia: pr. Rimini (Battarra) et in prov. di Parma (Passerini) aestate. Solis.

a Vigatto sotto i pini

Stripes 13

Pileo e convexo plano, molli, sericeo, olivacco, cuticula intus ferruginea;

stipite firmo curvato, luteo, fusco-nigro-striato, basi fusco-rufescente;

tubulis adnatis, angulatis, virescentibus;

poris minutis, luteis;

sporis 10-12 = 4. — Caro alba, ad tubulos et stipitis basim extus concolorem, velutina lutea.

Boletus subtomentosus Linn. Sp. pl. ed. I p. 1178 (1753)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 14.
Icon. Battarra Arim. t. 30 f. F (Cerioporus juglandis), Batt. Champ. Fr. t. 393 ex. d. fig. B-C (Bol. communis), Lenzi F. d. Roma t. 41 f. 1, Martius Mat. H. crypt. Suisse II t. 1-18 (plur. varr.), Rolland Atl. t. 80 f. 181. Venturi Mic. Bresc. t. 50 f. 3-5, Vivian. F. d' Mal. t. 37.
Bibl. 51, 61, 90, 209, 245, 103, 342, 418, 430, 434, 585, 638, 653, 656, 866, 923, 983, 1015, 935, 1090, 1203, 1219, 1232, 631, 1605, 1502, 1301
Hab. in silvis et silvulis graminosis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Napoletano, Sicilia, Corsica. Aest. Aut. Edulis.
Exs. Erb. crit. ital. II n. 190
Myc. Ven. n. 417
f. bosco di Castello, Tezenga, Magrassi ecc. (Bres. MS.),
Area Geogr. Europa, Amer. bor., Borneo, Australia.

Subtomentosey 14

Pileo pulvinato - expanso, molli, sicco, villoso - tomentoso, subolivaceo, tomento olivaceo disparente, ~~colore~~ lactiore, vario, infra cutem concolore, 5-15 cm. lato;

stipite valido, subcroftato - sulcato, sub lente punctato - scabrido, 5 cm. circiter longo, deorsum attenuato;

tubuli adnati;

pori ampli, angulati, lutei;

sporis fusoideo - oblongatis, hyalinis vel dilutissime flavescentibus, 11 - ~~14~~ = 4 - 6, ~~vel (Bres Mon.) 13 - 14 - 5 - 6~~; basidiis 50 - 60 = 10 - 12

— Pilei rimosi interstitia lutescunt; caro alba, vel pallida, infra cutem non rubra; ~~tomento~~

011. ~~L'A. radicatus Krombh. t. 18 f. 1-6 costituisce~~ di questa specie ~~una bella varieta quasi rugginosa~~ colle spore fusoidee, ~~pallidamente~~ ochracee, sub-valino 6-3.

Il B. subtomentosus appartiene a specie comune e quanto mai variabile. ~~E strano che la forma tipica manca in Rost Kouc. La Fr. 23 è dubbia come anche Vent. t. 50 f. 2. D'altra parte, se in Rostk. non debbonsi numerose specie che non è possibile limitare esattamente, manifestamente affini a B. subtomentosus, cioè B. fuscus t. 12, B. cuticularis t. 20, B. pannosus t. 22, B. decipiens t. 25 (differisce pel cappello glabro e i tubi decisi) ~~ecc.~~ Q Se ~~te~~ consulti l'egregia monografia del Martin loco citato.

Fr. Epicr. f. 415

39 Boletus ferrugineus ~~spadiceus~~ Schäff. Icon. Fung. IV p. 85 t 126 (1774), Bol. spadiceus Sacc. Sylt. Fung. VI p. 15 ?

Icon. Schäff l.c., Krombh. Schwämme t. 36 f. 19-20 (B. tomentosus), Guél. Champ. Jura I t. 15 f 3. 1301, Bres. 246, Mass. in Bull. S. B. Fr. 1912, Maire B.S.B. Fr. 1910, Valli Valtell. (Fayod) Hab. ut stirps, inter truncos — Piemonte: Valsesia (Carestia) Trentino: Area Distr. Europa

alpi mart. (Maire), Gocciadoro presso le querce (Bres. MS.), Asti Varese (Mass.) & Aostate.

bb "Il Fries ed altri autori seguendolo, attribuiscono allo Schäffer il nome B. "spadiceus", mentre quest'autore non ha che "ferrugineus".

Ferruginey
Spadiceus 15

Pileo → sat compacto, pulvinato - expanso, sicco, tomentoso, spadiceo, opaco, dein vage rimoso, 5-10 cm. lato; carne alba immutabili, → compacto, supra fusco-rubente; stipite firmo, clavato, levi, flocculoso-furfuraceo, luteo-fuscescente, non rubente, intus lutescenti-albo; tubulis adnatis, luteis; poris minutis, subrotundis; sporis 12 = 4 vel 10-14 = 4,5-5; basi = dii 30-35 = 9-11; cystidiis raro 55-60 = 10-12 (Bres. MS.)

Obs. Ha tutto l'aspetto di B. hieroglyphicus Rostk., ma questo si scosta per i pori.

Boletus radicans Pers. Syn. p. 507 (1801)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 16
Icon. Kromb. Schw. t. 48 f. 1-6, Quél. Champ. Jura I t. 16 f. B.

Bibl. 362
Hab. in silvis frondosis et acerosis Lombardiæ (Cesati), Trentino: bosch. d. Magras e sopra Arnago (Bres. MS.) æstate Autumno. Edulis
Area Distr. Europa

radicans 16

Pileo fulvinato, sicco, subtomentoso, ex olivaceo — cinereo gilvo, margine tenui, involuto;

stipite attenuato — radicato, levi, flavo, prunia rubente flocculoso, tactu nudo obscurato;

tubulis adnatis, poris inaequalibus, amplis, sibrinis; pori 12-15 = 5-6; basidii 30 = 8-10 (Bel. M. L.)

— Rara, sed admodum distincta species.

Pori B. subtomentosi, habitus B. badii; caro flava illico obscure caeruleſcit; sapor amaricans.

41 Boletus armeniacus Quél. Ass. Fr. Avanc. Sc. XIII 1884 p. 5 (extr.) t. 8 f. 11.
Lam. Syst. Jung. VI p. 14.
Icon Quél. l. c.
Bibl. Quél. Fl. mycol. p. 419 (Xylocomus), Barla in Bres. MS.
Hab. in silvis sabulosis – Nizzardo alp. Maritt. aestate.
Area dist. Galliæ, Italiæ.

armeniacus 14

Pileo convexo, subsecente - tomentoso, margine excoriato, incarnato - roseo ametHysteove variegato, 3-7 cm. lato;

stipite gracili, flexuoso, subradicante, fruinoso - tomentoso, incarnato - roseo, basi croceo;

carne firma elutaceo - citrina, fracta azurea vel rofea, stipiti aurantiaca, sapida, aromatica;

tubulis sinuatis, citrino - pallidis, tactu cyaneo - viridulis;

sporis ellipsoideo - fusoideis ~~11-13 μ longis~~, ~~vel~~ guttulatis, oliVaceis, ~~vel~~ 10-13 = 4-5 (Bres. MS.)

Hl. Bresadola (MS.) dubita se sia una varietà di Bol. chrysenteron e asserisce con Barla che Bol. rubro-fruinatus è diverso.

42 Boletus parasiticus Bull. Champ. Fr t. 451 f. 1 (1789)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 22
Icon. Bull. l.c. Berk. Outl. t. 15 f 4, Gillet, Champ. Fr tab. 147,
Hard Mushrooms f. 298.
Bibl. 209, 342, 397, 866, 1965, 1301
Hab. parasitica in Scleroderma verrucosa et Sc. vulgari — Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia. Autumno. Suspecta.

Area distr. Europa, Amer. bor.

φ subrenis V subpruinosis Fr.

paraguay 22

Pileo e convexo plano, siccо - glabrato, sicco, mox tessulato - rimoso, sordide luteo, 2,5 - 5 cm. lato,

stipite tenui, rigido, incurvo, extus intusque luteo, 5 cm. longo;

tubulis decurrentibus, mediis, aureis, poris compositis.

sporis fusoideis, elongatis, pallide brunneis, 12 = 3,5 - 4

~~Obs. Secondo Berkeley il cappello non è viscoso~~

43

Boletus rubroprasinatus Barla Champ. de Nice p. 64, t. 32 f. 1-4

Boletus Barlae Fr. Hymen. Eur. p. 504 (1874) ~~Boletus rubroprasinatus Barla~~ Sacc. Syll. Fung. VI p. 21 Aperçu mycol. de Nice, p. 47 t. 3 f. 3 (1858)

Icon. Barla ll. cc. et in Nova Act. Leopold. 27 (1860) t. 18

Bibl. 89, 90.

Hab in silvis montanis, praecipue Castaneae — Nizzardo (Barla), e Piemonte

(v. S. Dalmas, Tenda, alla Chiusa, alla Certosa di Pesio, pr. Cuneo.

Area Distr. Italia sup., Gallia. Aest. Autumno.

rubro-pruinosus
= Bardae - 21

Pileo e fulvinato-plano, velutino-
pruinoso, sicco, eleganter sanguineo
(« laccato-vinato ») ;
stipite corticato, subcostato, concolore, ~~[illegible]~~
sursum attenuato, luteo, intus spongioso
cavove, carne luteola, dissecta laccato-rubra;
sapore ingrato;
tubulis subdecurrentibus, primo luteis,
poris subirregularibus, inaequalibus, subinde
virentibus; sporis flavis.
— Pulcherrimus, distinctissimus, stipitis intus
sublacunosi fabrica ad B. cyanescentem
accedens; ~~sapore~~

44 Boletus cinnamomeus Rostk. in Sturm, Deut. Fl. Pilz III t. 9 (1839)
Sacc. Syll. Fung. VI p 22.
Icon. Rostk. l. c.
Bth. 1301
Hab. in silvaticis — Piemonte: Valli Val Soti, dintorni d. La Garcinière d. Angrogne (Fayod) varius
Area Distr. Germania, Italia bor.

Sec Fayod [illegible]

cinnamomeus
22 v

Fulvo - cinnamomeus ; pileo convexo,
tenui, pulverulento, 3-5 cm. lato ;
stipite elongato, gracili, striatulo, glabro,
flavescente, 6 cm. usque longo ;
tubulis decurrentibus, majusculis,
poris inaequalibus ; poris 12 = 9 ; cystidiis
materia resinosa, brunnea conspersis (Fayod)

Caro alba, dissecta lutescens ; sapor
acris.

Obs. Sembra molto affine a B. variegatus.
Secondo Fayod (n. 130) la cuticola
è piuttosto vischiosa e non polve-
rulenta com'è indicata pel tipo.

65 Boletus versicolor Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze III t. 10 (1839)

Sacc. Sylt. fung. VI p. 21.

Icon. Rostk. l.c. Gillet Champ. Fr. t. 446, Pat. Tab. anal. fig. 669.

Bibl. 671, 1015, 681.

Hab. in silvis frondosis — ~~Corsica~~ Veneto: Tregnago (Massalongo in Herb. M.S.)

Area distr. Germania, Corsica. (Acrt. Aut. Edidit.

versicolor 21

Pileo e convexo plano, sicco, levi,

glabro, pulverulento, sanguineo - rubro;
8 cm. circiter lato;

Stipite solido, firmo, levi, subaequali,

concolore, basi luteo; 8 cm. et ultra longo;
carne lutea,
tubuli postice rotundato - adnati,

ludei)

pori ampli, angulatis;
sporis 10 - 12 = 5 - 6 (Bref. Ms.)

Obs. Non si confonda con B. rubro - pruinatus

46 Boletus prunatus Fr. Bol. illustr. p. 9 (1835)

Sacc. Syll. fung VI p. 21

Icon. Gill. Champ. Fr. t. suppl., Schäff. Icon. fung. t. 133 (Bol. cupreus) forte (B. communis)

Quél., Bull. Champ. Fr t. 393 f. B. C.° forte Quél., Sicard Hist. Champ. t. 52

Bibl. 662, 1133, 1284, 848 (Fs 276 bis

Hab. in silvis graminosis, impositus fagetis — Liguria C. Ticino, Lombardia, Toscana. Aestate.

Area Distr. Europa

Oss. Il Panizzi (n. 848, p. 171) ha un Bol. prunulatus (oltre al B. prunatus) probabilmente una duplicazione per errore. Alla specie presente spetta dovrebbe conservarsi il nome di Bol. cupreus Schäff. (1774), non dubbia sec. Quélet., ma incerta sec. Fries.

pruinatus 21

Pileo e convexo plano, rigido, sicco
purpurascenti-badio, umbrino-pruinoso,
4-6 cm. lato;
stipite firmo, subventricoso, levi, glabro,
luteo rubellogue variegato;

tubulis adnatis, flavis;
poris minutis, rotundis. — i pori ellittici 6-8 longi, 1½ p. longi, flavi.

Caro alba sed cum obsolete virens
vel caerulescens.

Obs. La figura di Schaeffer esprime bene l'abito, ma il gambo è detto reticolato onde non è da restituirsi il nome di Schaeffer.

+

49 Boletus Ornentus Venturi Mic. Brescia p. 37, t. 43 f. 3-4.
Var. Syll. Fung. VI p. 27 = Bol. sanguineus var. gentilis Gaet. teste Bres. MS)
Ven. Venturi l.c.
Rabh. 1219.
Hab. ad sclvaticis — Lombardia: prov. di Brescia, Trentino: bosco misto di Pino e Querce a S. Antonio pr. Trento (Bres. MS).
Area Distr. Hab. bor.
Autumno.

+ Subsectio VI Calopodes Fr

cruenty 27

Pileo e convexo plano, glabro, demum rugu=
loso, gilvo;

stipite bulboso, sursum attenuato, basi appen-
diculato-radicato; carne (praecipue in apice
stipitis) sanguinea;

tubulis adnatis;

sporis minutis, simplicibus, luteis.

sporis 14-17 = 5-6; basidiis 35-40 = 10-12;
cystidiis 60-70 = 16 (Rbrs. Ms.)

Obs. Sembra avvicinarsi a B. appendiculatus
ma distinguesi pel color della carne.

48

Boletus calopus Fr. Syst. Mycol. I p. 390 (1821), ma Pers. Nees. Syll. Fung. VI p. 24

Icon. Fries Sver. ätl. Svamp. t. 69, Harzer, Pilze, t. 69, Krombh. Schw. t 37 f. 1-7, Saunders et Sm. Mycol. Ill. t. 14.

Obs. 90, 342, 430, 585, 725, 1031, 1133, 1219, 1284, 848, 1301

Hab. in silvis tam acerosis quam frondosis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abst. Aut. Venenatus?

Area Distr. Europa, Amer. bor.

Obs. Se il Bol. luteus Schäff Ic. fung. t. 315 (1774) collima con la specie presente, la denominazione di Schäffer dovrebbe essere prevalere. (Cfr Fr. Hym. Eur. p. 508) Il B. calopus Pers. è una forma di B. chrysenteron come egli stesso attesta in Myc. Eur.

cadopus 24

Pileo e globoso pulvinato, impolito,

subfomentoso, olivaceo, 6-9 cm. lato, non
involuto, subrepando;
stipite firmo, e conico subaequali,

reticulato, undique apiceve coccineo, deor-
sum denum pileo concolore et elongato, pilei dia-
metro longiore;
tubuli adnati,

sporis minutis, angulatis, luteis;

sporis fusoideis, lutescenti-brunneis,
7-8 = 3-4 vel 12 = 4 (Britz.)

— Caro pallida, subcaerulescens.

Ø 0.05

69 Boletus olivaceus Schäff. Icon. Fung. IV p. 77, t. 105 (1774)

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 24

Icon. Schäff. l.c., Rostk. in Sturm. Deut. Pilze t. 32, Venturi Micr. Brec. t. 36 f 3-4.

Bull. 61, 209, 245, 983, 1133, 1219, 1301 Matt. in Bull Soc. Bot. Ital. 1912

Hab. in silvis mixtis — Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia.

Trentino: boschi di Magras, Malè (Bres. ms.), Segno.

Varena (Matt.)

dest. Aut. Suspectus.

Area Distr. Europa.

olivaceus 24 v

Pileo convexo, levi, glabrato, olivaceo-fusco, margine primo inflexo; 4-6 cm diam.;

stipite firmo, clavato, bulboso, rubro, apice luteoscente, reticulo punctisque sanguineis;

tubulis adnatis, curtis;

sporis minutis, inaequalibus, flavo-olivaceis;

sporis 12 = 4; cystidiis nullis (Fayod) ~~12-14~~ vel 13-16 = 5-6; basidiis 30 = 6-8 (Bres. pl.)

Statura curta, robusta; caro caeruleiscens, dein alba.

50 Boletus appendiculatus Schäff. Fl. Jung. IV p. 86, t. 130 (1774)
Sacc. Syll. Jung. VI p. 23.
Icon. Schäff. l.c., Krombh. Schw. t. 36 f. 1–7 (B. aereus), Rostk. in
Sturm. Deut. Kr. Flyg. t. 15 (B. viridens), Pat. Tab. anal. t. 64
Bibl. V Bresadola MS. V 61, 434, 983, 1015–631.
Hab. in silvis mixtis Abietis, Corylis, Populis — Trentino: Fondo, Valle di Non (Bres.
MS.), Neapolitano, Corsica
Ligusia,
aest. Julio.

Oss. I binomi sono dati secondo Bres. MS. che lo dice affine a
Bol. regius Krombh.

Hyphoderm subulatum 23

Pileo compacto, e pulvinato expanso, subtomentoso, e fusco lateritio, 5 cm. et ultra lato;
stipite obeso, ventricoso, radicato,
apice subreticulato, 8 cm. longo, circiter 2 mm. crasso vix unquam rubente;
tubulis adnatis, curtis,
poris minutis, angulatis, flavis.
poris 10-14 = 3,5-4,5 raro 5; basidiis 30-35 = 7-8 raro 9 vel etiam poris 12-14 = 4,5-5 (Brez. Mk.)
— Caro pallida; color pilei varius.

5(Boletus pachypus Fr. S. M. I p. 390 (1821)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 24
Icon. Fr. Sverig. ätl. Svamp. t. 68, Gill. Champ. Fr. t. 439, Krombh. t. 35 f 13–15, Venturi Mic. Bresc. t. 64 f. 1–2 (B. albus)
Bibl. 39, 61, 90, 209, 417, 418, 585, 737, 848, 866, 983, 1219, 1456
Hab. in silvis, praecipue fagetis — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Napoletano dett. Aut. Venenatus?
Area Dist. Europa / Australia : bosch. di Terzolas e di Faè (Bres. MS.), Valle Lagar. (Cob.)

Fr. Hym. Eur. p. 507, Sacc. Sylt Fung. VI p. 25
Var. candicans (Fungh. Brit. Cent. II p. t. 10 f 4 (1879))
Icon. Tuzenga loco., Krombh. l. c. pg. 10–12, Saund. et Sm. Myc. Ill. t. 17
Pileo albo ad viridulum vergente; stipite levi, albo-virino

Hab. in silvis Quercus Italiae — Sicilia: Palermo alla Favorita
Area Dist. Austriaca, Gallia, Germania, Italia.
Vd. Sec. Guel. Fl. myc. p. 425 non è Vivo Dal Bol. Satanas Rogues

pachyppus 24

v. 25

Pileo pulvinato, subtomentoso, e fuscescente
alutaceo-pallido, 10-22 cm. lato,

stipite crasso, firmo, reticulato, flavo rubroque
variegato, saepe toto intense sanguineo,
5-10 cm. longo, 6 cm. crasso, primo curto, ovato-
bulboso, dein elongato, aequali, ~~saep~~
tubulis subelongatis, circa stipitem abbreviatis,

poris rotundis, flavis, demum subvirentibus;

sporis magnis, ovatis, lutescenti-ochraceis 12-14 = 5-6
vel 15-18 = 5-5,5; basidiis 35-40 = 6-8 (Bres. Mg.)

- Affinibus major, speciosior, habita ad Edules accedens. Caro crassa, albida, leviter caeruleascens,

52 Boletus citrinus Vent. Mic. Bresc. p. 43, t. 59 f. 1–2 et f. 3–4 (descr.)
(1863), Sacc. Syll. Fung. VI p. 27
Icon. Ventur. l. c.
Hab. in silvatis – Lombardiæ: prov. d. Brescia (Ventur.)
Area Dist. Ital. bor.
Bibl. 1219.

Subsect. VII Edules Fr.

citrinus 27

Pileo pulvinato, glabro, molli, ochraceo;

stipite ovato, a basi ventricosa attenuato,

levi, concolore;

tubuli @ "semiliberi" (in icone decurren-

tibus), poris minutis, rotundis (fuligineis ex icone).

— Caro alba; habitus peculiaris.

Obs. Una singolare mostruosità è il

B. monstrosus l.c. f. 2.

Sacc. Sylt. VI p. 31

53 Boletus aestivalis (Paul.) Fr. Epicr. p. 422 (1836), Tuberopsis aestivalis Paul. Traité Champ. t. 170 (1793)
Trog. Paul. l.c., Fr. Sver. Svamp. t. 43
Bibl. 66, 434.
Hab. in silvatici umbrosi — Lazio, (: Frascati (Bagnis) :) Napoletano. Vere. Aestate. Edulis.

Area distr. Europa Suecia, Anglia, Germania, Italia, Austriaca

(1863)
Var. pinicola Vent. Micr. p. 39 t. 46, Sacc. Sylt. Trog. VI p. 31.
Bibl. 1219.
Sine descriptione sed indicata affinitate cum B. edulis, cuius habet staturam, differt stipite lacunoso, tubulis viridibus, poris gilvo-rubiginosis, quales etiam in B. edulis vetusto occurrunt (Trog)
(Vent.) Autumno
Hab. in silvis pineis — Lombardia: prov. di Brescia, valle Nonna. Edulis
Ott.

Aestivalis 31

Pileo pulvinato, subrepando, levi, glabro, albido, jove sicco granuloso;

Stipite crassissimo, bulboso, levi, glabro, flavido, 5 cm. longo

Tubulis subliberis, poris aequalibus, minutis, luteis;

Sporis elongato-ovatis, viridi-brunneis, fusce-scentibus, 12=4-5.

— Est e maximis huius generis, saepe 15-18 cm. diam. Statura fere B. reticulati, aegre gratus, saporis, amplus. Caro inferne lutea, superne alba, in stipitis basi rubens.

54 Boletus rimosus Venturi Stud. micol. p. 31 t 10 f 93-94 (1842) et Mic. Bresc. p. 48, t. 64 f. 3-4, Sacc. Syll. Fung VI p. 27

Icon. Venturi l.l. c.c.

Bibl. 1214, 1219, 209, 886.

Hab. in silvis — Lombardia: prov. d. Brescia (Venturi), Dmitrii: bosch. misti a Collecchio (Passerini), Veneto: ad boc. Montello (Ripple via cyaneo).

Area distr. Ital. bor.

rimosus 27

Pileo convexo, tomentoso, areolato-rimoso, umbrino-olivaceo, rimis pallidis;

Stipite bulboso, levi, cyaneo, carne rubello tincta;

Subulis "liberis" (ex icone adnatis), poris minutis, rotundis, virescentibus; spor. 12-13 = 6.

Obs. A questa specie sono manifestamente unite da affinità, benchè diversi nel colorito: B. cruentus, citrinus, perniciosus Dello stesso Venturi. Se non ostasse il colore cianeo dello stipite, potrebbe aversi come la forma abbastanza frequente di Bol. edulis a pileo rimoso.

55 Boletus fragrans Vitt. Funghi mang. p. 153, t. 19 (1835)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 30
Icon. Vittad. l.c., Krombh. Schw. t. 75 f. 15-21 (B. xanthopous)
Lanzi, Funghi di Roma, t. 38, Gill. Champ. de Fr. t. 574, Vent. Mic. Brasc. t. 53 fig. 3-5.
Bibl. 240, 434, 653, 656, 667, 1090, 1219, 1228, 848
Hab. in silvis frondosis — Lombardia (Nizzardo (Barla in Bres. Mss.)), C. Ticino, Lazio, Napoletano,
Sicilia Aest. Aut. Edulis.
Area Geogr. Europa

Rhodesiae Bres. Mt. qui petit Bol. appendiculatus Gill

Fragrans 30

Pileo pulvinato, repando, subtomentoso, (variante inaequali) fusco-umbrino, passim purpureo-maculato vel purpureo-marginato, margine inflexo, variaeterna-ceps saepe areolato-rimoso,

stipite valido, levi, luteolo, rubroque variegato, primo ovato-bulboso, basi saepe fusiformi;

tubulis semiliberis, poris minutis, rotundis, luteis, virescentibus;

sporis ovatis, fusoideo-ventricosis, uno apice apiculatis, pallide luteolis - viridibus, 11 - 11,5 = 4 - 5, vel 10 - 15 = 4,5 - 6, basidiis 35 - 40 = 9 - 11 vel 40 - 45 = 8 - 10, clavatis (Bres. Myc.);

— Caro lutea, nunc immutabilis, nunc virescens vel caeruleascens, demum rubescens, subcuticula vel ad subulos linea rubra signata

52 Boletus obsonium (Paul.) Fr. Epicr. p. 421 (1836)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 30 Tubiporus obsonium Paul. Champ. t. 171 f. 2-3 (1793)
Icon. Paulet l. c. Kromb. Schw. t. 76 f. 12-14, Lucand Champ. Fr. t. 296

Bol. 866.
Hab. in Silva — Emilia: prov. di Parma (Passerini) aestate aut. Edulis.
alpi marittime (Giel. Fl. myc. p. 419)

Oss. Il Bresadola ms. cita dubitativamente di S. Martino di Castrozza (Trentino) un Bol. fuscus Rostk. (sinonimizzato dagli autori con Bol. obsonium) e ne dà le seguenti note caratteristiche: Pileus convexus, carnosus, luteo-subfulvus, glaber, 5-6 cm. latus; tubuli rotundato-adnati ex parte liberi, flavo-subviridi; pori flavi dein fuscescentes, parvi, subangulati; stipes elongatus, subaequalis, basi profunde in terra immersus, fusciduli, solidi, apice sordide dein laxe albo-reticulati, 9 cm. longus, 10-14 mm. crassus; caro alba, mitis, inodora. Color stipitis et reticulatio ut in B. eduli.

obf. mm 30

Pileo e pulvinato expanso, sericeo-levi-
gato, cinnamomeo-helvolo, margine
acuto; 10-12 cm. lato; ~~primo obtuto glabro~~
~~1/2 hora apparente sed cute~~
Stipite firmo, conico, levi, pallido;

Tubulis semiliberis, poris minutis,
rotundis, e luteo concoloribus;
Sporis 15-30 = 4-7, irregularibus
— Forma admodum regulari
Stipiteque conico levi distinctus; pileus
primo obtuto apparet glaber, sed
cutis subsericella; caro pallida,
haud mutabilis.

Boletus perniciosus Rog. Hst. Champ. f. 74, t. 7 f. 1-3 (1841), Venturi Mic. Bresc. p. 41, t. 50 f. 1-2 (1860), Sacc. Syll. fung. VI p. 27.
Icon. Rog. l.c., Venturi l.c.
Bibl. 1219

Hab. in silvaticis - Lombardia: ~~prov.~~ M. ~~Coccaglio (Brescia)~~ prov. di Brescia pr. Coccaglio (Venturi) et Aut- Venenatus.

Vpor ochre?

perniciosus 27

Pileo e convexo plano, subbomentoso, fu-
scescente - alutaceo (umbrino in icone);

Stipite sursum leviter attenuato, levi, glabro,
luteo;

tubulis semiliberis, poris minutis, luteis.

— Caro caerulescens.

588 Boletus reticulatus Schäff. Icon. fung. IV p. 78, t. 108 (1774)
Boletus impolitus Fr. Epicr. p. 421 (1838)
(Sacc. Syll. fung. VI p. 30 (1887)
Icon. Fr. Sver. ätl. Svampar t 42, Gill. Champ. Fr. 647 et 640, Schäff. l.c
Richon et Roze atl. Champ. t. 58, Harzer Pilze t. 51, Krombh. Schw.
Bbl. 434, 1015, 631, 90, 585, 848 (B. impactus) Nizzardo, S. Remo, t. 74 b. 7-9
Hab. in silvis, imprimis fondoly, usque quercetis — Napoletano, Corsica,
area distr. Europa. aestate. Julio.

Obs. H. Quél. Fl. mycol. p. attribuisce il Bol. reticulatus Schäff. al B. edulis contrariamente all opinione di Boudier, Gillet, Richon ecc. che lo riferiscono al B. impolitus.

reticulatus
= impolitus 30

Pileo pulvinato, dilatato, flocculoso, demum granuloso-rivuloso, impolito, fulvo-brunneo, 12-15 cm. lato, 5 cm. alto;

Stipite valido, subbulboso, levi, pubescente, flavo, 5 cm. circiter longo,
→ 1,5-2 cm. longis,
fabulis liberis, poris minutis, luteis;

Sporis ovatis vel fusoideis, pallide virescenti-brunneis, 8-10 μ longis

— Speciosus, obesus, odore et sapore gratus, inter maxime deliciosos. Caro crassa, infra cutem flavescens. Interdum adest zona rubella prope apicem stipitis. Ob pileos multorum reticulato-rimosos, frequenter confusus.

~~Obs. B. edulis Krombh. t. 74 f. 10-11 si scosta dal vero non poco; la t. 7-9 B. suspectus ha rappresentato meglio, ma il nome e la descrizione si allontanano.~~

59 Boletus edulis Bull. Champ. Fr. t. 60 et 494 (1781)
Sacc. Syll. Fung. VI f. 29. = Exs. D. Sacc. Myc. Ital. n. 105
= Icon. Bull. l.c., Barla Champ. Nice, t. 34, Bresadola, Mang. t. 88,
Lang. F. di Rome t. 39 f. 2 et 40 f. a–c (varr.), Sacc. et D'Ancona
Mang. t. 8 f. 4-5 et t. 15 f. 13, Venturi Mic. Bresc. t. 8, Vittadini Mang.
t. 22, Viviani F. d'Italia, t. 25.

Bibl. 51, 61, 5, 90, 123, 209, 242, 244, 12, 41, 66, 103, 349, 426, 411, 418, 430
434, 564, 568, 585, 639, 653, 656, 661, 671, 690, 699, 700, 725, 836, [illegible], 853,
866, 923, 927, 983, 995, 1002, 1015, 1062, 1090, 1133, 1203, 1219, 1228,
1244, 1269, 862, 858, 647, 433, 529, 631, 1301

Hab. in silvis praesertim frondosis – Liguria, Piemonte, Lombardia, C. Ticino,
Trentino, Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica
Sard. Aut. Edulis et praecibatus.

Area Distr. Europa, Tunisia, Amer. bor., Australia.

Obs. Per questa notissima specie dovrebbe preferirsi il più antico nome di B. bulbosus Schäff. (1774)
come è proposto da Karsten, Istvanffi ecc.
Qui le due var.

edulis 29

Pileo pulvinato, glabro, udo, 5-25 cm. lato, subbrunneo, ~~fusc~~ variante albo, griseo-rufescente etc.;

stipite valido, reticulato, pallide → interdum obsolete, fuscescente, nunc curto, bulboso, nunc elongato, aequali, etiam radicante, 5-13 cm. longo, 5 cm. crasso;

tubulis semiliberis, elongatis, minutis, sin primo albis, dein luteis, virescentibusque;

sporis fusoideo-oblongatis, rectis, plaindis 14-16 = 4-5,5, vel 10-14 = 3-4., vel 15-17 = 4-5, basidiis 40-50 = 10-12 (Bres. Myc.)

— Caro alba, infra cutem rubens, e compacto mollior, Delicios.

Var: elephantina cacsa vel contusa caeruleiuit.

Var. pubescens Fries in Sum. Veg. Scand. Sect. post. 1849 p. 106. a typo differt: pileo primo pubescente, tactu primo fulvo, demum ochraceo, tomento fasciculato, stipite ima basi cottoso, pileo ex hygrophano carneo-fulvo, rarius albo. Hab. in arcuis — Commune in Vall. Valdens., rare.

Var. pubescens Fries, Hym. Eur. p. 606 (1874). Syn. Fung. Upsal. p. 71.
Pileo tenui primitus albido, pubescente, demum sordide isabellino-brunneolato, carne tenui, albida, odore nullo, sapore vero mitescente, caro sub cuticula rubescente; tubulis semiliberis, albidis, demum carneis; sporis fusoideis, 14-16 = 4-5 mm. — Lombardia: Vallombrosa (Vestergren!). Var. ad typum transit.
Var. B Fries (Syst. Myc. I. c.) Non cum Typo de Candolle, sed cum Var. β Bolton, ad typum pertinet.
Var. γ Fries (Syst. Myc. I. c.) Non cum Typo de Candolle, sed cum Var. γ Bolton, ad typum pertinet.
Var. δ Fries (Syst. Myc. I. c.) Non cum Typo de Candolle, sed cum Var. δ Bolton, ad typum pertinet.
Var. ε Fries (Syst. Myc. I. c.) Non cum Typo de Candolle, sed cum Var. ε Bolton, ad typum pertinet.

60

Boletus messanensis Inzenga Funghi Sic. Cent. II p. 13, t. 3, f. 1 (1879)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 20.
Icon. Inzenga l. c.
Hab. in silvis castaneis collinis — Sicilia, pr. Messina
Area dist. Sicilia

Melzanensis 20

Pileo convexo-lobato, margine revoluto, castaneo, subtomentoso, in siccitate ex epidermide diffracta irregulariter rimoso;

stipite tubuli concolore, rugoso-striato, solido, cylindrico, basi nonnihil crasso;

tubulis brevibus, minutis, subliberis, ochraceo-virescentibus, ore semper ochraceis;

carne albida, densa, fracta mutabili;

sporis ochraceis.

— Caespitosus.

61

Boletus Harrowianus Sacc. et Cub. Syll. fung. VI p. 17, Bol. Bresadolae Schulz. in Hedw. 1885 p. 166, non Quél.

Bibl. 1901 Icon. deest

Hab in silvis — Piemonte: Valle Valdesi, S. Lorenzo di Angrogna (Fayod)

Obs. La specie piemontese si distingue alquanto, sec. Fayod, per la despigmentazione di una vera reticolazione sul piede

Slavonia 17

Pileo carnoso, e convexo subconcavo, 8-17 cm. lato, tempore sereno subhumentato, pluvio viscoso, e luteo in medio amoene luteo-cinnamomeo, fere aurantiaco, demum obscuriore cinnamomeo, partialiter subsanguineo;

stipite contiguo, valido, recto aut curvo, subcylindrico, basi cuspidato, 1,5 cm. crasso, interdum obconico, et supra 4 cm. crasso, 5-6 cm. longo, nec reticulato sed tuberculis minutis aspero, ex amoene dilute-luteo sordide-luteo, apice et basi rubicundo, tactu tarde obscuriori, usque nigrello-fusco;

spo tubulis liberis, 1,3 — 1,7 cm. longis, laete luteis, tandem viridibus)

poris semper sat grandibus, e sordide aureo-cinnamomeis, tactu nigrescente-viridibus;

carne solida, lutea, lente dilute-caerulea, ad basin stipitis tandem fusco-rubra fere sanguinea;

odore suave-aromatico, sapore grato;

sporis umbrinis, oblongis, utrinque attenuatis, subfusiformibus, 15-17 = 6

62

Boletus regius Krombh. Schwämme fasc. II p. 3 t. 7 (1832)

Sacc. Syll. fung. VI p. 28

Icon. Krombh. l.c. Lanz. F. d. Roma t. 42 f 1, Venturi Stud. mic. t. 10 f 13. 99–100

Hab. Bibl. 61, 209, 653, 656, 1301

Hab. in silvis – Liguria, Veneto, Lazio. Sept. Oct. Aest. Autumno. Julij

Area Distr. Europa (Piemonte: Bavero (Co. Padulli in Bres. MS.), Valli sotto: Cartagni Valdesi (Fayod).

Regius 28

variante purpureo et olivascente.

Pileo pulvinato, glabro, sicco, subsanguineo, 10 - 22 cm. lato,

stipite crasso, reticulato, luteo, basi purascente, 5-8 cm. longo;

tubulis semiliberis, minutis, curtis, aureis;

sporis lanceolatis, saepe irregulariter = subclavatis, continuis, flavescentibus, medio longitudinaliter guttulis 4-5 parvis, 15 = 5. vel 12 - 14 = 3,5 - 4,3; basidiis 35-40 = 9-10 (Bres. Myc.)

— Gregarius, amplus, pulcherrimus, sapidissimus; caro flavida, immutabilis.

63 Boletus siculus Inzenga, Funghi Sic. Cent. II p. t. 10 f. 2. (1879)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 33.
Icon. Inzenga l. c.
Bibl. 639.
Hab. ad silvulis ubicumque — Sicilia: pr. Palermo (Inzenga)
Area distr. Sicilia.

Siculy 33

Pileo pulvinato, margine acuto, ochraceo-fusco;

stipite pileo concolore, apice luteiscente, reticulato-purpurascente, basi ventricoso, radicato;

tubulis liberis, circa stipitem abbreviatis, citrinis, evanescentibus;

sporis ochraceo-aurantiacis;

sporis ochraceis.

64

Boletus vaccinus Fr. Epicr. p. 420 (1836)

Sacc. Syll. fung. VI p. 29.

Icon. Fr. Icon. äH. Champ. t. 51, Britz. Hymen. t. 565 f. 18.

Bull. 866, 1090.

Hab. ci silvis, imprimis fagineis sed etiam mixtis — Emilia: prov. di Parma, Sichel

a Colbacchini (Vall.)

a Pedara (Sicilia)

vaccinus 29

Pileo pulvinato - expanso, subvilloso, castaneo, margine obtuso;

stipite bulboso, sursum levi, concolore, basi fulvente, lacunoso, ~~adscendente~~ adscendente, clavato;
tubulis liberis, poris minutis, rotundis, albo-flavidis, demum flavis.

- Species subcaespitosa; caro alba, immutabilis; cutis intus rubens.

Oss. Per il gambo ascendente e clavato si deve con cautela separare da B. badius. Sec. Patterson l. c.: caro stramineo immutabili v. vix caeruleascens; spore di Boleti edulis (Pass. n. 866)

65

Boletus Briobianus Farneti in Atti Ist. bot. Pavia, VII (1902) p. t. 4-6.
Sacc. Syll. Fung. XVI p. 1115
Icon. Farneti l. c.
Rabh. 563, 1965.
Hab. ~~in ~~ ~~Lombardi sp. Pavia~~ Lombardia
ad terram sabulosam, herbosam, loci apici, prope Cava Carbonara, raro
Area Distr. Ital. bor.

Obs. Sec. lo stesso autore è specie molto affine a Bol. subtomentosus e Bol. chrysenteron, dai quali si distingue per le cripte o fossette irregolari, che ne rendono rimosa la cute, le quali però probabilmente non sono che una produzione accidentale, teratologica.

Pileo pulvinato, 4–5 cm. lato, subtomentoso, ticco, fusco-umbrino, cryptis anfractuosis conspersis, margine acuto; stipite solido fusiformi, subcurvato, basi affer. radicato-radicante v. fusiformi-elongato, pruno, fibroso-striato, luteo, superne sanguineo-lineato, 7–12 cm. longo, 1,5–2 cm. cr.; tubulis liberis, circa stipitem depressis, 0,5 cm longis, luteis, ab hymenophoro laevi ~~aegre~~ non omnino facile separandis; porris ~~luteis~~ aureis, irregularibus, angustis, linearibus, flexuosis, primo[illegible], sublabyrinthiformibus, dissepimentis crassiusculis obtusis, prominulis, gyroso-plicatis; carne lutea, sub cute rubro-violacea, fracta tenuissima violascente, in stipite lutea, immutabili; cuticula aegre separabili; chlamydosporis (?) intra tramam obviis, globosis, lacteis oblongis utrinque acutis, 32÷13; basidiis clavatis 40÷8,5; sterigmatibus 2,5 μ longis; sporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, 13÷6, ochraceis; cystidiis clavato-capitatis 50 μ longis.

66

Boletus aereus Bull. Champ. Fr. t. 385 (1788)

Sacc. Syll. VI p. 29

Icon. Bull. l.c., Lang. F. Roma t. 39 f. 1, ~~Krombh. Schwämme Taf. 47,~~ Roll. Atl. champ. t. 82 f. 183, Gill. Champ. Fr. t. 442, Quél. Champ. Jura t. 16 f. 2.

Bibl. 5, 90, 209, 242, 417, 418, 480, 434, 585, 653, 656, 983, 862, 1456

Hab. in silvaticis, umbrosis – Liguria, Piemonte, Trentino, Veneto, Lazio, Napoletano. Aestate Autumno Eduli.

Area distr. Europa, Australia.

: Pinè, Trento (Bres. MS.) Valle Lagarina (Cobelli)

aerug 29

Pileo pulvinato, glabro, subpelliculoso, olivaceo-fusco, subnigricante; 7-9 cm. lato;
Stipite valido, subreticulato, luteolo, basi fuscescente; juniore oblongato nec bulboso; subulis minutis, subliberis, sulfobureis;

Sporis oblongis, basi obliquis, 10-13 = 5-vel 13-15 = 5; basidiis 35-40 = 10-12
(Bres. M.S.)
— Caro alba, in aere lutescens.

Oss. La tavola 385 di Bull. rappresenta una varietà affine a Bol. vaccinus, minore colla carne nella pellicola rufescente.
La var: leucopora sembra uno stato giovanile. Clus. l.c. Sp. 1

67

Boletus aetnensis Inzenga, Funghi sic. Cent. II p. 22 t. 5 f. 2 (1879), Sacc. Syll. Fung. VI p. 35.

Icon. Inzenga l. c.

Bibl. 639, 1088, 1090

Hab. in graminosis regionis Aetneae Siciliae, praesertim ad Aci-Reale ubi saepe communis (Inzenga), e Padara (Scalia)

Area Distr. Europa Sicilia

Subsectio VIII Luridi Fr.

aetnensis 35

Pileo pulvinato, compacto, glabro,
brunneo-rufo;

Stipite crassissimo, subaequali,
obsolete reticulato, subconcolore;

tubulis semiliberis, elongatis,
sordide lutescentibus,
poris rubiginosis.

— Species ampla, colore
omnino peculiari; caro
iam pilei quam stipitis
mox caerulescit.

68 Boletus lupinus Fr. Epicr. p. 418 (1836)
Sacc. Sylt. Zung. VI p. 34,
Icon. Krombh. Schw. t. 38 f. 7–10, Gill. Champ. Fr. t. suppl.
Richon et Roz Atl. t. 60 f. 11–13.
Bull. 866, 639.
Hab. ad silvas — Emilia: prov. di Parma (Passerini), Liguria: prov. Palermo (Zang.) a Collecchio e Ugatto
Trentino: bosch. conifori di Castelfondo, Rendola, Faè presso Cles (Bres. Ms.),
Dest. Venezia.
Area Distr. Europa

Obs. Sec. Quél. Fl. mycol. p. 423 non sarebbe diverso da Bol. Satanas Lenz.

Lupsiny 34

Pileo pulvinato, glabro, sicco, impolito,

e livido ~~-~~ virescente lutescente; 5-12 cm. lato;

Stipite obeso, ovato-bulboso, obsolete reti-

culato, roseo-sanguineo tincto, 5-8 cm. longo,

demum elongato;

tubulis liberis, luteis, poris minutis,

aurantio-rubris; sporis 13-17 = 4,5-6 rarius 8

(Bres. Myc.)

— Caro flavida, mox caerulescens, nec rubescens;

odor & sapor acidus; ~~fabulosa forma~~

~~stipite colore rubro gutta~~

Obs. Una bella forma col gambo, secondo la figura di Inzenga, frequentemente rosso-guttato e non reticolato fu raccolta in Sicilia.

69

Boletus luridus Schäff. Icon. fung. IV p. 18 t 107 (1774)

Sacc. Syll. fung. VI p. 34

Icon. Schaff. l. c., Barla champ. Nice t. 33 f 1-5, Bresad. F. mang. t. 91, Fr. Sver. ätl. Sv. t. 12, Gillet Champ. Fr. t. 438, Pat. Tab. anal. f. 672, Richon et Roz Atl. t. 56 f 1-5, Rolland, Atl. t. 85 f 189.

Bibl. 39, 61, 90, 209, 242, 123, 264, 12, 315, 240, 426, 417, 418, 430, 434, 564, 585, 638, 653, 656, 725, 749, 836, 853, 866, 923, 983, 1015, 1049, 1133, 1232, 862, 858, 642, 1284, 528, 529, 631, 1502

Hab. in silvis pregnens — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Napoletano, Corsica — Aest. Aut. Venenatus

Exs. Sacc. D. Myc. Ital. n. 807

Area distr. Europa, Amer. bor., australis, Japonia.

Vill. Sec. Fayod in Ann. Atl. Agr. Tor. 1893 p. 104, le fig. di Barla l. c. rap. presenta una varietà (forse il B. miniatoporus Soc.) pregnente anche nelle Valli Valdesi, di tinta pel colore tabacco del pileo e rosso miniato dei pori e del piede, il quale non è mai reticolato, ma solo punteggiato.

lucidus 34

Pileo fulvinato, tomentoso, umbrino-olivaceo, dein subviscoso, fuligineo, 5-30 cm. lato;

stipite validus, miniato-ruber, reticulo vel fonctus notato, 6 cm. et (multo) ultra longo, apice ~~flavo~~aurantio;

tubuli liberi, lutei, demum 7, 12 mm. et ultra longi, virescentibus, poris rotundis, e miniato aurantiis,

sporis permagnis, ovatis, virescentibus - oriscis, 15 = 9 vel 11 - 15 = 6-7; basidiis 45-50 = 12-14. (Bres. MS.)

Caro lutea, fracta caerulescens.

Sapore gratus, sed valde venenatus.

~~Hb. Lato. 190 f. Bull. è media fra queste specie e Bol. erythropus.~~

~~Cfr. Icon. n. 18, 22.~~

V. s. d. verso

Il Bres ~~ricorda (MS.) controdata~~ una varietà colla carne quasi cacciria, le spore ellittiche o quasi ovali, pallido-gialle 11-12 = 6.

70 Boletus erythropus Pers. Syn. p. 513 (1801)

Sacc. Sylt. VI p. 35.

Icon. Barla Champ. Nice t. 33 f. 6-7, Harzer, Pilze, t. 56, Richon et Roze Atlas, t. 60 f. 14-16.

Bol. 61, 244, 417, 418, 737, 866, 985, 1031, 1284.

dest. dut. Venenatus.

Hab. in nemoribus — Liguria, Trentino, Veneto, Emilia, Lombardia, Toscana, area distr. Europa

(bosch. d. Magray e sopra il Pondasso (Bres. MS.))

erythrosus 35

Pileo saepe fulvo-rufescente; stipite ~~[illegible]~~ tenuiore, cylindrico, haud reticulato, sed squamuloso-punctato, intus subtubente. Cetera P. lurido

→ sporis 12-16 = 4,5-6; basidiis 40-45 = 8-10 Bres. Myc.

~~Praecedenti~~ ~~Bol. Satana~~ ~~stipite~~, ~~lurido~~ ~~minor~~. ~~Caro ex pertom~~ ~~sanguineo-rubra~~, ~~ex Pl. dan.~~ ~~t. 1792 lutea~~.

Obs. Da molti è distinto da P. lurido sec. Fries ma nel medesimo luogo in cui negli anni piovosi si raccoglie questo, nelle stagioni estive ~~sec~~ asciutte si raccoglie il P. erythrosus.

Boletus purpureus Fr. Bolet. Ill. p. 11 (1835)
Sacc Sylt. Fung. VI p. 35
Icon. Fr. Icon. ält. Champ. t. 41, Barla Champ. Nice t 33 f 8-10,
Lang. F. d. Roma, t 36 f 2, Saunders et Sm. Myc. Ill. t. 43 f 1-4.
Bibl. 61, 209, 434, 209, 725, 656, 749, 866, 983, 1133.

Hab. ex silvis — Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano.
Trentino: bosco sopra Arnago (Bres. MS.)
Aest. autumno. Venenatus.

Area Distr. Europa.

purpureus 35

Pileo pulvinato, subvelutino, opaco, sicco, purpurascenti-rubro;

stipite valido, luteo, venis punctisve purpureis variegato;

tubulis subliberis, luteo-virescentibus, poris minutis, purpureo-aurantiis;

poris virescenti-brunneis, ~~[illegible]~~ 10-13 = 5-6; basidiis 30-35 = 8-10 (Bref. Myc.)

— Valde speciosus; stipes variat apice modo reticulatus, intus praecipue basi rubescens. — Caro junior modo caerulescens, dein obscure lutea.

Boletus panormitanus Inzenga Fungh. Sic. Cent. II p. 21, t. 5 f. 1 (1879)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 35
Icon. Inzenga l.c.
Bull. 639, 434.
Hab. in silvaticis, nemoribus — Napoletano: Portici sotto i lecci (Comes), Sicilia, boschi di Leccio alle favorite di Palermo (Inzenga). Vere.
Area distr. ~~Regnicola~~ Ital. austr., Sicilia.

panormitanus 35

Pileo convexo, glabro, e fusco
sublutescente, margine acuto;

stipite valido, pallido, infra
medium brunneo, fusiformi-attenuato,
radicato, supra medium laxe et
eleganter rubro-reticulato;

tubulis semiliberis, luteis,

poris sanguineo-rubris.
— Caro caerulescens, in stipitis basi rubella.

Obs. È affine (affinis) a B. aetnensis
ma evidentemente distinto per
la base fusiforme del gambo
e il reticolo laxo

73

Boletus Sabaneus Leng. Die nütz. und schädl. Schw. p. 67 t. 8 f. 33 (1840)
Soc. Syst. Fung. VI p. 34 (non Rostk. (= erythropus))
Icon Leng l. c., Arcangel. F. vel. t. mang. fig. 8, Bresad. F. mang. t. 90,
Ingenga F. sicil. Cent. II t. 9 f. 2, Langi. F. di Roma t. 37 f. 2, Vivian
F. d'Nat. t. 40 (B. luridus), Rolland ath. t. 85 f. 188.

Bibl. 1, 39, 41, 51, 61, 209, 242, 263, 342, 398, 417, 418, 434, 639, 653, 656,
725, 749, 853, 866, 923, 1090, 1133, 1269, 528. 1408, 1502, 1617

Hab. in silvis frequens — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Marche, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia
(Bres. MS.)
Vallo Lagarina (Cob.), bosch. di Sopramonte, Villa Salvotti alla Scala, Margone ecc.
(Bres. MS.)
Acct. Aut. Venenatus.

Area Distr. Europa, Amer. bor.

~~Obl. edax Bres. Gén. Fl. mycol.~~ Forse da separare da Bol. erythropus.
Obl. Lec. Quél. Fl. Mycol. p. 422 il sinonimo più antico di questa specie sarebbe
Bol. tuberosus Bull. Champ. Fr. t. 100 (1782) e sarebbero pure suoi sinonimi: Bol. marmoreus
Roq., Bol. sanguineus Krombh. e Bol. lupinus Fr.

Satanas 34

Pileo pulvinato, glabro, subviscoso, e
fuscescenti – alutaceo albicante, saepe 22,5 cm. usque
lato;
stipite obeso, ovato-ventricoso, superne
sanguineo-reticulato, 5-8 cm. longo;
tubulis liberis, luteis, poris minutis,
primitus sanguineo-coccineis;

sporis laete brunneis, ovatis, vel
fusoideis 12-13 = 5-7 vel 16 = 5-8.

– Speciosus, robustus, mitis, haud
amaricans, sed maxime venenatus.
Caro albida, fracta rubescens vel
violascens; pori vetusti aurantiaci.

Oss. Il 12 Sett. il Bresadola raccolse a Sofromonte una forma:
"poris sanguineis et stipite sanguineo-reticulatis et maculato; carne
tam stipitis quam pilei albida, flaccidula, fracta caerulea sed mox albida
iterum reddita; tubulis flavis; fracti olivascis; sporis (specimen juvenile!) una
alterave vice 11-13 = 5-6 (in alio exemplari evoluto recto Margone 11-15 = 5-6,5
basidiis 40-45 = 10-12) A Boleto lupino videtur specifice distinctus."

Species dubiae (1844)

74 Boletus amarus Vitt. in Cattaneo, Notiz. nat. e civ. sulla Lombardia, p. 343
Magnus; pileo pulvinato, subtomentoso, sicco, e fuligineo cinerescente; tubulis subadnatis aequalibus, minutis, rotundis, e citrino ochraceo-virescentibus; stipite valido, orato-bulboso, cuteo, innate reticulato — Caro intus compacta, citrina, fracta caerulescens, demum mollis, ex albizans; sapor amarus

Bibl. 342, 1965
Hab. in silvis quercinis — Lombardia (Vittadini) Autumno

75 Boletus salsus Vitt. l. c. p. 343.
minor; Bibl. 342, 1965
Pileo pulvinato glabro, viscoso, irregulato-punctato, granulato; stipite tenui, longo, subaequali, subtorulato, basi albomarginato, luteolo; tubulis adnatis, majusculis, simplicibus, rotundis, minutis — Caro compacta ex albido rosea, circa pileo epidermidem rubens; sapor immutabilis salsus

Hab in silvis — Lombardia (Vittadini)

~~Bibl. 342, 1965~~

Vedi Tuscia (1844)

76 Boletus mollis Vitt. l.c. p. 344.

Vitt. 342 1965

media; pileo pulvinato, tomentoso e luteo fusco-umbrino; stipite subaequali leve, sulphureo; tubulis adnatis, minutis, rotundis e luteo-virescentibus — Pileo juvene toto luteo, tactu fuscescens; tubulis circa stipitem radiantibus dein antice, cameratum ad instar; caro mollis lutea, pacta sordide cyanescens, demum nigrescens.

Hab. in silvis — Lombardiae, (Vittadini). frequens Autumno.

77 Boletus ideropus Vitt. l.c. p. 343

Vitt. 342 1965

Major; pileo pulvinato, glabro subluteo; ex ochraceo rufescente; stipite crasso, firmo subaequali, minute, sed profunde reticulato, luteo; tubulis subadnatis, minutis rotundis e luteo ochraceo-virentibus — Pileo epidermi, demum adpluribus in areolas minutas divisa; stipes juvene ovato-bulbosus; caro compacta ex albo flavescens, rupta cyanescens, circa stipitis basim rubescens, demum tota nigreo-pallens; odor et sapor gratus.

Hab. in silvis quercinis — Lombardiae (Vittadini) Autumno

78 Boletus sulphureo-cinnamomeus Zantedesch. Descr. Fungh. Bresc. in Giorn. fis. Brugnatelli, 1821, p. 439.

Fl. H. 1284

Pileo convexo, umbone cinnamomeo, margine citrino; tubulis adnatis, mascinis, hexagonis, carnegue luteis; stipite cylindrico glabro cinnamomeo-citrino.

Hab. in silvis montanis - Lombardiæ: Val Trompia, prov. di Brescia, ~~frequente~~ in Eduliis

79 Boletus tomentosus Radd.; Spec. nove di Funghi Brasiliani in Atti soc. ital. di Modena 1808, p. 352 t. V f. 1

Fl. H. 998.

Pileo applanato, tomentoso, castaneo; tubulis minutissimis, rotundis, primo albis, dein sulphureis; stipite petuloso, fragili, basi incrassato, tomentoso pileo concolore; carne candida.

Hab. in silvis - Toscana: Firenze in viridario Bobolì

Obs. Ricorda nelle figure il Boletus edulis.

80 Boletus ochraceus Cumino, Fung. Valles Pisii, p. 19 (1805)

Rab. 998, 430.

Pileo convexo, rugoso, lacunoso, lubrico; tubulis minimis concoloribus; stipite crasso brevi + Vetustate caerules-cit.

Hab. in argillosis — Piemonte: Valle di Pesio (Cumino)

Ob. Si detta affine a Bol. cyanescens ma è sempre giallo e non subfulvigineo.

~~Boletus plumbeus Cumino~~

~~Rabh 998 c 430~~

81 Boletus bicolor Radd. N. sp. Fungh. Etr. in Atti Soc. Ital. di Modena, 1808
p. 352, t. IV f 4.
Bbl. 998.

Pileo subconico, levi, cinereo-carneo; tubulis exiguis, angulatis, flavis;
stipite pileo concolore, levi, ~~sed apice~~ ~~tenui bulboso-globoso~~ sursum ovato-incrassato sed
sub pileo coarctato.

Hab. in silvaticis — Toscana: Villa reale di Pratolino. Octobr.
Obs. Dalle figure apparisce una forma molto singolare.

~~Boletus~~ radicans!

~~Bolt. (Agaricus) big~~

82 Boletus rubeR Radd. Sp. nuov. Fungh. Fr. in Atti Soc. ital. Modena, 1808
p. 353, t. V f. 5, non Lam.
Bibl. 998, 393,
Pileo convexo-hemisphaerico, rubro; tubulis minutissimis, angulatis,
et subconcoloribus, sed pallidioribus; stipite cylindraceo gracili, elongato,
sursum albo, deorsum rubro
Hab. in silvaticis ~~Piemonte~~ ~~Lombardia~~, Toscana; vicinanze della Romola (Radd.)

83 Boletus rubro-punctatus Radd. Sp. nuov. Fungh. Fr. in Atti Soc. it. Modena 1808,
p. 352 t. V f. 3
Bibl. 998.
Totus albus; pileo convexo et subglutinoso; tubulis brevibus subrotundis;
stipite brevissimo punctis rubro-sanguineis adspersis;
Hab. in silvaticis — Toscana: alla Romola, Septembre.
Obs. Nella figura non apparisce bianco ma cinereo-pallido. Rompendolo
esce, sec. il Radd., un umore sieroso un pò denso.

~~Boletus subtomentosus Cymnos Fung. Vallis Pisii, p. 24 (1805) ined. auct.~~

~~Nro 61. 5/11 430~~
~~Boletus pseudoscaber~~

84 Boletus maculatus Raddi, Nuove sp. Funghi Fir. in Atti Soc. Ital. Modena, 1808
Tomo. p. 352 t V/2

Bol. 998

Pileo hemisphaerico rubro, striis longitudinalibus atro-rubris lineato; tubulis minutis, brevibus, subangulatis, sulphureis; stipite praelongo, carnoso, basi subbivaginato, pallide castaneo, maculis obscurioribus signato; carne alba, durisscula

Hab. in silvaticis — Toscana: Monte Senario, martio.

Obs. E' protabilmente il Bol. vafus.

85 Boletus pustulus Raspail, Caract. di alcuni nuovi generi e specie di animali e piante di Sicilia. Palermo, Lamplugge, 1810, Strobl, Flora der Hab. in silvis humidioribus regionis Aetnaeae — Sicilia: in Etna p. 323

~~Obs. Mi è ignota la figura di questa specie, che comunque rimarrà probabilmente dubbia, attesa~~

Obs. Non potei procurarmi la figura di questa specie, che verosimilmente rimarrà sempre dubbia

2

Sobolewyce

41/0003-3-1

(1870),

Strobilomyces Berk. Outl. p. 236 ; Sacc. Syll. Fung. VI pg. 49

(Etym. strobilos et myces ob pileum strobilaceo-squamosum).

Hymenophorum leve. Tubuli ab eo aegre separabiles, ampli, aequales. Pileus stipesque eximie squamoso-squarrosi, carnoso-tenaces. Sporae maiusculae, typice saturate coloratae et saepe torrenulosae; basidia et cystidia normalia

Conspectus synopticus specierum

A — Pileus nigrescenti-umbrinus, squamis floccosis imbricatus
S. strobilaceus

B. Pileus cinereus demum nigrescens, tomento areolato-fasciculatos, squamoso-squarrosus — — — S. floccopus

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. Outl. p. 236 (1860)

Syn. Syll. fung. VI p. 707 (49), Boletus strobilaceus Scop. Ann. Hist. nat. II p. 148, t. I f. 1. (1770)

Icon. Scop. l. c., Gill. Champ. Fr. t. 425, Kromb. Schw. t. 4 f. 31-34 et t. 74, f. 12-13, Pat. Tab. anal. fig. 675, Pers. M. E. II t. 19, Venturi Mic. Brex. t. 43 f. 1-2, Rostk. u. Sturm. Deut. Fl. III Pilze t. 38

Bibl. 209, 244, 245, 395, 662, 1219 (430) (501)

Hab. in silvis tam frondosis quam acerosis, rarius - Piemonte, Lombardia, Veneto, C. Ticino, Toscana - Aestate - Autumno. Suspectus Trentino: bosco d. Magras (Bres. MS.)

Area dist. Europa, Amer. bor. Japonia.

Nigrescenti-umbrini;
pileo fulvinato, squamis crassis
floccosis imbricato, 5-12 cm. lato;
stipite aequali, velato, apice sulcato,
8-16 cm. longo;
tubulis porrecto-adnatis, poris
amplis, angulatis, albido-fuscis;
sporis subglobosis, fusco-brunneis,
asperulis 13=9-10 vel 10 μ
diam.; basidiis 40-60=10-12;
cystidiis 60-70=8-12 (Bres. Mf.)
— Habitus Hydni imbricati; caro
fracta nigrescens vel rubescens.

Obs. Voss (in Verhandl. d. zool.
bot. Gesell. Wien 1885) distingue
dalle figure degli autori il Bol. strobilaceus
Scop. dal Bol. strobiliformis Vill.
ma le differenze dipendono più dalla mano
de' pittori che dalla stessa natura.

2 Strobilomyces floccopus (Vahl) Sacc. Syll. Fung VI p. 50 (1888), Boletus floccopus Vahl in Fl. Dan. fasc. 21 (1799) t 1252, ~~Bol. strobiliformis~~ Cumino Icon. Vahl l. c., Chev. Fl. Paris. t. VI f. 10, Rostk. in Sturm Deutl. Kr. Fl. III t. 39.

Bibl. ~~434~~, 1133, 1301, ~~2444~~

Hab. in silvis umbrosis — Piemonte, Toscana, Napoletano, rarius. Suspectus Aut. (Tassi)

Area Distr. Europa (: Valli Valdesi (Fauyod) Lawrenzano al Matese (Padivino)

Obs. Il Bol. strobiliformis Dicks. ~~in~~ Cumino F. Vall. Pisii è certamente ~~il~~ lo Strob. floccopus (Vahl) Karst. non il floccopus, come vorrebbe il Fries, E' da notarsi che il Quél. Fl. myc. p. 427 identifica le due specie, le quali però sec. le fig. di Rostk. sembrano molto distinte.

Floccosus 50

Cinereus, demum nigrescens;
pileo pulvinato, molli, tomento
areolato-fasciculato, squamoso-squar=
roso obvoluto, velo bombycino
crasso, annulari appendiculato, 10-12
cm. lato;
stipite valido, inferne umbrino—
tomentoso, sursum lacunoso,
10-12 cm. longo, 2,5 cm. crasso;
tubuli postice abbreviati, pori
magni albo-grisei;
sporis perfecte globosis, fusci,
9 µ diam., brevissime stipitati.
— Valde spectabilis, priore firmior
et amplior, sed manifeste affinis,
stipite nunc curto, nunc elongato.

3

Boletins

1

41/0003-6-1

(Sacc. Syll. Fung. VI pg. 51

Boletinus Kalchbr. Ic. Hym. Hung. p. 52 (1877) (Etym. dimin. a Boletus)

Hymenophorum non leve (ut in Boletis) sed in mucrones porrectum, tramae instar inter tubulos descendens. Tubuli aegre ab hymenophoro et a se invicem secedentes. Stipes annulatus, cavus. Sporae flavicantes &

Obs. Per il carattere notato costituisce un genere (particolare pero non ha tutto l'aspetto di Boletus

& i basidi & cysti dà normali.

Kalchbr. l.c. Boletus cavipes Opat.)

Boletinus cavipes (Opat.) (Comm. Bolet. p. 11 (1836)

Sacc. Syll. Fung. VI p. 54 (ex ell. typ. clavipes)

Icon. Kalchbr. Ic. Hym. Hung. t. 31. Gill. Champ. Fr. t. 468. Hard. Mushr. pg. 314.

Hab. in silvis — Trentino: Val di Sole, frequentissimo (Bres. MS.) Varena (Mass.) estate (1)

alpe mantova (Maire in alp. Austone (Mattirolo))

Trentino: Val di Sole, frequentissimo (Bres. MS.) Varena (Mass.)

1) Bibl. Bresadola MS, Mass. in Bull. S. B. I. 1912, Maire, in Bull. S. B. Fr. 1910

2) Bibl. Bresadola MS, Mass. n. 411, 418

Var. pallidior Bres. MS. (II)

Hab. in silvis — Trentino: Terzolas, Lega di Bolentina (Bres. MS.), Varena (Mass.)

Var. aureus Rolland in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1888) t. 21, Syll. Sacc. IX p. 159

Pileo aureo vellere obsito, margine fragmentis veli appendiculato; stipite infra anulum aureo-tomentoso, mox cavo; sporis oblongis flavis, guttulatis, 10 μ longis.

Bibl 245

Hab. in silvis montanis — ~~Toscana~~ Piemonte: Valsesia (Carestia)

(I) (clavipes): Pileo convexo, umbonato, → saepe obtuso, sicco sordide luteo, floccis innatis squamuloso, 6-8 cm. lato, stipite tenui, cavo, infra annulum floccoso, tubulis decurrentibus, poris majusculis, compositis, lutescentibus; sporis ellipsoideo-oblongis, flavidis, 10 μ longis, vel 8-10 = 3-3,5 [illegible]

— Est inter nobilissimos Boletos; hymenium flavum dein virescens.

(var. pallidior) (II) Differt a typo colore flavo-ochraceo, nunquam fulvo; stipite supra anulum flavo-reticulato; poris non olivaceis et plerumque majore gracilitate. Caro pilei flavo-pallida, stipitis albida, fracta subrosea; sporis ut in typo; basidiis clavatis 30 = 6; cystidiis fusoideo-ampullaceis. 70-90 = 10-15

4

Gyrodon

41/0003-5-1

Gyrodon Opatowski in Wiegm. Arch. f. Naturg. I pg. 5 (1856), Fr. Hym. p. 518 (subgen.), Sacc. Syll. Fung. VI pg. 51. (Etym. ~~gyros~~ γύρος et ὀδούς, dontos ob porostam ~~pileat~~ gyratos.)

Pori simoti vel gyroso-plicati; tubuli brevissimi (1-2 mm. longi) ab hymenophoro levi aegre secedentes. Sporae flavidae vel rubiginosae. Basidia normalia.

Conspectus synopticus specierum -

A_1 - Pileus flavo-albus vel eburneus vel citrinus, viscosus
B_1 - Stipes subbulbosus, rubro-ferrugineo-maculatus 1-G. placidus
B_2 Stipes deorsum attenuatus fusco-maculatus 2-G. fusipes

A_2 - Pileus ~~pallidus~~ e fuligineo-lividus lutescens vel ruso-brunneus
~~B_1 Stipes rufescenti-pallidus, pro luteo-fulvi 3 G.~~
B_1 - Stipes fuscescenti-luteus, tubuli e luteo virescentes 3-G. lividus
B_2 Stipes rufescenti-pallidus ~~pro~~ tubuli luteo-fulvi 4 G. tistotrema

Gyrodon placidus (Bonord.) Sacc. Syll. Fung. VI p. 51 (1888), Boletus placidus
Bonord. Bot. Zeit. 1851 p. 204
Icon. Nulla.
Bibl. Bresadola MS.
Hab. in silvis ubique frequens, hinc inde, copiose Aug. (Bres. MS.)
Area distr. Europa

Oss. Sec. Bresadola MS. non videtur distincta da Gyr. fusipes e Gyr. Rodmanii
Anche il Gyr. Boudieri sec. Bres. non sarebbe che una forma meridionale della presente specie

placidus 57

Pileo convexo explanato, glabro, viscido, flavo-albo, margine primo involuto, dein exserto acuto, carne candida, forma variante, saepe tubulis decurrentibus obconica ~~obconica~~, sed typice explanata, 8-11 cm. lato;

stipite obeso, subbulboso, albo, rubro-ferrugineo-maculato et striato; tubulis curtis, inaequalibus, unde oriuntur sinus, plures includentes, decurrentibus, flavis; poris sinuosis, demum e rubro ferrugineoscentibus;

sporis ovalis, minutis ~~fere Bres.~~ fusco-rubris, 8-9 = 3, fulvis.

(1) La specie ~~sembra~~ bene distinta. Le spore secondo Bon. sono fosco-rotte, ma verosimilmente è un errore di osservazione perchè questo colore è dei tubuli invecchiati. Secondo Bresadola (MS.) le spore sono come in Bol. Boudieri che forse non è che una forma australe di questa specie

2 Gyrodon fusipes (Berk.) Sacc. Syll. Fung. VI p. 512. (1888) Boletus fusipes Berk. in Rabenh. Exs. n. 712, Fr. Hymen. Eur. p. 500 (1874)
Icon. Gill. et Luc. Champ. sup. t. VI f. 4 pr. Lucand Champ. Fr. t. 274, Bond. Icon. mycol. I.

Bibl. 434

Hab. in silvaticis australioribus — Neapolitano: nelle selve d: Materdei (Ridola) Oct.

Area distr. Europa austr.

Exs. Rabenh. l. c.

fusipes 52

Pileo pulvinato, eburneo, tandem ci-
trino, glutine pallescente oblinito,
2,5 cm. lato;
stipite deorsum attenuato, elon-
gato, sirino, albo, fusco-maculato;
tubulis decurrentibus, inaequalibus,
guttatis; sporis subcylindraceis,
10 µ longis; carne tam pilei
quam stipitis alba.

Karsten e Bresadola

H. Lundb ~~Karsten~~ / ~~Hedw.~~
~~1876 p. 122~~ la specie
non è diversa da Gyr: plaidus
sufficientemente

3

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. Sylt. Fung. VI p. 52 (1888)

Boletus lividus Bull. Champ. Fr. t. 490 f. 2 (1790)

Syn. Bull. l. c., Gill. Champ. Fr. t. 418, Rostk. u. Sturm. Deutschl. Fl. III t. 18

Bibl. 340, 430, 886, 1920, 1933.

Hab. ad ulnos, praesertim alnetis — Piemonte, Lombardia, Emilia. Toscana.


(Trentino: boschi sopra Cavriato, sotto Sfruntars. (Bres. MS.)

lividus 52

Pileo e convexo explanato, e sericeo glabro, figrino, e fuligineo-livido lutescente; stipite stipita levi, aequali, fuscescente-luteo, 5 cm. longo; tubulis brevissimis, longe decurrentibus, hymenophoro adnatis, poris irregularibus, e luteo virescentibus; sporis ovatis, 1-guttulatis, flavis 7-8 = 6, vel (Bres. M.S.) 6-8 = 3-5; basidiis 25-30 = 5-7

Obs. Le figure e le descrizioni differiscono non poco, ma si accordano nei tubuli brevissimi, adnati all'imeno-foro, lungamente decorrenti, giallo-virescenti.

Gyrodon sistotrema (Fr.) San. Syll. Fung. VI p. 53
Boletus sistotrema Fr. Obs. mycol. I p. 120 (1815)
Ivon. Rostk. in Sturm Deut. Pilz. III fasc 21, t 11, Quél. Champ. Jura
I t. 15 f. 2 (var.)
Bibl. 342, 1965
Hab. in silvis montanis Lombardiae (Casati).
Area distr. Europa.



5–8 cm. lato, semper siccо (non udo),

Pileo tenui, utrinque applanato, glabrato, ~~vix~~, rufo-brunneo; stipite tenui, aequali, levi, rufescenti-pallido, 5–12 cm. longo; tubulis adnatis, brevissimis, inaequalibus, luteo-fulvis, vix 2,5 mm. longis, poris demum irregularibus, gyroso-plicatis; sporis elongatis 10–15 μ longis.

Sed ab hymenio strato succedente demum in formam Mucilii mutato,

variante flavescente,

5

41/0003 - 6 - 1

Fistulina Bull. Champ. I pg. 314 (1791)
Fr. Hym. Eur. p. 522; Sacc. Syll.
Fung. VI pg. 54. / Etym. fistula
ob. tubulos / Buglossus Wahlenb.
Hypodrys Pers. Myc. Eur.

Hymenium inferum, primitus verrucosum
dein tubulos protrudens cylindricos, inter
se liberos et discretos 1 — Fungi subcar-
nosi, epixyli, inter Polyporaceas et
Hydnaceas medii.
Oss. Cfr. l'egregia dissertazione del
ch. de Seynes Recto. Veg. inf. I,
les Fistulines, Paris 1874.

1 Basidia normalia 4-sterigmica, sporae minutae subglobosae, flavidae.

Succoso - carnosa, arrhiza; pileo integro, sanguineo, 20 mm. usque lato; tubulis primum pallidis; sporis ovato-globosis, subinaequilateralibus, uniguttulatis, dilute roseo-flavis, 5-6 = 3-4; basidiis 25-30 = 7-10 (Bres. Mf.)

- Versiformis, sessilis vel in stipitem lateralem productus, excentricus; caro crassa, mollis, superne rufescida, fibris tenacibus percursa, unde rubro-variegata. Status gasterosporus: Ceriomyces hepaticus. (Cfr. de Seyn. l.c. Arcang. in Giorn. bot. it. 1878, Sacc. Mich. I pg. 362). Conceptacula tubulis prorsus carentibus, e globoso ovoideis, extus rufescentibus, papillato-asperulis, intus purpurascentibus, radiatim loculatis; loculis elongatis saturatioribus, hyphis sporisque farctis; sporis (gasterosporis) ad apicem hyphorum ramulosarum racemose aggregatis, ovoideis vel suboblongis, 6-10 = 5, rarissime sub-uni-septatis, granulosis, hyalinis. Nascitur ubique cum statu perfecto.

Fistulina hepatica (Schäff.) Hudd. Fr. S. M. I. p. 396 (1821) ▽ Schäff. Ic. fung IV p. 82 (1774)
Sacc. Sylt. fung VI p. 54. Boletus hepaticus ▽ Hudd. Fl. Angl. II ed. p. 625 (1778)
Icon. Arcangeli in N. Giorn. bot. ital. X (1878) t. 11, Barla, Champ. Nice t. 30 f. 4-7,
Batt. Champ. Fr. t. 74, 464, 479 Lang. F. d. Roma, t. 92 f. 1, Mich. N. gen. t. 60,
Schäff. Ic. fung. t. 116-120, Vent. Mic. Brem. t. 36 f. 1-2, Vivian. F. d'Italia t. 53.
Bibl. 25, 61, 65, 5, 90, 101, 123, 209, 65, 342, 357, 417, 418, 474, 564, 568, 585, 639,
653, 656, 700, 725, 749, 757, 848, 866, 923, 983, 1015, 1030, 1091, 1178, 1219, 1228,
1232, 212, 862, 1284, 529, 631, 1514, 1595, 1502, 1549, 1581
Hab. ad truncos praesertim Quercus, Castaneae, Fagi in Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica
(Valle Lagorina (Cob.), Mte. Cornazza, Monetastico, Magra (Mor. MS.)
Area Distr. Europa, Ind. or., Australia, Amer. bor.
Aestate Autumno.
Edulis

6

Polysorus

41/0003 -7-1

(Polyporei) (1)

Conspectus synopticus sectionum, ~~subsectionum~~ et specierum

A, - Fungi stipitati.
B, - Fungi simplices, nec caespitosi, nec ramosi
C, - Stipes totus vel basi nigricans, cacenticus vel lateralis; fi= brus carnoso-lentus - - - - - - - - - - - - Sect. I Melanopodes
D, - Pileus squamosus floccosusve
E, - Pileus gilvus; pori aurantiaci - - - - - - - - 1 P. floccopus
E, - Pileus flavescens; pori albi vel pallidi.
F, - Pileus subtiliter floccuLosus, ex albo lutescens ~~fuscus~~ fuscus - - - - - - - - 2 P. melanopus
F, - Pileus squamosus, lutescens vel ochraceus
G, - Stipes ubique nigricans - - - - - - 3 P. pallidus
G, - Stipes basi tantum nigricans vel fusce= scens.
H, - Pori laceri, angulati, pallidi 4 P. squamosus
H, - Pori integri, rotundi, albi 5 P. Michelii
D, - Pileus glaber
E, - Stipes totus ater
F, - Pori pentagoni; stipes basi incrassatus - - 6 P. Rostkowii
F, - Pori rotundi; stipes aequalis - - - - - 7 P. picipes
E, - Stipes deorsum tantum nigrescens.
F, - Pileus virgatus, vulgo badius - - - - 8 P. calceolus
F, - Pileus haud virgatus, ochraceus vel aurantius
G, - Pileus 5-12 cm. latus, angulatus - - 9 P. elegans
G, - Pileus 2,5 cm. latus, subregularis - - 10 P. nummularius.
B, - ~~Fungus~~ Fungus non omnes has notas simul praebens.
D, - Pileus spongioso-mollis, dein suberosus vel coriaceus tomentosus vel velutinus. - - - - - - Sect. II Spongiosi
E, - Totus fungus sordide albus; pori mundi - - 11 P. lasiomitus
E, - Pileus, saltem ~~in~~ aetate, et stipes colorati.
F, - Fungus carneus - - - - - - - - 12 P. rufescens
F, - Color fungi diversus
G, - Pori sulphureo-virescentes - - 13 P. sistotremoides
G, - Pori non virescentes
H, - Stipes curtus, ferrugineo-la= natus; pori albo-cinerei - - 14 P. biennis
H, - Stipes 5-12 cm. longus; pori ex albo carnei 15 P. sericellus
D, - Pileus nec spongiosus, nec suberosus.
E, - Fungi efixyli, e carnoso lenti, coriacei induratus - - - - - - - - - - Sect. III Lenti
F, - Fungus totus albus, disco fulvi subluc= escente - - - - - - - - - - - 16 P. corylinus
F, - Fungus coloratus
G, - Stipes squamosus
H, - Pori integri, nec fimbriati - - 17 P. arcularius
H, - Pori denticulati vel fimbriati
I, - Pileus subglabrus, villo= sus vel glabratus - - 18 P. brumalis
I, - Pileus ochraceo-flavus, sericeo-striatus - - - 19 P. vernalis

G_2 - Stipes glaber
H_1 - Margo pileli ciliatus — — — — 20 P. ciliatus
H_2 Pileus non ciliatus
I_1 — Caro alba; pileus e pallescente cervinus — — — 21 P. leptocephalus
I_2 — Caro albo-lutescens; pileus fusco-lutescens — — — — 22 P. substrictus
E_2 - Fungi terrestres, carnosi, neque coriacei (~~ex~~ excepto P. fuligineo) — — — — Sect IV Ovini
F_1 - Pileus glaber, levis.
G_1 - Pileus coriaceus, subfuligineus 23 P. fuligineus
G_2 - Pileus non coriaceus nec fuligineus
H_1 Pileus virescens — — — 24 P. virellus
H_2 Pileus subluteoreticus — — 25 P. politus
F_2 - Pileus ~~scabr~~ granulatus, vel squamosus
G_1 - Pileus granulatus, niger — — 26 P. asperellus
G_2 Pileus squamulosus
H_1 — Pileus nigrescens
I_1 — Stipes pileo concolor 27 P. leucomelas
I_2 — Stipes luteo-albus — 28 P. scobinaceus
H_2 - Pileus vaccino coloratus
I_1 - Pileus flavescens — 29 P. tuberaster
I_2 - Pileus albidus
L_1 - Pileus tenax, 10-20 cm. latus; pori albi, inaequales 30 P. subsquamosus
L_2 - Pileus fragilis, 6-8 cm. latus; pori ex albo citrini aequales — — — 31 P. ovinus
B_2 - Fungi caespitoso-multiplices vel ramosi
E_1 - Fungi ramosi, carnosi, nec coriaceo-indurati Sect. V Frondosi
D_1 - Pili sulcati.
E_1 - Pori alveolares, dein sinuati — — — — 32 P. montanus
E_2 - Pori minuti, non sinuati — — 33 P. Barrelieri
D_2 - Pili non sulcati
E_1 - Pileoli virescentes — — — 34 P. flabelliformis
E_2 - Pileoli nunquam virescentes
F_1 Pileoli integri — — — 35 P. umbellatus
F_2 - Pileoli dimidiati
G_1 - Pileoli carneo-lutescentes 36 P. confluens
G_2 — Pileoli fuscescentes
H_1 - Pori albi; fungus tenacellus 37 P. frondosus
H_2 - Pori albi fuscescentes, fungus subfragilis — — 38 P. intybaceus
E_2 - Fungi caespitosi, vel imbricato-multiplices, e carneo coriacei — — — — Sect. VI Lobati
D_1 - Fungi albi
E_1 — Pili leves, glabri — — — 39 P. osseus
E_2 - Pili candido-tomentosi — — — 40 P. candidus
D_2 - Fungi colorati
E_1 — Pori ochroleuci vel ex albo rufescentes

F_1 – Pileo luteo, stipite fuligineo — 41 P. lobatus
F_2 – Pileo ferrugineascente; stipite ex albo rufescente — 42 P. acanthoides
E_2 – Pori albidi vel pallidi
F_1 – Pileo rubro-laterititi, demum pyxidati 43 P. Oakae
F_2 – Pileo spadiceo, dimidiato — 44 P. gigantens

A_2 – Fungi sessiles
B_1 – Concentrice sulcati, vel striati, substantia quidem molli et succosa, tamen simul coriacea — Sect. VII Lignescentes
C_1 – Pilei villosi; vix marginem tantum sulcati — 45 P. sabignus
C_2 – Pilei glabri, undique sulcati — 46 P. imberbis
B_2 – Non concentrice sulcati (1) vel cum substantia diversa
C_1 – Fungi crusta tenuiore tecti — Sect. VIII – Suberosi
D_1 – Caro colorata
E_1 – Cutis scrupeso-levigata, glabra — 47 P. pseudoigonia
E_2 – cuticula floccoso-pruinata vel rugosa, hispida
F_1 – Pori pallidi, cuticula resinacea — 48 P. resinosus
F_2 – Pori ferrugineo-umbrini — 49 P. fuligineotus
D_2 – Caro alba
E_1 – Pilei floccosi vel tomentosi
F_1 – Caespitosus; pilei albi, sonio fuscidulo-avellanei 50 P. Marianii
F_2 – Simplex; pileus alutaceo-pallidus — 51 P. quercinus
E_2 – Pilei glabri
F_1 – Pileus ex albo flavidus; pori ligneo-pallidi — 52 P. venetus
F_2 – Pileus e lutescente albus vel griseo-fulvus
G_1 – Pileus azonus, pellicula tenuis — 53 P. betulinus
G_2 – Pileus zonatus, pellicula dura — 54 P. Laricis
C_2 Fungi epelliculosi, anodermei.
D_1 – Carnosi, primo molles, fragiles
E_1 – Caespitoso-multiplices, fungi lignatiles, acidi — Sect IX Imbricati
F_1 – Pori albi; pilei alutaceo-isabellini — 55 P. alligatus
F_2 – Pori colorati
G_1 – Pori sulphurei; pilei rubello-lutei 56 P. caudicinus
G_2 – Pori non sulphurei; pilei fulventi-opaci 57 P. imbricatus
E_2 – Simplices, adulti molles vel indurati, non persistentes — Sect. X Molles
F_1 – Pileus tomentosus
G_1 – Pori flexuosi, laceri — 58 P. lacteus
G_2 – Pori rotundi, integri — 59 P. fespbrolencus
F_2 – Pileus glaber vel sericeus
G_1 – Pileus lutescens vel flavo-rubellus
H_1 – Pori albi dein lutescentes — 60 P. pallescens
H_2 – Pori sulphurei — 61 P. Ceratoniae
G_2 – Pileus albidus
H_1 – Pori flexuosi
I_1 – Pileus tenax, caesio-tinctus, pori caerulei — 62 P. caesius
I_2 – Pileus fragilis et pori albidi 63 P. fragilis

. . . . . H_2 - Pori non flexuosi
I_1 - Pileus fuscescens, intus zonatus - 64 P. destructor
I_2 - Pileus fallidus, azonus - - - 65 P. trabeus
D_2 - Elastici, firmi, ~~fib~~ intus fibrosi
E_1 - Carnosi - lenti, villoso-tomentosi, pori subadnati Sect. XI Dichroi
F_1 - Contextus coloratus (Inonotus Pat.)
G_1 - Pileus lutescens, pori crocei - - - 66 P. croceus
G_2 - Pileus gilvus vel fulvescens
H_1 - Pileus carnosus, mollissimus; pori fulvo-testacei - - - - 67 P. suberosus
H_2 - Pileus carnoso-lentus, pori non fulventes
I_1 - Pileus e fulvo-cinnamomeus, ex-pallens, pori nitidi - - - 68 P. rutilans
I_2 - Pileus gilvus, pori opaci, ferruginei 69 P. gilvus
F_2 - Contextus albus
G_1 - Pori aurei, pileus candidus - - - - 70 P. amorphus
G_2 - Pori aliter colorati
H_1 - Pileus albus
I_1 - Pori fusco-cinnamomei - - 71 P. dichrous
I_2 - Pori ex albo rufescentes 72 P. albus
H_2 - Pileus fuscescens
I_1 - Pori demum flexuosi, maiusculi 73 P. crispus
I_2 - Pori rotundi, minuti - - - -
L_1 - Pileus spurie zonatus, postice effuso-reflexus, villosus 74 P. adustus
L_2 - Pileus azonus, postice dilatato-adnatus, glabrescens - 75 P. fumosus
E_2 - Primo spongioso-aquosi, dein firmi, setoso-hispidi; pori cum poris carnis modo contigui - - - - Sect. XII Hirsuti
F_1 - Contextus albus (Spongipelles Pat.)
G_1 - Pileus brunneus - - - - - - 76 P. tirolensis
G_2 - Pileus albus vel ex albo lutescens
H_1 - Pori flexuosi, laceri - - - 77 P. borealis
H_2 - Pori rotundi
I_1 - Pileus compactus, pulvinatus, rugoso-hispidus - - - - 78 P. spumeus
I_2 - Pileus mollis, convexus, pubescens 79 P. pubescens
F_2 - Contextus ~~colora~~ ~~tus~~ coloratus
G_1 - Pileus ochraceus intuque aureus - - - - 80 P. coruscans
G_2 - Pileus aliter coloratus
H_1 - Margo fibroso-fimbriatus, incurvatus 81 P. cuticularis
H_2 Margo integer
I_1 - Pileus umbrino-fuscus; pori fallidi 82 P. Haussmanni
I_2 - Pileus ferrugineascens
L_1 - Pori cinnamomei - 9 } - 83 P. Tamaricis
L_2 - Pori e sulphureo vel lutescente fuscescentes
M_1 - Pori integri, pileo applanati - - - - 85 P. Spongia
M_2 - Pori fimbriati, pileus fulvinatus - - - - 86 P. hispidus

9 { Trama disolori zonata 87 Tamaricis
{ trama unicolori 86 rheades

Polyporus ~~Micheli Gen. p. 129 emend.~~ Fr. Nov. Symb. pg. 30; ~~Cooke Prace. p. 58~~; Sacc. Syll Fung. VI pg. 55. (Etym. polys multus, et poros porus.) Polyporus Mich. Nov. gen. p. 129 ( )

~~Hymenophorum inter poros in tramam descendens~~, Pileus carnoso-lentus, dein induratus (raro e caseoso-floccoso fragilis), extus absque sulcis et zonis, sed contextu fibroso-radiante, saepeque zonato; pori nunquam stratosi, ~~hinc cum~~ Hymenophorum inter poros in tramam descendens; pori hinc cum pilei contextu connati nec a se invicem separabiles, primitus obsoleti vel nulli dein rotundi, angulati laccrative. Basidia normali, 4-sterigmatica; cystidia nulla; sporae mycrutae, hyalinae, pariss. coloratae.

Seguiamo le divisioni dell'antico vastissimo genere Polyporus dallo stesso Fries nelle sue nei suoi Nov. Symb. proposte e accettate ~~da Cooke nel suo sistema~~ Tuttavia da molti micologi. Non ancora però si ha un metodo sicuro e chiaro per determinare le forme di questo difficilissimo genere. Quante volte infatti nel determinare un esemplare si è in dubbio non dico di quale specie si tratti, ma di qual genere, se di Polyporus o Trametes o Polystictus ecc! ~~Questo guardare quante specie sono di continuo trasportate da un genere all'altro. Quando, come già si disse più volte, si potrà conoscere di tutte le forme la struttura intima e specialmente quella carpologica, allora solo le determinazioni saranno come qui, così in ogni caso, certe e facili, di qui la necessità delle analisi microscopiche.~~

— Dal tipo di Polyporus si allontanano molte specie pei pori sinuosi, labirintiformi e sporologico, approfondendo il carattere morfologico, parecchi autori (Karsten, Patouillard, Schröter, Quélet, ~~Schröter~~, Ames etc.) suddistinsero in più generi i Polypores di Fries, ma è opportuno attendere la comparsa di una monografia generale epicritica per adottare le numerose forme italiane, le quali pure richiedono uno studio originale monografico.

forme e infrecciati p.e. P. salignus, P. lacteus, P. trabeus ecc. ecc. che differiscono come le Daedalea da Trametes. Facilmente si distinguono da Daedalea per la carne prima molle seccosa, pei pori sottili stretti, per i setti tenerelli, per la mancanza di trama discolore. In alcune poche specie è unita la forma conidifera Gastrosporo (Ceriomyces).

~~Questo, secondo Fries, dovrebbero distinguersi in genere tipo a sè sotto~~ il nome di Postia, ma ora però le note differenziali spesso troppo incerte o non abbastanza chiaramente indicate, dosicchè non è ~~possibile distinguere a dovere le specie di questo genere.~~

1 ed. I Melanopora sp. Fr

1 Polyporus floccopus Rostk. in Sturm Deutsch. Fl. Pilze f. 13. (Fasc. 22, p. 25) (1848) c/p

Hab. Syst. Myc. VI p. 64 (Polyp. brumalis)

Icon. Rostk. in Sturm l. c.

Bibl. Bresadola MS.

Hab. ad fragmenta lignea in fossa — Sardegna, Nizzardo / Barla in Bres. MS.

Area distr. Europa, Tunisia?

Δ (Melanopus Pat., Polyporellus Karst. pp. Ceriporus Quél. p. p.) ≠ Leucoporus

Obs. Secondo Bresad. MS. sono sinonimi di questa specie: il Favolus Boucheanus Kl. in Linnaea VIII (1833) p. 316, tab. V, il Polyporus antisporus Mont. (1845) e il Polyp. tubarius Quél. (1878)

f. hirsuta (Bign.) = Favol. Bouch. Syll. VI. 392

floccosus 64 U

Pileo carnoso - lento, plano, inaequali, levi, dein squamoso, gilvo, ~~squamis sui-rufando in fg~~

stipite excentrico, curto, tomentoso, deorsum fuscescente, subverticali, aequali

sporis lenoibus, demum alveolaribus, oblongo-hexagonis, dentatis, dilute aurantiacis;

sporis obovatis, 1-guttulatis, dein granulosis, hyalinis 8-10 = 4-5 vel 7-9 = 3-3,5; basidiis 22-26 = 5-6.

(Bref. MS.)

2 Polyporus melanopus (Pers.) Fr. S. M. I p. 349. (1794)
Sacc. Syll. fung. VI p. 81, Boletus melanopus Pers. Disp. meth. fung. p. 70
Icon. Persoon Ic. fung. t. IV f. 1 et 2, Rostk in Sturm Deutschl. Fl. Pilz. t. 4.
Bibl. 12, 397, 398, 418, 430, 434, 585, 737, 1031
Hab. ad radices et fragmenta lignea infossa — Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino ⊥ Napoletano
Area distr. Europa, Australia.
⊥: Valle Lagarina (Cob.), Terzolas, Alagna (Bres. MS.)

Melanopus 81

Pileo carnoso-lento, e plano infundibuliformi, ex albo lutescenti-fusco, primo subtiliter flocculoso, 5-8 cm. lato, demum et primo adpresse glabro, carne cassa, alba, molliore, nec lignescente; stipite excentrico, subvelutino, incurvo, deorsum incrassato, nigro, sursum attenuato et gracilliori, distincto, in pileum vero diffuso; ~~nudo~~ poris decurrentibus, curtis, minutis, obtusis, inaequalibus, albis; sporis oblongis, vitreis, 7-8 = 3-4 (Brés. M. S.)

Obs. Questo fungo manifestamente è descritto in Pers. Synopsis, ma nella figura sembra un altro, cioè P. picipes, molto diverso. Il P. flavescens Rostk. 28 t. 23 è una forma più robusta.

3 Polyporus pallidus Schulz. et Kalchbr. Icon. Hym. Hung. 6. t. 38 f. 2
Sacc. Syll. Fung. VI p. 81.
Icon. Kalchbr. l. c.
Bibl. Bresad. MS.
Hab. ad truncos arborum frondosarum Trentinos Gocciadoro, Majo (Bres. MS.)

Area distr. Slavonia, Italia, Amer. bor. et merid

Obs. Secondo il Bresadola MS. è molto affine al Polyp. squamosus, da cui differisce solo per lo stipite allungato. forse

pallidus 81

Pileo e carnoso ~~tenuis~~ lento, horizontali, planiusculo, excentrico, pallido, subflavido, cuticula in squamulas minutas obscuriores tecedente;

stipite verticali, inaequali, impolito, ubique nigricante, apice subscruposo, 5 cm. circiter longo, firmo;
poris decurrentibus, rhombeis, inaequalibus, demum dentato-lacceratis, albidis; sporis hyalinis, levibus, elongatis, 12-15 = 4,5-6; basidiis 40-50 = 7-9. (Pres. Mss.) — Pileus colore peculiaris, subflavidus.

Obs. Molta è l'analogia con P. picipes ma piuttosto è affine a P. squamosus.

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. S. M. I p. 363 (1821)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 79 Boletus squamosus Huds. Fl. Angl. ed. 626 ( )
Fries. Grev. Scot. Fl. t. 207, Rostk. u. Sturm Deut. Fl. Pilze t. 2, Bresad. F. Trid. t. 133 (fm. erectus) Gill. Champ. Fr. t. 456, Lang. F. d. Roma, t 29, Schäff. Z. Fung. t. 101-102, Venturi Mic. Bresc. t 37. Rbh. 61, 90, 122, 141, 143, 209, 234, 245, 263, 331, 362, 398, 417, 418, 430, 434, 585, 638, 653, 656, 690, 725, 748, 802, 836, 866, 983, 1219-1245-858, Sc. 28, 576, 1617, 1934, 1301 O
Hab. [ad truncos variosque] Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia [Vere Aestate] (: Valle Lagarina (Cob.), Nogaredo (Bres. MS.)
Area dstr. Europa, Amer. bor., India or. Australia
Exs. Myc. Ital. n. 211, Myc. Ven. n. 8, Cavara F. Longob. n. 66
~~vaccinus (Schulz.) Bres. MS.~~

Squamosus 79

~~Squamosus~~

Pileo carnoso-lento, flabelliformi, explanato, subobtraceo, squamis latis, adpressis, maculaeformibus, centrifugis, obscurioribus variegato, vulgo giganteo, ad 50 cm. usque lato, junione subcentrali et umbilicato, demum lateralis;
stipite excentrico, lateralique, obeso, apice reticulato, basi nigricante;

poris tenuibus, variis (primo minutis), dein amplis, angulatis, lacerisque, pallidis;

sporis ovoideis, hyalinis, latissimis, 12=5 cylindraceis vel potius amygdaliformibus et elongatis, 12-16 = 4,5-6; basidiis 40-45 = 7-9 (Bresad. M.S.).-
Speciosus, admodum varius.
~~vulgo giganteus, ad 50 cm. usque latus, junior subcentralis et umbilicatus, demum lateralis, admodum varius~~;

N.B. Per la sua variabilità vengono separate tre e anche più specie (cfr. Fers. Myc. Eur. Selsum. Secret.) che però non possono accettarsi coloro che osservano le decadi delle forme egualmente distinte.

9, vedute i passaggi.

5 Polyporus Micheli Fr. S. M. I p. 343 (1821)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 80 ≠
Icon Micheli Nov. pl. gen. t. 61, ord. III f. 2 (Agaricum esculentum candidum)
Rostk. in Sturm Deutschl. Pilze t. 1, Lanzi F. A Roma t. 25 f 2.
Bibl. 653, 656, 785, 700
candicans (Micheli)
Hab. ad truncos, imprimis salicinis — Toscana: pr. Firenze, Lazio, 2 Italia
Area distr. Europa

(nei colli boscosi presso Roma (Lanzi))

Micheliii 80

Pileo carnoso-lento, depresso, repando,
sericello, subsquamuloso, albo-lubescente,
5-8 cm. lato;
stipite subbasalti, brevi, bulboso,
scabro, albo, basi fuscescente, circiter
3-4 cm. longo; → primo minuti,
pori amplis, subrotundo-oblongis,
integris, albis; pori oblongo-elliptici,
10-6, albo-hyalini.

Obs. Affine anche a Pol. squamosus
ma per pori prima minuti, obtusi,
sempre interi e regolari ~~lo connettono~~
~~con questo gruppo~~. sta tra P. hirtus
e P. pallidus.

6 Polyporus Rostkovii Fr. Epicr. p. 439 (1838)
Sacc. Syll. fung. VI p. 82, Pol. infundibuliformis Rostk. in Sturm
Deut. Fl. Pilze, t 17, non Pers.
Jun. Rostk. l.c. Bischoff, Kryptog. f 3305, van Bambeke in
Bull. Soc. bot. Belg. 43 (1906) t. 1-2
Hab. ad truncos vetustos Castaneae pr. Montagnola, Canton Ticino
(Dott. F. Ferri), Trentino: Lopramonte, rarissimo (Bar.ssa Turco-Lazzari in
Brasad. MS) Oct.
Area Syst. Europa
Sept..
Bibl. Bresadola MS.

Rostkovii 82

Pileo carnoso-lento, dimidiato-infundibuliformi, glabro, levi, fumoso, 14 cm. lato, 25 cm. usque longo

Stipite 10-15 cm. longo, 2,5 cm. crasso, ~~longo~~, incurvo, excentrico, reticulato, definite nigro, basi incrassato ~~[illegible]~~ et subcaespitoso-connato;

Sporis in latere exteriore stipitis longe decurrentibus, amplis, pentagonis, acutis, dentatis, ex albo sordide lutescentibus; sporis hyalinis vel vitreis, oblongis, subamygdaliformibus, 1-2-guttulatis ~~sporis 12=5~~ 7-9=3,5-4 (vel 12=5?); basidiis 25-30=6-7; hyphis subhymenialibus 2-3 μ. (Bres. Mss.)

Obs. Per grandezza va coll' affine P. squamosus, ma il gambo in genere è più lungo; ~~e nell'esemplare Friesiano passa al gallicus~~.

Polyporus picipes Fr. S. M. I p. 353 (1821)
Sacc. Syll fung VI p. 83
Icon. Greville Crypt. Fl. IV t. 202 (P. varius), Pers. Icon pict. t. IV f 1-2
(Bol. melanopus a infundibuliformis) Fr., non Pers. Syn., Pat. Tab. anat. fig. 136
Lucand Suite t. 50.
Bibl. 209, 417, 418, 866, 754
Hab. ad truncos varios — Veneto, Trentino, Emilia. Magg-Aug.
(Brivia a Campo Trentino (Bres. MS.)
Valle Lagarina (Cob.), sui tronchi dei salici a Dì Ro)
Area Distr. Europa, Ceylon, Amer. bor. et centr. et merid. australe.

picipes 83

Pileo e carnoso coriaceo rigido, tenaci, levi, glabro, disco posticeve depresso, 10 cm. diam., (e pallido in castaneum rubigo abeunte, vulgo gilvo livido, disco castaneo, vulgo) emarginato, lobis circumscriptis, infundibuliformi; stipite excentrico lateralique, aequali, firmo, 2-3 cm. longo, primo velutino, dein nudo, punctato, atro usque ad poros decurrentes, rotundos, exiguos, tenellos, albos, dein gilvellos; sporis hyalinis, subamygdaliformibus, 1-2 guttulatis, 7-8 = 4½; basidiis 25-30-7-8 (Bres. N.S.) — Imbricatus, odore subdulci, carne alba.

8. Polyporus calceolus (Bull.) Chemn. Fr. t. 360, 445 f. 2. (1787)

Polyporus varius (Pers.) Fr.

Lasc. Syll. Fung. VI p. 84., Boletus varius Pers. Syn. p. 85 (1801)

Jen. Bull. l.c., Bttg. l.c., Jll. Champ. Fr. t. 455, Venturi Mic. Br. t. 57 f. Bull. 61, 65, 190, 209, 245, 426, 397, 417, 418, 530, 434, 585, 671, 803, 866, 1209. 631, 1605

Hab. ad truncos varios — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica.

Area Distr. Europa, Libia, Amer. bor. Australia.

T Brit. Hymen. t. 593 f. 9, t. 621 f. 111, t. 627 f. 125

calceolus 84
= varius

Pileo carnoso-lento, extenuato, mox lignescente,

glabro, subvirgato, difformi, disco postice ve
depresso, 1 ½-10 cm. lato;

stipite excentrico laterali que, levi, glabro,

deorsum sensim cinereo-nigricante, quando
adest, 2-5 cm. longo;
poris decurrentibus, minutis, curtis, rotundis,

inaequalibus, ex albido (intus que aquose)

cinnamomeis; ~~sporis ovoideo-ellipsoideis 7/5 lng.~~
v. 6-8=1,5-2 (Britz.)-
(In statura (major undulato-lobatus), forma
etc. nil constans; color vulgo badius
(exoleti fuligineus evidentius que virgatus),
sed ~~(conf. Bott. t. 168)~~ junior pallescens et adul-
tus intus que etiam flavescens legitur.
Variat sessilis (P. bicolor Wallr.?); etiam in cae-
spites amplissimos, difformes stipatus.

Polyporus elegans (Bull.) Fr. Epic. p. 440 (1838)
Sau. Syll. Fung. VI p. 85, Boletus elegans Bull. Champ. Fr. t 46 (1780)
Icon. Bull. l. c., Pat. Tab. anal. t. 137, Rostk in Sturm Fl. t. 11.
Fl. Dan. t. 1075 f 1.
Rbl. 245, 394, 398, 737, 886, 1031, 1965, 1301

Hab. ad truncos, imprimis tiliaceos et fagineos - Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia - Aestate.
Area Distr. Europa, Amer. bor., Cuba, Tasmania, Australia

(, Trentino: bosco d'Ingenga ecc (Bres. MS.)

Obs. Il Quel. Fl. mycol. p. 404 unisce questa specie al Pol. caleolus.

elegans 85

Pileo ex aequaliter carnoso mox inducto, vix depresso nec infundibuliformi, 5–12 cm. lato, lignescente, explanato, levi, glabro, angulato unicolore (pallide ochraceo vel aurantio, nitido, haud virgato); carne alba, in marginem usque cratta; stipite excentrico laterali, levi, glabro, pallido, bati primitus abrupte atra radicante; poris planis, minutis, subrotundis, albo-lutescentibus, pallidis; sporis hyalinis, oblongis, 7–10 = 3–3,5. (Bres. M. S.)

Junior ubique carnosus, albus (qualis in septentrione persistit &c. Sommerf. Lapp. p. 274) mox vero valde durus,

10 Polyporus nummularius (Bull.) Fr. S. M. I p. 352 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 85., Boletus nummularius Bull. Champ. Fr. t. 124 (1782)
Icon. Bull. l. c., Rostk. in Sturm Deut Fl. Pilze, t. 12, Neest Syst. t. 27 f. 214.
Bibl. 123, 836, 866. D
Hab. ad truncos varios — Lombardia, Emilia: Monte Ventasso e M. Penna in prov. di Parma (Pollacci)
prov. Pavia (Noca, Bargamaschi)

011. Viene dal ~~Quélet, Fl. mycol. p. 403~~ considerato come sottospecie di P. ~~elegans~~ leptocephalus, mentre è avuto dal Fries e altri come sottospecie di P. elegans.

nummularius

85

i pileo vix 2,5 cm. lato;

Minor, tenuior, subregularis, stipite aequali, excentrico. — Sine limitis vestigio in Polyporum elegantem transit.

11 Polyporus laciniatus Pers. Myc. Eur. II p. 48 (1825)

Sacc. Syll. Fung. VI p. 78. [junior] et B [adultus]

Icon. Battarra F. Arim. t. 32 f. A (Agaricum album, terrestre), Buschbaum

Pl. minus cogn. Cent V t. 3 f. 2.

Rabh. 103 D

Hab. ad terram graminosam circa truncos vetustos quercinos laricinos – Umbria pr. Rimin. (Battarra)

area Dilv. Europa.

a Sant'Andrea in Besanigo

> Sect. II Spongiosi Fr.

(Daedalea Auctorum, p. p.)

Coccinioday 78

Sordide albus, tactu rubescens, 12–15 cm. alt.

pileo e spongioso suberoso — coriaceo, molli, orbiculari lobatove, e flocculoso glabrato;

stipite centrali, albo-floccoso, glabrato;

poris rotundis, minutis, inaequalibus, mucidis. — Nunc solo macro minor est et satis regularis, nunc luxurians, gra= mina etc. obvolvens.

Obs. Raramente ~~si raccoglie dove~~ si trova in= sieme con P. rufescens ma è più affine P. alligatus. L'una e l'altra figura di Battara illustra la storia della vegetazione; per i pori si allontana da P. heteroporus, P. abortivus, P. ru= fescens etc. (Fries)

12 Polyporus rufescens (Pers.) Fr. S. M. I p. 351

Sow. Sylt. Fung. VI p. 78 Sistotrema rufescens Pers. Syn. p. 551 exp., Myc. Eur. II p. 206.

Icon. Sow. Col. Fig. t. 191 (P. biennis), Mich. N. pl. gen. t. 70 f 4 [var.] (Polyporus coriaceus fulvus), ? Bryant., Atti Ist. Incoragg. Nap. VII (1847) t I (Daedalea hymenopus)

Rib. 2 3, 254 430, 434, 101, 866

Hab. ad terram graminosam circa truncos vetustos - Piemonte, Toscana, Napoletano, Emilia

Area distr. Europa, Amer. bor., Australia

Exs. Erb. crit. ital. II n. 140 (P. biennis var. rufescens)

Obs. È piuttosto una var. di Polyp. biennis.

rufescens 78

Carneus; pileo spongioso, molli, inaequali, hirto (5–12 cm. lato); stipite brevi, difformi; poris magnis, sinuosis lacerisque, albo-carneis; sporis ovoideis 6 µ long., ocellatis;

~~Vegetatio prorsus~~

Hh. La vegetazione è tutta di P. pistoiremoides ma è minore più molle e col colore tanto dentro che fuori diverso — È piuttosto una var. di P. Lenzii.

13 Polyporus hirsutus (Alb. et Schw.) Lasch Handb. III p. 295 f. 47 (1906). Boletus hirsutus A. S. Lus. f. 243 (1805)

Polyporus Schweinitzii Fr. S. M. I p. 351 (1821) Ochroporus hirsutus (Alb. et Schw.) Schröt. Pilz. Schles. I p. 488.

Sacc. Syll. Fung. VI p. 76,

Fen Fr. Icon. Hymen. t. 179 f. 3, Micheli, Nov. pl. gen. t. 70 f. 1 (Polyporus albi radicibus innascens), Gillet, Champ. Fr. tab. suppl., Orlidieux Malad. pl. agric. f. 150-152, Lloyd, Polyporoid Stud p. 14, Lasch l.c. Bibl. 245, 263, 785, Bres. MS., 1496, 1965

Hab. ad truncos putres et alneos? — Piemonte, Lombardia, Toscana - destate (Autunno.

area dist. Europa, Himalaya, Amer. bor., Cuba, australis

(Trentino: bosch. d. Tergolas a Magras (Bres. MS.)

Exs. Rab. F. Eur. n. 1602 (Valdestia: Carestia), Myc. Ital. n. 406.

Sistotremoides 76

Schweinitzii

Pileo crasso, spongioso-suberoso, strigoso-tomentoso, scruposo, ~~spadiceo~~, gigantico, 19 cm. et ultra lato, nunc regulari, planocupulari, nunc concrescendo et incrustando difformi dimidiatoque, (spadiceo) primo fulvo-tomentoso, mox margine tantum, dein exoleto toto fusco, substantia in optimo vigore spongioso-mollissima, dein indurata, sicca fragili, e rhabarbarino colore fuscescente; stipite crasso, brevissimo vel obsoletove, ferrugineo; poris magnis, variis laceris que, sulphureo-virescentibus; sporis ovoideis, hyalinis 7-8 = 3,5, vel (Bres. M.S.) subovatis, apice subcurvulis, 1-guttulatis, vitreis, in cumulo albidis, 6-8 = 4-5 generatim 8 = 5.

Obs. Hydnum spadiceum Pers. differisce molto per l'indole dell'imenio, la sostanza, il tomento molle velutino del cappello ecc.

14 Polyporus biennis (Bull.) Fr. Epicr. p. 433 (1836)
Sacc. Sylt. Jung VI p. 77 Boletus biennis Bull. Champ. Fr. t. 449 f. 1
Daedalea biennis (Bull.) Fr. S. M. I p. 332.
(1789)
→ Icon. Bull. l.c., Gill. Champ. Fr. t. 476, Nees, Syst. Pilz t. 30 f. 228
de Leyn. Rech. Vég. inf. II t. 5 f 6, 8, 9, 13 et t. 6 f 1-5 et 10-13
(et Spec. ital.)
Brit. 66 662, 868, 446, 585, 90, 2441, 66, 430, 754
Hab. ad truncos ~~arborum~~ et terram — Cant. Ticino, Emilia, prov. di Parma (Passerini)
Ext. Erb. crit. ital. II — Liguria, Piemonte, Mizzardo (Barla in Bres. Myc.)
Area distr. Europa, Australia, Chili (Trentino: Gocciadoro, Orto dei Cappuccini, alle Ferrate (Bres. Ms.), ~~Lazio~~
(Veneto, Toscana, Lazio (Bagni) — Autunno

compactum
Obs. Sec. Bresadola Ms. l' Hydnum ~~crispum~~ Fng. f. fig. I t V et VI f 2 fig. 6-8
non che' il Hydnum crispum Fng. l.c. t VI f. 1, l'aspetto forme della presente pezza, contrariamente al giudizio di Fr. Cfr. Hydnum. E' veramente assai prossimo, come lo affini, al tipo di Daedalea.

Bierry 77

Pileo e spongioso coriaceo-suberoto, plano-
depresso, repando, azono, tomento leproto-
secedente glabrato, ex albo ferrugineo;

stipite curto, crasso, ferrugineo-lanato;

poris labyrinthiformibus, inaequalibus,
acutis, lacero-dentatis, albo-cinereis
fuscescentibusque; sporis ellipsoideis, 1-guttulatis,
subasperulis, hyalinis, in cumulo albis, 5-6 = 3,5-4

- Proteus, affinium more stipulas, muscos
incrustans. Primo sistit massam undi-
que porosam, griseo-albam, sensim
varie explicatur et calvescit. Pororum
stratum a pileo discolor, fere detersile.

15 Polyporus versicolor Sacc. ~~Algae Ven. Species~~ Fung. Ven. nov. v. crit. ser. V
p. 163 (in N. giorn. bot. it. 1876), Syll. Fung. VI p. 77., Polyp. Savardi
Cooke et Quél. Clav. Hym. p. 174.
Icon. Sacc. Fung. ital. fig. 106.
Bibl. 1036, 209.
Hab. ad basim palorum ustam — Veneto: Selva in prov. Treviso (Sacc.)

Area Sibi. Ital. bor.

Exs. Myc. Ven. n. 818.

Obs. Dest. vigueriana comm. una var. d. Polyp. biennis

Sericeldy 77

Pileo dimidiato, flabellato, sublobato, longiuscule stipitato, fulvo-pallescente, molliter breve velutino, non zonato, suberoso-coriaceo, contextu ex albo dilutissime roseo, 8-9 cm. lato, 0,5 cm. crasso; margine acutiusculo; stipite cylindraceo-tuberculoso, irregulari, pallide lutescente, subvelutino, quandoque duobus connatis, 5-12 cm. longo, 1-1,5 cm. crasso, saepe terrae particulas sibi obvolvente; poris grandiusculis, angulato-sinuosis, laceratisque, in stipitem breviter decurrentibus, ex albo dilutissime roseis; sporis subsphaerico-ellipsoideis 3-5 = 2,5-3 µ, dilutissime carneis, hyalino-guttulatis.

Obs. Ha manifesta affinità con P. biennis. Ceriomyces terrestris Schulz. è almeno in parte lo stato gasteroforo di questa specie. Cf. Ceriomyces

16 Polyporus corylinus Mauri, di due funghi marg. f. 1 tab unica f. 2 di Roma (1818)
Syll. Fung. VI p. 70.
Icon. Mauri l.c., Vivian. F. d' Italia t 1, Lang. F. d. Roma t. 30 f. 2.
Hab. ad truncos et ramos Corylis — Lazio nei colli della prov. di Roma
Area distr. Italia. varius Castaneae, Querci et Spartii. Soluti.
e coltivato a Rocca di Papa. Vere. Aest.
Bibl. Mauri l.c. 653, 656, 1232.

Sect. III Lentis Fr.
(Polyporellus Karst. p.p., Leucoporus Quél. p.p.)

corybinus 70

Albus; pileo e carnoso coriacco, ex hemisphaerico plano, levi, glabro, subtus convexo, disco sublutescente; ~~carne alba~~ stipite cylindrico, in pileum diffuso; poris decurrentibus, subquadrangulis, ore tenui, integro; carne alba; sporis Mispori-deo-ellipsoideis, hyalinis, 7 = 3,5.

17 Polyporus arcularius (Batsch) Fr. Sv. M. I p. 362 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 67. Boletus arcularius Batsch Elench. Fung. p. 97 (1783)
2) Bibl. 245, 395, 418, 434, 638, 737, 1031, 1062

1) Icon.: Micheli N. pl. gen. t. 70 f. 5 (Polyp. exiguus, pileolo hemisphaerico),
Patouill. Tab. anal. fig. 138, Sm. et Rea Trans. Br. Mycol. Soc. 1906 t. 16 f. 1.
Hab. ad truncos et ramos — Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Toscane: i. Foglio (Sommier), Napoletano, Siculus.
Area dispers. Europa, Rhodos, Sibiria Asiat., Ceylon, Amer. bor. et centr., Australia, Nova Zelandia, Libyen, Tunisia
(i. Valle Lagarina (Cob.), Vezzena d. Malè e bosco d. Magras (Bres. MS.)

611 · (Vers.)

Var. ochraceus Bres. MS., minor et pileo colore alutaceo v. ochraceo.; sporif 7-8 = 2,5 ; basidif 15-20 = 5-6
Hab. ad ramulos — Trentino: S. Biagio (Bres. MS.), Ala (P. Placido in Bres. MS.). Vere.
611. Diverso secondo Quélet da Pol. subarius per la disposizione dei pori.

arcularius 67 b.

Pileo e tenuto coriaceo, convexo, subumbi=
licato, azono, sitaneo fusco-squamuloso,
hornotino glabro, lutescente, margine
strigoso, firmiore 1 1/4-2,5 cm. lato;
stipite brevi, subsquamuloso, fusco-griseo, vix 2/3
longo; poris oblongo-rhombeis, tenuibus, majusculis,
integris, albidis, demum fulventibus; sporis
hyalinis, cylindraceo-subcurvulis, guttulatis,
7-8 = 2,5-3 (tres. M.S.)

Obs. Moltissimo affine a P. brumalis ma certo
diverso.

67

18 Polyporus brumalis (Pers.) Fr. S. M. I p. 348.
Sacc. Syll. Fung. VI p. 65, Boletus brumalis Pers.
Icon. Gill. Champ. Fr. t. 456, Lang. F. d Roma, t. 30 f. 1, Micheli N. pl. gen. t. 70 f. 7 (Polyporus exiguus coriaceus albus), Quél. in Assoc. franç. avanc. Sc. 18 (1889), t. 15 f. 16, Rost in Sturm t. 8, 13, 14.
Bibl. 209, 417, 418, 518, 653, 656, 866, 1030, 4334 (P. calaber), 1605, 1907.
Hab ad truncos quercinos, fagineos etc. — Veneto, Trentino, Emilia, Lazio, Toscana: isola Pianosa (Somm.) Vere (Valle Lagarina (Cob.), alle Giare (Bres. MS.)
Area Distr. Europa, Amer. bor., Asia occ. Austral. Tergolay, Ala ecc.

→ Exs. Myc. Ven. II ed. n. 8.

Sec. Bresadola MS. il Pol. lepideus Fr. è la stessa specie.

Obs. Il Polyp. calaber Berg. in Atti Ist. Incor. Napoli, VI (1840) t. 1 raccolto in Calabria [illegible] sembra appena una var. delle presente specie.

brumalis 63

Pileo e carnoso-lento coriaceo, subumbilicato, azono, sitaneo villoso, fuligineo, bornotino squamuloso glabratoque, pallescente, 2-12 cm. lato, margine subfimbriato-ciliato; carne alba;

stipite tenui, hirsuto, squamuloso; 2-5 cm. longo, 4-9 mm. crasso;

poris oblongis angulatisque, tenuibus, acutis, denticulatis, albis, demum lutescentibus;

sporis oblongatis, curvulis, 2-guttulatis, hyalinis, 6=2, vel hyalinis, cylindraceis, subcurvulis, 1-guttulatis, 7-9 = 2-3, vel 5-7 = 1¾-2; basidiis 14-16 = 4-6; hyphis 2,5-4 (Brés. MS.)

Ad. Nei tronchi cavi e nelle celle v'è una forma nana, quasi polverulenta che è B. pusillus Schrad; Pol. debilis Wallr. Questa specie è molto variabile donde la proposta di dividerla in più specie. Secondo Brés. MS. il Pol. lepideus Fr. è la stessa cosa.

19 Polyporus vernalis Fr. Hymen. Eur. p. 527 (1874), Sacc. Syll. Fung. VI p. 66.

Icon. desert Bibl. 418

Hab. ad ramulos putres ex Salix — Trentino: Valle Lagarina. Vera.

Area distr. Gallia, Italia.

66 vernalis

Pileo e carnoso coriaceo, tenui, plano
sericeo-striato, ochraceo-flavo, demum
depresso, expallente; stipite elongato,
gracili, squamoso-fibrilloso, albo;
poris minutis, fimbriatis, ochraceis; spor.
levat-ellipsoideis 6 μ longis, guttulatis.

Obs. ~~Il P. cyathodes Pers. differisce~~
~~per il gambo quasi nudo, nero alla~~
~~base, pei pori interi, ottusi.~~

20 Polyporus cibarius Fr. S. M. I p. 349 (1821)
Sacc. Sylt. Jung. VI p. 68, Pol. brumalis Rostk. m. Sturm Deut. Fl. Pilze t. 5, non Pers.
Icon. Rostk. l. c., Bischoff Krypt. fig. 331 c.
Ard. 246.
Hab. ad ramos arborum frondosarum — Piemonte: Valsesia (Carestia) ci Riva-Valdobbia
Area distr. Europa.
Obs. E' affinis ma var. d. Pol. brumalis.

ciliatus 68

Pileo carnoso-coriaceo, convexo-plano, azono, glabro, e brunneo pallido; → regulari, ciliato; margine ciliato; stipite tenui, aequali, glabro, pallido; poris minutis, subrotundis, obtusiusculis, dilute cinnamomeis, ore pallido; spor. 6-8-2-3.

~~Habitat fere P. varii, nummularii~~, sed stipes gracilior, tubi haud niger, saepe flexuosus.

21 Polyporus leptocephalus (Jacq.) Fr. S. M. I p. 349 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 71, Boletus leptocephalus Jacq. Misc. austriaca I p. 142, t. XII. (1773)
Icon. Jacq. l.c., Michel. N. pl. gen. t 70 f 7 (Polyporus exiguus, coriaceus, albus)
Bull. 103, 209, 426, 1035 1284, 1965 (Paul., Traité Champ. t. 164 f. 1–2)
Hab. ad truncos et ramos subemortuos — Lombardia, Veneto; Emilia: pr. Rimini e Bologna ♀
Area distr. Europa.
prov. d. Brescia
prov. di Treviso, in.
fagg. del Cansiglio (Bérenger)
♀ (Battarra, Cocconi)

leptocephalus 71

Pileo tenuo, demum coriaceo, convexo-plano, tenui, glabro, levi, azono, e pallescente cervino, 2,5 cm. circiter lato; margine subrepando; carne alba;
stipite ~~brevi~~, glabro, pallido, brevi, circiter 2 cm. longo;
poris adnatis, minutis, subrotundis, obtusis, albidis; sporis oblongo-ovoideis, 8 × longis, hyalinis

22 Polyporus substrictus (Bolt.) Sacc. Boletus substrictus Bolt. Hist. fung. t. 130 (1791)
Polyporus fusco-dulcis (Schrad.) Fr. Epicr. p. 451 (1838)
Sacc. Syll. fung. VI p. 71, Boletus fusco-dulcis Schrad. Spic. fl. germ. p. 153 (1794)
Icon. Bolton l.c. ~~Hooker Fungi t. 170~~ Britzelm. Hymen. t. 635-fig. 164.
Bibl. 417, 418
Hab. ad ligna et truncos — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli)
Area distr. Europa

Substrictus =
frequidulus 71

Pileo carnoso-lento, → tenaci, subcoriaceo, convexo-plano, azono, glabro, fusco-lutescente, 2-5 cm. lato; carne albo-lutescente; stipite subtenui, aequali, ~~glabro~~ pallescente, ~~vel ut~~ vel utrinque incrassato, 2-5 cm. longo, 4-5 mm. crasso, glabro, e fusco lutescente, pallescente; poris subrotundo-angulatis, obtusis, integerrimis, lutescentibus; sporis ovato-oblongis, 6-8 = 2-2,5 (Britz.)

23 Polyporus fuligineus (Pers.) Fr. S. M. I p. 348 (1821), Sacc. Syll. Fung VI p. 61, Boletus fuligineus Pers. Syn. p. 516 (1801), Icon. Bull. Champ. Fr. t. 469, 1 [1789] (Boletus polyporus) Bull. 209, 430, 848

Hab. ad terram nemorum — Liguria: S. Remo (Baruffi), Piemonte, Veneto: (a Savoja (Thg.) (ad M. Baldo e Summano (Bolliki)

Area distr. Europa.

E Dalig.

Sect. IV Ovini Fr. p.p.

(Polyporus Karst. s.s., Calopodius Quél.)

fuligineus 61

Pileo carnoso, coriaceo, tenui, umbilicato-depresso, glabro, subfuligineo; ~~carne molli~~ 3-6 cm. et ultra lato; margine inflexo, subrepando; carne molli, alba; stipite aequali, tenui, glabro, ut tringue incrassato, pallido, basi saepe fulvescente; poris minutis, rotundis, aequalibus, e niveo pallescentibus.

Obs. Tanto per la località, quanto per la carne molle è distinto dalle specie affini.

24 Polyporus versellus Fr. Epicr. p. 429 (1836-38), Sacc. Sylll. fung. VI p. 60,
Polyp. agglis Viviani F. d'Ital. p. 42, t 37 et ?38 (var. rubescens) (1834-38)
Fun. Viv. l. c., Ventura Msc. Dell'Abbadia Bresc. t. 62 f. 2-3 (P. crustatus)
Atl. 1232, 1219.
Hab. ad radices arborum v. ad terram silvaticam ~~in fagetis~~ – Toscana, Lombardia
Area Dist. Europa

Obs. Secondo Quél. Fl. mycol. questa specie probabilmente non è distinta
dal Polyp. ~~crustatus~~ flabelliformis.

virellus 60

Simplex; pileo carnoso, fragili, e convexo plano, subrepando, levi, glabro, virescente; stipite levi, glabro, albo; poris minutis, rotundis, albis, demum rufescentibus. – Statura varius, inaequalis; carne alba, sicca saepe virescente.

~~Obs. Non si confonda colla forma quasi semplice di P. cristatus Schaeff. t. 113.~~

25 Polyporus polaitus (Fr. Epicr. p. 429 (1838), Sacc. Sylt. Fung. VI p. 61

Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 179 f. 2.

Bibl.

Hab. ad terram et fragmenta ligni — Trentino: Varena, alla Chiusa (Bresad. ms.)

Area dist. Europa

Obs. Sec. Bresad. ms. sarebbe una forma stipitata semplice del Polyporus confluens.

polibus 61

Pileo carnoso, lento, planiusculo, subrepando, levi, glabro, sublateritio, disco compacto, marginem versus tenui, carne alba; stipite elongato, 8 cm. longo, digiti majoris crassitie, saepe excentrico, subradicante, inaequali, firmo, poris que rotundis, tenuibus, denticulatis albis. — Major, subnitens.

26 Polyporus asperellus Lév. Comm. ad Paul. Traité, p. 14, tab. 31 f. 1–3 (1855)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 58.
Icon Paulet l. c. (Scutiger tuberosus)
Bibl. 61 (0)
Hab ad ~~basin truncorum~~ vi Silvis Castenearum ? — Liguria a. prello Sbazzano (Ferrari). Nov.

Area distr. Galliæ, Italiæ.

asperellus 58

Pileo carnoso, firmo, convexo, difformi, repando, saepe excentrico, granulato, nigro; stipite inaequali, glabro; foris amplis, angulatis, primo albis, dein leviter rufescentibus.

Obs. Il gambo da Leveillé è detto nero ma nella figura è pallido.

27) Polyporus leucomelas (Pers.) Fr. S. M. I p. 346 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 58, Boletus leucomelas Pers. Syn. p. 515 (1801)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 179 f. 1, Gill. Champ. Fr. t. 451, Paulet Traité Champ. t. 164 f. 3–4, Fayod in Malp. III (1889) p. 72 (sp. or.)
Rbh. 417, 418
Hab in silvis pineis — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli), boch. N. Rabh. (Bres. MS.) – Autumno
Area dilat. Europa, Amer. bor.

Vel Fayod Melz?

leucomelas 58

Pileo carnoso, subfragili, difformi, sericello-squamuloso, nigro-fuliginoso, ad 5-8 cm. dilatato; carne alba, fracta rubente;

stipite valido, ~~inaequato~~, subtomentoso, concolore, nunc curto, inaequali, suberoso, 2,5 cm. longo, nunc 5-8 cm. longo, aequali, ictu quoque nigrescente;

poris majusculis, inaequalibus, cinereis, albidis, in exsiccatis nigrescentibus;

sporis ~~aequalibus~~, subglobosis, angulatis, hyalinis, tuberculosis, 4-7 μ diam.; basidiis 20-25=7 (Bres. M.S.)

28 Polyporus robinaceus (Cumino) Bres. F. mang. p. 104 t. 95 (1899), Boletus robinaceus Cumino Fungi Valli Pitii specimen. p. t. II f. 2 (1805)
Polyp. pes-caprae Pers. Champ. comest. p. 241 t. V (1818), Sacc. Syll. Fung. VI p. 58

Icon. Cumino l.c., Pers. l.c., Bresad. l.c., Gill. Champ. Fr. t. 450, Sacc. e D'Ancona, F. mang. Ven. t. 9 f. 1–3 et t. 15 f. 14, Venturi Mic. Bresc. t. 12, Quél. Champ. Jura, I t. 17 f. 2
Rabh. 61, 90, 209, 262, 263, 397, 398, 430, 585, 699, 1088, 1319.

Hab ad terram dehiscam in silvis pinetis et prandetis — Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino, Emilia, Sicilia. — Autumno. Edulis.
: nella pineta di Povo ecc. (Bres.)
Area dist. Europa, Australia.

Ex. Rab. F. Eur. n. 407 (Vercelli, Novara, Biella: Cesati), Myc. Ital. n. 1412, Myc. Ven. n. 816

Scobinaceus 58

= Pycnoxae

v. simplex

Subcaespitosus, pileo carnoso, fragili, ~~saepe dimidiato~~, rimoso-squamoso, badio, demum fusco-atro, variante integro et dimidiato; stipite difformi, ventricoso, basi non nigro, porisque amplis luteo-albis; — Porro caespitoso-connatus et simplex nec ramosus ut Merismata.

sporis in cumulo candidis, obovatis, e latere compressis, ~~to~~ crasse 1-guttulatis, levibus, 9-9,5 = 6,5-7; basidiis 30-35 = 9-10 (Bres MS.)

29 Polyporus Tuberaster (Jacq.) ~~Pers.~~ Fr. S. M. I p. 347 (1821)
Sacc. Sylll. Fung. VI p. 56, Boletus Tuberaster Jacq. Collect. Suppl. p. t. 8-9
Icon. Jacq. l. c., Micheli N. pl. gen. t. 71 f. 1 (Polyp. esculentus ... Pietra fungaia)
Barbarea F. Arim. t 24 f A (Ceriomyces Tuberaster), Boccone Mus. Fis. t. 300
f. 2 (Tuberaster fungos ferens), Venturi Mic. Bresc. t 47 f. 5-6, Vivian. F. d'Italia t. 55.
B. Bl. 51, 213 263, 284, 103, 434, 598, 653, 656, 785 1219, 1232, 212, 213, 862, 700
1599.

Hab. ad terram, quam in massam mycelio densa porcuriam conglobat) — praestim prope Tarsum Cercatore (Rolfs) Marche

Lazio, Napoletano, ~~Italia? (Hop)~~
Aree distr. Italia.
: Puglia, Campania, Abruzzo. Sudiz.
: presso Morolo e Carpinato (Lanj.)

Lanj. F. d Roma t 31,

Oss. Questa specie (la ben nota Pietra fungaia) proviene spontanea nelle località in citate, ma è stata ed è coltivata in molti altri siti anche fuori d'Italia.

Tuberaster 56 -

Pileo carnoso, lento, e plano infundibuliformi, repando, villoso-squamoso, flavescente, 5-12 cm. lato; stipite curto, firmo, lento, glabro porisque firmis, subangulatis, aequalibus albidis. Mycelium terram in massam lapidarem conglobat, quo aliorsum translato (etiam in Sueciam) propagatur et in usum culinarem in Europa australi passim colitur.

; sporis ovato-elongatis, 12-14 = 3,5-4, hyalinis, intus minute granulosis, vel guttulatis una guttula maiori praeditis (Bres. M.S.)

30 Polyporus subsquamosus (Linn.) Fr. S. M. I p. 346
Sacc. Sylt. Pung. VI p. 56, Boletus subsquamosus Linn. Sp. pl. ed. I p. 1178 (1753)
Icon. Fr. Svensg ätl. Svamp. t. 53, Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze t. 3
Bibl. 123, 995.
Hab. in silvis pineis inter acus emergens — Lombardia, Napoletano
(Trentino: Margone nella valle Salvadori e sopra Pardolo, Varena e in Val di Sole (Bres. MS.)
area distr. Europa.

Obs. affine, secundo Bres. MS., a Polyp. leucomelas.

Subsquamosus
56

Pileo carnoso, tenaci, explanato, levigato, albido, plerumque areolato-squamoso, amplo, 18-20 cm. usque, admodum firmo, sat regulari, simplicissimo; stipite obeso, duro, glabro, albido, 1-2 cm. longo, crassoque; porij mollibus, subflexuosis, inaequalibus, albij; sporis 5,5-6,5 (raro 7) = 4-5
(Bresad. M.S.)

Obs. ~~Diversissimo da P. rodiperi~~

?

Polyporus ovinus (Schäff.) Fr. S. M. I. p. 346 (1821) (1774)

Fan. Syst. Fung. VI p. 57, Boletus ovinus Schäff. Fg. Fung. IV p. 83, t. 121, 122.

Fries. Schäff. l.c., Brosad. F. mang. t. 94, Fries Sv. ätl. Svamp. t. 8,

Roll. ätl. Champ. t. 93 f. 206, Hayek, Pilze t. 57.

Rbl. 61, 90, 209, 242, 245, 397, 585, 995, 1284, Mass. in Bull. Soc. bot. it. 1912 p. 231.

Hab. ad terram in silvis praecipue pineis – Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Napoletano. Aut.: bosch. di Tergolas, Magras etc. (Brescia), Varena (Mass.)

Area distr. Europa, Amer. bor., Australia.

Exs. Erb. crit. ital. ser. II n. 332.

Edulis

Ovinuy 57

Pileo carnoso, fragili, difforme, impolito, mox diffracto-squamuloso, albido, 6-8 cm. lato;

stipite brevi, inaequali, albo, 2,5-3 cm. longo;

poris minutis, rotundis, aequalibus, ex albo citrinis; sporis sub microscopio hyalinis, subglobosis, 1-guttulatis, guttula hyalina, levibus, 3-4 μ diam.; basidiis 20=5 (Bres. M-C.).—

Valde versiformis, sat compactus, sed fragilis. Etiam crudus, amygdalino sapore gratus a quibusdam sub excursionibus mycologicis copiose comeditur. Variat caespitosus.

~~Questa specie è P. subsqua-mosus non furono mai visti nella medesima regione.~~

32 Polyporus montanus (Quél.) Ferry in Revue myc. XX (1893) t. 180 f. 27
Sacc. Syll. fung. XXI p. 260, Cerioporus montanus Quél. Mem. Fr. des
Franc. Sc. 1887 p. 4, t. XXI f. 10 (ex tr.)
Icon. Quél. l. c., Ferry l. c.
Bibl. 244, Quél. Fl. mycol. p. 407 (Barla in Bres. Ms.)
Hab. ad basin truncorum Abietum — Alp. marit. (Quél.), Nizza
Toscana: Vallombrosa (Cavara). Sicilia?
Area distr. Gallia, Italia.

Sect. V Frondosi Fr.
(Merisma Gill., Polyporus Karst., Calopora Quél. p.p.)
p.p.

Obs. Lo stesso Quélet Fl. mycol. p. 407, dubita che questa specie
non si differenzi abbastanza da Pol. acanthoderma Fr. l. c. Bres. Ms. e
affine a Polyp. frondosus.

montanus

21 - 26 o

Pileo flabellato, ramoso, 30 - 50 cm. lato, undulato, lobato, sulcato, velutino, pallide fulvo; carne spongiosa, fragili, alba, amara; stipite brevi, spisso, villoso, albido; sporis alveolaribus, 1 - 2 mm. diam., dein labyrinthiformibus et ~~dead~~ dentatis, tenuibus, sub vitro subverdis, albo - cremeis; sporis sphaericis 6 - 8 μ diam. aculeolatis

— ~~Tot~~ ~~forte edulis~~

V; vel subglobosis, 1 - guttulatis, sub microscopio luteolis 6 - 7,5 = 6 (Bres. M. S.). ~~Forte edulis~~

73 Polyporus Barrelieri Viv. Fungh. d'Italia p. 28, t. 28 (ex err. P. umbellatus
et t. 36 (P. frondosus), Sacc. Syll. Fung. VI p. 96 (Italia)
Icon. Barrel. Pl. Gall. Hisp. Ital. fig. 1241-72, Vivians l.l. c.c., Lang
F. di Roma t. 28.
Bibl. 61, 653, 656, 983, 1232.
Hab ad radices Castanearum — Liguria, Lagro: coll. autorum a Roma (Lang)
Area dist. Italia.
: nell'alta Polcevera (Beguinot).

Barrecheri 94

Ramosissimus, carnosus; ramis a basi ipsa divisis in lacinias ventilabriformes in orbem imbricatim dispositas, sulcatas, margine tumido crenato undulatoque; floris minutis stipitatoque albis; spor. spharoideo-subellipsoid., 4,5 = 3,7, hyalino-albis (Langj.).

Obs. Ha la statura di P. frondosus ma del resto è distintissimo specialmente pei lobi solcati.

34 Polyporus flabelliformis (Schäff.) Sacc., Boletus flabelliformis Schäff. Fl. Fung. IV p. 81, t 113 (1774)
Polyporus cristatus (Pers.) Fr. S. M I p. 356 (1821)
Sacc. Syll Fung VI p. 96, Boletus cristatus Pers. Syn. p. 522 (1801)
Icon. Barla Champ. Alp. t. 29, f 4-7, Krombh. Schwämme, t 48 f 15-16,
Rostk. in Sturm Deut. Fl. Krypt. t. 16,
Bibl. 61, 90, 244, 397, 430, 585, 983, 1219, 848 (8)
Hab. in silvis ~~nigricans~~ fagineis et pineis — Liguria, Piemonte, Lombardia,
Toscana. Aug. Sept.
(Trentino: bosch di Tergola e Magras (Rez. ms.)
Area distr. Europa, Amer. bor.

flabelliformis
= cristatus 96

Ramosus, firme carnosus, fragilis;

pileolis integris dimidiatisque, imbricatis,
depressis, subpulverulento-villosis,
demum rimoso-squamosis, rufo-virescentibus;

stipitibus connatis, difformibus, albis;

poris minutis, angulatis lacerisque,
albidis; sporis hyalinis, oboratis, 1-guttulatis,
6-7 = 5 ⌀; basidiis 21-24 = 5-7

_ Valde versiformis, interdum simplex
pileo 8 cm. circiter lato, modo un-
dulato-lobato, centrali.

95 Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. S. M. I p. 354 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 95, Boletus umbellatus Pers. Syn. p. 519 ex p.
Icon. Schäff. Icon. t. 111, Krombh. Schw. t. 52 f. 3–9, Guél. ex champ. Jura
E t. 18 f. 1, Lanzi Fl. d'Italia, t 26–27, Gill. Champ. Fr. t. 469.
Bibl 430, 585, 653, 656.
Hab. ad terram et basin truncorum — Piemonte Lazio
Area Nyk. Europa
Exotica. Myc. Hal. n. 1413.

umbellatus 95

~~Ramosissimus, fibroso-carnosus, tenaceus~~; Pileolis numerosissimis, integris, umbilicatis, plus minus depressis, 1 1/4 cm. latis, sat regularibus, fuligineis, rufis, vel pallide flavis, albis (Barr., ic. 1269, 1270); stipitibus elongatis, discretis, basi coalitis, poristque minutis albis ♀ – Ramosissimus, fibroso-carnosus, tenaceus; caespites ⊙ squarrosi, densi, ⌀ 18-20 cm. lati.

♀; sporis tenuit-ellipsoideis, 9,5 = 4, hyalinis.

Obs. Può esser solo questa specie l'Ag. ramosus Vet. s. B. ramosissimus Scop. il qual nome poi fu male riferito da Schaeffer a Pol. frondosus.

36 Polyporus confluens (Alb. et Schw.) Fr. S. M. I p. 355 (1821)
Sacc. Syll. fung. VI p. 96, Boletus confluens Alb. et Schw. Consp. Lus. p. 246 (1805)
Icon. Barla Champ. Nice, t 29 f. 2. 3, Bresadola F. mang. t. 96, Fr. Svensg. ätl. Svamp. t. 24, Cavara F. mang t. 33
Bth. 90, 209, 242, 245, 585, 699, 848
Hab. ad ligna muscosa emportata pineis — Liguria, Piemonte, Trentino, Veneto, Area dist. Europa, Amer. bor. Australasia
(bosco di Tergolas (Bres.) Varese (Mass.)

confluens 96

Ramosus, firme carnosus, fragilis ; pileolis crassis dimidiatis, imbricatis, confluentibus, glabris, carneo-lutescentibus, demum obscurioribus, squamu= losis, 12 - 15 cm. latis ;

stipitibus brevissimis, confluentibus, albo-pallescen= tibus ; ♃

sporis curtis, minutis albo-pallescentibus ; sporis subglo= bosis vel ovato - globosis, 1-guttulatis, ~~nucleis hyalinis~~, ~~sporis 6 - 7 µ longis~~ ~~uno latere compressis~~, ~~4×~~ 4 = 3 ; basidiis 12 - 15 = 4 (Bres. M. S.)

— Caespites 30 cm. et ultra lati. Crudus P. ovino minus gratus, carne pallida, sapore acriusculo. Colore fallax, nunc carneus, nunc paleaceus, in rufum et ochraceum vergens (aurantius non visus) sed facile dignoscitur pileis subcirci= nantibus, in massam amorphan, siccitate rigi= dam, confluentibus.

37 Polyporus frondosus (Schrank) Fr. S. M. I, f. 355
Sacc. Syll. Fung. VI, p. 95, Boletus frondosus Vahl Fl. Dan XVI t. 952 (1787)
Jon Vahl l.c., Fr. Hym. Eur. p. 444, Lanzi, F. di Roma t. 24 f. 2, Bresad. F. mang. t. 97 et 97 bis.
Exs. Myc. Mal. n. 212, Myc. Ven. 817

Rib. 90, 123, 209, 242, 397, 398, 430, 436, 585, 653, 656, 699, 757, 802, 836, 848, 853, 866, 929, 983, 1015, 1088, 1091, 1133, 1245, 1252, 212, 862, 858, 631, 754, 1456, 1700, 1965

Hab. ad radices imprimis Quercuum et Castanearum — Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica — Autunno.

Area distr. Europa, Australia.

sopra Malè, Croviana ecc. (Bres. MS)

Obs. È probabile che alcune delle citazioni suddette si riferiscano piuttosto a talune delle specie prece, spec. commutata. Il Bresadola l.c. ritiene che il P. Barrelieri Vitt. non sia sufficientemente definito

Frondosus 95

Ramosissimus, fibroso-carnosus, tenacellus; pileolis numerosissimis, dimidiatis, rugosis, lobatis, intricato-recurvatis, fuligineo-griseis, in caespitem convexum 15-30 cm. latum et crassum, 1,5-6 cm. latis; carne alba; stipitibus concrescentibus, albis; poris tenellis, minimis, acutis, vulgo rotundis, sed in situ obliquo hiantibus et laceris, albis; sporis late obovatis vel subglobosis, hyalinis, granulatis, 5-6,5 = 4,5-5; basidiis 25-30 = 6-8 (Bres. M. !)

— Saepe 15 Kg. pondus attingit.

Bh.

78 Polyporus intybaceus Fries Epicr. p. 446, Sacc. Syll. fung. VI p. 96
~~Polyporus Ulmarius Bulliard tab. 604~~. Lanzi F. di Roma t 25 f. 1
Jun. Drumée Ath. champ. I & t. 44, Richon et Roze Ath. champ. t. 63 f. 7-8,
Rolland Ath. champ. t. 92 f. 202., Fl. Dan. t. 1733 (1823) (Bol. gregarius)
Bibl 639, 653, 656

Hab. ad truncos varios — Lazio, Sicilia

Aest. Aut.

i boschi della regione Etnea (Gemmellaro)

i boschi romani e dei Cimini (Lanzi)

Area distr. Europa, Australia.

infybaceus 96

Ramosissimus, carnosus, subfragilis;

pileolis numerosissimis, dimidiatis, porrectis, sinuatis, demum spathulatis, gilvo-fuscescentibus;

stipitibus in truncum brevissimum connatis;

sporis firmis, obtusis, albo-fuscescentibus, primo obsoletis, dentatis, basi obliquis lamellosis

sporis ovoideis, albis 4-5 = 2-3.—

Caespites 15-30 cm. lati.

Hb. ~~La t. 87 Sow. : Bavr. f. 1268 si fosta fra : appellino fochi, eretti in alto, pel gambo quasi nullo, pei poi ampii + grigi.~~ Questo è il vero fungus infybaceus di Bauh. Ecc Hik. pl. XL / 4.5 (1651) et veter. sec. Frey.

39 Polyporus osseus Kalchbr.

Icon. Kalchbr. l.c.

Abb. 245, 1032.

Hab. ad truncos emortuos lariciuos —

Area distr. Europa, Amer. bor.

Exs. Myc. Ital. n. 603,

m. Mathem. Term. Közl. III (1865) Tt I f 2. X p. 160

Icon. Hym. Hung. t. 34 f 2, Sacc. Syll. Fung. VI p. 101

Nizzardo (Barla in Bres. MS.)

Piemonte, Veneto, Trentino: bosch. d. Terzolas, Malé, Ortlé (Bres. MS.)

Aestate – Autumno

Sect. VI Lobati Fr.

(Marisme Gill. p.p., Meripilus Karst., Caloporus Quél. p.p.)

Osseus 101

Caespitoso-multiplex, albus; pileis elastico-tenacibus, demum induratis, subdimidiatis, varie concrescentibus, levibus, glabris;

stipitibus brevibus, concrescentibus, ~~et~~ e basi communi ortis;

poris decurrentibus, minutis, rotundis, demum laceris, decolorantibus;

sporis ~~5 μ longis~~ cylindraceis, subcurvulis, 5-6 = 1,5-2 (Bres M.S.) —

Insignis species, carne demum durissima a P. caseosis longe distans. Pilei forma variantes, convexi depressive; contextus albus; odor acidulus.

40 Polyporus candidus (Roth) Fr. Epicr. p. 449 (1836)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 101, Boletus candidus Roth Cat. botanica, I p. 246 (1797)
Icon. (deest?)
Exs. 639 (1)
Hab. ad basin truncorum impiorum Populi et Arbuti Unedonis — Sicilia: rett. agro Palermitano (Inzenga). Aut. usque ad ver. presso Castelbuono

Vix. Lec. Guét. Fl. mycol. p. 386, le pensé non sarebbe abbastanza distante da Pol. caesius.

candidus 101

Imbricato-multiplex, ~~coriacco~~ ~~lutus~~
coriaceo-lentus, tenax;
pileis subsessilibus, dimidiatis, laciniatis
undulatisve, azonis, candido-tomentosis;
poris tenuibus, inaequalibus, curtis,
chalybaeis.-
Caespites minores, varie concrescentes et
incrustantes; numquam pilei postice
decurrentes ut in affinibus Apodibus.

41 Polyporus lobatus (Schrad.) Fr. Epicr. p. 448 (1838) ← Bol. informis Cumino in Mem. acc. Tor. 1805 p. 223

Syll. Hym. Fung. VI p. 100, Boletus lobatus ~~Schaeff.~~ Schrad. Spicil. p. 162 (1794)

Icon. Schäff. Fl. fung. t. 316-317 (Bol. orbiculatus), Nees Syst. t. 28 f. 217 (id.)

Bull. 430, 511, 564, 1965

Hab. ad basin truncorum — Lombardia: prov. di Cremona (Farneti)
Piemonte: valle di Pesio (Cumino)

Area distr. Europa.

Lobatus 100

Caespitoso-multiplex, lento-coriaceus, indu=
ratus; pileolis subdimidiatis, imbricato-
concrescentibus, lacero-lobatis, glabris,
subrugosis vel maculatis,
luteis, postice in stipites teretes, inae=
quales, fuligineos attenuatis; poris
mediocribus, adnatis, pallidis, ~~=~~ subochroleucis acie tenui.
— Caro tenuis fusescens

P. 11. ~~Non ha niente comune con~~ Dal P. cristatus
~~a~~ differisce per la sostanza tenace
indurata, pei cappelli quasi rugosi o
macchiati, per la carne tenue fusce=
scente, pei pori quasi ocroleuli e ~~gli~~
i gambi fuliginei; ma devo Lec. Busardola
Hym. Kmet. p. 5 ~~non~~ considerare come
lo stato vecchio indurato del predetto
P. cristatus.

Polyporus acanthoides (Bull.) Rost. in Stuem. Deut. Fl. Pilze t. 19 (1848) XXVII
Sacc. Syll. Fung. VI p. 100, Boletus acanthoides Bull. Champ. Fr. t. 486 (1790)
Icon. Bull. l. c., Rostk. l. c., Pers. Icon. fung. t. 6 (Cistotrema rufescens) non
Alb. 757, 983 (in addenda), 638 (?) Pers. Syn.

Hab. ad basin truncorum — Nizzardo (Riss.) Valtellina (Massara
Liguria, Lombardia, Sicilia (?) (Inzenga)
Area Distr. Europa, Amer. bor.
(Tunisia)

Obs. (qui) L'Hydnum crispum Fries F. Scand. I t. 6 f. 1, secondo Fries, è probabilmente la specie presente.

Acanthoidy 100

Imbricato-multiplex, e lento coriaceus; pileolis infundibuliformibus, incisis-dimidiatis, subzonatis, longitudinaliter rugosis; ferrugineascentibus; stipitibus connato-ramosis fibrilloso-lamellosis-sinuosis, tenuibus, acie dentatis ex albo rufescentibus. — Junior pallens; licet subcoriaceus, brevius durat et vetustate fragilis fit.

Ad ♀ è più tenue di Pol-Berkeleyi; dal P. rufescens differisce non poco pel cappello non rugoso, nè irto, ~~non ondulato-lobato~~, ~~hei fori maggiori~~ di ~~Lit.~~ Listrotrema (Berk. Syn.) o di Daedalea

43 Polypogon Olea Panzz. in N. giorn. bot. it. 1886, p. 65, Sav. Sylt. VI p. 100

Ten. Dest

Rbl.

Hab. ad basin subterraneam Francoram Olea europaea — Liguria: S. Remo

(Panzz.)

area Dietr. Italia.

Oleae 100

Caespitoso-multiplex, carnoso-coriaceus;
pileolis tomentosulis, subzonatis, in
prima aetate explanato-lobatis,
dein pyxidatis, lobato-crenatis striatisque,
colore rubro-lateritio, pro effusione
sporarum albo-marginatis;
poris albidis, minutis, superius obstructis,
inferne angulato-laceris; pseudo-radicibus
racemoso-fibrosis, simul contextis stipi-
tem effingentibus; sporis minutis, rotun-
dis, albis.

64 Polyporus gigantaeus (Pers.) Fr. S. M. I p. 356 (1821)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 99, Boletus gigantaeus Pers. Syn. p. 521 (1801)
Icon. Bresad. F. Trid. t. 134, Gill. Champ. Fr. tab. suppl., Lang.
F. d. Rome t. 24 f. 1, Schaff. t. 267, Rostk. u. Sturm t. 19.
Bibl. 234, 243, 245, 103, 430, 434, 585, 639, 653, 656.
Hab. ad truncos vetustos in silvis umbrosis — Piemonte, Trentino, Emilia, Lazio, Napoletano, Sicilia. Aut.
Toscana; nel giardino Boboli a Firenze (Ug. Martelli in Bres. MS.)
Area dist. Europa.

Ott. Sec. Quél. Fl. mycol. p. 407, ma sarebbe distinguibile da Pol. acanthoides;
ma Bres. l.c. non rileva l'abbinamento

gigantey 99

Imbricato-multiplex, e carnoso-
lento subcoriaceus; pileis dimi-
diatis, latissimis, flaccidis,
~~fuscis~~ subzonatis, rivulosis, spa-
diceis postice depressis, 30 cm. latis;
cute rigida in granula vel squamulas fibrillosas secedente;
stipitibus e subere communi
connato-ramosis; poris
minutis, subrotundis, pallidis,
demum laceris, tacte obscuratis;

sporis hyalinis, cratte 1-guttulatis,
globosis, levibus, 5,5 — 6,5 μ diam.;
basidiis 14 — 20 = 8 — 10. (Bres. M. S.)
Maximus 30 — 60 cm. latus (etiam
usque ~~ad~~ ad 1,20 m. latus). Variat
clavaeformis: Holmsk. Ot. 2, t. 13.
~~Obs. Le figure sono piuttosto scadenti,~~
~~impicciolite, quindi ambigue.~~

45

Polyporus sabigneus Fr. sclerotes. Epicr. p. 452 (1838)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 143, Daedalea sabigna Fr. S.M. I p. 337 (1821)
Icon. Batt. F. Arim. t 38 f E (Agaricus dædaleis similibus minoribus), Fr.
Icon. Hymen. t 181 f 1, Lanz. F. d. Roma, t. 23 f 1, Rostk. in
Sturm Deut. Pl. Pilze, t. 27 f. 2.
Bibl. 103, 209, 653, 656., 1133 →
Hab. ad truncos vetustos imprimis salicum — Veneto, Emilia, (Toscana, Lazio.

Area Distr. Europa.

→ Sect VII Lignescentes Fr.

Saligny 143

Caespitosus, coriaceo-mollis, elasticus; pileis dimidiatis, imbricatis, dilatato-reniformibus, adpresse villosis, albidis, circa marginem sublobatum, tumidum depresso-sulcatis; poris tenuibus, confertis, elongatis, flexuoso-intricatis, albis. — Caespites vulgo minores, inodori.

pois ellipsoïdes 7,5 = 6, hyalins.

l. c.

Hh. Il P. saligneus Rostk. 2 Ctr2

si scosta pel cappello fosco, ~~contro la definizione trasmessa da Fries.~~

46 Polyporus imberbis (Bull.) Fr. Epicr. p. 451 (1838)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 166, Boletus imberbis Bull. Champ. Fr. t. 445 f. 2 (1789)
Icon. Bull. l. c. Bresadola Q. Trid. t. 135, Kalchbr. Icon. Hym. Hung. t. 36 f. 3.
Bibl. 234, 246, 362, 983, 1015, 631, 1965
Hab ad basin truncorum — Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Venezia Giulia e Corsica. Ab autumno in ver persistens et lignicola.
Area Geogr. Europa australior
Campo Trentino (Bres.)
sui castagni e sui salc.

Exs. Cavara F. Longob. n. 67.

Obs. Loc. Bres. M.S. il Pol. albipes parrebbe lo stato giovanile e il Pol. fumosus non ne sarebbe sufficientemente distinto.

imbecbij 144

Caespitosij; pileij imbricatij, lobatij, glabrij, albido-pallidij, demum fuscescentibus; stipitibus concentrice zonatis, 1,5-2 cm. latis ob fovis profundis intus cum carne albo, crassis; fovis tenuibus, confertis, linearibus, labyrinthiformibusque, lutescentibus. —
Sporij in cumulo albidis, sub microscopio hyalinis, ellipsoideo-cylindraceis, 6-8 = 3,5-4; basidiis 25 = 6-7 (Br. M. S.)
(=Caespites vulgo amplis, valde imbricati, solidi, in struma radicali sessiles.

47 Polyporus (pseudoigniarius (Bull.) Sacc.

Polyporus Dryadeus (Pers.) Fr. S. M. I p. 374

Lacc. Syst. Fung. VI p. 136 Boletus Dryadeus Pers. Obs. myc. II p. 3 (1799) Syn. p. 537 (1801)

Icon. Bull l.c., Hartig Baumkrank. t. 3 f 3, Comes Crit. agr. t. 9 f. 78.

Bibl. 123, 434, 671, 836, 866, 631, 1170, 1965

Boletus pseudoigniarius Bull. Champ. Fr. t. 458 (1789)

Hab. ad truncos, praesertim quercinos — Lombardia, Emilia, Toscana, Napoletano, Corsica — Annuus in ver persistens.

Area diff. Europa, Amer. bor.

• Sect. VIII Suberosi Fr

(Tschroderma Karst. p.p., Placodes at Quercinus Gaet. p. p.)

pseudoigniarius
= dryadeus 136

Amplus; pileo e carnoso suberoso, crasso, pulvinato, subferrugineo, fuscescente, cute tenui, molli, scrupuloso-levigata, glabra, margine gutt. aq. florante; carne subzonata porisque praelongis, tenuibus, rotundis, mollibus, ore pallidioribus ferrugineis; sporis albis, chlorino-hyalinis subglobosis, inaequilateralibus, 8-9 = 7-8, circulo aureo praeditis (Bres. M.S.)

— Est ✱ e maximis et nobilissimis, rapide crescens, ad 65 cm. latus.

Obs. Perché emette dal margine goccie acquose è confuso con P. applanatus (può essere) Pers. dermo

48 Polyporus resinosus (Schrad.) Fr. S. M. I p. 361 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 137, Boletus resinosus Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 171 (1794)
Icon. Rostk. in Sturm. Deut. Fl. Pfz t. 34 (P. confluens), Fl. Dan. t. 1138 (Bol. velutinus)
Bibl. ~~aaaa~~, 797, 398, 434, 866, 1015, 631
Hab. in truncis arborum, imprimis fondotarum — Piemonte, ~~Veneto~~, Emilia, Napoletano, Corsica.
Area distr. Europa, Amer. bor.

~~Exs. Roger Ven. n. 13.~~

811. Il Placodes resinosus Quél. Fl. myol. p. 400, colle spore brune ovoidi, 10-12 µ l. è certamente altra specie. Sec. Bresadola Hym. Kmet. p. 9 confusa ~~m~~ con Pol. fuligineus.
/ la presente specie

resinosus 137

Pileo e carnoso suberoso, flocculoso-pru-
nato, rubiginoso-fusco, cuticula
adnata, rigida, rivulosa, resinacea,
intus azono, pallido; poris minu-
tis, aequalibus, pallidis, sporis
subglobosis, hyalinis, 4-5 µ diam. (Brits.)
— Grandis, in fago spithamaeus
usque, subimbricatus, pattim
zonatus.

49 Polyporus fuligineotus (Scop.) Fr. Epicr. p. 451 (1838)
Sacc. Sylt Fung. VI p. 164 (Fomes), Boletus fuligineotus Scop. Fl. Carn.
II p. 470 (1772), Boletus benzoinus Wahlb. Suec. II p. 1076 (1826)
Polyporus benzoinus (Wahlb.) Fr. El. I p. 100, Sacc. Sylt Fung. VI p. 137.
Icon. Fr. Icon. ~~Fung.~~ Hym. t. 183 f. 2, Kalchbr. Ic. Hym. Hung. t. 36 f. 1.
Karst Fin. Basidsv. t. VI f. 89.
Hab. ad truncos imprimis abiegnos — Trentino: Varena ed altrove (Bresad.)
Bibl. Bresadola P.S., Mass. in Bull. soc. bot. it. 1912 p. 231. 1913

sopra il Mezzolo di Male

Toscana: Val. Pianosa (Somm.).

Obs. Sec. Bresadola e Quélet il P. benzoinus confluisce colla presente specie.

fulgineofus | 137 e 164

Caespitosus, suberosus, fusco-rufus, indurati, suavcolens;

pilei ~~lae~~ dilatati, imbricati, rugosi, hispi= fusco-umbrini,

dulis, circa marginem sinuatum et subcaeruleascentem

plicatum nigro-fasciati,

pori subrotundi, minuti, ferrugineo— umbrini; sporis dermum abro-purpureis, ellipsoi= deis, 6-7 = 5, vel (Bres. MS.) hyalinis, biguttulatis, cylindra= ceo-curvulis 4-6 = 1,5-2

= Species insignis, caespitosa, 15 cm. lata.

Obs. ~~E~~ È ambiguo se sia una forma vecchia di Pol. resinosus o una specie distinta di Eranetes. L'abito è affatto uguale, il colore un po' più oscuro e l'odore quasi di Eram. odorata. Uomini Autorevoli personaggi (cfr. Wahlnb. Suec. 1075) ritengono due specie distinte. Anche Fries ~~ritiene~~ riterrebbe sinonimi se in una località non avesse raccolto soltanto carnoso P. resinosus nei tronchi di alberi frondosi, e in un'altra soltanto P. ferrugineus nei tronchi abietini e mai carnoso.

50 Polyporus Marianii Bres. et Car. in N. giorn. bot. it. VII (1900) p. 313
t. 11, Sacc. Sylt. Fung. XVI p. 150

Icon. Bres. et Car. l. c.

Bibl. 243. (1)

Hab. ad truncos quercus Cerris — Lazio pr. Terracina (Mariani)

Area distr. Italia centr.

Mariaui 16 - 119

caespitosus, albus, e lento suberoso - subligneso, pileis dimidiatis, imbricatis, undulatis, subtomentoso-squamosis, postice connatis et caespites 20 cm. altos laboque efformantibus, albis, pallescentibus, serio fuscidulo-avellaneis; tubulis albis, aetate pallido-griseolis, cum trama pilei homogeneis, usque ad 7 mm. longis; poris $\frac{1}{3}$ mm. circiter latis, variis, subrotundis, elongatis, vel subangulatis, acie demum fimbriata, albis, aetate lurido-pallidis; sporis hyalinis, cylindraceis, 5-8 = 2-2,5; basidiis clavatis, 15-20 = 5-6; hyphis subhymenialibus, 3-4 μ latis; carne alba odore fortiter subnanseoso, sapore amarulo.

51 Polyporus quercinus (Schrad.) Fr. Epicr. p. 441 (1838)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 138, Boletus quercinus Schrad. Spic. Fl. germ. p. 157 (1794)
Icon Krombh. Schwämme t. V f 3-5 et tab. XLVIII fig 11-16.
(Polyp. tuberosus), Brefeld Unters. VIII (1889) H 2 f 34-36
Bbl. 243, 65.
Hab.. ad truncos vetustos quercinos — Lazio: Monte Mario e Acqua Traversa (Bagnis) pr. Terracina (Cavara)
Area distr. Europa.

Obs. Sec. Giel. sarebbe da ascrivere piuttosto al gen. Fomes (Alcock)

Quercinus 138

Pileo tuberoso, → crasso, contextu floccoso e molli indurato, lingual= formi, convexo-plano, levi, primo floccoso-granulato, alutaceo-pallido, hinc inde tactuque rubello; postice in stipitem crassum, hori= zontalem angustato; floris curtis minutis, albidis. — Species inti= gris cum Fistulina analoga.

52

Polyporus venetus Sacc. Mycol. Ven. Specimen, p. 52, A. 7 f. 4–6

Syll. Fung. VI p. 142

Icon. Sacc. l. c.,

Bibl. 1035 – 209, 1061

Hab. ad trabes subdejectas et in cavo annosae Platani –

Veneto: Treviso, Padova, Chioggia (fm. minor: Chiamenti)

Area dist. Italia.

Venetus 142
3.

Simplex vel imbricato-multiplex, glaber; contextu compacto, suberoso, albo; pileo ungulato-dilatato vel multiformi, crasso, ubique tuberculato pileolosque laterales exserente, albo, denique flavido, margine obtusiusculo; foris ligneo-pallidis, minutis, angulatis; sporis minutis~~simis~~, albis, globosis, ~~diam. 3 μ circiter~~ 4-4,5 μ diam. circiter.

Hs. Fu visto a Treviso nelle travi delle cantine ove formava dei cespiti di 50 cm. e a Padova nel cavo d'un antico platano.

5?

Polyporus betulinus (Bull.) Fr. S.M. I p. 358 ~ Boletus betulinus
Sacc. Syll. fung. VI p. 139, Bulliard Champ. Fr. t. 312
Icon. Bull. l.c., Cordier, Champ. t 41 f 1, Gillet Champ. Fr. t. 462,
Rolland, Atl. t. 92 f 205.
Bibl. 90, 245, 397, 398, 430, 585, 1210 (Hydnum parastrum ?) 1965
Hab. ad cand. subnud. Betulae – Liguria, Piemonte, Lazio? Aestate.
Trentino: bosco d'Ingenga (Bres. MS.)
Area distrib. Europa, Siberia Asiatica, Amer. bor., Australia
Exsicc. Erb. crit. ital I n. 229, Sacc. Myc. Ital. n. 604.

Bedubrey 139

Pileo e carnoso suberoso, angulato, obtuso, azono, glabro, vertice obliquo umboniformi, pellicula tenui, recedente, grisco-fulvo (Gillet) sporij serotinij, curtij, minutij, inaequalibus, demum recedentibus;

sporij albij, minutis, cylindraceis, 4-6 = 1,5-2 curvulis, ~~bacillaribus~~ (Peck)

VII. La misura delle spore che leggasi in Quél. Fl. myc. (9 μ l.) deriva probabilmente da un errore di stampa.

54 Polyporus Laricis (Jacq.) F.

Polyporus officinalis (Villars) Fr. S. M. I p. 365

Boletus Laricis Jacq. Misc. Austriaca II p. 164–210, t. 19–21 (1781)

Sacc. Sylt. fung. VI p. 139, Boletus ~~Laricis~~ officinalis Vill. Fl. Dauph. p. 1041 (1789)

Icon. Jacq. l.c., Bull. Champ. Fr. t. 296 (1786), Lang. F. di Roma t. 22 f. 1

Micheli, N. pl. gen. t. 61 ord. III f. 1 (Agaricum sive fungus Laricis)

Bibl. 90, 209, 393, 398, 417, 418, 430, 434, 585, 653, 656, 757, 760, 848, 965.

Hab. ad truncos Laricis – Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Lazio, Napoletano

Area distr. Europa, Siberia asiatica

: Valle Loganina (Col.), in tutte le selve di Larici comune (Bres. M.S.)

Exs. Rabenh. F. Eur. n. 211 (Valsatia: Carinthia), Roumeg. F. Gall. n. 2205 (Pisano: Arcangeli)

[Delle Chiaje Icon. piante med. t. 66 f. 3 (1824)

Laricis
= officinalis 139

Pileo carnoso - suberoso, ungulato, deformi, irregulariter ~~concentrice~~ sulcato, glabro, tuberculoso, e lutescente albo; zonis lutescentibus et fuscescentibus variegato; cute dura rivuloso-fatiscente, intus concolore, friabili; carne molli, lenta sed demum friabili; poris curtis, semibus, lutescentibus, demum fuscescentibus. — Odor farinae recentis; sapor amaricans; sporis submicroscopio flavidis, oblongo-ellipsoideis, interdum apice curvatis, punctatis vel 1-guttulatis, 6-7 = 2-3

(Bres. M. S.)

D.L.S. Pel cappello variegato si ~~fa~~ sceglie dalla tribù. — ~~Antecamente~~ Celebratissimo fino dall'antichità. Mat. med. Dioscoride III cap. I. ~~Ricercato~~ in commercio come purgativo.

55 Polyporus allligatus Fr Elench. I p. 78 (1828)
Sacc. Sylt fung. VI p. 107
(2) Brbl. 131 Bres. MS. , 1301 (1)
(1) ~~Hab~~ Icon. Sow. Col Fig. t. 422 (Boletus rugosus)
Hab. ad basin truncorum Jugland~~i~~, Mors.; Castaneae-Trentino
Area Sibi. Europae.

(Tayd)
Piemonte: Angrogna
(Berlese)
(prati A. Magrag (Bresad. Berl.)
Sero Autumno.

Sect. Imbricati Fr
(Merisma Gill. hb., Polyporus Karst. pp., Leptoporus Quél. p. p.)

Obs. Sec. Bres. MS. a Bol. rugoso Scop. e Polyp. pubescens Kalchbr.
Ic. Hym. Europ. p. 54 t. 36 f. 3 (ex Schum.) ma si distinguono dalla presente
specie Sec Quél. Fl. mycol. p. 388 a P. alligatus colline col P. imberbis.

Caespitoso - multiplex, fibroso - carnosy, rigido - fragily;

pileis imbricatis, inaequalibus, azonis, villosis, alutaceo - isabellinis;

poris minutis, mollibus, albis, facile floccoso - obturatis; sporis vitreis, ellipsoideo - elongatis, 7 = 2,5 - 3; basidiis 13-17 = 4-5

— Junior saepe clavatus. Vulgo stipulas et gramina obvolvit.

56 Polyporus ~~calidicinus~~ candicinus (Scop.) Kühl. Flora 1907, p. 246, Boletus candicinus Scop. Fl. carn. II p. 470 (1772)
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. S. M. I p. 357
Sacc. Sylt., Syng. VI p. 104, Boletus sulphureus Bull. Champ. Fr. t. 429 (1780)

Icon. Schäff. Fl. Fung. t. 131-132, Fl. d. champ. Fr. t. 470, Bull. l.c. Champ. Fr. t. 429, Lang. F. d. Roma t. 23, f. 2, Venturi Mic. Bresc. t. 53, f. 6-7. Voglino Patol. Veg. p. 222

Bibl. 61, 90, 209, 243, 244, 245, 65, 103, 216, 357, 397, 398, 417, 418, 430, 434, 518, 585, 639, 653, 656, 725, 802, 866, 928, 983, 1090, 1133, 1219, 1347, 1456, [illegible], 1595, 1801 D

Hab. ad basin truncorum arborum et acerosarum frondosarum — Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Litorale, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Aest. Aut. Eduli sed tenax. Val di Sole: Terzolas, Cogolo ecc. (Bres. MS), Valle Lagarina (Cob.)

Exs. Erb. crit. ital. II n. 340, Myc. Ital. n. 1614, Cavara, F. longob. n. 214, Myc. Ven. n. 1108, Thüm. Myc. Univ. n. 1603 (Parmigiano: Passerini)

Area Distr. Europa, Tunisia, Reg. asiat., Ind. orient., Amer. bor., Cuba, Tasmania, Australia

= sulphureus

candicans

104 V

Caespitoso – multiplex, succoso – caseosus, mox expallens;

pileis latissimis, imbricatis, undulatis, glabriusculis, rubello – luteis;

poris minutis, planis, sulphureis;

carne flavida, dein alba, ~~sicca~~ → caseosa, floccosa, serio fatiscente, nec indurata, friabili;

sporis ovoideis, ~~ne~~ obovatis, vel subglobosis, 1-guttulatis, hyalinis, subtiliter papillatis, 7-8 = 4-5 vel 6-7 = 4,5-5; hyphis subhymenialibus 3-5 μ; hyphis contextus pilei ramosis, ramis principalibus usque ad 12 μ crassis, secundariis 4-6 μ. – Vulgo sessilis sed variat stipitatus (Batt. t. 34, B. Paulet t. 14) caespitosus, 30-66 cm., lateralis, in arboribus stantibus, sed undique expansus in prostratis; etiam clavatus, ubique porosus (Sowerb. t. 135). In optimo vigore sulphureo-lactescit.

Obs. Questo fungo, come insegnò giustamente Heufler, è il famoso Fungus Laricis aureus Mattioli Del Mattioli.

Vasc. Todaro, Fungh. sicil. I p. t. III f. 2 (18), 1866.
Syll. Fung. III p. 104 (at var.) – a Typo differt pileo roseo v. rubro.
Ic. 494, 495, 638, 639? 1787.
Hab. in ramis Robiniae, Carini, Sic. Occid. – Novembri in hortis Scalae.
Sub. mesenterium (Septa), ... (Lamellae).

57 Polyporus imbricatus (Bull.) Fr. S.M. I p. 357 (1821)
Sacc. Sylt. fung. VI, p. 106, Boletus imbricatus Bull. Champ. Fr. t. 366 (1786)
Jacq. Bull. l.c. ~~Neeg, elyst. t. 296~~ Rostk. u. Sturm Deutl. Fl. Pilze t. 21
Rbh. 216, 430, 585, 983, 1133, 1715

Trentino: Bressanone e Varna (Toldt)

Hab. ad truncos varios: Liguria, Piemonte, Litorale, Toscana

Area distr. Europa

Var. ramosus Bull. Champ. Fr. t. 418 (Boletus ramosus). Pileis clavatis undique porosis.
Rbh. 1129.
Hab ad truncos — Toscana: prov. di Siena (Tassi)

imbricatus 106

V

Caespitoso-multiplex, fibroso-caseosus, formulis, demum expallens, fatiscens, fulventi-opacus; pileis latissimis, imbricatis, lobatis, opacis, luteo-fulvis, ad marginem subzonatum pallidioribus; carne uda fuscescente, sicca alba; sporis minutis, rotundis, e pallido sordide luteolis, subfusco-ochraceis subferrugineascentibus; sporis subglobosis, 6 μ diam. (Britz.), v. subovoideis 6-7 = 4,5 (Bres.)

D.S. Pei colori del cappello, dei fori e della carne differisce da F. ~~subfuscus~~ candicans, ma Sc. Bres. Hym. Kmet. p. 6, potrebbe esserne solo una varietà più adulta.

58 Polyporus lacteus Fr. S. M. f. 359 (1821)
Sau. Syll. Fung. VI f. 108, Polyp. apalus Lév. in Ann. S. N. Bot 1848 IX f. 124.
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 182 f 1, Karsten, Finl. Basidsv. t 5 f 1, Patouill
Tab. anal. f. 246, Rostk. in Sturm Deut Fl. Pilze t. 23 (juven.)
Rbl. 245, 397, 398, 866, 61, (P. apalus), 1301
Hab. ad truncos, ~~coniferos~~ et ~~praecipue~~ fagineos — Liguria, Piemonte, Emilia
Area distr. Europa, Amer. bor, Ceylon, Australia.

, Trentino, su tronchi di larice e di pino ~~pr~~ presso Ortisei
e a ville Marjone (Bres. Ms.)

, Sect. X Molles Fr.
(Bjerkandera Karst., Leptoporus Quél. l. c.)

Obs. Molto affine a Polyp. adustus l. c. Bres. Ms.

lacteus 108

Candidus, piloso carnoso-fibroso, fragili, triquetro, pubescente, extus intusque azono, margine inflexo, acuto;

floris tenuibus, acutis, dentatis, demum labyrinthiformibus, laceris.

— Vulgo parvus, tenuis, sed interdum maior, transversim elongatus, valde declivis et postice gibbus, demum glabrescens et inaequabilis.

sporis hyalinis, subcylindricis, vel obovatis 4-5 = 2,5 (Bres. Mg.

59 Polyporus leptocephalus Fr. S. M. I p. 360 (1821)
elácc. Syll. fung. VI p. 108,
Icon. Rostk. in Sturm Deutsch. Fl. Pilze t. 26, Bull. Hymen. t. 598 f 20 et
t. 643 f. 169.
Rabh.
~~Hedw.~~

Hab ~~Area Italiæ~~ ad Pinea mucida — Emilia: prov. di Parma (Passerini).
Area distr. Europæa, Amer. bor.

a Collechio.

Tephrolecany

108

Pileo carnoso-caseoso, triquetro, obtuso, villoso, inaequabili, griseo, intus albo, zonato; poris rotundis elongatisque, obtusis, integris, albis ♀. — Vulgo imbricatis, transversim dilatatus, subtus planus, primo subgelatinosus.

♀; poris Hipnidis, carnosis, 6-7μ longis.

60 Polyporus pallescens Fr. S. M. I p. 369 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 114
Icon. Sow. Col Fng. t. 230 (1799) [Bol. pelloporus, non Batt. 1790], Bresadola.
Hymen. t. 643 fig. 170
Rabh. 418.
Hab. ad truncos et ramos arborum frondosarum — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli)
Area distr. Europa, Amer. bor.

611. Sec. Quél. Fl. mycol. p. 388 sarebbe una forma di Pol. imberbis.

pallescens 114

Pileo e carnoso suberoso, levi, glabro, azono, lutescente, margine acuto concolore;

poris curtis, minutis, rotundis, albis dein lutescentibus. Subcaespitosus, 5–8 cm. vel ultra latus, tenuis, affinitate anceps.

Ic. pros. Myprodei, 6–8 = 4.

61 Polyporus Ceratoniae Risso Fl. de Nice, p. 528-529, cum tab. (1844) Sacc. Syll. fung. VI p. 705

Icon. Risso l.c., Berk Clamp. Nic. t 30, f. 1-3, Corn. F. Napol. t. 7.

Rabl. 90, 434, 435, 983, 457.

Hab. ad truncos Ceratoniae Liguriae — Liguria, Neapolitano

Area distr. Italia, Gallia.

Subsp. aptat

Olla Ei pinkbotze ans dor Fal Polyp. sulphureus.

Cerafoniae 105

Subsessilis, e carnoso subcoriaceus;
pileo plano, glabrisculo, flavo-rubello;
carne alba, tenaci, hinc fibrosa;
poris minutis, brevissimis, sulphureis.

111. Dubita l'autore se sia diverso da P. ~~sulphureus~~ candicinus
ma ~~da~~ ne differisce per la carne non solo
bianca ma tenace e quindi fibrosa, mentre
in P. ~~sulphureus~~ candicinus è caseosa, floccosa e adulta
friabile, fatiscente. Anche dalla figura
appare semplice. Secondo Cooke, quélet è una
varietà di P. ~~sulphureus~~ candicinus.

62 Polyporus caesius (Schrad.) Fr. S. M. I p. 360 (1821)
Cav. Syll. Fung. VI p. [illegible] 113, XVII p. 114
Icon. Sow. Col. Fg. t. 226 (B. albidus), Grev. Champ. Fr. t. 458
Berk. Hymen. t 595 f 22.
Rab. 209, 244, 363, 417, 418 ♂
Hab. ad truncos varios, praesertim pinieos, fagineos etc. — Trentino,
Veneto, Toscane. (Valle Lagarina (Cob.), bosco di Tezolay etc. (Bres. MS.)
area dilat. Europa, Amer. bor.

caesius 17 - 114

Albus, hinc inde caesio-tinctus, 1,2 – 8 cm. latus, forma varians stipitatus et resupinatus; pileo carnoso, molli, tenaci, inaequali, tericeo; poris exiguis, inaequalibus, elongato-flexuosis dentatoque-lacerati; sporis ovatis (cerotis cum nucl. hyalinis) pallide caeruleis? ø 4-5, 5' = 1,5.

Ad.

"Questa specie dice Bresadola (Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903, pg. 73) quanto a forma e grandezza dei pori è variabile; talora è anche resupinato-riflessa o interamente resupinata. Vidi anche degli esemplari col cappello atro-caeruleo. Il Polyp: caeruleus Schum., specie a tutti gli autori ignota secondo me è da riferirsi a questa specie. Il carattere della sostanza ocracea non è forse vero.

63 Polyporus fragilis Fr. Elench. I. p. 86 (1828)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 111
Icon Fr. Icon. Hymen. t. 182 f. 2, Britz. Hymen t. 600 f. 26.
Bibl. 244
Hab. ad ligna abiegna putrescentia — Toscana: Vallombrosa (Cavara) Autumno.
Trentino: sui tronchi di pino a Flavon? (Bres. MS.)
Area Distr. Europa, Australia

fragilis 111

albidus, tactu fusco-maculatus;
pileo carnoso, fibroso, fragili,
plano-depresso reniformique, rugoso,
subtus convexo, latitudine varia usque
ad 5 cm.;
poris tenuibus, elongato-flexuosis,
intricatis; 6-7 = 4
sporis ~~6-guttulatis~~ vel (Bres. M.S.)
5 = 1,5-2, hyalinis, cylindraceis,
curvulis, saepe biguttulatis.
— Distinctissimus, licet nulla forma constans.
Variat etiam porrecto-stipitatus
pendulusque, ~~habitu dubii Sowerb.~~
~~t. 387 f. 6.~~

64 Polyporus destructor (Schrad.) Fr. S. M. I p. 357 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 115, Boletus destructor Schrad. Spic. Fl. germ. p. (1794).
Icon. Rostk. u. Sturm. Deut. Fl. Pilze t. 2 (P. albipaeus), Krombh. Schw. t. 5 f 8,
Mez, Hausschw. p. 111–113 f 41–46.
Bibl. 209, 244, 995 —
Hab. ad ligna uda, imprimis domestica fabrefacta, quae emollit et destruit — Veneto, Toscana, Napoletano
Piemonte: Valsesia (Carestia in Bres. MS)
area distr. Europa, Sibiria asiat., America bor.

Obs. Il Bresadola MS. sospetta che il P. destructor sia una forma del Polyp. albidus.

destructor 115

Pileo aqueso carnoso, effuso-reflexo, fragili, rugoso, subundulato, fuscescenti-albido, intus zonato;

poris elongatis, subrotundis, dentatis lacerisve, albis, confertissimis, ~~membrana f~~ totum fungum, membrana fungente excepta, constituentibus, valde subtilibus, aequalibus, 4-7 mm. longis; sporis suboviodis, 6=7.

65 Polyporus trabeus Rostk. in Sturm Deutsch. Fl. Pilze t. 28, Lau. Syst
fung. VI f. 112.
Icon. Rostk. l. c. Britz. Hymen. t. 600 f 28, Mez Hausschw. f. 114 f. 28.
Bibl. 671. 631
Hab. ad Pinum pineam — Cortica:
Area distr. Europa, Sibiria asiatica.

trabeus 112

Albus; pileo carnoso-fibroso, dein firmo, effuso-reflexo, transversim elongato, azono, pallido; poris curtis, minutis, subrotundis, elongatisve, dentatis, albis ♀ — ~~♂ ♀~~ .— ♂ Vulgo conjunctus cum P. destructore; utrique variat effusus et reflexus, glaber et fubescens, sed P. trabeus magis regularis, laetius coloratus, udus intus hyalinus, obsolete zonatus.

♀; spor globoso-ellipsoideis, 6-7 μ long.

66 Polyporus croceus (Pers.) Fr. S. M. I p. 364 (1821)
Sacc. Syll. fung. VI p. 117, Boletus croceus Pers. Obs. mycol. I p. 87 (1796)
Icon. Rostk. u. Sturm Deutl. Fl. Pilze t. 1.
Abb. 395, 398, 639. (1)
Hab. ad truncos putres, praesque quercinos — Piemonte, Lombardia, Sicilia.

Area distr. Europa.

croceus 117

Pileo carnoso, molli, tomentoso, azono, lute-
scente, intus fibroso, subzonato, 8 cm. et ultra lato;
poris curtis, inaequalibus, croceis;
sporis 7 μ longis.

— Species admodum variabilis, colore
lacte croceo fere Pleur. nidulantis
facile distincta, sed siccatus nigrescens.
Bene evolutus raro obvius.

67 Polyporus tuberosus (Bull.) Sacc. Boletus tuberosus Bull. Champ. Fr. t. 482 (1790)
Polyporus rubilans Fr. S. M. I p. 362 (1821)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 118 (ex errore typi. roseus) (rubilans)
Icon. Bull. l.c., Gill. Champ. Fr. t. 460, Vaund. et Sm. Myc. Ill. t. 45 (P.
Bibl. 397, 398, 430, 430, 1965, 983.
Hab. ad truncos arborum imprimis frondosarum — Nizzardo, Piemonte, Lombardia
Area disl. Europa, Mongolia, Amer. bor., Australia
Exs. Klot. Herb. myc. Ins. 1914, II n. 210 (Briolla: Orsi)

Ill. H. Fl. myc. p. 391, Pol. rubilans.

Suberosus = nidulans 118

Pileo carnoso, mollissimo, subpulvinato, e villoso levigato, azono, subgilvo, intus concolore, 1-2,5 cm. crasso; margine patente, subobtuso; poris elongatis, mediis, inaequalibus, angulatis, fulvo-testaceis; sporis ovoideis, minutis.
- Eximia species, sicca fragrans, mollitie insignis; duplex forma, altera gilva, altera subincarnata; pori majores quam in proximis.

68 Polyporus rutilans (Pers.) Fr. S. M. I p. 363
Sacc. Syll. Fung. VI p. 119, Boletus rutilans Pers. Ic. et Descr. fung. I t. 6, f. 3.
Fr. Pers. l. c.
Rbh. 245
Hab. ad ramos arborum, praesertim Querc. et Sorb. — Piemonte: Valtesia (Carestia).
Area digit. Europa

> Sect. XI Dichroi Fr. et Inodermei
(Bjerkandera Karst. p. p., Leptoporus Quél. p. p.)

rutilans 119

Pileo carnoso-lento, tenui, primo villoso, dein glabrato, azono, e fulvo-cinnamomeo expallente, intus concolore, demum exsucco, frigili, marginello inflexo sed non incurvo fimbriato-ove; at in P. cuticulari; poris curtis, minutis, tenuibus, aequalibus, acutis, cinnamomeis, subnitidis; sporis ovoideis-pruniformibus hyal. long. 4,5-6 ! 3-4.

— Forma varius, sed extenuatus, nec sulvinatus et utrinque convexus ut P. dryophilus

~~Polyporus imberbis (Bull.)~~

69 Polyporus gilvus (Schw.) Fr. Elench. I p. 104 (1828) Syn. Fung.
Sacc. Sylt. Fung. VI p 121 Boletus gilvus Schw. in Carol. p. 96 n. 897 (1822)
Icon. Low. Col. fig. t. 195 (Bol. imberbis, ex parte), Rick in Broteria
V (1906) t 4 f 7.
Bibl. 398
Hab ad truncos — Piemonte, Lombardia

Area distr. Britannia, Amer. bor., Italia, Australia

gilvus 121

Pileo carnoso-lento, effuso-reflexo, molli, levi, glabrato, azono, gilvo, 5-8 cm. lato, longitudinaliter vulgo effuso, loci suffocatis byssino, tacte molli, proprie velutino sed tam levigato ut glaber appareat; margine patente, tenui, acuto; poris exiguis, nudis, intergerrimis, gilvo-ferrugineis, oparis.

Polyporus amorphus Fr Obs. mycol. II p. 258 (1818)
Fries. Syst Myc. VI p. 127
Icon. Rostk. in Sturm Deut. Kr. Pilze t. 12, Gill. Champ. Fr t. 459
Hennings in Engl. Pfl. 1 p. 164 f 89 C., Britz. Hymen. t 600 f 119 et 624 f 27.
Bibl. 245, 446, 866, 419.

Hab. ad truncos putrescentes imprimis coniferos, caespitosus, frequens — Piemonte, Trentino, Emilia-Appennino. (Valle Lagarina (Cob.), Selva di Rabbi (Bres. MS.)

Area distr. Europa, Sibiria asiat., Amer. bor.

Amorpholy 127

Pileo carnoso-lento, tenui, effuso-reflexo, tericeo, candido;

sporis minutis, inaequalibus, aureis; sporis cylindraceis, curvulis, hyalinis, 4-4,5 = 1,5-2; basidiis 12-15 = 3-4. (Fig. xx. M.S.)

- Saepe caespitosis, imbricatis, valde irregularis, ad terram acubus fectam etiam resupinatis, interrupt

71

Polyporus dichrous Fr. S. M. I p. 364 (1821)
Sal. Syst. Myc. VI, 126,
Icon. Rostk. u. Sturm Deut. Fl. Pilze, t. 39, Bresf. Autenr. Vol. VIII f. t. II f. 38.
Rabh. 209, 1035.
Hab. ad truncos varios imprimis arborum frondosarum — Venetia: prov. di Treviso (Saccardo), Lazzo: pahd. Pontine (Bres. Ms.)
area distr. Europa, Amer. bor., Australia.

di Syrou 126

Pileo carnoso - lento, tenui, molli, effuso - reflexo, levi, sericeo, albo;

margine concolore, stricto;

poris curtis, minutis, rotundis, fusco - cinnamomeis, obtusis; sporis cylindraceis, curvulis 4-5 = 1-1,3; basidiis clavatis 12-15 = 4 (Bres. MS.)

— Pulchellus, saepe longe latissimeque effusus, margine tenui, reflexo.

72 Polyporus albus (Huds.) Fr. Epic. p. 456 (1836)
Sau. Syll. fung. VI p. 122, Boletus albus Huds. Fl. Angl. p. 626 (1778)
Icon. Bull. Champ. Fr. t. 433 f 1. (B. salicinus) Sow. Col. Fg. t. 227 (B. salicinus)
Britz. Hymen. t. 602 f 32.
Rabh. 983.
Hab ad truncos, praecipue salicinos — ~~Liguria~~ S. Ilario: a Nizza (Risso).
Area distr. Europa

albus 122

Pileo carnoso, tenuto, molli, azono, levi, glabrato, albo, in denum fuscescente, basi attenuato, intus similari, postice porrecto; poris minutis, curtis, rotundis, ex albo rufescentibus; sporis ovoideis, 6 µ long.

Obs. Certo affine a Pol. salignus e pel cappello posteriormente diritto assai prossimo a P. chioneus; ma infine fuscescente e prossimo a P. fumosus.

73 Polyporus crispus (Pers.) Fr. S. M. I f. 363 (1821) Sacc. Syll. Fung. VI f. 125 { Boletus adustus β. crispus Pers. Syn. p. 72 (1801) Icon { Bol. crispus Pers. Obs. mycol. II f. 8-9 (1799)

Icon. Britzelm. Hymen. t. 645 f. 176, Rostk. u. Sturm. Deut. Fl. Pilze t. 37. (non bona)

Bibl. 209, 244, 245, 404, 112, 1129, 1133, 1435, 1605, 1595 Bres. MS. (1)

Hab ad truncos varios — Piemonte, Emilia, Veneto, Toscana, Lazio Napoletano — Vere

Area distr. Europa, Amer. bor.

Trentino: lungo il Fersina (Bres. MS.)
Gocciadoro, Torzolano

crispus 125

Pileo e carnoso - lento coriaceo, tenaci, juniore fuligineo-nigro, floccoso-rugoso, azono, margine albo, adulto tenuiore, flexili, expallente, griseo, cinereo nigricante, glabrescente, zona ~~rugoso~~ ~~cinereo nigricante~~, ~~postice effuso~~ marginali (subinde pluribus) ~~fusca~~, tenui, crispa, fusca demum nigra; ~~postice effuso-reflexo~~ ~~reflexo~~, 5-8 cm. lato, 4-5 cm. longo;

~~margine tenui, crispo, demum nigro,~~

sporis majusculis, inaequalibus, demum labyrinthiformibus, argenteo - cinereis, Daedaleae facie; sporis hyalinis vel albis, obovatis vel ellipsoideis, 5-6,5 = 3-4 (Bres. M. S.

- ~~Micro~~.

74 Polyporus adustus (Willd.) Fr. S. M. I p. 368 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 125, Boletus adustus Willd. Fl. Berol. p. 392 (1787) ♀
Icon. Batsch El. Cont II t. 41 f. 226 (B. suberosus, 1789), Bull. Champ. Fr.
t. 486 (B. pelleporus, 1790), Pat. Tab. anal. f. 162, Rostk. u. Sturm t. 38.
Rab. 61, 101 207, 244, 417, 418, 430, 434, 585, 737, 866, 948, 983, 995, 1129,
1133, 1345, 1456, 1965

Hab. ad truncos, radices que arborum praecipue frondosarum — Liguria,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano Aestate — Autumno.
(Valle Lagarina (Cob.), Tergola, sopra Arugo (Bres. ms.)
Area distr. Europa, Amer. bor. Argentina, Australia, Nova Zelandia, India or., Cuba.

Exs. Sacc. Myc. ital. n. 1202, Myc. Ven. n. 11, 12.

♀ Boletus plumbeus Cumino
F. Vall. Visi n. 22 (1805)

Obs. Trovato talora quasi del tutto resupinato (Gr. Bill. n. 209)

Var. carpineus (Lasch) Fr. Hym. Eur. p. 349 (1874)
Hard. Syll. Fung. VI p. 125, Boletus carpineus Lasch, Cat. Fg. p. 281 (1803)
Icon. Lasch l.c.
Hab. Sec. ☉
Hab. ad truncos carpinos — Simlar: Bov. & Parma (Passerini)

Pileo carnoso-lento, tenui villoso, spurie zonato, rugulosis, cinereo-pallido, postice effuso-reflexo; margine stricto, nitescente; poris minutis, curtis, rotundis, obtusis, ex albido-pruinoso mox cinereo-fuscis, demum nigricantes marginalibus obsoletis; sporis ovato-oblongis, cylindraceis, vel ovatis, minute granulosis-hyalinis, in cumulo albis 4,5-5 = 2,5 vel 5-6 = 3 (Pres. Nos.)

Simile a P. fumosus ma più tenue, più fuscescente, cetera typi.

Pileo tenuiore, lute-
scente, cetera typi.

75 Polyporus fumosus (Pers.) Fr. S. M. I p. 367

Lasc. Syll. Fung. VI p. 123, Boletus fumosus Pers. Syn. p. 530 (1801)

Icon. Rostk. u. Sturm Deut. Fl. Pilz t. 42, Nees Syst. II ed. t 31 f 1-4,

Trattinik F. austriac. t. III f 5.

Bibl. 209, 434, 518, 430, 866, 1965

Hab ad basin truncorum emortuorum frondosorum — Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Napoletano. — Vere.

(Trentino: sui Salci presso Gardola. (Bres. ms.)

Area distr. Europa, Libria asiat., Amer. bor., Venezuela, Argentina.

Exs. Myc. Ven. n. 8, Thüm. Myc. Univ. n. 604 (Parmigiano: Posterula), Klot. Herb. myc. II n. 616 (Vercelli: Malisverni)

Obs. Sec. Bresadola (ms.) ha a abbastanza diverso da Pol. imberbis

fumosus 123

Pileo carnoso-suberoso, firmo, azono, e sericeo glabrescente, fuligineo-pallido, postice dilatato-adnato, intus fibroso, subzonato, 5-12 cm. lato;

pori minuti, curti, rotundi, integri, albido-fumosi, fritis obscurioribus;

sporis hyalinis, ovato-oblongis = vel subcylindraceo-curvulis, 6-7 = 4-4,5 (Bres. M. S.)

— Caespitosus, imbricatus, sat crassus, marginem versus nigrescentem attenuatus; color plus minus fumosus.

76 Polyporus tirolensis Sacc. et Cub. in Sacc. Syll. VI p. 136 (1888), Polyporus Schulzeri Kalchbr. in Verhandl. Zool. bot. Ges. 1868 p. 431, non Fr. Icon. deest. Abb. 640, 1715 et Sacc. l. c.

Hab. ad truncos Populi et Quercus — Tirolo cisalp.: Bolzano (Haussmann)

Area distr. Gal. bor. Tirolo.

> Sect. XII Hispidi Fr.
(Tronotus Karst. Inodermus Quél. p. p.)

tirolensis 136

Pileo effuso-reflexo, plano-convexo, subinaequali, incurvo vel gibbo, pilis rigidis adpressis vestito, fibroso-lignoso, margine acuto, leniter crenato, 2-8 cm. longo latoque, basi 12-18 mm. crasso, pallide brunneo, obsolete zonato et sulcato; poris elongatis, 4-7 mm. longis, latiusculis, rotundis, integris, subaequalibus, pallide ligneis, senio ore brunneolis.

77 Polyporus borealis ~~(Wahlenb.)~~ Fr. S. M. I p. 366 (1821)
Sall. Syst. Myc. VI p. 134, Boletus borealis Wahl. Fl. Suec. II p. 956 (1826)
Icon. Kalchbr. Ic. Hym. Hung. t. 35 f. 2, Pers. Mal. pl. agr. f. 145-146,
Rostk. u. Sturm. Deutschl. Kr. Pilze t. 40, Atkins. Mushr. p. 9-10, f. 9-10.
Bull. 418, 866.

2 Area distr. Europa, Sibiria asiat., Amer. bor. Australia

1 Hab. ad truncos prostratos pineos — Trentino, Emilia, Nizzardo (Barla in Bres. MS.)
(: valle Lagarina (Kob.), bosco di Terzolas altitzne (Bres. MS.)

Ex albo lutescens; pileo e spongioso suberoso, compacto, subpulvinato, hirto, intus parallelo-fibroso; margine patente; poris adnatis, inaequalibus, sinuoso-flexuosis lacerisque, albis;

v. ovato-oblongis vel 6-7=4-4,5

~~sporis subovatis, ——— vitreis, ——— 5-6=4-5, vel ovato-oblongis vel ellipsoideis~~, lutcolis et asperulis, ~~5-6 4-5 6-7 4-5~~ Spor. 4-5=3 basidiis 15-20=4-5; cystidiis variabilibus, subfusoideis, saepe apice furcatis, e granuloso lividis 15-30=8-15 (Bres. Mc.)

Species notandi: B. montanus pileo carnoso, crasso, hirto, margine obtuso; poris obtusis, integris.

C spathulatus pileo tenui, villoso; margine acuto, in stipitem brevem lateralem porrecto; poris tenuibus, valde lacerisi.

Obs. Dalle specie prossime è egregiamente distinto da giovane è pur carnoso, ma adulto è suberoso: del resto molto variabile.

78 Polyporus spumeus (Sow.) Fr. S. M. I p. 358 (1821)

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 134, Boletus spumeus Sow. Col. fig. t. 211 (1799)

Icon. Sow. l.c. Berkeley Outl. t. 16 f. 4.

Bibl. 866, 399 (P. spumosus)

Hab. ad arbores vetustas adhuc vivas, imprimis Ulmos et Mori — Emilia: prov. di Parma (Pallerini), Lombardia (Cesati). Aut.

Area Distr. Europa, Amer. bor. (Trentino: Magras, Trento sul monte dei Cappuccini (Bresad. MS.), Veneto

Exs. Erb. crit. ital. II n. 877, Soc. Myc. Ven. n. 13 (P. retinosus)

Spunev 134

Albidus; pileo carnoso-spongioso, compacto, pulvinato, gibbo, rugoso-hispido, circitèr 8 cm. lato, carne marginem incurvatum versus zonata; basi stipitiformi; foris secedentibus, minutis, rotundis, acutis, integris; sporis hyalinis, subglobosis, 1-guttulatis, 6-7,5=5-6 (Bres. N. S.) — Valde nobilis species.

79 Polyporus pubescens (Schum.) Fr. S. M. I p. 367, Sacc. Syll. Fung. VI p. 135, Boletus pubescens Schum. in H. Dan. t. 1790 f. 1. ( )
Icon. Schum. l. c. (ad carn. non pertng.)

Bibl. 245

Hab. ad ramos et truncos praecipue betulinos — Piemonte: Valsesia (Carestia). in Riva-Valdobbia

pubescens 135

Pileo e carnoso-lento suberoso, molli, convexo, subzonato, pubescente, extus intusque albo, → 2-6 cm. lato. ; margine acuto, demum lutescente; poris curtis, minutis, subrotundis, planis; sporis albis, ellipsoideo-oblongis, 6-8 μ longis.

Obs. S'accosta ai Coriacei ma sembra dovers̃i collocare in questo luogo. Comunemente è distrutto dalle larve, restando solo la cuticola.

Cfr. ~~Fomes annosus Fr.~~

80 Polyporus coruscans Fr. in Vet. Akad. Förhandl. 1851 p. 52, Sacc. Syll. Fung. VI p. 131.
Icon. (deest) Bibl. 434.
Hab. ad truncos vetustos, imprimis quercinos — Napolitano: (Como), Toscana: Firenze (Martelli in Bres. Ms.) Rieme.
Area distr. Svezia, Italia

Obs. Sec. Quél. Fl. mycol. non è distinguibile dal Pol. corcens.
~~È Pol. rheades Bres. (sungi Brid. non Pers. (Bres. Ms.)~~

corrycans 131

Maximus, extus intusque aureus;

pileo tuberculiformi, spongioso-fibroso,

molli, pubescente, tuberculo 30-60 cm. effuso=
protuberante, non vel obtusissime marginato, e plu=
ribus, ut apparet, coalito;
poris curtis, minutis, subrotundis,

inaequalibus, obscurioribus; carne crassissi=

ma, eximie fibrosa, ambitu zonata;

sporis aureis ellipsoideis 7-7,5 = 4,5-5,5

(Bres. M.S.)

81 Polyporus corticularis (Bull.) Fr. S. M. I p. 363 (1821)
Syn. Syst. Myc. VI p. 128, Boletus corticularis Bull. Champ. Fr. t. 462 (1789)
Icon. Bull l.c.
Rabh 209, 410, 418, 430 585 886 1139.
Hab ad caudices arborum imprimis frondosarum — Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia, Toscana. Sept
(Valle Lagarina (Cob.) boch. d. Magras (Bres MS.)
Area Syst. Europa.

cuticularis 128

Pileo tenui, spongioso-carnoso, dein exsucco, applanato, hirto, tomentoso, e ferrugineo-fusco nigricante, intus laxe et parallele fibroso, margine fibroso-fimbriato, incurvato; poris minutis, longis, e pallido ferrugineis;

sporis copiosis, ~~ochraceis 5-6-3~~ subglobosis vel ellipsoideis, sub microscopio ochraceis vel luteis, nucleo oleoso hyalino, 6-7 = 4-5 (raro 6); setulis fulvis 21-24 = 6-10 (Bres. Mon.)

Hab. Affine a Pol. ~~spongia~~ ma molto più tenue, e molle, coi pori più lunghi della carne.

82 Polyporus Hausmanni Fr. Hymen. Eur. p. 552 (1874), Sacc. Syll. Fung. VI p. 131.

Icon. (deest) Bibl. Fr. l.c., 640, 1215

Hab. ad truncos vetustos — Tirolo cisalp.: pr. Bolzano (Hausmann)

Area distr. Habi. bor. Tirolo

Hallsmanni 131

Pileo dimidiato-flabelli, spongioso, hirsuto, umbrino-fusco, intus pallido; pori majusculi, subangulati, integerrimi, profundi, pallidi.

N.B. Fries lo ascrive agli Spongiosi per la carne molle, fibrosa di Pol. hispidus, ma il cappello non è hispido e i pori sono maggiori ed interissimi.

83 Polyporus Tamaricis (Pat.) Sacc. et D. Sacc. Syll. Fung. XVII p. 111,
Polyp. Rheadey Bres. F. Tirol. t. 136, non Pers. Xanthochrous Tamaricis
Icon. Bres. l. c. II, p. 30, Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr
Rabh. 234 (1) 1904 p. 51

Hab. ad basin trunci Tamaricis aliasque arborum — Trentino ignaviæ raro,
Toscana: pr. Firenze (U. Martelli in Bres. ms.)
Area distr.: Africa bor., Italia bor.

Exs. Myc. Hel. n. 1202

Cf. Bres. Lungo

Camarici 17-III

~~A P. Rheade Pers~~ (P. Rheades Sch. v. Tol.)

Pileo spongioso-carnoso, semiorbiculari, convexo-plano, velutino, tandem glabrato, numquam sulcato, margine integro-reflexo, ultra 5-8 cm. (4 to) longo, ~~ultra 10 mm. crasso~~ (5-6 cm. antio producto), lute=scente-ferrugineo; trama molli, laxa, lacte flava et zonis alternatis flavis brunneisque variegata; poris subtubulosis, subaequalibus, cinnamomeis; sporis 8-15 µm. longis. ~~(nec 5-6 = 4)~~ ellipsoideis 7-8 = 4,5-5,5 lateis.

~~A P. Rheade Pers. differt dimensionibus maioribus, praecipue crassitie maiori, trama molliore laxiore, lacte flava et zonis alternatis flavis brunneisque variegata; pileo brevius velutino, tandem glabrato, numquam sulcato, sporis 8=9 (nec 5-6 = 4)~~

Obs: Affine piuttosto a P. ~~hirta~~ hispidus che a P. Rheades.

84

Polyporus rheades Pers. f. Myc. Eur. II p. 69 (1825), Fr. Hym. Eur. p. 551
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 130.
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 184 f. 3 / Polyp. fulvus Fr. f. Lèd non Pers. nec Fr. l.c.
Rabh. Sacc. Fung. ex im. Malta fer. I n. ~~Fungi Italici~~ Bull. Soc. Bot. Ital. 11 Dic. 1912, p. 316.

Pileo sporgioso-carnoso, semiorbicolari, convexo-plano e sbrisoso denudato 6-8 cm. lat.
stellulose, lutescenti-ferrugineo, margine intero, reflexo, tramа unicolori aureo-fulva
subaequabili, cinnamomeis, stratulis nullis i poris tubulosis,
subaequalibus, cinnamomeis, i poris e globoso ellipsoideis, basi brevissime apiculatis, 6-7 = 4-5 µ, dilute cinnamomeis, 1-2-guttulatis, levibus.

Hab. ad caudices Pini sp.? — Malta: nel cimitero dell' Addolorata (Carmana-Gatto). Come è ben noto il Polyp. fulvus Pers. è un Fomes.

85 Polyporus spongiä Fr. Monogr. Hym. II p. 268 (163)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 128.
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 180 f. 2, Lucand Champ. Fr. t. 172, ? Rostk.
Deutschl. Pilze, t. 18 (Polyp. Herbergii)
Bibl. 564, 1965 D
Hab. ad truncos vetustos arborum — Lombardia: prov. di Cremona (Farneti)
Area distr. Europa.

Spongiae 128

Caespitoso-multiplex; pilis spongioso-mollibus, numerosissimis, dimidiatis, in caespitem amplum connatis, applanatis, scruposo-rugosis et hirto-leprosis, brunneo-ferrugineis (siccis fulvo-ferrugineis); poris curtis, mediis, integris, e sulphureo fuscescentibus; sporis ellipsoideis 7-9 μ longis.

Obs. Molto affine a *P. sistotremoides* ma diverso per la statura, il colore e specialmente per ~~la~~ i pori minori ed interi. ~~Il P. Herbergii~~ ~~conviene chiaramente dalla descrizione~~, ~~ma la figura imbiancolita s'allontana per abito e colore~~.

86 Polyporus hispidus (Bull.) Fr. S. M. I p. 362 (1821) 493

Sacc Syll. Fung. VI p. 129, Boletus hispidus Bull. Champ. Fr. t. 210 (1784) et-

Exs. Fl. crit. ital. I n. 42, Myc. Ital. 213, Myc. Ven. n. 12, Rab. F. Eur. p. 606 (Valsesia: Carestia)
Kl. Hyst. myc. n. 1913 (Vercelli: Cesati)

Icon. Bull. l. c., Gill. Champ. Fr. t. 461, Krombh. Schw. t. 48 f. 7-10,
Quél. Champ. Jura I t. 18 f. 3, } Pat. Tab. anal. fig. 140. Cr. Malad.
Bert. F. mors. t. 5.
pl. agricol. fig. 156-161.

Bibl 61, 90, 101, 123, 141, 143, 209, 246, 263, 65, 131, 318, 357, 397,
564, 568, 585, 678, 725, 836, 866, 907, 983, 1015, 1133, 1170,
528, 631. 700, 1965, 1301

Hab. ad truncos arborum frondosarum, raris Coniferarum saepius Mori — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Marche, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano
Sicilia, Corsica .. Aestate-autumno ; Negras en. (Bres. MS.)

Area disb. Europa, Amer. bor. Australia

hypidus 129

Pileo compacto, spongioso-carnoso, dimidiato, fulvinato, ~~hispido~~ hispido, subferrugineo, intus divergenti-fibroso, 10-15 cm. lato;

sporis minutis, rotundatis, subdiscretis, fimbriatis, pallidioribus, e lutescente fuscescentibus;

sporis ~~ovoideis~~ Haud, subglobosis vel globoso-ellipsoideis, interdum guttulatis, 8-10 = 7,5-9 (Brev. Ms.) — Maior, decolorans.

7

Fomes

41/0003 - B - 1

Fomes

Conspectus synopticus specierum (*)

α Fung. homomorphi, majores, primitus non subcarnosi

A_1 - Contextus albus vel pallidus (Sect I Endolencus)

B_1 - Pori albi vel albidi

C_1 - Pileus villosus, imbricatus

D_1 - Pori semper stratosi ---------- 1. F. connatus

D_2 - Pori non stratosi ---------- 2. F. populinus

C_2 - Pileus glaber vel sericeus

D_1 - Pileus superne truncatus, lateribus perpendicularibus undulato-sulcatis ---------- 3. F. Gelsorum

D_2 - Pileus aliam formam praebens ---------- 4. F. annosus

B_2 - Pori demum colorati

C_1 - Pileus levis

D_1 - Pileus castaneus ---------- 5. F. populneus castaneus

D_2 - Pileus aurantius badioque variegatus ---------- 6. F. variegatus

C_2 Pileus tuberculosus vel demum concentrice sulcatus

D_1 - Pori rufo-ferruginei ---------- 7. F. fraxineus

D_2 - Pori lutescentes vel ochroleuci

E_1 - Pileus sitaneus albus; pori stratosi 8. F. ulmarius

E_2 - Pileus e fulvo nigricans; pori non distincte stratosi ---------- [9 F. ungulatus]

A_2 - Contextus coloratus (Sect II Endochromus)

B_1 Pileus extus intusque et pori rosei ---------- 9 F. roseus

B_2 Color fungi diversus

C_1 - Contextus spadiceus vel umbrinus

D_1 - Pileus spadiceus, tomentosus, conchaeformis. ---------- 10 F. conchatus


D_2 - Pileus lacteus, glaber ---------- 11 F. Inzengae

Note

(*) Si in questo Prospetto sinottico che su tutti gli altri di quest'opera la disposizione delle specie è puramente artificiale e non naturale a tale è pur quella corrispondente nel testo. Per le determinazioni si faccia larga ricerca.

C_2 – Contextus lutescens, alutaceus, fulvus vel ferruginascens.
D_1 – Pori rubro-sanguinei – – – – – – – – 12 F. rubriporus
D_2 – Pori nunquam rubri
E_1 – Pileus primo tomentosus, velutinus, vel flocculosus
F_1 – Pileus fulvus, demum canescens – – – 13 F. fulvus
F_2 – Pileus demum umbrinus vel nigricans
G_1 – Pori ferruginei, demum fuscescentes 14 F. robustus
G_2 – Pori cinnamomei vel fulvenți
H_1 – Pileus floccolosus, levis – – 15 F. igniarius
H_2 – Pileus tomentosus vel velutinus
I_1 – Pileus e ferrugineo umbrinus, leviusculus – – – 16 F. Ribis
I_2 – Pileus fusco-nigricans
L_1 – Margo tumens, ferrugineus – – – – 17 F. Loniceræ
L_2 – Margo acutus – – 18 F. Evonymi
E_2 – Pileus glaber vel adpresse sericeus
F_1 – Caro lutescens vel alutacea
G_1 – Pileus e pulvinato angulatus, ad marginem cinnabarinus – – – – – 19 F. angulatus
G_2 – Pileus applanatus, ad marginem versicolori-zonatus – – – – – – – 20 F. marginatus
F_2 – Caro ferruginascens vel fulvens
G_1 – Pori umbrino-purpurei – – – 21 F. roburneus
G_2 Pori ferruginascentes
H_1 – Pileus, præter marginem, niger vel fuligineo-canescens ~~– – –~~ 22 ~~F.~~
I_1 – Pileus remote concentrice sulcatus, opacus – – – 22 F. fomentarius
I_2 – Pileus dense concentrice sulcatus, nitidus – – – 23 F. nigricans
H_2 – Pileus cinnamomeus vel rufescenti-ferrugineus
I_1 – Pileus lignosus, durissimus, ~~senex~~ glaber; pori minimi 24 F. salicinus
I_2 Pileus suberoso-stupeus, sericeus; pori longissimi – – 25 F. cryptarum

B Fungi heteromorphi, initio subcarnosi, demum duriusculi, minutuli (sed varius v. hydrophilus) (Cfr. Polyporus Brauniæ n. 2)



Tomes

(1857)

Fomes Fr. Nov. Symb. pg. 31, Cooke Pracc. p. 117; Sacc. Syll. Fung. VI pg. 150. (Etym. fomes)

Pileus primitus lignoso induratus (raro mollis, plorans), contexta floccoso-intertexto, crusta rigida obductus, azonus, sed demum concentrice sulcatus, perennis, successive strata nova gerens, revivescens, et sed stratum recens tantum vegetum. Sporae hyalinae v. pallidae. Consistit in pileis cute ~~non indicata~~ varius adnat.

Obs. Vi sono molte specie ambigue fra questo genere e i Polyporus lignescenti. ~~Molte specie dagli autori originali sono indicate sotto il genere Polyporus; questa natura viene poi per amore di brevità mettiamo. Gli autori principali che hanno fatto questa riduzione sono Fries in Nov. Symb. Mycol. e Cooke in Pracc. Mon. Polyp.~~

Anche questo genere è stato smembrato nel modo più diverso da taluni autori moderni. Noi abbiamo adottato il gen. Ganoderma, che facilmente si riconosce dai tipici Fomes.

Sect I. Eudoleucus

1 Fomes connatus (Weinm.) Grll. Champ. Fr. p. 684 t. 465 x (1874)
Jacz. Syll. Fung. VI p. 196 et IX p. 176, Polyporus connatus Fries Epicr.
p. 472 (1838)
Icon. Battarra, F. Arim. t. 37 f. G (Agaricus lignosus informis)
Fr. Icon. Hymen. t. 185 f. 2, Gillet l. c.
Bibl. 103.
Hab. ad truncos ulmeos, — Emilia: pr. Rimini (Battarra), Tridentino: bosch. S. Sambuco presso Bolentina (Bres. MS.) sambuchos etc.

Area distr. Europa, America Bor. Australia.

tanto più che nella fig. di Fries i pori ne appajono stratosi.

Obs. Sec. Bresad. MS. va differente specificamente dal Fomes populinus (Schum.) e dubito se il Polyp. obducens sia la forma resupinata di questa specie, come vorrebbe il Cooke.

connatus 196

= D-176

(196)

Pileis suberoso-lignosis, effuso-reflexis, scabari-imbricatis, concrescentibus, villosis, albis cinereisve intus porisque stratosis, minutis, subrotundis, albis; sporis globosis, hyalinis, 4-5 μ diam.; cystidiis capitatis, echinulatis (Bres. M.S.)

Obs. Il P. connatus Weinm. Bot. f. 332 nacque pure sugli Aceri, conviene con questa specie, eccetto il cappello che è latprizio. Este Karsten (Hedw. 1889) il Polyp. obducens rappresenta una forma resupinata. Invece secondo Cooke (Grev. XVII fg. 58) il Pol. obducens sarebbe il Pol. saligny resupinato. Che siano specie diverse?

Fomes populinus (Schum.) Cooke in Grev. XIV p. 20 (1885)
Sacc. Syll. fung. VI p. 197, Polyporus populinus (Schum.) Fr. S. M. I p. 367 (1821)
Icon. Flor Dan. t. 1791
(Boletus populinus Schum. Fl. Sall. II p. 384.
Bibl. 209, 661, 866, 528.
Hab. ad truncos Populi albae et nigrae — Canton Ticino, Veneto, Emilia.

Var. Deducens Fr. a forma typica pileo resupinato dignoscitur
Hab ad truncos quercinos etc. — Trentino (Bres. Ms.)

Obs. Lec. Quélet e Bresadola da riunirsi a Fom. connatus. Col nome di Trametes populina io pubblicai i non ho presente specie, ne la forma pelli. di T. Trav. lutescens. Cfr.

Poriuk nuy 197

V

Albus; pileo suberoso-lignoso, rigido, azono, villoso, intus ~~concolore, intus~~ candido, non stratoso;

margine obtuso;

poris minutis, curtis, rotundis; sporis globosis, hyalinis, 3–4 μ diam.

– Imbricatus, basi decurrente connexescens, transversim dilatatus; pilei singuli 1–1,5 cm. lati.

Obs. Fries in Copelus nigra lo vide quasi solitario col cappello prima fioccoso-farinoso, vecchio durissimo e lignoso. Secr. n. 60 colla carne alutacea (a meno che non fosse imbevuto dei succhi dell'albero) è diverso.

Forse non è che questa specie

Trametes lignicola (populina) Lasch.

in Rb. Herb. n. 1809 Bot. Zeit 1854 pg. 86.

Fomes Gelsorum (Fr.) Cooke in Grev. XIV p. 17 (1885)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 168, Polyporus Gelsorum Fr. S. M. I p. 377 (1821)
Agaricus ~~pulcherrimus stratosus~~ gelsorum Batt. F. Arim. p. 70 t. 37 f D., Agaricum Gelsij seu Morij adnascens ex obscure ferrugineum inferne album... Micheli N. gen. pl. p. 118 n. 3.
Icon. Battara l.c.
Bibl. 785, 103, 989, 209.
Hab. ad truncos Mororum — Veneto: presso Verona (Pollini), Lombardia presso Pavia (Pollini), Toscana: presso Firenze (Micheli), Emilia: presso Sarzana (Battara)

Oss. La specie rimane un po dubbia; sembra però molto affine a Fomes fomentarius. Il Berlese dimostrò in Boll. soc. bot. ital. 1889 e in Malp. 1889, che la specie riferita dal Martelli in Boll. soc. bot. it. 1889 p. 531 corrisponde non all' Fomes Gelsorum Fr. ma all' Agaricum Gelsij seu Morij adnascens... inside luteum ubique superne subhirsutum... Micheli l.c. p. 118 n. 7 cioè al Polyporus hispidus, che il Martelli asserma essere mangereccio in Toscana

Gelsorum 168

Pileo suberoso-lignoso, durissimo, glabro, superne truncato, subtus plano, lateribus perpendicularibus, undulato-sulcatis;

foris minutissimis, albis.

— forma admodum singularis, si constans.

Fomes annosus (Fr.) Cooke in Grev. XIV p. 20 (1885)
Sacc. Syll fung. VI p. 197, XVII p. 120, Polyporus annosus Fr. S. M. I p. 375 (1821) Tramates radicis perdax
Icon. Fr. Icon Hymen. t. 186 f. 2, Hartig, Raumkrank. p. 77-79 et tab. 3, f 1, Rostk. in Sturm. Deut. Fl. Pilze t. 29 (Pol. retinosus), Hennings in Engl. Pflanzenfr. I p. 159, Voglino Patol. veget. p. 218-219.
Bres. 417, 418, 244, 245, 437, 1031, 1083, 1109

Coniferarum, variis arborum frondosarum

Hab. ad radices truncorum in Piemonte, Veneto, Trentino: valle Lagarina (Cob.), Toscana. — Aestate (Terzolas ad altrove (Bres. MS.)

Area dist. Europa, Amer. bor., Cuba, Australia.

Exs. Mycoth. Ital. n. 407

Ott. Torrag. Pileo resupinato dei Larici, e pini del Trentino (Bres. MS.)

annotuy

197 e 17-120

Pileo lignoso, e convexo applanato, rugoso-tuberculoso, fuscaneo brunneo sericeoque, hornotino annotoque crusta rigida, glabra, nigricante obducto, intus albo, toto 10-13 cm. longo, 5-8 cm. lato; poris mediis, albidis; sporis ovoideis vel oblongato-ovoideis (vel ellipsoideis) hyalinis, 5-6 = 4-4,5, uno latere depressis laxe et minute punctatis (Bres. M.S.) ~~vel subg. sphaeroph. vel ellipsoid.~~

Obs. Specie molto varia per forma, ma bene e chiaramente distinta. ~~Questa specie~~ Species haec praecipue in fodinis ad ligna fabrefacta coniferarum sub omnibus formis frequentissime obvia; in silvis vero magis communis forma reflexa (= Polyporus marginatus Rostk.) (Bresadola, Fungi polonici in Ann. Myc. 1903 pg. 75).

Fomes populneus (Pollini) Sacc.

Polyporus Fomes cartaneus (Fr.) Cooke in Grev XIV (1885) p. 20

Sacc. Syll. Fung. VI p. 198, Polyporus cadaneus Fr. S. M. I p. 369 (1821)

Polyp. populneus Pill. N. Veron. p. 36 (1816) et Fl. Veron. III p. 611 + 2 f. 5

Fom. Pollini l. c., Britz. Hymen. t. 610 f. 62.

Bibl. 988, 989, 209.

Hab. ad truncos Populi nigrae — Veneto: prov. di Verona presso Caldiero Autumno.

Area distr. Italia, Germania.

castaneus 198

Pileo coriaceo - lignoso, applanato, cvi, glabro, azono, castaneo, intus albo, vix 5 cm. crasso;

poris curtis, rotundis, minimis, luteolis, marginem versus fuscescentibus.

Obs. Corrisponde a P. variegatus ma è minore e diverso pei colori. Sembra leucospora.

P. castaneus Rostk. è diverso per il cappello zonato e la tessitura.

6 Fomes variegatus (Sow.) Cooke in Grev. XIV p. 21 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 200, Boletus variegatus Sow. Col. Figs. t. 368

Icon. Sow. l.c. ~~Col. Fig. t. 368~~
Bibl. 283, ~~Secr. Myc. Saille n. 65~~

Hab. ad truncos, imprimis fagineos: Neapolitano: prov. d Barletta (Brun.)
~~Nelus~~ (Lenzet.)

Area distr. Europa

variegatus 200

Pileo suberoso-lignoso, ~~glabro~~, subapplanato, levi, glabro, azono, nitido, aurantio-badioque variegato, intus pallido;

poris rotundis, minutis, curtis, inaequalibus lacerisque, ludescentibus.

Hab. Habitus di P. varius ma la base è decorrente e, Sowerby, quanto a sostanza, lo paragona a ~~Fomes~~ Ganoderma Pseudoboletus.

7 Fomes fraxineus (Bull.) Cooke in Grev. XIV (1885) p. 21
Fam. Sylt. Fung. VI p. 199, Boletus fraxineus Bull. Champ. Fr. t. 433 f 2 (1789)
Icon. Bull. l.c. Brfelm. Hymen. t. 618 f 97.
Bibl. 32, 209, 85, 430, 585, 983, 1133, 101

Hab. ad truncos fraxineos (Partical etc.) Liguria, Piemonte, Veneto, Piemonte, Toscana; Sardegna.
Firenze (U. Martelli in Bres. Mss.)

Area distr. Europa, Amer. merid.

Exs. Erb. crittt. ital. II n. 1452

fraxineus 199

Pileo suberoso-lignoso, glabro, subapplanato, azono, ex albo rubiginoso fuscoque, primo levi, dein concentrice sulcato-plicato, intus pallido;

poris minutis, curtis, rufo-ferrugineis, primo margineque villo sebaceo, albo obductis;

Sporis 6-7 μ longis; Sec. Bres. MS. oborato-sphaericis, hyalinis, 7-8 = 6-6,3

— forma varia, junior mollior, sed non carnosus, vere perennans; → sed non stratosus; basi subdecurrens.

~~Obs. Il n. 68 di Secr. (escluso il sin. di Pol. lucidus) può appena esser diverso.~~

8. Fomes almaricus (~~Bol.~~ Sow.) Gill. Champ. Fr. p. 683 (1874)
Syn. Syll. Fung. VI p. 166 Boletus almaricus Sow. Col. fig. t. 88 (1797)
Icon. Sow. l. c. (stipes), Berk. Outl. t. 16 f. 5 (adultus), Briosi e Cav. F. paras. n. 169, Gill. Champ. Fr. tab. suppl.
Bibl. 101 355, 357, 639, 866; Bres. Mi.
Hab. ad truncos, imprimis Ulmi — Lombardia, Emilia, ~~Liguria~~, Toscana; Sicilia.
Area distr. Europa, Amer. bor.
(Pavia casarile)
(Firenze / Martelli in Bres. MS.)
Ex. Briosi e Cav. F. paras. n. 16, Klot. Herb. viv. myc. II n. 616 (Varallo: Malinverni)

Obs. N. Gill. riunisce questa specie al Fomes fraxineus sotto il titolo di Fom. o Placodes inclusus (Fl. mycol. p. 397), mod. l. c. Bres. MS. ne è specificamente distinta

ulmarius 166

Pileo suberoso-lignoso, durissimo, incrustato, tuberculoso, glabrato, sitanco albo, contextu albo;

poris rotundis, stratosis, lutescentibus;

sporis globosis 7-8 μ longis, 6-6,5 μ diam., vel globoso-ellipsoideis 6,5 = 6, ~~globosis, vel ellipsoideis globosis~~, hyalinis (Bres. MS)

— Sessilis, ~~dilatatus~~ explanatus, 8-11 cm. latus, tuberculosus.

Sect II Xylochrous.

9 Fomes roseus (Alb. et Schw.) Cooke in Grev. XIV p. 19 (1885)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 189, Boletus roseus Alb. et Schw. Consp. Fus. p. 251
(1805), Polyporus roseus (Alb. et Schw.) Fr. S. M I p. 372 (1821)
Bibl. Bresadola MS.
Hab. ad truncos caespitosos — Trentino: bosco di Calceranica (Bres. MS.) Aest. Aut. rario

Area distr. Europa

Obs. Lec. Frey la Poria Halachka Hoffm. Veg. Crypt. p. 11, t 7 è una
mostruosità sotterranea delle presente specie.

Rosenj 189

Pileo suberoso-lignoso, duro, triquetro, levi, subfasciato, extus intusque roseo, extus fuligine cinereo-nigricante adflato, intus floccoso-fibroso, 5-12 cm. lato, basi 1-3 cm. crasso;

sporis minutis, rotundis, concoloribus;

sporis 6 µ longis! — Subcaespitosus.

(0 Fomes conchatus (Pers.) Gill. Champ. Fr. p. 685 (1874)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 146, Boletus conchatus Pers. Obs. myc. I p. 24 (1796)
Polyporus conchatus (Pers.) Fr. S. m. I p. 376.
Icon. Britzelm. Hymen. t. 607 f. 52.
Rabh. 61, 430, 434, 638, 866, 986, 858. 0
Hab. truncos salicinos, fagineos etc. — Liguria, Umbria, Napoletano, Sicilia — Aestate
Trentino: boschetto lungo il Noce (Bres. ms.)
Area distr. Europa, Tunisia, Amer. bor. Australia. sui salici

On. Ser. Bresadola Hym. Konet. p. 11 Officialmente può separarsi
da Fomes salicinus

conchatus 174

Pileo suberoso-fomentario, semi,
effuso, subconchaeformi-reflexo, subtus concavo,
concentrice sulcato, fomentoso,
spadiceo; margine acuto;
poris curtis exiguis, trama semi,
concolore; sporis subglobosis, 5-6=4-5, maequilateralibus, saepe uno latere compressis, hyalinis, 1-guttulatis (Bres. MS.)
-Variat tubo resupinato, qualis a
F. sabcino probe distinguendus (Fr.)

11 Forme Inzengae (De Not.) Cooke, in Grev. XIV p. 18 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 175, Polyporus Inzengae De Not. in Erb. crit. it.
I n. 636, II n. 977.

Icon. Inzenga, F. Icil. I t. II f 1.

Bibl. 61, 85, 434, 638, 725, 895, 945, 983, 1090, 1456

Hab. ad truncos imprimis Populi et Quercus — Liguria, Piemonte, Veneto, Napoletano, Sicilia, Sardegna.

Area distr. Italia, Sicilia — Trentino: Trento al Desert e Ala ar Ronchi (Bres. M.S.)

Exs. Erb. crit. ital. II n. 977, Rab. F. Eur n. 1508 (Sannio: Pedicino)

Obs. Semibra una copiosa var. del Forme fomentarius, anche sec. il Bresa-dola (M.S.)

Inzenga 175

Pileus suberoso-fomentario, convexo-dilatato, dense concentrice sulcato, glabro, incrustato, lacteo, intus molli, subumbrino; pororum strato crassissimo, albra 2,5 cm., umbrino, zona obscuriore a pileo limitato; poris obsolete stratosis umbrinis, ore minuto, flavo.

— Amplus, speciosus, ~~ex cone~~ P. abmario Severo ~~similimus~~ sed internus color ~~et structura videntur admodum diversi~~ cuticula in pileo annoso ~~crusta~~ persistenter alba, quasi calcarea.

Fomes rubriporus ~~(Quél.)~~ Sacc.

Fomes fusco-purpureus (Bourd.) Cooke in Grev. XIV p. 19 (1885)

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 184,

Fr. 1881, p. 92, t. II f. 3.

Fom. Bourd. l.c.

Bull. 754, 1133, 1309, 243

Hab. ad basin truncorum Quercuum etc.

Toscana: ~~prov. di Siena (Fatti)~~ in trunco Laurocarasi in Horto Pisano (Arcangeli) (Bres. e Cav.).

Area distr. Gallia, Italia.

Ex. Myc. Ital. n. 1616.

Polyp. rubriporus ~~purpureus~~ Quél. Ass. fr. av. Sciences 1880 p. 9

Polyporus fusco-purpureus Bourd. in Bull. Soc. bot.

Nizzardo (Barla in Bres. MS.)

Veneto: prov. di Verona (Massal.), Trentino: reg. in fraxinis, Castaneis (Bres. MS.)

Lazio: pr. Terracina

ma però la figura di Bulliard Champ. tab. 454 citata dal Persoon non vi corrisponde.

Obs.

Sec. Lloyd e Bresadola il Boletus tornatus Pers. (Myc. Eur. II p. 79 (1825)) sarebbe il binomio più antico di questa specie.

rubriporus 184
= fuco-purpureus

Pileo conchoide, 1 cm. lato, tenui, 5 mm. crasso, villoso, brunneo-fulvo; margine incrassato, flavescente, tomentoso, badio-rubiginoso juxta sulcum;

carne suberosa, subtenera, pallide fulva;

poris perexiguis, curtis, 1-2 mm., laete rubro-sanguineis;

sporis ovoideis, ~~5-7 longis~~, pallide fulvis, ~~vel (B. res. M.S.)~~ 4-6 = 4; setulis fulvis 20-40 = 6-8 (Bres. MS.)

Obs. È affine a F. conchatus.

13 Fomes fulvus (Scop.) Gill. Champ. Fr. p. 687 (1876), Boletus fulvus Scop. Fl. Carn. II p. 469 Sacc. Syll. Fung. VI p. 182, Polyporus fulvus (Scop.) Fr. e.p., non Fr. Tc. Hym. (1774) Boletus pomaceus Pers. Syn. p. 538 (1801) Icon. Trillieux Mal. pl. agric. p. 163, Delacroix Mal. pl. cult. p. 503, Hartig Baumkr. t. 4.

198 (Polyp. Pruni Pers. [nomen])

Bibl. 209, 483, 101 61, 244, 85, 398, 617, 618, 634, 757, 866, 923, 1109, 529, 1965

inprimis Prunus domestica, P. Cerasi, Amyg. Persicae

Hab. ad truncos arborum frondosarum — Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia, Toscana, Napoletano, Sardegna — Arboribus vall. vocibus

Valle Lagarina (Cob.)

Roveredo e Trento ai Cappuccini (Beg. MS)

Area distr. Europa, Australis

fulvus 182

Pileo lignoso-suberoso, duriss.mo, utrinque convexo, ~~[illegible]~~ → basi lata adnato, levi / haud concentrice sulcato, primo hirto villosove, fulvo, demum canescente; margine mimus obtuso, hinc exacte triquetro;
poris curtis, rotundis, minutis, cinnamomeis, primum cinereo-luteis primo tectis, haud discrete stratosis;
sporis subglobosis, uno latere subcompressis, hyalinis 5-6 = 4-5, hyphis 2,5-3 μ crs. (Bres. MS)

Obs. ~~Lycitano~~ ~~pocis~~ ~~indonuda~~,
Obs. Secondo Bres. (MS.) i pori sono ombrino-cervini e sulle specie di Prunus sono piuttosto ocraceo-cinnamomei: ~~cervini~~. Il Polyp. fulvus Fr. Icon. Hym. tab. 184/3 (non v. M.) è il Polyp. rheades Pers. Varia ~~specie~~ assai resa noto (Pol. levigatus Fr.)

14 Fomes robustus Karst. Fenn. Bass. dr. p. 467 (1890), Sacc. Syll. Fung. IX p. 113, Fomes Hartigii (Allesch.) Sacc. et Trav. Sylt. Fung. XXI p. 294
Polyporus Hartigii Allesch. Polyp. ignarius var Pinaum Bres. Rev. Myc. 1889, n° 84.
Icon. Pilleuse Mal. pl. agric. II pp. 142-144, Tubeuf Pflanzenkr. p. 463.
Bibl. 243, 245, 1715.

Hab. in truncis corticatis impiisque Coniferarum et aliarum arborum frondosarum p. p. Olea, Robinia de Piemonte: Valsesia (Carestia), Lazio: pr. Terracina (Bres. e Cav.)

Trentino: a Trento, comune anche nella forma resupinata (Bres.)

> Exs. Myc. Ital. n. 1001.

Oss. Sec. il Bresadola n. litt. il Fomes Hartigii è identico al Fom. robustus Karst. (sec. esempl. autentici); osservo però che il Karsten assegna le querce, come matrice, mentre il vero Fom. Hartigii è pinicolo — Trovasi anche allo stato resupinato.

robustus 21.294

ex IX - pg. 173 —

Pileo subhemisphaerico, sessili, subcoroso - lignoso, ungulato - pulvinato, crassissimo, adnato, bruneo-flavido vel 10 cm. circiter crasso; remote concentrice sulcato, fusco-opaco, cute concreta, seruposo inaequabili, breviter et rudifer pilosa dein grisea glabra, rimosa carneque fulvo - ferruginea duritissimis, margine obtuso subferrugineo; tubulis cylindraceis, initio cinnamomeo-tinctis; poris minimis, convexis, stratosis, ferrugineis demum subfuscis; sporis hyalinis, globosis 7-8=7.

Obs. Affine a F. fulva nigricans e a F. igniaria. La descrizione di Karsten è imperfetta, mentre l'identificazione con F. Hartigii fu fatta dal Bresadola su esemplari originali.

Fomes igniarius (Linn.) Gill. Champ. Fr. p. 687 (1874)
Sacc. Syll. fung. VI p. 180, Boletus igniarius Linn. Sp. pl. ed I p. 1176 (1753)
Fries. Bull. Champ. Fr. t. 454 (excl. f. C-E), Lanz. F. di Roma, t. 21/2,
Michel. N. pl. gen. t. 61 (agaricum igniarium) et t. 62 (fom. resup. ag.
durum), Venturi Mic. Bresc. t. 61 f. 4, Gill. Champ. Fr. t. 468.
Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze t. 54.
Bull. 61, 90, 131, 206, 216, 417, 418, 430, 434, 518, 585, 638, 653, (836 (Bol. ovatus))
866, 1129, 1210, 1219, 862, 143, 409, 245, 263, 357, 564, 656, 725,
757, 983, 1090, 1133, 1170, 1175, 1597, 1061

Hab. ad truncos imprimis arborum frondosarum, — Liguria, Lombardia, Pie-
monte, Veneto, Tridentino, Litorale, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia,
Area distr. Europa, Libia (Libya) asiat., Amer. bor. et merid.
Varia tubo resupinato in Tridentino a Tergolay (Herb. mus.) I (Mich. t. 62) Abbiategr. Pav. Mycoth. Gall.
Exs. Erb. crittog. ital. I n. 166 et 767 (var. abietina) → ad altrove.

iguiarius 180

Pileo primo tuberculoso-globoso (immarginato), levi, indumento tenui, floccuoso, adpresso, cano, dein ungulato, e ferrugineo fusco-nigricante, opaco, cute concreta, scruposo-inaequabili carneque Zonata, ferruginea durissimis; margine rotundato, 8-10 cm. lato, 6-7 cm. longo, 5 cm. et multo ultra crasso;

poris minimis, convexis, stratosis, cinnamomeis, exoletis albo-farctis, primitus cano-centibus;

sporis sphaeroideis, hyalinis, 6-7 μ diam. vel 6-7=5,5-6, globosis, uno latere depressis, hyalinis (Bres. Ms.)

~~Incrementa nova, quae vernalia, individua~~ minora ubique, majora margine tantum et in hymenio (tunc primo sporis carente) redadunt floccoso-cana, dein ferruginea, tandem obscurata, [illegible] ineptus; sed ad ignem diu servandum, quia lente consumitur, adhibetur, unde nomen.

Oss. I suoi ibremondi, che assorgono di prima vera, si vestono i piccoli individui totalmente ed i maggiori solo al margine o anche nell'imenio ancor sterile, rendendoli dapprima con pomentozzi tratteggi grigi ferrugine e poi foschi. Non li presta, come esce, ma mantiene a lungo il floco.

16 Fomes Ribis (Schum.) Gill. Champ. Fr. p. 685 (1874)

Sau Syll. fung. VI p. 184, Boletus Ribis Schum. Fl. saell. II p. 386 (1803)

Icon. Rostk. et Cord. u. Sturm Deutsch. Flora, Pilze, t. 53, et t. 62, Fl. Dan. t. 1790 f. 2.

Bulliard Champ. Fr. t. 456 f. E (Bolet. igniarius ex parte)

Rib. 61, 85, 418, 518, 754, 866, 858, 1035

Hab. ad radicem Ribis, rarius Corni sanguinei — Liguria, Trentino, Veneto, Emilia, Napoletano, Sardegna.

Exs. Myc. Ven. n. 20 (su Corno sang.)

011. Sec. Bres. (MS.) Fom. versatilis Giel., F. pectinatus Giel., F. Evonymi Kalchbr. et F. Loniceræ Weinm. Tutte semplici forme o varietà della presente specie.

Ribij 184

Pileo suberoso-coriaceo, applanato, ad 12 cm. lato, levitenlo, velutino, e ferrugineo umbrino, intus una cum margine acuto fornique curtis, exiguis, nudis, 2 mm. longis fulvent bus; sporis 3-4 = 3 (Bref. Ns.)
— Perennat, stratose revivisceit, foris in amosis stipatis.

17 Forney Lonicerae (~~Mont.~~ Weinm.) Gill. Champ. Fr. p. 684 (1876)
Sacc Sylt Fung. VI p. 182, Polyporus Lonicerae Mont. in Ann. Sc. nat. 1836
t. 12 f 6
(Pol. Lonicerae Weinm. in Flora, Syst. pl. nov. 1825 II p. 102)
Icon. Mont. l. c.,
Bibl. 1090
Hab. ad basin truncorum Loniceraram — Sicilia: Catania sulle Lonicere
Area dist. Europa in orto botanico (Italia)

Loniceraceae 182

Pileo suberoso, duro, effuso-reflexo, tenui, adscendente, scrupuloso-tomentoso, fusco-nigricante; margine tumente, ferrugineo; poris mediis, fulvo-cinnamomeis, primo griseo-pruinatis; poris oblongis o hexagonis stramineis 3-4 p. long.

18 Fomes Lyonymus (Kalchbr.) Cooke in Grev. XIV p. 18 (1885) ut var.,
(1867, p. 232.
Sylt Fung. VI p. 182 Polyporus Lyonymus Kalchbr. in Mathem. Term. Közl.
Fom. Kalchbrenn. Lyon. Hymen. t. 35 f. 3., Briosi e Cav. F. parass. n. 323
Rbl. 866, 209
Hab. ad radices Lyonymi europaei etc. etc. — Emilia: prov. di Parma
(Passerini), Veneto: presso Vittorio (Saccardo)
Exl. Myc. Ven. n. 414, Briosi Cav. F. parassit. n. 323

Oss. È piuttosto una sottospecie di Fom. Loniceræ ed anche questa è da riguardarsi una sottospecie di Fom. Ribis.

Evonymi 182

Pileo convexo-plano, concentrice sulcato, subtuberculoso, tomentoso, dein glabrato, nigricante, margine acuto, 2-6 cm. lato, 1 cm. crasso.

Porij curtij, minuti, fulvo-cinnamomeij, saepe stratosij; sporij 3-4=3 (Bref. Mss.) = Hymenio hyalino.

Variat sessilis et effuso-reflexus, subimbricatus. Non saepe

(9 Fomes ungulatus (Schäff.) Sacc. Mich. I p. 539 (1879) et Syll. fung. VI p. 167, Bolatus ungulatus

Fomes piricola (Swartz) ~~Rbt~~ Cooke, Grev. XIV p. 17 (1885) (Schäff. t. fung. IV t. 137 (1774) pro Bull.

Sacc. Syll. fung. VI p. 167, Bolatus piricola Sw. Vet. akad. Handl. 1810 p. 87

Icon. Gill. Champ. Fr. t. 464, Schäff. Ic. fung. t. 137, 262 et 270 (Bol. fulvus et Bol. semisordatus), Guin. et Maire in Bull. soc. mycol. 24 (1908) p. 138-139, Hard. Mushr. p. 419 p. 348, Lucand Champ. Fr. t. 173

Bibl. 90, 417, 418, 434, 585, 725, 895, 209, 245, 417, 418, 836, 1284 (M. Gregna (Art. Rossi))

Hab. ad truncos ~~praesertim~~ Coniferarum — Liguria, Veneto, Trentino, Napoletano Valle Lazarina (Cob.), frequente sui tronchi alti (Bres. Mangiasa, Tavrolas → Mr.)

Area dist. Europa, Sibiria asiat., Amer. bor. Cuba.

Exs. Myc. Ital. n. 214

Piemonte: Valsesia (Caverna), Lombardia: prov. di Brescia (Zanetti)

Obs. Sec. Quél. Fl. mycol. p. 396, non è diverso abbastanza da Fom. marginatus e sec. Bres. è identico a Fomes ungulatus (Schäff.) Sacc. molto anteriore.

Offinia viola pinicola in rotto unguulatus

unguulatus = pinicola

167

Pileo suberoso-lignoso,
e fulvinato unguulato, 10-12 cm. lato, crasso,
incrustato, glabro, concentrice sulcato, rugulos,
(haud vernicos),
inaequabili, e fulvo nigricante, rufo ochraceo=
que subzonato,
margine adulti cinnabarino, fulvente,
intus duro, pallido, ~~ex albo~~

poris minutis, obtusis, brevisculis, tramaque
e pallido ochroleucis, lutescentibus,
sporis 8-10 = 3,5 - 4,5, vireis, oblongis, nucleo
oleoso. (Bres. Nos.)

Magnus, vere perennis et revivisceus,
margine accrescens, sed pori
non distincte stratosi.

Odor acidus

20 Fomes marginatus (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 683 (1874)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 168 / Polyporus marginatus Fr. S. M. I, 372 (1821)
Icon. Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze, t. 43, Quél. Champ. Jura, I t. 19 f. 2.
Abb. 103, 430, 585, 866, 1015, 631, 1965
Hab. ad truncos arborum frondosarum variarum — Piemonte, Emilia, Corsica
Area distr. Europa, America merid. Australia (Trentino: Tavodo, Mangiasa (Bres. MS.)
Lombardia: prov. di Mantova (Magnaghi)

marginatus 168

Pileo suberoso-lignoso, subapplanato, incrustato, concentrice sulcato, (semper glabro, etiam rufo, sed griseo-pruinoso, ad marginem pallidum versicolori-zonato, intus alutaceo;

poris rotundis, stramineis, ore albis, tritis rufescentibus; pori pramiformes 8-10 μ longi.

— Ungulaeformis, 10 cm. metiens. Stipanea zona albo-cinerea, hornotina fulvo-badia, tertii anni sanguineo-rubiginosa scabra, antiquiores nigricantes rugoso-rimosae. Pori exoleti ligneo-pallidi, strati parum distincti.

Obs. È chiaramente distinto da F. ungulatus col quale sembra confuso, perchè più spianato e non florante.

robarnensis (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 684 (1874

21 Fomes ~~[illegible]~~

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 181

Icon Fr. K. Hymen. t. 184 f. 1, Bull. Soc. mycol. Fr. V (1889) p. t. VIII f. 4-5 (Hekrobasidion annosum Bref.)

Bibl. Bres. MS.

Hab. ad truncos Quercus — Tridentum: loco Arnago (Bres. MS.) Autumno.

Area Dist. Suecia, Germania, Italia.

roburneus 181

Pileo duristimo, triquetro protractoque, late adnato, scrobiculato-tuberculoso, laccato, glabro, opaco, fusco-nigricante; margine pallido; porij minutij, rotundi, confluentes, stratosis, umbrino-purpureis; sporij ovatij, globosij, hyalinis, interdum subangulatis, 4-5,5 = 3,5-4 mm; hyphis hymenialibus 2,5-3,5 fulvo-brunneis; hyphis carpophori 3-4,5 idem fulvo-brunneis; setulis fulvis 18-24 = 6-8 (Bres. MS.). — ~~Duritie et pondere~~ fere lapideus.

~~Duritie et pondere fere lapideus.~~

" Fomes fomentarius (Linn.) Gill. Champ. Fr. p. 686 (1874)
Sacc. Syll. fung. VI p. 179, Boletus fomentarius Linn. Sp. pl. ed I p. 1176 (1753)
Icon. Battarra F. arim. t. 37 f E (Fungus pedis equini facie) Lang. F. d. Roma, t 21 f 3, Venturi Msc. Bresc. t. 49 f 3-4 (Bol. ungulatus)
Bull. Champ. Fr. t. 491 f C-D (Bol. ungulatus ex parte), Fr. Svar. ätl. Sv. t. 62.
Exs. 61 bis 90, 123, 244, 65, 417, 418, 430, 434, 585, 638, 653, 712, 866, 895, 923, 995, 647, 209, 245, 263, 103, 318, 357, 568, 656, 690, 907, 983, 1002, 1133, 1213, 1793
Hab. ad truncos praesertim fagineos et betulinos — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Sardegna
Exs. Myc. Ven. n. 14
Area distr. Europa, Tunisia, Siberia asiatica, Malacca, Amer. bor. australe

61. È il ben noto Fungo dell'esca. Esiste una forma mostruosa cauliscente cilindracea (Batt. T. XXXVII E) ed è comune la forma resupinata.

Pileo ungulato-pulvinato, → subtus plano, crasso, ~~glabro~~, e bati crassissima marginem versus attenuato hinc tri- quetro quidem sed ambitu semper circulari, et undique declivi, glabro, remote concentrice sulcato, opaco, e fulgineo canescente, intus molli, floccoso, ferrugineo-fulvo, cute crassa, durissima, persistente, → 15 cm. lato, 9 cm. longo, margine porisque praelongis, minutis, distincte stratosis primo glauco — pruinosis, dein ferrugineis; poris hyalinis, cylin- draceis vel oblongis 16-22 - 5-7 vel 14-18 = 4-5; speci- mina in fago semper sterilia (Bres. M.-L.)

— Duplex monstrum: alterum caulescens, cylin- dri cum Batt. t. 37 E, Nees Voss. Act. Nat. Cur. X ~~c. ic~~ cum icone; alterum effusum, resupinatum: Pol. expansus Desm. Exs. n. 16. Ob fomitem optimum olim huius copiae quotannis in silvis Lucciae meridio- nalis collectabatur, cuius maxima pars ad exteros vendebatur.

23 Fomes nigricans (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 685 (1874)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 180, Polyporus nigricans Fr. S M I f. 375 (1821)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 184 f. 2, Batt. Champ. Fr. t. 401 ex parte,
Gill. Champ. Fr. Tab. suppl., Pat. Tab. anal. fig. 139, Quél. Champ. Jura
I t. 19 f. 3.
Bibl. 244, 434, 639, 866.
Hab. ad truncos, imprimis Betulae — Veneto: prov. d. Vicenza (Saccardo),
Emilia, Toscana, Napoletano, Sicilia.
→ Trentino: Colonisla (Bres MS.)

Area distr. Europa, Amer. bor., Cuba.

nigricans 180

Pileo pulvinato, crassissimo, dente concen=
trice sulcato, glabro, nitido, nigro,
crusta durissima, crustacco-laccata per=
sistente, intus durissimo, ferrugineo,
5-8 cm. lato;
margine obtusissimo sporisque minimis,
planis, confluenti-stratosis, nudis
ferrugineis; sporis ovato-globosis 6=4,5-5 (Bres. Ms.)
8 µ longis (Quél.)
– forma typica pileo levi, laccato, nitido + speciem suadet distinctis=
simam, sed cum hac confunditur trivialis forma pileo triquetro, rugoso,
opaco, accedens ad F. igniarium. (Rostk. t. 51, Quél. t. 19 f. 3)
Obs. La forma è quasi ~~di F. excavatus~~
di Fomes fomentarius, ma è più alto
~~ma se è certo diverso~~, più alto, quasi
glabro, ~~meno~~ poco dilatato, duristimo / mai
corroso dalle tignuole come il ~~precedente~~ Fom. quello
dopo alcuni anni), inetto ad accendersi,
perchè cresce più lentamente ed interna=
mente è nella massima parte costituito
dai tubuli indurati.

24 Fomes salicinus (Pers.) Gill. Champ. Fr. - p. 684 (1874)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 184. Boletus salicinus Pers. Syn. p. 563 ex p.
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 185 f 1, Karst. Icon. Hymen. t. I f 5,
Pat. Tab. analyt. t. 141, Quél. Champ. Jura I, t 17 f 6.
Rbh. 123, 876, 866, 1284.
- Lombardia, Emilia, Trentino: boschetto N. Salci presso Terzolas (Bres. MS)
Hab. ad truncos, praecipue salicinos (Europa, Amer. bor., Africa merid.,
Australia).
Area dispos. ←

Fabicinus 184

Pileo lignoso, durissimo, undulato, glabro, ex maxima parte resupinato, 30 cm. et ultra metiente; margine brevi, obtuso, patente, e cinnamomeo canescente;

poris ~~minutis~~ minimis, rotundis, ferrugineo-cinnamomeis; sporis subhyalinis, 4,5 - 6 = 4,5-5 (Bres. MS.)

— Crusta ebenea. Et situ totus resupinatus vel locis verticalibus superne margine angusto, undulato, glabro cinctus.

Obs. Distintissimo da F. Ribis, rubriporus ecc., Sec. Fr. è affine piuttosto a F. fomentarius e igniarius

~~Sembra appartenere a questa specie~~
~~P. plicatus Pers. Myc. Eur. 2 p. 116~~
~~(var. col margine del cappello striato-piegato)~~
~~e P. loricatus β. Pers. Myc. Eur. 2 p. 87.~~

mentre sec. Bres. Hym. Kmet. p. 11 confluisce in Fomes conchatus.

25 Fomes cryptarum (Bull.) Cooke, Grev. XIV p. 21 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 205, Polyporus cryptarum Fr. S. M. I p. 376 (1821)
Leucoporus Boletus cryptarum Bull. Champ. Fr. t. 478 (479) f. 2 (Nees, Syst. f. 29 a f. 222 B).
Icon. Bull. l.c. t
Bib. 182.
(Borbose)
Hab. ad ligna pinea putrida — Italia (loco non indicato)
Area Distr. Europa.

cryptarum 205


Pileo suberoso - stupeo, effuso - reflexo va=
rioque, azono, adpresse sericeo,
rufescenti - ferrugineo, intus
porisque longissimis, minutis,
rotundis pallidioribus.

- Colore et forma maxime
mutabilis, sub jove expallens

2 bis
8

Ganoderma

41/0003-9-1



(Ganoderma)

= Conspectus synopticus specierum =

A_1 – Forma varia, stipitata, ~~pleuropoda v. mesopoda~~ ~~stipite 15-25 cm longo~~ v. subsessilis — 1. G. Pseudoboletus

A_2 – Forma sessilis vel subsessilis, dimidiata

B_1 – Pileus demum sanguineus, vel niger vernice olivacea evanida tectus

C_1 – Tubuli 5-8 mm longi, fuscescentes; pori pallidiores — — — — — — — 2 – G. valesiacum

C_2 – Tubuli 3 cm. circiter longi; pori ex albo fusco-cinnamomei vel rufescenti-umbrini

D_1 – Crusta demum sanguinea — — — — 3 – G. resinaceum

D_2 – Crusta nigra, vernice olivacea evanida tecta — — — — — 4 – var. Martelli

B_2 – Pileus nec sanguineus, nec niger

C_1 – Pileus primitus cinnamomeus

D_1 – Pori subferruginei, ore albidi — — 4. G. lipsiense

D_2 – Pori ore ochracei — — — — — 5 – G. gelsicola


C_2 – Pileus primitus albicans vel gilvus

D_1 – Pori albi — — — — 6 – G. leucophaeum

D_2 – Pori umbrini

E_1 – Pori confluenti-stratosi — — — 7 – G. australe

E_2 – Pori strato intermedio distincti — 8 – G. vegetum



Sacc. Sylv. Fung. XXI p. 294

Ganoderma Karst. in Revue Mycol 1881, p. 17, Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr 1889, p. 64 Stym. ganos splendor et derma pellis, Fornes Fl. subgen Ganoderma Sacc. Sylv. Fung. passim.

Pileus suberosus, dimidiatus, sessilis, v. (abnormiter) stipitatus, typice incrustato-laccatus, zona brunnea, Sporae oblongo-ellipsoideae v. ovoideae vel subacroideae, ferrugineae vel brunneae saepius asperulae. Basidia oblonga v. subgloboso, 4-sterigmatica. Cetera Fomitis. Contexta in pileo superficie, i-cellularia, brunnea saepius admixto copioso.

Obs. Il sottogenere Amauroderma Patouill. si distingue per cappello alla superficie opaco, non lucido e le spore appiattite sferoidee, più leggermente colorate.

Obs. Probabilmente alcune delle specie non sono ben distinte e sono piuttosto da considerarsi come forme o varietà.

Ganoderma Pseudoboletus (Jacq.) Murrill Contr. New York Bot. Gard. n. 29 (1902) Agaricus Pseudoboletus Jacq. Pl. Austr. t. 41 (1773)

Ganoderma lucidum (Leys.) Karst. in Rev. Mycol. 1881 p. 64.

Fomes lucidus (Leys.) Cooke, Grev. XIV p. 118 (1884)

Syn. Lyll. Fung. VI p. 157 Boletus lucidus Leys. Fl. halens. ed. II p. 380 (1783)

Icon. Jacq. l.c. ~~Fl. Austr. t. 179~~ Barbarra Fl. Arim. t. 35 f. D (Agar. fulvus semi-pateram referens), Batsch. Champ. fr. t. 7 et 459, Gill. Champ. Fr. t. 457, Lanz. F. di Roma, t. 22 f. 2, Rolland, Atl. t. 95 f. 209, Venturi, Misc. Brescia. t. 49 f. 1-2.

Bibl. 23, 61, 90, 123, 198, 209, 244, 65, 85, 426, 397, 398, 417, 418, 430, 474, 585, 634, 640, 658, 671, 802, 836, 866, 923, 954, 1015, 1129, 1219, 405, 631, 263, 1031, 195, 357, 656, 690, 725, 748, 983, 1062, 1090, 1133, 1061, 1345, 1349, 1482

Hab ~~basso~~ truncorum arborum frondosarum et acerosarum — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica, Sardegna.

Exs. Erbar. crit. ital. I n. 769 (fm. estipitata), Myc. Ven. n. 9, Rab. F. Eur. n. 1213 (Vercelli: Maliverni).

Area distr. Europa, Amer. bor. et merid., Asia, Africa, Australia

Ganoderma

Pseudoboletus 1
= P. lucidus 157

Stipitatus pleurpus v. mesopus, interdum subcentralis v. lateralis;
Pileo 2-5 cm. lato, suberoso lignoso, flabelliformi, sulcato-rugoso,
stipite 15-25 cm. longo, 2,5 cm. et ultra crasso, laterali, aequali, glaccato, rigido,
e flavo sanguineo-castaneis;

poris determinatis, longis, minutis, ex albo cinnamomeis;

sporis ovoideis, leviter verrucosis vel echinulatis, 10-12 = 6-8

~~— Mire mutabile, etiam sessile (cfr. Batt. t. 36)~~

~~Boletus Lucidus~~

Obs. Non differt a P. semipatera Pers. Batt. t. 35 f. 8.
Borszczow in Jung. Ingr. tab. 7, 8 differt
delle forme quanto mai anormali ± ~~cespitosa~~
che mostrano cespiti merismoidei.

Fomes valesiacus (Bond.) Sacc. Sylt. Zung XIV p. 184,
2 Ganoderma valesiacum Bond. in Bull. Soc. bot. Fr. 1894, pag. CCXLV
Syn. deest
Bibl. Bresad. M. 1. O
Hab. ad truncos Laricis — Trentino, comune tm. monti più elevati.
(Bres. M.)

Area distr. Gallia, Helvetia, Italia bor.

Ganoderma

Galeiacum 14-184

Pileo sessili aut subsessili, 7 cm. aut ultra lato, dimidiato, laccato, nitente, castaneo vel umbrino-sanguineo, subconcentrice sulcato, ad marginem attenuatum 2 mm. crassum pallidiore, ad basim circiter 3 cm. crasso; carne albida ad tubulos vix fuscescente, non fibrosa, sed hyphis tenuioribus, ramosis, hyalinis contexta, subputrescente; tubulis 5-8 mm. longis, fuscescentibus, minutis ore rotundatis et pallidioribus; sporis fusco-brunneis vel fuscis, ovoideis asperulis, guttula saepius unica instructis, 10-12 = 7 (l

Obs. Quasi simile a Ganoderma carnosum Pat. ma diverso per la carne superiormente bianca ancor più carnosa e per le spore un po' minori. Il Bresadola (MS.) descrive le spore lisce; guardate più dettagliatamente delle specie.

~~Ganoderma resinaceum~~

Fomes resinaceus (Boud.) Sacc. Sylt. Fung. IX p. 179 (1891)

(Ganoderma resinaceum Boud. ap. Patouill. Bull. Soc. Mycol. 1889 p. 72.

Icon. Patouill. Ess. taxon. Hymén. p. 105 f 2.

Var. ~~Gallia, Tunisia~~ Martelli. Bres. F. Trid. II p. 31 t. 137 (Ganoderma), Sacc. Sylt. Fung. XI p. 90

Icon. Bres. l. c.

Bibl. 234.

~~Trentino (Bres. sec. Boudier)~~ ~~Firenze, giardino Bobolí~~ ~~(M. Martelli)~~

~~Hab. ad truncos Quercus, Ilicis~~ — ~~Toscana~~

Area distr. ~~Italia media, Gallia~~, Hesp.

Bibl. Boud. l. c.

Hab. ad truncos Quercum, Fagi et. Trentino (Bres. sec. Boudier)

area distr. Gallia, Italia, Tunisia

Var. Martelli (vedi sopra e ♯

Icon. Bresad. l. c.

Bibl. et.

Hab. ad truncos Quercus Ilicis — Toscana: Firenze, giardino Bobolí (M. Martelli)

resinaceum 9-179

Maior 15-30 cm. lat. perennans? ~~Poroporia~~ pileo semiorbiculari subapplanato, sessili, ramus pediculo brevissimo aut subnullo instructo, concentrice zonato, sulcis primariis latis, sequentibus vegetationis recentioris minus profundis et confertioribus, crusta vernicosa e luteo-castaneo vel umbrino sanguinea tecto, primo maxime nitente dein obscurato vel sporis subpulverulento, margine primitus albicante, demissime puberulo, rotundato, dein glabro, acutiusculo, concolori; poris minutis rotundatis, dein stratosis ore ex albo fusco-cinnamomeo, 3 cm. circiter longis; sporis oblongo-ovatis aut diverse ovatis, basi truncatis, fuscis, omnino levibus, episporio crasso, eguttulatis vel 1-guttatis 10-12 = 6-7.

Oss. ~~Affine a F. carnosa~~. → 20-30 cm. lato,

Var. Martelli (~~n. sp.~~) Pileo semiorbiculari, convexo-subapplanato, levi, sessili, margine crasso, involuto, ~~concentrice~~ concentrice sulcato; crusta nigra, vernice luteo-olivacea, demum evanida tecta, fraedito; tubulis rufescenti-umbrinis, plus minusve elongatis; poris concoloribus, mediocribus, subangulatis; sporis obovatis, luteolis 10-12 : 7-8, basi truncatis, levibus

Oss. Differisce dal tipo pel cappello levigato, pel margine soltanto solcato per la crosta olivacea e i tubuli e la sostanza più ombrini, e per le spore levigatissime.

~~Fomes lipsiensis (Batsch) Sacc.~~ (Boletus lipsiensis Batsch Elench. t 25 f 130 (1786)

Fomes applanatus (Pers.) Gill. Champ. Fr. p. 686 (1874)

Sacc. Syll. Fung. VI p. 176. Boletus applanatus Pers. Obs. mycol II p. 2 (1799)

Exs. Erb. crit. it. II n. 540, Myc. Ven. n. 104, Rab. F. Eur. n. 1603 (Valtellina: Carestia)

~~Fl. Bel.~~ 245, 23, 61, 65, 418, 639, 671, 866, 186, 631. 209, 783, 1090, 1965

~~Exsicc.~~ Icon. Batsch l. c., Gill. Champ. Fr. t. 466, Quél. Champ. Jura I t. XIX

Hab. ad truncos arborum frondosarum — Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Sicilia, Corsica.

Area distr. Europa, Tunisia, America bor. et mer., Australia.

Boletus rubiginosus Schrad Spicil. p. 168 (1794)

Var. mentiroides Corda in Sturm Deutschl. Fl. Pilze t. 63, Fl. Bel. 209.

Monstrosus, irregularis, multiplex, contextu cinnamomeo, hymenio minute poroso primum flavido primum laeto.

Hab. in ramis murorum certe ex ligneis fragmentis orientis — Veneto: Padova ai colli di Arcella

Ganoderma lipsiense (Batsch) Atkins. Ann. mycol. VI (1908) p. 89, Sacc. Syll. XXI p. 304

lipsiense
= f. applanata 176
v

Pileo explanato, tuberculoso, obsolete zonato, pulve-
rulento, glabrove, e cinnamomeo canescente
cute crustacea, rigida, demum fragili, ~~cutis~~ contexto tramae
~~duro, albo-brunneo~~ ~~subtilissimo, laxe floccoso~~; circiter 35 cm. lato;
margine humido;

ex albo cinnamomeo.
contextu tramae subaequantibus
poris vitreis, subferrugineis, ore albido, trito fulgente
~~mollissimis, brevissimis, sporis fusis, oblongis, apice hyalino, deciduo et dense~~
~~guttulatis, 7-9 × 3-5 μ, atque apice, vel obovatis subtis, 4-guttulatis, alone matris~~
~~albo, basi manifestiori, circumdatis 8-10 × 5-6 μ (B. res. M.)~~
— Non carnosum nec succosum; odor acidus.

~~(cum tramae Abietis)~~

Esc. fl. XXI - 304

(spiny rodeij e chrysulatis, brunneij
11-12 = 7-8.

5 Ganoderma gelsicola (Berl.) Sacc.

Fomes gelsicola Berl. a Malp. III (1889) p. 371, t. 12.

Sacc. Syll. Fung. IX, p. 180

Icon. Berl. l. c.

Bibl. 141, 1031.

Hab ad truncos Mori albae — Veneto: pr. Treviso a Selva (M. Maria Saccardo-Trotter)

Area Distr. Italia

gelsicola 9-180

Totus fungus 11 cm. altus, 10 cm. latus; pileo 4,5 cm. crasso, dimidiato, durissimo, convexulo, irregulariter tuberculoso, margine tenuiter obsoleteque sulcato, pulverulento, glabro, ex aenoene cinnamomeo fuscescente, margine pallidiore, undulato, basi magna et lateribus perpendiculariter decurrentibus, subtus sulphureo-canescente; contextu spongioso-suberoso, ferrugineo; poris minutissimis centro longis, peripherice valde brevioribus, extus (ore) intusque pallide sordideque citrinis; sporis ovoideis, episporio crassiusculo et verruculoso (?) guttuligeris, 6-8 = 4-5 ochraceo-rufis.

6 Ganoderma leucophaeum (Mont.) Pat. in Bull. soc. myol. 1889 p. 73
Fomes leucophaeus (Mont.) Cooke in Grev. XIV p. 18 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 173, Polyporus leucophaeus Mont. Syll. gen.
spec. Cryptog. p. 157 (1856)
Hon. Atkins in Ann. mycol. VI (1908) t. III f. 11, et Schorstein
Holzzerstör. Pilze f. 6 4. (Ganoderma)
Rabh. 245, 631, 1015, 1345 (Gan. megaloma Lév. 1846) O
Hab. ad ad truncos . . . . . Piemonte: Valsesia (Carestia), Corsica . . .
Area Ital. Amer. bor. Italia, Corsica
Napoli sul tronco: Napoli, sul Monte
alba nell'Orto botanico (Cesati)

Obs. * Il Cesati, probabilmente sec. il giudizio del Bresadola, sinonimizza ben con la presente specie il Polyp. megaloma Lév., anteriore.

Leucoagaricus 173

Dimidiatum; pileo maximo, suberoso-ligneo, convexo-plano, tuberculato-nodoloso, glabro, tandem concentrice sulcato, crustaceo-laccato, ex albo-lacteo cinerescente, lineolis obscurioribus fasciato; transversim 30 cm. lato, 13-15 cm. longo, postice fere 10 cm. crasso;
margine obtuso, lacteo, sterili;
substantia duristima, flocoso-suberosa, badia; poris ~~niveis~~ omnium minutissimis, longissimis, primo niveis, tandem fulvescentibus, tuti nivei, ore obtuso, albo, eadem materia qua totus fungus primitus est vestitus, initio obturatis, dein obductis; sporis levibus, obovatis, brunneis, 8-9 = 5.

Obs. ~~La superficie del cappello ricorda Lepiota~~ ~~fasciatum~~. È medio tra Gan. australe e Gan. applanatum, dai quali però è lontano per la crosta lattea e non mai del tutto staccandosi.

*

7

Ganoderma australe (Fr.) Pat. in Bull. Soc. Myc. (1889) p. 67.
Fomes australis (Fr.) Cooke Grev. XIV p. 18 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 176. Polyporus australis Fr. Elench. I p. 108 (1828)
Icon. Berk. in Ann. Nat Hist III (1839) t. VIII, Massee in Trans. New Zeal. Inst. 1906, t I f 4., Patouill. Ess. taxon. Hymén. p. 105 f 3a (Ganoderma)
Bibl. 243, 640

Hab. ad truncos varios, Nizzardo (Bres. ms.) Trentino, Lazio, Toscana (Bres. ms.)
imprimis frondosorum

Area distr. Europa, Ceylon, Borneo, Sumatra, ins. Fidji, Guyana, Brasilia, Chili Venezuela, Tasmania, N. Zelandia, Australia.

Obs. Sec. Patouillard, che fece la monografia del genere, questa specie ha le spore lisce o quasi a differenza delle affini G. applanatum che le ha echinulate. Alcuni autori ammettono tutti l'opposto e perciò equivocano scambiano (a loro danno) le due specie.

australe 176

Pileo ~~duriusculo~~, convexo-plano, dimidiato-sessili, undulato-tuberculoso, glabro, incrustato, opaco, subspadiceo; margine sterili glaberrimo; ~~carne duriuscula~~; contexto tramae floccoso lanoso poris praelongis, minutis, ~~confluentibus~~ confluentibus - stratosis, umbrinis, ore primo albidis; sporis fuscis, ~~granulosis, asperis, 10-11 = 6-8~~ leviusculis, tuberculosis 7-9 = 5-6, soc. Pat. ♃

— Fungus sitaneus pileum habet valde dilatatum (ultra 18 cm.) semiorbicularem, ligneo- vel gilvo-pallescentem, jugis elevatis, concentricis, tuberculosis, maxime undulatum, contextum grumoso-flocculosum, qualis etiam in Fomite australi var. applanata (Klotzsch Linn. VIII pg. 484) quae vero differt pileo magis explanato, leviore, haud tuberculoso, modo concentrice sulcato.


Oss. Il P. tornatus Pers. in Freyc. Voyag. non si scosta in alcun modo da questa specie

8 Ganoderma vegetum (Fr.) Pat. in Bull. soc. mycol. Fr 1889, p. 71 (ut var. Ganod. australis)
Fomes vegetus (Fr.) Cooke, Grev. XIV p. 18 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 179, Polyporus vegetus Fr. Epicr. p. 464 (1838)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 183 f 3. (Brig.) in Domenica del Corriere n. 5 (1915) p. 10
Bibl. 244, Bresad. MS.
Hab. ad truncos impurios Fagi — Toscana: Vallombrosa (Cavara)
Area distr. Europa, Tunisia — Lombardia: Milano su un Fagus dell'orto botanico (Brig.)
Trentino: boschi d'Ingenga (Bres. MS.)

Vedi Sec. Pat. in Bull. Soc Mycol. 1889 p. 71 questa specie non è sufficientemente distinta da Gan. australe.

Pileo amplo, dilatato, glabro, opaco, ~~fusco~~, primo albicante, concentrice sulcato, zona annua lata; contexte floccoso, laxo, tenuissimo, cute hornotina, crassa, separabili, subtus plano; margine glaberrimo, nitido, sterili, angusto; poris minutis, decedentibus, umbrinis, tinguloseum annorum strato inter= medio floccoso distinctis, pors 8 in mm = 5-6, ~~poris 2-3 p. diam.~~ Est inter maximos ra= pide crescens, jam primo anno pedale, sed caro admodum tenui, a qua demum tam cutis quam pori longissimi separari possunt.

~~Affatto simile a~~ Tones australis β applanatus



~~Affatto simile a~~ Tones australis β applanatus è con Tones applanatus confuso, ma per più ragioni da tutti è diverso. Mentre in T. australis gli strati dei diversi anni confluiscono in modo da non potersi più discernere, in questa specie non solo rimangono distinti ma restano separati anche da un proprio strato fondamentario. Anche secondo Bres. ~~Mp. è forse una varietà di Tones applanatus~~

~~sed ex sec. Bres. MS 8-10 : 5,5-6,~~

obovatis, fulvis, intus minute granulatis, levibus, saepe pyriformibus, ad= late apice truncatis, primum alone mucoso cir= cumdatis (Bres. MS.)

9

Polytechn

41/0003-10-1

Polystictus

= Conspectus synopticus specierum =

→ Cooke

A_1 - Pileus resupinatus, margine reflexus (Subresupinati), umbrinus ..... 1 P. polymorphus
A_2 - Pileus non resupinatus (Vide tamen P. abietinum et P. albidum)
B_1 - Sessiles, dimidiati (Simpliciores)
C_1 - Fungus tenuissimus, ~~[illegible]~~, tubus membranaceus - mollis, siccus durissimus (Hymenea nascii Fr.) - - - - - - - - - - 2 P. Braunii
C_2 - Fungus his notis carens
D_1 - Pileus azonus, vel ad marginem tantum spurie zonatus; contextus fibroso-lignosus, vel stupeus, jugifer siccus (Stuposi Fr.)
E_1 - Contextus albidus
F_1 - Pileus sordide lutescens - - - - - - - - 3 - P. ravidus
F_2 - Pileus albus vel albidus
G_1 - Pileus durus, lignosus; pori integri - - - - - 4 P. albidus
G_2 - Pileus mollis, coriaceus vel carnoso-lentus; pori demum laceri.
H_1 - Pori lutescentes - - - - - - - - 5 P. fibula
H_2 - Pori albi - - - - - - - - - 6 P. floriformis
E_2 - Contextus coloratus
F_1 - Pileus fuscus; pori lutei - - - - - - - (12 P. fuscatus)
F_2 - Pileus e fulvo ferrugineus; pori argenteo-micantes
G_1 - Pileus lignosus, triquetro-nodulosus, non radiato-rugosus 7 - P. nodulosus
G_2 - Pileus coriaceus, radiato-rugosus, non nodulosus 8 P. radiatus
D_2 - Pileus zonatus, vel concentrice sulcatus; contextus tenaci-floccosus (Coriacei Fr.)
E_1 - Contextus fulvo-ferrugineus - - - - - - - - 9 P. lutescens
E_2 - Contextus albus
F_1 - Pori demum colorati
G_1 - Pori e violaceo expallentes - - - - 10 P. abietinus
G_2 - Pori lutei vel demum sublutescentes
H_1 - Pileus nitidus, velutinus - - 11 P. versicolor
H_2 - Pileus obscurus, fuscus, villosus 12 P. fuscatus
F_2 - Pori albidi vel fuscescentes
G_1 - Pori seriati in laminulas dentatas producti - - - 13 P. pergamenus
G_2 - Pori nec seriati, nec appendiculati
H_1 - Pileus candidus, fusco-zonatus, flabellato-lobatus 14 P. pulcherrimus
H_2 - Pileus albidus, vel fuscescens, vel demum coloratus
I_1 - Pileus effuso-reflexus, sericeus vel e pubescente glabratus
L_1 - Pileus alutaceus, incrustans - - 15 P. Wynnei
L_2 - Pileus griseo-fuscus - - - - 16 P. stereoides
I_2 - Pileus non effuso-reflexus, nec glaber
L_1 - Pileus pilis rigidis hirtus - - - 17 P. hirsutus
L_2 - Pileus villosus vel velutinus
M_1 - Pileus convexus vel postice gibbus, villosus - - - - 18 P. multicolor
M_2 - Pileus utrinque planus, velutinus 19 P. velutinus
B_2 - Metapodes vel pleuropodes (Perennes Fr.)
C_1 - Pileus azonus, persistenter tomentosus, fulvus - - - - - - - 20 P. tomentosus
C_2 - Pileus zonatus, demum glaber
D_1 - Pileus ferrugineus, margine fimbriato - - - - - 21 P. fimbriatus
D_2 - Pileus cinnamomeus vel nigricans
E_1 - Pori majusculi, angulosi; tubus fungus cinnamomeus; pars superior - - 22 P. cinnamomeus
E_2 - Pori minuti; Pileus hyalinus.
F_1 - Stipes deorsum incrassatus, 2,5 cm. longus - - - - 23 P. perennis
F_2 - Stipes aequalis, brevissimus - - - - - - - 24 P. carbonarius

1851

Polystictus Fr. Nov. Symb. pg. 54 (*) Cooke Illustr. Fol. in Grev. 1886 pg. 77; Sacc. Sylt. Fung. VI pg. 208. (Etym. polys multus et stictos punctatus seu porosus.)

Pileus coriaceus vel membranaceus vel stupposus, inodermeus, hoc est cute tenui fibrosa tectus, strato intermedio fibrilloso in hymenophorum abeunte. Pori a centro successive versus ambitum explicati, primitus punctiformi – superficiales, discreti, aperti, dein magis excavati congesti, pilei substantiae (horizontali) vertticaliter oppositi. Trama ab hymenophoro formata. Basidia normalia 4-sterigmatica, sporae hyalinae ovoidea. Cystidia rarissima flavida. Caulis varie additus. – Polyporus et Fomes tubulis praeformatis, determinatis, homogeneis, nec initio superficialibus – punctiformibus a Polysticto prae ceteris dignoscuntur. Trametes magis affinis, dignoscitur poris longitudine inaequalibus et secus pilei contextum dispositis eoque contiguis (T

Obs. Quanto alla citazione degli autori vale quanto si disse al genere Fomes.

Obs. Malgrado la differenziazione ora esposta, dal Frey, anche il gen. Polystictus come i suoi affini, rimane d'incerta delimitazione; basti a provarlo il vario smembramento subitosi dai moderni micologi.

Sect I Subresupinati Cooke

1 Polystictus polymorphus (Rostk.) Cooke, Grev. XIV (1886) p. 87
Saut. Syll. Fung. VI p. 291, Polyporus polymorphus Rostk. in Sturm.
Deut. Fl. Pilze, t. 56 (1838)
Icon. Rostk. l. c.
Rbl. 639
Hab. ad ligna et ramos putrescentes — Sicilia: Palermo, sul legno lavorato putrido di faggio (Inzenga)
Area distr. Europa.

Obs. Sec. Rostkovius Hym. Kmet. p. 9. la specie non sarebbe diversa da Polyst. radiatus; comunque rimane dubbia.

polymorphus 291

Pileo resupinato, effuso, coriaceo;
margine reflexo, crispato,
glabro, umbrino;
poris majusculis, angulatis,
lacerisque, pallidis.

Obs. Dalla descrizione degli autori
è tutto bajo - pallido.

Sect II amphibolis

~ Polystictus Braunii (Rabenh.) Sacc. Syll. Fung. VI p. 289 (1888)
Polyporus Braunii Rabenh. in F. Eur. n. 2005 (1876) Winter Deut. Pilze I p. 454
Polyp. obducens Sacc. Myc. Ven. p. 56, non Pers.
Icon. Desc.

Bibl. 209, O

Hab. ad ligna fabrefacta aquaeductuum — Veneto: Vittorio (Sacc.)

Area distr. Belgica, Germania, Italia, Austrahia

(forse in causa del substrato speciale di provenienza)

Oss. Specie, rispetto al genere, ambigua e intermedia fra Fomes, Polyporus e Polystictus; ma certamente sarà preferibile accettare la classificazione che ne fa il Ch. Bresadola in Hym. Kmet. p. 12, come segue: Fomes Braunii (Rabenh.) Bres. Il medesimo riferisce come sinonimi il Polyp. Engelii Hary (1889) e quivi da corrispondano alle specie Boletus Brownei Humb. e Bol. paradoxus Humb. (1793)

Pileis sessilibus, hinc dimidiatis et subcal=
vato-imbricatis, hinc incurvis orbiculatis,
udis membranaceo-mollibus (siccis duris=
simis) castaneo-brunneis, calvis, rugu=
losis, concentrice zonatis, margine acuto,
flavo-limbato;

sporis minutissimis, longis, rotundis,
vel inaequalibus, laete vitellinis;
sporis hyalinis, 1-guttulatis 2-2,5 = 1,5

(Bres. M. in esempl. Berolin.)

~~Obs. "Videtur pilus Formes diminutas: vidimus et formam sporis stratosis."~~

M. Pareste un Forme diminuito; talvolta diventa un pò stratoso.

Sect III Hymenii Fr.

1 Polystictus ravidus Fr. Epicr. p. 475, Hym. Eur. pg. 566, Sacc. Sylll. Fung. VI pg. 238; Boletus heteroclitus Sowerb. Col. Fig. t. 367, Cistostroma cinereo-lutescens Pers. Myc. Eur. 2 p. 205

Icon. Sow. l. c.

Bibl. Bres. ms.

Hab. ad Salices vetustas ——— Tirentino: Campo Trentino (Bres. Mf.) Aestate

Area distr. Gallia, Anglia

ravidus 238

(Ex Brev. inedito Persoon)

Pileo suberoso – coriaceo, tenaci, subapplanato, basi effuso, fordide lutescente, villoso – subsquamoso, imbricato, 7–9 cm. lato, circa marginem humidum ~~zonato~~ ~~sulcato~~, zonis tpuriis villoso – rugosis notato,

poris inaequalibus, rotundis, angulatis, minoribus mediocribus, acie fimbriata, demum laceris, luteis;

carne alba, haud zonata, odore fungino, tenui fragilis;

sporis hyalinis, cylindraceis, subincurvis, ✠ 6–8 = 3,

~~Ser. Brev. Mss. ò~~

Obs. ~~È affine assai a Polyporus imbricatus~~, ne differisce però pel cappello affatto villoso, la carne bianca non zonata e le spore alquanto più sottili, in cumulo stramineee e per l'imenio non limitate dal cappello mediante una linea nera; invece la trama del cappello discende nei tubuli come in Terana.

Però Il Bresadola raccolse un solo esemplare e ~~la~~ tubuli ~~bruni~~ di Pol. velutinus, j. t.

che potrà trovarsi ~~ostare~~ una forma

M. Frig e il Brev. nei F. Pol. fr. 75 avvicinano questa specie a Daedalea amicta

~~M. Frig. e il Brev. nei F. Pol. fr. 75 avvicinano questa specie a Daedalea amicta~~

Grev. XIV (1886) p. 81

t. 124 (1774)

4 Polyporus albidus (Schäff.) Cooke (Boletus albidus Schäff. Fc. Germ. IV p. 84)

Syn. Syll. Germ. VI p. 239 et XVII p. 114 (sub Polyp.)

2 Rabh. 397, 398, 417, 418, 866

1 Icon. Schäff. l. c., Britzelm. Hymen. t. 609 fig. 58.

Hab. ad truncos putrescentes, imprimis abietinos — Piemonte, Trentino Emilia, Sardegna (Bresad. MS.)

albidus 239

c # 114

(xxx)

Albus; pileo ~~xxx~~ suberoso-lignoso, primitus vero arido, stupeo et elastico, dein duro, lignoso, nulla forma constante: globulari, conchato, triquetro, substipitato, sed non effuso-reflexo, libero, scrupuloso-rugoso, azono, margine obtuso; poris tenuibus, minutis, subangulatis, acutis, integris; sporis hyalinis oborate, vel oblongis, uno latere depressis, 1-guttulatis 4,5-5 ~~xx~~ 2-2,5; basidiis 12-15 = 4, ~~Bres. Myc.~~ hyphis conexis tubulorum 2-4 ~~xxx~~ se latis crasse tunicatis. ~~Valde distinctus~~ Valde distinctus, licet habitu trivialis, ~~xxx~~ P. carnotis similis. (Bres.)

~~Fungus prorsus variae figurae, sessilis vel stipitatus~~ vel etiam resupinatus, generatim in junioribus fragilis, friabilis, demum induratus; ~~Sporae hyalinae, oblongae, 4,5-5-2,5-2,75; hyp~~ sapor amariusculus (Bresadola, Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903 pg. 74)

O.N. Molto variabile nella forma, sessile o ~~stipitato~~ od anche resupinato, fragile, friabile, poi ~~duro~~ indurato, di sapore un pò amaro (Bres. F. Pol.)

5 Polystictus fibula (Sow.) Fr. Nov. Symb. p. 68 (1851)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 239, Polyporus fibula (Sow.) Fr. Epicr. p. 475 (1838)
Icon. Sow. Col. Fig. t. 387 f. 8 (Boletus fibula) (1802)
Bull. 417, 474
Hab. ad ramos et ligna putrescentia — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli) → Sopra Arnago Trento, bosco de' Cappuccini (Bres. mss.)
Napoletano: sui faggi nelle selve del Matese (Pedicino) — aestate
Area dist. Europa.

fibula 239

Albidus; pileo coriaceo, molli, tenaci, velutino-hirto, ~~cutaneo-albidaceo, tomento haud nec cadaco~~, azono sacpe radiato-rugoso, intus nveo, margine integro, acuto; 3-4 cm. lato, 5-7 cm. ~~raro~~ longo; poris minoribus, rotundatis, acutis, demum lacteis, lutescentibus; sporis ovatis, intus granulosis, extus punctato-asperulis, hyalinis, 8-10 = 5-6 ~~Bresadola~~ vel 7-9 = 2-3, cylindraceis, curvulis, raro rectis. (Bres. MS.)

Minor postice adnatus, ambitu ubique liber, nunc peltas orbiculares sistens, nunc concre-scendo varius; ~~coriaceus, fere ex integro resupinatus, apice tandem revolutus~~

Oss. La tavola 287 fig. 8 di Soverb. rappresenta l'"habitus" ma differisce per il luogo nel legno lavorato (Fries)

~~I pori secondo Bres. MS. sono bianchi e non laceri e mediocri, ond'egli dubita trattarsi di una varietà. Ed secondo Bresadola il medesimo, la specie stessa sarebbe una varietà di Polyst. hirsutus~~

Sec. Bres. MS. i pori sono bianchi, laceri, mediocri; egli dubita trattarsi di una forma di Polyst. hirsutus

6 Polystictus floriformis (Quél.) Sacc.

Polyporus floriformis Quél. in Bres. F. Trid. p. 61 t. 68 (1884), Sacc. Syll. Fung. VI p. 102, Coriolus floriformis Quél. Fl. myc. p. 390

Icon. Bresad. l. c.

Bibl. 234

Hab. ad ramulos laricinos juxta terram — Tridento, Quara e Cà. — Autumno.

Area Dist. Italia superior.

floriformis 102

Imbricato - multiplex ; pileis carnoso - lentis, subcoriaceis, subsessilibus, dimidiatis, longi = tudinaliter radiate - rugosis, ex albo subgriseis, interdum margine griseo - subzo = natis, 2 - 3,5 cm. latis ;

poris parvis, subrotundis, dein oblongo — laceratis aut fimbriatis, albis ;

carne alba, amariuscula, subacidula ;

sporis hyalinis, subcylindraceis 4 = 2 ;

basidiis clavatis, 56 = 15 - 20.

Oss. È prossimo a Polyporus candidus e per l'aspetto esteriore può credersi anche il Polyporus osseus Kalchbr. col quale cresce, ma n'è diverso pel cappello raggiato - rugoso la carne mai ossea. Essendo posto dal Fiolet nel gen. Coriolus viene al P. versicolor lo stesso fra i Polystictus. (a dubbio.

Polystictus nodulosus (Fr.) Cooke, Grev. XIV (1886) p. 82
Sacc. Syll. Fung. VI p. 267, Polyporus nodulosus Fr. Epicr. p. 474 (1838)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 187 f. 2, Smith et Rea, Trans. Brit.
Mycol. Soc. 1906, t. 16 f. 2, Patouill. Essai taxon. Hym. p. 101 f. 2.
Bull. 245
Hab. ad ramos dejectos praecipue fagineos - Piemonte: Valsesia
(Carestia)

Ott. Sec. Bresadola sarebbe da considerarsi come varietà di Pol. rad.

nodulosus 247

Pileo suberoso-lignoso, durissimo, trique-
tro-noduloso, azono, villoso-rugoso scrupososque,
e fulvo ferrugineo;
poris curtis, subrotundis, inaequalibus, acutis-
lacerisque, dilute cinnamomeis, argenteo-mican-
tibus.

— Primo nodulos rotundos, confertos vulgo
sistit, mox concrescentes, carne dura crassa.

8 Polystictus radiatus (Sow.) Fr Nov. Symb. p 80 (1851)
Sacc. Syll. Fung. VI / 247 / Boletus radiatus Sow. Col. Fg. t. 196 (1799)
Icon. Sow. l. c. Batt. Fungi Arim. t. 35 f C (Agar. cinereus margine albo), Lucand Champ. Fr. t. 123.
Bibl. 103, 209, 866, 366.
Hab. ad truncos, imprimis Amentacearum — Veneto, Emilia, Toscana, area distr. Europa, Australia, Amer. bor. et merid.

Vars. hadrolatus Fr.

radiatus 247

Pileo suberoso, coriaceo, rigido, radiato-rugoso, primo velutino, fulvo, dein glabrato, ferrugineo-fusco, margine patente, repando;

poris minutis, pallidis, argenteo-micantibus, demum ferrugineis;

sporis 4-6 = 3-4, hyalinis, v. Dilutissime luteolis

— Valde imbricatus, concrescens, lignescens, sed non perennis; jam vere modo emortuus legitur; 2-3 cm. latus.

~~Ab Secundo Cooke qui spetta P. glomeratus Peck. 24 Rep. pg. 78~~

9 Polyporus lutescens (Pers.) Fr. Cooke in Grev. XIV p. 85 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 273, Boletus lutescens Pers. Mycol. Eur. II p. 74 (
Icon. Berlese F. monic. t. 7 f. 1-3, Schäff. Icon Fung. t. 136 (Bol. versicolor)
Bibl. 123, 143, 209, 131, 836, 1715, 1965, 989.

Hab. ad truncos variarum arborum — Lombardia: prov. di Pavia, Venetia: Trentino: Val di Sole. (prov. di Verona e Vicenza (Voltolini)

Area distr. Europa, Malacca.

Sect IV Coriacei Fr.

lutescens 273

Pileo suberoso-coriaceo, convexo, fusco-lutescente, zonis aliis elevatis, hirtis, obscurioribus, aliis depressis, velutinis, dilutioribus variegato, subtus concavo, carne concolore;

sporis curtis, minutis, rotundis, aequalibus, pallidioribus ~~carneis~~ dein carneis ~~fuscis~~ opacis; sporis teretioblongis, 7-8 μ longis. — Variat regularis et sinuatus, zonis obscurioribus.

Obs. Questa specie non può non differire tanto dal P. undulans che è azono, quanto dal P. lutescens Auct. volgo che Swartz, Albert. e Schw. dissero varietà di P. velutinus.

Ott. Giustamente il Quélet, Fl. myc. f. 389 giudica la presente una sottospecie del Polyst. hirsutus.

10 Polystictus abietinus (Dicks.) Fr. Nov. symb. myc. p. 87 (1851)
San. Syll. fung. VI p. 265, Boletus abietinus Dicks. Pl. crypt. f 9 f 9 (1785)
Icon. Dickson l.c., Gill. Champ. Fr. t. 663, Greville Sc. crypt. Fl. IV t. 226.
Rbh. 209, 244, 430, 434, 363, 585, 737. 245, 564
Hab ad truncos et ligna Coniferarum in montanis — Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Napolitano — Aestate.
↳ Terzolas, lungo il Rabbies (Bres. myc.)
Area dist. Europa, Tunisia, Amer. bor.
Exs. Myc. Ital. n. 605, Myc. Ven. n. 1409

Pileo coriaceo, tenui, effuso-reflexo, villoso, obsolete zonato, cinereo-albo; poris inaequalibus, laceris, e violaceo expallentibus; sporis cylindraceis, [saepe curvulis, hyalinis, 6-8 = 2,5-3; basidiis 12-15 = 3-4; cystidiis 20-30 = 4-6 (Bres. M.S.)

Non extat vero facilius distincta species, licet nunc tota resupinatus, nunc reflexus si modo semel vegetum rite observaveris nec in specimini-bus exoletis (expallidis) et siccis species distinctas quaeras.

Obs. P. dolosus Pers. e Sist. violaceum Pers. ad spec. ab ipso determinata in Mycg. exs. n. 678. Cfr. Micheliia I Ap. 59 ove sostiene che Irpex fusco-violaceus è una forma della presente specie.

Obs. Varia notabilmente secondo l'età e il sito: or reflesso, or tutto resupinato, coll'imenio violaceo o più pallido, coi pori interi o laceri ed irpicoidei. Any. Irpex fusco-violaceus Fr. è un sinonimo.

11 Polystictus versicolor (Linn.) Fr. Nov. Symb. Myc. p. 86 (1851) (1853)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 253, Boletus versicolor Linn. Sp. pl. ed. I p. 1176
Icon. Balbarra F. Orsin. t. 35 f. A., Bull. Champ. t. 80, Langr. F. de Roma
t. 21 f. 1., Pat. Tab. anal. fig. 143 Schaff. Fl. Fung. t. 263.
(Rostk. in Sturm. Deut. Flora, t. 10, 45, 46, 48 (varietates))
Hab. ad truncos et ramos subtivos v. emortuos — Liguria, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Trentino, Cant. Ticino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia,
Corsica,
Bibl. 12 23, 51, 61, 90, 123, 209, 244, 85, 103, 214, 318, 357, 363, 426, 417, 418,
430, 434, 518, 564, 568, 585, 638, 653, 656, 667, 671, 712, 725, 757, 802,
836, 866, 923, 927, 983, 995, 1015, 1049, 1090, 1129, 1173, 1180, 1203, 1240,
858, 647, 1284, 529, 754, 631.
Exs. Myc. Ital. n. 5, Myc. Ven. fr. 18 et 19 Myc. Ven. n. 413 (fm. dealbata), Cav. F. Longob.
n. 15.
Area distr. Toto orbe.

Var. nigricans Bres. Lasch in Rab. Exs. Pileo superne toto nigricante, subazono.
Bibl. 209 58, 39, 1170, 754
Hab. ad truncos, hinc inde frequens — Veneto, Toscana et certe alib.

versicolor 253

v

Pileo coriaceo, tenui, rigido, applanato, postice depresso, levigato, velutino, nitido, zonis discoloribus variegato;

poris minutis, rotundis, acutis lacerisque, albis dein pallescentibus (sublutescentibus); sporis oblongo-ellipsoideis 6–8 = 2–2,5, hyalinis.
— Color et forma omnimode ludens;

Obs. Per i pori lacerati o formati rappresenta spesso una Daedalea o un Cistotrema ~~nel senso di Persoon~~. ~~Il P. argyraceus Pers. Myc. Eur. 2 p. 73 è parimente una forma insolita, primaverile, corrotta. Cfr. Secr. n. 88–98. Ad un tale spettano Rostk. 4 t. 45, 46, 48; 37 t. 10. P. nigricans~~ Forme più nobili trovansi nei ~~tropici. Leo~~ Per la forma gasterospora Cfr. Pat. Tab. an. fig. 143.

Polystictus fuscatus (Fr.) Cooke in Grev. XIV (1886) p. 83
Sacc. Syll. Fung. VI p. 254 Polyporus fuscatus Fr. Obs. myc. II p. 257 (1818)
Icon. Bolt. Brit. Fung. t. 163 (Bolet. unicolor), Rostk. in Sturm, Deutl. Fl. Pilze
t. 47 (Bole Polyp. castaneus)
Exs. 417, 418
Hab. ad corticem, loco suffocatis — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli)

Area Distr. Suecia, Britannia, Germania, Italia bor.

fuscatus 254

Pileo coriaceo, applanato, lobbi, semiorbicolari, 5-6 cm. lato, villoso, fusco, ~~atro~~ obscuro, azono v obscuro zonato ~~vel zonato obscuriore~~ interiori lata ~~variegato~~; zona pororum laceris, luteo-gentibus,

Obs. Dalla figura di Bolton appare una specie distinta dal tipo del Pol. versicolor.

17 Polyporus pergamenus Fr. Nov. Symb. p. 85 (1851)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 262 Polyporus pergamenus Fr. Epicr. p. 480 (1838)
Icon. Hard Mushrooms p. 415 f. 345; Freeman Minn. Pl. Dis. p. 81
f. 36
Fibl. 243
Hab. ad truncos imprimis pineos — Lago di Terraccina (Mariani)
Area distr. Familia Amer. bor. Utah., Australia

Lec. Vahlstedt, Cat. Cellul. Tamsiae, p. 48, sono sinonimi di questa
Bresad. Hym. Kmet. p. 13 c
specie: Polyp. bisporus Kl. (1833), non Fr. P. carolinianus Berk.; P. lacerator Bork. P.
simulans Blonski; P. subpergamenus Thüm. e P. dispar Kalchbr.

pergamenus 242

Pileo coriaceo – membranaceo, rigido, tomentoso, concentrice sulcato, (v. juniore bilacero albo) valde inaequabili; ✱ poris seriatis, fallescentibus, in laminulas semissimas dentatas productis ✱; pori teneri- oblongi, hyalini, curvuli, 6-7 = 2,5

Oss. Si accosta a Polyst. abietinus ma il cappello è molto ineguale, più largo, più sottile, quando è secco molto rigido; i pori più sottili in maniera speciale disposti in serie, biancastri e appendicolati di laminette sottilissime – # gr

14 Polystictus pulchellus ~~(Sacc.) Cooke~~

(Sacc. Syll. Fung. VI p. 256, Polyporus pulchellus Sacc. Myc. Ven. Spec. p. 50 t. VII f 11-15 (1873)

Icon. Sacc. l. c.

Bibl. 209, 1035.

Hab. ad ramos piceos, acus tabidos dum obvolvens — Veneto: in Horto bot. Patavino

Le specie rimane qualche un pò dubbia. ~~e non più sicura.~~ o comunque incerta.

Obs. ~~Probabilmente è piuttosto una varietà del Polyst. versicolor~~.

(fu raccolta una volta sola e non più ritrovata;

pulcherrimus 256

Subcoriaceo-membranaceus, tenuis;

pileo e basi angustiore flabellato-lobato,

nitido, candido, fusco-zonato;

sporis albis, curtis, mediocribus, mollio=

ribus, dein fuscis;

sporis minimis rotundis, albis, 3 μ diam.

circiter.

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 264

15 Polystictus Wynnei (Berk. et Br.) Cooke in Grev. XIV p. 84 (1885), Polyporus Wynnei Berk. et Br. in Ann. Nat Hist. 3 ser. III p. 356 n. 805 (1859), Sacc. Sylt. Fung. VI p. 264

Fem. Beeli

Berk. 1309.

Hab. in ramulis quercinis — Toscana: prov. di Pisa a Tombolo (Marcelli).

VII. Sec. Quél. sarebbe una sottospecie di P. fragilis.

Wynnei 264

Pileo coriaceo, effuso-reflexo, postice adnato, incrustando vario, sericeo, alutaceo, lineis elevatis zonato; poris minutis, angulatis, albis; 240 μ latis; sporis sphaeroideis, hyalinis, 6 μ diam.

Obs. Si scosta dalle specie affini perchè incrosta le foglie, i rami caduti ecc. L'habitus è di Polypor. amorphus.

16 Polyporus stereoides (Fr.) Cooke Grev. XIV p. 84, n. 826 (non p. 78 n. 618)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 267, Polyp. stereoides Fr. S. M. I p. 369 (1821)
Boletus abietinus Cumino Fung. Valli Pesii p. 24. — non Dicks.
Icon. Fr. Icon. Hym. t. 187 f. 3, Rostk. in Sturm Deutschl. Fl. Pilze t. 46.
Bibl. 511, 430, 245, 1032

Hab. ad truncos arborum fagineos abietinos et betulinos — Piemonte: Valle di Pesio (Cumino), Veneto: Treviso, sur vam. di fagus a Vittorio (D. Sacc.)
Area Distr. Europa, Australis, Amer. bor.

Hericioides 267

Pileo coriaceo, tenui, rigido, effuso-reflexo, e pubescente glabrato, griseo-fusco, zonis concoloribus, 1-1,5 cm. longo, 1-2,5 cm. lato;

poris curtis, majusculis, obtusis, differentibus albis; sporis laeti-oblongis, 9-11 ≃ 4-4,5, hyalinis; hyphis subhymenialibus 2-4 μ. cr.

~~Rarus et insignis~~

Obs. ~~Cresce nel modo stesso che C. abietinus~~. Sec. il Bresad. F. Kmet. p. 28, la specie appartiene piuttosto al gen. Trametes a cui questa non differisce che Trametes mollis (Somm.) Fr.

17 Polyporus hirsutus (Wulf.) Fr. Nov. Symb. myc. p. 86 (1851)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 257, Boletus hirsutus Wulf. in Jacq. Collect. II
t. 14 (1796)
Icon. Bertoia F. mosc. t. 8 f 1-5, Venturi Myc. Bresc. t. 61 f 2-3
Hard, Mushrooms p. 402 f. 342.
Bibl. 61, 143, 209, 243, 131, 417, 418, 434, 653, 802, 866, 923, 927, 995,
1170, 1203, 1219, 528, 245, 357, 690, 725, 1605, 1456
Hab. ad ramos et truncos ~~vel stipites~~ — Liguria, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Trentino, Litorale, Cant. Ticino, Emilia, Lazio, Napoletano.

Area Dist. Totus fere orbis.

Exs. Myc. Ital. n. 408, Myc. Ven. n. 15

611. . . —

Var. scruposus Sacc. Fung. Ven. nov. ser. V p. 163 (1876). a typo recedit pileo tubercu-
loso-scruposo. Exs. Myc. Ven. n. 16.
Hab. ad truncos Carpinum — Veneto - Vittorio.
Var: marginatus Bres. Hedw. 1885; pileo eximie ferrugineo - marginato. : Hab. Rovereto (Bres. MS.)

hirsutus 257

U

Pileo suberoso – coriaceo, convexo – plano, pilis rigidis hirto, unicolore sed sulcis concentricis zonato, albido, 5–6 cm. longo, 3–4 cm. lato;

(poris rotundis, obtusis, albidis, subfuscescentibus;

Sporis elongatis, plerumque curvulis, 6–8 = 2 (Bres. Myc.

— Variat: B. – poris omnino albis

C. – poris ore luteis, intus vero albis (Secr. n. 75)

D. poris obtusis, angulatis

E. – pilei margine ferrugineo (Secr. n. 76

Fl. Dan. t. 2079 f. 1)

F. – pileo nigricante.

Obs. Distintissimo da Polust. velutinus a cui lo unisce Persoon in Myc. Eur.

~~Var. ferrugineus~~

Obs. Varia a pori del tutto bianchi, o bianchi coll' orlo gialliccio, ~~rotondi~~ di forma più o meno angolosa, a pileo ferrugineo al margine o più o meno oscuro, ~~rosso~~ Pers. Syn. Fung. dal sito o dall'età

18 Polystictus multicolor (Schäff.) Sacc. Boletus multicolor Schäff. f. Germ. IV p. 91 t. 269 (1774)
Polystictus zonatus (Nees) Fr. Nov. symb. mycol. p. 86 (1851)
Sacc. Sylt. Germ. VI p. 260, Boletus zonatus Nees Syst. Pilze p. 221 t. 28 f. 221 (1816) ~~Boletus multicolor Schäff.~~
Germ. Schäff. l. c., Nees l. c., Batt. F. arim. t. 35 B. (Agaricus cinereus, margine albo), Quél. Champ. Jura I t. 18 f. 4.
Bibl. 61, 209, 244, 103, 430, 434, 446, 653, 661, 866, 1133, 529, 245, 983.
Hab. ad truncos varios, praecipue arborum frondosarum — Liguria, Piemonte, Veneto, Cant. Ticino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano. — Vere aestate, Trentino: sopra Arnago (Bres. Mss.)

Area distr. Europa, Ind. orient., Borneo, Mexico.

multicolor.
= zonatus 260

Pileo suberoso-coriaceo, convexo, postice tuberculoso gibboque, subzonato, villoso, opaco, margine albicante;

poris minutis, rotundis angulatisve, obtusis, albidis; sporis ~~6-9=3-4, vel~~ 7-8=2-3, ~~E~~, hyalinis, elongatis; basidiis 15=5 (Bres. MS.)

Obs. Per la forma del cappello, per la mancanza di lucidita' ecc. ~~certo~~ differisce da Polyst. versicolor, ma ~~il cb. Prof.~~ gli è certo assai affine

~~da lui raccolse~~ nel medesimo tronco di Betula e dal medesimo micelio delle forme col cappello e tutto grigio o lutescente e ben zonato, tanto ch'egli pensò appartenere a Polyst. ~~versicolor~~ multicolor ~~L.~~ il Polyst. serialis ~~Rostk~~ Rostk. t. 49.

La figura di Pol. serialis Rostk. in Sturm t. 49 rappresenta una var. grigia.

19 Polyporus velutinus (Fr.) Cooke in Grev. XIV, 1886, p. 83.
Sacc. Syll. fung. VI n. 258, Polyporus velutinus Fr. S. M. I p. 368 (1821)
Icon. Rabenh. Hymen. t. 609 f. 60 et t. 630 f. 149, Rornell, Hym austro-americ. I t. 1 f. 22.
Bibl. 209, 245, 417, 418, 420, 585, 725, 866, 923, 1133, 1284, 528, 317, 737.
Hab. ad truncos et ramos languidos v. emortuos (imprimis arborum frondosarum) — Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano.
Area distr. Europa, Siberia, Borneo, Java, Japonia, amer. bor. et merid., Cuba, Nova Zelandia, Australia
Exs. Erb. crit. ital. n. 804 et 1051, Myc. Ven. n. 17.

velutinus 258

Pileo suberoso-coriaceo, utringue plano,

velutino-molli, leviter zonato, albo,

demum lutescente, margine extenuato, acuto, circiter 5 cm. lato;

poris rotundis, minutis, gemino, albis;

sporis 6-8 = 2,5 cylindraceis (vel oblongis), subcurvulis, hyalinis, protoplasmate granuloso-fulvo; Bres. M.S.

basidiis 15-20 = 5-6 vel 18-22 = 3-4

— Junior humidus, dein induratus, non nitens

ut P. versicolor, zonae paullum modo obscuriores.

20 Polystictus tomentosus (Fr.) Cooke in Grev. XIV (1886) p. 77.
Saq. Syll. Fung. VI p. 208, Polyporus tomentosus Fr. S. M. I p. 351 (1821)
Lenz. Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilz t. 7 (Polyp. rufescens), Brinzelm. Hymen.
t. 611 fig. 66 et t. 632 f. 141, Bresadola, Krypt. f. 3258.
Bull. 418.
Hab. ad ligna in pinetis — Trentino. Valle Lagarina (Cobelli) Bosco di Terzolas, Ala (P. Placido) (Bres. M.S.)
Area distr. Europa, Australia, Amer. bor.

Sect. V Perennes Fr.

Fomentofury 208

Pileo suberoso, duro difformi, arcuato, usque 12 cm. lato ± stipiteque inaequali persistenter tomentosis, fulvis;

pois exiguis, aequalibus, obtusis, integerrimis, primitus rore albido tectis; sporis oblongo-pruniformibus 9-10 = 2,5-3, hyalinis.

Oss. Differisce da P. circinatus per la carne omogenea, pel cappello irregolare, stalara laterale. È prossimo invece a P. perennis ma è più grasso.

Il P. Kalchbrenneri secondo Bres. (M.S.) non sembra distinto.

2 Polystictus fimbriatus (Bull.) Sacc. Boletus fimbriatus Bull. Champ. t. 256 (1785)
Polystictus pictus (Schultz) Cooke, Grev. XIV (1886) p. 77
Sacc. Syll. Fung. VI p. 210, Boletus pictus Schultz, Fl. Starg. p. 485 (1819)
Icon. Michel. N. pl. gen. t. 70 f 9 (Polyporus exiguus, coriaceus), Bal-
liard, l.c. Champ. Fr. t. 256 (Bol. fimbriatus)
Bibl. 785, 12, 725, 866, 1031, 446, 1301
Hab. ad terram, muscosam — argillosam, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia. — Aestate
Area dist. Europa. → sopra Malè (Bres. MS.)

Obs. Il Polystictus fimbriatus (Fr.) Cooke, diverso e molto posteriore (1820) potrà chiamarsi Polystictus Griesii Sacc. S'accosta a Polyst. perennis, ma è più gracile, più pulito e di più breve durata.

fimbriatus = picus

216

ferrugineus ; pileo coriaceo , tenui , plano - umbi = licato , zonato [→ zonis fuscis obsoletisque , fuscescente , e pubescente glabrato ; margine tenuissime incaso - fimbriato , 2,5 cm. lato , poris ~~de~~ dilutiore) ;

stipite gracili , glaberrimo , deorsum attenuato ;

poris subrotundis , minutis , integris ;

sporis sub microscopio chlorino - hyalinis , guttulatis , subovatis 6 - 7 = 4 - 5 (Pres. M.S.)

— Dense gregarius , stipitibus ~~f~~ basi pileisque con = fluentibus .

Oss. di Polyst. perennis è più gracile , più pallido , ma di più breve durata e foscheg = giante .

22 Polystictus cinnamomeus (Jacq.) Sacc. Michelia I p. 362 (1878), Syll. VI p. 216

Boletus cinnamomeus Jacq. Collect. I p. 116 tab. 2 (1786)

Icon. Jacq. l. c., Bres. F. Trid. I p. 88 t. 99, Hard, Mushrooms p. 414 f. 344, Van Bambeke in Bull. Soc. bot. Belg. 1909, t. I f. 1-7.

Dill. 234, 245 1036, O

Hab. in nemoribus, solo detritico — Veneto, Trentino; Bosco d'Inzenga (Bres. mus.), Piemonte — Aestate

Area dist. Italia, Austria, Australia

cinnamomeus 210

Totus extus et intus vivide cinnamomeus, hymenio vero dilutiore; pileo plano-depresso, vel subinfundibuliformi, 2-3 cm. lato, zonato; margine saepius eximie fimbriato; hymenio versus marginem sterili;

stipite velutino-tomentello, 3-4 cm. longo, 4-5 mm. crasso;

sporis majusculis angulosis (pentagonis vel hexagonis); sporis ellipsoideis (ovatis vel subglobosis) 5-7 = 4-5 flavidis. — Solitarius vel caespitosus.

~~Oss. Affine a Polystictus perennis e a Polyst. pes fimbriatus, da cui si riconosce tosto pei pori del doppio o del triplo maggiori.~~

Polystictus perennis (Linn.) Fr. Nov. Symb. n. 71 (1851
Sacc. Syll. Fung. VI p. 210, Boletus perennis Linn. Sp. pl. ed. I p. 1177, (1753
Icon. Bull. Champ. Fr. t. 28 et t. 449 f. 2, Mich. N. pl. gen. t. 70
f. 8 (Polyporus lignosus fulvus) et f. 10 (Polyp. exiguus alpinus)
Rolland Atl. Champ. t. 89 f. 197, Rostk. in Sturm Deutl. Fl. Pilze t. 6,
Schäff. Ic. Fung. t. 125, Venturi, Mic. Brescia t. 61 f. 1.
Exsicc. 51, 61, 90, 123, 209, 244, 65, 417, 430, 434, 518, 585, 639,
836, 923, 927, 995, 1133, 1212, 1219, 858, 1284, 631, 243, 357,
725, 803, 983, 1093, 868.
Hab. ad terram muscosam, sterilem, frequens — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto
Cant. Ticino, Trentino, Umbria, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica,
Area totus fere orbis.

Exs. Roum. F. Gall. n. 2206 (Pisa: Savi)

perenny 210

Pileo coriaceo, tenaci, plano-infundibuliformi, e velutino glabrato, zonato, e cinnamomeo fpadiceo, 3-6 cm. lato;

ftipite firmulo, deorsum incrassato, velutino, 2,5 cm. longo, crassitie variante;

foris minutis, angulatis, acutis, primo albo-irro-ratis, dein nudis, laceris;

fporis ovoideis, hyalinis, 4-5 = 2,5

24 Polystictus carbonarius (Fr.) Cooke, Grev. XIV (1886) p. 78
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 212, Polyporus carbonarius Fr. S. Myc. I p. 369
(1821).
Icon. Micheli, Nov. pl. gen. p. 131, t. 70 f. 6 (Polyporus lignosus et caespitosus...)
Rabh. 785.
Hab in areis carbonariis — Toscana: ~~prope~~ nei monti A. Pistoja (Micheli). Aut.

Area Sibiu Italia.

carbonarius 212

Pileo coriaceo, tenui, orbiculari, plano-infundibuliformi, zonato, glabro, nigricante;
stipite ♁ brevissimo, aequali porisque minutis albis.


– Elegans, parvus, 2,5 cm. vix attingens.
Ob stipitem cum nullo huius sectionis conjungi potest et poris albis ad Hornodinos transit.

50
Trames 16

61/0003-11-1

Phil

Tramites



Trametes

Conspectus synopticus sectionum et specierum

A_1 - Species non resupinatae, sessiles, dimidiatae Sect. I^a Sessiles Fr.

B_1 - Contextus et pori albi vel semifer colorati

C_1 - Odor fragrans

D_1 - Pileus demum zonatus ..... 1 - Tr. Billiardi

D_2 - Pileus azonus

E_1 - Pileus albus ..... 2 - Tr. suaveolens

E_2 - Pileus umbrinus ..... var. umbrina

C_2 - Odor nullus vel diversus

D_1 - Pori et pileus rubescentes ..... 3 Tr. rubescens

D_2 - Pori albi vel ochroleuci

E_1 - Pilei membranacei, tenuissimi ..... [12 Tr. subsimosa]

E_2 - Pilei stupeo-suberosi

F_1 - Pileus albidus

G_1 - Pileus villosus, gibbosus ..... 4 Tr. gibbosa

G_2 - Pileus piloso-hispidus ..... [9 Tr. lutescens var. Trogii]

F_2 - Pilei testacei, vel lignicolores, effuso-reflexi, seriatim elongati

G_1 - Pori albi ..... 5 Tr. serialis

G_2 - Pori flavescentes ..... 6 Tr. flavescens

B_2 - Contextus et pori intense colorati

C_1 - Tolus fungus axitus intusque cinnabarinus ..... 7 Tr. cinnabarina

C_2 - Contextus fulvus

D_1 - Pileus fulvus vel e fulvo fuscus

E_1 - Pileus azonus, hygrometer ..... 8 Tr. protracta

E_2 - Pileus zonatus, imbricatus ..... 9 Tr. lutescens

D_2 - Pileus umbrino - nigrescens vel e ferrugineo - fusco nigricans

E_1 - Odor subfoeniculaceus; pori fulvo - cinnamomei ..... 10 Tr. amulata

E_2 - Odor debilis, diversus; pori luteo - lateritii ..... 11 Tr. Pini

A_2 - Species resupinatae Sect. II Subresupinatae Fr.

B_1 - Pileus et pori albi vel semiter colorati.

C_1 - Pileus albus demum pallescens ..... 12 Tr. serpens

C_2 - Pileus demum griseolus, cervinus vel flavescens

D_1 - Pilei membranacei, tenuissimi ..... 13 Tr. subsimosa

D_2 - Pileus suberoso - coriaceus vel stupeo - suberosus

E_1 - Pileus dilute cervinus ..... 14 Tr. cervina

E_2 - Pileus flavescens ..... [6 Tr. flavescens]

B_2 - Pileus et pori intense colorati

C_1 - Tolus fungus sebraceo - citrinus, intus albidus ..... 15 Tr. campestris

C_2 - Pileus fuscus, zonatus; pori ex albo alutacei ..... 16 Tr. nigrescens

11 Januar 1915

(1836)

Trametes Fr. Epier. pg. 488, Hym. Eur. pg. 581, Nov. Symb. pg. 95

Sacc. Syll. Fung. VI pg. 334 (Etym. trama). —

Pori subrotundi, obtusi, integri, saepe profunditate inaequales, nec stratum hetero-geneum formantes, subtus in carne pilei immersi, unde trama cum carne pilei contigua et similaris. Fungi lignatiles, lignosi vel suberosi, indurati, sed non stratosi, saepe vulgo suaveolentes. Sporidia normalia; sporae hyalinae, ovoideae v. cylindraceae; cystidia rarius occurrunt.

Obs. Genere intermedio tra Daedalea, Polyporus e Polystictus, nè ancora con precisione limitato. Dalle specie di Daedalea spesso prossime differisce pei pori non tino-sto—labirintici, da quelle di Polyporus, perchè in queste lo strato dei pori è eterogeneo col cappello; in quelle di Polystictus pei i pori ~~i fori~~ sono ~~offerti~~ verticali rispetto al ~~del cappello, il quale contesto è longitudinalmente~~ orizzontalmente fibroso del cappello.

contesto che è orizzontalmente fibroso.

Però esistono numerosi passaggi, che lasciano molto dubbi-tare giusta assegnazione delle specie.

Trametes Bulliardii Fr. Epicr. p. 491 (1838)

Saac Syll. Fung. VI p. 337, Boletus suaveolens Bull. Cham. t. 310 (1786) non Linn.

Icon. Bull. l. c., Michelm. Hymen. t. 614 f. 81.

Bibl. 123, 430, 585, 983, 1514 →

Hab. ad truncos subvivos, potissimum Salicinos — Piemonte, Lombardia, Liguria

Area distr. Europa, Sibiria austral.

Obs. Secondo Quél. Fl. Mycol., p. 373, la specie confusa con Tr. subectans

Bulliardi 337

Pileo suberoso, applanato, levi, glabro,
ex albo fuscescente, demum zonato, 10-11 cm.
lato, 5 cm. longo, ad insertionis punctum usque ad 2,5-3 cm. crasso;
poris subrotundis, profundis, inaequalibus,
e pallido rufescentibus; sporis cylindraceis curvulis,
10 µ longis.
— Intus demum fusceseit. Odor fragrans.

Oss. ~~La descrizione di Fries fatta su esemplari vivi si scosta dal~~ colore da quella degli autori

Trametes suaveolens (L.) Fr. Epic. p. 491 (1838)

Jac. Syll. Fung. VI p. 338, Boletus suaveolens Linn. Sp. pl. ed. I p. 1177. (1753)

Icon. Krombh. Schw. t. IV f. 25, Hard. Pilze t. 49, Grev. Champ. Fr. t. 478

Venturi Mic. Bresc. t. 57 f. 2-3, Pat. Tab. anal. fig. 20.

Bibl. 90, 430, 585, 757, 1210, 1219, 1284, 61, 209, 357, 417, 418, 430, 101 564, 725, 836, 866, 995, 1049 →

Hab. ad truncos arborum frondosarum, imprimis salicum — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Lazio, Napoletano

Valle Lagarina (Cob.), Trento, Malè (Bres. MS.) Calvizzano, Clesio ecc.

Usque ad ver persistens.

Area dist. Europa, Amer. bor.

Exs. Eb. crit. it. I n. 231, Myc. Ital. n. 6, Myc. Ven. n. 22, Cav. F. Longob. n. 16

Var. umbrina Bres. MS. Pileo umbrino; poris albis; → carne albido-fuscidulo zonata; sporis basidiisque typi.

Hab. ad truncos salicinos — Trentino: Campo Trentino (Bres. MS.)

Suaveolens 338

var.

Pileo tuberoso, molli, pulvinato, villoso,
azono, albo, 5-12 cm. lato, 4-5 cm. longo,
basi 3 cm. saltem crasso;
poris rotundis, majusculis, obtusis,
ex albo fuscescentibus;

sporis ovoideis vel limoniformibus ~~4-4,5~~
vel ~~(Brev. Ms.)~~ 10-13 = 3,5-4; basidiis 25=7-8 (Brev. Ms.)
~~vel 8-10 = 3-3,5~~
— Odor fragrans, anisey.

? Trametes rubescens (Alb. et Schw.) Fr. Epicr. p. 492 (1838)
Syst. Syll. Fung. VI p. 33), Daedalea rubescens Alb. et Schw. Consp. Fusat. p. 238
t. 11 f. 2 (1805)

Icon. Alb. et Schw. l. c., Pat. Tab. anal. f. 21, Allen in Trans. Brit. Mycol.
Soc. 1906, t. 16 f. 3.

Brfl. 209, 245, 564, Bres. MS., 1617. →

Hab ad truncos, imprimis salicinos — Piemonte, Lombardia, Veneto, (Valsesia)
Trentino (Bres. MS.)

Area distr. Europa.

Exs. Myc. Ven. n. 1411

rubescens 337

Ubique rubescens, junior albo-pruinosa;
pileo suberoso, tenui, levi, demum zonato, 5-8
cm. diam. 10-15 mm. crasso,
sporis linearibus, elongatis, rectis, angustis,
obtusis, vel rotundis; sporis 7-9 = 2-2,5
(Bres. M.)

Ss. Sembra affine a Trametes Bulliardi
~~perchè ambedue volgono al bianco o al fulva.~~
anzi il Quélet la pone in sinonimia.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. Epicr. p. 492 (1838)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 337, Daedalea gibbosa Pers. Syn. p. 501 (1801)
Icon. Gill. Champ. Fr. t. 474, Rolland Att. champ. t 97 f 212, Strauss in
Sturm Deut. Fl. Pilze t. 6, Swart. Fung. t. 32 f. 9–10.
Bibl. 61, 209, 245, 397, 434, 866, 983, 995, 1115 →
Hab. ad truncos varios — Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino: Tajenga (Bres. M.S.), Bolzano (Krauss)
(Tilia, Fagi, Betulae etc.) → Lombardia, → Toscana, Napoletano.
Area distr. Europa, Asia boreali-occidentalis, Ceylon.

gibbosa 337

Ubique albida; pileo suberoso, compacto, villoso, obsolete zonato, postice porrecto, gibboso, 8-15 cm. lato; margine obtuso; sporis hyalinis 5-6 = 2-2,5 (Bres. Ms.) sporis linearibus, rectis, aequalibus.

— ~~Fungus compactus~~.

5 Trametes serialis Fr. S. M. I p. 370 (1821)
Jan. Sylt. fung. VI p. 337
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 191 f. 2, Karst. Finlands Basidsv. t. V f. 74.
Mey Haussch.. p. 115-116 f. 45-46.
Bibl. Bresadola MS. →
Hab. ad truncos Coniferarum — Trentino e Lombardia (Bres. MS.)

Specie insolere affine nelle vegetazione a Lenzites abietina, perenne: nel primo anno tutta bianca, successivamente assume il colore tortaceo.

Obs. Sec. Bres. MS. la Poria callosa (Fr.) sarebbe la forma resupinata della presente specie.

Serialis 337

~~Ed. Dam~~

Pileis stupeo-suberosis, effuso-reflexis, seriatim elongatis, angustis, confluentibus, villo adpresso rugosis, scrobiculatisque, testaceis, margine porisque obtusis, minutis, inaequalibus albis; sporis 10-12 μ longis, vel (Bres MS.) 9-11 = 2,5-3,5 —)

~~Singularis species, vegetatione lenteris abiesinae. Perennis et primo anno tota alba, sed bovinotina pileo testaceo.~~

Pilei singuli 1-1,5 cm. lati atque ex confluentia series 1/3-1 m. longas efformant.

6 Trametes flavescens Bres. F. Polon. in Ann. mycol. 1903 p. 80, Sacc. Syll. fung. XVII p. 137.

Icon. Fedtsch.

Bibl. Bresadola l. c. et MS. →

Hab. ad ligna abietis excelsae et Pinus silvestris — Trentino (Bres. l. c.)

Area distr. Polonia, Hal. bor. (Trentino)

flavescens 17-137

Pileis stuppeo-suberosis, effuso-reflexis ut plurimum seriatim elongatis saepe scalari-imbricatis, tomentoso-villosis, stramineo-flavidis lignicoloribus vel ochroleucis, 3-8 cm. latis, 1-1,5 cm. antice productis, margine obtuso; tubulis crassiusculis, 3-5 mm. longis, angulatis vel subsinuosis, 0,5-2 mm., acie ex obtusa demum subfimbriata, concoloribus; substantia fibroso-suberosa, lignicolore; sporis hyalinis, cylindraceo-curvulis, 6-8 = 2-3; basidiis clavatis, 18-20 = 4-6; hyphis subhymenialibus crassiusculis, mollibus, crasse tunicatis, 2,5-4 μ latis. — Variat ex integro resupinata, margine elevato tomentoso-villoso.

Obs. Questa specie è prossima a Trametes seriata Fr. da cui tuttavia è ottimamente diversa per la sostanza più fibrosa, pei cappelli più evidentemente villosi, pel color dei pori e dei tubuli non mai puramente bianco e per la forma delle spore.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr. Hymen. Eur. p. 583 (1874)
Sacc. Sylt. Fung. VI, 353 Boletus cinnabarinus Jacq. Fl. austr. t. 304 (1776)
Icon. Jacq. l.c. Bull. Champ. t. 501 f 1, Venturi Msc. Bresc. t. 62 f 4.
Bibl. 209, 245, 216, 397, 398, 417, 418, 430, 518, 585, 725, 802, 866, 995, 1219, 754, 1715, 1879 1301
Hab. ad truncos vetustos arborum frondosarum — Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Litorale, Emilia, Napoletano
Valle Lagarina (Cob.), Ratti, Rovereto, Dimaro (Bres. MS.) Aestate
Area distr. Europa, Sibiria Asiat., Tunisia
Ex. Sacc. Myc. Ital. n. 410, Myc. Ven. n. 1410

annabarina 353

Pileo suberoso, convexo-plano, e subé=
rente glabrato, subazono, rugulosto,
cinnabarino, expallente, ~~intus floccoso~~
2-3 cm. diam., intus floccoso

porisque rotundis, mediis saturatioribus
(teretibus-oblongis curvatis) hyalinis, ~~albidissimo roseis~~
sporis ~~albidis~~ 5-7=2 (Bres. MS.)

— Contextu floccoso, cum trama contiguo
nec longitudinaliter fibrillosa et poris
opposito, ad hoc genus referenda, sistens
tamen typum peculiarem, a reliquis
europaeis distantem (Fr.)

Obs. Anticamente ben conosciuta. Cfr
~~abbiamo~~ Chev. Fern. gen.
XXIV spec. 2. - N. Quelet Fl. myc.
f. 395 le attribuisce pore ovoide-
peniche di 6 p. diam., un po rotee.
Si tratta forse d'altra specie?


Trametes protracta Fr. Vet. akad. Förhandl. 1851 p. 52.
Jan. Syll. fung. VI p. 366
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 191 f 3, Mes Hausschw. p. 121 f 49.
Bibl. 737 →
Hab. ad truncos et asseres varios — Veneto: prov. di Verona (Massalongo)
Trentino: Rovereto nell'Orto dei Cappuccini (Bres. Ms.) (Vere)
Area distr. Europa

Ob. Sec. Bresadola in Ann. myc. 1908 p. 39, è da considerarsi come una forma di Lenzites o Trametes Rabenhorstii

protracta 346

Pileo suberoso-lignoso, triquetro, in longitudinem protracto, inaequabili, azono, e fulvo fusco, contextu porisque mediis, rotundis, subdistantibus, obtusis ± fulvis;
sporis 10-12 = 4 (Bres. MS.)

— Luoad vivendi typum Lenzitis abietinae similima, modo basi lata adnata et utrinque marginem acutum versus decrescens, ut forma exquisite triquetra. Luoad contextum tam Cr. annulatae quam Lenzitis saepiariae affinis.



9

Trametes lutescens (Pers.) Bres. F. hung. Kmet. p. 25 (1897) Polyporus lutescens Pers. Myc. Eur. II p. 71 (1825)

Trametes hispida Bagl. Comm. Soc. bot. it. II (1865) p. 261

Sacc. Sylt. fung. VI p. 346

Icon. deest.

Bibl. 60, 101, 143, 209, 357, 243, 85, 357, 434, 564, 725, 748, 802, 866, 923 1061, 1345,

Hab ad ligna et truncos emortuos arborum frondosarum, praecipue Quercus — Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sardegna

Trentino: Gouiadoro, Palazzo Albere (Bres. Mf.)

Area distr. Europa merid., Algeria

Exs. Myc. Ven. n. 21, ~~Myc. Italic. 822 (p. p. pro parte)~~, Cav. F. Longob. n. 68

Var. Trogii Berk. in Trog Schweiz. Schw. II p. 52 (1850), Tram. populina Sacc. Myc. Ven Sp. p. 53, non alior. — A typo nonnisi colore, albo v. albem, pelli d'ove recedit. (ex algis saepe lurido viridescens)

Exs. Sacc. Myc. Ven. n. 415, Myc. ital. n. 822.

Icon. Lucand Suite à Bull. tab. 124, Gill et Lec. champ. supér. t. 46. 1.

Hab. ad truncos emortuos Populi — Veneto, Trentino, et verisimiliter in tota Ital. sup. (Nizza), Toscana (Cavara n. 244), Napoletano,

Sec. il Bresadola, Hym. Hung. Kmet. p. 25 – 26 ms., alle Trametes lutescens appartengono numerosi sinonimi: Polyporus proteus Berk., Trametes cristata Cooke, Tr. Zollingeriana Lév., Inpex grotus Kalchbr., Polyporus Hausmanni Fr., Trametes Peckii Kalchbr. & c. Sec. lo stesso Bresadola anche il Boletus fawy Batt. Champ. t. 42 I (Salamburgo mal delineato) potrebbe essere la specie presente.

♀ Polyp. obliquus Marcucci non Fr. –

Sec. Patouill. Cat. Champ. Tunis. p. 45 il Polyp. extensatus Dur. et Mont. rappresenta una varietà della specie. lo stesso autore e il Quél. riferiscono alle stesse medesime il Polyp. vulpinus Kalchbr. Icon. Hym. Hung. t. 37 f. 1, che il Bresadola invece riferisce a Trametes popatrina (Schulz.) Bres., la quale in ogni modo è una specie molto affine. è molto affine a Trametes gallica.

Lutescens
346
var.

Pileo subcoriaceo, fulvo subsericeo, demum effuso-reflexo, fuscescente, subinduto, tomentoso-hirsuto, azonato, azonato-rugoso, rugoso, sordide-fulvo, sordide-ochraceo, glabrescente; tubis angustis, dentato-sinuatis, albidis, demum ochraceis, stratosis, rectis; poris angulatis, irregularibus, margine sterili, albido, tenuissimo; sporis 10 – 12 = 3 – 4, cum alterans 14 = 5 (Bres. Myc.)

10 Tramates amulata (Schäff.) Sacc. Boletus amulatus Schäff. IV p. 77, t. 106 (1774)
Tramates odorata (Wulf.) Fr. Epicr. p. 489 (1838) (1788)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 345, Boletus odoratus Wulf. in Jacq. Coll. Bot. II p. 150)
Icon. Schäff. Icon. Fung. t. 106, Hoffm. Veget. Herc. t. I, II, V (Bol. cerato-
Herb. Bull. 245, 430, 518, 585, 1203, 1032, 1715 → Lombardia (Val Sesia),
Hab. ad truncos et ligna Conferarum — Piemonte, Veneto, Trentino: Tunes
(Grüss), bosco d. Magras (Bres. MS.) Autumno
Area distr. Europa, Sibir. et Lapponia rossica, Amer. bor.
Syn. Erb. crit. ital. $\frac{II}{X}$ n. 805

anulata = odorata 345

Pileo suberoso, submolli, villoso, sitaneo intusque fulvo, annoso dilatato, concentrice sulcato, rugoso, tomentoso, umbrino-nigrescente; margine

poriisque subrotundis oblongisque fulvo-cinnamomeis;

sporis 9-11-4 (Bres. MS.)

– Perennis, sed non distincte stratosa.

Odor gratus, subfoeniculaceus.

Obs. Come Lentinus lepideus e Polyporus squamosus nei luoghi nascosti e nelle cave dà luogo a moltissime forme abnormi:

(B. ramos corniculatos formans: Ceratophora fribergensis Humb. Frib. pg. 112 t. 1, Boletus ceratophorus Hoffm. –

C. pulvinata: Boletus polymorphus Hoffm. D. mycelio luxuriante fibrilloso: Daedalea variicompta Link (« ? »). Cfr. Schrad. Spic. pg. 170, alb. & Schw., pg. 250, Fries Syst. Myc. I pg. 336.

11 Tramates Pini (Thore) Fr. Epicr. f. 489 (1838) † Thore, Essai cht. Dép. des Landes. p 487 (1803)

Sacc. Sylt. Zeitg. VI f. 345 Boletus Pini Brot. Fl. Lusit. II f. 468 (1804)

Icon. Nees Syst. II ed. t 21 f. 1-3, Karst. Finl. Basidio. t. VII f. 90, ~~Boletus~~ Rostk. in Schum Deut. Fl. Pilze t. 50, Sobla, Fitopat. t. 4 f. 12.

Bibl. 23, 65, 483, 671, 923, 631, 1715, 101, 65 →

Hab. in truncis Conferarum, quibus valde nocet — Veneto, Trentino, Toscana, Lazio, Corsica

Area distr. Europa, Amer. bor., Cuba, Australia

Exs. Erb. crit. ital. I n. 1133.

Pini 345

Pileo suberoso-lignoso, duristimo, pulvinato, concentrice sulcato, rimoso-scrupposo, aspero, e ferrugineo-fusco nigricante, intus fulvo-ferrugineo;

poris magnis, subrotundis, oblongisve, luteo-lateritiis; sporis 6-8 = 6; sebulis cuspidatis, fulvis 40-80 = 12-16. (Bres. ms.)
— Perennis, sed nulla strata distincta.
Odor debilis.

~~Obs. La descrizione è per disteso di fac data da Fries in Linn. V pg. 514~~

(1818)

12 Trametes serpens Fr. Hym. Eur. p. 586 (1874)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 355, Daedalea serpens Fr. Obs. myc. II p. 265 t. 6 f. 2 et S. M. I p. 340 (1821)
Icon. ~~Obscurata et~~ Fr. l. c. et Icon. Hymen. t. 192 f. 3.
Saund. et Sm. Mycol. Ill. t. 45 f. 8–12.
Hab. ad corticem, imprimis quercinum, alnum, salicinum — Veneto (Berl.), Trentino (Bres. Mss.) : Goriziano etc.
(Bibl. 182, Bres. Mss. →

Area distr. Europa, Africa Asiat., Amer. bor., Ceylon., Australia.

Arida, acute adnata, primo erumpens, tuberculiformis, orbicularis, dein confluens alba, ambitu determinato, pubescente; poris petrohunchis x angulatisque, inaequalibus, obtusis, latiusculis 1/4 mm. latis;

sporis permagnis, ovoideis, hyalinis, 14–6 vel 12–15 = 5–6 (Bres. MS.)

— Species distinctissima, cum Radulo orbiculari analoga. Color demum pallescens.

13 Trametes subsimosa Bres. F. Polon. ex Ann. Mycol. 1903, p. 82, Sacc. Syll. Fung. XVII p. 136, Polyp. simulans Pl. auct. non Fr.
Icon. deest
Bibl. Bres. l.c. et MS. →
Hab. ad truncos prostratos Pini sylvestris — Trentino (Bres.)
Area distr. Anglia, Hungaria, Polonia, Germania, Ital. bor.

subsinuosa 17-136

Generatim resupinata, raro rudimenta pileorum vel pileos geminos exserens; ex orbiculari longe lateque effusa; subiculo tenui, membranaceo, 0,5 mm. circiter crasso, albido, ambitu demum separabili et subreflexo vel pileiformi; pileis tunc 3-5 mm. antice protensis, tenuissimis, in magis evolutis zonatis, zonis interdum pubescentibus, ex albo griseolis; tubulis crassiusculis, 2-3 mm. longis, albidis; poris ex albido stramineis vel ochroleucis, mediis vel majusculis, 0,7 – 3 mm. latis, variantibus quoad formam, scilicet rotundatis, angulatis, vel oblongis, acie demum lacerato-subfimbriata;
sporis oblongo-subamygdaliformibus, hyalinis, 7-9 = 2,5-3,5 basidiis clavatis 20-25 = 5-6; hyphis tortuosis, crasse tunicatis mollibus, ~~3~~ 3,5 – 5,5 μ latis, ad septa saepe nodosis.

Oss. Questa specie affine a Trametes flavescens. Bres., sembra specialmente confluire colle forme resupinate di questa, ma pel colore prima biancheggio, pei pori maggiori e specialmente per la forma delle spore, certo è specificamente distinta. La forma resupinata fin qui fu da molti autori confusa con Polyporus (Poria) sinuosa Fr. dal quale ottimamente diversifica come sopra vedemmo.

14 Trametes cervina (Schw.) Bres. F. Pol. a. Ann. mycol. 1903 p. 81.
Sacc. Syll. Fung. XVII p. 137, Polyporus cervinus Schw. Fyn. Car. p. 96 n°. 902
(1822)
Icon. Kalchbr. Icon. Hym. Hung. t. 37 f. 6 (Pol. vulpinus)
Bibl. Bres. ms. →
Hab. ad truncos Mori albae — Trentino (Bres. MS.)
Area distr. Polonia, Hungaria, Italia, Amer. bor.

Obs. Lec. Bresad. l.c. qui gerbarii Polystictus byssinus (Fr.) Sacc. Cooke, Tra-
metes pergulina Bres. Hym. Kmet. p. 26 = Polyporus vulpinus Kalchbr.

cervina 17-137

« Pol. cervinus VI 238

Pileo suberoso-coriaceo, subresupinato, conchiformi inaequabili, adpresse velutino, ex ochraleuco dilute cervino, 2zgeo 1,5–2 mm. crasso poris majusculis, sublacerato, ligneo-pallidis; sporis hyalinis, tenuibus, cumulis, 7–9 = 2,5–3; basidiis clavatis — longitudinaliter effusa reflexa subimbricata, 4–9 cm. lata, basi crassiore versus marginem attenuata, subformi-cata, radiato-striatis, subzonatis, sulcis concentricis, obsolete strigoso-velutina. Variat poris lacerati, irpicoidis. Specimen priesianum restaceo-fulvum, rugosum; substantia tenui, alba, stupeo-flocc.a, poris pallidis, oblique prominulis, acutis, basi praecipue laceris, majoribus quam in prostinis.

Pol. biformis VI 240

Subimbricata Imbricata; pileo effuso-reflexo, stupeo-coriaceo, molli, villoso-tomentoso, albo, azono, primo levi dein concentrice sulcato; margine integro acuto, 5–10 cm. lato, 2–5,5 cm. longo; poris majusculis, acutis, ligneo-pallidis, demum lacerato-dentatis, irregularibus. Haec brunneo-violacea

Ex Lyll. XVII – 138

« In fung. Hung. Kmet. deceptus specimine dubio Herbarii Musei Berolinensis frustra Polyporum biformem Fr. ad Pol. pergamenum Fr. duxi, sed postea visis specimini-bus auther-ticis Musei Upsaliensis tam Polypori biformis Fr. quam Polypori cervini Schw., mox diversitatem specierum hic in synonymia allatarum perspexi. » (Bres. l. c.)

15 Frameka campestris Quél. Champ. Vosg. II p 291 t. II f 6 (1872)
Sacc. Syll. Fung. VI 355
Icon. Quél. l.c., Patouillard Tab. anal. f 18
Bibl. Bresad. MS.
Hab. ad ramos emortuos Castaneae etc. — Trentino (Bresad. MS.), Lago: Vallelun. (Bres. MS.)
Area distr. Europaea. Gallia, Italia.

campestris 355

Pusilla, resupinata, carnoso-suberosa, fulvinata, vix marginata, glabra, ochraceo-citrina, intus albida; fulvi-nubij 9-13 mm. altij, siccitate indurati, (fulgidibus, fulvis;) sporij amplis, polygonij, demum fimbriatij; sporij (e strato) hyalinij, cylindraceij, 12-16 = 5,5-6,3

— Typus omnino peculiarij

16 Trametes nigrescens Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 165, Sacc. Syll. Fung XXI p. 344.

Syn. Deest

Bibl. Bres. l.c. →

Hab. ad ramos Abietis viridis — Trentino in regione alpina (Bres. l.c.)

Area Geb. Hal. bor. Tirolia


nigrescens 21-344

Resupinato - effusa, superne margine crasso, pileiformi, 1,5 - 4 cm. lato, 4-10 mm. crasso, glabro, rugulojo, fusco, zona alutacea vel rufo-carnea, dein unicolori cincto praedita; sububij 4-6 mm. longis, pallido-alu. facey; porij angulatis, primitus albij, dein alutacei, 1/3 - 1/2 mm. latis; contextu filei ligneicolori; sporij hyalinij, oblongis, imo latere subcompressis, 12 - 13 = 4 - 5; hyphij contextus tubulorum 2 μ crassis.

Obs. Pel modo di crescere si accosta a Trametes saepium Berk.; per affinità però si avvicina più a Polyporus (Tramopes) stereoides Fr.; da ambe però ben distinta.

61

Hexagonia



A1/0003-12-1

Diagnosis Generum

non Polimi (quae = Favolus)

Hexagonia Fr. Epicr. p. 496 (1838), Sacc. Syll. Fung. VI p. 356. (Etym hexagonus ob pororum formam). — Hymenophorum in stramam pileo concolore et similarem descendens. Pori jam primitus in alveolos hexagonos, regulares, lignoso-indurato dilatati, parietibus firmis, nunquam lacerato-fimbriatis, sessiles, epixyli, suberoso-lignosi, persistentes, sed non stratose reviviscentes.

Obs. Genere molto naturale, facilmente riconoscibile, rappresentato da numerose specie nelle regioni calde; nella regione mediterranea dell'Europa due specie sole furono raccolte. Il carattere essenziale sta negli alveoli fin dalla prima età egualmente ampii, mentre nei Polyporus i pori giovanili sono minuti e soltanto a poco a poco si spiegano e si dilatano. Il nome primitivo di Pollini e di Fries non è Hexagonia (Mont.), ma Hexagona che va conservato.

Sp. Basidia normalia; sporae teretiusculae, hyalinae.

Hexagonia nitida Dur. et Mont. Fl Alger. inéd. Atl. t. 33 f. 1 (1846), Sacc. Syll. Fung. VI p. 366 et in Ann. mycol. XI (1913) p. 325, Hexagonia Maraccaana Bagl. et De Not. in Erb crittog. it. II n. 90.

Exs. Erb. crittog. it. II n. 90, Maraccci Un. it. n. 69 (1866) // Hexag. Mori Marc. non Pol.)

Icon. Dur. et Mont. l. c., ~~Hexag~~ Lloyd, Syn. Hexag. 1910 fig. 290.

Bibl. 85 et Sacc. ll. cc. →

Hab. in truncis (imprimis Quercus Ilicis) quercinis — Sardegna, in pareti. Lucyth. (Marcucci, Gennari, Canepa)

Area distr. Algeria, Pyrenaei, Rhodus, Sardinia

Diagn. a Maraccaana, vitrea. Solis cognitis, dermine evidenter diversa

nitida 366 v.r.

Pileo subligneo coriaceo, dimidiato, semiorbiculari, angulato
supra convexo glaberrimo, nitente, umbrino —
fuliginco, sulcis concentricis ~~obscurioribus~~ demum
evidentioribus, margine acutiusculo i
zonato, alveolis amplis, e rotundo hexagonis,
vel pentagonis
profundis, glabris, nigricantibus, sporis Lorato-oblon
gis, utrinque subrotundatis, apice lenissime curvulis, 14-15 = 5,5-6,
hyalinis, granulosis, levibus.
— Pileus crassus, semiorbicularis, sessilis 7-9 cm.
latus, 4 cm. longus, ~~subtus~~ carne vix 1 mm. crassa.
~~(in specimine~~
~~exsiccato) subplanus, (in alcotico) ad~~
~~basin gibbosus, ita ut sectione verticali dimidius ±~~
~~triqueter appareat~~; alveoli amplis, fere 2-2,5 longi
1,5-2 mm. lati, ~~profundi, posteriores longissimi~~
~~disseptimentis validis ore alternato obsoletis;~~
~~caro pilei tenuissima, vix 1 mm. crassa;~~
~~contexta liberis flocculosis, umbrinis, in~~
~~stratum descendens.~~

Obs. Col colore e le zone del cappello ~~dove~~
distinguesi da Hexagonia vespacea e
per la glabrizie da Hexagonia Moltkenboerii
Lév.

72

Daedalea

41/0003-13-1

(Daedalea)

Conspectus synopticus specierum

A_1 - Sessiles

B_1 - Non resupinatae

C_1 - Pileus suberosus

D_1 - Pileus lateritio - fuscus, pori demum rufo - fusci .. 1. *D. confragosa*

D_2 - Pileus et pori aliter colorati

E_1 - Pileus glaber

F_1 - Pileus azonus, intus concolor .. 2 *D. quercina*

F_2 - Pileus intus zonatus, discolor ... 3 *D. Inzengae*

E_2 - Pileus velutinus vel tomentosus

F_1 - Aurea ... 4 *D. aurea*

F_2 - Cinerea ... 5 *D. cinerea*

C_2 - Pileus coriaceus, humida fuliginea, sicca albido - grisea .. 6 *D. unicolor*

B_2 - Resupinatae

C_1 - Ligneo - pallens

D_1 - Intus zonata et parallelo - filamentosa .... 7 *D. latissima*

D_2 - Pileus azonus, intus concolor ... [2 *D. quercina*]

C_2 - Cinerea vel fuscescens

D_1 - Pruinosa; pori demum flaventes ..... 8 *D. orbicularis*

D_2 Villoso - strigosa; pori fuscescentes ..... [6 *D. unicolor* var. *resupinata*]

A_2 - Substipitata; pori rhomboidei (Favolus?) ... 9 *D.(?) Broussonetiae*

(1801)

Daedalea Pers. Syn. pg. 449 Hym. pg. 586, Sacc. Syll. Fung. VI pg. 370 (Etym. daedaleus seu labyrinthicus ob poros), Agarici daedalei tinibus Battarr. — Pori firmi adulti sinuosi labyrinthiformes; religua omnino Trametis. — Fungi lignatiles, indurati, contextu floccoso in tramam immutatam descendente.

Basidii normales i sporae ovoideae v. cylindraceae, hyalinae.

(specialmente nello stadio iniziale)

Non mancano transizioni ai generi Trametes, Polyporus e Lenzites

D.S. ~~Esam~~ ~~Esclusi~~ ~~Lenzites~~ e ~~Trametes~~ il genere Daedalea è ~~trattenuto~~ limitato, perchè a queste ~~molto affini~~.

Ma generalmente il genere si distingue bene e merita essere mantenuto.

1 Daedalea confragosa (Bolt.) Pers. Syn. p. 501 (1801), ~~Bolt~~
Sacc. Sylll. Fung. VI p. 372, Boletus confragosus Bolt. Fung. IV. Pl. t. 160 (1791)
Fr. Bolton l.c., Bull. Champ. t. 491 f. A-B, Hard Mushroom fig. 358.
Bibl. 90, 397, 398, 430, 585 →
Hab. ad truncos arborum frondosarum — Liguria, Piemonte, Lombardia,

Area distr. Europa, Amer. bor.

confragosa 372

Pileo suberoso, convexulo, scabro, subzonato, unicolore, lateritio-fusco, intus ligneo-colorato, ferrugineiascente; stipite e poroso angusto labyrinthiformibus, lacerato-sque, e cinereo-pruinoso rufo-fusci; sporis cylindraceis 6-7 μ long. hyal. (Quél.)

~ Daedalea quercina (Linn.) Pers. Lyn. p. 500 (1801)

Syn. Syll. Fung. VI p. 370, Agaricus quercinus Linn. Sp. pl. II ed. p. 1176 (1753).

Icon. Bocc. Mus. Fis. t. 305 f 5 (Fung. lign. daed. gibb.), Grev. Scot. Cryp. Fl. t. 238, Langi F. d. Roma t 20 f 3, Nees, Syst. t 30 f. 227, Rolland Atl. t. 97 f. 213, Venturi Mic. Bresc. t. 6 f 1-2.

Distr. 51, 65, 90, 123, 209, 243, 263, 65, 85, 103, 957, 426, 429, 417, 418, 430, 434, 564, 568, 585, 653, 656, 712, 801, 836, 866, 923, 983, 995, 1133, 1210, 1219, 212, 858, 1284, 1456, 101, 1347, 1301 →

Hab. ad corticem et ligna putrescentia quercina – Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Sardegna, (Valle Lagarina (Cob.), Magras, Malè (Bres. ms))

Area distr. Europa, Tunisia, Amer bor.

Exs. Myc. Ven.: 23, 24, 25 –, Erb. crit. ital. I n. 142.

Obs. Varia assai nella forma, potendo spesso trovare nelle forme effuse e resupinate il Quél. Fl. myc. p. 369 riferire la specie al gen. Lenzites!

guerana 370

Ligneo-pallens; pileo suberoso, rugulososo, inaequabili, azono, glabriusculo, intus concolore, primo poroso;

poris dein in simulos subcontortos lamellos=

sove labyrinthiformes abeuntibus, acie obtusa.;
sporis 5-7 = 2,5 (Bres. Myc.)

— Ab Hymenium primitus aporum dein porosum, tandem crasse lamellosum nec radians a Lenzite diversa.

Varietates numerosae: effuso-reflexa Schaeff. t. 231:
pileo membranaceo extenso, zonibus longissimis;
tota reflexinata Bull. l. c. J. Pers. Myc. Eur. t. 184. 1

Daedalea Inzengae Fr. in Inzenga F. Sicil. II Cent. p. 8, t. 2) (1879), Hym. Eur. p. 587) (1874)

Jan. Syll. Fung. VI p. 371

Icon. Inzenga, ~~Fedrici~~ l. c.

Bth. 434, 639. →

Hab. ad truncos putres Gle d'Ischiae Triacanthi — Sicilia: Palermo, alla Favorita.

Area distr. Sicilia.

Obs. Della figura 1. direbbe una forma della D. quercina.

Inzengae 371

Straminea ; pileo suberoso, e levi tuberculoso, glabro, intus zonato ± di colore ;

poris curtis, postice daedaleo-sinuosis, marginis subporosis (?)

— Peremis quoque videtur, nova strata addens ; interiora enim strata rufo-brunnea, exteriora pallide subfuscea.

Oss. Affine a Daedalea quercina eccetto il colore ; i pori secondo la figura sono appena 2 mm. profondi.

Daedalea aurea Fr. S. M. I p. 339 (1821)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 371
Jos. Baltarra F. Arim. t. 35 f. F. (Agaricus aureus Daedaleis similibus)
Bibl. 22, 446 →
Hab. ad truncos quercinos — Piemonte: Ungrasca (Valle Intrasca?) (De Notaris), Emilia: pr. Rimini (Baltarra).

Area Dijt. Italia, Gallia Britannia, Amer. bor., Cuba.

Fl. mycol. p. 375
Sec. Quélet, potrebbe essere una forma di Polyporus croceus.

aurea 371

Aurea ; pileo subcarnoso-coriaceo, gibbo, → triquetro, 5 cm. lato, ~~margine tumido~~, ↓, velutino, subzonato, unicolore, margine humido, intus hymenioque e poroso angustesinuato-labyrinthiformi flavis.

— Imbricata veris maxima parte rectis, radiantibus.

Obs. Sebbene convenga con Daed. quercina e Daed. Inzengae per la località, tuttavia sembra specie distinta Lgr.

5 Daedalea cinerea Fr. Obs. mycol. I p. 105 (1815)
Syst. M. I p. 386 (1821), ~~Daedaleoides~~
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 372
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 192 f. 2,
Rabh. 209, 1129, 1133, 1284, 101, 1965 →
Hab. ad truncos, praecipue fagneos: Lombardia, Veneto, Toscana

Area Distr. Europa, Amer. bor.

Obs. H. Guillet rapporte la spece au gen. Lenzites.

cinerea 372

Pileo suberoso-liquoso, crasso, subundulato, zonato, tomentoso, cinereo, 3-8 cm. lato;

poris minutis, obtusis, integerrimis, alijs rotundis, alijs longissimis, labyrinthyformibus, flexuosis, intricatis albis cinereisve; sporis globulosis, hyalinis 6 μ diam. (Britzelm.)

D — Perennis, stratosa.

Obs. È affine a Daedalea unicolor.

6 Daedalea unicolor (Bull.) Fr. S. M. I p. 336 (1821)
Jacc. Sylt. Jung. VI p. 377, Boletus unicolor Bull. Champ. t. 501 f 3 (1790)
Jean Batt. G. arim. t. 38 f E (Agaricus daedaleis striis minoribus), Berkeze
F. mosc. t. 7, f 4-6, Panzig. in St. F. ital. fig. 1125, Nees Sygst. t. 30 f 229.
Bibl. 61, 90, 117, 209, 243, 245, 103, 131, 328, 362, 417, 418, 430, 434, 564,
585, 671, 737, 866, 530, 983, 1170, 1284, 631, 1456, 101, 1723. →
Hab. ad truncos et ramos arborum frondosarum — Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Sicilia, Corsica.
Sardegna, - Aestate (Valle Segarina (Cob.), Argegno, Malè, Ala (Bres. MS.)
Exs. Myc. Ven. n. 26, 27, Erb. crittt. it. I n. 333, Myc. Ital. n. 1209

Area distr.: Europa, Australia.

unicolor 377

Pileo coriaceo, villoso-strigoso, ~~ch~~ cinereo, zonis concoloribus;

similis labyrinthyformibus, flexuosis, intricatis, acutis, demum lacero-dentatis; sporis 6-7-4 (Bres Myc.)

– Vulgo imbricata, humida fuliginea, sicca albido-grisea. Hymenium albido-cinereum, interdum fuscum.

(Duplex hujus forma: altera crassior, margine albido, dissepimentis firmioribus, distantibus, sinulos magis integros formantibus; altera tenuior, latior, similis angustioribus, magis laceris.)

(Variat quoque resupinata et obscurior. ~~S. subsonia, Ital. Oss. Bull. t. 501, f. 3 rappresenta una varietà (?) insigne rafforzata coi sinuli minuti.~~

~~Varia quoque resupinata~~

7 Daedalea labyrinthina Fr. S. M. I p. 340
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 383.
Icon. Desm.
Bibl. 430. →
Hab ad truncos vetustos muscosos — Piemonte?, Savoia (Huguenin).
Area Distr. Europa, Austria.

Obs. N Guélet Fl. myc. p. 371 n'admet le Type que dans Transmutans.

latissima 383

Effusa, tuberoso-lignosa, crassa, undulata, ligneo-pallens, intus zonata; tubulis angustis, distantibus, subrotundis et longissimis, flexuosis

~~subtus dilute~~

— Resupinata, 10-70 cm. lata. Structura ordinaria peculiaris, a basi ad superficiem radians, parallelo-filamentosa.

Obs. Polyporus tuberculosus Pers.

se è una mostruosità sotterranea.

8 Daedalea orbicularis Bagliett. in Comm. Soc. Crittog. ital. II p. 265 (1865)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 383.
Icon. deest.
Bibl. 60, 61, 983. →
Hab. in pavimento sabuloso-calcareo, verisimiliter e fragmentis ligneis impositis
orieus — Liguria: Orto botanico di Genova (C. Bagliett).
Area dist. Italia bor.

orbicularis 383

Resupinata, late orbiculatim effusa,
crassa, suberoso-lignosa, mycelio albicante
adnata quandoque stratose ~~vesi~~ reviviscens,
rotundata, subfusca, pruinosa;
margine crasso, inaequali, undulato, intus ferru-
gineo-fuscescente;
poris brevissimis, minutis, simplicibus, primo lacteis,
rute evolutis flavescentibus.

— Ampla 10-12 cm. lata.

Species dubiae

Daedalea Broussonetiae Re Fl. Torin. II p. 309 (ex Cappelli) (1827)

Bibl. 1005, 430

Pori rhomboidei; hiptae brevissimi; pileo plano margine irregulariter lobato

Hab. ad corticem Broussonetiae papyriferae. Piemonte: Torino nel giardino Molineri (Re)

Oss. forse il Favolus europaeus?

13

Roma

41/0003 -16-1

Poria Pers. Syn. pg. 542 (subgen.) Fr. Nov. Symb. pg. 70,
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 292 et XVII p. 131 (Etym. porus)
Physisporus Cher. et Gill, Chysisporus et Poria Karst. —

Pileus nullus vel omnino obsoletus, quare fungus totus resupinatus. Pori matrici vel mycelio plerumque immediate impositi, carnosuli, ceracei, lignescentes, placentas vel membranas adnatas vel secernibiles efformantes. ♀

— E situ horizontali pendent pori recti et e verticali obliqui, nimo uno latere hiantes. Species admodum numerosae, sed permultae definitis characteribus carent ut limitari vix possint.

Basidia normalia; sporae hyalinae, varius Mate colorat.

Obs. Genere da studiarsi accuratamente nei siti naturali e nelle sue varie fasi di sviluppo. Sembra in fatti che talune delle sue specie non siano che stati resupinati di forme che, in migliori condizioni, possano farsi pileate (di Polystictus, Polyporus, Fomes). Però praticamente è opportuno mantenerlo, perchè dei maggiori numero delle specie non si conoscono le transizioni. Il Karsten distingue due generi: Physisporus dai colori pallidi o vivi e Poria dai colori bruni.

Conspectus synopticus Specierum

A₁ - Pori decolorantes

B₁ - Pori primitus carneoli, dein vitellini vel aurantio-incarnati - - - - - - - 1 - P. nitida

B₂ - Pori primitus albi

C₁ - Pori demum fuscescentes vel spadiceo-nigricantes

~~D₁ - Ambitus erecta, cristata~~ 2 - P. obliqua

~~D₂ - Ambitus haud cristata non cristata~~

2 - P. subspadicea

C₂ - Pori demum lactius colorati

~~D₁ - Tactu~~ Tactu cruentata - - 3 - P. sanguinolenta

D₂ - Species hac nota carentes

E₁ - Pori demum flavescentes

F₁ - Species 1 cm. circiter crassa; superficies nodulosa - - - - - - - 4. P. crassa

F₂ - Species tenuior, non nodulosa.

G₁ - Pori flexuosi; odor Liguritiae - - - - - - - - 5 P. sinuosa

G₂ - Pori angulati

6 P. pulchella

. . . . . E_2 Pori demum alutacei vel fulventes
F_1 - Species radicicola ; pori perexigui - - - - - - 78 P. terrestris
F_2 - Species fumigena ; pori majusculi
G_1 - Odor farinaceo-rancidus, fortis - - - - 82 P. rancida
G_2 - Odor diversus
H_1 - Pori stratosi - - - - - - - 97 P. obducens
H_2 - Pori non stratosi
I_1 - Pori demum dentato-laceri - - 107 P. ambigua
I_2 - Pori non dentati, cellulaeformes 117 P. ancilina

A_2 - Pori non decolorantes vel tantum expallentes
B_1 - Pori albi
C_1 - Pori flexuosi ; mycelium floccoso-pulverulentum - - 127 P. farinella
C_2 - Pori non flexuosi
D_1 - Subhyalina ; mycelium xylostromeum - - 137 P. vitrea
D_2 - Species his notis carentes
E_1 - Pori distantes - - - - - - 145 P. reticulata
E_2 - Pori contigui vel hinc inde congesti
F_1 - Color ex albo fallescens vel lignei
G_1 - Mycelium floccosum - - - 156 P. vaporeria
* Tenuissima - - - - - var. macra
G_2 - Mycelium molle
H_1 - Tenuis ; pori centro vel hinc inde congesti - - - 167 P. mollusca
H_2 Crassiuscula ; pori aequaliter dispositi - - 178 P. mucida
F_2 - Color non fallescens
G_1 - Determinata, subundulata 189 P. medulla-panis
G_2 - Indeterminata
H_1 - Pori rotundi - - 199 P. vulgaris
H_2 - Pori angulati
I_1 - Mollis ; mycelium tomentosum - - 20 P. radula
I_2 - Membranacea, tenuis 21 P. calcea
B_2 - Pori nunquam albi
C_1 - Pori cinnamomei alutacei vel ferruginascentes
D_1 - Pori spadicei - - - - - - 22 P. unita
D_2 - Pori cinnamomei
E_1 - Pori majusculi ; subiculum crassum
F_1 - Pori laceri - - - 23 P. ferruginosa
F_2 - Pori integri - - - 24 P. contigua

. . . . E_2 – Pori minimi; subiculum tenue
F_1 – Pori demum canescentes, obliqui – 25 P. Friesiana
F_2 – Pori persistenter cinnamomei
G_1 – Determinata; subtus cute rigida vestita – – – 26 P. levigata
G_2 – Indeterminata, adnata, tuberculata rimosa – – 27 P. emollita
F_3 Pori cinnamomei nigricante obliqui – 28 P. obliqua
C_2 – Pori aliter colorati
D_1 – Pori non rubentes
E_1 – Pori caesio-albi – – – – 29 P. caesio-alba
E_2 – Pori violacei vel purpurei lilacini
F_1 – Determinata, subiculo distincto tenens, violacea – – – 30 P. violascens
F_2 – Vage effusa; mycelium mucedineum.
G_1 – Purpureo – lilacina – 31 P. purpurea
G_2 – Roseo – lilacina, expallens 32 var. rosco-lilacina
D_2 – Pori rubentes
E_1 – Sanguineo – rufa – – – 32 – P. rufa
E_2 – Incarnata vel incarnato – albida
F_1 – Suberoso – coriacea, firma 33 P. incarnata
F_2 – Tenuis, adnata, mollis.
G_1 – Pori subrotundi; margo determinatus, nudus 34 P. rhodella
G_2 – Pori favosi angulati; ambitus byssino – albus 35 P. micans

Poria nitida Pers. Obs. mycol. II p. 15, em. Fr. t. 4 f. 1 (1799) et Syn. p. 547 (1801)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 298 et XVII p. 133
Icon. Pers. l.c. Bond. Icon mycol. I.
Bibl. 417, 418, 1715
Hab. ad ligna putrescentia: Trentino: Valle Lagarina (Cobelli), presso Brentonico (v. Höhn.).
Area distr. Europa, Amer. bor.

Sylt. p. 133 media a [illegible] Syn. p. 491 Lasi ramum?

nitida 298
1733

Effusa, tenuis, subadnata, limitata, lutea, ambitu villoso-marginata; colore laeto, fere aureo et forma subregulari insignis;

subiculum ut plurimum manifestissimum, usque ad 6 mm. crassum, aurantiacum, in magis evolutis basi album, in exsiccatis saepe roseum ~~ex hyphis crasse tunicatis, 3-6 μ crassis, conflatum~~; ~~tubulis et poris aminatis~~, ~~ovatis~~, ~~rotundis~~, aequalibus, nitidis, ~~carnosis~~, mollibus, colore primitus ~~carneolo dein vitellino vel aurantio~~ - incar = nato, ~~compressione vel tacto fuscescentibus~~, ~~mox collapsis~~.

Sporis hyalinis, oblongis, 5-6 = 2,5-3; basi = ~~ovato~~ diis clavatis, 12-15 = 5-6; hyphis contextus tubulorum, vinus granulosis, 2,5-4 μ. (Bres.)

Oss. ~~Questa forma è considerata come tipica in Pers. Myc. Eur.~~ 2, pag. 95, ma la figura in Pers. Obs. 2 t. 4 f. 1 e anche più la descrizione si scostano dalla forma Friesiana. Conviene meglio colla nostra Poria cupora Karst. diversa però di struttura. Secondo Bresad. (Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903 p. 77) questa specie sembra diversa da Poria placenta Fr. per la variazione dei colori, ma probabilmente è solo una sua forma; però il Bresadola fece vedere di queste due specie sottratto esemplari essiccati, onde egli stesso ritiene doversi esaminare esemplari vivi per vedere se trattisi o no di specie distinte. ~~Anche~~ Secondo Bresadola Poria nitida Pers. è una forma più sottile di questa specie, che vi convengono e la diagnosi e la figura; invece Poria nitida di Fr. è affatto diversa.

2 Poria subspadicea (Fr.) Karst. Hattsv. II p. 81 (1882)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 321, Polyporus subspadiceus Fr. S.M. I p. 321 (1821)
Icon. Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze, t. 57 (Pol. murinus)
Bibl. 209
Hab. in truncis putrescentibus, praesertim populinis – Veneto: prov. di Padova (Bizzozero)
Area distr. Europa, Amer. bor., Brasilia

Subspadicea 321

Effusa, levigata, semis, ambitu
byssino, albo ✓ 8-12 cm. longa et lata.
poris curtis, minutis, inaequalibus,
primo rore denso albicantibus, dein
fuscis;
sporis ~~4-5 μ longis~~ ✓ vel 8-9 μ longis (Quél.)
— Primo mollis, albida, dein indurata, fusca.

3 Poria sanguinolenta (Alb. et Schw.) Quél. Ench. Fung. p. 180 (1886)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 313 et XVII p. 135. Boletus sanguinolentus Alb. et Schw. Consp. Fus. p. 257 (1805).
Icon. Quél. Asoc. fang. av. Sc. XX (1891), t. III f 27, Patouill. Tab. anal. f. 454.
Brot. 209, 866.
Hab. in truncis saepius Salicinis, pinetis etc putrescentibus — Veneto: Selva prov. di Treviso, Emilia Collecchio prov. di Parma, Trentino: bosco di Terzolas, Rovereto sull'orto dei Frati (Bres. M.S.) Estate-Autunno.
Area distr. Europa, Tunisia, Amer. bor.

Exs. Sacc. Myc. Veneto II ed. n. 13

Obs. Talora dai tronchi si diffonde anche sulla terra prossima.

Sanguinolenta

313
17-135

Modulosa, mox confluens, effusa, mollis, albida sed tactu cruentata, ambitu byssino evanescente;

poris minoribus, subrotundis, inaequalibus, demum laceris, valde versiformibus; sporis hyalinis, cylindraceo-curvulis 7-10 = 2-2,5 (Bres. Micc), bas. diy 15-18 = 4-5 (Bresad.).

— Mycelium emersum formal nodulos primo byssinos, dein glabratos, in quibus pori nidulantur, sed in pileum non abit.

" Forma hic exhibita est, meo sensu, forma typica, in statu vetusto vix distinguenda et generatim cum Poria violacea confusa. Frequens est ad ligna abiegna et pinea, raro etiam ad corticem, primitus omnino alba et tactu tandem cruentata, sed exiccando incarnata evadit, dein in herbariis purpurea vel demum violaceo-fusca. In hac forma sporae sunt 6-8 = 2-2,5; basidia 15-18 = 4-5 et hyphae subhymeniales 3-5 μ cr. Forma vero ad ligna arborum frondosarum, a me in « Fungi Kmet. » pg. 19-20 enumerata, forte specifice distinguenda, mihi crassior est, poris magis regularibus, aetate et in herbario semper pallidior evadit et sporis et hyphis aliquantulo minoribus praedita. » (Bresadola, Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903, pag. 79).

Poria crassa (Karst.) Sacc. Syll. Fung. IX p. 190 (1891), Physisporus crassus Karst. Fenn. Basidv. p. 319 (1889), Phys. obducens Karst. Hattsv. II p. 61 pro parte.

Icon. deest. Hab. 1663. →

Hab. ad truncos Coniferarum — Tirolo australi; Carnia (v. Höhn., Heimerl), Trentino (Bres. in v. Höhn. l.c.)

Area distr. Fennia, Tirolia, Italia.

crassa 9-190
v. s.

Suberosa, circiter 1 cm. crassa;

poris minimis, stratosis, albis, siccando
flavescentibus → citrino-aureis,
3-4 mm. altis; sporis cylindraceis,
rectis vel curvulis, 3-5 = 1 (v. Höhn) vel 6-7 = 1,5-2 (Bres. ms.)
— Superficies nodulosa, contextus albus;

5 Poria sinuosa (Fr.) Cooke, Grev. XIV p. 113 (1886) (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 322 et XVII p. 131. Polyporus sinuosus Fr. S. M. I p. 381
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 190 f. 1, Quél. Ass. Fr. Av. Sc. XXIV (1895)
t 6 f. 13.
Bibl. 61, 209, 418, 1063, 101
Hab. ad ligna et cortices varia – Liguria, Trentino, Veneto, Toscana
Area distr. Europa, Amer. bor.

Sinuosa 322

17-131

Late effusa, valde lata, 4 mm. fere crassa, adnata, arida, e mycelio evanescente subradiculoso enata, ex albo lutescens, ~~vel~~ (ex luride alba lignea vel salutacea); odor Liquiritiae; partim a matrice solubilis, quacum jungitur radiculis albis; poris amplis, flexuosis, variis, daedaloideis, acutis, laceris

" Sporis ~~6 = 2 - 3 (Britz.)~~, hyalinis, cylindraceo-curvulis, 5 - 6,3 = 1 - 1,3, [vel 6 = 2 - 3 (Britz.)] basidiis clavatis, 15 - 16 = 4 - 5; hyphis contextus tubulorum 2,5 - 3,5 μ, tenacibus, non septatis. - Variat poris non sinuosis, nec ~~Dae~~ daedaloideis: haec forma sistit Poriam vaporariam auct. pl. " (Bresad. ~~Fungi Polonici in~~ F. Pol. p. 310) ~~Annal. Mycol. 1903 p. 310~~

6 Poria pulchella (Schw.) Cooke, Grev. XIV p. 113 (1886)
(Sacc. Syll. Fung. VI p. 323, Polyporus pulchellus Schw. Syn. N. Am. F. p. 158 (1834)
Fam. Deest
Bibl. 1031
Hab. in cortice emortuo quercino — Veneto: Padova in Horto botanico (D. Sacc.)
Area Dist. Amer. bor. Italia

pulchella 323

Resupinato-effusa, inaequalis, subplicata, rugosa, ambitu determinata, flavescens, dura, sicca, 2,5 cm. lata; margine undulato, humido, subsericeo; poris minutis, regularibus, angulatis, tubulis subobliquis, in rugis superficiei. — Totus fungus flavescens, durus.

(Boletus)

7 Polia · Terrestris Pers. Obs. mycol. II p. 15 (1799), em. DC. Fl. fr. VI p. 39
Sacc. Syll. fung. VI p. 332
Icon. Pers. Icon. pict. fung. t. XVI f. 1, Quél. Asoc. Fr. de Sc. XX (1891)
t. 3 f. 29.
Bibl. 430, 244
Hab. ad radices Coniferarum terrâ conspersa — Piemonte, Toscana: Vallombrosa
(Cavara)
Area distr. Europa, Amer. bor.

Archiv
Obs. Fl. d'Quélet, Fl. mycol. p. 381, ~~cerda dubia~~ Dubita de la
realtà di questa distinta.

terrestris 332

Effusa, araneoso-byssina, tenella, fugax, alba; sporis centralibus, perexiguis, ex albo rufescentibus, demum nigrescentibus; sporis globosis, hyalinis, 4,5–6 μ diam.
— Ambigua et vix typica forma.

(hyphis 3,5–4,5 μ crs.

8 Poria vanc. da Bres. F. Tridentina II p. 96 + 208 p. 1. (1900)

Sacc. Syll. Fung. XVI p. 160

Icon. Bresad. l. c.

Bibl. 236 p. 1715 →

Hab. ad truncos languinos juxta radices, saepe acervos conglomeratos — Trentino:

Area dystr. Italia (Trentino)

Bosco di Torgolas ecc. (Bres. MS.)

Aestate autumno

rancida 16-16a

Effusa, alba, dein pallide alutacea, margine subfimbriato, demum recedente, subiculo tenui, submembranaceo; tubulis 2-4 mm. longis;
poris variis, rotundatis, oblongis, subangulatis, mediocribus vel submajusculis, usque ad 1 mm. latis, ore integro vel demum etiam lacerato; substantia coriacea, odore forti, farinaceo-rancido praedita;
sporis hyalinis, cylindraceo ~~subcurvulis~~ (vel ellipsoideo-cylindraceis), 5-7 = 2,5-3; basidiis clavatis, 15-18 = 4-6; hyphis tenuibus, 2,5-4 mm. crassis.

Obs. Affine a Poria vaporaria colla quale forse fu finora confusa, ma distinta egregiamente per il forte odore, la forma delle spore e il contesto, poi tenace e per le ife del contesto più tenui.

9 Porta obducens (Pers.) Quél. Ench. Fung. p. 180 (1886) (Enc. II p. 104 (1825)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 299 — ~~Boletus~~ Polyporus obducens Pers. Myc.
Icon. Quél. Asv. F. Av. Sc. XX (1891) | tab. 3 f. 30 Patouill. Tab. anal. fg. 11.
Bibl. 209, 866, 1133, 5528
Hab. in truncis et lignis putrescentibus — Veneto, Toscana, Emilia

Area Diff. Europa, Amer. bor.

Ex. Enb. crit. tab. II n. 1351

obducens 299

Effusa, incrustans, innata, firma, alba,
tota e poris formata minimis, stipatis,
aequalibus, distincte stratosis, stratis anno-
tis albicacco-pallidis;
globoso-
sporis ellipsoideis, minutis, hyalinis, 4-5 μ long.
cystidiis apice ± capitatis, muriellatis, dein levibus, 12 μ diam.
— Primi anni fungus Poriam vulgarem refert,
sed annosus e stratis innumeris (2 mm. crassis)
superimpositis crassus fit, cum ligno mucido,
mycelio pervaso, omnino concrescens, ut certe
suos loci, licet verticalibus locis fibrorum
rudimenta exserat.

~~Ph. è affine a P. connatus Cfr. la nota~~
~~di Le Bretoni (Bull. Soc. Sc. Nat.~~
~~Rouen 1887) che descrive una forma~~
~~a cappello di questa specie, affine a~~
~~P. connatus se pure non è lo stesso.~~

Ph. Forse è la forma resupinata di Fomes
Pol. connatus. o ® populinus.

10 Poria ambigua Bres. nr Atti Acc. Sc. Lett. Arti Agiati Roveretо a 1897 p. 84, San
Sylt. Fung. XIV p. 189
Icon. deest
Bibl Obod 1309 →

Hab. in truncis putrescentibus — Toscana: Selva di Tombolo (Martelli), Trentino: sur bonch.
di Robinia (Aresadola).

Area distr. Hungaria, Italia.

Ambigua 14-189

Lassissime effusa, margine superiore saepe inflato subreflexo, alba, demum stramineo-isabellina; subiculo membranaceo, arcte adnato albo;

tubulis ut plurimum obliquis, hinc inde nodulose-congestis, usque ad 8 mm. longis; poris majusculis, angulatis, demum dentato-laceris;

sporis hyalinis, obovatis, 5-8 = 3-3,5; basidiis clavatis, 18-20 = 6-8; cystidiis fusoideis, apice muricellatis, et demum levibus 24-30 = 6-8; hyphis subhyme-~~viatis~~ nialibus tenuiter truncatis, septatis 3-4 ye latis.

Obs. Oscilla tra Poria e Irpex

11 Poria anosiriza (Somm.) Cooke, Grev. XIV p. 112 (1886)
Sacc. Sylt. Fung VI, p. 314 et XVII, p 133, Polyporus anosirinus Somm. in H. Lapp. Suppl.
p. 278 (1826).
Icon. Quél. Assoc. Fr. Av. Sc. xx 1891, t. 2 f. 15-, Britz. Hymen.
t. 657, f. 217-218.
Bibl. 866, 246
Hab ad truncos putres quercinos — Piemonte: Valsesia (Carestia) Emilia: Collectio, Prov. di Parma (Passerini).
Area dist. Europa, Amer. bor., Ceylon

Obs. Il Passerini scrive l.c. Pori ampli, angulati ex albo sulfurentes.

Oneirina 314
17 - 133

Effusa, demissa, subinnata, ambitu byssina, alba;

poris amplis cellulaeformibus, ceraceis, angulatis, glabris, ex albo fulvescentibus; sporis (conidiis sec. Juel) obovatis 5-6 = 3,5-4,5 (Bres.)

— Vegetatio primitus omnino ~~to~~ byssina; pororum formatio ut in P. bombycina,

2 (sed demum ceracea et saepe exacte hexagoni

1 (nempe pori primordiales foveolas tantum sistunt in mycelio depressas, dein explicati, toti vero tomento contexti, subrotundi,

"In specimenibus a me examinatis basidia jam absorpta et tantum sporas seu conidia, ut mavult cl. Juel solutas vidi, obovatas 5-6 = 3,5-4,5" (Bresad. Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903 pg. 78)

Osserv. Il Dott. H.O. Juel nella sua egregia disserta-zione "Muciporus und die ~~Familie~~ Familie der Tulasnellaceen" ~~scrive~~ ascrive questa specie a un nuovo genere Muciporus perchè ha i basidii e le spore del genere Tulasnella. Ф

1a Poria farinella (Fr.) Quél. Ench. fung. p. 181 (1886)
Sacc. Syll. fung. VI p. 330, Polyporus farinellus Fr. S. M. I p. 384 (1821)
Icon. Quél. in Assoc. franç. avanc. Sc. XX (1891) t. 2 f. 23.
Bibl. 886.

Hab. ad ligna putrida quercina — Trentino: sui legni di alnus lungo il Rabbies (Mes. Mg)
Emilia: Collecchio pres Parma (Passerini)
restato

Area Distr. Europa, Americ. bor.

Farinella 330

Alba, vage effusa, tenuis; mycelio nudo flocculoso-pulverulento, haud contexto; poris tenuibus, contiguis, ± inaequalibus, subflexuosis, intricatis; pori ellipsoidei, 7 μ longi, hyalini.
— Diversissima, tactu fugax, substantia Corticii Sambuci Fers.

13 Porta vitrea Pers. Obs. mycol. I p. 15 (1796)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 296.
Icon. Quél. Asoc. Fr. Av. Sc. XX (1891) t. II f. 22, Sacc. Spec. Myc. Ven. t. VII f. 7-10, Pers. Myc. Eur. II t. 16 f 3 (Polypr. undatus)
Bull. Dog, 245, 1496
Hab. ad truncos et ligna caprosa ada — Piemonte: Valsesia (Caretta), Veneto: Vittorio (Saccardo), Toscana: nell'Orto botanico (Bartoli)
Area Syst. Europa Tunisia, Argentina

Exs. Myc. Ven. II ed. n. 17.

Obs. Sec. Bresad. qui spectans Pol. undatus Pers, Pol. Broomei Rabenh. e Pol. cinctus Berk. Cfr. Sylt. XVII p. 131.

vitrea 296
17-131

Effusa, subundulata, indeterminata, albida subhyalina, mycelio xylostromeo, tenaci, separabili;

poris minimis, rotundis, longis, obtusis integris; sporis globulosis, ovatis, hyalinis, 4 µ; v. ovoideis 4 = 2,5 (Bres.)

— Ad plurimae geminae species huius sectionis rara, sed valde insignis poris et mollitiem quasi carnosis (ceterum exarmis) membrana tenui Xylostromatis generis Quelt. impositis, saepe in nodulos collectis et interruptis.

Obs. Col micelio sterile è Xylostroma candidum Pers. Myc. Eur. I pg. 93


Ex Sacc. Sylt. Fung. XVII pg. 131

"Mea Poria vitrea in Hym. Hung. Kmtt. pg. 21 absque dubio est forma Poriae vulgaris Fr. – Poria, prout de P. vitrea praedicatur, mycelio xylostromeo, tenaci, separabili praedita; poris carnosis, saepe in nodulos collectis etc., inter innumeras Poriae formas a me visas, tantum in specie hic proposita (Poria vitrea) quaerenda." (Bres. l. supra c.)

14. Poria reticulata (Hoffm.) Pers. Syn. p. 548 (et Index) (1801)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 330
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 190 f. 3, Pers. Icon. pict. t 16 f. 2 (Poria fugax)
Karst. Finl. Basidv. t. VI f 78.
Rbh. 209, 1284, 1965
Had ligna putrida — Lombardia: prov. di Brescia, Veneto: prov. di Treviso nel bosco Carsighè.
Area Ribi. Europa, Amer bor.

reticulata 330

Orbicularis, tenuis, fugax, alba, reticulata, margine floccoso byssino-radians; poris distantibus cupulaeformibus; poris leretiviculis, curvulis, 7-8 = 2,5 (Bres. Hym. Kmt. f. 25)



Fss. Poria byssina Secr. 2, pg. 175 spetta qui, ma Poria reticulata Secr. l. c. pg. 174 meglio quadra con P. fugax Pers. Ic. pict. t. 16 f. 2 la cui differenza non è ancor chiara.
Questo pel contesto fibrilloso e il margine byssino è appena con dubbio una vera Polyporacea, ma Mucilago reticulata Hoffm. Crypt. t. 10 e P. sebacea Secr. 2, pg. 175 sono i primordii dei Myxomycetes, come osservo Famintzin.

Vll. Sec. Bresad. l. c., anche giusta gli esempl. orig. di Fries, la spora è più corta
in Merulius, forse M. fugax

15 Poria vaporaria Pers. Disp. meth. p. 70 (1797)
Sacc. Syll. fung. VI p. 311 et XVII p. 131.
Icon. Gill. Champ. Fr. t. 472, Henn. in Abh. Bot. Ver. Brandenb. 40 (1898) p. 177 fig. 1–4 (Varietates), Quél. Ass. Fr. Av. Sc. XX (1891) t. III f. 25, Bibl. 209, 866, 1133 (Mey, Hausschw. fig. 24–28.
Hab. ad ligna, quae corrumpit et destruit — Veneto, Emilia, Toscana
Area dist. Europa, Tomitio, Ins. Canar. Amer. bor. et merid., Ceylon, Australia, Nova Zelandia

Var. macra (Somm.) Sacc. Pol. macer Somm. Lapp. p. 278 (1826)
Tenuissima, pore angusto marginata; poris angulosis, margine acutis et dentato-lacero, albis
Hab. in truncis populeis — Veneto: a Padova.
Icon. Patouill. Tab. anal. fig. 144. Exs. Myc. Ven. n. 1305 Bibl. 1043, 209.

vaporaria 311

U 17-131

Effusa, innata, mycelio in ligno irrepente, floccoso, albo; ~~pores~~ color ex albido ligneus;

poris amplis, magnis, rotundatis vel angulatis, albo-pallescentibus, non flexuosis, nec daedaloideis;

in stratum contiguum, firmum, persistens constipatis;

sporis hyalinis, cylindraceo-curvulis, mobilibus, 4-1-1,3; hyphis contextus crassiusculis, lumicatis, septatis ad septa saepe unilateraliter nodosis, 2,5-3 μ.

- Vulgatissima generis et Poriae typus.

Obs. Più per la località che per caratteri determinati differiscono P. papyraceus Schweinitz, P. macer Sommerf. Lapp. p. 279, Pat. Tab. 1414 (forma in Pinulo in S. M. memorata), P. versiporus Pers. Myc. Eur. 2 sec. tot. Cfr. del resto Bl. p. 121 ubi syn. et varr.

È affine a Poria sinuosa. Concorda coll'esemplare di Fries, ma la Poria vaporaria Pers. appena con dubbio è identica a Poria Vaillantii (De Cand.). ~~P. hyporus cinctus Berk.~~ Outl. p. 250, Poria vitrea Pers.

16 Poria mollusca (Fr.) Quél. Ench. Fung. p. 180 (1886)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 293, Polyporus molluscus Fr. S. M. I p. 384 (1821)
Icon. Rostk. in Sturm Deutsch. Fl. Pilze t. 64, Rees Hyst. fys. 223.
Bfl. 209, 518, 866, 995, 1284.
Hab ad ligna vetusta varia — Veneto, Lombardia, Emilia, Napoletano

Area distr. Europa, Tunisia, Amer. bor. Chile

mollusca 293

Effusa, tenuis, mollis, ~~albida~~ → candida ~~fuscescens~~ lutescens, ambitu byssino fibrilloso-radiante;

poris centro vel hinc inde congestis, exiguis, semibus, rotundis, inaequalibus lacerisque, pallescentibus; sporis ovoideis, 4-5=3 (Britz.)

— Ambitu ~~Hirantioideo~~ Hinantioideo facile distincta, sed extat var. ambitu membranaceo sterili candigio: ~~Lowerb. t. 387~~

~~f~~.

~~Obs. Lowerb. t. 387 f. 9 e Poria epiphylla Pers. Myc. 2, pg. 15~~

Vll. de Poria mollusca Pelt. Exterio Fiorianos sec. Bresadole, e Poria Vaillantii (DC.) Fr. Hym. Kmet. b. 22,

17 Poria mucida (Pers. Obs. mycol. I p. 87 (1796)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 294
Icon. Quél. anoc. Fr. Avanc. Sc. XX (1891) t. 2 f. 24.
B.H. ~~Hab.~~ ~~Deg.~~ 123, 244, 417, 418, 430, 585, 836, 866. 101, 301, 1965 →
Hab. ad ligna vetusta coniferarum, imprimis pinea — Lombardia, Piemonte, Trentino; Emilia, Toscana. Aestate - autumno; Valle Lagarina (Cob.); bosco di Magras (Bres. M.S.)
Area dist. Europa, Tunisia, Amer. Bor.

mucida 294

Effusa, crassiuscula, subimmersa, mollissima / mollis /

ex albo pallescens, ambitu indeterminato

byssino;

poris mediis (mycelio crustoso receptis)

inaequalibus lacerisque; sporis ovoideis 3-3½-1,5-2

guttulatis, hyalinis; hyphis subhymenialibus 2,5-3

~~Bulbosa~~ μ cr. (Bres.)

— E loco variat mollior et firmior

sed sat persistens, Suberoso-carnosa,

plerumque humens, 12-16 cm. et

ultra longa, 1½-1,5 cm. crassa.

Obs. molto maggiore di Poria mollusca

e non affine.

18 Poria medulla-panis (Jacq.) Pers. Syn. meth. fung. p. 29 (1797)
Sacc. Syll. fung. VI p. 295, Boletus medulla-panis Jacq. Misc. I p.
161 t. 11 (1773)
Fern. Jacq. l.c. Fr. Fern. hymen. t. 190 f. 2, Mez, Hausschw. f. 31–36
Fl. Dan. t. 190 f. 2.
Bibl. 209, 65, 417, 418, 430, 518, 585, 866, 923, 123, 96, 244, 1133,
1284, 101

Hab. ad ligna et truncos putrescentes — Piemonte, Lombardia, Veneto,
Trentino, Emilia, Toscana, Marche, Lazio. Aestate Autumno.

Area distr. Europa, Amer. bor., Australia.

I: Valle Lagarina (Cobelli), Inzenga e Magras (Bres. MS.)

Exs. Myc. Ven. n. 821

medulla-panis 295


Effusa, determinata, subundulata, firma, glabra, alba, ambitu nudo submarginato, tota fere contexta poris sublongis mediis integris; ~~sporis~~ globos. 4-6-3-4 (15 Schröt.) vel ~~5-7-5-6~~, subglobosis vel ovato-globosis ~~subtriangulatis~~, hyalinis; ~~(Bres. Myc.)~~ hyphis subhymenialibus 2,5-3 μ cr. (Bres.) — forma terrestris mollior et aquoso — mollis; ~~P. bibulus Pers. Myc. Eur. n. 135.~~

Annua, sat magna, exsiccatione indurescens, ~~tubo~~ secedens.

Da lui indicate

Secondo Bres. Ms. probabilmente le spore sono piuttosto ovoidee perchè troncate, quantunque non le abbia mai viste aderire ai filamenti.

~~Fig. Acetabula~~ figura e fedele. Jacq. Myc. t. 11 e Bolt. t. 166 fig. 2 riferite a questa specie, a buon diritto possono ascriversi invece a Poria corticola. P fluctuosus Weinm. p. 337, non visto da Fries, pare affine.



19

Poria vulgaris (Fr.) Quél. Ench. Fung. p. 180 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 292 Polyporus vulgaris Fr. S. M. I p. 381 (1821)
Icon. Rostk. in Sturm Deutschl. Pilze, t. 60, Berk. Outl. t. 16 f 6,
Mez, Haussknw. fig. 35–38
Rbh. 61, 209, 417, 418, 430, 639, 653, 357, 983, 1091, 1133, 1595, 1965 →
Hab. ad ligna et ramos putres – Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana,
Lazio, Sicilia, Napoletano.
Area distr. Europa, Tunisia, Ins. Canar., Amer. bor., Cuba, Ceylon, Malacca, Java, Nova Zelandia,

Exs. Myc. Ven. n. 412

vulgaris 292

Late effusa, tenuis, arida, arete adnata, levis, alba, interdum flava, ambitu mox glabro, tota e poris constans finnis, stipatis, exiguis, rotundis, subaequalibus, variantibus pro more obliquis et hiantibus, poris globoso-ovatis, 4-5 = 2-3 hyalinis. typhis subhymenialibus 2,5-3 μ cr.
~~— Solo ex affinibus vulgata~~

Var. calcea ~~ad humos~~ Pini ~~in montosis vulgatissima non differt nisi candore~~.

~~Fries~~ Fries è certissimo che la varietà gialla appartiene a Poria vulgaris: infatti in un medesimo esemplare ne vide una metà bianca e una citrina. Ma P. flavus Karst. ~~Fink~~ Fenl. Polyp. p. 40 o P. selectus Karst Not. Sc. Fenn. IX pg. 360 pei pori ottusi, rigidi, sembra specie distinta

20 Poria radula Pers. Obs. myc. II p. 14 (1799)

Sacc. Sylt. Fung. VI. p. 310 et XVII p. 132.

Thom Guét. in Assoc. Fr. Av. Sc. XX (1891) t. 3 f 28, Hennings in Engl.

Pflanzenfam. Pilze II p. 157 f. 85 B

Bol. 737, 748, 983, 1031, 866, 61.

Hab. ad ligna et ramos emortuos (imprimis arborum frondosarum) — Liguria, Veneto, Emilia, Aestate, Autumno

(Trentino: Gucciadoro, Inzenga (Bres. MS.)

Area distr. Europa, Amer. bor.

radula 310

17-132

Effusa, alba, e mycelio nudo, tomentoso constipata, mollis, subtus villosa, indeterminata, 8-11 cm. longa, 3 cm. et ultra lata; poris mediis, angulatis, dentatis, juniori-bus pubescentibus;

sporis hyalinis, subglobosis, 3-5 = 3-4; basidiis clavatis, 15-20 = 4-5; cystidiis fusoideis, fur-furaceo-tunicatis, 50-60 = 10-15; hyphis subhy-menialibus, crasse tunicatis, 2-3 μ latis, (Bres. F. Pol. p. 80) ~~Fungi Polonici in Ann. Mycol. 1903, pg. 80.~~);
vel sporis hyalinis, ~~ovatis~~ obovatis, minute granulosis 4 = 2,5 vel subrotundis, interdum apiculatis 3-5 μ diam. (Bres. MS.)

Oss. La vegetazione è di P. sanguinolenta ma è più secca, & più lassa ed è separabile dalla matrice.

21 Poria calcea (Schw. Fr.) Cooke Grev. XIV p. 114 (1886)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 330, Polyporus vulgaris β calcea Fr. S. M.
I p. 381 (1821), Polyporus calcea Schw. Syn. Fung. Am. bor. p. 448 (1834)
Icon. deest
Obs. Thesaur. ms.

Hab in Fungis abietinis — Trentino, frequens (Bres. ms.)
Area dist. Amer. bor. Europa

calcea ~~330~~ 330
e 295

Late effusa, innata, tenuis, candida;
poris exiguis, ~~[illegible]~~ hiantibus. (Fr. l. c.)
sporis hyalinis cylindraceo-curvulis 4-4,5 = 1-1,5;
basidiis 12 = 3-4 (Bres. MS.)

Lindsay 9-
Ss. Secondo Fries è una mera forma candida di Poria vulgaris, ma secondo Schweinitz e Cooke è da distinguersi.

È una specie omonima (diversa?) presso B. et Br. J. of. Lyn. pg. 55 n. 506 e Sacc. Syll. fung. pg. 295, così descritta:

"Tela resupinata, effusa, margine tenuissima, adnata, membranaceo; poris minimis, angulatis 140-160 μ diam. dissepimentis tenuibus. In ligno emortuo Dolosbagey Ceylon. Primitus haec ~~Differima~~ ~~questa~~ ~~imita~~ Corticium calceum imitatur; duae formae occurrunt, quarum altera crassior, margine majis membranaceo; poris 1/7 mm. diam., altera poris 1/6 mm. "

72 Poria unita (Pers.) Quél. Enchir. Fung. p. 178 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 389, Polyporus unitus Pers. Myc. Eur. II p. 93 (1825)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 188 f. 3.
Bibl. 417, 418.
Hab. ad ligna abietina — Trentino: Valle Lagarina (Cobelli)
Area dist. Europa, Amer. bor.

unita 309

Effusa, levigata, glabra, spadicea, opaca, ambitu depresso concolore; poris perexiguis, tenuibus, nulla membrana impositis.

— Tenuior, nuda, circiter 10 cm. lata, 4-5 mm. crassa.

611. Sec. Bres. Hym. Kmet. p. 14, queste specie, finora ritenuta sterile, potrebbe essere lo stadio giovanile di Poria megalopora (Pers.)

23 Poria ferruginosa (Schrad.) Bres. Quél. Ench. Fung. p. 178 (1886)
Sacc. Syll. fung. VI p. 329 Boletus ferruginosus Schrad. Spic. Fl. germ.
p. 172 (1794)

Icon. Greville Scot. crypt. Fl. t. 155, Bulliard. Hymen. t. 610 f. 64.
Bibl. 1133, 1138bis, 245, 209, 417, 418, 923, Bres. MS.
Hab. ad ligna et truncos vetustos varios — Piemonte, Trentino, Veneto,
Toscana.
Area geogr. Europa, Amer. bor. Cuba, Amer. merid. Australia.

Exs. Myc. it. n. 606, Myc. Ven. n. 411

ferruginosa 327

Effusa, crassa, firma, inaequalis, fulva, exsicata, spadicea-ferruginea, ambitu sterili, 2,5 cm. usque crassa, maxima ex parte poris elongatis contexta; poris mediis, praelongis, subrotundis, lacerisque, cinnamomeis; poris brevibus albidis, 5 = 3, hyalinis (Schröt.) hyphis subhymenialibus 2 — 3 μ cr.; sporis fulvis cuspidatis, bas. ventricosis, ~~9 μ~~ 6 μ. La specie di Burtelmyra [illegible] colle spore 8 — 10 μ lunghe dovrebbe essere diversa

♀ 36 - 45 = 6 - 8.

24 Poria contigua (Pers.) Karst. Hafsv. 2. p. 82 (1882)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 328, Boletus contiguus Pers. Syn. p. 544 (1801)
Icon. Rostk. in Sturm Deutschl. Fl. Pil. t. 8, Brosi e Cav. F. parass. n. 235
Bibl. 209, 470, 585, 1133, Rea MS.
Hab. ad ligna vetusta, putrescentia — Piemonte, Veneto, Trentino, Toscana
area distr. Europa, Amer. bor., Madeira, Ceylon, Australia.

Exs. Brosi e Cav. F parass. n. 235, Sacc. Myc. Ital. n. 409 (sub P. ferruginosa)

contigua 328

Effusa, crassa, firma, glabra, submarginata, junior cinnamomea; margine primitus villoso, fere 8 cm longa, 2,5 cm. lata, 12 mm. crassa; ◯.
poris majusculis, aequalibus, obtusis, integris, 0,5–1 cm. altis ◯
— Mycelium ochraceum.

Dd. Simile di Poria ferruginosa, 0,5 cm. grossa, ~~e coi pori più larghi e cinnamomei.~~ Pel micelio ocraceo è distinta dalle forme resupinate di Fomes igniarius che ha il micelio bianco secondo Berkeley. ~~P. pachypus Rostk. 27 t. 5. sembra qui appartenere ma nella descrizione è detto tutto bianco~~

◯ sporis cylindraceis, hyalinis, laeve 1-guttulatis, 5–7 = 3–3,5; hyphis subhymenialibus 2,5–3 μ crs.; basidiis fulvis 45–80 = 6–8

25 Poria Friesiana Bres. in Ann. mycol. VI (1908) p. 40, Sacc. Syll. Fung. XXI p. 328, Polyp. contiguus Fr. ex p. non Pers., Pol. igniarius var. semp. natus Auct. plur.

Icon. Veest. Bes B. 1663

Hab. ad truncos stantes arborum e.g. Robiniae — Tirolo cisalp. : Carnia (v. Höhn.), Italia (loc non ind.) (Bresad. l.c.)

Area distr. Europa

Fries. Icon. 21-325

Late effusa; subiculo plus minusve manifesto, interdum obsoleto, ex hyphis 2-2,5 μ crassis conflato; cinnamomeo vel cinnamomeo-umbrino; tubulis concoloribus, usque ad ½ mm. longis, contextu ex hyphis tenuibus, flavis, 2-4,5 μ, commixtis cum aliis 3-4 μ crassis, fulvis et crasse tunicatis; poris parvis, generatim obliquis, 4 circiter per 1 mm., concoloribus, demum canescentibus; sporis hyalinis vel rarius luteolis, e latere subcompressis, 6,5-9 = 5,5-7; setulis rarissimis, tenuibus, flavis, demum septatis, 35-50 = 6

Pileus sessilis, stratosa, unicolor, in Salice cinnamomeo-umbrina, in Corylo et Fago nitide cinnamomea.

Oss. Questa specie che Bresadola credeva varietà resupinata di Fomes igniarius Fr., da lui stesso fu ritenuta poi distinta, per l'abito costantemente resupinato anche se si trovi su tronchi eretti, pel colore più vivace, le spore alquanto maggiori e le setole appena diverse dalle ife più molli, se non ~~forse~~ per la base ventricosa. In Fomes igniarius Fr. il colore è più oscuro, il ricettacolo mai resupinato fin dalla base, le spore più depresse e le setole, del resto rarissime, piccole, fulve come in Fomes fulvus Scop. (Bresadola l.c.)

26 Poria cerisgata (Fr.) Bres. Quél. Ench. Fung. p. 178 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 326, Polyporus cerisgatus Fr. Hym. Eur. p. 571 (1874)

Icon. Quél. in Assoc. Fr. av. Sc. XXII (1893) t. III f 11, Mayr in
Bot. Centralbl. 19 (1884) t. 2.
Bibl. 446

Hab. in cortice cari Betulae — Piemonte: Riva d. Valsesia (Carestia).
Decastri
Area Distr. Europa.

levigata 326

Late effusa, coriacea – rigida, determinata, sed non marginata, cum epidermide a matricis adulta recedens, levis, glaberrima, cinnamomea, ~~subtus cute rigida vestita~~; vix 2–5 mm crassa; poris minimis, rotundis, polygonis, integris, 1–2 mm. altis, capsulatibus, brunneis, margine fulvis; sporis globoso-ovoideis, 5–6 = 4–5 μ elongatis e latere levitor compressis; hyphis subhym. 2,5–3 μ cr.; setulis fulvis 15–26 = 5–6

Obs. Comunemente confusa con Poria contigua Sec. Fries ma ~~chiaramente~~ distinta per la tenuità, per la superficie levigata pei pori minimi e specialmente pel ~~tubo più~~ inferiore crostaceo. distaccarsi colla matrice. Però Sec. Bresadola ed altri micologi non lavette che la forma resupinata del Fomes ~~igniarius~~ fulvus.

27 Poria emollita (Fr.) Cooke, Grev. XIV p. 111 (1886)
(Sacc. Syll. Fung. VI p. 307
Icon. deest. Vitt. 983 →
Hab. ad ligna putrida quercina — Liguria; Pegli alla villa Rostan. (Bottacci) Martio
Area distr. Europa

emollata 307

Late et indeterminate effusa, adnata, levis, glabra, siccitate rimosa, cinnamomea, poris minimis, rotundis, integris.

Hb. I pori sono come in Poria levigata di cui secondo Fries è sottospecie. Per l'habitus è prossima a P. contigua ma è meno rigida e a guisa di Corticum rimosa. Forse ne è uno stato giovanile.

28 Poria obligua Achariy l.c. Fr. S.M. I p. 378, Quél. Fl. mycol. p. 379
Fomes obliquus (Pers.) Cooke, Grev. XIV p. 21 (1885)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 206, Boletus (Poria) obliquus Pers. Syn. p. 548 (1801)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 188 f. 1, Karst. Finl. Basidsv. t. VII f. 86, Pergij
Stud. bot. Agrum. t. 22 f. 5 et in F. ital. fig. 1124. (fm. stratosa) Rostk. in Sturm t. 7.
Bull. - 209, ~~[illegible]~~ 85, 886, 1042, 926, 930, 1035, 1496. (Perg. in Vitt. F. ital. fig. 1124.)
Hab. ad truncos cortices varios e.g. Citri, Robiniae, Platani — Veneto, Emilia, ~~Toscana, Napoletano~~, Sicilia, Sardegna, Toscana.

Exs. Myc. Ven. n. 820, et II ed. n. 85.

È meglio collocata nel gen. Poria (ove la collocava Persoon l.c. ed ora il Quél. l.c.
Ott. ~~Fomes pratensis Sow.~~ Fl. Carn. p. 329. Lo Schröter Pilzfl. Schles. p. 489 dà le spore 5-6 = 3-4 e giallo bruno: sono queste dei conidi o si tratta d'altra specie?

obliqua 206

Laetissime ambiens, 4-9 mm. crassa, decorticans, excarnis, e pallido ~~stratico~~ cinnamomeo - nigricans, ambitu erecto, cristato vulgo cincta;

poris (ligno impositis, basi perviis) longis, minimis, obtusis, subpentagonis, vulgo obliquis;

Sporis ~~sph.~~ elliptico - ~~aeroideis~~ hyalinis 9-11 = 6-8, (stipitis ~~brunneis, guttulatis 5-7 = diam.~~ ~~5-6 = 3-4 (stipitis)~~ flavis, cuspidatis, basi ventricosis) 15-30 = 4-6

— Mobilissimus fungus. Sub cortice crassiore incipit crescere, integros truncos saepe ambiens eorumque corticem abjiciens (ut ratione maxime diminuta Corticium comedens) prorsus excarnis, annuus (sed in ver emortuus persistens, in quo statu obscurato, indurato vulgo legitur). Pori vulgo obliqui, quia arbores stantes saepius destruit.

(Sacc. Sylt. Fung. VI p. 305; Physisporus caesio-albus Karst.)

29 Poria caesio-alba (Karst.) Fragm. mycol IV p. 111 (1883) (Hedwigia

~~Sacc. Sylt. Fung. VI p. 285~~

Ann. Karst. Ann. Mycenom. t. IX f. 30.

Bull. 245.

Hab. in cortice Abietis pectinatae — Piemonte: Valtesia (Carestia)

area distr. Gallia, Italia. (Trentino:

Obs. Loc. Bresad. (MS.) sarebbe una forma resupinata (a biancheggia) di Polyporus abietinus.

Coriaceo-membranacea, suborbicularis, subinde, confluens, secernibilis, alba; margine latiusculo, tomentoso, candido, poris inaequalibus, variis, rotundis, oblongatis, angulatis, nonnunquam laceris, exiguis, curtis, caesio-albis, siccis expallentibus, majusculis, dissepimentis tenuissimis; sporis subellipsoideis, hyalinis, 5-6=2-3 vel (Brés. MS.) cylindraceo-curvulis, hyalinis 5-6=2-3; basidiis et cystidiis ut in ~~Polyporo~~ Polystricto abietino.

30 Poria violascens (Alb. et Schw.) Sacc. Polyp. Poria subg. violascens Alb. et Schw. Consp. Lusat. p. 258 (1805), Polyporus violascens Fr. Obs. mycol. p. 263 (1818), Poria violacea (Fr.) Cooke
Sacc. Syll. fung. VI p. 319.
Icon. Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze t. 3 (Pol. ~~violaceus~~ purpureus), Brit. Hymen. t. 612 f. 74.
Bibl. 639.
Hab. ad corticem putrescentem arborum frondosarum — Sicilia: Palermo a S. Anastasia, macchie di Zurrica (Inzenga). Vere.

violascens

319

Effusa, determinata, tenuis, brevis, levis, glabra, ~~arcte~~ arcte adnata, subiculo distincto carens, violacea; poris brevibus, cellulosis venosisve, integerrimis;
sporis 7 μ longis.

Obs. Pé pon corto, cellulosi si accosta a Merulius.

31 Poria purpurea (Fr.) Quél. Ench. Fung. p. 179 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 319 et XVII p. 136.
Icon. Quél. Asoc. Fr. Av. Sc. XX (1891) t. II f. 21, Gill. Champ. Fr. f. 471
Rabh. 61.

Hab. ad truncum emortuum Salicis – Liguria: Serravalle Scrivia (Ferrari)
Area distr. Europa, Amer. bor.

Obs. Il Bagliretto (n. 61) cita la fig. di Polyp. purpureus Rostk., che non dagli autori è riportata a Poria violacea

purpurea 319
17-136

Latissime et vage effusa, mycelio mucedineo, flocculoso, albo ligni cariosi superficiem per= restante; valde elegans, 10-30 cm. longa et lata;

poris curtis, minutis, inaequalibus, interrupte sparsis conglomeratisve, purpureo-lilacinis; sporis ellipsoideo-oblongis, [illegible]

et Fungi Polonici in Ann. Myc. 1903 fig. #6

var. roseo-lilacina Bres. Fungi Hung. Kmet. p. 16) (Polyporus purpureus Fr. El. II pg. 118, nec alibi) Sacc. Syll. Fung. 17 pg. 136

A typo differt subiculo crassiusculo, dissepimentis tubulorum quoque crassiusculis, colore constanter roseo-lilacino, expallente; sporis et hyphis aliquan= tulo majoribus, scilicet sporis cylindraceo-curvulis, 8-10 = 2-2,5, hyphis usque ad 6 μ latis. —

Est forma media ad Poriam placentam transiens.

Hab. Ad ligna Betulae in Polonia.

♀ teratiscalis, cornubis 6-7 = 2; basidiis clavatis 15-20 = 5-6; hyphis subhym. 3-5 μ cr.

32 Poria rufa (Schrad.) Quél. Enchir. Fung. p. 179 (1886) (1794)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 304, Boletus rufus Schrad. Spic. Fl. germ. p. 172
Icon. Rostk. in Sturm Deutschl. Fl. Pilze, t. 62 (Pol. haematodes)
Rabh. 61, 983, 101
Hab. in truncis emortuis dejectis Ligustri, japonici — Liguria: Genova in Horto bot. (Baglietto), Toscana: a Viepelago sul Monte Pisano (Beccari) et Francisci
Area distr. Europa

Oss. La forma indicata dal Baglietto è la var. lilacina Rabenh. Fung. Eur. ed. II n. 308. Per errore certamente il Rostkovius indica le spore "nigrae".

Rufa 304

Effusa, coriacea, tenuis, adnata, levis, glabra, determinata, sanguineo-~~Rufa~~;

poris minimis, tenuibus, acutis.

~~Sporis nigris~~ (? sec. Rostk.)

– Junior margine byssino cincta.

~~Obs. Ex~~ È diverso il fungo dell'ordine dei Fomentarii descritto sotto questo nome in Rabenh. Crypt. pg. 418

33 Poria incarnata Pers. Disp. meth. fung. p. 20 (1797), Sacc. Syll. fung. VI p. 317.

Icon. Pers. Myc. Eur. II t. 16 f. 4 (Pol. croceus), Fr. Icon. Hym. t. 189 f. 1, Gill. Champ. Fr. t. 471, Patouill. Tab. anal. fg. 558.

Bibl. Brejcd. MS. 1965

Hab. in truncis putrescentibus muscosis Coniferarum et amygdalis Trentino: bosco di Magras, (Bres. MS.). Asiat. Aut.

Lombardia: prov. di Mantova (Magnaghi).

Area distr. Europa, Sibiria asiat., Amer. bor.

Obs. Sec. Patouill. Cat. Champ. Fan. f. 45 le figure di Gillet e Patouil. riproducono le forme comuni di Poria vaporaria

incarnata 317

Effusa, suberoso-coriacea, persistens, firma, glabra, incarnata; poris elongatis, inaequalibus, vulgo obliquis.

HH ~~Hh~~ sporis elongatis, hyalinis, 7-2; basidiis 30-4-5 (Bres. MS.)

— Usque ad 20 cm longa. Margo superior passim reflexus; pori ut in reliquis, e situ obliqui.

Hh. Secondo Pers. Myc. Eur. P. incarnatus Syn. pg. 546 è un "lusus" ~~della~~ di una specie bianca fu casualmente tinta in rosso.

24 Poria rhodella (Fr.) Quél. Ench. Fung. p. 179 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 302, Polyporus rhodellus Fr. S.M. I p. 380 (1821)
Icon. Bull. Champ. Fr. t. 462 f D (Agar. labyrinthiformis ex p.), Fr.
Icon. Hymen. t. 189 f 2, Britzelm. Hymen. t. 653 f. 196.
Bibl. 1715
Hab. ad truncos Coniferarum putres — Trentino: Brentonico (v. Höhn.)
Area distr. Europa, Amer. bor.

Rhodella 302

Effusa, tenuis, adnata, mollis, albo-incarnata; margine determinato, nudo; 5-6 cm. ~~longa~~ longa;

poris minutis, subrotundis, contiguis, ~~sporis~~ ~~decorphaeis, 6 μ long.~~

— Hymenio tenuior, 5-11 ~~cm~~ longa,

hyalinis, teretiusculis, 4-5 = 2-2,5; basidiis clavatis, 15-20 = 5-6; hyphis subhym. 3-7 μ cr.

Obs. Sembra prossima a Poria vulgaris, ma è d'un bel color roseo persistente.

35 Poria micans (Schrenk.) Quél. Enchir. Fung. p. 179 (1886)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 318, Boletus micans Schrenk. Syll. Berol. p. 30 (1818)
Icon. Rostk. in Sturm Deut. Fl. Pilze t. 63, Brotkoff Krypt. f. 3288.
Rbh. 209, 1043
Hab. ad ligno quercino putri — Veneto: Treviso in silva Montello (Saccardo)
Sept.
Area disb. Europa, Tavisia Amer. bor.

micons 318

Effusa, tenuis, adnata, mollis, incarnato-albida, ambitu byssino albo;

poris tenuissimis, favosis, angulatis, subcrenatis; sporis subellipsoideis 8 × 6 μ. (Spél.)


— Subcorticularis, confluens, fugax.

Obs. Per la struttura dei pori si accosta a Poria bombycina

~~8 Canzoni~~

12 Favole

41/0003-15-1



Favolus Fr. Elench. I p. 44 (1828), Sacc. Sylt Fungi VI p. 390

(Etym. favus = ob poros favoso) / Hexagonia Pollini, non Fries.

.— Hymenium reticulato-cellulosum vel alveolatum. Alveoli radiantes e lamellis dense anastomosantibus formati, elongati. Sporae ~~albae~~ Fungi dimidiati, substipitati, carnosi, lenti, annui, epixyli, tota facie et structura a prioribus diversi, quare olim non ad Polyporos sed Cantharellos vel Merulios relati.

(Loreti - clavulatae, hyalinae; basidia normalia.

(Oss. Genere molto naturale ed insigne, del quale numerose specie sono tropicali; una sola è europea. Come le Lenzites sono ~~e sono~~ funghi poliporei lamellati, così i Favolus sono funghi agaricini colle lamelle ~~di ogni forte e~~ fin da principio cellulose-anastomosanti fra loro. Sono analoghi anche, se non affini, a Polyporus squamosus.

~~Lactoria spathulata Jungh., che è posta tra Hymenogramma, secondo Lév. Esat fungi pg 203 spetta al Genere Favolus.~~

Favolus alveolaris (DC) Quél. Ench. Fung. p. 185 (1886), Merulius alveolaris DC Fl. Fr. VI p. 43 (1815)
Favolus europaeus Fr Epicr. p. 498 (1838), Sacc. Syll. Fung. VI p. 392
Hexagona Mori Pollin. Pl. nov. p. 35, t. I, f 2-3 (1816)
Icon. Pollini l.c., Berk. F. moric. t. 9, Bresadola F. Trid. t. 27, Gill. Champ. Fr. t. 477, Lanzi F. di Roma, t. 20 f 2. Vivian. F. d'Ital. t. 58, Pat. Tab. anal. fig. 131.
Bibl. 61, 143, 209, 236, 245, 131, 301, 418, 653, 656, 725, 983, 997, 1232, 90, 198, 200, 203, 430, 585, 1284, 1965, 1715. →
Hab. ad truncos varios, saepe Mori, Robiniae, Prunus, Tiliae, Ulmus alb. — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Canton Ticino, Lago, (Valle Lagarina (Cob.), Ala, Nogaredo, Marna (Bres. v. Höhn.)
Area distr. Europa, Amer. bor.

alveolaris
= europaeus 392

Pileo carnoso, lento, tenui, orbiculari,
levi, glabro, albido fulvescente demum aspretto squamulo

Stipite brevi, laterali;
alveolis profundis, reticulatis, radiantibus 3-4 mm. long.
e subrotundo-v. oblongo-hexagonis; sporis 12-14 = 3-4, hyalinis, guttulatis;
teretibus — clavatis — ~~falcatis~~; basidiis 30 = 6-7 (etiam Bres. Myc.)
— Siccus, subcoriaceus, ~~sordidus~~, ex pallens
v. fuscescens ~~2-3~~ = 5 cm. latus; ~~sporae 12~~

~~Species sedulo inquirenda et~~
~~ulterius observanda~~.

♀, curvulis

15 Mercuius

14 ~~Posthelium~~

41/0003-16-1

Merulius

(Merulius)

Conspectus synopticus sectionum et specierum =

A_1 - Hymenium nudum; sporae albae ♃ Sect. Ia Leptospori Fr.

B_1 - Resupinati vel effusi

C_1 - Carnoso - tremellosus - - - - - - - - 1 M. tremellosus

C_2 - Membranaceus vel papyraceus

D_1 - Pori albi - - - - - - - 2 M. niveus

D_2 - Pori colorati

E_1 - Ambitus demum libero - reflexus; hymenium reticulatum - - - - - 3 M. papyrinus

E_2 - Ambitus byssinus; hymenium gyrosum - 4 M. molluscus

B_2 - Crustaceo - adnati

C_1 - Plicae flavo - sordidae - - - - - 5 M. porinoides

C_2 - Plicae rubescentes


D_1 - Carneo - ruber; ambitus nudus - - - - 6 M. rufus

D_2 - E pallido rubescens; ambitus byssinus, albus 7 M. serpens

A_2 - Hymenium pulverulentum; sporae coloratae Sect. II Coniosphori Fr.

B_1 - Spongioso - carnosus, flavo - ferrugineus - - - - - 8 M. lacrimans

B_2 - Membranaceus, zonatus, multicolor - - - - - 9 M. pulverulentus



(1821) ex Haller,

Merulius ~~Hall. Hebo. emo. p. 150~~ Fr. Syst. Myc. I pg. 326, Epicr. p. 499, Hym. p. 591, Sacc. Syll. Fung. VI pg. 411 (Etym. merula probabiliter ob colores fungi.) — Hymenophorum e mycelio contexto mucoso formatum, hymenio tectum ceraceo-molli, contiguo, superficie plicis obtusis reticulato, incomplete poroso, demum gyroso obsoletoque dentato. ♀ — Fungi epixyli, molles, mucosi, primitus saltem resupinati.

♀ Basidia normalia 4-sterigmatica; sporae ovoideae v. ellipsoideae, hyalinae v. dilute flavidae.

Obs. Genere assai naturale; nelle forme medie però (p.es. M. rufus, M. pinicoides) fa passaggio a Polyporus. ~~Phlebia tanto per la sostanza quanto per il tipo imeniale non mai poroso o reticolato si scostano da questo genere.~~ Ha la consistenza tremellacea, ma la fructificazione polyporea.

Nemhius tremelloides Schrad. Spic. Fl. germ. p. 139 (1794)

Sacc. Syll. fung. VI p. 411

Icon. Rest. Fungi nosc. t. 8 f. 6-10, Gill. Champ. Fr. t. 479, Nees Syst. II ed. t. 30 f 1-5, Mey, Hausschw. fig. 22-23.

~~Icon~~ Bibl. 61, 65, 143, 209, 245, 651, 731, 397, 398, 430, 564, 866, 1133, 1170, 1965

Exs. Myc. Ven. n. 401, Myc. Hel. n. 412, Cav. F. Longob. n. 159, Erb. crit. ital. ed. I n. 970

Hab. ad truncos arborum frondosarum — Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Autunno, Inverno.

(i tronchi di Salso al Pondasio (Bres. MS.))

Area Alpi — Europa, Asia bor., Africa bor., Turchia.

Sect. II Leptospor. Fr.

~~Resupinatus, dein liber reflexusve, carnoso-tremellosus, pileo effuso-reflexo, basi decurrente, albo vel albido, villoso, 5-8 cm. lato, margine dentato-radiato, tentaculato-fimbriato; hymenio centro atro-purpureo, versus marginem lutescenti-zonato; plicis radiato-porosis, variis, rubicundis; sporis cylindraceis, curvulis, hyalinis, utrinque 4-gutt. vel (Bres. MS.) 5=1,5~~

Resupinatus, dein liber reflexusve, carnoso-tremellosus; pileo effuso-reflexo, basi decurrente, albo vel albido, tomentoso, villoso, 5-8 cm. lato, margine dentato-radiato, tentaculato-fimbriato; hymenio centro atro-purpureo, versus marginem lutescenti-zonato; plicis radiato-porosis, variis, rubicundis; sporis cylindraceis, curvulis, hyalinis, 5=1,5 (Bres. MS.)

— Forma hudit, locis absconditis frallet, sed carne gelatinoso-cartilaginea mox dignoscitur

2 Nemalion niveum Fr. Flench. I p. 59 (1828)
Sam. Syll. Jung. VI p. 414, ~~Phycodrys alba Peck. Cfr. Syll. VI p. 697.~~
Jron. deest
Bibl. Breadole MS. —
Hab. in ramis Tiliae — Trentino: boschi d'Ingenga (Bres. MS) Septembri.

Area Hab. Europa, Amer. bor.

Obs. Sec. A Karsten qui apparterrebbe Trogia (Phycodrys) Alni Peck
della America sett., però egli assegna alle spore la misura 3 = 1, che
non corrisponde affatto alla presente specie.

niveus 414

Resupinatus, membranaceus, mollis, glaber, niveus, postice centro adnatus et undique liber, plicis rugaeformibus, subreticulatis;

sporis oblongato-cylindraceis ~~2-3 × longis, fere~~ lec. Bres. Ms: 7-9 = 3-3,5; basidiis 30 = 4-5 — Species nobilissima, aliis haud affinis, 1 1/4-6 cm. lata et ultra. Vigens spongiosa, mollissima; sicca membranam papyro tenuiorem sistit.

~~Hs Secundo Karstenio qui spellit Trogia~~ (Plicatura) Alni ~~Acc. Cfr. Syll. Hym. I pg. 630~~.

3 Merulius papyraceus (Bull.) Quél. Fl. mycol. p. 32 (1888), Auricularia papyracea Bull. Champ. t. 402 (1788)
Merulius corium Fr. Elench. p. 58 (1828)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 613
Icon. Bull. l.c., Sacc. F. ital. fig. 1128, Sow. Col. fig. t. 349.
Bibl. - 23, 209, 244, 132, 737, 866, 530. 1965, 1309
Hab. ad truncos et ramos arborum frondosarum — Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Trentino: frigenga sui rami d. Hyeli (Bres. ms.)
Area distr. Europa, Tunisia, Asia, Africa, Australia, Amer. bor. et merid.
Exs. Eb. crypt. ital. n. 806, Myc. Ital. n. 808.

papyrinus = coriium

413

Resupinato - effusus, mollis, subpapyraceus, ambitu demum libero-reflexus, subtus villosus, albus; pileis orbicularibus vel elongatis, 2,5 - 8 cm. latis; hymenio reticulato-poroso, carneo vel alutaceo-pallescente;

sporis ~~oblongo lanceolatis, insignitatis, hyalinis~~, oblongo-ellipticis vel ovatis, granulosis, ~~10 = 3 (Fuckel)~~ 6-10 = 2,5 = 3,5 (Spegazzini et Bres. Mb.); basidiis clavatis v. subcapitatis 20-25 (-30) = 6-7; hyphis 3-5 m. latis.

Exsiccus, forma et colore varius, nunc brevis reflexus, nunc late expansus.

Obs. Certo differisce da M. serpens; piuttosto può confondersi con M. molluscus.

Merulius molluscus Fr. S. M. I p. 329 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 416 et XVII p. 165
Icon. Pers. Myc. Eur. II t. 14 f. 1–2 (Xylomyzon pulchrum), Fr.
Icon. Hymen. t. 193 f. 2.
Herb. Brot. 101 →
Hab. in ramulis emortuis Tiliae — Toscana: Pisa in Horto botanico (Savi)
Trentino: boschi di Dimaro sulle Conifere (Bres. MS.)

Mollusca 416
17-145

Effusus, tenuis, mollis, membranaceus,
margine byssino, albo;

plicis poroso-gyrosis, carneis;

Sporis ovatis, 1-guttulatis, hyalinis, ~~4 = 3 vel (Bres.~~
~~Fung. Polonici in Ann. Mycol. (p. 83)~~ sporis flavidis, ellipsoideis, 5,5-7 = 4-4,5
rarius 5,5 μ; basidiis clavatis, 30 = 6-8; hyphis 3-5 μ latis.

— Variat pileo breviter reflexo et hymenio haud
reticulato, sed primitus gyroso-dentato,
Variat etiam crassior et tenuior, margine fimbriato vel subreflexo et
~~Ex~~ subpilleato, hymenio carneo, carneo-aurantio, etc.
~~Obs. Por la località deve distinguersi a M. Corsini.~~

~~Saccoporus.~~

5 Merulius porinoides Fr. S. M. I p. 329 (1821)

Lec. Syll. Fung. VI p. 617

Gen. Pers. Myc. Eur. II t 14 f 7 (Xylomyzon paucirugum)

Bibl. 564 →


Hab. ad ligna putrescentia — Lombardia: dintorni di pr. Cremona (Farneti), Napoli sono sul tronco di Gelsi nelle a Napoli (Cesati)

Area distr. Europa, Amer. bor

Exs. Rabenh. F. Europ. n. 1809

porinoides 417

Effuso, arcte
Crustaceo - adnato, tenui, ambitu
byssino ± albo, juniore lutescente, adulto albo, demum
hymenio toto denudato;
plicis poriformibus, distantibus, flavo-sordidis.



Ad. Sec. Brel. F. pol. n. 83 è appena
una forma di Mer. serpens.

6 Merulius rufus Pers. Syn. p. 498 (1801)
Fr. Syst. myc. VI. p 417
Icon. Persoon Myc. Eur. II t. 16 f 1-2 (Xylomyzon isoporum)
Bibl. 209, 446, 1035. →
Hab. ad ligna et truncos arborum frondosarum, imprimis Quercus –
Veneto: !, Canta Ticino (Penticchia) Malacca, ! Treviso al bosco Montello (Bocc.)
Area distr. Europa, Sibiria Amer. bor.

rufus 417

Crustaceo - adnatus, ceraceo - mollis, glaber, carneo - ruber, ambitu subnudo; hymenio aequaliter poroso, concolore; sporis teretiobl. 6-8 = 2-2,5, curvulis, hyalinis.
— Habitu Polypori sed indole carneo - molli distinctus. Saepe ligno immersus.

1. Memb. Serpens Tode in Abh. d. Hall. Naturf. Ges. I (1783) f. 355.
Jan. Syst. Faun. VI f. 617.
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 193 f. 3, Berg. Hymen. t. 615 f. 87 & t. 655 f. 208

Arb. 430, 1284, 1965 →

Hab. ad ligna putrescentia imprimis pinea — Biscaia Savoja (Colle, Hugueniin)
Lombardia: prov. di Brescia (Zantedeschi)

Area distr. Europa, Australia

serpens 417

Crustaceo-adnatus, tenuis, glabre-
scens, e pallido rubescens, ambitu
byssino albo;

plicis primo rugaeformibus, dein porosis,
angulatis, integris, crispatis;

sporis oblongo-cylindraceis, hyalinis, 4-5 = 2; basidiis clavatis 15-20 = 4-5.

Oss. Il nome passo a varie specie
ma la presente pianta è distintissima
dalle altre.

8 Merulius lacrymans (Wulf.) Schum. Fl. saell. II p. 371 (1803) (1788)
Fau. Syst. Fung. VI p. 419, Boletus lacrymans Wulf. in Jacq. Misc. II p. t. 8 f. 2
Gen. Wulf. l.c., Briosi e Cav. F. parass. n. 289, Fr. Sver. ätl. Svamp. t. 70,
Harzer Pilze, t 77, Mez Hausschw. t. 1 et f. 1–18 et 90, Rolland
ätl. t. 98 f. 216, Möller Hausschw. t. 1, 3, 4, 5.
Nrl. 209, 244, 315, 301, 318, 430, 518, 564, 568, 866, 1965. →
Hab. ad Cyna uda, praesertim domesticia, quae maxime vexat et destruit – Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Napoletano et verisimiliter in tota Italia.
Trentino (Bres. MS.)
Area distr. Europa, Siberia, Amer. bor., Australia.
Exs. Myc. Ital. n. 215, Briosi e Cav. F. parass. n. 289.

9 Sect II Coniophori Fr.

Lacrinans 419

Grandis, spongioso-carnosus,
uvidus, flavo-ferrugineus, subtus
araneoso-velutinus, margine
tumido, tomentoso albo;
plicis amplis, porosis, grosse-dentatis;

sporis ovatis, inaequilateralibus, 1-guttulatis,
saturate flavis 10-12 = 5-6.

— Vulgo placentaeformis sed etiam effuso-re=
flexus, immo e media placenta surgunt
tubercula caulescentia pileolos proferentia.
Hymenium maxime ~~xxx~~ mutatur, ni=
si forsan hydnoideum.

~~Obs.~~ ~~Vi differt exactamente~~ Sistotrema cellare Pers.

9 Merulius pulverulentus Fr. Elench. p. 60 (1828)
Sac. Syll. fung. VI p. 419
Ex. Sac. Myc. Ven. n. 1406
Icon. / nulla genuina /
Bibliogr. 1035 ~~5~~

Hab. ad ~~praeced.~~ ligna fabrefacta et parietes muratos ~~ed~~ in calidariis — Veneto: Padova nell'Orto botanico. Vere. Verosimilmente trovasi altrove, confusa coll'affine M. lacrimans.

(di cui pare una forma sottilmente membranacea colle pliche meno elevate)

611. Sembra una forma intermedia fra Merulius lacrimans e Coniophora membranacea. Cfr. quest'ultima.

fulvescentes 419

Latissimus membranaceus, levigatus, zonatus, aridus, subtus araneoso-velutinus, e centro ambitum versum sensim esoletus;

pileis marginalibus, subreticulatis, fulventibus; pors 8-10 = 5-6, flavo-olivaceis.

— Multicolor, singularis hymenio sensim centripeto.

È cos. affine a M. lacrimans che se gli altri rr. generale non lo avessero distinto, sarebbe proprio da unirlo; poiché il M. lacrimans sterile, nei luoghi soffocati, offre esso pure una membrana rinantioidea. Cfr. a suo luogo Coniophora membranacea.

86

Ceriomyces

U1/0003 -17-1

Ceriomyces Corda apud Sturm. → Deut. Krypt. Fl. fg. 133
~~D. C. f.~~ ~~p. 133~~ (1837), Sacc. Syll. Fung. VI pg. 385. (Etym. ceros cera seu favus et myces fungus)
non Battarra nec Batt. qui Boletus ~~x~~ Ptychogaster Corda Ic. fung. II pg. 24 (1838). — Fungi subglobosi vel pulvinati, subsessiles, carnosi vel suberosi, intus loculati sporigeri, extus inaequales, subinde spurie porigeri. Sporae ovoideae, continuae, hyalinae vel pallide coloratae, sporophoris filiformibus variis suffultae.

Oss. Genere spurio che rappresenta lo stato metagenetico di Polyporus, Daedalea, Lenzites, ecc.
~~Lycogaloptis~~ Fischer sembra appartenere a questo genere Cfr. Syll. Gaster. p. 153. Cellularia Bull. Champ. t. 414, dietro l'esempio di Fries è una forma ceriomicetoidea di Lenzites o Polyporus. Tulasne (Ann. Sc. Nat. 1865) giustamente paragona la struttura di C. albus a Dacrie Peteri (Syll. Hyph. pg. 580); cfr. anche Bref. Unters. VII t. 1. —
Ultimamente de Seynes (Bull. Soc. bot. France 1888 pg. 124) dimostrò che Fibrillaria subterranea Pers. (Tul. Hyp. p. 2 t. XXI, f. 12) conviene esattamente col tipo di Ceriomyces.

Ceriomyces terrestris Schulz. Myc. Berth. in Verh. zool. bot. Ges. Wien 1874

Sacc. Syll. Fung. VI p 386

Icon Sacc. Fungi ital. del. f 107, De Seynes Rech. Végét. infér. II t. 11 f 1 (Ptychogaster)

Bibl. 1036. V., 1042, 209. →

Hab. in ~~[illegible]~~ basi truncorum fere subterranea — Veneto: Treviso a Selva e Padova.

Area Distr. Hungaria, Italia.

Obs. Genere singulo, constituto ob statu gasteroideo e consortio del Polyporus Sericellus e Bivonia

Terrestris 386

Pileo e globoso ovoideo vel subirregulari, simplici vel composito, in stipitem fibrosum brevem vel longiusculum basi producto, ex albo carneo, initio (vegeto) carnoso-tenacello, dein exsiccato duriusculo e fibroso spongioso; superficie minute verruculoso-porcelato, intus minute pluri lacunoso; lacunis angulosis, variis, ~~inde~~ initio subconcentrice dispositis, pagina ~~inferiori~~ inferiore hymenophoris; sporis e globoso-ovoideis primitus e mutua pressione subangulosis, 5,5 - 6 = 5 nucleo majusculo vel guttulis pluribus roseis foeto, in basidiorum cylindraceorum sterigmatibus vel denticulis 3-4 insertis.

— Status gasterosporus Polypori sericelli ~~et~~ a Polyp. biennis (?) Cf. qui visc diversus

17

Protokoll

41/0003-18-1

Porothelium

Fr. Obs. 2 p. 272 Hym. pg. 595, Tacc. Sylt. Fung. VI pg. 421. (Etym. porus et thele papilla), Stigmatolemma Kalchbr. in Grev. X pg. 104 (1882). —

Fungus totus e mycelio contextus, resupinato-expansus, submembranaceus, e quo prominent papillae primitus distinctae, mox poroso-apertae, demum elongatae, tubulosae ♀ — Genus a ~~praecedentibus~~ distinctissimum, cum Fistulina multis rationibus analogum.

Obs. Finora le specie tipiche del genere non sono state indicate d'Italia, mentre il Por. subtile spetta piuttosto al gen. Poria.

♀ Basidia normalia; sporae ovoideae, minutae, hyalinae.

Poroth. subtile (Schrad.) Fr. S. M. I p. 506 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 422, Boletus subtilis Schrad. Spicil. Fl. germ. p. 173
t. II f. 2 (1794) Poria subtilis (Schrad.) Bres. Hym. Kmet. p. 24
Icon. Schrad. l. c. Corda Anleit. t. II fig. 75[23], Nees Syst. p. 224.
Bibl. 244, 1284. → A Corgli Avellanae (Zambeccari) (Cavara)
Hab. ad cortices Coniferarum — Lombardia: prov. di Brescia), Toscana: Vallombrosa

→ Irregulariter effusum, membranaceum, niveum, ambitu aequali, nudo; pororum verrucis distinctis, demum elongatis, cylindricis, obliquis, subrefescentibus; pori oborati, hyalini, f. subtubulati, asperuli, 3,5—4,5 = 3; hyphis laxiuscule fabricatis, explanatis, 2,5—4,5 μ crs.
— Siccum rigescens, subfragile

Area dist. Europa


Ott. Bresadola (Hym. Kmet. p. 24) inserisce questa specie a Poria e P. subtilis (Schrad.) Bresad.

Ott. In riguardo alla genesi dei pori, A. Bresadola ascrive questa specie al gen. Poria!

subtile 422

12 Solemia

41/0003 -13-1


Solenia

(Solenia)

= Conspectus synopticus specierum =

A_1 - Albae

B_1 - Subsericeae vel glabrae

C_1 - Gregaria, clavato-cylindrica ---- 1 *S. fasciculata*

C_2 - Sparsa, cylindrica ------ 2 *S. candida*

B_2 - Villosa ------ 3 *S. villosa*

A_2 - Coloratae

B_1 - Color ochraceus, cinnamomeus vel cervinus

C_1 - Sparsa, ochracea ---- 4 *S. ochracea*

C_2 - Dense stipata

D_1 - Cupulae subcervinae vel sordide luteae vel ferrugineae, urceolatae --- 5 *S. anomala*

D_2 Cupulae primo albicantes, dein e carneo helvolae, senio ochraceae et cylindraceae - 6 *S. endophila*

B_2 - Color obscurior, umbrinus vel fuscescens

C_1 - Stipitata ----- 7 *S. stipitata*


C_2 - Sessilis

D_1 - Subiculum non manifestum --- 8 *S. stipata*

D_2 - Subiculum manifestum

E_1 - Tubuli teretes, cinereo-umbrini - 9 *S. poriaeformis*

E_2 - Cupulae urceolatae, villosae -- 10 *S. grisella*



Solenia Hoffm. Deutschl. Fl. tab. 8, fr. Hym. pg. 596, Sacc. Syll. Fung. VI pg. 424 (Etym. solen tubus). – Receptaculum discretum, nullum, sed subiculum effusum plus v. minus evolutum. Tubuli membranacei, subcylindrici, turbinati, a se invicem discreti et liberi, in subiculo imperspicuales, ore conniventi, quo a Cyphellis differunt. Basidia normalia tetraspora; sporae subovoideae, hyalinae v. flute colorate.

Gen. Genere anceps; è quasi una Cyphella (quasi chiusa all'apice) stipata, e inserita sopra un subiculo; è quindi più vicino forse alle Teleforacee. Il fungillo ordinariamente tende a rivolgersi verso terra (coll'apice).

1 Solenia fascicularis Pers. Myc. Eur. I p. 335 t. XII f. 8-9
Fr. Syst. Myc. VI p. 424
Fr. Pers. l. c. Nees Syst II ed. t. 20 f. 1-2, Patouill. Dl. hax. Hym. t. 381-4 (Cyphella)
B. fl. 1031, 430. →
Hab ad ligna dejecta — Piemonte Savoja (Hugueniin) Veneto: Padova sulle fosche putrescenti d. Platycerium nelle serre dell'Orto bot. (D. Sacc.)
Area Ost. Europa, Amer. bor., Ceylon.

Fasciculata 424

Gregaria, subfasciculata, cavato-cylindrica, subsericea, alba

– Junior granuliformis, dein poroso-aperta, sensimque elongata, extus fibris adpressis sericea, 2–7 mm. longa; greges subinde plura cm. extensa.

~~Ost. Solenia incana Pers. Syn. tendera una variata~~

2 Solenia candida Pers. Disp. meth. fung. p. 36 (1797)
Sacc. Sylt. fung. VI p. 624 et XX p. 803 (in nota)
Icon. Hoffm. Deutschl. Flora t. 8 f 1, Berk. et Br. in Ann. N. H. 1871 t. 18 f 4 et t. 21 f. 30 (perperam sub nom. S. fasciculata), Pers. Myc. Eur. Bibl. 209, 1036 V.
Hab. in ligno carioso fagineo — Veneto: Treviso nel bosco Cansiglio (Saccardo)

candida 424

20-803

Sparsa, cylindrica, glabra, candida, tubulis 2–3 mm. altis, tenuibus, late distantibus

Diss. Più breve di Solenia fasciculata, sparsa, e non fasciculata, esattamente cilindrica. Le figure di Cooke e di Hoffmann sopra citate, rappresentano bene queste specie e non la S. fasciculata come già Carus Berk. e Broome

Obs. Collatis iconibus originalibus Persoonii et Hoffmanni et Solenia Malbranchei Pat. Hymen. Eur. t. 3 f. 30 (spor.) et Solenia nivea Quél. Fl. Alp. Franç. Avanc. Sc. 24 t. 5 f. 15 videtur revera candida et non fasciculata ut primitus asseruerant Berkeley et Broome et Cooke.

(Ex Sacc. Syll. Fung. XX pg. 803 in nota)

3 Solenia villosa Fr. S. m. II p. 200 (1822)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 425
Icon. deest.
Nob. 948.
Hab at ligna dejecta Italiae — Emilia: Ferrara nell' Orto botanico
(E. Tironi e Massal.).

villosa 425

junior tuberculata Dem
Gregaria, cylindrica, villosa, alba.

A

un po' più grande
HH. Affine a Solenia candida ma distinta
pel tegumento villoso ~~carattere che la~~
~~avvicina a~~ ~~Sol. elaphylla~~ dei seguenti
~~La t. 18 fg. 4 Bert. ritrae la~~
~~stessa~~ ~~esemplare~~ di questa specie.

4 Solenia ochracea Hoffm. Deut. Fl. II p. 8, t. VIII f 2 (1795)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 425, Sol. Friesii Quél. Champ. Jura III p 15 t. I f 7
Icon. Hoffm. l. c. ~~tab~~ Quél. l. c.
Bibl. 245, 1203, 1715, 1437 →
Hab. ad ramos et truncos putrescentes — Piemonte: Valsesia, Veneto: (Carestia)
Friuli (Trotter), Trentino: S. Alderico in Gardena (Magnus), Toscana:
Firenze in Boboli (Martelli ed in Bres. MS.)

Oss. Soc. Karst. Krit. Fiul. Bctidsv. p. 283, la Solenia anomala e la
Sol. stipata sarebbero poco distinte dalla presente. Anche
Ostea (da Tabularia (Solenia) Collae Re, Fl. Tor. Suppl. III p. 20, è
una probabilmente una forma della ~~presente~~ medesima specie, trovata nel Torinese.

ochracea 425

Sparsa, clavato-cylindrica, tomentosa, ochracea, intus alba;

sporis ovoideis, hyalinis, ~~6-8 = 4-4,5~~ (Bres. ms.)
6,5-8 = 4-4,5 (Bres. ms.)
conceptaculis cylindraceo-clavatis, minutissimis, fulvis, 2-2,5 mm. altis, villis dilute ochraceis, 2 μ diam. 4-5 μ crassis (Bres. ms.), granulis conspersis; ~~7~~

~~Cetera ut in typo alta, sed~~

~~Obs. Forse è troppo affine a S. caligata~~

e secondo Berkeley è varietà di Sokpira anomala. Altri invece (Persoon, Weinmann, Albertini & Schweinitz) la vogliano distinta, dicendo: "S. Peziza anomala certe diversa."

5 Stereum anomalum (Pers.) Fr. Hymen. Europ. p. 596 (1874)

Sacc. Sylt. Fung. VI p. 427, Peziza anomala Pers. Obs. mycol. I p. 23 (1796)

Icon. Doass. et Pat. Champ. t. 35, ~~Folk Champ. Belgique fig. 245~~.

Karst. Fenland. Basidiom. t. VIII f. 117, Patouill. Ess. tax. hym. f. 38:9

Rbh. 209, 245, 362, 397, 398, 1715, Bres. ms. ⟶

Hab. ad ligna et ramos arborum frondosarum, imprimis Salicum, Fagi. et. —

Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino: Sacrodoro (Magnus), al Rabbi (Bres. ms.). Majo - Junio

Area distr. Europa, Siberia Asiat.

anomala 427

Dense stipata, mycelio tenui, floccoso ±
insidens, turbinata, villosa, suberovina,
disco urceolato, pallido;

basidiis clavulatis, 20 = 4 dense fasciculatis;
sporis allantoideis, hyalinis, ~~1 2 (3) Sassa.~~,
~~aut ovatis, continuis, 5 = 4 (Fuckel)~~
8-10 = 4-5, stramineo-hyalinae.

Perennans, vulgatissima, quam maxime
polymorpha (~~cf. Alb. et Schwein.~~), haec
adeo stipata, ut primo obtutu
Polyporum fingeres. Color variat sor-
dide luteus ± et ferrugineus.

Pil. conceptacula pileiformes apice sae-
pius incurvata, granulata, ferruginei.

6 Lolenia endophila (Cel.) Fr. Hymen. Eur. p. 705 (1874), Sacc. Syll. Fung. VI p. 427, Cyphella endophila Cesati in Rabenh. F. Eur. n 1513 (1872) Icon. Mattirolo in Atti Ac. Sc. Torino, XXII (1887) t. 4

Bibl. 762, Rabenh. l. c.

Syn. Rabenh. l. c.

Hab. in ramis emortuis Phytolaccae (Pircunae) dioicae — Napoletano: a Napoli (Cesati)

Area distr. Italia merid.

endophila 427

Dense stipata; cupulis furfuraceo-villosis, e tapete continuo (saepe evanescente) ex helvolo cinnamomeo assurgentibus, e globoso obverse piriformibus, ore contracto punctiformi, serius cylindraceis, deorsum leniter attenuato-stipitatis, repandis, primo albicantibus, cito amoene e carneo helvolis, serio ochraceis, disco pallidiore;

fabidiis clavulatis, tetrasporis;

sporis ovoideis, ochraceo-subferrugineis 7-9=5-6

7 Solenia hispidata Fuck. Symb. mycol. Opp. I p. 2 (1871)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 428
Icon. deest B-G. 246, 1715 →
Hab. ad ramos et ligna putrescentia — Piemonte: Valsesia (Carestia), Trentino:
lungo il Rabbies (Bres. MS.), Guccadoro (Magnus)
Area dist. Germania, Italia (Trentino).

Stipitata 428

Cupulis dense laxeque gregariis, greges 8-10 cm. longos et latos formantibus, semper stipitatis, stipitibus cupulam subturbinatam ventricosam aequantibus, fusco-villosis, humidis haud apertis, disco orbiculari, demum subplano, porcellaneo, siccis clausis; sporis ovatis, utrinque obtusis, 2-guttulatis, continuis, 6-8 = 4; subiculo ab individuis juventutis formato, ut in affinibus.

8 Solenia stipata Fr. S. M. I p. 106 (1821)
Sacc. Syll. Fung. VI p. 428
Icon. Desm. Bibl Bresad. MS. →
Hab. in ramis et lignis putrescentibus Tiliae, Alni etc. — Tridentino:
boschi di Ingenga e Terzolas (Bres. MS.)
Area Distr. Europa.

Stipata 428

Confertissima, confluens, sessilis, villosa, grisco-fusca; cupularis, margine tenui, disco urceolato nigrescente; sporis cylindraceis, hyalinis, 8-10 = 3; basidiis clavatis, 30-34 = 6-7

Cupulae oblongae, 0,5 mm. altae, ~~subcrenatae~~ crenatae, basi quoque villosae sed subiculum non adest manifestum. Cupulae pilis intercantes, conidia observata 7-9 = 5-7 exerentes.

~~Obs. De prima vista~~ Obstat pro Pezizam facile sumitar ~~non Peziza~~ ut species subiculo manifesto pro Perichaeto.

Obs. A prima vista, per la causa dei tubuli assai avvicinati, si potrebbe prendere questa per una Poria.

9 Solenia porisaeformis (Pers) Fuck. Symb. mycol. App. I p. 2 (1871)
Sacc. Sylt. Fung. VI p. 428 (1815) ↑ Peziza porisaeformis DC. Fl. Fr. VI p. 26
Pezza anomala var. porisaeformis Pers. Syn. p. 656 (1801)
Icon. Brefeld, Unters. Myk. VIII (1888) t. XI f. 21
Bibl. 182 →
Hab. ad truncos carioticos imprimis Salicinos — Veneto: loco non indic. (Berlese)
Area distr. Europa.

Obs. Sec. Quél. Fl. Myc. p. 29 è forma mod. var. de S. ochracea accedit

poriaeformis 428.

1 mm. alto, 0,5 mm. or

Stipata confluens, sessilis; tubulis teretiusculis,
disco pallido
tomentosis, cinereo-umbrinis, subiculo irregulariter
effuso pallidiore infidentibus; pilis tubulorum
obscuris, flexuosis.

~~Basidiis subgymnisporis 20-26 = 8-9, gram.~~
~~hyalinis~~
oblongis, abrupte rotundatis, curvulis 11-14 = 3-3,5
Sporis ~~globosis, nucleatis, 4-5 μ diam.~~
hyalinis, levibus (Schröt.).

- Obs. Porothelium Friesii Mont. (sembra affine a questa specie.
Le ~~dimensioni delle~~ spore descritte nella Sylloge
di 4-5 μ d'am. potrebbero essere dei conidi.

p. 329

10 Solenia grisella Quél. in Bull. Soc. bot. Fr. 1877, t. VI f. 13
Sacc. Syll. Fung. VI pg. 429
Icon. Quélet l. c.
Bibl. 245
Hab. in truncis et ramis Abietis pectinatae — Piemonte: Valsesia a Riva Valdobbia (Carestia).
Nec visi. Gallia, Italia.

Perisphoria
Obs. S' inventa parasitica sulla ~~Coccinea~~ cinerea var. Picae.

gristella 6 – 429

Capulis vreeolatis, 1/2 mm. longis, villosis, griseolis, vegetis stipatis, siccis discretis, in tapete minuto, velutino, griseo-argenteo insidentibus;

hymenio fusco vel brunneo;

sporis ellipsoideis, hyalinis, 10 μ longis.

Polyporaceae

41/0003-20-1

(Polyporaceae)

Conspectus synopticus generum

A – Tubuli ~~tubiculo non inserti~~ nec in verrucis discretis immersi, nec ~~in~~ subiculo inserti.

B₁ – Tubuli superficiales

~~C₁ – Tubuli intus non papillati~~

C D₁ – fungi non ceraceo-tremelloti, vel ceracei, sed tunc tubuli non reticulato-plicati

D E₁ – Tubuli genuini

E F₁ – Fungi pileo praediti

P₁ G₁ – Tubuli in stratum ab hymenophoro distinctum stipati

G₁ H₁ – Stratum tubulorum ab hymenophoro separabile; fungi carnosi

H₁ I – Stipes centralis

I₁ L₁ – Tubuli facile ab hymenophoro separabiles, longissimi, regulares — Boletus

I₂ L₂ – Tubuli aegre ab hymenophoro separabiles, ampliores.

L₁ M₁ – Tubuli non sinuosi

M₁ N₁ – Hymenophorum leve; pileus stipesque fasciculo-squamosi — Strobilomyces

M₂ N₂ – Hymenophorum mucronatum; stipes saepe pileusque floccosi — Boletinus

L₂ M₂ – Tubuli sinuosi, vel gyroso plicati brevissimi. Hymenophorum leve — Gyrodon

H₂ I₂ – Fungi lateralis; tubuli a se invicem discreti sinuoso verruciformes — Fistulina

G₂ H₂ – Stratum tubulorum non separabile ab hymenophoro.

H₁ I – Fungi non membranacei, nec coriacei

I₁ – Tubuli non stratosi, praeformati; fungi carnoso-lenti, stipitati vel pileati — Polyporus

I₂ – Tubuli saepius stratosi, sessiles

M₁ – fungi primitus lignosi; keratopori — Fomes

M₂ – Fungi suberosi, hypothecio inerustato laccati, ~~ochropori~~ — Ganoderma

H₂ I – Fungi coriacei vel membranacei; tubuli non stratosi, plerumque a centro ad ambitum evoluti, primitus superficiales, punctiformes — Polystictus

F₂ G₂ – Tubuli in carne pilei immersi profundiores inaequabiles stratum heterogeneum haud formantes; fungi suberosi, non stratosi, sessiles

G₁ H₁ – Tubuli subcylindrici — Trametes

G₂ H₂ – Tubuli non cylindrici

H₁ I – Tubuli jam primitus in alveolos hexagonos dilatati — Hexagona

H₂ I – Tubuli sinuoso-labyrinthiformes — Daedalea

E₂ F₂ – Pileus nullus vel obsoletus, unde tubuli indefinite effusi, resupinati; fungi ceraceo-coriacei vel membranacei — Poria

D₂ E₂ – Tubuli spurii nempe ex lamellis primitus formati

F₁ ~~Tubi lamellae undique versae, fungi carnosi, lateralis, forte atypici~~ — Bresadolia

F₂ lamellae in series a stipite radiantes dispositae; tubuli primitus ampli. fungi carnoso-lenti, dimidiati — Favolus

C₂ H₂ – Fungi ceraceo-tremelloti, resupinati; tubuli reticulato-plicati demum subgyrosi — Merulius

C₂ E₂ – Tubuli centro papillam tectam porumque aequantem gerentes, regulares, contigui, fundo membranaceo — Cheleporus

B₂ – Tubuli superficiales nulli vel obsoleti. Fungi subglobosi nitidi, loculati, sporigeri, saepius Polyporis vel Daedaleis connati et metagenetice connexi. — Ceriomyces

~~A₂ – Tubuli tubiculo inserti, tenues, vel urceolati, primo clausi~~ — ~~Solenia~~

A₂ – Tubuli in verrucis discretis immersi, vel subiculo inserti

~~A₁ – Tubuli in verrucis discretis~~

Per carattere vedi Fam. I Agaricacee ✠ pg 38

Fam. II Polyporacee Fr. Pl. hom. p. 79 (1825)

(Sacc. Syll. Fung. VI pg. 1

Hymenophorum typice inferum, terram spectans, ✠ porosum. Pori rotundi vel angulosi, interdum sinuosi vel lacerati, intus sporis, basidiis typice tetrasporis et cystidiis muniti. Sporae, ut in Agaricaceis ~~vacuit~~, sphaericae, oblongae, fusoideae continuae, albae, flavae, rubentes, nigricantes; ~~basidia~~ normalia, apice saepius 4-sterigmatica. Fungi carnosi, coriacei vel lignosi, in terris calidioribus praecipue luxuriantes. Inter Agaricaceas et Hydnaceas medium tenent locum: cum illis junguntur Daedaleà et Lenzite cum his Fistulina et Irpice Fl. Hym. pg. 495

Oss. A ragione alcuni micologi più recenti e specialmente il ch. Patouillard smembrano in più generi i generi antichi di questa famiglia, e li classificarono come nelle Agaricacee in base ai caratteri sporologici e specialmente al colore delle spore. Essi però, pel fatto che appunto i caratteri sporologici di moltissime specie sono ancora ignoti, ti è seguita (ancora) la classificazione Friesiana ~~d'altra parte eccellente~~ con lievi modificazioni.