Frontispizio

35/0018-1

Cronologia della Flora italiana

Repertorio sistematico delle più antiche date ed autori del ritrovamento delle piante (Fanerogame e Pteridofite) indigene, naturalizzate e avventizie d'Italia e della introduzione di quelle esotiche più comunemente coltivate fra noi

compilato da

P. A. Saccardo

Ego plantavi; lascio ad altri la palma di migliorare e perfezionare l'opera mia

Boerio

Fogli ..... Prezzo L. .....

Padova
Marzo 1909
a (Stamperia del Seminario
1 (a spese dell'autore

Catalogo bibliografico
delle fonti
della Cronologia
della Flora italiana

Rostan + 1895
Grovey
Giannini + 1871
Narducci + 1876
Amidei + 1870
Ausendorf + 1884

48°
40
52°

Kralik

Barrelier (+ 1673) ed. 1714
Cupani (+ 1711) ed. 1715

35/0018-2

1

Cronologia della Flora italiana

~~Saggio~~ ~~inteso a indicare~~ Reportano sistematicamente più antiche delle date ed gli autori ~~più antichi~~ del ~~trovamento~~ rinvenimento delle ~~piante~~ ~~fanerogame~~ piante vascolari indigene, naturalizzate e avventizie d'Italia e della introduzione di quelle esotiche ~~qui naturalizzate~~ o più ~~estesamente~~ comunemente coltivate fra noi

compilato da

P. A. Sauardo.

Prefazione

Pochi mesi or sono comunicava all'Accademia Scientifica Veneto-trentina-istriana di Padova (1) una notizia preliminare del lavoro che oggi finalmente, dopo quasi due anni di pazienti e minuziose ricerche, faccio di pubblica ragione. Nella predetta notizia ne esposi il concetto e le ragioni, che qui trovo necessario ripetere.

Il titolo di Cronologia della Flora italiana ha bisogno di essere tosto chiarito affinchè non sia inteso nel senso paleontologico o filogenetico; si tratta invece di uno studio d'indole storico-botanica che s'industria d'indagare e di rivelare le prime date e i primi autori della scoperta o constatazione delle piante che formano la Flora italiana.

Questo lavoro ha principalmente due scopi. L'uno storico, col quale si studia di mettere in luce que' benemeriti naturalisti che colle loro ricerche andarono via via creando e accrescendo, fra' primi, il patrimonio della

patria Flora. Con tale esposizione verrà dimostrato il successivo accrescersi e acuirsi di queste scoperte che, limitate dapprima alle non molte piante utili o più vistose fino all'epoca romana, si assopirono nel lunghissimo e bujo periodo medievale, per risvegliarsi nel cinquecento a vita nuova con Mattioli, Anguillara, Cesalpino, Cibo, Aldrovandi, Colonna e un po' più tardi con Boccone, Cupani ed altri minori, ed intensificandosi sulla fine del settecento per il forte impulso dato dal Linneo, trovarono via via sempre più numerosi e oculati cultori fino ai dì nostri, in guisa che non poche forme, ch'erano rimaste prima inosservate furono recentemente rintracciate e acutamente discriminate. mapicoletta

L'altro scopo, cui mira il lavoro, si connette colla botanica propr. detta, specie colla geobotanica e più particolarmente colla fitostatistica. Come è ben noto la Flora di una regione si compone di tre elementi, almeno secondo l'opinione ora prevalente:

I. Le piante indigene che vi crescono spontaneamente ab immemorabili e che costituiscono la grandissima maggioranza. Fra queste alcune vengono coltivate estesamente; onde le indigene possono essere spontanee e coltivate (2); grassetto

II. Le esotiche più largamente coltivate per opera dell'uomo, parecchie delle quali sfuggono spesso dalle colture e si moltiplicano spontaneamente qua e là;

35/0018-3

III finalmente le esotiche accidentali che, importate fra noi per via di agenti sconosciuti o involontari o già coltivate appena in qualche orto botanico, trovarono nelle condizioni telluriche e meteoriche della nuova patria un ambiente così favorevole da riprodursi spontaneamente. Queste ultime si possono suddividere in due categorie: le une che si diffondono tosto largamente da paese a paese e divengono invadenti come le male erbe e si dicono naturalizzate(3); e le altre che non si allontanano dal luogo della prima disseminazione e spesso, dopo pochi anni, scompajono, per ricomparire o no ulteriormente, e sono le avventizie(4). Non occorre notare che talune piante, ora naturalizzate, passarono probabilmente all'inizio per lo stadio delle avventizie.

Formano una categoria a parte di indigene avventizie quelle piante che pure appartenendo alla stessa regione botanica s'incontrano spostate dalla loro naturale stazione per opera segnatamente delle acque e dei venti. Queste piante si addomandano eterotopiche 5)

Riassumendo, si ha rispettivamente ai dati fitostatistici sopra esposti, il seguente prospetto 6)

I Piante indigene { spontanee { autotopiche (viventi nella loro stazione fuori propria) (cavatt. minuto) / ~~eterotopiche~~ eterotopiche / coltivate

II Piante esotiche { coltivate) 2 / accidentali { naturalizzate / avventizie) 1

Considerate queste varie categorie di piante, non può essere senza interesse scientifico e storico la ricerca del tempo nel quale la loro prima comparsa fra noi ebbe luogo o, dirò meglio, fu constatata.

È ben vero che la presenza della massima parte delle piante, cioè delle indigene rimonta ad epoche preistoriche, inafferabili; però delle modificazioni nell'attualità avvengono indubbiamente anche fra queste, sia per formazione di nuovi ibridi o di nuovi lusus per mutate condizioni d'ambiente, sia per immigrazioni o emigrazioni. Riuscirà adunque sempre interessante fissare, per quanto è possibile, le date e gli autori di queste constatazioni, servendoci per documentarle degli erbari e dei codici tuttora conservatici e delle opere fededegne a stampa. E ciò vieppiù che sono ben molte le specie vegetali di esotica derivazione, le quali insinuatesi clandestinamente e moltiplicatesi fra la vegetazione indigena da moltissimi anni, oggi, in mancanza di sicura documentazione, potrebbero passare come nostrali. E non sono pochi i dubbi tuttodì sollevati dai naturalisti sull'indigenato legittimo o acquisito di molte specie (7).

Ed anche al riguardo delle piante esotiche più comunemente coltivate pegli usi domestici o per altri scopi, sarà sempre di notevole interesse indagare e determinare l'origine e il tempo della loro introduzione fra noi, oggetto che diede già origine ad opere reputatissime

35/0018-4

di Antonio Targioni-Tozzetti[7a], di Alfonso De Candolle[7b]) di V. Hehn[7c]) e di altri.

È ben chiaro che il lavoro, che presento, non può aspirare che ad una esattezza e completezza relativa, perocché, malgrado ogni attenzione e cura, è sempre possibile scovare in avvenire o qualche testo o qualche erbario che obblighi a spostare o qualche data o qualche scopritore. Però, prescindendo dall'obbligo nostro di salvaguardare il più possibile il titolo di priorità dei singoli scopritori, rimane sempre storicamente e scientificamente importante sapere a quale tempo spetti approssimativamente la scoperta di una specie data, se cioè questa rimonti, ad esempio, o all'epoca romana o al cinquecento o all'uno o all'altro dei secoli successivi o all'età nostra.

Ed ora faccio seguire per chi vorrà servirsi del presente lavoro, le nozioni e le norme più indispensabili.

I. Per ogni specie o forma enumerata nella Cronologia sono semplicemente citati il nome degli autori del trovato e le date rispettive. Per risalire alla fonte si deve anzitutto ricorrere al Catalogo bibliografico alfabetico premesso al testo e si troverà l'opera o l'erbario donde fu tratta la notizia. Talune pubblicazioni, meno spesso allegate sono invece citate ai propri luoghi. Se si tratta di opere postlinneane, a nomenclatura binaria, sarà agevole trovare in esse la pianta cercata. Ma se si tratti invece di opere

7a Targioni-Tozzetti A. Cenni storici sulla introduzione di varie piante nell'agricoltura e orticoltura Toscana. II ed. per cura di E. Baroni. Firenze 1896.
7b De Candolle Alf. L'origine delle piante coltivate. Trad. ital. Milano 1883.
7c Hehn V. Piante coltivate e animali domestici. Trad. ital. sulla V tedesc. Firenze 1892.

antiche a nomenclatura ora affatto abbandonata, bisognerà ricorrere, secondo i casi, alle opere del Linneo, dell'Allioni, del Pollini e, sovratutto, alla erudita e classica flora italica del Bertoloni. In esse si troveranno insieme agli antichi sinonimi, anche la citazione del loro autore, opera e pagina e sarà facile quindi confrontare il testo ed eventualmente le figure delle piante ricercate. Trattandosi poi degli erbari e dei codici si dovrà confrontare le rispettive illustrazioni citate nel nostro Catalogo bibliografico.

II Il mio intento fu specialmente quello di indicare per ogni specie e ~~forma~~ sottospecie ed ibrido il più probabile primo scopritore; quanto agli altri autori citati appresso al primo, questi furono aggiunti a confermarlo e legittimarlo. Essi sono certamente fra i più vecchi, ma senza pretendere però che fra l'uno o l'altro di essi non sia occorsa l'omissione di qualcuno.

III Gli autori più antichi (patres) da me citati non precisano talvolta l'habitat in Italia delle piante da essi illustrate; però l'indigenato o la naturalizzazione italiana di coteste specie viene in qualche modo dimostrata dagli autori citati di seguito.

IV. Le date esposte di alcuni antichi erbari (Cibo, Aldrovandi ecc.) e di parecchi codici (Rinio, Michiel ecc.) debbono essere prese soltanto come approssimative, essendo ben naturale che la loro composizione dovette durare un tempo più o meno lungo.

V Riferisco alcune poche specie date come incerte in opere floristiche

raccolte in Italia, quantunque taluni botanici posteriori, come Caruel, Gortani, Goiran ecc. abbiano negato o sollevato dei dubbi sul loro habitat. A me pare infatti che un dubbio o un'asserzione (che potrebbe diventare gratuita) non siano motivo sufficiente per un'assoluta esclusione.

VI Rispetto ai numerosi ibridi di certi generi (Salix, Potentilla, Alchemilla, Mentha, Cirsium ecc.) dove gli autori diversi non sono sempre concordi, necessariamente anche le fonti da me citate per essi possono lasciare dei dubbi sulla identità delle forme contemplate.

VII I numeri progressivi premessi al nome delle specie, corrispondono a quelli che si hanno nella Flora analitica d'Italia dei professori Fiori, Paoletti e Béguinot. Le lettere A, B, C. ecc. che spesso fanno seguito ai numeri indicano o le specie aggiunte dal Fiori nel suo IV vol. della predetta Flora (Appendice), ovvero le forme ibride, che in detta Flora non sono distinte da numeri, o, finalmente, non poche specie esotiche coltivate o avventizie che nella stessa opera mancano o sono solo nominate in nota. Le mie aggiunte si riferiscono specialmente alle piante più di sovente coltivate per ornamento, sembrandomi interessante conoscere anche di queste la data e il luogo d'introduzione fra noi, elementi che possono spiegare talora la successiva comparsa sporadica di dette piante seguita non di rado dalla loro naturalizzazione fra noi.

VIII Colla lettera majuscola R, collocata a destra dei nomi, ho indicato le specie note ai romani e rammentate dagli auto-

35/0018-5

ri classici. Le difficoltà ed incertezze in tale attribuzione non mancano, giacchè è ben noto che i cenni descrittivi coi quali detti autori cercarono distinguerle sono alcune volte così vaghi e laconici che riesce quasi impossibile pervenire a dati sicuri. Sono ben conosciuti e gli immensi commentari e le infinite dispute il più delle volte sterili e contraddittorie, in cui si indugiarono i semplicisti, specie cinquecentisti, per interpretare le piante degli antichi. Ho creduto quindi limitarmi ai dati più sicuri, ai quali pervennero lo Sprengel (8), il Meyer (9) e specialmente il Fraas (10). Il Fée nell'ampia illustrazione ~~delle~~ numerosissime ~~piante Plinia~~, ~~si studiò~~ della parte botanica dell'Istoria naturale di Plinio (11) si studiò di darci l'interpretazione delle numerosissime specie che questi più che dalla natura ritrasse dai molti codici antichi che potè consultare; ma in questo lavoro il Fée mi pare ci abbia date per sicure molte piante incerte; ond'io non potei tenerne conto. Del resto molte di queste sono rammentate dal Plinio di seconda mano e non sono affatto indigene d'Italia. Lo Schouw (12) e meglio il Cornes (13) ci diedero l'identificazione di una settantina di piante rappresentate nei dipinti di Pompei, che dovevano essere comuni intorno al principio dell'èra nostra. Ed il Bonnet (14) illustrò alcune poche piante rappresentate negli antichi vasi sterrati a Boscoreale (Napoli); documenti ottimi sicuramente, ma assai scarsi per il nostro intento.

Sicuramente il mio lavoro sarebbe riuscito più

IX [illegible]

completo e di più comodo uso se avessi aggiunto per ciascuna ~~specie e forma~~ pianta i nomi e gli habitat riferiti da ogni autore; ma se si pensi che fra le specie, sottospecie ed ibridi (escluse le forme inferiori) il numero delle entità da me contemplate è di 8000 (15), è manifesto che il volume avrebbe raggiunto una mole soverchia mentre lo scopo può essere ottenuto, sia pure per una via un pò più lunga, medesimamente.

Due opere a stampa hanno delle analogie col presente saggio: i Beiträge zu Deutschlands Flora gesammelt aus den Werken der ältesten Pflanzenforscher (Heidelberg, 1825-1833) del Dierbach ed i First Records of British flowering Plants (London, 1897) del Clarke; ma la prima opera riferisce i sinonimi antichi delle piante germaniche descritte dai soli botanici cinquecentisti e senza le singole date; la seconda indica testualmente gli habitat e le date del solo primo scopritore, ma non riporta i nomi originali ed esclude tutte le sottospecie e gli ibridi; tutt'e due poi contemplano un numero assai ristretto di entità vegetali.

Esposta così l'indole e lo scopo del mio lavoro e le avvertenze per usarne mi preme ripetere ch'esso va considerato (non come un'opera definitiva ma) come un saggio, un tentativo da essere emendato e accresciuto (16) grasso Confido poi ch'esso possa servire di eccitamento ai già numerosi e valenti floristi nostri, i quali riconoscendo in queste ricerche l'importanza che indubbiamente loro spetta, vogliano vagliare, emendare, aumentare i dati da me non senza lunga pazienza raccolti e ordinati (17)

Padova, R. Istituto botanico, Agosto 1908.

P. A. Saccardo

~~(17) [illegible]~~

volta

35/0018-6

Appiè di pagina si stampi, se rimane un pò di spazio.

Spiegazione delle abbreviature

R significa: pianta nota fino dall'epoca romana

C " pianta coltivata per usi economici

C. " pianta coltivata a scopo ornamentale o scientifico

A " pianta avventizia

N " pianta naturalizzata

Delle 713 piante esotiche ~~coltivate~~ introdotte in Italia e enumerate nel ~~Il Elenco~~ secondo elenco, almeno 382 sono esclusivamente coltivate senza tendenza e, per alcune anzi, senza probabilità di acclimatarsi fra noi, mentre le rimanenti 331, vuoi perchè provvedute di più adatti mezzi di disseminazione, vuoi perchè il nuovo ambiente riesca loro affatto omogeneo, si naturalizzano o, comportandosi per ora come avventizie, si avviano a naturalizzarsi in seguito. Dallo stesso Elenco risulta che le piante veramente naturalizzate in Italia sono oggi almeno 111, mentre il doppio numero, cioè 220 *) sono le avventizie, molte delle quali, però, dimostrano una spiccata tendenza a naturalizzarsi. Come è vario il luogo d'origine, la data d'introduzione fra noi, la durazione delle singole piante, così è pur varia la loro forza d'espansione e la relativa area già da loro occupata. E così da un attento esame si può verificare che, in generale, le specie di più antica introduzione provengono in maggioranza dall'Asia, mentre quelle di più recente comparsa sono giunte prevalentemente dalle Americhe e dall'Africa. È giusto aggiungere che le avventizie per lo più e per ragioni abbastanza ovvie, sono di durazione annua. (**)

(*) Il Fiori (Flora anal. I p. LXXIX) fa ascendere a 267 le piante esotiche, ora avventizie o naturalizzate in Italia, mentre dall'Elenco, qui esibito, ne risultano 331. La differenza deriva dal fatto che in questo sono considerate come avventizie buon numero di piante che, per essere state notificate una sola volta o dubitativamente, il Fiori ~~ha creduto~~ ha creduto dover escludere dal suo prospetto.

(**) Vedi: Fiori, Flora anal. I p. LXXIX. Alle giuste ragioni della prevalenza (ovvia) delle avventizie annue in confronto alle perenni, addotte dal Fiori, credo si possa aggiungere un'altra e non trascurabile. Ed è questa: che molte delle avventizie, provenendo da regioni più calde, non potrebbero svernare fra noi, mentre, compiendo il loro ciclo vitale nel periodo estivo-autunnale, esse, perchè abbondano i loro semi possono persistere e diffondersi.

35/0018-7

IX Al testo faccio seguire una giunta di 107 specie di piante esotiche che, secondo la mia esperienza, sono ~~agg.~~ più comunemente coltivate nei nostri giardini, le più per ornamento e da epoca remota. Un altro centinaio circa di simili piante aggiunsi, ~~a~~ a' propri luoghi, nel testo; in totale adunque un aumento di 209 specie*). Avendo alla mano i documenti genuini per fissarne l'epoca d'introduzione, ho giudicato opportuno di profittarne sia perchè tali conoscenze non sono prive in sè d'interesse e sia per correggere i frequenti dati erronei che incontriamo in periodici e trattati ~~[illegible]~~ nostrani che si contentano di prendere ~~[illegible]~~ soltanto le notizie ~~[illegible]~~ dalle opere straniere. In totalità le specie esotiche coltivate, avventizie e naturalizzate, contemplate nel presente lavoro, sommano a 713, di cui 78 furono note nell'epoca romana; a queste nel medio evo se ne aggiunsero soltanto 19; nel cinquecento 127; nel seicento 58; nel settecento 175 e nell'ottocento a tutt'oggi 256.

X In fine seguono due elenchi offerenti in qualche modo la sintesi del lavoro. Nel primo elenco sono enumerate le piante della nostra flora (siano indigene che coltivate, avventizie e naturalizzate) secondo erano conosciute nella successione de' tempi. Eccone il prospetto cronologico e il numero delle specie, sottospecie ed ibridi:

A. Piante classiche (note all'epoca romana)	n.	408
B Piante medievali (scoperte in più nel medio evo)	"	189
C. Piante cinquecentesche (" nel cinquecento)	"	1171
D Piante secentesche (" nel seicento)	"	814
E Piante settecentesche (" nel settecento	"	1311
F Piante ottocentesche e novecentesche φ	"	4107
Totale		8000

φ (" nell'ottocento e principio del novecento)

Delle piante però di quest'ultimo gruppo omisi l'elenco nominativo sia perchè le dette piante risultano manifeste dal non essere comprese nelle liste di quelle più antiche e sia perchè, ~~[illegible]~~ la loro constatazione più recente è meglio nota. Nella maggior parte sono sottospecie ed ibridi.

Nel secondo elenco figurano esclusivamente le piante esotiche di cui è parola al precedente paragrafo, disposte cronologicamente, contraddistinte mediante segni speciali, a seconda delle tre categorie alle quali spettano e inoltre, per le coltivate, se lo sono per gli usi economici o per ornamento. S'intende che parecchie fra esse sono utili insieme ed ornamentali.

~~[illegible]~~

*) Aggiunsi pure le tre seguenti specie di scoperta recentissima: Panicum erectum Poll., Cuscuta Gronovii W. e Melitella pusilla Somm.

Dai risultati numerici esposti ~~nel~~ in questo e nel precedente paragrafo IX abbiamo una nuova conferma di fatti storici ben noti: all'epoca romana le nostre cognizioni botaniche erano scarse e limitate alle piante di uso pratico, più scarse ancora relativamente furono le cognizioni acquisite nel medio evo, il memorabile risveglio del cinquecento in ogni ramo del sapere apportò anche per la Botanica notevole incremento sia nella scoperta di ~~[illegible]~~ piante indigene ~~[illegible]~~ che nella introduzione fra noi di ~~[illegible]~~ molte esotiche. Il seicento segnò un regresso, poche essendo state le nuove piante indigene scoperte e più scarse quelle importate in Italia dall'estero. Dalla metà ~~fine~~ del settecento a tutt'oggi il progresso è stato incessante sia per l'uno che per l'altro gruppo di piante e l'ottocento sopra tutto si distinse per il sottile esame e per l'acuta distinzione delle forme subalterne alle specie, cioè sottospecie, varietà, razze ed ibridi.

Sicuramente ecc

35/0018-8

Note (da porsi a piè di pagina) 6 35/0018-9

1) Nella tornata dell' 8 Dicembre 1907 (atti, Nuova Serie, V, p. 1)

2) Come, ad esempio, Trifolium pratense, T. incarnatum, Hedysarum coronarium, Lotus corniculatus, Lolium perenne ecc. di coteste piante è interessante lo studio delle modificazioni subite per effetto della coltura in confronto delle selvatiche.

3) (5) Cito fra i molti, alcuni pochi esempi di piante prettamente esotiche ora naturalizzate fra noi: l' *Azolla caroliniana*, la *Eleusine indica*, la *Helodea canadensis*, l'*Erigeron canadense*, la *Stenactis annua*, il *Bidens bipinnatus*, la *Galinsoga parviflora* sono oggi piante tanto diffuse per tutta o gran parte d'Italia, da parere onninamente indigene. Or bene l'*Azolla* appena nel 1886 uscì dall'Orto botanico di Pisa per diffondersi nelle acque di mezza Italia; l'*Eleusine* cominciò a propagarsi nell'alta Italia dopo il 1870 ed ora vi è diffusissima; la *Helodea*, portata da Altona a Mantova nel 1866, solo da quest'anno cominciò a diffondersi meravigliosamente per le acque d'Italia; lo *Erigeron* era coltivato nel 1644 nell'Orto Patavino ed ora è diventato la più invadente erbaccia d'Italia, anzi d'Europa; la *Stenactis* figura appena nel 1717 nell'Orto Padovano, ora non si distingue dalle erbe indigene; il *Bidens* cominciò a naturalizzarsi nel 1754 ed oggi è fra noi una vera malerba; la *Galinsoga*, infine, era fra il 1806 e 1812 coltivata come una rarità negli Orti botanici di Firenze e di Padova ed oggi è disseminata fra noi in cento luoghi.

4) (4) Fra le piante esotiche avventizie, che spesseggiano sopra tutto presso gli scali marittimi, dove approdano le navi di lontane provenienze e negli Orti botanici, mi limito a citare l'asiatico-africana *Pteris serrulata*, che da molti anni, resistendo ai rigori invernali si moltiplica fra le fessure dei muri dell'Orto padovano, insieme alla *Pteris longifolia*, senza però finora uscirne. Invece la *Veronica peregrina*, la *Dicrocephala sonchifolia*, la *Fumaria anatolica*, la *Clozophora tinctoria*, tutte sicuramente esotiche pel Veneto, fanno saltuaria comparsa nell'Orto stesso e appena le due prime s'incontrano talora nelle vicinanze.

/hr

5) 5) Per citare un solo esempio, fra i molti, rammento quelle specie montano-alpine che, trasportate — per mezzo dei loro semi — dalle acque del Piave, si incontrano, benchè precariamente, in pianura lungo le sponde, come: *Bellidastrum Michelii*, *Spiraea decumbens*, *Saxifraga autumnalis*, e alla foce, proprio in prossimità del mare, come: *Epimedium alpinum*, *Hieracium staticifolium*, *Satureja montana* ecc.

/delle piante eterotopiche

/Dryas octopetala,

6) Sul capitolo speciale delle nostre piante naturalizzate, avventizie ed eterotopiche abbiamo già una piccola ma interessante serie di contribuzioni di T. Caruel (1867), G. A. Pasquale (1868), Marchesetti (1882), Mazzini (1883), Baglietto (1886), Penzig (1889), Sommier (1904), Béguinot (1904-1905-1907), senza contare gli articoli di altri nostri botanici che trattano di singole specie avventizie o naturalizzate, o ne trattano incidentalmente in lavori floristici.

«Giovan (1890)

Bozzi (1888) I Traverso (1898)

7) A questo proposito è confronti il particolareggiato lavoro per l'Italia, primo in ordine di tempo, di T. Caruel: Di alcuni cambiamenti avvenuti nella flora toscana (Milano, 1867) e la recente memoria d'indole più generale e sintetica di A. Béguinot: Sull'opportunità di uno studio metodico e regolare dei cambiamenti e delle variazioni a cui va soggetta la flora italiana in rapporto ai fattori d'ambiente (Venezia, 1908)

8) Sprengel, Historia rei herbariae ⊤
9) Meyer, Geschichte der Botanik ⊥
10) Fraas, Synopsis plantarum Florae classicae. München, 1845.
11) Schouw, Die Erde. Leipzig, 1868, pag. 34.
12) Comes, Enumerazione delle piante rappresentate nei dipinti Pompejani. Napoli 1880.
13) Fée ϕ
14) Bonnet Δ

(15) (numero risulta da 7788 entità descritte) Questo è ~~il numero portato~~ nella *Flora analitica d' Italia* dei professori Fiori, Paoletti e Béguinot, ~~la quale~~ Io seguo scrupolosamente ⊥ numero per numero, intendendo quasi che il mio lavoro sia un complemento di quella. La seguo senza preoccuparmi di critica sistematica, giacchè la mia trattazione è, come ho dichiarato, quasi esclusivamente d'indole storica, accessoriamente inserviente alla fitostatistica.

⊥ detta opera,

b/ e dalle 212 da me aggiunte.

(16) Una nuova via per rintracciare altre e forse più antiche date della ~~accertamento~~ conoscenza, che si aveva, delle nostre piante, è quella del diligente esame degli antichi quadri, nei quali non pochi dei nostri pittori ritrassero dal vero e con mirabile fedeltà parecchie fra le piante dei loro dintorni. Come mi rammenta mio genero, il prof. Aless. Trotter, in talune tele (come in quelle dell' Alfani, di Eusebio da S. Giorgio ecc.), che si conservano nel prezioso Museo perugino, sono riconoscibili molte di tali piante, che le ornano, come gentile accessorio.

ϕ Fée A. L.
la matière
1833, vol.

⊥ Meyer E.
Königsb

⊤ Sprengel K.
I, 1807, –
I, 1817, II

Δ Bonnet Ed
vases de
Paris 1899

Fée A. L. Commentaires sur la Botanique de la matière médicale de Pline etc. Paris, 1833, vol. 3.

Meyer E. H. Geschichte der Botanik. Königsberg, 1854-57, vol. I–IV

Sprengel K. Historia rei herbariae. Lipsiae, I, 1807, II 1808 — Trad. tedesca. Leipzig I, 1817, II 1818.

Bonnet Ed. Plantes représentées sur les vases de Boscoreale (Musée du Louvre) Paris 1899.

Catalogo bibliografico delle fonti citate nel presente libro.

Agostini Giuseppe (1715–1786)

1769. Plantae (stirpes) Agri Belunensis. Cfr. Saccardo, I codici botanici figurati e gli antichi erbari di Zannichelli, Martino Agostini e Venezia 1904. A pag. 64 è riportata la moderna nomenclatura (seguita dall'antica) di tutte le piante contenute in detto Erbario dell'Agostini.

Aldrovandi Ulisse (1522–1605)

1551. Suo Erbario di Bologna. Cfr. Mattirolo O., Illustrazione del I volume dell'Erbario Aldrovandi. Genova 1899 — 1551. Vol. II: Cfr. G.B. De Toni, Illustrazione del secondo volume dell'Erbario Aldrovandi. Venezia 1908 — 1552 Vol. III: Cfr. G.B. De Toni, Illustrazione del terzo vol. ecc. Genova 1908.

Allioni Carlo (1728–1804)

1755. Rariorum Pedemontii stirp. specimen I. Taurini.
1757. Stirpium praecipue Litor. et agri Nicaeens. Parisiis.
1759. Fasciculus stirpium Sardiniae etc. a M. A. Plazza lect. Taurini (Miscell. Taurin. I)
1760. Synopsis methodica stirp. Horti Taurinensis. Taurini (Miscell. Taurini II) — 1772 Auctarium. Taurini 1772 (Miscell. Taurin. seu Mélang. V)
1785. Flora Pedemontana. Taurini — 1789 Auctarium

Alpino Prospero (1553–1617)

1592. De plantis Aegypti. Patavii.
1627. De plantis exoticis. Venetiis (postumo)

Ambrosi Francesco (1821–1897)

35/0018-10

1853. Elenco delle Fanerogame del Tirolo meridionale. Bologna
1854. Flora del Tirolo meridionale. Padova. Vol I — 1857 Vol. II, parte I.
1888. Le piante Crittogame vascolari del Trentino. Trento.

Ambrosini Giacinto (1588–1637)
1657 Hortus studiosorum. Bononiae
1666 Phytologiae tom. I. Bononiae.

Anguillara Luigi (1512–1570)
1561. I Semplici. Venezia.

Anzi Martino (1812 — 1883)
1878 Auctarium ad floram novo-comensem. Mediolani.

Arcangeli Giovanni.
1882 Compendio della flora italiana. Torino — 1894. Seconda edz. Torino.

Arduino Onorato (1819–1874)
1862. Catalogue des plantes vasc. de Menton et de Monaco. Turin
1867. Flore analytiq. des Alpes maritimes. Mentone — 1879. Seconda edz.

Arduino Luigi (1759–1834)
1807 Catalogo primo (ed unico) delle piante del R. Orto d'Agricolt. in Padova. Tip.

Arduino Pietro (1728–1805)
1759. Animadversiones botanicarum Specimen [I] Patavii — 1764 Specim. II. Venetiis
1766. Memorie di Osservazioni. Padova (Saggi Anad. Padova)
1780. Sul genere degli Olchi. Padova (Saggi c. s.)
1780 Sul genere degli Orzi. (Padova (Saggi c. s.)

35/0018-11

1781. Sulle piante avenacee. Padova (Saggi c. s.)

Arvet-Touvet C.

1888. Les Hieracium des Alpes françaises et. Lyon-Genève-Bâle.

Ascherson Paul et Graebner Paul

1896-98 Synopsis der Mitteleurop. Flora. Leipzig-Vol. I - 1898-1902 Vol. II.

Avé-Lallemant (1803-1867)

1827 De plantis quibusdam Italiae borealis et Germ. austr. Berolini.

Badaró Giov. Battista (1793-1831)

1826 Osservazioni sopra diverse piante della Liguria occid. e della Sardegna Pavia (Giorn. di Brugnatelli, VII)

Baglietto Francesco

1886 Flora della valle del Lagaccio. Genova.

Balbis Giov. Battista (1765-1831)

1801 Elenco delle piante dei contorni di Torino. In calce: Additamenta ad Floram pedemontanam. Torino.

1803. De Crepidis nova specie etc. Taurini (Mem. Acad. Torin.)

1804. Miscellanea botanica, simul additamentum alterum ad Floram pedemontanam (Mem. Acad. Tor.) — 1806 Miscellanea botanica. Pars altera. Taur. (l. c.)

1806. Flora Taurinensis. Taurini.

1810. Horti Taurini Stirpium icon. et descriptiones. Taurini.

1813. Catalogus stirpium Horti taurinensis. Taurini

1818. Elenchus recentiorum stirpium. Taurini (Mem. Acad. Torin.)

Ball John (1818 - 1889)

1868. Alpine Guide. London

1879 The distribution of plants on the south side of the Alps London (Trans. of the Linn. Soc. 1896)

Barbey William.

1884. Florae Sardoae compendium. Lausanne.

Barrelier Jacques (1606—1673)

1714 Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae. Parisiis (Posthum)

Barbieri Paolo (1789—1875)

1826. Intorno all'Ibisco roseo nei contorni di Mantova. Pavia (Giorn. di Brugnatelli)

1831. Oss. sopra un nuovo gen. di Piante per l'Italia, il Corispermum. Verona (Poligrafo)

1838. Aggiunte ed osservazioni sul Saggio di St. nat. Mant. del prof. Lanfossi. Verona (Poligrafo)

1848. Conferenze sull'Apios tuberosa scoperta nei boschi del Po nel Mantovano. Milano.

Barla Gio. Battista (1817—1896)

1868 Flore illustrée de Nice (Orchidées). Nice

Bartalini Biagio (1746—1822)

1776. Suo Erbario in Siena. Cfr. Gl. Tatti. Illustrazione dell'Erbario Bartalini. Siena 1899-1905 (Bull. Orto bot. Sien.)

1776. Catalogo delle piante che nascono intorno alle città di Siena. Siena

Bauhin Casp. (1560-1624)

1620 Prodromus Theatri botanici. Francofurti.

1623 Pinax Theatri botanici. Basileae.

Bauhin Joh. (1541-1613), Cherler J. (1570-1610)

1650 Historia plantarum univers. ed. Chabraeo. Vol. I Ebroduni — 1651, vol. II.

Bayle—Barelle Giuseppe (1768—1811)

1809. Monografia agronomica dei Cereali. Milano.

Barsali Eugenio. Vedi anche Cattolica.

1897-1902 Supplemento generale al Prodromo della Flora toscana di T. Caruel. Firenze

35/0018-12

Beck von Mannagetta Günther.
1890. Monographie der Gattung Orobanche. Cassel (Bibliotb. botanica)
Béguinot Augusto – Delle pubblicazioni di lui è fatta citazione ai propri luoghi.

Bellardi Carlo Ant. Lod. (1741–1826)
1788 Osservazioni bot. e Append. alla flora Pedemontana. Torino
1791 Appendix ad Floram Pedemontanam. Taurini (~~Mem. Acad. Torin.~~)
1802 Stirpes novae Pedemontanae. Taurini (Mem. Acad. Torin.)

Belli Saverio
1890 Avena planiculmis var β taurinensis Genova (Malpighia IV, p. 363)
1900 Le Festuche italiane Genova (Malpighia XIV p. 275)

Bérenger Adolfo (1815–1895)
1860 Dell'antica storia e giurisprud. forestale. Fasc. III°. Treviso

Bertoloni Antonio (1775–1869). Vedi anche Bocone
1803 Rariorum Ital. v. Liguriae plantarum Decas (I) Genuae – 1806 Decas II. Pisis – 1810 Decas III. Pisis.
1804. Plantae Genuenses. Genuae.
1819. Amoenitates italicae. Bononiae
1820 Excerpta de re botanica. Bononiae.
1822 Lucubrationes de re herbaria. Bononiae.
1824 (Species novae) in Römer et Schult. Syst. vegetab. Mantissa II Stuttgardiae.
1826 Descrizione dei Zafferani italiani. Bologna
1832 Mantissa plantarum Florae Alpium Apuanarum. Bononiae.
1833 Flora italica. Vol. I Bononiae – 1835, vol. II. – 1837, vol III – 1839, vol. IV – 1842, vol. V – 1844, vol. VI – 1847, vol. VII – 1850 vol VIII – 1853, vol. IX – 1854, vol X – 1858 vol. XI (Flora cryptog. pars. I)
NB Non è stato possibile determinare con sicurezza le date dei fascicoli (8 per volume) onde uscì alla luce la flora italica. Si può ammettere in generale che la I metà di ogni volume uscì nell'anno portato nel frontispizio e la II^a metà nell'anno dopo.

1838 Horti botanici Bononiensis plantae novae. Fasc. I Bononiae — 1839 Fasc. II.
1857 Miscellanea botanica, fasc. XVII Bononiae — 1858, fasc. XVIII.

Bertoloni Giuseppe (1804–1828)
1844 Iter in Apenninum Bononiense. Bononiae.

Bicknell Clarence
1885 Flowering plants of the Riviera. London.
1896. Flora of Bordighera and S. Remo. Bordighera

Biroli Giovanni (1772–1825)
1808 Flora Aconiensis. Viglevani
1815 Catalogus plantarum Horti botanici Taurinensis. Taurini.
1817 De nova Phytematis specie Taurini (Mem. Accad. Torino)
1820 Phyteuma Charmeli Dey descript. Taurini (l. c.)
1820 Sopra un' Androsace. Pavia (Giorn. di Brugnatelli)
1821 Verbascum cisalpinum. Pavia (l. c.)

Bivona–Bernardi Antonio (1774–1837). Citato anche: Bivona,
1806 Siculorum plantar. Cent. I Panormi — 1807 Centuria II
1813 Stirpium rariorum Siciliae, Manip. I, Panormi — 1814 Manip. II — 1815 Manip. III — 1816 Manip. IV.

Bivona–Bernardi Andrea
1838 Nuove piante inedite. Palermo.

Bizzozero Giacomo (1852–1885)
1879. Alcune piante d'aggiungere alla Flora Veneta. Padova (Atti Soc. Ven. trent.)
1882 Seconda aggiunta alla Flora Veneta. Venezia. (Atti R. Ist. Ven.)
1883 Contribuzione alla Flora Veneta. Venezia. (l. c.)

Bicchi Cesare (1822–1906)
1860 Aggiunta alla Flora lucchese. Lucca

Bocconi Paolo (1633–1703)
1671. Recherches et observations naturelles. Paris.
1674. Icones et descriptiones plant. Siciliae etc. Panormi
⊙ 1678. Suo Erbario in Genova. Cfr. Penzig sopra un Erbario di P. Boccone Massino (Malpighia)
⊙ 1676 Suo Erbario in Bologna. Cfr. Bertoloni Misc. bot. XVII. Bologna.
1697 Museo di piante rare della Sicilia etc. Venezia
1697 Museo di Fisica e Osservaz. naturali. Venezia.

35/0018-13

Boissier Edmond (1810–1885)
1839-45 Voyage botanique ~~en Espagne~~ dans le midi de l'Espagne. Paris. (Il viaggio fu eseguito nel 1837)

Bolzon Pio.
1898 Supplemento generale al Cat. delle piante vascolari del Veneto di R. de Visiani e P.A. Saccardo. Venezia (Atti R. Ist. Ven.)

Bonato Giuseppe Antonio (1753–1836)
1812 Catalogus plantarum Horti bot. Patavini: Patavii — 1820 Cat. alter.
1801 Catalogus plantarum Horti botanico-medici caes. reg. Academiae Patavinae. MS. dedicato all'Arciduca Giuseppe Antonio d'Austria (1776–1847), ora conservato nella biblioteca dell'Orto bot. di Padova.

Bonelli Giorgio (1724–1782) + Sabbati Liberato (1714–?), Martelli Niccolò (1735–1829) o Sabbati Costantino
1772 Hortus Romanus vol. I. Romae (auct. Bonelli et Sabbati L.) — 1774 vol. II (auct. Martelli et Sabbati L.) — 1775 vol. III (auct. iisd.) — 1776, vol. IV (auct. iisd.) — 1778 vol. V (auct. iisd.) — 1784 vol. VI (auct. Martelli et Cost. Sabbati) — 17... vol. VII (auct. iisd.) — 1793 vol. VIII (auct. iisd.)

Boreau Alexandre (1803–1875)
1857 Notice sur les plantes recueillies en Corse par M. Revelière. Paris — 1858 Notices II et III.

Borzì Antonino.
1885 Compendio della flora forestale italiana. Messina.
1891 Di alcune piante avventizie del Messinese (Malpighia)

Bozzi Luigi.
1888 Piante americane naturalizzate nei dintorni di Pavia. Milano (Atti soc. ital. di sc. naturali)

Briganti Vincenzo (1766–1836).
1816 Stirpium variorum Neapolitanarum Pemptas. Neapoli.

Brignoli de Brunnhoff Giovanni (1774–1857)

1810 Fasciculus variorum plantarum Forojuliensium. Urbini.

1836 Catalogus plantarum in Horto bot. Mutinensi cult. Mutinae

Briquet John

1891 Les Labiées des Alpes maritimes. I partie. Genève — 1893, II part. — 1895, III partie

1889 Fragmenta monographiae Labiatarum. Genevae.

1902 Les Centaurées des Alpes maritimes. Genève.

Brocchi Giov. Battista (1772–1826)

1811 Memoria mineralogica sulla valle di Fassa. Milano.

1817 Viaggio al Capo Circeo. Milano (Bibliot. italiana)

1822 Dell'aspetto della vegetazione nei contorni di Reggio Calabria. Milano (Bibliot. ital.)

1819 Osservazioni naturali negli Abruzzi. Milano (Bibl. ital.) — 1822 (Continuazione)
(fatte in alcune parti degli Apennini)

Burnat Emile. (Citato: Burnat I, II, III, IV)

1892 Flore des Alpes maritimes. Vol I Genève — 1896, vol. II — 1899 vol. III part. I — 1902 vol III part. II — 1906 vol. IV

Burnat E. et Gremli Auguste

1883 Catalogue raisonné des Hieracium des Alpes maritimes. Genève.

1886 Observations sur quelques Roses d'Italie. Bâle.

1879 Les Roses des Alpes maritimes. Genève — 1883 Supplément.

C. P. G. Vedi Casati, Passerini e Sibth. 5 35/0018-14

Calcara Pietro (1819–1854)
1847 Descrizione dell'isola di Lampedusa. Palermo.

Caldesi Lodovico (1822–1884)
1879. Florae faventinae tentamen. Florentiae (N. Giorn. bot. ital.)

Calzolari Francesco (1521–1600)
1566 Il viaggio di Monte Baldo. Venezia.

Capelli Carlo (1763–1831)
1821 Catalogus stirpium quae aluntur in R. Horto bot. Taurinensi. Taurini

Carual Teodoro (1830–1898)
1860 Prodromo della flora Toscana. Firenze. (–1870 Supplemento II. Firenze
1871 Statistica botanica della Toscana. Firenze. –1865 Supplemento I. Milano)

Castelli Pietro (1575–1656)
☉ 1640 Hortus Messanensis. Messanae. Cfr. Arrosto A. Enumerazione delle piante dell' Hortus Messanensis, per cura di L. Nicotra. Messina 1900.
☉ 1625. Exactiss. descriptio Hort. Farnesiani. Romae (sotto il nome di Tobia Aldini)

Cattolica (principe della) // Sec. XVIII. I, Giuseppe Romanno,
1733 Orto secco. Cfr. Baroni E. Illustrazione di un orto secco del Princ. della Cattolica Firenze 1896.
Celani E. Vedi Cibo.

Cesalpino Andrea (1519–1603)
1563. Suo Erbario in Firenze. Cfr. Carual, Illustratio in Hort. siccum Andreae Caesalpini. Florentiae 1858.
1583 De plantis. Florentiae – 1603 Appendix. Romae

Cesati Vincenzo (1806–1883)
1840 Stirpes italicae rariores iconib. illustr. Mediolani

1841. Saggio sulla Geografia Botanica e sulla Flora della Lombardia. Milano.
1873. Elenco delle piante dalle Majella e del Morrone. Torino

C.P.G.

Cesati Vinc., Passerini Giov. (1816-1873) e Gibelli Giuseppe (1831-1898) Stati anche:
1868-1901 Compendio della Flora Italiana. Milano — 1868 pp. 1-48 —
1869 pp. 49-120 — 1870 pp. 121-168 — 1871 pp. 169-208 — 1872 pp.
209-256 — 1874 pp. 257-328 — 1875 pp. 329-376 — 1876 pp. 377-416
— 1877 pp. 417-440 — 1878 pp. 441-464 — 1879 pp. 465-544 — 1880
pp. 545-592 — 1881 pp. 593-640 — 1882 pp. 641-712 — 1883 pp.
713-760 — 1884 pp. 761-784 — 1886 pp. 785-906 — 1901 Indice generale
e correzioni (Gibelli e Mottareli)
per cura di

Chabert Alfred
1899. Etude sur le genre Rhinanthus. Genève (Bull. Herb. Boiss.)
1900 Les Rhinanthus des Alpes maritimes. Genève (Mém. Herb. Boiss)
Chenevard Paul
1902 Contributions à la Flore du Tessin. Genève I — 1903, II-III — 1904, IV — 1905, V-VI
1906 Notes sur les Rosiers alpines (Memoria inserita tutte nel Bull. Herb. Boiss)
Chenevard Paul et Braun-Blanquet
1905 Contributions à la Flore du Tessin. Genève (annessio Cons. et Jard. bot. de Genève)
Chiovenda Emilio — Vedi anche Cibo.
1892 Sopra alcune piante rare o critiche della Flora romana. Roma (Annuario del R. Ist. bot. di Roma)
1895 Sopra alcune piante nuove per la Flora romana. Roma (Annuario del R. Ist. bot. di Roma)
1897 Piante nuove o rare da aggiungersi alla Flora Romana. Genova (Malpighia)

Cibo Ghinardo (1512 - 1600)
1552 Sec. I Erbario in Roma nella Bibliot. Angelica (ora descritto col titolo di Erbario A, in 1 volume) — 1550 c.
Sec. II Erbario B, in 4 volumi, seguito del precedente, appare nell'Angelica. Erbario A e Erbario B, in comunicato
(Questo Erbario B secondo le ricerche del prof. D. Tonì G.B. e Chiovenda fu per buona parte composto dal medico viterbese Francesco Petrollini, o verosimilmente portato poi a
Cibo erbario compimento dal medico Petrollini. Da questo e dal Penzig [illegible] la copia [illegible] sulla patavina di detto erbario e sulle date delle loro consegne (?) Il Penzig nella sua dotta memoria (N. III. V. sua nota) pella il merito di [illegible] tale [illegible] Simo Erbario. Ci si ho ascoltato la sua [illegible]

Cirillo Domenico (1739-1799)
1788. Plantarum rariorum Regni Neapolitani: Fasc. I Neapoli — 1792 Fasc. II.

(*) Ecco le pubblicazioni sull'argomento:
I (1902 Febb.) E. Celani. Sopra un Erbario di Ghinardo Cibo conservato nella R. Biblioteca Angelica di Roma. Genova (Atti d. Soc. Ligust. di Scien. nat. e geogr. etc.)
II (1903 Magg.) E. Chiovenda. A proposito dell'Erbario di Gh. Cibo. Roma (Ann. d. Botanica del prof. Pirotta)
III (1904) O. Penzig. Contribuzioni alla Storia della Botanica. I. Illustrazione degli Erbarii di Gh. Cibo. Genova
IV (1907 Giugno) E. Chiovenda. Nuovi studi su due antichi Erbarii della Biblioteca Angelica di Roma. Milano (Atti d. Congress. dei Naturalisti italiani del 1906, Sett.)
V (1907 Luglio) E. Celani e O. Penzig. Ancora sugli Erbarii conservati nella Biblioteca Angelica. Risposta al Dr. E. Chiovenda. Genova (Malpighia)
VI (1907 Ott.) G.B. De Toni. Spigolature aldrovandiane. VII Noterelle intorno ad un Erbario perduto del medico Franc. Petrollini (anteriore al 1583) ecc. Firenze (N. Giorn. bot. italiano)
VII (1908 Febb.) E. Chiovenda. Sugli Erbarii della Biblioteca Angelica di Roma. Replica. Roma (Annal. d. Bot. del prof. Pirotta)
VIII (1908 Giugno) E. Chiovenda. Ritorno all'autore dei due Erbarii anticheggianti che si conservano nella Biblioteca Angelica di Roma. Roma (Rendic. Acad. Lincei) [illegible] del Petrollini, però riconosce [illegible] piante, numerati nel catalogo del Petrollini seguito a Bologna.
IX (1908 Giugno) De Toni G.B. Le Lettere del medico Francesco Petrollini ad U. Aldrovandi e Filippo Tedosio. Padova

(E per questo che io cito tutte insieme con Petrollini e Cibo.

35/0018-15

6

Clarici Paolo Bartolomeo (1664–1724)
1727 Istoria e coltura delle piante. Venezia

Colla Luigi (1766–1848)
1833 Herbarium Pedemontanum. Taurini. vol. I — 1834, vol. II et III — 1835 vol. IV — 1836 vol. V et VI — 1837 vol. VII et VIII.

Colonna Fabio (1571–1640)
1592 Phytobasanos. Neapoli.
1606 Minus cognitarum stirpium Ecphrasis. Romae.

Comolli Giuseppe (1780–1849)
1824 Plantarum Lariensium enumerat. in Prodrom. Florae Comensis. Novo Com.
1834 Flora Comense. Como. vol. I — 1835, vol. II — 1836, vol. III — 1846, vol. IV — 1847, vol. V — 1848, vol. VI — 1857, vol. VII.

Cortuso Giacomo Antonio (1513–1603)
1591 L'Horto dei Semplici d. Padova. Venezia.

Coste H.
1901 Flore descriptive et illustrée de la France. Paris. vol. I — 1903 vol. II — 1906 vol. III.

Crepin François (1830 — 1...)
1882 à travers le pays des Dolomites. Bruxelles (Bull. Soc. bot. Belgiq.)
1891 Gen. Rosa in Lojacono Flora sicula vol. II.

Crescenzio ° de Crescenzi Pietro (1235–1320)
1471. Opus ruralium commodorum. Augustae.

Cruguola Gaetano
1894. La vegetazione del Gran Sasso d'Italia. Teramo.

Cupani Francesco (1657–1711)
1696. Hortus Catholicus. Neapoli — 1697 Supplementum
1713. Panphyton siculum. Panormi. (Attribuisco al solo Cupani anche un seguito di tavole che Antonio Bonanni sparciava indebitamente come opera sua)

Dalla Torre Giorgio (1607–1688)
1660 Catalogus plantarum Horti bot Patavini. Patavii.
1662 Idem novo incremento locupletior. Patavii.

Dalla Torre K. G. (von) e Sarnthein L. (von)
© 1906 Flora von Tirol, Vorarlberg, I Vol (Pteridophyten) Innsbruck
① 1900 Literatur der Flora von Tirol, Vorarlberg, Innsbruck. /de.

Debeaux Odon
1891 Note sur plantes méditerranées. Paris, I — 1894, II Note.

Del Riccio Agostino (sec. XVI)
1592 Il Calendario di Flora (Edito da O. Mattirolo, Firenze 1900)

De Notaris Giuseppe (1805–1877). Vedi anche Moris.
1844. Repertorium Florae Ligusticae. Taurini.

1887 Intorno ad alcuni alberi e frutici ragguardevoli esistenti nei giardini di Padova (Atti R. Accad. di Padova)

1846. Prospetto della Flora Ligustica. Genova.
1847. Index Seminum Horti bot. Genuensis. Genuae – 1848 Idem. Ibidem – 1858. Idem, Ibidem.
De Toni G. B. Vedi Aldovrandi e Cibo.
De Toni Ettore. Vedi Michiel e Rinio.

Donati Antonio (1606–1659)
1631. Trattato dei Semplici, Pietre e Pesci che nascono nel lito di Venetia. Venezia.
Erbario Messinese.
1651. Vedi Zodda. Illustrazione di un erbario messinese del Sec. XVII. Roma.
Duby Jean Etienne (1798–1886)
1828. Botanicon Gallicum. Parisiis. Vol. I – 1830. Vol. II.
Evers Georg
1896 Beiträge zur Flora des Trentino. Wien (Verh. der k.k. Zool.-bot. Gesell.)

Durante Castore (1529–1590)
1585. Herbario nuovo. Roma.
Duthie J. Fr.
1872 Notes on the Flora of Malta and Gozo. London. (Journ. of Botany)

Facchini Francesco (1788–1852)
1855. Zur Flora Tirols, Flora Tiroliae cisalpinae. Innsbruck – La data del MS. si aggira intorno 1850.

Farsetti Antonio Francesco (m. 1808)
1780 c. Catalogo (MS.) delle piante che esistono nella Villa di Sala (MS. nella Biblioteca dell'Orto Padovano)
1796. Elenco botanico del giardino di Sala per l'anno MDCCXCVI (Venezia?)
1798. Series plantarum quae studio et expensis A. F. Farsetti Salae modo coluntur. Patavii (Questi 3 cataloghi furono compilati sotto la direzione di Leonardo Sesler e Lor. Patarol)

Favre ~~Ernest~~ Émile
1875 Guide du Botaniste sur le Simplon. Aigle

35/0018-16

Ferrari Giov. Battista (1584–1655)
1633. Flora seu de florum cultura. Romae

Fiori Adriano, Paoletti Giulio, Béguinot Aug. (ed altri). Citati: Fiori I–IV.
1896 Flora analitica d'Italia, Padova. Vol. I pp. 1–256 — 1898 pp. 257–618 —
1900 Vol. II pp. 1–224 — 1901 pp. 225–304 — 1902 pp. 305–493 —
1903 vol. III pp. 1–272 — 1904 pp. 273–524 — 1907 Appendice.
Fiori Adriano, Pampanini Renato e Béguinot Aug.
1905 Flora italica exsiccata. Florentiae Cent. I et II — 1906. Cent. III–V.

Fiorini-Mazzanti Elisabetta (1799–1879).
1823 Notizie di piante da aggiungersi al Prodr. Florae Romanae di Sebastiani e Mauri. Roma (Giorn. Arcad. XVIII)
1828 Appendice al Prodr. Florae Romanae. Pisa (N. Giorn. letterati di Pisa)
Foucaud Julien
→ qui
Foucaud Julien e Simon Eugène
1898 Trois semaines d'herborisation en Corse. La Rochelle.
1900 Additions à la flore de Corse (Bull. Soc. bot. France)

Franzoni Alberto (1816–1886)
1890. Le piante fanerogame della Svizzera Insubrica. Zurigo.
Franciosi Angelo (1759–1828)
1805 Cento fiori colti nel loro mese e tratti in pittura, (MS.) Fasc. I — 1805–6, fasc. II — 1806, fasc. III–V —
1807–8 fasc. VI — 1808–9 fasc. VII — 1809–10 fasc. VIII — 1811–13 fasc. IX — 1813–14 fasc. X
— 1815–22 fasc. XI. MS di tav. col. 1126 — Cfr. Saccardo, La Iconograf. bot. dell' Ab. A. Franciosi Padova 1902.
Freyn Joseph (1845–1903)
1877. Flora von Süd Istrien. Wien — 1881 Nachträge. Wien.
1879. Flora des Monte Maggiore. Wien.

Gasparrini Guglielmo (1804–1866)
(3) 1842 Trifolii ornithopodioidis adumbratio. Neapoli (Rendic. R. Acad. Napoli) pp. 408–409
(1) 1833 Notizie intorno alcune piante della Lucania. Napoli (Il Progresso IV)

8

di Napoli.

② 1837. Descrizione delle Isole Tremiti. Napoli (Annali civili)

④ 1842. Nonnullarum plantarum rariorum descriptio. Neapoli (Rendic. R. Acad. di Napoli, pp. 49-51)

1845 Descrizione di una nuova specie di Felce. Napoli (Rendic. pp 107-108)

Gaudin Gio. Francesco (1766-1833)

1811 Agrostologia helvetica. Genevae.

1828 Flora helvetica vol. I-III. Turici — 1829 vol. IV-V — 1830 vol. VI — 1833, vol. VIII.

Gelmi Enrico (1855—1901) (1900 Nuove aggiunte. Firenze l.c.

③ 1893. Prospetto della Flora Trentina. Trento — 1898 Aggiunte. Firenze (N. Giorn. bot. it.)

① 1886. Le Rose del Trentino. Trento.

② 1891. Prospetto delle piante crittogame vascolari del Trentino. Firenze (N. Giorn. bot. it.)

Gennari Patrizio (1820-1897)

1852. Centuria plant. Repertorio Fl. Ligust. addendarum. Taurini. Cent. I

1857 Centuria III.

1856. Cryptogamae vasculares Ligusticae. Taurini (Mem. R. Acad. Tor. 1859)

1861 Nuove specie del gen. Isoetes — Genova (Comm. Soc. crittog. ital.)

1861. Rivista delle Isoetee della Flora italiana — Genova (l.c.)

1866. Specie e varietà da aggiungersi alla Flora Sarda. Cagliari

1869. Isoetografia italiana. Cagliari.

1870. Florula di Caprera. Firenze.

Giani Nicola (1768-1830)

1817 Catalogo dei vegetabili che attualm. esistono nell' Orto bot. e agrario del r. Liceo di Treviso. Ivi.

Gibelli Giuseppe (1831-1898) e Pirotta Romualdo

1882. Flora del Modenese e Reggiano. Modena — 1884 Primo Supplem.

Gilii Filippo Luigi (1756-1821)

⊙ 1794. Enumeratio plantarum Horti Vaticano-indici et Herbarium Vaticanum Gilii — Cfr. G. Lais in Atti Acad. Pont. N. Linc. Roma 1879.

① 1789. Osservazioni fitologiche sopra alcune piante esotiche introdotte in Roma. Ivi (In collab. col padre Gasp. Xuarez)

35/0018-17

Ginanni Francesco (1716–1766)
1774. Istoria civile e naturale delle pinete di Ravenna. Roma.

Ginanni Giuseppe (1692–1753)
1755 Opere postume Venezia, vol. I

Goiran Agostino.
1875 Specimen morphographiae vegetabilis. Veronae. (In coll. coh. Dal Fabbro)
1874 Plantae vasculares Veronenses. Veronae.
1880 Appunti botanici. Verona
1880 Note di fitografia. Firenze (N. G. B. ital.)
1882 Prodromus florae Veronensis. Florentiae (N. Giorn. bot. ital.) Pteridoph., Gymnosp., Loranth. – 1883 Orchid. – 1884 Dioscor., Amaryll., Liliac. – 1885 Asparag., Colchic. – 1886 Juncac., Arac., Lemn., Typhac.
1891–1893 Erborizzazioni estive e autunnali attraverso i Monti Lessini. Firenze (Bull. Soc. bot. ital.) N. 1–799.
1897 Flora Veronensis. Veronae, Vol. I – 1904 vol. II.
1890 Di una nuova stazione ital. di Galeisoga parvifl., Eleusine indica ed altre piante esotiche. Firenze (Bull. Soc. bot. ital.)

1907 Pteridophytae agri Veronensis. Milano
Gortani Luigi e Michele
1905 Flora Friulana. Udine, Vol. I – 1906, vol. II.

Grech-Delicata Giov. Carlo (1811–1882)
1853 Flora Melitensis. Melitae.

Grenier Charles (1808–1875) e Godron Dom. Alexandre (1807–1880)
1848. Flore de France. Paris, vol. I – 1850, vol. II – 1855–56, vol. III.

35/0018-18

Groves Enrico (1835 — 1891)
1877. Contribuzione alla flora d' Otranto. Firenze (N. Giorn. bot. ital.)
1880. Flora di Sirente. Firenze (l. c.)
1887 Flora delle coste della terra d' Otranto. Firenze. (l. c.)

Guilandino Melchiorre (1520 — 1589)
1600. Catalogus plantarum in Horto Patavino et Conjectanea synonymica, publicante J. G. Schenkio. Francofurti.

Gussone Giovanni (1787 — 1866)
1821. Catalogus plantarum Horti in Boccadifalco. Neapoli.
1825. Index seminum Horti in Boccadifalco — 1828 Altera editio.
1826. Plantae rariores. Neapoli.
1827. Florae Siculae prodromus Neapoli. Vol. I — 1828, vol. II.
1832. Supplementum ad Fl. Siculae prodr. Neap. fasc. I — 1843, fasc. II.
1842. Florae Siculae Synopsis. Neapoli, Vol. I — 1844, vol. II.
1854. Enumeratio plantarum vascularium in insula Inarime. Neapoli.

Haekel Eduard
1882 Monographia Festucarum europaearum. Cassel.

Hacquet Balthasar (m. 1815)
1782. Plantae alpinae Carniolicae. Viennae

Hallier-Wohlfart ed altri
1890 Koch's Synopsis. Vol I pp. 1-320 — 1891 pp. 321-998 — Vol. II 1892 pp. 999-1270 — 1895 pp. 1271-1590 — 1901 pp. 1591-1990 — vol. III. 1902 pp. 1991-2070 — 1903 pp. 2071-2230 — 1904 pp. 2231-2390 — 1905 pp. 2391-2550 — 1906 pp. 2551-2710 — 1907 pp. 2711-3094

Hausmann Francesco (1810 — 1878)
1851 Flora von Tirol. Innsbruck vol. I pp. 1-576 — 1852 vol. II, pp. 577-1084 — 1854, vol. III pp. 1085-1640.

Host Nik. Thom. (1761 — 1834)
1797 Synopsis plantarum Austriacarum. Vindobonae
1827 Flora austriaca. Viennae. Vol. I — 1831, Vol. II.

Imperato Ferrante (1550–1625)
1599 Dell' historia naturale. Napoli (La II ed., 1672, illustra le stesse piante)

Ingegnatti Annibale
1877. Catalogo delle principali piante che cresc. nel circond. di Mondovì. Ivi.

Jan Giorgio (1791–1866)
1826. Elenchus plantarum. Parmae — 1831 Addenda et supplem. Parmae.
Keller Robert
1903 Vegetationsbilder aus der Val Blenio. Genève (Bull. Herb. Boiss.)

Kerner de Marilaun Anton (1831–1898)
1870–71 Novae plantarum species Tiroliae, Venetiae etc. Innsbruck
1881–1896 Schedae ad Floram exsicc. Austro-Hungaricam. Vindobonae. Nr. 1–2800

Koch Daniel W. (1771–1849) — Vedi anche Hallier-Wohlfarth.
1843 Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Francofurti.
Kralik Gio. Luig. (1813–1892)
1850 c. Plantae Corsicae exsiccatae.
Lanfossi Paolo (1798–1864)
1825 Saggio di storia naturale dei contorni di Mantova. Pavia (Giornale di Brugnatelli)
Latini Gio. Maria (Sec. XVIII)
1756 Suo Erbario presso l'Orto botanico di Palermo. Cfr. G. E. Matteo, Un altro Erbario dell'Orto Cattolico. Palermo 1906.
Levier Emilio
1884 Les Tulipes d'Europe. Neuchâtel (Bull. Soc. Sc. nat.)
1884 L'origine des Tulipes de la Savoie e de l'Italie. Turin (Archiv. italiens de Biologie)

35/0018-19

L' Obel o Lobelius Matthias (1538-1616)
1576. Plantarum seu stirpium historia et Adversariorum volumen. Antwerpiae.

Loiseleur - Deslongchamps J. L. Aug. (1774-1849)
1806. Flora Gallica. Lutetiae - 1828, Edit. II. vol. I e II.
1810. Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France. Paris.
1827. Nouvelle notice sur les plantes etc. Paris.

Lojacono - Pojero Michele
1878 Monografia dei Trifogli di Sicilia. Palermo.
1878. Le isole Eolie. Palermo.
1881. Osservazioni sulle Linarie del gruppo Elatinoides. Palermo.
1883. Criterî sui caratteri delle Orobanche. Palermo.
1884. Un escursione botanica a Lampedusa. Palermo.
1889. Flora Sicula. Palermo, vol. I - 1891, vol. II - 1902, vol. III -
1907, vol IV (Corollifl., Monochl., Gymn.) (Polypet. Thalamifl.) (Polyp. Calycifl.) (Gamopet. Calycifl.)

Loss Giuseppe (1831-1880)
1872 L' Anaunia (m. giorn. "Voce cattolica")

Mabille Paul
1867. Recherches sur les plantes de la Corse. Paris, Fasc. I - 1869, Fasc. II.

Maly Joseph Karl (1797-1866)
1848 Enumeratio plantar. phan. imperii Austriaci. Vindobonae.

Maratti o Maratta Francesco (m. 1777)
1822. Flora Romana. Romae - Scritta intorno 1772, ma pubblicata postuma nel 1822.

Marchesetti Carlo
1882. Florula del Campo Marzio di Trieste. Ivi.
1896. Flora di Trieste e de' suoi dintorni. Trieste.

Marcucci Emilio (1837–1890)
1866 Unio itineraria: Cryptogamae exsicc. Sardiniae.

Mari Girolamo.
1898 Catalogo d'un Erbario alpino. Viterbo.

Marsili Giovanni (1727–1795)
1771 Notizie del pubblico Giardino dei Semplici. Padova 1840 (postumo)

Marsilly L. J. A. de Commines, de, (1811–1890)
1872 Catalogue des plantes vasculaires de la Corse. Paris.

Martelli Niccolò – Vedi Bonelli

(botanici figurati e gli antichi erbari di Zannichelli, Martini, agosti Venezia 1904 (Atti R. Ist. Ven.)

Saccardo I codici ecc. 1904

Martini Bartolameo (1676 – 1720)
1701 Erbario generale vol. I – 1702 vol. II – 1703 vol. III – 1704 vol. IV e app. Cfr.
1707 Catalogus plantarum Montis Baldi. Veronae
1707. Tomus plantarum (exsicc.) Montis Baldi. In oppido S. Bonifacii
Erbario corrispondente al detto Catal. a stampa ed esistente nell' Istituto bot. di Padova. Cfr Saccardo I codici bot. figurati e gli erbarî ecc. Veneg. 1904.

Massara Giuseppe Filippo (1792–1839)
1834. Prodromo della flora Valtellinese. Londra

Marzari – Pencati Giuseppe (1779–1836)
1802 Elenco delle piante del territorio di Vicenza. Milano.

Mattei G. E. Vedi Latini.

35/0018-20

Matthioli Petrus Andreas (1500–1577)

1554. I discorsi nei sei libri della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo. Venezia – 1558, Venetiis – 1562 Prag – 1565, Venetiis – Cfr. Sternberg, Catalogus plantarum ad septem variis editionis Commentariorum Matthioli. Pragae, 1821

1571. Compendium de plantis. Venetiis. Cf. Franciscus Calceolarius, pharmacopaeus auctor

Matthiolo v. Vid. Aldrovandi U.

Mauri Ernesto (1791–1836)

1820. Romanarum plantarum Centuria XIII. Romae.

Mazzini David.

1882 I lavoripem. di Genova. Genova (Ricord. Soc. Ligust. Chal Alpina)

Maggiuato Giovanni (1787–1814)

1807. Sopra alcune specie di frumenti. Padova.

1811. Viaggio botanico alle Alpi Giulie. Udina

Menzel Christian (1622–1701)

1682 Pugillus plantarum rariorum. Berolini (Il calce all'opera: Index plantarum multilingue)

Micheli Pietro Antonio (1679–1737)

1723. Micheli apud Tilli. Cfr.

1729. Nova plantarum genera. Florentiae.

1748 Catalogus plantarum Horti Florentini (1735), cura J. Targioni-Tozzetti. Florentiae Compostо nel 1735; detto postumo nel 1748.

Michiel Pietro Antonio (1510–1561)

1553 (1565 (2)). Erbario e storia generale delle piante. Cod. (in 5 vol. in 1028 tav.) conservato nella Marciana di Venezia; di cui il Prof. Ett. di Tor. trasse un estratto ma non pubblicato (**)

Milde Julius (1824–1871)

1865. Die höheren Sporenpflanzen. Leipzig.

1867. Filices Europae et Atlantidis. Lipsiae.

(2) Scrive un inciso: "il titolo [illegible] di P.A. Michiel ad U. Aldrovandi in data 11 ott. 1557 e 10 aprile 1558 e provato che il Codice erbario Michiel non già [illegible] lavoro nel 1553. Cfr. [illegible] Guido de Toni, Contributo alla conoscenza delle relazioni del patrizio P.A. Michiel con U. Aldrovandi. Modena 1908, p. 21 e 25. E perciò [illegible] Michieliano l'opera [illegible] (supplemento?) di 1553–1565.

(**) Il ch. prof. Ettore De Toni deplora che non trovi modo di pubblicare per le stampe l'intero commento; io devo alla luce però un giusto attestato di lode per l'utilissimo contributo alla conoscenza dell'opera Michieliana, dei tempi, tra gli studiosi, contributo di cui mi sono valso per le efficaci citazioni nel mio lavoro. Quali mi servii per le efficaci citazioni nel mio lavoro: Quest.

Contributo sopra:

1. All'Ill.re Aldrovandi e Pietro Antonio Michiel. Imola 1907 [È l'illustrazione delle piante [illegible] che il Michiel alle dotò all'Aldrovandi per il suo Codice erbario o a cui cito il giudizio]

2. Notizie su Pietro Antonio Michiel e sul suo codice erbario. Venezia 1908 [Contiene i giudizi botanici sul Michiel; i nomi dei suoi corrispondenti; la lunga lista degli autori da poterne di piante, compilata dallo stesso Michiel; l'indice dei luoghi ricordati da questo nel codice; l'enumerazione delle piante figurate dal Michiel prima o più completamente di altri botanici; l'albero genealogico della famiglia Michiel – I tutti questi capitoli sono estratamente di Cicilati. Dal di Toni]

3. Il codice erbario P. A. Michiel: introduzione e libro azzurro. Roma 1908 [Dopo una dotta e critica introduzione [illegible] il libro illustrato da Michiel [illegible] la descrizione delle piante figurate nel libro azzurro, con chiarimenti del De Toni. Come è noto, i 5 libri del codice Michieliano, a seconda del colore dei contorni, si distinguono in libri di: Azzurro, Giallo, Rosso I, Rosso II – Verde]

Minio Michelangelo. Vedi anche Patarol
1905 Erborazioni nel bacino medio del Natisone. Firenze.

Moggridge John Traherne (1842–1874).
1864–1869. Contribution to the flora of Mentone etc. London.

Monti Giuseppe (1682–1760).
1719. Catalogi stirpium agri Bononiensis prodromus, gramina et hujusmodi affinia complectens. Bononiae — Il Bertoloni nella sua flora italica ne identificò tutte le specie sugli esempl. originali esistenti nell'Orto bot. di Bologna.

Moreni Giulio (m. circa 1770).
1750 circa Suo Erbario esistente in Verona presso l'Accad. di Agricoltura. Vi hanno molte determinaz. di Seguier e Pontedera. Molte specie poi furono identificate poi dal Pollini nella sua "flora Veronensis".

Moretti Giuseppe (1782–1853).
1815. Notizie sopra diverse piante da aggiungersi alla Flora Vicentina. Pavia (Giorn. di Brugnatelli)
(2) 1820. Memorie ed osservazioni etc. Pavia (Ricompajono anche le piante enumerate nella nota precedente)
(1) 1818. Osservazioni sopra diverse piante d'Italia. Milano (Bibliot. ital.)
1822–1825. De quibusdam plantis Italiae. Decas I–VII. Papiae (Giorn. Brugn.)
1823. Tentamen illustrationis generis Saxifragae. Papiae
1826. Il Botanico italiano. I–III. Pavia.

12 35/0018-21

Moricand Stefano (1780–1854)
1820 Flora Veneta (Phanerogamia). Genevae.

Moris Giacinto Giuseppe (1796–1869)
1827. Stirpium Sardoarum fasc. I, Carali – 1828. Fasc. II – 1829. Fasc. III.
1837 Flora Sardoa, Taurini, vol. I – 1840-43, Vol. II – 1858–1859, Vol. III.
1841 (Specie nuove di piante di Sardegna) (Atti III Riun. Scienz. ital. Firenze)
1857 Diagnoses Stirpium Sardiniae novarum. Taurini.

Moris Gius. Giac. e De Notaris Gius.
1839 Florula Caprariae. Taurini.

Naccari Fortunato Luigi (1793–1860)
1824. Aggiunte alla Flora Veneta. Bologna.
1826. Flora Veneta. Venezia, Vol. I e II – 1827, Vol. III–IV – 1828, Vol. V–VI.

Nocca Domenico (1758–1841)
→ qui

Nocca Domenico (1758–1841) et Balbis Giov. Batta (1765–1831)
1816 Flora Ticinensis. Ticini, Vol. I – 1821, Vol. II.
– 1803 Synopsis plantarum horti botanici ticinensis. Papiae

Nyman Carl. F. (1820–1893)
2 (1878 Conspectus Florae Europ. Örebro, Fasc. I pp. 1–240 – 1879. Fasc. II pp. 241–493 – 1881, Fasc. III pp. 494–677
– 1882 Fasc. IV pp. 678–858 – 1883 Suppl. I Acotyl. vasc. et Index – 1889–1890 Suppl. II.
1 (1854–1855. Sylloge Florae Europaeae. Örebro

Ortini Antonio (1788–1870)
1830 Catal. delle piante dell' Abruzzo Roma (in Opusc. scelt. del Cappello)

Parlatore Filippo (1816–1877)

1838 Rariorum plantarum Siciliae Fasc. I Panormi — 1840, Fasc. II.

1839 Flora Panormitana. Panormi.

1841 Observations sur quelques plantes d'Italie. Paris (Ann. Sc. nat.)

1842 Plantae novae v. minus notae. Parisiis.

1844 Monografia della Fumaria. Firenze (Giorn. bot. it.)

1845 Flora Palermitana, Vol. I. Firenze (Giorn. bot. it.)

1848 Flora Italiana. Firenze. Vol. I pp. 1–96 — 1850 pp. 97–568 —
1852, Vol. II, pp. 1–220 — 1857 pp. 221–638 — 1858 Vol. III pp. 1–166
— 1860 pp. 161–690 — 1868 Vol. IV pp. 1–288 — 1869 pp. 289–fine
— 1872 Vol. V pp. 1–319 — 1875 pp. 320–671 — 1884 Vol. VI pp. 1–336
— 1885 pp. 337–656 — 1886 pp. 657–971 — 1887 Vol. VII pp. 1–256
— 1893 pp. 257–fine — 1888 Vol. VIII pp. 1–176 — 1889 pp. 177–fine
— 1890 Vol. IX pp. 1–272 — 1892 pp. 273–624 — 1893 pp. 625–fine
— 1894 Vol. X

1856 Nuovi generi e specie di piante monocotiledoni. Firenze.

Pascal Diego (1768–1812)

1798 Elenchus plantarum horti regii botanici parmensis. Parmae

Pasquale Giuseppe Antonio (1820–1893)

1868 Nota su di alcune piante naturalizzate nelle provincie di Napoli. Tor.
(Atti Acad. Pontaniana).

1869 Flora Vesuviana. Napoli.

1867 Catalogo del Real Orto botanico di Napoli. Napoli.

Passerini Giovanni (1816–1893)

1846 Flora Italiae superioris. Thalamiflorae. Mediolani.

1852 Flora dei contorni di Parma. Parmae

Patarol Lorenzo (1614–1727)

1717 Suo Erbario in Venezia. Cfr. Minio M., Sulle Erbario di L. P. Padova 1905

1719 Agrostographia (Graminac. exsiccatae). Cfr. Minio M. l.c.

Payot Venance
Florule du Mont Blanc. Paris 13

Penzig Ottone. Cfr anche Bottone e Cibo.
1897 Florae Ligusticae Synopsis. Genuae
1889 Piante nuove o rare trovate in Liguria. Genova (Malpighia)
1904 Contribuzioni alla storia delle botaniche. Milano.

Petagna Vincenzo (1734–1810)
1785 Institutiones botanicae. Neapoli, Vol. I — 1787, Vol. II–V.

Petit E. medico in Copenhagen
1884 Additamenta catalogi plantarum Corsicae edito a de Marsilly. Copenhagen.
Petrollini Francesco. Vedi Cibo.

Piccioli Antonio (1794–1842)
1829 Catalogus plantarum Horti botanici florentini. Florentiae.
1841 Catalogo delle piante esistenti nell' i. r. Giardino d. Boboli. Firenze.

Pirona Giulio Andrea (1822–1895)
1855 Florae Forojulensis Sylloge. Utini.
Pirotta Romualdo — Vedi Gibelli e Sabbati.

Pollini Ciro (1782–1833)
1812. Catalogus plantarum Horti botanici Veronensis. Veronae — 1814 Edit. alt.
1816. Horti et provinciae Veronensis plantae novae. Ticini.
1816. Viaggio al Lago di Garda e al Monte Baldo. Verona.
1817. Sulle alghe viventi nelle terme Euganee, con indice delle piante Euganee. Milano.
1822 Flora Veronensis. Veronae, Vol. I et II — 1824, Vol. III.

Pona Giovanni (1565–1630)

1595. Plantae seu Simplicia quae in Baldo Monte reperiuntur. Veronae.

1617 Monte Baldo descritto (ed. II, accresciuta, della prec. ?) Venezia.

Pontedera Giulio (1688–1757)

1718. Compendium tabularum botanicarum. Patavii.

1720. Anthologia sive de floris natura. Patavii.

Porta Pietro

1879. Viaggio botanico intrapreso da Huter, Porta e Rigo in Calabria nel 1877 (Nuovo Giorn. bot. Ital.)

Pospichal Eduard (1838.–1905)

1897 Flora des oesterreich. Kuestenland. Leipzig, Vol. I – 1898 vol. II parte I – 1899, Vol. II parte II.

Presl Karl Bor. (1794–1852)

1818 Gramineae Siculae. Pragae.

1826. Flora Sicula. Pragae.

1820. Cyperaceae et Graminaceae Siculae. Pragae

1822 Deliciae Pragenses. Pragae.

Puccinelli Benedetto (1808–1850)

1842 Synopsis plantarum in agro Lucensi sponte nascent. Lucae, Parte I. – 1852 Parte II.

1844 Additamenta ad Synopsis plantar. in agro Lucens. Firenze (Giorn. botan. ital.)

Rabenhorst Ludwig (1806–1881)

1849 Vorläufiger bot. Bericht über eine Reise durch die östl. und südlich. Prov. Italiens. Regensburg (Flora)

35/0018-23

Rafinesque-Schmaltz Cost. Sam. (1783–1840)
1810 Caratteri di alcuni nuovi generi e specie di Sicilia Palermo
1814 Précis des decouvertes botaniques et zoologiques Palermo.
1814 } Specchio delle Scienze. Palermo.

Ray John (1628–1705)
1694. Stirpes Europaeae extra Britannias etc. Londini (Il viaggio botanico fu in Italia fu fatto dal Ray nel 1664)

Re Gio Francesco (1772–1833).
1805. Flora Segusiensis. Taurini.
1821. Ad Floram Pedemontanam Appendix I Taur. – 1824 Appendix alt.
1825. Flora Torinese. Torino.

Reboul Eugenio (1781–1851)
1822. Nonnullarum spec. Tuliparum in agro Florentino etc. Florentiae.
1823. Appendix.
1838. Selecta specierum Tuliparum synonyma. Florentiae.

Reichenbach L. (1793–1879)
1830 Flora Germanica excursoria Lipsiae p. 1–434 – 1832 p. 435 ad finem.

Requien Esprit (1788–1851)
1825 Observations sur quelques plantes rares ou nouvelles de la Flore Franc. Paris (Ann. des Sc. natur.)

Rigo Gregorio
1877. Relazione del viaggio eseguito da Porta e Rigo nelle provincie meridionali d'Italia fino a tutto il 10 Agosto 1875 (Nuovo Giorn. bot. Italiano)

Rinio Benedetto (Sec. XV).
1415–1430 c. Liber de simplicibus (Codice nella Marciana di Venezia, di cui il prof. Ett. de Toni scrisse un esteso Comento, non ancor pubblicato. Cfr. Saccardo La Bot. in Italia I, p. 138. Debbo alla cortesia del chiaro professore il catalogo delle piante Riniane ~~interpretate ed elencate~~ coi loro sinonimi moderni; dei quali ho qui fatto uso. ms.

Risso J. A. (1777—1845)
1844 Flore de Nice. Nice.

Rodegher Emilio e Venanzi Giuseppe.
1893 Piante nuove pel Catalogo del Dott. Rota. Firenze
1894. Prospetto della Flora della prov. di Bergamo. Treviglio.

Rodati Luigi (1762—1832)
1802 Index plantarum quae extant in horto publ. Bononiensi. Bononiae

Romano Gerolamo (1765—1841)
1821. Notizie sopra diverse piante da aggiung. alla Flora Vicentina. Padova (Giorn. delli Ital. Letterature)
1823 Le piante fanerogame Euganee, Padova — 1828 Edz. II — 1831, Edz. III.

1821

Rossi Stefano (1851—1898)
1884. Le piante acotiled. vascol. e gramin. Ossolane. Domodossola.
1890 Nuove piante trovate in Val d'Ossola. Roma (Atti Ac. pont. Linc.)
1883 Studi sulla flora Ossolana. Domodossola.

Rota Lorenzo (1819—1885)
1853. Prospetto delle Flore Bergamasca (della provincia Cat.). Bergamo.
1852. Prospetto delle piante fanerogame finora ritrovate nella prov. Pavese. Firenze

Rouy Georges, Foucaud Julien, Camus Gustave Ed.
1893 Flore de France. Tours, Vol. I — 1895, Vol. II — 1896, Vol. III — 1897, Vol. IV — 1899, Vol. V — 1900, Vol. VI — 1901, Vol. VII — 1903, Vol. VIII.

Ruchinger Giuseppe (1804—1855)
1818 Flora dei lidi Veneti. Venezia

35/0018-24

Sabbati Liberato (n. 1714 — ?) Vedi anche Bonelli. 1738 Erbario detto "Deliciae" — 1737 Erbario detto "Hortulus" — 1731. Erbario detto "Innesto" — 1747-1752 Erbario detto "Collectio" — 1756-1776 Erbario detto "Theatrum botanicum romanum" — Cfr. Pirotta e Chiovenda Di alcuni erbari antichi romani. Genova 1902.

1745 Synopsis plantarum quae in solo Romano luxuriantur. Ferrariae. (Le specie qui enumerate sono state identificate sugli erbari dell'autore ora citati (Innesto, Hortulus, Deliciae) per opera del Pirotta e Chiovenda)

Sauardo Pier Andrea

1864 Prospetto della Flora Trivigiana. Venezia (atti del R. Istituto Veneto)

1867 Breve illustrazione delle Crittogame vascol. della prov. di Treviso (e del Veneto) Venezia (Comment. della Flora, Fauna e Gea del Venet. e Trentino)

1869 Catalogo delle piante vascolari del Veneto (in collab. col prof. R. de Visiani (Atti del R. Istituto Veneto) — 1898 Supplemento, vedi Bolzon.

1880 Aggiunte alla Flora Trivigiana (in collab. con G. Bizzozero). Venezia (atti del R. Ist. Veneto)

1891 Addenda ad Floram italicam (Malpighia, vol. V) Genova

Saint-Lager

1883 Catalogue des plantes vasculaires de la Flore du bass. du Rhone à Lyon.

Salis-Marschlins Ulysses (1795-1886)

1833 Aufzählung der in Korsika Cotyled. Pflanzen. Regensburg (Flora) — (Filic. - Monocotyled.) 1834 (Dicotyledones) l. c.

Sandi Alessandro Fr. (1794-1849)

1837. Enumeratio stirpium ~~Bellunen~~ phanerogam. agri Bellunensis. Belluni

Sanguinetti Pietro (1802-1868)

1837 Centuriae tres Prodromo Fl. Romanae addendae. Romae.

1852-67. Florae Romanae Prodromus alter Romae — 1852: pg 1-104 — 1853: pg. 105-196 — 1855-56: pg. 197-381 — 1857: pg. 382-460 — 1858: pg. 461-516 — 1859: pg. 517-564 — 1862: pg. 565-693 — 1864: pg 694-796 — 1865: pg. 797-849 — 1867 pg. 850 alla fine

Sartorelli Giov. Battista (1780-1853)

1816 Degli alberi indigeni nell'Italia superiore. Milano.

Sauvaigo Emile

1899. Enumeration des plantes cultivées dans les jardins de la Provence et de la Ligurie. Nice.

Sauter Ferdinand

1899 Funde seltener Phanerogamen in Ost- und MittelTirol. Wien (Oest. bot. Zeitschr.)

Savi Gaetano (1769–1844)

1795. (Spec. nove) in Santi, Viaggio al Montamiata. Pisa, Vol. I — 1798 Vol. II — 1806, Vol. III

1798. Flora Pisana. Pisa Vol. I e II.

1801. Trattato degli alberi della Toscana. Pisa — 1811 Ed. II. Firenze.

1804. Due Centurie della Flora Etrusca. Pisa.

1808. Botanicon etruscum. Pisij. Vol. I — 1815 Vol. II — 1818, Vol. III 1825 Vol. IV.

1810. Observationes in varias Trifoliorum species. Florentiae.

1816. Osservazioni sopra diverse piante. Pisa.

1818. Flora Italiana (dei giardini), Pisa, Vol. I — 1822 Vol. II — 1824, Vol. III.

1827. Pugillo di piante da aggiungersi al Botanicon etruscum. Pisa.

1832. Cose botaniche. Pisa.

1822 Sopra i generi Phaseolus e Dolichos. Pisa.

Scheuchzer Johan (1684–1738).

1719 Agrostographia. Tigori.

Schouw Joh. Fred. (1787–1852).

1824. Prospetto d'una descrizione geografica delle piante d'Italia Pavia (Giorn. di Brugnatelli)

1845 Distribution des arbres en Italie. Paris (Ann. Sc. natur.)

16

35/0018-25

Scopoli Gio. Antonio (1723 – 1788)
1760. Flora Carniolica. Viennae – 1772 Editio II.
1786 Deliciae florae et Faunae Insubricae. Ticini, Pars I – 1787, Pars II – 1788 Pars III.

Sebastiani Antonio (1782 – 1821)
1813 Romanarum plantarum fasc. I. Romae – 1815 Fasciculus alter.

Sebastiani Antonio e Mauri Ernesto. Vedi Mauri
1818 Florae Romanae Prodromus. Romae.

Séguier Jean François (1703 – 1784)
1745 Plantae Veronenses. Veronae, I et II Vol. – 1754, Vol. III (Suppl.)
Simi Emilio (1820 – 1875)
1851 Flora Alpium Versiliensium Massae.

Smith Anna Maria
1878. Flora von Fiume. Wien
Sommier Stefano. (Di parecchie ~~note~~ lavori di lui è fatta ai suoi luoghi la citazione) ~~del titolo ecc. del [illegible]~~
1898. Aggiunte alla Florula di Capraja. Firenze (Nuovo Giorn. bot. ital.)
1904. Della introduzione fortuita di piante esotiche ecc. Firenze (Bull. della Soc. bot. ital.)
1903 La flora dell'Arcipelago Toscano. Firenze (Nuovo Giorn. bot. ital.)
Soleirol Joseph-François (1781 – 1863)
1825 Plantes de Corse (Exsiccatae)
Solla Ruggero F.
1885 Phytobiologische Beobachtung auf einer bot. Excursion nach Lampedusa und Linosa. Wien (Zool. bot. Gesell. Verhandl.)
1895 Alcune notizie sulla flora della Calabria. Firenze (Nuovo G. B. ital.)
Spadoni Paolo (1764 – 1826)
1826 Xilologia picena. Macerata, Vol. I – 1827, Vol. II – 1828, Vol. III.

Spigno (marchese di) princ. del Sec. XIX
1812 Le Jardin de St. Sebastien. Turin. – 1818 Ed. alt. – 1823 Supplément.

Sprengel Kurt? (1756–1833)
1813. Plantarum minus cognitarum fasc. I Halae – 1815 fasc. II.

Steininger Hans
1887 Beschreibung der europäisch. Art. des genus Pedicularis Cassel (Bot. Centralbl.)

Sternberg Kaspar (1761–1838)
1804. Botanische Ausflüge in die rhetischen Alpen. Regensburg
1806. Reise in die rhetischen Alpen. Nürnberg.
Suffren Palamede (princ. del sec. XIX)
1802 Principes de Botanique. – Suivis d'un Catalogue des plantes di Frioul et de la Carnia. Venise (Le escursioni botaniche furono fatte nel 1797–1799)

Sterneck Jakob, v.
1901. Monographie der Gattung Alectorolophus. Wien (Abh. zool. bot. Gesellsch.)
Strobl Gabriel
1880–88 Flora des Etna. Wien (Oesterr. bot. Zeitschrift)
1878–88 Flora der Nebroden. Regensburg (Flora)
1903 Die Dialypetalen der Nebroden Siziliens. Wien. (Verh. d. k. k. zool. bot. Gesell.)
Targioni-Tozzetti Antonio (1785–1856)
1853 Cenni storici sulla introduzione di varie piante nell'agricoltura ed orticoltura. Firenze – 1896, Ediz. II.
Tassi Flaminio. Vedi Bartalini

Tenore Michele (1780–1861)
1811 Flora Napolitana. Prodromus Florae Neapol. pp. I–LVIII – Ejusd. Supplem. I pp. LVIII–LXIII. – Ejusd. Suppl. II pp. LXV–LXXII.
1811–1815 Testo della Flora Napolit. vol. I pp. 1–324.
1820 Testo della Fl. Napolit. Vol. II pp. 1–375 – Prodr. Florae Neap. Suppl. III p. 377–382
in dato 1824 Prodrom. Florae Neap. Suppl. IV pp. III–XII – 1824–1829, Testo della Flora Napolit. Vol. III.

35/0018-26

1830. Sylloge florae Neapolit. pp. 1–152 – Append. I pp. 153–156 – Append. II pp. 161–169 – Testo della flora Napolit. Vol. IV pp. 169–358 – Sylloges app. III pp. I–XIV.

1835. Sylloge app. IV pp. I–XVI – 1835–1836 Testo della flora nap. Vol. V pp. 1–379.

1823 Florae Neapolitanae Prodr. Supplementum V Neapoli.

1826. Memoria sulle specie e varietà dei Crochi. Napoli.

1827. Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata e Calabria. Napoli.

1831. Sylloge plantarum vascul. Florae Neapolitanae, cum app. I–III Neapoli – 1842 Append. IV–V.

183[redacted] Relazione del viaggio in Abruzzo. Napoli.

1832 Memoria su d'una nuova felce. Napoli.

1842 Tenore Memoria sulle peregrinazioni di Napoli (in collab. col prof. Gussone) Napoli (atti R. Acad. Napol. V)

1845 Catalogo del real Orto botanico di Napoli. Napoli.

Terracciano Nicola

1872. Relazione intorno alla peregrinazione bot. in Terra di Lavoro. Caserta I – 1873 Relaz. II – 1874 Relaz. III – 1878 Relaz. IV

(1889 Synopsis plantarum vascularium Mont. Pollini. Romae – 1900 Addenda (Cl. d

2 (1896 Intorno alla flora del M. Pollino e terre adiacenti. Napoli (Mem. R. Acad. Napol.)

1 (1890 Intorno ad alcune piante della Terra di Lavoro. Napoli (Atti R. Acc. Nap.)

Terracciano Achille.

1890 La flora del Poletino: Le piante dei dintorni di Rovigo. Firenze (Bull Soc. bot. ital)

Tilli Mich. Angelo (1655–1740)

1723 Catalogus plantarum Horti Pisani. Florentiae

Tineo Giuseppe (1757–1812)

1793 Synopsis plantarum hort. botanici academiae panormitanae. Panormi

Tineo Vincenzo (1791–1856)

1817. Plantarum variorum Siciliae pugillus. Panormi.

1846. Plantarum Siciliae minus cognitarum fasc. I–III. Panormi.

1827 Catalogus plantarum Horti Panormitani. Panormi.

Tissière Pierre Germain (1825–1868)

1868. Guide du Botaniste sur le grand St. Bernard. Aigle.

Tita Antonio (1657–1729)

1713 Catalogus plantarum Horti Mauroceni. Auctt. Iter per Alpes Tridentinas. Patavii — Cfr. Savardo e Traverso, La flora delle Vette di Feltre. Venezia 1905

Todaro Agostino (1818–1892)

1842 Orchideae Siculae. Panormi.

Tommasini Muzio (1794–1879)

1895 Flora delle isola di Lussino (postuma per cura di C. Marchesetti) Trieste – Il lavoro venne compiuto nel 1871.

Tornabene Francesco (1813–1897)

1887. Flora Sicula. Catinae.

Traverso Gio. Battista.

1898 L'Acalypha virginica nella flora pavese. Genova (Malpighia)

Trevisan Vittore (1818–1897)

1842. Prospetto della flora Euganea. Padova.

1874. Sylloge Sporophytarum Italiae. Mediolani (atti Soc. ital. Sc. nat.)

Trionfetti Giov. Batt. (1658–1708)

1685. Observationes de ortu ac vegetatione plantarum cum novis stirp. Romae.

1688. Praelusio ad publicas herbarum ostensiones. Romae.

Turra Antonio (1730–1796)

1765 Dei vegetabili del Monte Baldo. Venezia (Giorn. d'Italia del Spallanzani)

1767 Osservazioni geologiche sul Monte Summano, con un Catal. delle piante. Venezia.

1780 Florae Italicae Prodromus. Vicetiae (La data del MS. è del 1768)

35/0018-27

Uoria (da) Bernardino (1739 — 1796)
1789 Hortus regius Panhormitanus. Panormi.
1796 Plantae ad Linnaeanum opus addendae. Lipsiae (Roemer's Arkiv f. de Botanik, I vol., 1 fasc. pp. 67-70)

2 (Vaccari Lino.
1904 Catalogue raisonné des pl. vascul. de la vallée d'Aoste. Aoste (I Ranunc. Rosac.)

1 (Ugolini Ugolino. Di talune pubblicazioni di lui è fatta la citazione a' propri luoghi.

Valle Felice Spirito (1715-1747)
1760 Florula Corsica ab Allionio edita. Taurini.

Vi 32. di Jean Pierre Etienne (1763-1841)
1827 Monographie des Orobanches. Genève.

Venzo Sebastiano (1815-1876)
1873 Relazione d'un viaggio alpestre. Firenze (N. giorn. bot. ital.)

Vesling Giovanni (1598-1649)
1642 Catalogus plantarum Horti Gymnasii Patavini. Patavii — 1644 Altera editio.

Visiani (de) Roberto (1800-1878) Vedi anche Sauardo.
1842. L'Orto botanico di Padova. Padova.

Vitman Fulgenzio (1728-1806)
1773. Saggio dell'istoria erbaria delle Alpi di Pistoja, Modena e Lucca. Bologna.

Viviani Domenico (1772-1840)
1802 Annali di Botanica. Genova I — 1804 Annales botanici Genuae, II (ovvero vol. I parte II)
1802 Elenchus plantarum Horti bot. Di Negro. Genuae.
1808 Florae Italicae fragmenta. Genuae

1824 Florae Lybicae Specimen. Gennae.
1824 Florae Corsicae Specierum diagnosis. Gennae — 1825 Appendix I — 1830 Appendix altera.

Volpari Gio. Andrea (+ 1699)
1653 Suo Erbario presso l'Orto bot. di Modena. Cfr. A. Mori. Illustrazione di un Erbario di G. A. Volpari. Modena 1901.

Wettstein Rich.
1896 Monographie der Gattung Euphrasia. Leipzig.
1893-94 Die Arten der Gattung Euphrasia. Wien (Oesterr. bot. Zeitschr.)

Wohlfarth. Vedi Hallier.

Wulfen Fr. Xav. (1728 — 1805)
1850 Flora Norica Vindobonae, cura Ed. Fengl. et Rainer Graf Vindobonae (L'opera fu scritta intorno al 1790)
1805 Plantarum variorum descriptiones. Lipsiae.

Zahn Hermann
1901 Hieracium in Hallier et Wohlfarth. Koch's Symps. vol. II. Leipzig.

Zannichelli Gio. Girolamo (1662 — 1729)
1730 Opuscula botanica posthuma edita a filio J. Jacopo. Venetiis (L'operetta fu stesa circa il 1726). Cfr. Sauardo, I codici botanici figur. e gli erbari ecc. Venezia 1904 (in Atti R. Ist. Veneto)
1735 Istoria delle piante che nascono nei lidi intorno Venezia. Venezia (per cura del figlio Gio. Jacopo) Cfr. Sauardo, I codici ecc. l. c. — Quarta e la precedente opera dell'Zannichelli sono postume, ma risultando che le ricerche e gli studi dell'autore cadono fra il 1722 e 1726, tengo l'anno 1726 come data media.

Zanoni Giacomo (1615 — 1682)
⊙ 1675 Istoria botanica. Bologna.
⊙ 1652 Descrittione di alcune piante nuove. Bologna tipi G. B. Ferroni.

Zanoni Giacomo et Monti Giuseppe (1682 — 1760)
1742 Rariorum stirpium historia. Bononiae

Zanardini Giovanni (1804 — 1878)
1847 Prospetto della Flora Veneta. Venezia (nell'opera: Venezia e le sue lagune)

Zerapha Stefano (prima metà del sec. XIX)
1827. Florae Melitensis thesaurus, Melitae. Fasc. I pp. 1-36 — 1831 Fasc. II pp. 37-86.

35/0018-28

Zersi Elia (1818—1882)

1877. Prospetto delle piante vascolari della provincia di Brescia. Brescia.

Zodda Giuseppe. Vedi Erbario mattirese

Zuccagni Attilio (1754-1807)

1793 Synopsis plantarum Horti botanici Musei regii Florentini. Florentiae — 1795 Auctarium — 1796 Auctarium II 1798 Auctarium (III) 1799 Auctarium (IV)

1806. Synopsis plantarum quae vivescunt in Horto botanico Musei Florentini. Florentiae.

1806. Centuria I Observationum botanicarum. Florentiae.

Zumaglini Antonio Maurizio (1804—1865)

1849 Flora Pedemontana Taurini — 1866, Vol. I Vol. II.

35/0018-29

PTERIDOPHYTAE

Fam. I Filices

Ceterach Adans

1. Ceterach officinarum W. R

1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona. 1815 Rivio –

Notholaena R. Br.

2. Notholaena Marantae (L) R. Br.

1565 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1785 Allioni – 1804 Savi.

3. Notholaena vellea (Ait.) R. Br.

1827 Moris (†1840) Cosentini in Bertoloni X, 1858.

Polypodium L.

4. Polypodium vulgare L. R

1532. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

(1554 Mattioli)

– β serratum W.

1697. Boccone – 1868 C. P. G.

1815 Rivio –

– γ cambricum L.

1793. Martelli e Sabbati – 1868 C. P. G.

5. Polypodium Phegopteris L.

1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re – 1821 Nocca-Balbis.

6. Polypodium Dryopteris L.

1566 Calzolari – 1595 Pona – 1745 Seguier – 1785 Allioni – 1805 Re.

– β Robertianum (Hoffm.)

1819 Bertoloni. 1852 Hausmann.

7. Polypodium rhaeticum L.

1785 Allioni – 1808 Bivoli – 1832 Tenore

Gymnogramme Desv.

8. Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.

1803 Balbis – 1818 Savi – 1819 Bertoloni

8* Gymnogramma spectabilis Zumagl.

1860 Zumaglini (sp. dubia)

Woodsia R. Br.

9. Woodsia glabella R. Br.

1858 Hausmann in Bertol. XI.

⊕ 1872 Huter. Cfr. cum sopra.

⊙ 1864 Molendo. Cfr. Dalla Torre – Sarnthein, 1900

1873 Venzo in N. Giorn. bot. ital.

10. Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

1801. Balbis – 1874 Treviran.

– β hyperborea (R. Br.)

1869 Treviran in Vis. e Saccardo, 1869.

1903 Gelmi

Aspidium Sw.

11. Aspidium Lonchitis (L.) Sw.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1561 Anguillara.

12. Aspidium aculeatum (L.) Sw.
1532 Cibo – 1676 Boccone. Cfr. Bertoloni Misc. XVII, 1857 – 1717 Patarol – 1726 Zannichelli – 1785 allioni.

– β lobatum (Sw.)
1818 Savi – 1832 Tenore.

– γ Braunii (Spenner)
1872 Huter. Cfr. Dalla Torre e Sarn. 1900 – 1874 Trevisan – 1880 Goiran. Cfr. Goiran 1907. 1893 Gebri.

Nephrodium Rich.

13. Nephrodium Thelypteris (L.) Strempf.
1550 Cibo – 1717 Patarol – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

14. Nephrodium Oreopteris (Ehrh.) Kunth.
1723 Micheli in Tilli – 1785 allioni – 1790 Bellardi – 1805 Re.

15. Nephrodium filix-mas (L.) Rchb.
1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1595 Pona. 1745 Rivio

– β distans (Viviani)
1825 Viviani – 1874 Trevisan.

16. Nephrodium cristatum (L.) Michx.
1872 Loss – 1882 Goiran

17. Nephrodium rigidum (Sw.) Desv.
1748 Pontedera – 1754 Séguier – 1790 Bellardi – 1819 Bertoloni

– β pallidum (Bory et Chaub.)
1832 Tenore (Aspid. rigid. v. austriale)

18. Nephrodium spinulosum (Sw.) Strempf.
1790 Bellardi – 1806 Sternberg – 1854 Leybold in Flora – 1867 Savardo.

– β dilatatum (Desv.)
1824 Pollini – 1832 Tenore 1888 ambrosi.

Cystopteris Bernh.

19 Cystopteris montana (Lam.) Bernh.
1785 allioni – 1808 Biroli – 1867 Savardo.

20 Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
1550 Cibo — 1551 Aldr. — 1696 Cupani

— β alpina (Desv.) Syria 1754
1718 Pontedera — 1816 Pollini
1595 Pona

— γ pumila (Bertol.) Vis. Sace.
1824 Pollini, 1882 Goiran

Asplenium L.

21 Asplenium Filix-femina (L.) Bernh.
1717 Patarol — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
1595 Pona —

22. Asplenium fontanum (L.) Bernh.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1824 Comolli — 1874 Trevisan.

— β forsteriacum A. Le Grand
1879 Bizzozero (A. lanceol.) — 1902 Christ (Farnfl. östl. Riviera) — 1903 Béguinot (Bull. Soc. bot. it.)

23 Asplenium lanceolatum Huds.
1871 Carnel — 1897 Penzig — 1901 Bég. in Boll. Soc. bot. it.
— β obovatum (Viv.)
1824 Viviani — 1826 Gussone — 1828 Moris
1651 Erbario mattiner. Cfr. Zodda

24. Asplenium Adiantum-nigrum L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli.

— β (cuneifolium (Viv. 1806)) Serpentini (Tausch) 1839
1819 Bertoloni — 1842 Trevisan.

— γ (Onopteris (L. 1753)) lacutum (Bory) 1810
1835 Tenore — 1844 Gussone.
1757 Latini

25. Asplenium fissum Kit.
1745 Sabbati
1824 Pollini — 1826 Gussone — 1835 Jan (in Flora sub [A. Trettenerianum])

26. Asplenium lepidum Presl
1845 Tineo in Gasparrini — 1872 Lojac.

27. Asplenium Ruta-muraria L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante
1415 Rimini —

28. Asplenium germanicum Weiss
1550 Cibo — 1801 Balbis — 1824 Pollini

28* Asplenium Heufleri Reichardt
(A. Trichomanes × germanicum Reich.)
1858 Heufler. Cfr. Dalla Torre e Sarn. 1906
1889 Rosenstock. Cfr. l. c.

29. Asplenium marinum L.
(†1711) Capani ed. 1713 — 1822 Bertoloni — 1828 Moris.

30. Asplenium viride Huds.
1790 Bellardi — 1802 Suffren — 1808 Viroli — 1827 Savi.

31 Asplenium Trichomanes L. R
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1561 Anguillara — 1554 Matthioli — 1585 Durante 1615 Rinio —

31* Asplenium dolosum Milde
(a. adiantum-nigrum × a. Trichomanes mihi)
1863 Milde in Verh. zool. bot. Ges. Wien;

32. Asplenium Petrarchae (Guér.) DC.
1844 Gussone — 1858 Bertoloni

33. Asplenium Septentrionale (L.) Hoffm.
1563 Cesalpino — 1745 Segaier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

34 Asplenium Seelosii Leybold
1855 Leybold (Flora) — 1856 Bors. et Reut. Cf. Dalla Torre et Sarn. 1906 — 1858 Hausmann in Bertoloni

Scolopendrium Smith.
35 Scolopendrium vulgare Sm. R
1532 Cibo — 1551 Aldr. — 1554 Matthioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante. 1615 Rinio

36 Scolopendrium Hemionitis Sw.
1532 Cibo — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante.

Woodwardia Smith
37. Woodwardia radicans (L.) Smith.
1723 Micheli in Tilli — 1835 Tenore — 1844 Gussone.

Blechnum L.
38. Blechnum Spicant (L.) With.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1565 Matthioli — 1696 Capani

Allosorus Bernh.
39. Allosorus crispus (L.) Bernh.
1785 Allioni — 1808 Viroli — 1824 Pollini.

Struthiopteris Willd.
40 Struthiopteris germanica W.
1785 Allioni — 1805 Re — 1824 Comolli e Pollini.

3

Cheilanthes Sw.

41. Cheilanthes fragrans (L.) W. et B.
1640 Castelli 1802 Viviani — 1827 Moris — 1835 Tenore.
— β maderensis (Lowe)
1874 Trevisan.

42. Cheilanthes Szovitsii F. et M.
1858 Tassinari in Bertoloni Misc. bot. XVIII — 1906 Baccarini e Pampanini in N. giorn. bot. ital. p. 83.

Pteris L.

43. Pteris aquilina L. R
♀ 1551 aldrovandi — 1554 Mattioli — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.
1415 Rizio

44. Pteris longifolia L.
♀ 1827 Tenore — 1845 Gussone — 1858 Bertoloni (Coltivata dal 1842 (Visiani) nello Orto bot. di Padova ad ora iri completamente naturalizzata: 1869 Visiani e Saccardo l. c. 277.)
1726 Zannichelli Erb. gen. nell'Orto bot. di Padova —

45. Pteris cretica L.
1532 Cibo — 1735 Micheli — 1790 Bellardi — 1819 Bertoloni — 1804 Viviani

45* Pteris serrulata L. fil.
Coltivata dal 1842 (Visiani) nell'Orto bot. di Padova ed ora iri completamente naturalizzata: 1869 Visiani e Saccardo p. 277.
Originaria dell'Asia or. e Natal.

Adiantum L.

46 Adiantum Capillus-Veneris L. R
♀ 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.
1415 Rizio —

Hymenophyllum Sw.

47 Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm.
1697 Boccone — 1855 Salle in Grenier Godron III.

Botrychium Sw.

48. Botrychium Lunaria (L.) Sw.
♀ 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1592 Colonna.
1415 Rizio —

49 Botrychium matricariifolium A. Br.
1867 Bérenger in Saccardo — 1872 Loss — 1874 Trevisan.

— β lanceolatum (Gmel.) Koch
1868 Loss. Cfr. Dalla Torre e Sarnth. 1906 — (†1886) Fragoni. Cfr. Asch. Gräbn. I.

50. Botrychium ternatum (Thunb.) Sw.
(Il tipo è ~~esotico~~ proprio della N. Zelanda)
— β Matricariae (Schrank) Fiori
1868 Ball — 1872 Loss.

50* Botrychium virginianum Sw.
1874 Trevisan.

Ophioglossum L.
51. Ophioglossum vulgatum L.
1532 Cibo — 1558 Mattioli —
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari.

— β lusitanicum (L.)
1825 Soleirol — 1827 Moris — 1855
Grenier e Godron.

Osmunda (Tourn.) L.
52 Osmunda regalis L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563
Cesalpino — 1717 Patarol.

— β Plumierii (Tausch) Milde
1845 Presl, Suppl. Tent. Pteridogr. —
1867 Milde — 1896 Jäggi in Asch. e
Gräbn.

Fam. 2: Marsiliaceae
Azolla Lam.
53 Azolla caroliniana W.
Dell'America temp. e trop. Introdotta
nei giardini bot. europei nel 1872
(Asch. e Gräbn.). Naturalizzata
in Italia: 1886 (Arcangeli) — 1890
(Chiamenti) — 1891 (Martelli) ecc.
Cfr. Saccardo, L'Azolla carolin. 1892.
— 1888 (L. Bozzi)

53* Azolla filiculoides Lam.
Dell'America merid. introdotta e naturalizzata
in Europa intorno al 1880 (Rozer) si diffuse più tardi anche
in Italia: 1900 (De Bonis) — 1901
(Béguinot) — 1906 Briosi e Farneti
(~~[illegible]~~) ecc. Cfr. Béguinot e Traverso in Boll. Soc. bot. it. 1906 p. 161.

Salvinia (Mich.) L.
54. Salvinia natans L.
1565 c. Michiel 1583 Cesalpino — 1620 C. Bauhin.
1729 Micheli — 1754 Séguier.

Marsilia (Mich.) L.
55. Marsilia quadrifolia L.
1565 Mattioli — 1585 Durante
1745 Séguier.

56. Marsilia putescens Ten.
1815 Tenore — 1827 Moris. Cfr. Barbey 1884

35/0018-32

Pilularia (Vaill.) L.

57. Pilularia globulifera L.
1785 Allioni — 1836 Colla — 1847 Rabenhorst.

Fam. 3 Equisetaceae

58. Pilularia minuta Dur.
1835 De Notaris — 1865 Canepa. Cfr. Barbey 1884 — 1863 Ascherson in Milde.

Equisetum (Tourn.) L.

59 Equisetum arvense L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino.

60. Equisetum maximum Lam.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1745 Sabbati

61 Equisetum silvaticum L.
1735 Micheli Cfr. Pollini 1824 — 1785 Allioni — 1824 Comolli e Pollini. 1858 Hausmann in Bertoloni XI.

62 Equisetum pratense Ehrh.
1853 Rota — 1858 Hausmann in Bertoloni XI — 1882 Crepin, À travers le pays des dolomites — 1891 Gelmi

63. Equisetum palustre L.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1816 Pollini.

64. Equisetum limosum L. R
1551 Aldrovandi — 1785 Allioni — 1805 Re — 1821 Nocca-Balbis.

64* Equisetum litorale Kühlewein (E. arvense × limosum Lasch)
1905 Chenevard e Braun.

65. Equisetum hiemale L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1816 Pollini — 1821 Nocca-Balbis.
1415 Rinio —

— β Schleicheri Milde
1865 Milde — 1882 Goiran — 1891 Gelmi.

66. Equisetum ramosissimum Desf.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1640 Castelli. 1819 Bertoloni (escl. il sinon. di Micheli 1735, che spetta ad Eq. silvaticum, come osserva Pollini).

67 Equisetum variegatum Schl.
1550 Cibo — 1858 Bonjean e Hausmann in Bertoloni — 1867 Savardo.

Fam 4. Lycopodiaceae

68 Lycopodium (Ruppius) L.

68 Lycopodium complanatum L.
1713 Tita — 1717 Patarol — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1816 Pollini.

— β Chamaecyparissus (A. Br.) Döll
1853 Rota — 1867 Saccardo — 1888 Ambrosi. 1745 Sabbati.

69 Lycopodium alpinum L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1818 Savi — 1824 Pollini.

70 Lycopodium clavatum L.
1561 Anguillara — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.
1551 Aldrovandi II.

71. Lycopodium annòtinum L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1824 Comolli e Pollini.

— β pungens Desv.
1867 Uechtritz in Milde — 1903 Wolf in ~~Chenot~~ Bericht. Schweiz. bot. Gesell. XIII p. 104

72 Lycopodium inundatum L.
1808 Biroli — 1824 Pollini — 1836 Colla.

73 Lycopodium Selágo L.
1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1824 Comolli; Pollini

Selaginella P. B.

74. Selaginella spinosa P. B.
1532 Cibo — 1754 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1824 Pollini.

75 Selaginella helvetica (L.) Spr.
1717 Patarol — 1713 Tita — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

76 Selaginella denticulata (L.) Spring.
1563 Cesalpino — 1798 Savi — ~~1713 Tita~~ ~~1745 Seguier~~ 1827 Moris — 1858 Bertoloni.

Fam. 5. Isoetaceae

Isoëtes L

77 Isoetes lacustre L.
1848 De Notaris. Cfr. Nobili in Fiori IV ~~Appendice anal.~~

— β echinosporum Dur.
1858 Franzoni in Erb. critt. it. I, n°. 3.

78 Isoetes Malinvernianum Ces. et De Not.
1858. Ces. et De Not. in De Not. Ind. sem. Horti Gen. — 1861 Gennari

79 Isoetes velatum A. Br.
1858 Moris in Bert. XI (I. setacea)
1861 Gennari
1551 Aldrovandi II

5

— β tegulense (Genn.)
1861 Gennari — 1866 Marcucci Ucria Italia —

— γ. dubium (Genn.)
1861 Gennari. Cfr. Archiv. Gräb. I.

— δ sicilium Ces. De Not. (non Tod.)
1861 Gennari

80. Ioetes Durieui Bory
1843 De Notaris. Cfr. Milde 1867
1855 Reguien in Gren. Godr. III —
1861 Gennari.

81 Ioetes hystrix Durieu
1855 Kralik in Gren. Godr. III —
1861 Gennari — 1866 Marcucci
1873 De Notaris e Moris (I. setacea)

— β subinermis Dur. (I. setacea Tod.)
1860 Savi e Bauoni in Gennari 1861 —
1866 Marcucci.

PHANEROGAMAE

Gymnospermae

Fam. 6 Coniferae

Pinus (Tourn.) L.

82 Pinus Cembra L. R
1558 Mattioli — 1729 Michel. — 1785
Allioni — 1824 Pollini — 1802 Marzari

83 Pinus Pinea L. R
1558 Mattioli — 1561 Anguillara —
1583 Cesalpino — 1585 Durante
1615 Cibo —

84. Pinus Pinaster Soland (1551 Aldrovandi II)
1558 Mattioli — 1532 Cibo — 1583
Cesalpino — 1798 Savi.

85. Pinus halepensis Mill.
1550 Cibo — (1551 Aldrovandi II) 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1789 Ucria.

85* Pinus brutia Tenore
(Pinus Laricio × P. halepensis ?)
1835 Tenore — 1845 Schouw.

86. Pinus Laricio Poir.
1827 Moris — 1835 Tenore — 1845
Schouw.

— β nigricans (Host) Richt.
1835 Tenore — 1845 Schouw —
1854 Fon Strangway in Bertol. X.
— γ leucodermis (Antoine) Fiori
1905 B. Longo in Ann. Bot. Roma.

87 Pinus silvestris L. R (1780 Turra —
1554 Mattioli — 1745 Séguier — 1785
Allioni — 1802 Marzari e Soffreni

88. Pinus montana Mill.
— α uncinata (Antoine)
1867 Bornet e Moggridge in Ardoino.

— β pumilio (Hänke)
1558 Mattioli — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1853 Rota

— γ Mugus (Scopoli)
1824 Pollini — 1875 Willkomm. Cfr. Dalla Torre-Sarnth. 1906, anche per le altre varietà.

Larix (Tourn.) Adans.

89 Larix decidua Mill. R
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.

Abies (Tourn.) L.

90. Abies alba Mill. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari.

91. Abies excelsa Poir. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari.
1415 Rinio —

— β alpestris Brügger
1897 Ascherson e Gräbn. I.

Thuya L.

92. Thuya orientalis L.
Del Giappone e della Cina, coltivata ~~esa~~ fino dal settecento. Ora si è resa qua e là anche avventizia.
1762 Allioni — 1780 Farsetti — 1801 Bonato

~~92~~ A Thuya occidentalis L.
Originaria dell'America settentrionale atlantica coltivata ~~nel Veneto~~: fino dal principio del settecento: φ
1701 Martini — 1717 Patarol — 1760 Allioni — 1780 Farsetti — 1801 Bonato

φ Ora trovasi anche non di rado avventizia:

Callitris Vent.
B ~~92~~ Callitris quadrivalvis Vent.
1906 Caruana-Gatto in Sommier Bull. Soc. bot. it.

Cupressus (Tourn.) L.

93 Cupressus sempervirens L. R
1415 Rinio
2 1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
1 Oriundo d'Asia e di Creta, coltivato e naturalizzato dall'epoca romana.

93* Cupressus horizontalis Mill.
1554 Mattioli – 1585 Durante – 1755 Micheli – 1583 Cesalpino
Coltivato e naturalizzato come il precedente di cui è da aversi come una sottospecie.

Juniperus (Tourn.) L.

94 Juniperus communis L.
1545 Rinio † 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante.

– β hemisphaerica (Presl)
1822 Presl – 1535 Tenore – 1845 Gussone
– γ nana (W.)
1595 Pona – 1745 Séguier – 1885 Allioni

95. Juniperus Oxycedrus L. R
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1798 Savi.

96. Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1845 Gussone.

97 Juniperus phoenicea L.
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani.
1551 Aldrovandi ++

98. Juniperus Sabina L. R
1545 Rinio † 1552 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1785 Allioni.

99. Juniperus virginiana L.
Dell'America sett. Coltivato fino dal ~~principio del~~ 1796 † Zuccagni † ~~1812~~ Bertoloni 1812 † Spignoli † ~~1820~~ Sora 1821 † Bonato † ec. (Ora talvolta rinselvatichito qua e là:

99* Juniperus excelsa M. Bieb.
(coltivato intorno 1840 a Padova, Napoli ecc.)
Del Caucaso. Di rado inselvatichito nel Veronese: 1897 † Rigo in Giovan †

99** Juniperus thurifera L.
(coltivato come sopra)
Di Spagna e Portogallo. Inselvatichito (?) in Sardegna: 1881 † Gristebach in Nymon †

100 Taxus baccata L.
1545 Rinio † 1552 Cibo – (1551 Aldrovandi ††) 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1563 † Cesalpino – 1595 Pona.

Fam. 7 Gnetacea
Ephedra (Tourn.) L.
101 Ephedra distachya L.
1785 Allioni – 1798 Clemia – 1845 Gussone.

102. Ephedra nebrodensis Tineo.
1696 Cupani – 1828 Moris.

103. Ephedra fragilis Desf.
1845 Gussone – 1854 Tineo in Bertoloni X

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledones

Fam. 8 Graminaceae

Zea L

104. Zea Mays L.
Dell' America merid. Coltivato in Europa fino da poco dopo la scoperta d'America. spesso avventizio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

– β praecox Pers.
Coltivato fino dalla fine del cinquecento

Coix L.

105. Coix Lacrima L.
Delle Indie orient. e Nubia: e coltivata fra noi fino dal cinquecento.
1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1642 Veslingio.

Lygeum L.

106 Lygeum Spartum L.
1798 Ucria – 1826 Gussone – 1828 Moris.

Hemarthria R. Br.

107. Hemarthria fasciculata (Lam.) Kth.
1811 Tenore – 1820 Presl – 1827 Gussone.

Andropogon L.

108 Andropogon distachyus L.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1719 Monti – 1785 Allioni.

109 Andropogon hirtus L.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1719 Monti – 1723 Micheli in Tilli.

– β pubescens (Vis.)
1831 Tenore – 1839 Gussone in Bertoloni IV.

– γ podotrichus (Hochst.)
1861. Stolterfoth in Bourg. Cfr. Ascher. Gräbn. II.

110 Andropogon Ischaemum L.
1583 Cesalpino – 1717 Patarol – 1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

111 Andropogon panormitanus Parl.
1820 Presl (A. angustifol.) – 1847 Parlatore in Atti IX Congr. Scienz. it. Venezia.

35/0018-35

Heteropógon Pers

112 Heteropogon Allionii (DC.) R. S.
1785 Allioni – 1805 Re – 1824 Pollini

– β secundus (Willd.)
1838 Andrea Bivona.

Chrysopógon Trin.

113 Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
1719 Monti – 1726 Zannichelli –
1745 Séguier – 1785 Allioni.

Sorghum (L.) Moench

114 Sorghum halepense (L.) Pers.
1561 Anguillara – 1583 Cesalpino –
1697 Boccone – 1717 Patarol –
1719 Monti – 1726 Zannichelli

115 Sorghum vulgare Pers. R
Originario dall'Africa tropicale; la var. a seme nero era nota ai Romani (Plinio)
(+1320) Crescenzio (var. a seme rosso) – 1415 Rinio (var. a seme rosso e bianco) – 1550 Cibo –
1562 Mattioli (var. a seme rosso, nero, bianco)

– β saccharatum (L.)
Dell'Africa tropicale, fu coltivata fra noi solo dal settecento; però la var ε era nota ai Romani.
1718 Pontedera – 1769 Agosti –
1780 Arduino – 1772 Allioni.

– γ campanum (Ten. et Guss.)
1842 Tenore. Colt. e subspont.

– δ technicum Körn. (1885)
1896 Fiori ~~Tenore~~. I. Coltivato.

– ε cernuum (Ard. 1780) R
1780 Arduino. Coltivato

– ζ glycychylum (Passerini)
Della Cina boreale, introdotto fino dal 1849 dal Sig. Montigny in Francia ed in Italia per l'estraz. dello zucchero, dei colori etc.
1856 Passerini in period. "I Giardini". Milano.

Saccharum L.

116 Saccharum aegyptiacum W.
(1828 Gussone ed in Bertoloni I, 1833.
1640 Castelli

117 Saccharum Ravennae (L.) Murr. R
1675 Zanoni – 1719 Monti –
1726 Zannichelli – (+1766) Ginanni 1774.

118 Saccharum strictum (Host) Spr.
1864 Sauardo – 1906 Pampanini, Fl. it. exsicc.

Imperata Cirillo.

119 Imperata cylindrica (L.)
(+1673) Barrelier, 1714 — 1719 Monti —
1792 Cirillo — 1804 Savi

Tricholaena Schrad.

120 Tricholaena Teneriffae (L.) Parl.
1813 Tenore — 1816 Bivona-Bernardi
— 1820 Presl — 1826 Gussone.

Pennisetum Rich.

121 Pennisetum ciliare (L.) Link
1826 Gussone ed in Bertol. I, 1833.

122. Pennisetum longistylum Hochst.
Dell' Abissinia, coltivato talora avventizio
1889 Penzig — 1897 Goiran.

Stenotaphrum Trin.

122* Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.
— β americanum (Schrank)
2 (1904 Cavara in Bull. Soc. bot. it.
1 (Delle regioni tropicali naturalizzato presso Catania

Setaria Palis. Beauv.

123. Setaria italica (L.) P. B. R
Della Cina e Giappone, largamente coltivata fino dal cinquecento.
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino
1415 Rinio —

— β germanica (Mill.)
Coltivata e inselvatichita.
1837 Facchini in Bertoloni III — 1879 Caldesi.

124 Setaria glauca (L.) P. B.
1696 Cupani — 1583 Cesalpino
2 1
1719 Monti — 1726 Zannichelli.

125 Setaria viridis (L.) P. B.
1415 Rinio 1719 Monti — 1726 Zannichelli —
1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β major Posp.
1897 Pospichal.

125* Setaria reclinata Vill.
(S. glauca × viridis Chen.)
1903 Chenevard.

126. Setaria verticillata (L.) B. B.
1550 Cibo — (+1711) Cupani, 1713 —
1717 Patarol — 1719 Monti — 1726 Zannichelli.
— β ambigua Guss.
1827 Gussone.

127

Oplismenus P. B.

127 Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. B.
1697 Boccone — 1764 Arduino —
1785 Allioni — 1802 Suffren.

Panicum L.

128. Panicum compressum Biv.
1816 Bivona-Bernardi – 1833 Gussone
in Bertoloni X.

129. Panicum repens L.
1696 Cupani – 1798 Moris – 1806 Bivo
na-Bernardi

130. Panicum parviflorum Lam.
Della 1786 Mascarene, Africa occ. e Amer.
tropic. Il tipo manca.
– β serpens (Kunth)
1887 Torrebene – Isole circostanti Sicilia.

131. Panicum capillare L. (ed Ital. fino)
Dell'america sett., coltivato ed ora
estesamente inselvatichito:
Toscana 1772 (Allioni) – Liguria 1793
(Zuccagn. Padova, 1812 (Bonato)
1806 (Balbis) – 1897 (Goiran) – 1891 (Sac
cardo) – 1905 (Fortuna)

132. Panicum miliaceum L.
Originario delle Indie or., coltivato dall'era roma
na (Plinio) e passato (inselvatichito)
1532 Cibo – 1558 Matthioli – 1563 Cesalp
no – 1561 Anguillara –
1415 Rinio

133. Panicum crus-galli L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino –
1565 Matthioli – 1696 Cupani – 1719 Monti.
– β orizoides (Arduino 1764)
1717 Patarol – 1764 Arduino.

135* Panicum phyllopogon Stapf.
D'origine asiatica ora qua e là avventizio.
1896 Arcangeli in Stapf. Cp. Fiori
in Boll. soc. bot. it. 1905, p. 66
1904 Farneti in Atti Ist. bot. Pavia IX p. 6.

Digitaria Scop.

136. Digitaria ischaemum (L.) Fiori d'america
Originaria dei paesi intertropicali, ora
qua e là avventizia presso Genova.
1889. Penzig.

137. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
1415 Rinio
1561 Anguillara – 1696 Cupani – 1719
Patarol – 1719 Monti – 1726 Zannichelli.
1551 Aldrovandi

138. Digitaria filiformis Koel.
1824 Tenore – 1833 Balsamo – Crivelli,
Barbieri ecc. in Bertoloni I – 1834 Comolli.
– β gracilis (Guss.)
1854 Gussone

134. Panicum colonum L.
1697 Cupani – 1821 Moretti – 1825 Gussone

135. Panicum crus-galli L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino –
1565 Matthioli – 1696 Cupani – 1719 Monti.
– β orizoides (Arduino 1764)
1717 Patarol – 1764 Arduino.

135* Panicum phyllopogon Stapf.
D'origine asiatica ora qua e là avventizio.
1896 Arcangeli in Stapf. Cp. Fiori
in Boll. soc. bot. it. 1905, p. 66
1904 Farneti in Atti Ist. bot. Pavia IX p. 6.

Digitaria Scop.

136. Digitaria ischaemum (L.) Fiori d'america
Originaria dei paesi intertropicali, ora
qua e là avventizia presso Genova.
1889. Penzig.

137. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
1415 Rinio
1561 Anguillara – 1696 Cupani – 1719
Patarol – 1719 Monti – 1726 Zannichelli.
1551 Aldrovandi

138. Digitaria filiformis Koel.
1824 Tenore – 1833 Balsamo – Crivelli,
Barbieri ecc. in Bertoloni I – 1834 Comolli.
– β gracilis (Guss.)
1854 Gussone

139 Digitaria debilis (Desf.) W.
1831 Tenore — 1835 Gussone in Bertoloni. II.

Tragus Hall.

140 Tragus racemosus (L.) Hall.
1676 Boccone
1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

Orýza L.

141 Oryza sativa L.
Delle Indie or., Africa e Australia. Ignota ai Romani, in Italia si cominciò a coltivarla nel 1468 (Targioni-Tozzetti, Cenni stor. sull'introd. di varie piante. II ed. p. 21)
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.

142 Oryza clandestina A. Br.
1718 Pontedera — 1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier.

Ehrhárta Thunb.

143 Ehrharta panicea Sm.
Originaria del Capo di B. S.; si trovò inselvatichita presso Napoli.
1837 Gussone in Bertoloni III — 1842 Tenore

Phálaris L.

144 Phalaris arundinacea L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1772 Maratti — 1785 Allioni.

145 Phalaris truncata Guss.
1827 Gussone.

146. Phalaris tuberosa L.
1719 Monti — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone
1745 Sabbati —

147 Phalaris caerulescens Desf.
1789 Uoria — 1818 Sebastiani e Mauri — 1827 Gussone.
1745 Sabbati

148 Phalaris paradoxa L.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

149. Phalaris minor Retz.
1818 Sebastiani e Mauri — 1819 Bertoloni.

— β gracilis (Parl.)
1842 Parlatore

150. Phalaris brachystachys Link.
1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Prest (Cfr Parl. Fl. it.) — 1842 Gussone.

35/0018-37

151. Phalaris canariensis L.
Oriunda delle isole Canarie, spesso coltivata fino dal cinquecento a talora inselvatichita.
1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1698 Cupani — 1717 Patarol
1551 Al Bernardi II

Hierochloë Gmel.

152. Hierochloë australis R. S.
1754 Séguier — 1816 Pollini — 1833 Brignoli in Bertoloni I.

153. Hierochloë borealis (Schrad.) R. S.
1839 Facchini in Bertoloni IV.

Anthoxanthum L.

154. Anthoxanthum gracile Biv. Bern.
1813 Bivona-Bernardi — 1820 Presl.

155. Anthoxanthum odoratum L.
1696 Cupani — 1697 Bonone — 1717 Patarol — 1726 Zannichelli.
— β villosum (Dum.)
1827 Gussone.
— γ Sommierianum (Ricci)
1881 Ricci in N. Giorn. bot. ital.
— δ aristatum (Boiss.)
1839 Boissier, Voyag. en Espagne — 1855 Thomas in Gren. Godr. III.
— ε Puelii (Lec. et Lam.)
1866 Gennari.
— ζ glaucum (Vahl)
1900 Foucaud.

156. Anthoxanthum ovatum Lag.
2 (1882 Arcangeli (ex herb. Pap.)
1 (1855 Huet. Cfr Nym. Consp. 790

Aristida L.

157. Aristida Adscensionis L.
1839 Parlatore in Bertoloni IV — 1842 Gussone.

Stipa L.

158. Stipa Calamagrostis (L.) Wahlb.
1718 Pontadera — 1754 Séguier — 1787 Allioni — 1805 Re.

159. Stipa Aristella L.
1787 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Presl.

160 Stipa capillata L.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1822 Pollini

161 Stipa gigantea Lag.
1824 Tenore — 1826 Gussone.

162 Stipa juncea L.
1787 Allioni — 1833 Sassi in Bertol. I

163 Stipa tortilis Desf.
1697 Bonone — 1719 Monti — 1817 Bivona-Bernardi — 1824 Tenore.

164 Stipa pennata L.
1550 Cibo — 1717 Patarol — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni

165 Stipa barbata D
(1856) Tineo in Arcangeli 1882

165* Stipa setigera Presl
Originaria dell' Argentina, ora avventizia presso Genova.
1904 Canneva in Sommier, Bull. Soc. bot. ital.

165** Stipa hyalina Nees
Dell' Argentina, ora avventizia presso Genova
1904. Canneva in Sommier, Bull. Soc. bot. ital.

Nassella Trinius
165*** Nassella trichotoma (Nees) Hack.
Dell' Argentina, avventizia presso Genova:
1904 Canneva in Sommier, Bull. Soc. bot. ital.

Milium L.
166. Milium effusum L
1719 Monti — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini.

167 Milium vernale M. Bieb.
1827 Gussone — 1828 Moris.

— β Montianum (Parl.)
1848 Bertoloni. 1842 Parlatore in Gussone. Cfr. Parlatore 1850, I.

168 Milium caerulescens Desf.
1723 Tilli — 1785 All. — 1819 Bertoloni — 1802 Viviani

169. Milium paradoxum L.
1901 Lutz Bull. Soc. bot. France p. CL. (?)
— β virescens (Boiss.) Fiori
1822 Pollini — 1833 Mauri e Biasoletto in Bertoloni I.

170 Milium multiflorum Cav.
1723. Tilli — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Presl.

— β Thomasii Duby
1850 Parlatore I

Cryptis Aiton
171. Cryptis alopecuroidea Schrad.
1808 Savi — 1825 Re — 1852 Tenore.
— β brachystachys Bath. et Trab.
1826 Presl — 1827 Gussone
172. Cryptis schoenoides (L.) Lam.
1685 Trionfetti — 1719 Monti — 1785 Allioni — 1798 Savi.

35/0018-38

173. Cryptis aculeata (L.) Ait.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1798 Savi.

Phleum L.

174. Phleum arenarium L.
1718 Pontedera — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

— β sardoum (Hack.)
1881 Reverchon. Cfr. Barbey 1884.

— γ graecum (Boiss. et Heldr.)
1881 Groves

175. Phleum tenue (Host) Schrad.
1723 Micheli in Tilli — 1745 Sebast. 1790 Bellardi — 1798 Savi.

176. Phleum asperum Jacq.
1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier — Sebast. 1785 Allioni.

177. Phleum echinatum Host.
1820 Presl — 1827 Guttone — 1829 ? Biasoletto in Flora XII, 531.

178. Phleum alpinum L.
1719 Monti — 1756 Séguier — 1785 Allioni 1816 Balbis. Nova.

1822 Pollini —
— β commutatum (Gaud.)
1875 Favre — 1868 Tschiera — 1882 Payot

— γ subalpinum Hack.
1897 Goiran.

179. Phleum pratense L.
1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1717 Patarol — 1745 Séguier.

— β nodosum (L.)
1719 Monti — 1756 Séguier — 1785 Allioni.

180. Phleum Michelii All.
1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1785 Allion. — 1798 Savi.

— β ambiguum (Tenore)
1826 Tenore.

181. Phleum Boehmeri Wib.
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1818 Ruchinger — 1816 Nova e Balbis.

Alopecurus L.

182. Alopecurus Gerardi (All.) Vill.
1785 Allioni — 1804 Balbis — 1822 Pollini — 1824 Cornolti.

183. Alopecurus utriculatus (L.) Soland.
1719 Monti — 1756 Séguier — 1785 Allioni — 1798 Savi.

184. Alopecurus agrestis L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1718 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

— β versicolor Biasoletto
1829 Biasoletto in Flora XII, 514.

185. Alopecurus pratensis L.
1719 Monti — 1785 allioni — 1802 Suffren — 1816 Nouæ Balbis — 1822 Pollini.

186. Alopecurus bulbosus Gouan.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1785 allioni — 1798 Savi.

187. Alopecurus geniculatus L.
1719. Monti — 1745 Séguier — 1785 allioni — 1806 Balbis — 1808 Savi.

Nibora Adanson

188. Nibora minima (L.) P.B.
1719 Monti — 1785 allioni — 1808 Bivoli.

189. Coleanthus Seidel

189 Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid.
1852 Heufler. Cfr. Della Torre e Sarnth. 1906.

Lagurus L.

190 Lagurus ovatus L.
1640 Castelli — 1719 Monti — 1726 Zanichelli — 1785 allioni — 1798 Savi.
1415 Rizzo

Chaetaria Link

191 Chaetaria fasciculata Link.
1842 Meneghini in Trevisan.

Polypogon Desf.

192 Polypogon monspeliensis Desf.
†1717 Patarol — 1719 Monti — 1718 Pontedera (†1711) Cupani — 1789 Acerbi.

192* Polypogon adscendens Gaud.
(P. monspeliensis × Agrostis verticillata Dav. f.)
1833 Gussone in Bertoloni I e II p. 777.

192** Polypogon littoralis Sm.
1897 Pospichal — 1899 Palanza H. Terra di Bari —
— β lobatus Posp.
1897 Pospichal.

193. Polypogon maritimus W.
1823 Trovini — Mazzanti — 1826 Gussone — 1827 Moris.
— β subspathaceus (Req.)
1825 Requien. Cfr. Gren. Godr. 1855, III

Gastridium Palis. Beauv.

194 Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
1719 Monti — 1785 allioni — 1798 Savi — 1804 Bertoloni.
— β scabrum (Presl)
1818 Presl — 1827 Gussone

Triplachne Link.

195 Triplachne nitens (Guss.) Link
1825 Gussone.

35/0018-39

Sporobolus R. Br.

196 Sporobolus pungens (Schrad.) Kunth
1583 Cesalpino – 1697 Cupani –
1723 Micheli in Tilli – 1798 Savi.

Agrostis L.

197 Agrostis spica-venti L.
1717 Patarol – 1719 Monti – 1745
Séguier – 1785 Allioni – 1802 Sussen.
– β interrupta (L.)
1754 Séguier – 1801 Balbis – 1816
Nova. Balbis – 1818 Bachinger.

198 Agrostis anemagrostis Trin.
1789 Moris – 1826 Gussone – 1828 Moris.

198* Agrostis elegans Thore
1827 Presl in Gussone (A. pulchella)

199. Agrostis alpina Scop.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli
– 1822 Moretti

200 Agrostis rupestris All.
1785 Allioni 1808 Biroli – 1822 Polli-
ni. Moretti.

201 Agrostis canina L.
1785 Allioni – 1798 Savi – 1810 Bertolo-
ni – 1802 Marzari e Sussen

202 Agrostis alba L.
1785 Allioni – 1802 Sussen – 1816
Nova e Balbis – 1822 Pollini.
– β maritima (Lam.)
1820 Moricand – 1826 Nocca.
– γ olivetorum (Gren. Godr.)
1882 Arcangeli.
– δ vulgaris (With.)
1563 Cesalpino – 1657 Ambrosini –
1719 Monti – 1785 Allioni.
– ε densiflora Gass.
1842 Gussone.
– ζ verticillata (Vill.)
1804 Balbis – 1810 Bertoloni – 1818
Sebastiani e Mauri.

Calamagrostis Adans.

203. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
1719 Monti (Tatti) – 1785 Allioni (collett.) – 1906 Gotaro
– β montana (Host)
1816 Pollini – (1832) Facchini in Hausm. 1854
1833 Soleirol in Bertoloni I – 1906 Gotaro
– γ varia (Schrad.)
1833 Brignoli in Bertoloni I – 1837
Facchini in Bertoloni III – 1906 Gotaro

204. Calamagrostis tenella (Schrad.) Host
1833 Moris in Bertoloni I – 1848
Parlatore. – 1897 Goiran – 1893 Schinz
205 Calamagrostis Halleriana (Jacq.) Roth
1839 Facchini in Bertoloni IV.
1816 Brignoli – 1897 Pospichal – 1893 Schinz

206 Calamagrostis Epigejos (L.) Roth.
1717 Patarol – 1718 Pontedera – 1719 Monti – 1726 Zannichelli
– β Reichenbachiana Grecescu
1897 Pospichal

207 Calamagrostis litorea (Schrad.) DC.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1826 Naccari

208 Calamagrostis lanceolata Roth
1833 Barbieri in Bertoloni I – 1848 Parlatore.
– β canescens (Asch. et Gräbn.)
1897 Pospichal

da portare in ditto ai relativi numeri

203* Calamagrostis Haussknetiana Torges
(C. arundinacea × varia Torges)
(+ 1879) Tommasini. Cfr. Asch. Gräbn. II

203** Calamagrostis acutiflora (Schrad.) Rchb.
(C. arundinacea × Epigejos Heid.)
1897 Pospichal

206* Calamagrostis Wirtgeniana Haussk.
(C. Epigejos × litorea Fiori)
1899 Prahl, Precht in Asch. Gräbn. II

206** Calamagrostis bihariensis Simonkai
(C. varia × Epigejos Asch. Gräbn.)
(+ 1878) Hausmann. Cfr. Asch. Gräbn. II.

Psamma P. B.

209 Psamma arenaria (L.) R. et S.
Il tipo sembra mancare in Italia.
– β australis (Mabille) Fiori
1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger.

Arundo (Tourn.) L.

210 Arundo Donax L. R
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1640 Castelli.
1415 Rinio

211. Arundo Pliniana Turra. R
1696 Cupani – 1719 Monti – 1780 Turra – 1818 Sebastiani e Mauri.
– β mauritanica (Desf.)
1820 Presl. – 1827 Gussone.

Phragmites Trin.

212 Phragmites communis Trin. R
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1565 Mattioli – 1696 Cupani.
– β isiaca (Del.)
1869 Mabille.
– γ humilis (De Not.)
1847 De Notaris

Ampelodesma P. B.

35/0018-40

213. Ampelodesma tenax (Vahl) Lk.
1561 Anguillara — 1696 Cupani —
1723 Micheli in Tilli — 1792 Cirillo.
— β bicolor (Poir.)
1858 Schweinfurth. Cfr Barbey 1884.

Holcus L.

214 Holcus mollis L.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1804 Savi —
1816 Nocca e Balbis — 1824 Pollini, Cornolli.

215 Holcus lanatus L.
1563 Cesalpino — 1717 Patarol — 1719
Monti — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni.

216 Holcus Notarisii Nym.
1848 De Notaris in Parlatore I — 1856
Nyman, Syll. Fl. Eur. p. 411.

Airopsis Desv.

217. Airopsis tenella (Cav.) Goss.
1827 Gussone.

Aira L.

218 Aira praecox L.
1785 Allioni — 1822 Pollini — 1808 Biroli.
1833 Balbis in Bertoloni I

219 Aira caryophyllea L.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1772 Maratti
— 1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis

— β provincialis (Jord.)
1882 Arcangeli.
— γ Cupaniana (Guss.)
1842 Gussone — 1696 Cupani.

220 Aira capillaris M. K.
1696 Cupani — 1717 Patarol — 1816
Nocca e Balbis — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini

221 Aira Tenorei Guss.
1824 Tenore — 1827 Gussone.
— β intermedia (Guss.)
1832 Gussone — 1845 Parlatore

222 Aira insularis (Parl.) Boiss.
1696 Cupani — 1827 Gussone — 1845 Parlatore.

223 Aira minuta Loefl. ap. L.
1719 Monti — 1833 Bubani, Gussone, Soleirol in Bertoloni I.

Corynephorus P. B.

224 Corynephorus canescens (L.) P. B.
1816 Nocca e Balbis — 1822 Pollini.
1833 Badaró e De Notaris in Bertoloni I.

225 Corynephorus articulatus (Desf.) P. B.
1785 Allioni — 1798 Savi — 1804 Balbis
1807 Bivona — Bernardi.

Deschampsia P. B.

226. Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
1719 Monti – 1754 Séguier – 1772 Ma-
ratti – 1785 Allioni – 1798 Savi.
– β setacea (Hudt.)
1855 Pirona

227 Deschampsia media (Gouan) R.S.
1798 Savi.

228 Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
1719 Monti – 1745 Séguier – 1772
Maratti – 1785 Allioni – 1802 Seffren.

Trisetum Pers.

229. Trisetum subspicatum (L.) P. B.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1834 Comolli.

230. Trisetum gracile (Moris) Bert.
1827 Moris.

231. Trisetum villosum (Bert.) Schultz.
1820 Bertoloni – 1826 Gussone.

232. Trisetum distichophyllum (Vill.) P.B.
1787 Allioni – 1788 Bellardi – 1805 Re.

233 Trisetum argenteum (W.) R. S.
1822 Pollini – 1833 Comolli e Pollini in
Bertoloni I

234 Trisetum Burnoufii Req.
1848 Requien in Parlatore I.

235 Trisetum flavescens (L.) P. B.
1717 Patarol – 1719 Monti – 1745 Séguier.
(+1711) Cupani.
– β purpurascens (DC.)
1833 Bonjean in Bertoloni I.
– δ alpestre (Host)
1837 Facchini in Bertoloni III.

236 Trisetum Cavanillesii Trin.
1804 Balbis.

237 Trisetum aureum Ten.
1820 Tenore – 1826 Gussone – 1828
Fiorini – Mazzambr.

238 Trisetum panicaeum (Lam.) Pers.
1723 Micheli in Tilli – 1798 Savi –
1804 Balbis.

239. Trisetum parviflorum (Desf.) Pers.
1696 Cupani – 1723 Micheli in Tilli –
1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

240. Trisetum myrianthum (Bertol.)
C. A. Mey.
1833 Balsamo – Crivelli e De Notaris
in Bertoloni I – 1834 Comolli.

35/0018-41

Ventenata Koel.

241 Ventenata dubia (Leers) Coss.
1816 Nocca e Balbis — 1787 Allioni
1820 Presl — 1832 Tenore

Avena (Tourn.) L.

242. Avena sativa L. R
1415 Pinio
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1583
Cesalpino — (1561 Anguillara) — 1585
Durante.
— β brevis (Roth)
Coltivasi talora: ~~a Padova~~, 1812 [Bonato]; ~~a Torino~~, 1815 [Biroli], ~~a Verona~~
— 1814 [Pollini] ecc.
— γ strigosa (Schreb.)
Coltivasi talora e talora subspontanea nel Napoletano: ~~a Padova~~, 1820 [Bonato], ~~nel Napoletano, subspontanea~~, 1824 [Tenore]
— δ orientalis (Schreb.)
Coltivasi spesso ~~a S. Maria di Sala~~, 1793
[Farsetti], ~~Torino~~, 1815 [Biroli],
~~Verona~~, 1814 [Pollini].

243 Avena fatua L. R
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino —
1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli —
1726 Zannichelli.
— β sterilis (L.)
1551 Aldrovandi — 1723 Micheli in Tilli
— 1787 Allioni — 1789 Ucria.
— γ hirsuta (Mönch)
1785 Allioni — 1820 Presl — 1826 Naccari

244 Avena pratensis L.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1804 Savi —
1816 Nocca e Balbis — 1822 Pollini.
— β alpina (Sm.)
1855 Pirona — 1872 Loss.
— γ taurinensis (Belli) Frori
1890 Belli in Malpighia.
— δ bromoides (Gouan)
1848 Durando, Panizzi, De Notaris
in Parlatore I

245 Avena versicolor Vill.
1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1822
Pollini — 1832 Tenore.

246. Avena pubescens L.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Bi-
vona-Bernardi — 1822 Pollini
— β sesquitertia (L.)
1844 Puccinelli — 1846 De Notaris.

247. Avena Parlatorei Woods
1787 Allioni — 1788 Bellardi — 1805 Re
— 1822 Pollini.

248. Avena montana Vill.
1845 Parlatore — 1848 De Notaris

249. Avena sempervirens Vill.
Dei Pirenei e del Delfinato, il tipo
pare finora manchi all'Italia.

— β Notarisii (Parl.)
1787 Allioni — 1848 De Notaris.
— γ filifolia (Lag.)
1820 Presl — 1826 Gussone — 1845 Parlatore.
— δ setacea (Vill.)
1790 Bellardi — 1845 Parlatore.

Arrhenatherum P. B.

250 Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1719 Monti
— 1754 Séguier — 1785 Allioni.
— β bulbosum (W.)
1719 Monti — 1827 Gussone.
1551 Aldrovandi II

Gaudinia P. B.

251 Gaudinia fragilis (L.) P. B.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1752 Sabbati 1801 Balbis
— 1819 Sebastiani e Mauri — 1822 Bertoloni.
— β filiformis (Albert)
1898 Foucaud e Simon

Danthonia DC.

252 Danthonia provincialis DC.
1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1789
Allioni.

Spartina Schreb.

253 Spartina stricta (Ait.) Roth.
1719 Monti — 1726 Zannichelli —
1820 Moricand.

254 Spartina versicolor Fabre
1894 Arcangeli — 1897 Chiovenda

Cynodon Rich.

1415 Ribro
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563
Cesalpino — 1696 Cupani — 1719 Monti.

255. Cynodon Dactylon (L.) Pers. R
qui

Beckmannia Host

256 Beckmannia eruciformis (L.) Host.
1719 Monti — 1798 Savi — 1811 Tenore
— 1818 Sebastiani e Mauri.

Dinebra Jacq.

257 Dinebra retroflexa (Vahl) Panz.
1832 Tenore — 1833 Ostini in Bertoloni I

Eleusine Gaertn.

258 Eleusine indica (L.) Gaertn.
Delle Indie or., coltivata dal settecento: a Torino,
1772 (Allioni), a Firenze 1793 (Zuccagni), a Padova 1812 (Bonato), ora
largamente e perfettamente naturalizzata:
(+1877) De Notaris in Arcangeli 1884 —
1879 Goiran. Cfr. Goir. 1897 — 1880
Sauardo.
— β coracana (L.)
In specie coltivata: a Roma 1752 (Sabbati) — a Torino, 1772 (Allioni), Firenze
— 1793 (Zuccagni), Padova 1807 (L. Arduino);
ora anche avventizia: a Genova, 1897 (Penzig),
Friuli, 1897 (Pospichal)

35/0018-42

— γ tristachya (Lam.)
1872 Terracciano Nic. (Indigena?)

Dactyloctenium W.

259. Dactyloctenium aegyptiacum (L.) W.
1696 Cupani — 1820 Presl — 1827 Gussone
1640 Castelli —

Echinaria Desf.

260 Echinaria capitata (L.) Desf.
1606 Colonna — 1719 Monti — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri.

Sesleria Scopoli

261 Sesleria caerulea Ard.
1719 Monti — 1764 Arduino — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1810 Brignoli
— β nitida (Tenore)
1811 Tenore — 1820 Presl — 1827 Gussone
— γ argentea (Savi)
1810 Brignoli e Bertoloni — 1800 Savi in Ust. Ann.

261* Sesleria insularis Somm.
1905 Forsyth Major e Gestro in Sommier, Bull. Soc. bot. ital.

262 Sesleria tenuifolia Schrad.
1802 Soffren — 1810 Brignoli — 1822 Pollini.

263 Sesleria sphaerocephala Ard.
1764 Arduino — 1780 Tarra — 1810 Brignoli
1822 Pollini —
1791 Bellardi —

264. Sesleria microcephala (Hoffm.) DC.
1848 Facchini in Parlatore I.

265 Sesleria disticha (Wulf.) Pers.
1822 Pollini + 1834 Comolli
1833 Meneghini e Bergamaschi in Bertoloni I
1802 Suter Fl. helv.
— β pedemontana (Reut.) = Poa sesleriodes All.
1785 Allioni — 1867 Lisa, Barla in Ardoino.

Triodia R. Br.

266. Triodia decumbens (L.) P. B.
1719 Monti — 1772 Maratti — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1816 Nocca e Balbis.

Diplachne P. B.

267 Diplachne serotina (L.) Link.
1723 Micheli in Tilli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri

Molinia Schrank.

268 Molinia caerulea (L.) Moench
1717 Patarol — 1719 Monti — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β depauperata (Lindl.)
1907 Fiori App. Fl. anal.
— γ litoralis (Host)
1897 Pospichal

Koeleria Pers.

269 Koeleria juncescens (Lam.) P. B.
1719 Mont. — 1785 Allioni — 1818
Sebastiani e Mauri — 1827 Guttone

270 Koeleria hispida (Savi) DC.
1723 Micheli in Tilli — 1798 Savi —
1819 Bertoloni — 1827 Moris.

271 Koeleria phleoides Pers.
(+1811) Cupani — 1717 Patarol — 1719
Mont. — 1723 Micheli in Tilli.

272 Koeleria setacea Pers.
1787 Allioni — 1805 Re — 1852 Petterini
1869 Casali Petterini Sibilli
— β alpicola (Gr. Godr.)
1882 Rostan in Garcke Nym. Consp. 816.

273 Koeleria hirsuta (Hall) Gaud.
1811. Schleicher in Gaudin Agrost. helv.
1833 Comolli a. Bertoloni I
— β brevifolia Rent.
1882 Nyman (K. comitis) — 1874 Arcangeli
Rentet in

274. Koeleria cristata (L.) Pers.
1719 Mont. — 1785 Allion. — 1802 Sieber
— β splendens (Presl)
1723 Micheli in Tilli — 1798 Savi — 1824
Bertoloni in Roem. Schult. Mant. II.
— γ glauca (Schkuhr)
1808 ? Savi — 1894 ? Arcangeli
— δ canescens Vis. 1852 Freyn —
1848 De Notaris in Parlat. I. 1896 Goiran
Taufani, Bolzon, Rigo in Fiori P. B. I
— ε montana (Hausm.)
1852 Hausmann — 1893 Gelmi
— ζ gracilis (Pers.)
(+1848) Crillofori. Cfr. Dalla Torre Sarnt. 1906
1904. Murr a. C. Dornin in Magyar Bot. Lap.
— η carniolica Kern.
1872 Huter. Cfr. Dalla Torre Sarnt. 1906
1897 Goiran.

Avellinia Parl.

275. Avellinia Micheliï (Savi) Parl.
1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli.
1808 Savi — 1826 Guttone

Cynosurus L.

276 Cynosurus cristatus L.
1698 Cupani — 1717 Patarol — 1719 Mont.
— 1745 Séguier.
1415 Rimini

277 Cynosurus echinatus L.
1696 Cupani — 1726 Zannichelli —
1745 Séguier — 1785 Allioni.

278 Cynosurus elegans Desf.
1824 Viviani — 1827 Guttone.

278* Cynosurus paradoxus (Sommier) Fiori
1902 Sommier in Bull. Soc. Bot. Ital. 1902
(+1867) Moris, (+1897) Gennari, Marchesa
L. Doria in I

15

Schismus P. B.

278** Schismus calycinus (L.) Coss. Dur.
1906 Coste Fl. de France III.

Lamarkia Mönch

279 Lamarkia aurea (L.) Mönch 1752 sattine
1696 Cupani – 1719 Monti – 1785
Allioni – 1819 Bertoloni – 1820 Presl.

Sphenopus Trin.

280 Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.
1798 Savi – 1826 Gussone.

Catabrosa P. B.

281 Catabrosa aquatica (L.) P. B.
1719 Monti – 1785 Allioni – 1808
Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.
– β ochroleuca (Dum.)
1827 Gussone – 1845 Parlatore.

Eragrostis Host

282 Eragrostis poaeoides P. B.
1717 Patarol – 1719 Monti – 1745 Séguier
– 1818 Ruchinger
– β megastachya (Koel.)
1565 Cesalpino – 1712 Patarol – 1719
Monti – 1745 Séguier – 1785 Allioni
– γ Barrelieri (Daveau)
1842 Gussone (+1711) Barrelier. Cfr.
2
(Arch. di Grafia II.

283 Eragrostis pilosa (L.) P. B.
1685 Triumfetti – 1719 Monti – 1723
Micheli in Tilli – 1745 Séguier.

283* Eragrostis megicana (Humb. Bonpl. Kund.
Originaria dell' Equatore (Russia), in
Lombardia da molti anni nell' Orto
bot. di Padova. 1869 Savardo. Visiani.

Mélica L.

284 Melica Cupani Guss.
1696 Cupani – 1827 Gussone.

285 Melica ciliata L.
1719 Monti – 1723 Micheli in Tilli –
1745 Séguier – 1772 Maratti.
– β Magnolii (Gren. Godr.)
1867 Ardoino – 1877 Freyn.
– γ nebrodensis (Parl.)
1842 Gussone – 1845 Parlatore.
– δ transsilvanica (Schur)
1896 Fiori.

286 Melica Bauhini All.
1789 Allioni – 1802 Viviani – 1808 Savi –
1809 Host. N. gram. austr.
1822 Pollini. 1872 Marsilly

287 Melica minuta L.
1802 Viviani – 1819 Bertoloni – 1827 Gussone
– β Columnae Coss.
1798 Savi – 1802 Viviani – 1818 Sebastiani e
Mauri – 1820 Presl.

288. Melica nutans L.
1745 Séguier – 1785 allion. – 1802 Suffren – 1806 Balbis.

289. Melica uniflora Retz.
1696 Cupani – 1719 Monti – 1806 Balbis – 1818 Sebastiani e Mauri.

Briza L.

290 Briza media L.
1563 Cesalpino – 1717 Pabarot – 1719 Monti – 1725 Michelin Tilli – 1726 Zannichelli.

291 Briza minor L.
1678 Boccone (Icb.) 1785 allion. – 1798 Savi – 1816 Nocc. e Balbis – 1818 Sebastian. e Mauri.

292 Briza maxima L.
1551 Alpinand. – 1696 Cupani – 1640 Castelli – 1678 Boccone (Icb.) 1719 Monti.

Aeluropus Trin.

293 Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
1802 Suffren – 1810 Brignoli – 1815 Savi – 1819 Bertoloni.
– β repens (Desf.)
(+1711) Cupani – 1822 Bertoloni – 1827 Guss.

Dactylis L.

294 Dactylis glomerata L.
1717 Pabarot – 1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
– β hispanica (Roth)
1806 Balbis – 1820 Moricand – 1802 Suffren – 1810 Brignoli
– γ Sibthorpii Boiss.
1887 Grovet.

Poa L.

295 Poa alpina L.
1719 Schenchzer – 1754 Séguier – 1785 allion. – 1816 Nocc. e Balbis.
– β insularis (Parl.)
(+1711) Cupani – 1827 Gussone
– γ badensis (Haenke)
1818 Balbis – 1848 Parlatore.
– δ pumila (Host)
(+1805) Walfen 1850 – 1863 Bizzozero.
– ε exigua (Fouc. et Mand.) Fiori
1900 Foucaud.

295* Poa sclerocolamus Facchini.
(P. alpina × caesia Asch. Gräbn.)
(+1852) Facchini. Cfr. Ambros. 1854.

296 Poa bulbosa L.
1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1745 Seg. – 1785 allion.
– β concinna (Gaud.)
1837 Koch ed. I – 1848 Parlatore – 1879 Caldes.
– forma vivipara E. Koch.
1696 Cupani – 1719 Monti – 1726 Zannichelli.

35/0018-44

297 Poa annua L.
1719 Monti — 1726 Zannichelli —
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren
— β exilis Tommasini.
1877 Freyn. 1872 Tommasini in Freyn

298. Poa laxa Hänke
1833 Soleirol in Bertoloni I —
1808 Biroli — 1834 Comolli.
— β minor (Gaud.)
1818 Balbis — 1848 Parlatore.

299 Poa violacea Bell.
1792 Bellardi — 1822 Pollini — 1827 Gussone.
— β. breunia (Facchini) Richter
1844 Facchini. Cfr. Ambrosi 1854.
— γ. nebrodensis (Jan) Asch. Graebn.
~~300~~ 1826 Jan.
— δ aetnensis (Presl) Fiori
1820 Presl.

300. Poa nemoralis L.
1719 Monti — 1754 Séguier — 1785 Allioni
1816 Noua e Balbis.
— β subuniflora Rchb.
1896 Fiori — 1897 Goiran —
— γ Balbisii (Parl.)
1827 Balbis. Cfr. Parlatore 1848 — 1828 Mori.
— δ firmula Gaud.
1837 Facchini in Bertoloni III — 1848 Parlatore
— ε aetnensis (Guss.)
1820 ? Presl — 1827 Gussone.

— ζ caesia (Smith)
1837 Facchini in Bertoloni III —

301 Poa palustris L.
1816 Noua e Balbis — 1822 Pollini

302 Poa cenisia All.
1789 Allioni — 1790 Bellardi — 1837 Facchini in Bertoloni III

(2) 304 Poa Chaixii Vill.
1789 Allioni — 1805 Re — 1833 Balbis
in Bertoloni I — 1837 Facchini in Bertoloni III
— β hybrida (Gaud.)
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854.
1893 Gelmi — 1882 Cesati in Arcangeli

(1) 303 Poa compressa L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1726 Zannichelli
— 1785 Allioni.

305 Poa pratensis L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1785 Allioni.
1802 Suffren — (1726 Zannichelli.)
— β anceps Gaud.
1848 Parlatore
— β silvicola (Gussone) Fiori
(Poa attica (Freyn, non) Boiss. et Heldr.)
1854 Gussone — 1877 Freyn — 1879 Caldesi

306 Poa trivialis L.
1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1785 Allioni
— 1798 Savi — 1802 Suffren.

Glyceria R. Br.

307 Glyceria fluitans (L.) R. Br.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1745 Séguier
— 1785 Allioni.
— β plicata (Fries)
qu. 1717 Patarol — 1806 Bivona — 1827
Gussone

308 Glyceria aquatica (L.) Wahlenb.
1719 Monti — 1745 Séguier — 1785
Allioni — 1789 Uaria — 1802 Suffren.

309. Glyceria distans (L.) Wahlenb.
1815 Savi — 1833 Berini, Pollini in
Bertoloni I.
— β convoluta (Fries)
1827 Gussone — 1848 Parlatore.
— γ permixta (Guss.)
1827 Gussone — 1848 Parlatore.
— δ maritima (Huds.)
1818 Ruchinger — 1820 Moricand
1815 Savi
— ε festuciformis (Host)
1818 Ruchinger, 1798 Savi.

Festuca (Tourn.) L.

310 Festuca ovina L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1818 Le-
bastiani e Mauri.
— β duriuscula (L.)
1550 Cibo — 1719 Monti — 1745 Séguier

— γ valesiaca (Schleicher)
1825 Re — 1852 Heufler in Hausmann.
Cfr. Dalla Torre et Sarn. 1906.
— δ dura (Host)
1872 N. Terracciano.
— ε Halleri (All.)
1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini
— 1826 Gussone.
— ζ alpina (Suter)
1852 Hausmann — 1893 Gebmi — 1897 Goiran.
— δ Morisiana (Parlatore)
1844 Moris in Parlatore.
— ι supina (Schrad.)
— 1900 Belli.
— κ vaginata (W. K.)
1900 Farneti in Atti Ist. bot. Pavia
— λ stricta Host.
1897 Pospichal
— μ stenantha ~~[illegible]~~ (Nym.)
1882 Hackel — 1897 Pospichal
— ν rupicaprina Hack.
1897 Pospichal — 1900 Belli.

310* Festuca bergomensis Rota
1853 Rota.

311 Festuca rubra L.
1785 Allioni + 1806 Balbis — 1825 Re.
1791 Bellardi

— β heterophylla (Lam.)
1827 Gussone — 1833 Bertoloni — 1830 Tenore
— γ multiflora (Hoffm.)
1882 Hackel — 1900 Belli.

35/0018-45

— γ violacea (Schleich.)
1834 Comolli — (1852) Facchini in Ambrosi 1854.
1889 Terracciano
— δ Puccinellii (Parl.)
1844 Puccinelli.
— ε nigricans (Schleicher)
1848 Parlatore.

312 Festuca gigantea (L.) Vill.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1802 Suffren
— 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini

313 Festuca elatior L.
1717 Patarol — 1816 Nocca e Balbis —
1820 Moricand e Presl.
— β Fenas (Lagasca)
1816? Pollini — 1887 Groves — 1897 Goiran.
— γ arundinacea (Schreb.)
1719 Monti — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni

314 Festuca spadicea L.
1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier —
1785 Allioni — 1790 Bellardi — 1815 Savi.
1551 Aldrovandi II.

315 Festuca caerulescens Desf.
1816 Bivona — 1820 Presl — 1827 Gussone

316 Festuca pumila Chaix
1790 Bellardi — 1818 Balbis — 1822 Pollini.
— β varia (Haenke)
2(1848 Comolli e Montini in Parlatore I
1(1837 Facchini Bertoloni III.

— ζ eskia (Ram.)
1889 Sauter (dubbia)
— γ flavescens (Bellardi)
1790 Bellardi — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini.
— δ Sardoa Hackel
1884 Reverchon in Barbey 1884
— ε alpestris (R. et S.)
1882 Hackel — 1900 Belli.

317 qui Festuca dimorpha Guss.
1827 Gussone — 1830 Tenore.

316* Festuca laxa Host
1882 Huter in Hackel

318 Festuca pulchella Schrad.
1837 Roemer e Facchini in Bertoloni III.

319 Festuca spectabilis Jan.
1826 Jan — 1833 Pollini e Jan in Bertoloni I.
— β calabrica (Hut. P. e Rigo)
1877 Huter, Porta e Rigo. Cfr Hackel 1882 e Nyman 1882
— γ croatica (Kern.)
1896 Marchesetti — 1897 Pospichal. Cfr Asch. e Graebn. II.

320 Festuca montana M. B.
1820 Presl — 1833 Gussone in Bertoloni I
1845 Parlatore
— β exaltata (Presl)
1826 Presl — 1882 Hackel

321 Festuca altissima All.
1789 Allioni — 1723 Micheli in Tilli — 1818 Balbis

Vulpia Gmel.

322 Vulpia sicula (Presl) Link.
1820 Presl — 1827 Gussone.
— β setacea (Parl.)
1827 Gussone — 1841 Parlatore

323 Vulpia geniculata (L.) Link
1808 Savi — 1832 Gussone
— β attenuata (Parl.)
1844 Parlatore in Gussone.
— γ incrassata (Parl.)
1841 Parlatore
— δ tenuis (Parl.)
1827 Gussone — 1830 Tenore — 1841 Parlatore.

324. Vulpia ligustica (All.) Link
1785 Allioni — 1802 Viviani — 1806 Bivona — 1815 Sebastiani
1651 Erbario messinese. Cfr. Jodda — 1752 Sabbati.

325. Vulpia uniglumis (Sol.) Rchb.
1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichell. — 1804 Balbis

326. Vulpia Myuros (L.) Gm.
1719 Monti — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1816 Nocca e Balbis

— β dertonensis (All.) = V. sciuroides (Gm.)
1785 Allioni — 1719 Monti — 1816 Nocca e Balbis.

327. Vulpia ciliata (Pers.) Link.
(+1711) Cupani — 1752 Sabbati — 1798 Savi — 1816 Nocca e Balbis

328. Vulpia Alopecurus (Schousb.) Lk.
1815 Sebastiani; Savi — 1830 Tenore
~~1832 Gussone~~ 1723 Micheli in Tilli.

Nardurus Reichenb.

329 Nardurus unilateralis (L.) Fr.
1789 Allioni — 1802 Viviani — 1819 Bertoloni.

330 Nardurus Halleri (Viv.) Fiori
1785 Allioni — 1804 Viviani — 1816 Nocca e Balbis.

Catapodium Link.

331 Catapodium tuberculosum Moris
1841 Moris — 1848 Calcara in Parlatore I.

332 Catapodium siculum (Jacq.) Link.
1694 Bocone — 1696 Cupani — 1788 Cirillo
1820 Presl
— β triticeum (Presl) Fiori
1820 Presl.
333 Catapodium loliaceum (Huds.) Link
1785 Allioni — 1804 Viviani — 1808 Savi.
1719 Monti.

35/0018-46

Sclerochloa P. B.

334. Sclerochloa dura (L.) P.B.
1719 Monti – 1798 Savi – 1806 Balbis – 1822 Pollini.

335 Sclerochloa maritima (L.) Sweet
1719 Monti – 1696 Cupani – 1798 Savi – 1806 Bivona.

336. Sclerochloa divaricata (Desf.) Link
1697 Boccone – 1806 Bivona – 1820 Presl 1822 Gussone

337. Sclerochloa procumbens (Curt.) P.B.
1833 Rachinger in Bertoloni I. (Avventizia?)

338 Sclerochloa rigida (L.) P.B.
1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1745 (1685 Trionfetti.)
– β hemipoa (Guss.)
1808 Savi – 1824 Tenore – 1832 Gussone

Bromus L.

339. Bromus inermis Leyss.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1833 Balbis in Bertoloni I.

340. Bromus asper Murray
1785 Allioni – 1808 Savi – 1816 Bocca e Balbis – 1822 Pollini.
– β φ (Zerotinus Solander)
1785 Allioni – 1824 Tenore
φ ramosus (Huds.) Asch. Gräbn.

341. Bromus erectus Huds.
1717 Patarol – 1719 Monti – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
– β transsilvanicus (Steud.)
1879 Huter ap. Hackel 1882.
– γ pannonicus (K. et S.)
1890 N. Terracciano – 1897 Pospichal
– δ caprinus (Kerner)
1879 Hackel. Cfr. Asch. e Graebn. II
– ε condensatus (Hack.)
1888 Goiran. Cfr. Dalla T. Sarnt. 1906
1890 Beck. Cfr. l. c.
– ζ albidus (M. B.)
1888 Simonkai in Oest. bot. Zeitschr.
– δ stenophyllus Link
(+ 1839) Funck Cfr. Asch. Graebn. II
1881 Sardagna in Oest. bot. Zeitschr.

342 Bromus tectorum L.
1785 Allioni – 1789 Ucria – 1802 Suffren – 1808 Biroli – 1816 Nocca e Balbis

343. Bromus rubens L.
1551 Aldrovandi
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1808 Savi – 1820 Presl – 1822 Pollini
– β maximus (Desf.)
1824 Tenore – 1827 Gussone – 1833 Barbieri, De Notaris ecc. in Bertoloni I.

344 Bromus sterilis L.
1563 Cesalpino – 1717 Patarol – 1785 Allioni – 1816 Nocca Balbis
– β scaberrimus (Tenore)
1824 Tenore – 1804 Bertoloni

345 Bromus madritensis (L.)
1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni
1717 Patarol 1807 Bivona.
— δ rigidus Roth.
1826 Naccari — 1880 Sacc. e Bizzozero
1897 Goiran.

345 Bromus fasciculatus Presl
1820 Presl — 1826 Gussone.

346 Bromus scalinus L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1745
Seguier — 1802 Saffren.

347 Bromus arvensis L.
1554 Matthioli — 1717 Patarol — 1719 Monti
1726 Zannichelli — 1745 Seguier.
— β patulus (M. et K.)
1816 Nocca e Balbis — 1855 Pirona —
1869 Vitman e Savardo

348 Bromus mollis L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni.
— β neglectus (Parl.)
1827 Jasmin — 1842 Parlatore
— δ racemosus (L.)
1718 Pontedera — 1723 Micheli in Tilli —
1818 Sebastiani e Mauri — 1821 Re
— δ commutatus (Schrad.)
1833 Barbieri in Bertoloni I — 1845
Parlatore — 1880 Savardo e Bizzozero

349 Bromus tectorius L.
1822 Bertoloni — 1848 Moris e Bia
Tobler in Parlatore I
— β Alopecurus (Poir.)
1696 Cupani — 1826 Gussone.

350 Bromus intermedius Guss.
(+1737) Micheli. Cfr. Parlatore I 1848 —
1827 Gussone — 1830 Tenore.

351 Bromus macrostachys Desf.
1820 Presl — 1824 Tenore — 1826 Gussone

352 Bromus squarrosus L.
1717 Patarol — 1724 Zannichelli — 1745
Seguier — 1785 Allioni.

352* Bromus intermedius Lam. (non Guss.)
1849 Zumaglini

Ceratochloa P. B.

352** Ceratochloa unioloides P. B.
Dell'America meridionale, da noi
qua e là avventizia
1873 Levier in Sommier, Bull. Soc. bot.
ital. 1904 — 1904 Camerano
in Sommier l. c.

Brachypodium P. B.

35/0018-47

353. Brachypodium distachyum (L.) P.B.
1719 Monti — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1816 Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani e Mauri
— β asperum (R. et S.)
1826 Gussone — 1835 Tenore.

354. Brachypodium silvaticum (Huds.) P.B.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1789 Allioni — 1798 Savi — 1804 Bertoloni.

355. Brachypodium pinnatum (L.) P.B.
1696 Cupani — 1717 Patarol — 1719 Monti — 1745 Séguier.
— β phoenicoides (R. et S.)
1870 Kralik Pl. cors. exs. — 1882 Nyman.
— γ ramosum (L.)
1785 Allioni — 1824 Tenore — 1827 Moris — 1833 Mayer in Bertoloni I.

Nardus L.

356 Nardus stricta L.
1719 Monti — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis.

Psilurus Trin.

357 Psilurus aristatus (Linn.) Duv. Jouv.
1697 Boccone — 1719 Monti — 1745 Séguier — 1785 Allioni

Lepturus R. Br.

358 Lepturus incurvatus (L.) Trin.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1788 Cirillo.
— β filiformis (Trin.)
1802 Viviani — 1806 Savi in N. Giorn. lett. Pisa — 1818 Sebastiani e Mauri
1827 Gussone.

359 Lepturus cylindricus (W.) Trin.
1697 Boccone — 1719 Monti — 1806 Savi in N. Giorn. lett. Pisa — 1818 Sebastiani e Mauri.

Lolium L.

360 Lolium temulentum L. R
1719 Monti — 1696 Cupani — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1798 Savi.
— β speciosum (Stev.)
1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1719 Monti.
— γ Gussonei Parl.
1827 Gussone — 1845 Parlatore
— δ remotum (Schrank)
1816 Nocca Balbis — 1848 Parlatore.

361 Lolium rigidum Gaud.
1696 ? Cupani — 1820 Presl — 1827 Gussone
— β subulatum (Vis. 1842) (L. lepturoides Boiss 1853)
1877 Freyn — 1882 Arcangeli.

262 Lolium perenne L.
1717 Patarol — 1719 Monti — 1785 Allioni
1585 Durante

— β compositum (Thuill.)
1896 Cupani — 1808 Savi — 1842 Guss
ne

— γ italicum (a. Br.)
1545 Rinio
1563 Cesalpino — 1816 Nocca e Balbis —
1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini.

— δ Gaudini (Parl.)
1816 Nocca-Balbis — 1842 Gussone — 1822
Pollini — 1848 Parlatore.

— ε hirsutum (Parlatore)
1842 Gussone — 1845 Parlatore.

— β glaucum (Desf.)
1719 Monti — 1816 Nocca e Balbis —
1831 Tenore.

— γ Savignonei (De Not.)
1846 Savignone in De Notaris.

— δ litorale (Host)
1719 Monti — 1833 Ruchinger, Berini
en. in Bertoloni I.

— ε pungens (Pers.)
1820 Moricand — 1826 Navari — 1848
De Notaris, Kellner in Parlatore I.

262* Lolium festucaceum Link
(Festuca elatior × Lolium perenne)
1848 Kellner in Parlatore I.

Agropyrum Gaertn.

263 Agropyrum caninum (L.) P.B.
(+1711) Cupani — 1719 Monti — 1756
Séguier — 1785 Allioni

— β biflorum (Brignoli)
1810 Brignoli — 1906 Gottani

364 Agropyrum panormitanum Parl.
1827 Gussone — 1840 Parlatore

365 Agropyrum repens (L.) P. B.
1583 Cesalpino — 1719 Monti — 1726 Zanni-
chelli — 1745 Séguier.

366 Agropyrum junceum (L.) P. B.
1785 Allioni — 1798 Savi — 1802 Viviani.
1820 Presl.

366* Agropyrum acutum (DC.) R.S.
(A. repens × junceum)
1843 Koch — 1882 Nyman

366* Agropyrum junceum × litorale Fiori.
1896 Fiori.

367 Agropyrum elongatum (Host) P.B.
1833 Berini, Biasoletto, Ruchinger
in Bertoloni I

— β hirsutum (Presl) Guss.
1820 Presl — 1827 Gussone.

368 Agropyrum cristatum (Schraeb.) Gaertn.
1848 Meneghini e Savignone in Parlatore I.
(Aventizio?)

35/0018-48

Triticum (Tourn.) L.

369. Triticum villosum (L.) M. B.
1696 Cupani — 1752 Sabbati — 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Presl.

370. Triticum monococcum L. R
Originario di Grecia, Serbia, Asia minore, è coltivato da secoli.
1554 Mattioli — 1793 Zuccagni — 1807 L. Arduino — 1822 Pollini.

371 Triticum aestivum L. R
D'origine, come sembra, asiatica, è coltivato da secoli colle sue varietà.
1415 Pinio 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino ecc.
— β hibernum (L.)
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino ecc.
— γ compactum (Host)
1807 Mazzucato — 1809 Bayle-Barelle
— δ turgidum (L.)
1696 Cupani — 1760 Allioni — 1793 Zuccagni — 1807 L. Arduino.
— ε durum (Desf.)
1696 Cupani
— ζ polonicum (L.)
1807 L. Arduino
— δ dicoccum (Schrank)
1809 Bayle-Barelle — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli
— η Spelta (L.) R
1554 Mattioli — 1561 Anguillara
1583 Cesalpino.
— χ compositum (L.)
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino

— μ monococcum (L.)
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante

Aegilops (Dill.) L.

372 Aegilops bicornis (Forsk.) J. et Sp.
1846 Savignone in Parlatore 1848, I.
(Assai probabilmente importata dallo Oriente)

373 Aegilops Aucheri Boiss.
1846 Savignone in Parlatore 1848. I.
(Assai probabilmente importata come la precedente)

374 Aegilops caudata L.
1846 Savignone in Fiori 1896, I.
(+1869) Moris. Cfr. Barbey 1884.
(Avventizia come le precedenti)

375 Aegilops cylindrica Host
1804 Balbis — 1835 Tenore
1806 Sternberg

376 Aegilops ventricosa Tausch
1804 Balbis — 1869 Ces. Pass. Gib.
1860 Amidei in Carvel
1882 Nyman
— β fragilis (Parl.)
1835 Tenore — 1848 Moris in Parlatore I.

377 Aegilops uniaristata Vis.
1877 Freyn — 1887 Groves
1871 Tommasini. Cfr. Tomm. Fl. Lus. 1895

377* Aegilops triticoides Req.
(Triticum vulgare × Aegilops ovata G. G.)
1826 Gassone — 1848 Parlatore

378 Aegilops ovata L.
1550 Cibo – 15 Mattioli – 1719 Monti – 1726 Zannichelli.
– β biuncialis (Vis.)
1887 Groves
– γ triaristata (W.)
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1826 Gussone – (1719 Monti)

379 Aegilops triuncialis L.
1785 Allioni – 1820 Presl – 1826 Gussone
1828 Naccari

Secale (Tourn.) L.

380 Secale Cereale L. R
Originaria, a quanto pare, dell'Asia occid. e dell'Europa orient. temperata, coltivasi dall'epoca romana (Plinio) ~~da molti secoli~~ ~~[illegible]~~ e spesso avventizio.
~~[illegible]~~
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.
– β montanum (Guss.)
1825 Gussone – 1855 Huet Pl. exs. neap. et sic.

Hordeum (Tourn.) L.

381 Hordeum vulgare L. R
Oriundo dall'Asia occid., coltivasi fino dall'era romana
1415 Rinio 1551 Aldrovandi – 1554 Mattirolo – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino

– β hexastichum (L.) R
Noto dall'epoca romana
1788 Arduino
– γ distichum (L.) R
1415 Rinio 1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino – 1788 Arduino

382 Hordeum bulbosum L.
1696 Cupani – 1719 Monti – 1789 Ucria
1802 Viviani.

383 Hordeum secalinum Schreb.
1719 Monti – 1785 Allioni – 1806 Baltis – 1824 Pollini.

384 Hordeum maritimum With.
1696 Cupani – 1719 Monti – 1785 Allioni – 1798 Savi
– β Gussoneanum (Parl.)
1827 Gussone (H. secalin.)

385 Hordeum murinum L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1717 Patarol

Élymus L.

386 Elymus arenarius L.
1785 Allioni – 1802 Soffren – 1882 Cadet e Heldreich in Nyman. (Avventizio?)

387 Elymus europaeus L.
1719 Monti – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1833 Moris in Bertoloni I.

35/0018-49

388 Elymus Caput-Medusae L.
1831 Tenore – 1828 Moris – 1833 Gasparrini in Bertoloni I.
– β asper (Simonkai)
1839 Tommasini. Cfr. Marchesetti 1882 e Parlatore 1848 2
1882 Todaro in Nyman
– α Bobartii Asch. et Graebn.
1867 Ardoino – 1882 Saint Lager 1
– β crinitus (Schreb.)
→ qui

Fam. 9 Cyperaceae

Cypérus (Tourn.) L.
389 Cyperus levigatus L.
1833 Gussone in Bertoloni (ex Cosyra)
1844 Tineo in Gussone.
– β distachyus (All.)
1789 Allioni – 1696 Cupani – 1806 Bivona – 1820 Presl.

390 Cyperus serotinus Rottb.
1685 Trionfetti – 1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1729 Micheli – 1745 Séguier. 1745 Sabbati.

391 Cyperus flavescens L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1717 Patarol – 1719 Monti – 1729 Micheli.

392 Cyperus globosus All.
1789 Allioni – 1822 Pollini – 1833 Molineri e Balbis in Bertoloni I. (Avventizio?)

393 Cyperus polystachyus Rottb.
1824 Tenore – 1833 Giraldi, Tenore ecc. in Bertoloni I.

394 Cyperus aristatus Rottb.
Dell'Africa trop. ed Indie or. e occ., non fu trovato finora in Italia.
– β Boeckeleri Cavara
1896 Cavara in Atti Ist. bot. di Pavia (Prob. importato e avventizio)

395 Cyperus fuscus L.
1696 Cupani – 1717 Patarol – 1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1729 Micheli.

396 Cyperus difformis L.
1816 Nova e Balbis – 1822 Pollini – 1824 Cornolli – 1827 Gussone.

397. Cyperus glomeratus L.
1719 Monti – 1729 Micheli – 1745 Sabbati 1785 Allioni – 1815 Savi.

398. Cyperus glaber L.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini – 1827 Gussone

399 Cyperus esculentus L. R
1565 Rivin
1558 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1592 Colonna – 1595 Pona – 1640 Castelli

400 Cyperus rotundus L R
1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1719 Monti – 1729 Micheli.

401. Cyperus longus L. R
1565 Rivin
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1729 Micheli.
— β badius (Desf.)
1820 Presl – 1827 Sutton – 1839 Parlatore

402 Cyperus Papyrus L. R
Originario d'Siria, Palestina, Afr. tropicale, fu importato dagli Arabi in Sicilia ed è naturalizzato da secoli.
1583 Cesalpino – 1592 Alpino – 1697 Boccone – 1719 Monti.

403 Cyperus aegyptiacus Gloxin.
1712 Patarol – 1719 Monti – 1729 Micheli – 1726 Zannichelli.

Eriophorum L.

404 Eriophorum polystachyum L.
1719 Monti – 1808 Biroli – 1822 Pollini 1824 Tenore.
1565 Micheli

— β latifolium (Hoppe)
1719 Monti – 1785 Allioni – 1802 Suffren 1816 Nouv. e Balbis.
— γ gracile (Koch)
1833 Turio e Bonjean in Bertoloni I – 1834 Cornalia

405 Eriophorum vaginatum L.
1719 Monti – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1805 Re.

406 Eriophorum alpinum L.
1729 Micheli – 1719 Monti – 1785 Scheuchzeri Allioni – 1802 Suffren – 1822 Pollini.

407. Eriophorum Scheuchzeri Hoppe
1804 Balbis – 1729 Micheli – 1822 Pollini.

Fuirena Rottb.

408 Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
1833 Soleirol e Sutton in Bertoloni I.
1850 Kralik – 1852 Reguien e Jordan in Parlatore II

Scirpus (Tourn.) L.

409 Scirpus Michelianus L.
1729 Micheli in Tilli – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1816 Nouv. e Balbis – 1822 Pollini.

22

410 Scirpus silvaticus L.
1719 Monti — 1729 Micheli — 1785 allion. — 1802 Saffren — 1806 Balbis.
— β radicans (Schker)
1869 Cesati in Cos. Pall. Gib.

411 Scirpus maritimus L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1726 Zannichelli.
— β compactus (Krock.)
1729 Micheli — 1754 Séguier.

412 Scirpus Cariæ Retz.
1729 Micheli — 1785 allion. — 1806 Balbis — 1816 Nocca e Balbis — 1820 Moretti.

413 Scirpus Holoschoenus L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1719 Patarol — 1719 Monti — 1729 Micheli.
— β globifer (L. fil.)
1729 Micheli — 1827 Gussone — 1879 Parlatore.
— γ romanus (L.)
1719 Monti — 1729 Micheli — 1818 Sebastiani e Mauri.
— δ australis (Mutt.)
1719 Monti — 1820 Moricand — 1822 Pollini.

414 Scirpus lacustris L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1719 Patarol — 1726 Zannichelli.

414bis Scirpus carinatus Sm.
(S. lacustris × triquetrus)
1869 Rosellini in Cos. Pall. Gib. — 1879 Reverchon Pl. de Corse — 1882 Arcangeli — 1900 Jelmi.

415 Scirpus litoralis Schrad.
1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1822 Pollini.
— β Philippi Tineo.
1846 Philippi in Tineo.

416 Scirpus triquetrus L.
1551 Aldrovandi — 1719 Patarol — 1729 Micheli — 1785 allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli.

417 Scirpus pungens Vahl
1729 Micheli — 1785 allioni — 1802 Saffren — 1806 Balbis.

418 Scirpus mucronatus L.
1719 Monti — 1729 Micheli — 1745 Séguier — 1798 Savi.

419 Scirpus supinus L.
1804 Balbis — 1815 Savi — 1822 Pollini — 1834 Comolli.

420 Scirpus setaceus L.
1719 Monti – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1815 Savi.
– β Savii (Seb. et Maur.)
1696 Cupani – 1729 Micheli – 1789 Moris – 1820 Presl – 1818 Sebastiani e Mauri

421 Scirpus fluitans L.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1815 Savi. 1822 Pollini.

422 Scirpus caespitosus L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini (Sec. Arch. e Graebn. in Italia si avrebbe soltanto la forma: austriacus (Palla) A. et Gr.
– β. mixtus Fouc. et Mand.
1900 Foucaud.

423 Scirpus alpinus Schleich.
1852 Reuter in Parlatore II.
1882 Nyman

424 Scirpus pauciflorus Lightf.
1837 Facchini in Bertoloni III – (1804 Balbis – 1822 Pollini – 1880 Savardo e Bizzozero.

425 Scirpus parvulus R. et S.
1829 Moris – 1833 Cernazai e Bertoloni in Bertoloni I.

Heleocharis R. Br.

426 Heleocharis acicularis (L.) R. Br.
1696 Boccone – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1806 Balbis.

427. Heleocharis carniolica Koch
1848 De Notaris – 1852 Cesati in Parlatore II – Decaisne – 1897 Coppichal. – 1856 Franzoni Cfr. A. Terracc. in Malp. 1888

428 Heleocharis palustris (L.) R. Br.
1696 Cupani – 1719 Monti – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1802 Suffren.
– β nebrodensis (Parl.)
1827 Gussone – 1845 Parlatore.
– γ amphibia (Schult.)
1822 Pollini. Cfr. Goiran 1897 – 1852 Parlatore – 1864 Savardo.
– δ multicaulis (Sm.)
1839 Puccinelli in Bertoloni IV.

429 Heleocharis caduca (Dal.) Schult.
(+1869) Bertoloni f. Moris, 1837 Facchini in Bertoloni III, 1884 Cfr. A. Terracciano in Malpighia 1888 – 1884 Mueller in Berkey. Cfr. Ten.

430 Heleocharis ovata (Roth.) R. Br.
1801 Balbis – 1808 Biroli – 1822 Pollini 1825 Lanfossi – 1828 Romano

431 Heleocharis atropurpurea Lestib.
1844 Rota. Cfr. Parlatore II 1852.
1831 Cesati. Cfr. A. Terracc. Malp. 1888

35/0018-51

Fimbristylis Vahl

432 Fimbristylis exilis (Poir.) R. S.
Il tipo dell' Africa trop. e America meridionale manca all' Italia.

— β Cioniana (Savi)
1842 Savi in Parlatore, 1852, II — 1844 Puccinelli

433 Fimbristylis squarrosa Vahl.
1729 Micheli — 1815 Savi — 1842 Puccinelli.

434 Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
1792 Bellardi — 1806 Balbis — 1816 Pollini.

— β adventitia (Ces.)
(F. squarrosa × dichotoma ?)
1863 Cesati in Linnaea XXXII, 261

435 Fimbristylis annua (All.) R. S.
1729 Micheli — 1745 Ségnier — 1785 Allioni — 1820 Moricand — 1816 Pollini

Schoenus L.

436 Schoenus nigricans L.
(+1711) Cupani — 1717 Patarol — 1726 Zannichelli — (1719 Monti) — 1729 Micheli

437 Schoenus ferrugineus L.
1804 Balbis — 1822 Pollini — 1847 Facchini in Bertoloni VII.

Cladium R. Br.

438 Cladium Mariscus (L.) R. Br.
1550 Cibo — 1696 Cupani — 1697 Bononie — 1719 Monti

Rhynchospora Vahl

439 Rhynchospora alba (L.) Vahl
1729 Micheli — 1785 All. — 1808 Biroli — (1815 Savi — 1822 Pollini) — 1855 Pirona — 1844, Cesati

440 Rhynchospora fusca (L.) Dryand.
1729 Micheli — 1834 Comolli — 1833 Cesati, Schleicher, De Notaris in Bertoloni I.

Cobresia W.

441 Cobresia myosuroides (Vill.) Fiori
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1844 Cesati.

442 Cobresia bipartita (All.) Dalla Torre
1785 Allioni — 1805 Re — 1853 Rota

Carex L.

443 Carex Davalliana Smith.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1824 Pollini.

444 Carex dioica L.
1729 Micheli — 1806 Balbis — 1824 Pollini.

445 Carex pulicaris L.
1729 Micheli – 1852 Rota in Parlatore II – 1855 Brumati in Pirona

446 Carex capitata L.
2(1854 Ambrosi in Bertoloni X
1(1846 Facchini in Ambrosi 1854.

447 Carex rupestris Bellardi.
1785 Allioni – 1852 Montini in Parlatore II – 1882 Mabille in Ryman
1745 Sabbati –

448 Carex microglochin Wahlb.
1785 Allioni – 1804 Balbis – 1852 Bonjean in Parlatore II.

449 Carex pauciflora Lightf.
1808 Biroli – 1844 Cesati – 1852 Facchini, Leybold in Hausm. – 1854 Ambrosi – 1853 Rota – 1852 Parlatore.

450 Carex baldensis L.
1620 Bauhin Casp. – 1745 Seguier – 1824 Pollini; Comolli.

451 Carex cyperoides L.
1729 Micheli – 1808 Biroli – 1854 Jan in Bertoloni.

452 Carex incurva Lightf.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1808 Biroli

453. Carex foetida Vill.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1811 Gaudin (+1852) Facchini in Bertol. X.

453* Carex Kükenthalii Dörfler.
(C. foetida × heleonastes v. lagopina)
1875 Favre, ~~Guide bot. Simplon~~ Kneucker
1899 Kneucker Allg. bot. Zeitschr. – 1904 Chenevard.

453** Carex Laggeri Wimm.
(C. foetida × stellulata Kukenth.)
1899 Kneucker Allg. bot. Zeitschr. – 1902 Correns in Asch. Graebn. II.

454 Carex microstyla J. Gay
(C. foetida × brunnescens Asch. Gr.)
1846 Thomas in Rchb. Ic. VIII – 1852 Bonjean in Parlatore II – 1854 Lagger in Bertol. X.

455 Carex curvula All.
1785 Allioni – 1792 Bellardi – 1808 Biroli.

456 Carex divisa Huds.
1697 Cupani – 1719 Monti – 1729 Micheli – 1789 Uoria
– β chaetophylla (Steud.)
1894 Arcangeli – 1896 Bicknell
– γ stenophylla (Wahlb.)
1846 Rchb. Ic. VIII – (+1852) Facchini. c/r Ambrosi 1854.

35/0018-52

457. Carex arenaria L.
1729 Micheli – 1843 Koch – 1835 Tenore. 1890 Terracciano A. in Bull. Soc. bot. it.
– β ligerica (J. Gay) [~~C. prandiarenaria Rchb.~~]
1879 Porta (p. 257).
– γ disticha (Huds.)
1785 Allioni – 1806 Sternberg – 1835 Tenore
1897 Pospichal.

458 Carex paniculata L.
1719 Monti – 1729 Micheli – 1785 Allioni.
– β paradoxa (W.)
1804 Balbis – 1852 Parlatore II (1897 Pospichal)
– γ teretiuscula (Good.)
1852 Rota in Parlatore II ed in Prosp. piant. Pav. – (+1852) Facchini in Bertol. X.

459. Carex vulpina L.
1551 Aldrovand. II
1719 Monti – 1729 Micheli – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

460. Carex muricata L.
1563 Cesalpino – 1717 Patarol – 1729 Micheli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
– β divulsa (Good.)
1696 Cupani – 1729 Micheli – 1804 Balbis – 1806 Bivona – 1808 Biroli.

461. Carex distachya Desf.
1729 Micheli – 1806 Bertoloni – 1807 Bivona – 1820 Presl

462 Carex brizoides L.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1808 Bivona – 1815 Savi
– β praecox (Schreb.)
1804 Balbis – 1811 Gaudin – 1821 Nova e Balbis – 1816 Pollini.

463 Carex leporina L.
1729 Micheli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Biroli.

464 Carex heleonastes Ehrh.
1852 Parlatore – 1855? Pirona – 1869 Cesati, Pass. Gib.
– β lagopina (Wahlenb.)
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1811 Gaudin – 1852 Parlatore

465 Carex elongata L.
1785 Allioni – 1806 Balbis – 1808 Biroli – 1821 Nova e Balbis.

466 Carex echinata Murray
1719 Monti. Cfr. Bertoloni X – 1729 Micheli – 1804 Balbis – 1806 Sternberg.
– β grypos (Schkuhr)
2 (1852 Parlatore – ~~1846 Facchini~~ in ~~Rchb. Ic. VIII~~ 1843 Facchini in
1 (Láng, Flora XXVI e Rchb. Ic. VIII.

467 Carex canescens L.
1785 Allioni – 1804 Balbis – 1805 Re

— β brunnescens Pers.
1852 Parlatore II — 1854 Meneghini e Lagger in Bertoloni X.

468 Carex remota L.
1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1745 Séguier.

468* Carex axillaris Good.
(C muricata × remota Ritsch.)
(+1841) Romano. Cfr Fiori P. B. Fl. anal.

469. Carex bicolor Bell.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli.
1853 Rota — 1854 Pacher in Ambrosi

470 Carex caespitosa L.
1897 Pospichal (da confermarsi)
— β stricta (Good.)
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1820 Moricand — 1824 Pollini.
— γ. Buekii (Wimm.)
1863 Cesati in Ces. Pass. Gib. 1869 — 1897 Pospichal
— δ acuta (L.)
1717 Patarol — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1754 Séguier — 1802 Suffren.
— ε Goodenowii (J. Gay)
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1806 Balbis — 1818 Ruchinger
— ζ intricata (Tineo)
1844 Tineo in Gussone — 1852 Requien in Parlatore II

471 Carex Buxbaumii Wahlb.
1854 Montini in Bertoloni X — 1893 Gelmi.

472 Carex Vahlii Schkuhr
(+1852) Facchini e Ambrosi in Bertoloni X — 1893 Gelmi.

473 Carex atrata L.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1808 Biroli.
— β nigra (Bellardi)
c. 1750 Moreni. Cfr. Pollini 1824 — 1785 Allioni — 1808 Bivona-Bernardi — 1824 Pollini.

474 Carex digitata L.
1729 Micheli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β pediformis (C. A. Mey.)
1855 Huber e Hausmann. Cfr. Dalla Torre e Sarnth.
— γ ornithopoda (W.)
1820 Moretti — 1824 Pollini — 1854 Ambrosi e Montini in Bertoloni X°.
— δ subnivalis (Arv. Touv.)
1897 Valbusa in N. Giorn. bot. it.
— ε ornithopodioides (Hausm.)
(+1852) Facchini in Bertoloni X.

473* Carex pseudonigra Rota
1853 Rota

473** Carex Sieberi Rota
(C. atrata × frigida?)
1853* Rota

35/0018 - 53

475. Carex alba Scop.
1729 Micheli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1824 Pollini.

476 Carex humilis Leyss.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1824 Pollini.

477 Carex Halleriana Asso
1789 Allioni – 1804 Bertoloni – 1806 Balbis – 1824 Pollini.
– β basilaris (Jord.)
1867 Ardoino – 1896 Bicknell

478 Carex montana L.
1729 Micheli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1824 Pollini.

479 Carex ericetorum Pollich
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1852 Bonjean in Parlatore II – (†1882) Facchini in Ambros. 1854.
– β approximata (All.) Rchb.
1785 Allioni – 1897 Borbás in Fritsch Beitr. Bezon in Bull. T. 5. 1906.

480 Carex verna Chaix
1551 Alpinus II
1583 Cesalpino – 1729 Micheli – 1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
– β insularis Christ
1840 Lisa. Cfr. Barbey 1884, p. 64.
– γ longifolia (Host)
1804 Balbis – 1808 Biroli – 1821 Nocca e Balbis – 1824 Pollini.

480* Carex caryophyllea × ferruginea Asch. et Graebn.
1903 v. Fischer-Benzon in Asch. et Graebn. II p. 231.

481* Carex pilulifera L. *)
1785 Allioni – 1808 Savi – 1819 Bertoloni – (†1852) Facchini in Ambros. 1854.

482 Carex tomentosa L.
1719 Monti – 1785 Allioni – 1804 Balbis – 1818 Ruchinger – 1824 Pollini.

482* Carex Grioletii Rom.
(Viviani Griolet in) 1804 Viviani – (1852 Parlatore) – 1854 Griolet e Turio in Bertoloni X. Cfr. Béguinot in Malp. 1901.

483 Carex pallescens L.
1729 Micheli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1824 Pollini.

484 Carex pilosa Scop.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1806 Balbis

485 Carex olbiensis Jord.
(1847 De Notaris. Cfr. Ardoino 1867 –
((†1737) Micheli. Cfr. Parlatore II, 1852.
1852 Gennari

486 Carex capillaris L.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Biroli 1824 Pollini.

*) Non pilulifera. La grafia pillulas corretta (Rchb.) citata dal Della Torre. Savoi 1906, p. 336 e anche Matz

487 Carex strigosa Huds.
1729 Micheli – 1815 Savi – 1854 Gasparrini in Bertoloni X.

488 Carex pendula Huds.
1551 Aldrovandi – 1696 Cupani – 1719 Monti – 1729 Micheli – 1724 Zanoni

489 Carex microcarpa Bert.
2 (1827 Bertoloni in Moris
1 (1807 Déséglise. Cfr. Gren. Godr. III 1855
1822 Salzmann Cfr. l. c.

490 Carex nitida Host.
1818 Ruchinger; Balbis – 1825 Re
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854.

490* Carex Ferdinandi-Sauteri Asch. Gräbn.
(C. nitida × caryophyllea)
1899 Sauter.

491 Carex panicea L.
1726 Zannichelli – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Balbis.
– β parsiflora Wahlb.
1896 Bornmüller in Bull. Herb. Boiss.

Carex atrofusca Schkuhr (1801)
492 Carex ustulata Wahlb. (1803)
1806 Sternberg – 1820 Sieber. Cfr. Dalla T. Sarn. 1906. – ♀ 1869 Ces. Pass. Gib. – ♀ 1855 Clément in Gren. Godr. III –

493 Carex limosa L.
1785 Allioni – (+1852) Facchini in Ambrosi 1854 – 1893 Gelmi
– β irrigua Wahl. (1803) magellanica Lam. (1789) = C. limosa var.
(+1833) Gaudin e Montini in Parlatore II –
1854 De Notaris, Facchini, Montini in Bertoloni X – 1893 Gelmi.

4 Carex glauca Murray
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1719 Monti – 1729 Micheli – 1745 Séguier.
– β serrulata (Bivona)
1806 Bivona-Bernardi – 1820 Presl.
1752 Sabbati

495 Carex hispida W.
1806 Bivona-Bernardi – 1826 Gussone
1828 Moris.

495* Carex hispida × serrulata Christ
1888 Burnat in Christ, Bull. Soc. bot. Belg. XXVII.

496. Carex mucronata All.
1729 Micheli – 1785 Allioni – 1819 Bertoloni

497 Carex macrolepis DC.
1729 Micheli – 1819 Bertoloni – 1830 Orsini – 1842 Puccinelli.

498 Carex brachystachys Schrank
1830 Balbis. Cfr. Bertoloni X – 1852 Facchini, Montini in Parlatore II.
– β tenax (Rent.)
1852 Reuter. Cfr. Dalla T. Sarn. 1906 –
– 1899 Murr – 1890 Bäckeler. Cfr. l. c.

35/0018-54

499. Carex frigida All.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli (†1852) Facchini in Ambrosi 1854 – 1854 Montini in Bertoloni X.
— β fuliginosa (Schk.)
1854 Menegazzi in Bertoloni X – 1857 Rota

500 Carex ferruginea Scop.
1729 Micheli – 1754 Séguier – 1785 Allioni 1808 Biroli – 1819 Bertoloni – 1824 Pollini
— β fimbriata (Schk.)
1882 Ball in Arcangeli.
— γ firma Host
1806 Balbis – 1808 Biroli – 1824 Pollini.
— δ temperiens (Vill.)
1804 Balbis – 1808 Biroli – 1824 Pollini.
— ε levis (Kitaib.)
1879 Porta (Huter e Rizzo). Cfr. Nyman Suppl. 321.

501 Carex Micheli W.
1729 Micheli – 1798 Savi – 1824 Poll.m.

502 Carex depauperata Good. (1789)
Carex ventricosa Curt. (1790)
1808 Biroli – 1814 Balbis – 1844 Guglielmo – 1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr. Freyn 1877.

503. Carex silvatica Huds.
1729 Micheli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1806 Balbis – 1808 Savi.
— β Tommasini Rchb
1844 Tineo in Guglielmo – 1846 Tommasini in Rchb. Ic. VIII.
1837 Biasoletto e Tomasini Cfr. Freyn, 1877.

504 Carex punctata Gaud.
1821 Acquier in Link Enum. pl. Hort. berol. – 1844 De Notaris.

505 Carex distans L.
1719 Monti (1551 al Dioscoride) – 1729 Micheli – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier – 1785 Allioni
— β Hornschuchiana (Hoppe)
1852 Parlatore – 1844 Casati – 1854 Ambrosi
— γ fulva (Good.)
1785 Allioni – 1824 Pollini – 1854 Montini in Bertoloni X – 1864 Ambrosi
— δ binervis (Sm.)
1855 Kralik in Grenier et Godron – 1891 Sommier in Somm. e Levier, N. Giorn. bot. ital.
— ε levigata (Sm.)
1855 Grenier et Godron.

506 Carex extensa Good.
1563 Cesalpino – 1729 Micheli – 1726 Zannichelli – 1813 Balbis, Cat. Hort. Bot. Taurin.

507 Carex Mairii Coss. e Germ.
1863 Ardoino – 1885 Bicknell

508 Carex flava L.
1719 Monti – 1726 Zannichelli – 1765 Séguier – 1785 Allioni
— β Oederi Retz.
1729 Micheli – 1806 Balbis – 1819 Bertoloni

508* Carex flava × Hornschuchiana F. Schultz.
1893 Gelmi.

508** Carex adulterina Chenevard
(C. Oederi × punctata Bruegg.)
1902 Chenevard e Brugger

509 Carex Pseudocyperus L.
1719 Monti — 1729 Micheli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

510 Carex rostrata With.
1806 Balbis — 1824 Pollini
(Sternberg)

511 Carex vesicaria L.
1729 Micheli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1808 Biroli

512 Carex riparia Curt R
1551 Aldrovandi II
1717 Patarol — 1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1745 Séguier.
— β acutiformis (Ehrh.)
1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1754 Séguier — 1806 Balbis.
— γ ramosa Pamp.
1903 Pampanini in Ann. Bot. Roma.

512* Carex Nicoloffii Pampan.
(C. riparia γ ramosa × caespitosa β stricta)
1903 Pampanini in Ann. Bot. Roma

513 Carex nutans Host
1852 Clementi in Parlatore II.

514 Carex filiformis L.
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854 — 1854 Ambrosi in Bertoloni X — 1853 Rota.

515 Carex hirta L.
1719 Monti — 1729 Micheli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — [illegible]
— β hirtiformis (Pers.)
1853 Rota — 1864 Savardo

516 Carex hordeistichos Vill.
(1854 Bonjean e Thomas in Bertoloni X
(1848 Maly — 1882 Nyman

Fam. 10 Palmae

Phoenix L.

517 Phoenix dactylifera L. R
Originaria dell'Arabia e del Sahara, coltivata e subspontanea nell'Italia più australe da molti secoli.
1415 Rinio
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
1640 Castelli.

Chamaerops L.

518 Chamaerops humilis L. R
1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1591 Cortuso (colt.) — 1640 Castelli.
(1551 Rinio Aldrovandi II)
— β arborescens Pers.
Coltivazi.
1591 Cortuso — 1720 Pontedera

518' Chamaerops (Trachycarpus) excelsa Thunb.
Della Cina e Giappone. Introdotta in Europa intorno 1820 e fra noi dopo il 1850; p. e a Napoli 1867 (Pasquale)
Vive in pieni aria in quasi tutta Italia

Fam. 11 Typhaceae 27 35/0018-55

Typha (Tourn.) L.

519 Typha minima Hoppe
1550 Cibo (Petrus) — 1719 Monti — 1785 Allioni.
1816 Pollini.

520 Typha stenophylla F. et M.
1866 Barbieri. Cfr. Sacc. Vis. 1869.

521 Typha angustifolia L.
1550 Cibo (Petrus) — 1563 Cesalpino qui — 1745
Séguier — 1719 Monti)

522 Typha latifolia L. R
1415 Rinio
1554 Mattioli — 1561 Anguillara —
1563 Cesalpino — 1585 Durante
— β Shuttleworthii (Koch et Sond.)
1869 Cesati, Passerini, Gibelli.

Sparganium (Tourn.) L.

523 Sparganium erectum L. e.p.
1550 Cibo (Petrus) — 1554 Mattioli (1551 Aldrovandi II) — 1563
Cesalpino — 1585 Durante — 1719 Monti
— β neglectum (Beeby)
1893 Magnus e Mori in Ascherson
Oesterr. bot. Zeitschr.

523* Sparganium Aschersonianum Haussk.
(S. ramosum × simplex Gelmi)
1898 Gelmi.

524 Sparganium simplex Huds.
1719 Monti — 1808 Biroli — 1821 Balbi
e Nocca — 1824 Pollini.

525 Sparganium natans L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1824
Zantedeschi in Pollini.
— β minimum (Fr.)
1852 Facchini in Hausmann — 1854
Montini in Bertoloni X — 1893 Gelmi

Fam. 12 Araceae.

Acorus L.

526 Acorus Calamus L. R
Originario delle Indie or. ora
naturalizzato in molti luoghi d'Italia
La droga (almeno) era nota anche ai Romani.
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585
Durante — 1719 Monti — 1729 Micheli.
1745 Séguier. (se non la pianta)
1551 Aldrovandi II

Colocasia Schott.

527 Colocasia antiquorum Schott R
Originaria delle Indie, ma da secoli
coltivata e naturalizzata nell'Italia
australe.
~~1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585~~
~~Durante — 1719 Monti — 1729 Micheli~~
1532 Cibo (1551 Aldrovandi II) — 1563 Cesalpino — 1565
Mattioli — 1640 Castelli.

Arum (Tourn.) L.

528 Arum pictum L. fil.
1824 Viviani — 1827 Moris.

527
Nat
dall
173
Zo

Zantedeschia Spr.

527 Zantedeschia aethiopica (L.) Spr.

Nativa dell'Africa merid. Coltivata dalla prima metà del 1600 circa.

1735 Micheli — 1752 Sabbati — 1780 Fasetti — 1793 Zaccagni — 1801 Bonato.

529. Arum maculatum L.
1550 Petrus Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1697 Cupani
– β cylindraceum Gasparrini.
1697 Cupani – 1844 Gasparrini in Gussone

530. Arum italicum Mill. R
1415 Rinio 1550 Petrus Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni

Dracunculus (Tourn.) Adans.

531. Dracunculus vulgaris Schott R
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

532. Dracunculus muscivorus (L. fil.) Parl.
1824 Viviani – 1827 Moris
1828 Loiseleur.

Biarum Schott

533. Biarum tenuifolium (L.) Schott
1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1565 c. Michiel – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1822 Bertoloni.

534. Biarum Bovei Decaisne
(+1869) Moris. Cfr. Barbey 1884.

Arisarum (Tourn.) Adans.

535 Arisarum vulgare Targ. Tozz. R
1550 Petrus Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani
(+1320) Crescenzio, edit. 1471 –

536 Arisarum proboscidéum (L.) Savi
1697 Boccone – 1816 Savi – 1820 Tenore.

Ambrosinia Bassi

537 Ambrosinia Bassii L.
1694 Boccone – 1696 Cupani – 1763 Bassi.
– β maculata (Ucria)
1696 Cupani – 1844 Gussone
– γ reticulata (Tineo)
1696 Cupani – 1827 Tineo, Cat. Horti Panorm. – 1844 Gussone

Jam. 13 Lemnaceae

Lemna L.

538 Lemna polyrhiza L.
1729 Micheli – 1772 Maratti – 1785 Allioni – 1806 Balbis.

539 Lemna trisulca L.
1563 Cesalpino – 1729 Micheli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

540 Lemna minor L. R
1415 Rinio 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1729 Micheli – 1745 Séguier.

541 Lemna gibba L.
1729 Micheli – 1772 Maratti – 1785 Allioni

35/0018-56

Wolffia Horkel

542. Wolffia arrhiza (L.) Wimm.
1729 Micheli — 1798 Savi — 1833 Soleirol in Bertoloni I.

Fam. 4 Najadaceae.

Potamogéton (Tourn.) L.

543. Potamogeton pectinata L.
1694 Boccone — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1806 Balbis.
— β marina (L.)
1785 Allioni — 1835 Contarini, Moris ecc. in Bertoloni II.
1780 Turra

544. Potamogeton pusilla L.
1785 Allioni — 1780 Turra — 1798 Savi — 1802 Marzari.
— β hichoides (Cham. et Schl.)
1694? Boccone — 1842 Tenore — 1858 Parlatore.

544* Potamogeton mucronata Schrad.
1897 Pospichal — 1900 Foucaud.

545 Potamogeton acutifolia Link.
1785 Allioni — 1880 Turra — 1822 Pollini — 1835 Moris in Bertoloni II

546. Potamogeton graminea L.
1804 Balbis — 1835 Moris in Bertoloni II

Veneto?

547. Potamogeton natans L.
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1717 Patarol.
— β fluitans (Roth)
1820 Moricand — 1822 Pollini — 1828 Giorini-Mazzanti.
— γ polygonifolia (Pourr.)
1802 Viviani — 1835 Ottaviani in Bertoloni II.
— δ colorata (Horn.)
1827 Guscone — 1835 Moris in Bertoloni II — 1844 De Notaris.

548 Potamogeton lucens L.
1745 Séguier i Sabbati — 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren.
— β alpina (Balb.)
1804 Balbis — 1822 Pollini.

549 Potamogeton crispa L.
1717 Patarol — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1780 Turra — 1806 Balbis.

550 Potamogeton perfoliata L.
1745 Séguier — 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

551 Potamogeton densa L.
1696 Cupani — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1816 Nouae Balbis — 1822 Pollini
— β serrata (L.)

Ruppia L.

552 Ruppia maritima L.
1729 Micheli – 1772 Marratto –
1785 Allioni – 1802 Suffren
– β depauperata (Tineo)
1827 Moris – 1844 Gussone
– γ rostellata (Koch)
1729 Micheli – 1858 Doria, Orsini, Re-
guien in Parlatore III – (1844 Gussone)
– δ brachypus (J. Gay)
1827 Moris.

Zannichellia (Mich.) L.

553 Zannichellia palustris L
1720 Pontedera – 1729 Micheli –
1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Suffren.
– β dentata (Rth.) – 1854 Gasparrini in
Bertoloni X.
– β pedicellata (Buch.-Ham.)
1858 Parlatore – 1882 Arcangeli.

Althenia F. Petit

554 Althenia filiformis F. Petit
1849-50 Rabenhorst in Flora – 1855
Huet, Pl. Reap. et Sic. exs.

Posidonia Koenig

555 Posidonia oceanica (L.) Del.
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785
Allioni – 1785 Allioni.

Zostera L.

556 Zostera marina L.
1802 Suffren – 1820 Moricand
1819 Bertoloni –
1796 Ucria –

557 Zostera nana Roth
1750 Gmelin – 1819 Bertoloni.
1867 Zanardini

Cymodocea Koenig.

558 Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1792
Carolini, De Rhizagrost. Reap.

Najas L.

559 Najas marina L.
1726 Zannichelli – 1729 Micheli –
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Savi.
– β intermedia (Wolfg.)
1901 Rendle in Engl. Pflanzenfam.
– γ muricata (Del.)
1901 Rendle l. c.

560 Najas minor L. 1752 Sobolati
1729 Micheli – 1754 Seguier – 1785
Allioni – 1806 Savi.

561 Najas graminea Del.
1816 Pollini – 1821 Nocca e Balbis

35/0018-57

Fam. 15 Hydrocharitaceae

562 Helodea canadensis Rich.
(= Anacharis canadensis (Rich.) Planch.)
Oriunda del Canadà, fu introdotta in Irlanda nel 1836 e successivamente nel resto d'Europa. Il prof. Agostini la ebbe a Mantova da Altona nel 1866 e da Mantova la spedì all'Orto Padovano nel 1867. Da questa epoca si diffuse ostinatamente e naturalizzò in tutto il Veneto, nella Lombardia, nel Lazio nel Napoletano ecc., come e meglio d'una malerba indigena. Cfr. Béguinot sulla pres. in H. della H. c. 1897 e Fiori in Fl. anal. e App.

Vallisneria (Mich.) L.

563 Vallisneria spiralis L.
1697 Boccone – 1729 Micheli – 1745 Séguier.

Stratiotes L.

564 Stratiotes aloides L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1826 Moretti – 1844 Cesati – 1842 Barbieri e Campana in Bertoloni V.

Hydrocharis L.

565 Hydrocharis Morsus-ranae L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1571 Mattioli – 1745 Séguier.

Fam. 16 Alismataceae

Alisma L.

567 Alisma parnassifolium Bassi-in L.
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1808 Biroli.
⊙ vedi appendi

568 Alisma Plantago L. R
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1562 Mattioli 1566 Calzolari – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1595 Pona.
— β lanceolatum (With.)
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1824 Comolli
— γ graminifolium Wahlb.
1822 Moretti – 1816 Nova e Balbis – 1827 Re.

569 Alisma ranunculoides L.
1802 Soffren – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone – 1827 Moris.

Sagittaria L.

566. Sagittaria sagittifolia L. R
1550 Cibo – 1565 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino 2ni 1566 Calzolari – 1585 Durante

Damasonium (Tourn.) Mill.

567* Alisma natans L.
1847 Zanardini – 1897 Pospichal
da portarsi sopra al segno ⊙

570. Damasonium Alisma Mill.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1789
Ucria — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Guss.
— β Bourgaei (Coss.)
1842 Gussone — 1884 Ascherson in Bar-
bey 1884.

571. Damasonium polyspermum Coss.
1890 Richter Pl. Eur. I, 220 — 1894 Arcangeli

Butomus (Tourn.) L.

572. Butomus umbellatus L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1562
Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Da
Vinci — 1726 Zannichelli.

Fam. 17 Juncaginaceae.

Triglochin (Rupp.) L.

573. Triglochin maritima L.
1726 Zannichelli — 1729 Micheli
1785 Allioni — 1802 Suffren.

574. Triglochin palustris L.
1729 Micheli — 1754 Seguier —
1785 Allioni — 1802 Suffren.

575 Triglochin Barrelieri Loisel.
(†1673) Barrelier — 1729 Micheli — 1818
Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone
1827 Moris.

576 Triglochin laxiflora Guss.
1826 Gussone — 1831 Tenore

Schenchzeria L.

577 Schenchzeria palustris L.
1854 Viewheider a Hausmann
1858 Huguenin a Parlatore III.

Fam. 18 Commelinaceae

578 Commelina communis L.
Originaria della Cina e del Giappo-
ne, Talora coltivata e spesso qua
e là naturalizzata vedi appendice
1890 Pirotta in N. Giorn. Bot. Ital. — 1898
Ugolini in Malf. — 1902 Murr. Cf.
Dalla Torre e Sarnth. 1906.

579 Commelina virginica L.
Dell'America sett. inf., cent. e merid.
Coltivata nel Padovano Veneziano fino dal 1798
(Farsetti), a Firenze 1806 (Zuccagni-
ni), trovasi inselvatichita presso
Pavia: 1838 L. Bizzi, acerbo
~~Milano (Selten Soc. it. Sc. nat.)~~

Tradescantia L.

579' Tradescantia virginica L.
Nativa della Virginia. Comunemente colti-
vata fino dal principio del settecento.
1703 Martyn — 1760 Allioni — 1793 Zuccagni
— 1780 Farsetti — 1801 Amato

Fam. 19 Juncaceae

Juncus (Tourn.) L.

580 Juncus glaucus Ehrh.
1563 Cesalpino — 1713 Vitaliano — 1719 Monti —
— 1723 Micheli in Tilli — 1745 Seguier.

a Padova fino dal 1713 (Vitaliano) — Fi-
renze 1750 (Manetti) — Roma, 1766 (Vallisn.)
nel Veronese fino dal 1767 (Martyn)

35/0018-58

— β paniculatus (Hoppe)
1852 Tommasini in Parlatore II
1870 Terracciano a. — 1898 Fiori in Bologna.
— γ depauperatus (Tenore)
1832 Tenore — 1877 Sanguinetti — 1842 Puccinelli.

580* Juncus Leersii Marss.
(J. conglomeratus × glaucus B. et T.)
1897 Penzig.

580** Juncus diffusus Hoppe
(J. conglomeratus β effusus × glaucus Schmidt)
1852 Parlatore.

581. Juncus conglomeratus L.
1554 Mattioli — 1585 Durante — 1696 Capari — 1719 Monti — 1729 Micheli.
— β effusus (L.)
1561 Anguillara (Oxyschoenus, sec. Bauh.) — 1696 Capari — 1719 Monti — 1756 Séguier.
— γ fistulosus (Guss.)
1827 Gussone — 1845 Parlatore.

582 Juncus arcticus W.
1801 Balbis — 1837 Molineri e Facchini in Bertoloni IV.

583 Juncus filiformis L.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1802 Moyari — 1822 Cristofoli in Pollini.

584 Juncus acutus L.
1640 Castelli — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1785 Allioni
— β multibracteatus (Tineo)
1827 Tineo in Gussone — 1852 Parlatore

584* Juncus Tommasinii Parl. (×?)
1852 Tommasini in Parlatore II

584** Juncus variegatus Carmel (×?)
1870 Carmel in Nuovo Giorn. bot. it.

585 Juncus maritimus Lam. R
1715 Pamp
1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli.
1815 Savi — 1820 Moricand — 1827 Gussone.
— β rigidus (Desf.)
1832 Gussone — 1852 Parlatore

586 Juncus obtusiflorus Ehrh.
1719 Monti — 1729 Micheli — 1798 Savi — 1822 Pollini.

587 Juncus articulatus L.
1563 Cesalpino — 1719 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β acutiflorus (Ehrh.)
1798 Savi — 1822 Pollini — 1835 Cornolti
— γ atratus (Krock.)
1852 Manganotti in Parlatore

— β striatus (Schousb.)
(+1711) Cupani — 1824 Viviani — 1827
Gussone.
— ε Fontanesii (J. Gay)
1827 Gussone — 1845 Parlatore
— ζ Thomasii (Ten.)
1824 Tenore — 1839 Gussone in
Bertoloni IV.
— η alpinus (Vill.)
1723 Micheli in Tilli — 1789 Allioni
— 1818 Sebastiani e Mauri.
— ϑ anceps (De la Harpe)
1852 Caruel e Frorini — Mazzanti a
Parlatore II.
— ι Gussonei (Parlat.)
1827 Gussone — 1852 Parlatore

588 Juncus heterophyllus Duf.
1723 Micheli in Tilli — 1852 Parlatore

589 Juncus supinus Moench
1723 Micheli in Tilli — 1831 Tenore
— 1852 Parlatore.

587* Juncus acutiflorus × lamprocarpus Buch.
(+1879) Tommasini in Buchenau. Cfr.
Asch. et Graebn. II.

587** Juncus Buchenaui Dörfl.
(J. alpinus × lamprocarpus Buch.)
(+1883) Cesati in Asch. et Graebn. II
587*** Juncus anceps × lamprocarpus Murbeck
1890 Buchenau. Cfr. Asch. & Graeb. II

587**** Juncus acuminatus Michx.
Dell'America sett., avventizio nel
Lazio.
1830-35 Sanguinetti. Cfr. Chiovenda
a Malp. 1898 p. 415.

— qui
590. Juncus subulatus Forsk.
1824 Viviani — 1826 Gussone — 1828
Moris.

591 Juncus squarrosus L.
1853 Rota — (+1886) Franzoni 1890.

592 Juncus tenuis W.
1891 Armitage, Cat. delle piante Dint.
Pallanza — 1894 Caboni in Arcangeli.

593. Juncus compressus Jacq.
1719 Monti — 1726 Zannichelli — 1729
Micheli — 1745 Séguier
— β Gerardi (Lois.)
1824 Viviani — 1831 Tenore — 1832 Gussone

594. Juncus bufonius L.
1718 Pontedera — 1719 Monti — 1723
Micheli — 1754 Séguier — 1785 Allioni
— β Hostii (Tausch)
1729 Micheli — 1852 Parlatore — 1864
Saccardo (J. castaneus)

35/0018-59

595 Juncus Jacquinii L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Pollini. (Cesati, Passerini in Gibelli e Schauer in)

596 Juncus trifidus L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Pollini (Cesati, Passerini, Gibelli in)

597 Juncus castaneus Sm.
1826 Sieber. Cfr. Parlatore II e Dalla T. Sarnth. 1906 (Da confermarsi!)

598 Juncus stygius L.
1854 Leybold e Ambrosi in Parlatore II (Da confermarsi!)

599 Juncus capitatus Weig.
1729 Micheli — 1806 Balbis — 1816 Nocca e Balbis — 1827 Gastone.

600 Juncus pygmaeus Rich.
1824 Viviani — 1839 Seraffini in Bertoloni IV. — 1882 Huet, Todaro in Nyman.

601 Juncus bufonius L.
1696 Cupani — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1754 Séguier.
— β foliosus (Desf.)
1852 Parlatore — 1882 Arcangeli.
— γ hybridus (Brotero)
(1827 Gastone — 1742 Monti — 1723 Micheli in Tilli — 1798 Savi — 1818 Seb. e Mauri)

Juncus tenageia Ehrh.
1804 Balbis — 1820 Moretti — 1822 Pollini.
(1729 Micheli)

Luzula DC.

603 Luzula pilosa W.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1805 Re — 1806 Balbis.
— β Forsteri (DC).
1771 Micheli (Holsteum) — 1787 Moris — 1798 Savi — 1816 Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani e Mauri.

604 Luzula flavescens (Host) Gaud.
1853 Rota (1852) Facchini in Ambrosi 1854 — (1837 Savi)

605 Luzula spadicea (All.) DC.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1816 Nocca e Balbis.
— β glabrata (Hoppe)
1785 Allioni — 1837 Savi 1869 Savando e Viviani

606 Luzula lutea (All.) DC.
1729 Micheli — 1808 Biroli — 1837 Savi — 1869 Savando e Viviani.

607 Luzula silvatica (Huds.) Gaud.
1729 Micheli — 1719 Monti — 1745 Séguier — 1785 Allioni

— β Sieberi (Tausch)
1827 Gussone — 1852 Parlatore.
— γ conglobata Goir.
1886 Goiran (L. maxima)

607* Luzula Lepetitiana R. Beyer.
(L. silvatica × pedemontana)
1899 R. Beyer in Verhandl. B. V. Brandenb.

608. Luzula nivea (L.) DC.
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1707 Martini — 1713 Tita — 1745 Sabbat.
— β lactea (E. Mey.)
1877 Gillot in Bull. Soc. bot. France, XXIV p. LXXIV.
— δ albida (DC.)
2 1568 c. Michiel 1696 Cupani — 1719 Monti — 1729 Micheli — 1816 Nocca e Balbis
— γ pedemontana (Boiss. et Reut.)
1 1839 Savi e Thomas in Bertoloni IV. (L. albida e p.)
1842 Puccinelli — 1852 Parlatore

609 Luzula campestris (L.) DC.
1551 Aldrovandi (f. multiflora) — 1729 Micheli — 1745 Séguier.
— β congesta (Thuill.)
1729 Micheli — 1745 Séguier — 1832 Gussone.
— γ sudetica (W.)
1729 Micheli — 1852 Parlatore.
— δ calabra (Tenore)
1824 Tenore — 1852 Thomas in Parlatore II

608* Luzula Levieri Asch. et Graebn.
(L. pedemontana × nivea)
1890 Levier ap. Buchenau in Engl. Jahrbücher.

609* Luzula depauperata R. Beyer.
(L. spicata × sudetica ?)
1899 Rostan in R. Beyer, Verhandl. B. V. Brandenb.

610 Luzula spicata (L.) DC.
1723 Micheli in Tilli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini

611 Luzula nutans (Vill.) Duv. Jouv.
1789 Allioni — 1839 Molineri e Balbis in Bertoloni IV — 1867 Ardoino.

fam. ~~18~~ 20 Liliaceae

Narthecium Moehr.

612 Narthecium ossifragum (L.) Huds.
1839 Gussone e Soleirol in Bertoloni IV — 1855 Grenier e Godron III.
— β Reverchoni (Celak.)
1889 Reverchon in Celakovski, Oesterr. bot. Zeitschr.

Tofieldia Huds.

35/0018-60

613 Tofieldia calyculata (L.) Wahlb.
1595 Pona — 1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1808 Biroli.
— β (Iglacialis (Gaud.) capitata (Hoppe)
1854 Ambrosi — 1858 Parlatore — 1893 Gelmi
— γ collina (Gmel.)
1907 Fiori App. (Prob. inclusa dagli aut. nel tipo)
614 Tofieldia palustris Huds.
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854 — 1863 Molendo. Cfr. Dalla Torre Sarn. 1906.

6 Veratrum L.

614 Veratrum album L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1726 Zannichelli.

614 Veratrum nigrum L.
1550 Petroli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1713 Tita — 1802 Suffren
1565 c. Michiel

Colchicum (Tourn.) L.

615 Colchicum montanum L.
(Il tipo non è ancora noto d'Italia)
— β pusillum (Sieb.)
1810 Bertoloni — 1824 Tenore — 1827 Moris; Zeraphe, Fl. Melit. — 1844 Tineo in Gussone
— γ Cupani (Guss.)
1696 Cupani — 1827 Gussone

618. Colchicum alpinum DC.
1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis — 1818 Balbis — 1819 Bertoloni
— β parvulum (Tenore)
1824 Tenore — 1844 Gussone,

619. Colchicum neapolitanum Tenore
1824 Tenore — 1855 Grenier e Godron — 1858 Gussone, Gasparrini ecc. in Parlatore III.
— β variopictum Janka.
1855 Janka in Oesterr. bot. Zeitschr.
— γ Kochii (Parl.)
1858 Rellner e Tommasini in Parlatore III.
— δ corsicum (Baker)
1880 Baker in Journ. of Linn. Soc.

620 Colchicum autumnale L. R
1415 Rinio 1550 Petroli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari
1585 Durante — 1595 Pona.
— β Tenorei (Parl.)
1824 Tenore — 1858 Parlatore II.
— γ vernale (Hoffm.)
1839 Facchini in Bertoloni IV.
— δ Todaroi (Parl.)
1858 Todaro in Parlatore II.

620* Colchicum longifolium Castagne
1855 Grenier e Godron — 1867 Ardoino — 1905 Aschert. e Graebn. III.
— β provinciale (Loret)
1905 Sommier in Boll. Soc. bot. ital.

621 Colchicum Bivonae Guss.
2 (1806 Bivona-Bernardi — 1821 Gussone
1 (1640 Castelli — 1696 Cupani

Bulbocodium L.

622 Bulbocodium vernum L.
1792 Bellardi — 1806 Balbis — 1839 Gussone in Bertoloni IV — 1858 Parlatore III.

Erythronium L.

623 Erythronium Dens-canis L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1566 Calzolari — (1565 Mattioli) — 1583 Cesalpino — 1595 Pona.

Tulipa L.

624 Tulipa silvestris L.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1785 Allioni
— β australis (Link)
1811 Tenore — 1832 Bertoloni — 1852 Parlatore

625 Tulipa saxatilis Sieber (1825)
Oriunda di Creta ed Asia minore, da pochi lustri coltivata ed ora naturalizzata qua e là in Toscana.
1860 Beccari in Bicchi — 1896 Martelli in Fiori ~~P. B. Fl. anal.~~ I.

626 Tulipa Clusiana DC.
Oriunda della Lisia e della Persia; coltivata già da 2-3 secoli in Italia (1630 Ferrari — 1717 Patarol) ed ora qua e là largamente naturalizzata
1822 Reboul — 1839 Targioni-Tozzetti in Bertoloni IV — 1842 Narducci e Ricasoli in Bertoloni V.

627. Tulipa Oculus-solis St. Am.
Originaria forse dell'Asia occidentale; comunque oggi trovasi estesamente naturalizzata in molti luoghi d'Europa e in molte varietà o sottospecie.
1822 Reboul — 1854 Gussone
— β maleolens (Reboul)
1823 Reboul — 1842 Puccinelli
— γ praecox (Ten.)
1811 Tenore — 1822 Reboul

—

627* Tulipa Martelliana Lev.
(T. Oculus-solis β × Gesneriana α?)
1884 Martelli in Levier.

627** Tulipa apula Guss.
1826 Gussone in Tenore — 1852 Parlatore — 1889 Terracciano N.

628 Tulipa strangulata Reb.
Forse d'origine orientale, ma ora largamente diffusa e naturalizzata
1822 Reboul — 1852 Parlatore

35/0018-61

— β Sommierii (Lev.)
1871 Sommier in Levier, (Orig. des Tulip.)
— γ Passeriniana (Lev.) (Tul. d'Eur.)
1871 Passerini (T. Didieri) — 1884 Levier
(Forma ibrida?) in N. Giorn. bot. ital.

629 Tulipa Gesneriana L.
Oriunda dell'Asia occid. e centr.
Introdotta nel 1559 in Europa e descritta dal Gesner; coltivata già in Italia nel 1592 (Del Riccio) nel 1630 (Ferrari), 1640 (Castelli) ecc.; spesso fuggiasca dai giardini e subspontanea nelle seguenti sottospecie:
— α spathulata (Bert.)
1822 Reboul — 1842 Puccinelli.
— β Didieri (Jord.)
1852 Parlatore — 1884 Levier — 1894 Perrier e Songeon in Bull. Herb. Boiss.
— γ serotina (Reboul)
1838 Reboul — 1884 Levier

Fritillaria (Tourn.) L.

630 Fritillaria persica L.
Oriunda probabilmente dell'Asia occid.
~~coltivata~~ fu importata in Italia int. il 1576 probabilmente dal Costantinopol. e probabilmente ~~coltivata a Ferrara~~ per la prima volta in Europa (De Condenhove) e successivamente coltivata a Padova, 1600 (Cortuso) e 1660 (Dalla Torre), a Bologna 1657 (Ambrosini) a Roma, 1737 (L. Sabbati) ecc. Fuggiasca dai giardini fu trovata qua e là inselvatichita: [illegible] in
1846 Rolli — 1886 Ⓟ Orcangeli — 1895. 1897 Béguinot — Cfr. per molti di questi dati: Bég. in Bull. Soc. bot. it. 1899.

632 Fritillaria messanensis Ref.
1814 Rafinesque — 1807 Bivona-Bernardi — 1826 Gussone

631 Fritillaria delphinensis Gren.
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854 — 1855 Grenier e Godron

633 Fritillaria involucrata All.
1629 Parkins. Parad. terrestr. 1789 Allioni — 1839 Bertero in Bertoloni IV

634 Fritillaria tenella M. B.
1839 Tommasini e Biasoletto in Bertoloni IV — 1855 Pirona
— β micrantha Beck.
1904 Bönitz in Beck, Wiss. Mitt. Bosn. Herc. IX.
— γ Orsiniana (Parl.)
1852 Parlatore — 1889 N. Terracciano
— δ intermedia N. Terracc.
1896 N. Terracciano.
— ε pollinensis N. Terracc.
1896 N. Terracciano
634 Fritillaria imperialis L.
Originaria dell'Oriente, Coltivata fino dal cinquecento.
1565 Michiel — 1822 Pollini — 1780 Farsetti

Lilium L.

635 Lilium candidum L.
1415 Rimini — 1550 Petrus Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino 1585 Durante

Ⓟ Baldacci in Mattei Aggiunte Fl. Bolognese Bologna.

636. Lilium bulbiferum L. R
1551 Aldrovandi (teste Bertol.) – 1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante

637 Lilium Martagon L.
1415 Pinio
1532 Cibo – 1558 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona
— β villosum Persona
1899 Perona e Cavara in Malpighia.

638 Lilium pomponium L. R.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1839 Sutti e Balbis in Bertoloni IV
— β carniolicum Bernh.
1558 Matthioli – 1822 Pollini – 1802 Suffren – 1881 Schlyters in Joiran 1897.

Lloydia Salisb.

639. Lloydia serótina (L.) Rchb.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1835 Comolli – 1852 Perini, Bari in Hausmann II – 1876 Joiran, edit. 1904.

640. Lloydia graeca (L.) Endl
1856 Huet in Nyman Consp.

Gagéa Salisb.

641. Gagea pratensis (Pers.) Dum.
1852 Rota in Parlatore – 1854 Ambrosi.

642. Gagea lutea R. et S.
1745 Seguier – 1802 Suffren – 1816 Nova e Balbis – 1820 Pollini.
— β Brentae Evers.
1896 Evers in Verhandl. Zool. bot. gesell. Wien.

643 Gagea pusilla (Schm.) Schult.
1839 Tommasini in Bertoloni IV.
— β luteadanea Gmel. et Schenk
1905 A. Terracciano in Bull Herb. Boiss.

644 Gagea minima (L.) Ker-Gawl.
(+1886) Franzoni in Franzoni 1890.
1896 Calvelli in ~~F.P.B.~~ Fiori I

645 Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
1852 Gennari in Parlatore – 1896 ~~F.P.B.~~ Fiori I.

646 Gagea fistulosa (Ram.) Ker-Gawl.
1835 Comolli – 1854 Ambrosi.

646* Gagea intermedia (Schleich.) Rchb.
(G. minima × fistulosa Asch. et Graebn.)
1899 Béguinot in Bull. Soc. bot. Ital.

647 Gagea arvensis (Pers.) Dum.
1532 Cibo – 1595 Pona – 1606 Colonna – 1735 Micheli – 1745 Seguier – 1785 Allioni

35/0018-62

— β Granatelli (Parl.)
1839 Parlatore. Cfr. Parlatore II — 1842 Gussone.
— γ ~~[illegible]~~ saxatilis (Koch)
1811 Tenore — 1842 Gussone

647* Gagea foliosa Schult.
1827 Gussone — 1845 Parlatore

647* Gagea bohemica (Zauschn.) R. S.
1901 Béguinot e Sommier in Bull. Soc. bot. Ital.

Ornithogalum (Tourn.) L.

648. Ornithogalum exscapum Ten
1811 Tenore — 1814 Rafinesque — 1826 Jan — 1844 De Notaris.
— β ambiguum (N. Terracc.)
1889 N. Terracciano.

649 Ornithogalum refractum Kit.
1827 Moris — 1839 Tommasini in Bertoloni IV — 1844 De Notaris — 1845 Parlatore
— β Adalgisae (Groves)
1887 Groves.
— γ brutium (N. Terracc.)
1838 Tenore — 1889 N. Terracciano.

650 Ornithogalum montanum Cirillo.
1811 Tenore — 1814 Rafinesque — 1826 Jan — 1827 Gussone

651 Ornithogalum comosum L.
1550 Cibo (Petrus) — 1827 Tenore, Index semin. Horti Reap.
— β Kochii (Parl.)
1852 Tommasini in Parlatore II
— γ tenuifolium (Guss.)
1827 Gussone — 1829 Tenore — 1837 Sanguinetti.
— δ collinum Guss.
1825 Gussone — 1830 Tenore

652 Ornithogalum umbellatum L. R
1415 Rinio
1561 Anguillara — 1566 Calzolari (1563 Cesalpino) — 1640 Castelli.
— β divergens (Bor.)
1832 Gussone — 1877 Freyn — (+1869) Moris in Barbey 1884

653 Ornithogalum arabicum L.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1824 Viviani.

654 Ornithogalum nutans L.
Originario dell'Europa orient. ed Asia minore. Trovasi qua e là inselvatichito.
1606 Colonna — 1818 Sebastiani e Mauri — 1839 Facchini in Bertoloni IV.
— β Boucheanum (Kunth)
1880 Grimus Cfr. Dalla T. Sarnth. 1906.

655. Ornithogalum narbonense L.
1550 Cibo (Petrus) — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1785 Allioni.

(Q; Sardagna.)

656 Ornithogalum pyrenaicum L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1808 Bivoli – 1819 Bertoloni.

Urginea Steinh.

657 Urginea maritima (L.) Bak. R
1415 Rinio
1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1785 Allioni.
1551 Aldrovandi II

658 Urginea fugax (Moris) Steinh.
1827 Moris – 1852 Bonjean in Parlatore.

659 Urginea undulata (Desf.) Steinh.
1827 Moris – 1855 Ponzolz e Bernard in Grenier e Godron III.

Scilla L.

660 Scilla autumnalis L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1798 Savi – 1816 Nocca e Balbis – 1802 Suffren

661 Scilla obtusifolia Poir.
1827 Moris – 1852 Requien in Parlatore II
— β intermedia (Guss.)
1697 Cupani – 1789 Uoria – 1825 Gussone

662 Scilla italica L.
~~1802 Viviani~~ 1785 Allioni – 1804 Bertoloni; Viviani

663 Scilla peruviana L.
1844 De Notaris – 1854 Parlatore
— β sicula (Tineo)
1827 Gussone – 1842 Tineo in Gussone
— γ Hughii (Tineo)
1832 Tineo in Gussone
— δ Cupanii (Guss.)
1696 Cupani – 1810 Rafinesque – 1825 Gussone

664 Scilla hyacinthoides L.
(+1711) Cupani – 1713 – 1826 Gussone – 1839 Rillo in Bertoloni IV

665 Scilla bifolia L.
1550 Petrus Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Porta – 1640 Castelli – 1745 Séguier.

666 Scilla amoena L.
Dell'Europa orient. ed Asia occid., spesso coltivata ma da oltre 2 secoli qua e là naturalizzata:
1696 Cupani – 1796 Farsetti – 1822 Pollini – 1839 Naccari in Bertoloni IV

667 Scilla hispanica Mill.
È propria della Spagna, Portogallo ecc., ma è tanto diffusa anche in Italia che meglio che naturalizzata parrebbe da aversi come spontanea e indigena.
1804 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1839 Montini, Zanardini ecc. in Bertoloni IV – 1852 Parlatore

35/0018-63

668 Scilla non-scripta (L.) H. et L.
Originaria di Spagna e Inghilterra, coltivata a Padova fino dal 1642 (Vesling sub Hyac. belgic.), ~~1657~~ a Bologna 1657 (Ambrosini) ecc., ma da molto tempo però anche qua e là inselvatichita:
1797 Host. — 1822 Pollini — 1869 Parolini in Sacc. e Vis.

Hyacinthus (Tourn.) L.

669 Hyacinthus orientalis L. R
Dell'Asia occid.; ma non è escluso che trovisi indigeno qua e là anche fra noi, quantunque sia più probabile una naturalizzazione in seguito all'estesissima coltura fattane fino dal cinquecento:
1532 Cibo — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante. E come naturalizzato: 1806 Suffren in DC. Syn. Fl. Gall. 1839 Bertoloni IV (e Puccinelli) — 1852 Parlatore — 1867 Ardoino ecc.

670 Hyacinthus fastigiatus (Viv.) Bert.
1825 Viviani — 1839 Bertoloni IV — 1827 Moris — 1617 Pona (od. ital.)

670* Hyacinthus Webbianus (Parl.)
(Hyac. romanus × Muscari comosum Car.)
1854 Parlatore.

671 Hyacinthus romanus L.
1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1735 Micheli.

672 Hyacinthus dubius Guss.
1821 Gussone — 1830 Tenore.

673 Hyacinthus trifoliatus Ten.
1824 Tenore — 1885 Bicknell (sub Bellev. Webbiana)
— β pendulinus Chiov
1896 Chiovenda in F. P. B.

674. Hyacinthus ciliatus Cirillo.
1792 Cirillo — 1824 Tenore.

Muscari (Tourn.) Mill.

675 Muscari moschatum W.
Originario dell'Asia occident., donde introdotto a Costantinopoli l'ebbero fra i primi in Italia il Mattioli e il Cortuso. Da molti anni coltivasi e trovasi anche qua e là inselvatichito:
1565 Mattioli (Bulb. vomit.) — 1585 Durante — 1642 Vesling — 1697 Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone — (+1724) Clarici 1727 (Cfr. circa al Cortuso)

— β flavum Lam
1697 Cupani — 1842 Gussone

676. Muscari comosum (L.) Mill. R
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino
— 1554 Mattioli — 1585 Durante
1640 Castelli — 1726 Zannichelli
— β Holzmanni (Freyn)
qui 1877 Freyn — 1885 Hackel in Freyn, Flora LXVIII
— γ tenuiflorum (Tausch)
(+1844) Sieber. Cfr. Freyn. in Flora
1885 (f. constricta)
— δ pyramidale (Tausch)
1841 Sieber in Tausch, Flora XXIV
1839 Bracht. (Vicenza) Cfr. Freyn, Flora 1885 LXVIII

677 Muscari maritimum Desf.
(+1711) Cupani — 1844 Gussone.

— β Gussonei (Parl.)
1827 Gussone — 1852 Parlatore

678 Muscari parviflorum Desf.
1825 Gussone — 1852 Parlatore

679 Muscari commutatum Guss.
1789 Acria — 1826 Gussone.
1839 Mauri; Tenore ecc. in Bertoloni IV. 1415 Rinio
1852 Becki in Parlatore II.

680 Muscari racemosum (L.) Mill.
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1735
Micheli — (1726 Zannichelli) — 1745 Séguier

— β neglectum (Guss.)
1842 Tenore — 1854 Gussone.

681 Muscari botryoides Mill.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1745
Séguier — 1790 Bellardi — 1802
Suffren — 1806 Sternberg.
β Kerneri (Marchesetti)
1882 Marchesetti in Bull. Soc. Adr.
Sc. nat.

Dipcadi Med.

682 Dipcadi serotinum (L.) Med.
Indigeno di Spagna, Portogallo, Barberia,
era coltivato nell'orto bot. di Torino
nel 1772 (Allioni); ma fu dato
dall'Allioni stesso (1785) anche come spontaneo in
Liguria. Fose avventizio?

Allium (Tourn.) L.

683 Allium sativum L. R
Biondo dall'Asia centrale, ma coltivato
dovunque da secoli e talora subspontaneo
1551 Anguillara — 1554 Mattioli —
1583 Cesalpino — 1585 Durante

683 Allium scorodoprasum L.
Biondo dall'Europa media e orient., ma
coltivato da secoli e talora subspontaneo

35/0018-64

685 Allium Ampelóprasum L.
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1729 Micheli – 1789 Ucria
— β Porrum (L.) R
Indigeno e coltivato da secoli e forse derivato dal tipo per effetto di coltura.
1415 Rinio 1561 Anguillara – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante
— δ hemisphaericum Somm.
685. 1907 Sommier in F. P. B.

686 Allium multiflorum Desf.
1836 Colla – 1839 Sassi in Bertoloni IV.
— 1844 De Notaris
1815 De Candolle Fl. Fr. V

686 Allium rotundum L.
1844 De Notaris – 1852 Tommasini, Passerini ecc. in Parlatore II.
— β Waldsteinii (G. Don)
1864 Tommasini. Cfr. Freyn 1877.
— γ scariosum (Jan)
1872 Marsilly – 1884 Reverchon in Barbey.
— δ Preslianum (Schultz fil.)
1822 Presl – 1842 Gussone

687 Allium vineale L.
1583 Cesalpino – 1729 Micheli – 1754 Séguier.

688 Allium sphaerocephalum L.
1415 Rinio 1696 Cupani – 1729 Micheli – 1816 Pollini

— β arvense (Guss.)
1825 Gussone – 1830 Tenore – 1845 Parlatore.
— γ sardoum (Moris)
1828 Moris De Notaris
— δ descendens (L.)
1827 Gussone – 1828 Fiorini-Mazzanti

690 Allium margaritaceum S. et S.
1830 Tenore – 1832 Gussone.

691 Allium carinatum L.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1826 Nocca e Balbis.
— β violaceum (W.)
1785 Allioni – 1798 Savi – 1822 Pollini
— γ asperum (G. Don)
1848 Facchini ~~in F.P.B.~~ (+1876) Vanzo in Bolzon 1898.
in Rchb. Ic. X

— δ flavum (L.)
1785 Allioni – 1696 Cupani – 1811 Tenore – 1839 Jan in Bertoloni IV.
— ε ligusticum (De Not.)
1846 De Notaris
— ζ pulchellum (G. Don)
1595 Porta – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi.
— η nebrodense (Guss.)
1827 Gussone – 1830 Tenore – 1839 Jan in Bertoloni IV.
— ν calabrum (Terr. N.)
1889 N. Terracciano –

692 Allium oleraceum L.
1805 Re — 1804 Savi — 1822 Pollini (A. carinat.) 1826 Gussone
— β paniculatum (L.)
1811 Tenore — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone — 1822 Pollini
— γ pallens (L.)
1745 Séguier — 1606 Colonna
1827 Gussone — 1852 Parlatore
— δ tenuiflorum (Ten.)
1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone — 1830 Tenore.

693 Allium maritimum Rafin.
1810 Rafinesque — 1696 Cupani —
1813 Tenore, Cat. Horti Neap. — 1827 Gussone

694 Allium parciflorum Viv.
1825 Viviani — 1827 Moris — 1872 Marsilly.

695 Allium Cupani Rafin.
1696 Cupani — 1810 Rafinesque — 1826 Gussone.

696 Allium moschatum L.
1830 Tenore — 1852 Noé, Mauri ecc.
m. Parlatore II

697 Allium fistulosum L. R
Oriundo della Siberia, fu coltivato negli orti botanici fino dal 1772 a Torino (Allioni), a Firenze ~~1793~~ 1793 (Zuccagni), a Padova ~~1812~~ 1801 (Bonato) ed ora anche nelle ortaglie.

698 Allium Cepa L. R
Originario della Persia, coltivato da secoli e trovasi qua e là subspontaneo
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.

699. Allium Ascalonicum L. R
Probabilmente oriundo d'Asia, coltivasi da secoli.
1415 Rinio 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.

700. Allium Schoenoprasum L.
1562 Mattioli — 1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli
1867 Ardoino — È pure coltivato.

701 Allium Victorialis L.
1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1837 Sandi — 1855 Pirona. 1565 Mattioli (All. anguin.)

702 Allium narcissiflorum Vill.
1785 Allioni — 1867 Ardoino
— β insubricum (Boiss. et Reut.)
1835 Comolli — 1844 Cesati

35/0018-65

703 Allium angulosum L.
1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger
– β montanum (F. W. Schm.)
1697 Bocone – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

704 Allium strictum Schrad.
1852 Tappeiner in Hausmann – 1871 Faure. Cfr. Nym. Consp. Suppl. 308.

705 Allium suavéolens Jacq.
1726 Zannichelli – 1774 Ginanni – 1818 Ruchinger – 1822 Pollini – 1797 Host.
– β ochroleucum (W. et K.)
1551 Aldrovandi – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier – 1818 Ruchinger.

706 Allium globosum M. B.
1852. Tommasini Parlatore II – 1878. Schunck in Oest. bot. Zeitschr.

707 Allium Chamaemoly L.
1606 Colonna – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1789 Uoria – 1843 Sendtner in Freyn 1877.

708 Allium subhirsutum L.
1792 Cirillo – 1696 Cupani – 1818 Sebastiani e Mauri.

– β trifoliatum Cirillo.
1792 Cirillo – 1827 Gussone.
– γ subvillosum (Salzm.)
1832 Tineo in Gussone – 1845 Parlatore.

709 Allium roseum L.
(+1711) Cupani – 1745 Sabbati – 1785 Allioni – 1789 Uoria – 1804 Viviani.
– β permixtum (Guss.)
1827 Gussone.

710 Allium neapolitanum Cir.
1788 Cirillo – 1798 Savi – 1806 Bivona – Bernardi – 1819 Bertoloni. 1754 Séguier 1822 Pollini.

711 Allium triquetrum L.
1797 Cupani – 1806 Bivona – Bernardi – 1820 Moricand
– β pendulinum (Ten.)
1617 Porta – 1696 Cupani – 1818 Sebastiani e Mauri

712 Allium ursinum L.
1569 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Porta – 1696 Cupani.

713 Allium nigrum L.
1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1792 Cirillo.

— β Cyrilli (Tenore)
(+ 1799) Cirillo sec. Tenore 1824 — 1852 Gussone e Tenore in Parlatore II.

714. Allium siculum Ucria
1697 Bonone — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone

Aphyllanthes (Tourn.) L.

715. Aphyllanthes monspeliensis L.
1785 Allioni — 1824 Viviani — 1836 Colla — 1839 Mauri in Bertoloni IV
1905 Ugolini, Quinto elenco di piante Bresc.

Asphodelus (Tourn.) L.

716 Asphodelus ramosus L.
1808 Biroli — 1789 Ucria — 1811 Tenore
1855 Pirona — 1867 Marsilly
— β albus (L.)
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona
— γ microcarpus (Viv.)
1824 Viviani — 1852 Moris in Parlatore II.

717 Asphodelus fistulosus L.
1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1735 Micheli — 1745 Séguier —

— β tenuifolius (Cav.)
1884 Lojacono.

Asphodeline Reichenb.

718 Asphodeline lutea (L.) Rchb.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1585 Michiel — 1585 Durante 1595 Pona — 1640 Castelli.

719 Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
1565 Michiel 1772 Scopoli — 1816 Briganti — 1824 Tenore.

Paradisia Mazzuc.

720 Paradisia Liliastrum (L.) Bertol.
1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona — 1745 Séguier.

Symethis Kunth

721 Symethis Mattiazzi (Vand. Jul. 1771) Sacc.*)
(= S. planifolia (L. Oct. 1771) Gr. Godr.
1824 Viviani — 1828 Moris — 1839 Seraffini, Soleirol in Bertoloni IV.

Anthericum L.

722 Anthericum ramosum L.
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1595 Pona
1726 Zannichelli.

Nota
*) Sacc. Di S. Vandelli, in atti e mem. della R. Accad. di Padova. 1900, p. 76

35/0018-66

723 Anthericum Liliágo L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino — 1745 Séguier — 1785 Allioni

Hemerocallis L.

724 Hemerocallis flava L.
Oriunda dall'Ungheria fino alla Siberia; coltivata da remotissimi tempi e qua e là naturalizzata.
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1745 Séguier — 1789 Allioni — 1802 Suffren — 1806 Balbis.

725 Hemerocallis fulva L.
Originaria, coltivata e naturalizzata come la precedente.
1563 Cesalpino — 1818 Ruchinger — 1820 Moretti — 1825 Lanfossi.

Funkia Spreng.

725* Funkia subcordata Spreng.
Del Giappone; coltivata comunemente dal principio dell'ottocento.
1812 Bonato — 1815 Biroli — ecc.

Agapánthus L'Herit.

725** Agapanthus (afriganus (L.) Hoffgg. a. a capo) umbellatus L'Herit.
Del Capo; coltivato comunemente dalla fine del settecento.
1796 Zuccagni — 1812 Bonato — 1815 Biroli.

Yucca Linn.

725*** Yucca gloriosa L.
Dell'America meridionale; coltivata comunemente fino dalla metà del seicento e nel 1790 quasi naturalizzata nelle sabbie intorno a Chioggia. Cfr. Olivi in N. giorn. d'Italia spettante alle Sc. nat. Veneg. 1792.
1635 Veghi Cat. Ort. bot. di Pisa — 1657 Ambrosini — 1682 Pighi Cat. ms. Orto bot. Padova — 1720 Pontedera — 1760 Allioni.

725**** Yucca aloifolia L.
Dell'America meridionale; coltivata e inselvatichita nel Lazio nel 1860. Cfr. Chiovenda in Malpighia 1897.

Aloe (Tourn.) L.

726 Aloe vera L.
Originaria dell'Africa sett. e Canarie. Coltivata fino dal quattrocento ed ora inselvatichita nel litorale dell'Italia più australe.
1415 Plinio 1640 Castelli — 1696 Cupani — 1827 Gussone.

Paris (Rupp.) L.

727 Paris quadrifolia L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1563 Cesalpino — 1595 Pona.

Convallaria L.

728 Convallaria majalis L.
1550 Petitt Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.

Ophiopógon Ait.

728* Ophiopogon japonicus (L.) Curt. Originario del Giappone, coltivato fino dal principio del secolo, p. e a Padova, 1812 (Bonato), a Treviso, 1817 (Giani), a Torino 1815 (Biroli) ecc., oggi poi è in tutti i giardini a qua e là quasi inselvatichito.

Majánthemum Web. et Wigg.

729. Majanthemum bifolium (L.) DC.
1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1785 Allioni.

Stréptopus Rich.

730 Streptopus amplexifolius (L.) DC.
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1785 Allioni — 1811 Mazzucato.

Polygónatum (Tourn.) Adans.

731 Polygonatum verticillatum (L.) All.
1563 Cesalpino — 1718 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier; Sabbati.

732 Polygonatum multiflorum (L.) All.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — β Brotéri (Guss.) Baker
1696 Cupani — 1827 Gussone.

733 Polygonatum officinale All.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1802 Suffren. — β latifolium (Desf.)
1811 Mazzucato (la forma dichotomum) — 1816 Nocca e Balbis — 1855 Pirona (Da confermarsi)

Asparagus (Tourn.) L.

734 Asparagus tenuifolius Lam.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1595 Pona.

735 Asparagus officinalis L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1726 Zannichelli — β maritimus (Mill.)
1726 Zannichelli — 1810 Brignoli — 1830 Tenore. | 1745 Sabbati

39

736 Asparagus acutifolius L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1595 Pona.

737 Asparagus aphyllus L.
1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1827 Gussone ; Moris.
– β Stipularis (Forsk.)
1696 Cupani – 1807 Brocca – Bernardi.

738 Asparagus albus L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1826 Contarini in Nocca.

739 Asparagus medeoloides Thunb.
Dell'Africa merid. ; Coltivato e qua e là inselvatichito fino dal Settecento :
1723 Tilli – 1742 Sabbati – 1782 Allioni – 1780 Forsetti – 1876 C. P. G. (inselvatichito presso Palermo) – 1882 Arcangeli (id.)

Ruscus (Tourn.) L.

740 Ruscus aculeatus L. R
1415 Rinio
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

741 Ruscus hypoglossum L. R
1415 Rinio
1532 Cibo – (1583 Cesalpino) – 1557 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1595 Pona – 1606 Colonna

742 – β Hypoglossum (L.) R
1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino – 1606 Colonna

741bis Ruscus racemosus L.
Dell'America settentrionale ; Coltivato e qua e là inselvatichito fino dal Settecento :
1678 Boccone – 1713 Tilli – 1780 Forsetti – 1802 Rodati – 1806 Martini –

Smilax (Tourn.) L.

742 Smilax aspera L. R
1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1798 Savi.
– β mauritanica (Desf.)
1696 Cupani – 1723 Tilli – 1735 Micheli

21
Fam. 19 Dioscoreaceae.

Tamus L.

743 Tamus communis L. R
1415 Rinio
1550 Dubois – Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

Fam. 22 Amaryllidaceae

Galanthus L.

744 Galanthus nivalis L.
1571 Mattioli (Narciss. III fig. inter.)
1754 Séguier — 1785 Allioni —
1804 Bertoloni — 1808 Biroli

Leucójum L.

745. Leucojum aestivum L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1802 Suffren.
1551 Aldrovandi II — 1565 c. Michiel
— β pulchellum (Salisb.)
1827 Moris — 1882 Reverchon e Marcucci in Barbey 1884.

746. Leucojum vernum L.
1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1785 Allioni — 1802 Suffren
Petrus

747. Leucojum hiemale DC.
1789 Allioni — 1806 Balbis — 1844 De Notaris.

748. Leucojum autumnale L.
1696 Cupani — 1827 Moris; Gussone
— β roseum (Lois.)
1839 Seraffini e Soleirol in Bertoloni IV — 1855 Boullu, Requien etc in Gren. e Godr. III —

749 Leucojum longifolium F. Gay.
1855 Ph. Thomas, Soleirol, Salis Marsch. in Gren. e Godron III.
1850 Roemer in Kunth Enum. pl. V. plant.

Sternbergia W. et K.

750. Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl.
1532 Cibo — 1566 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1696 Cupani.
1551 Aldrovandi — 1565 c. Michiel
— β sicula (Tineo)
1844 Tineo in Gussone

751 Sternbergia colchiciflora W. et K.
(Il tipo finora non fu constatato in Italia)
(+1673) Barrelier — 1810 Rafinesque — 1827 Gussone.
Ed. 1714
— β aetnensis (Rafin.)
qui

Amaryllis L.

751* Amaryllis Belladonna L.
Dell'Africa australe coltivata fino dal settecento e da qualche tempo abbondantemente naturalizzata
Procida
1772 Allioni — 1796 Farsetti — 1801 Bonito — Naturalizzata:
1901 Beguinot in Bull. Soc. bot. ital.

Narcissus (Tourn.) L.

752 Narcissus serótinus L.
1811 Tenore — 1827 Moris — 1853 Grech-Delicata.
— β autumnalis (Link)
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1842 Gussone

753 Narcissus Jonquilla L.

35/0018-68

1565 Mattioli – 1717 Patarol – 1812 Tenore – 1822 Pollini.

— β juncifolius (Req.)

1847 Requien. Cfr. Parlatore, 1858, III
1752 Sabbati

753* Narcissus intermedius Lois. (x?)

1844 De Notaris – 1858 Carrega in Parlatore III.

754 Narcissus cupularis (Salisb.) Bert.

Il tipo finora pare soltanto coltivato.

— β Bertolonii (Parl.)

1842 Puccinelli – 1858 Celi, Calandrini, Giannini ecc. in Parlatore III

— γ aureus (Lois.)

1858 Barla in Parlatore III

754* Narcissus senuior Curt.

(N. Jonquilla x poeticus?)

1858 Puccinelli in Parlatore III.

755 Narcissus Tazzetta L. e. p. R

1550 Fetuli Cibo – 1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1717 Patarol – 1785 Allioni

— β patulus (Lois.)

1858 Parlatore, Webb, Rolli ecc in Parlatore III.

— γ remopolensis (Panizzi)

1847 Panizzi in Giornale bot. it. I.

— δ orientalis (L.)

(+1673) Barrelier – 1811 Tenore
ed. 1714

— ε Aschersonii (Bolle)

1865 Bolle in Atti Soc. ital. Sc. nat. Milano.

755* Narcissus obliquus Guss. (x?)

1847 Gussone in Bertoloni VII – 1867 Moggridge in Ardoino.

755*** Narcissus Sequentiae Tod.

1858 Sequenza in Todaro, Ind. sem. Hort. Panorm. (Hermione Sequentiae) – 1883 Nicotra, Prodr. Fl. Messan.

755**** Narcissus syracusanus Tod.

1858 Todaro in Ind. sem. Horti Panorm. (Hermione syracusana)

755** Narcissus italicus Ker-Gawl.

(N. dubius γ papyraceus x cupularis β? Bertolonii)

1811 Tenore – 1839 Giuli in Bertoloni IV – 1867 Moggridge, Canut ecc. in Ardoino.

756 Narcissus dubius Gouan.

1861 Bourgeau Plant. nicaeus. ex. Cfr. Moggridge 1864.

— β polyanthos (Lois.)

1785 Allioni (N. Tazzetta) 1847 Reichenb. Ic. IX
1894 Debeaux

— γ papyraceus (Ker-Gawl.)

1839 Bertoloni IV – 1858 Minà in Parlatore III.

— δ unicolor (Tenore)

1811 Tenore

— ε Panizzianus (Parl.)

1858 Panizzi in Parlatore III.

— ζ Barlae (Parl.)
1858 Barla in Parlatore III — 1884 Levier — 1891 Bolzon.

757 Narcissus poeticus L. R
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren
1551 Al Brandi II
— β radiiflorus (Salisb.)
1839 Tommasini in Bertoloni IV — 1858 Savi in Parlatore III.

757* Narcissus biflorus Curt.
(N. poeticus × Tazzetta Henon)
1806 Zuccagni (colt.) — 1812 Bonato (colt.) — 1818 Ruchinger; Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini.

757** Narcissus odorus L.
(N. Pseudonarcissus × Jonquilla H. et T.)
2 (1839 Puccinelli in Bertoloni IV (naturalizz.)
1 (Coltivato a Firenze 1798 (Zuccagni), nel Piemonte 1812 (Spigno) ecc.

757*** Narcissus incomparabilis Mill.
(N. Pseudonarcissus × poeticus B. et B.)
1640 Castelli — 1810 Bertoloni — 1816 Sebastiani e Mauri

758 Narcissus Pseudonarcissus L. R
1532 Cibo — 1640 Castelli — 1785 Allioni.

Pancratium L.

759. Pancratium maritimum L. R
1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1696 Capani — 1785 Allioni

760 Pancratium illyricum L.
1565 Mattioli (Narciss. constantinop.)
1824 Viviani — 1827 Moris.

Agáve L.

761 Agave americana L.
Dell'America centrale, fu importata in Europa nel Cinquecento e coltivata e diffusa e naturalizzata ognor più specialmente nel mezzodì d'Italia.
1561 Cortuso, che la coltivò a Padova primo in Europa. Cfr Camer. Hort. H.
1565 c. Michiel — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

qui
fam. 23 Iridoceae.

Crocus (Tourn.) L.

762 Crocus biflorus Mill.
1583 Cesalpino — 1818 Sebastiani e Mauri — 1823 Tenore Fl. med. — 1826 Bertoloni

Polyanthes L.

761* Polyanthes tuberosa L.
Oriunda di Giava e Ceylon, coltivata fino dal principio del settecento:
1713 Tita — (+1724) Clarici edit. 1727 — 1723 Tilli
T. 1640 Castelli
T. 1702 Martini —

Triteleja Lindl.

Triteleja uniflora (Graham) Lindl.

Nativa dell' Argentina e del Texas. Coltivata da dopo la metà dell' ottocento Q ed ora qua e là avventizia nel Veneto e Nizzardo. 1885-1906 Goiran. Cfr. Goiran in N. giorn. bot ital. 1907, p. 539.

Q. p. e a Napoli, 1867 (Pasquale), a Padova 1875 (Visiani)

35/0018-69

763 Crocus reticulatus Stev.
1826 Bertoloni — 1855 Brumati in Pirona — 1858 Tommasini in Parlatore III

764. Crocus vernus L.
1532 Cibo — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1745 Séguier.
— β etruscus (Parl.)
1858 Parlatore III

765 Crocus versicolor Ker-Gawl.
1833 Bertoloni I — 1844 De Notaris — 1858 Ardoino in Parlatore III

766 Crocus Imperati Tenore
1825 Tenore in Cat. sem. Horti Neap.
— β suaveolens (Bert.)
1826 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri
1830 Tenore.

767 Crocus minimus DC.
1826 Bertoloni — 1827 Moris
— β sardous (Martelli)
1898 Martelli, Monocot. Sardoae
— γ corticus (Gay ~~Vanucci in Maw~~)
1827 Gay. Cfr. Parlatore III (C. minimus β)
1881 Vanucci in Maw Monogr. Crocus

768 Crocus sativus L.
3(1824 Tenore — 1826 Bertoloni.
2(1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
1(1550 Cibo — 1551 Aldrovandi —
1415 Rinio

R

— β Pallasii (Goldb.)
1826 Tenore (C. Thomasii)

769 Crocus medius Balb.
1801 Balbis — 1826 Bertoloni

770 Crocus longiflorus Raf.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1810 Rafinesque.

Romulea Maratti

771. Romulea Columnae Seb. e Mauri
1606 Colonna — 1815 Ronconi. Cfr. Parlatore III — 1827 Gussone.
— β Rollii (Parl.)
1858 Rolli in Parlatore III
— γ ramiflora (Ten.)
1827 Tenore in Ind. sem. Hort. Neap.
→ qui

772. Romulea purpurascens Tenore
1811 Tenore

773. Romulea Linaresii Parl.
1839 Parlatore.
— β ligustica (Parl.)
1858 De Notaris e Caldesi in Parlatore III
— γ Requienii (Parlatore)
1833 Requien in Bertoloni I

774* Romulea insularis Somm.
1898 Sommier in N. Giorn. bot. ital.

774 Romulea Bulbocodium (L.) Sie M.
1606 Colonna — 1697 Cupani
1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

Iris (Tourn.) L.

775 Iris florentina L.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1735 Micheli.

776 Iris pallida Lam.
1858 Todaro e Citarda in Parlatore II.

777 Iris germanica L. R
1415 Rinio 1550 Cibo qui — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — (1554 Mattioli) — 1696 Cupani — 1745 Séguier.
— β Cengialti (Ambrosi)
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854.
— γ illyrica (Tommas.)
1871 Tommasini, Veget. dell'isola di Veglia.

778 Iris variegata L.
Originaria dell'Europa centrale, coltivata e inselvatichita qua e là.
1760 (Allioni) — 1793 Zuccagni — 1812 (Bonato) — 1906 Gortani (inselvatichita)

778* Iris sambucina L.
(I. variegata × germanica ?)
1837 Sandi — 1844 De Notaris — 1855 Cernagai in Pirona (Colt. e inselvat.)

778** Iris squalens Horn.
(I. germanica × variegata ?)
1805 Berini in Wulfen — 1837 Facchini in Bertoloni III — 1893 Gelmi.

778*** Iris neglecta Horn.
(I. germanica × pallida ?)
1867 Passerini in C. P. G.

779 Iris lutescens Lam.
1858 Todaro Nuovi gen. e spec. fasc. I
(D'origine probabilmente orientale, coltivata e inselvatichita in Sicilia).

780 Iris Chamaeiris Bert.
1837 Bertoloni — 1844 De Notaris
1871 Ces. Pass. Gib.
— β olbiensis (Hénon)
1858 Webb, Bicchi, Giannini in Parlatore III.

781 Iris pumila L.
1807 Bivona-Bernardi — 1696 Cupani
1827 Gussone — 1833 Bertoloni.

782 Iris Pseudacorus L. R
1415 Rinio 1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

35/0018-70

783. Iris foetidissima L.
1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.
— β lorea (Janka)
1877 Janka in Term. Füz. I, p. 245

784. Iris sibirica L.
1806 Balbis – 1789 Allioni – 1816 Noll e Balbis
— β eriorrhiza Pospichal
1897 Pospichal

785. Iris spuria L.
1847 Zanardini – 1877 Janka in Term. Füz. I, p. 245. (Inselvatichita?)

786. Iris graminea L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1754 Séguier – 1785 Allioni.
— β collina (N. Terracc.)
1872 N. Terracciano – 1877 Janka ~~[illegible]~~ in Term. Füzet. I p. 245.

787 Iris ensata Thunb.
Dell' Asia centrale, Inselvatichita presso Torino:
1804 Balbis; et 1813 in Redouté. Cfr Richt. Pl. Europ. – 1871 C.P.G.

788 Iris Xiphium L. e.p.
1858 Requien in Parlatore III – 1884 Bornemann in Barbey

789 Iris juncea Poir.
1833 Sassi e Viviani in Bertoloni I – 1858 Splitgerber e Tineo in Parlatore III

790 Iris Sisyrinchium L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1807 Bivona-Bernardi – 1811 Tenore.
— β maculata (Todaro Exs.) = Moraea sicula Tod.
1887 Todaro in Ind. sem. Hort. Panorm. p. 37.

791 Iris planifolia (Mill.) Fiori
1696 Cupani – 1806 Bivona-Bernardi – 1827 Moris i Gussone

Hermodactylus (Tourn.) Adans.

792 Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.
1565 Mattioli – 1696 Cupani – 1772 Maratti – (1640 Castelli) – 1833 Bertoloni
— β longifolius (Sweet)
1838 Sweet. Cfr. Richter Pl. europ.

Gladiolus (Tourn.) L.

793 Gladiolus paluster Gaud.
1726 Zannichelli – 1832 Bertoloni – 1842 Puccinelli

794 Gladiolus imbricatus L.
1844 Cesati – 1867 C.P.G. – (1886) Franzoni
— β illyricus (Koch)
1858 Tommasini in Parlatore III.

795 Gladiolus segetum Ker-Gawl
1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino
— β inarimensis (Guss.)
1854 Gussone
— γ vexillaris Martelli
1896 Martelli in Bull. Soc. bot. ital.

796 Gladiolus communis L. R
1827 Gussone — 1844 De Notaris
— β byzantinus (Mill.)
1696 Cupani — 1640 Castelli — 1789
Ucria — 1827 Gussone

Anthoxyza L.

796* Anthoxyza aethiopica L.
Del Capo e coltivata già dalla fine
del Settecento: 1796 (Zannoni) a Fi-
renze, 1798 (Zuccagni) nell'orto botanico di Padova 1801 (Fanzetti) nel Veneziano (Bonato)
ecc. Ora inselvatichita qua e là
nell'Italia meridionale in Liguria (Sommier) e Calabria (Caruel)
1880 Todaro — Sommier Bull. Soc. bot. Ital.
Doria e Reginato Bollettino
1906 Fiori in latt. (Liguria e Calabria) — Soc. d. Terrazziano in Bull. Ort. bot. Palermo I. 1897 (pianta di Palermo sarebbe l'Ant. bicolor Gasp.

Fam. 24 Musaceae

Musa (Plum.) L.

797 Musa sapientum L.
Dell'Asia tropic. orient., coltivata
tardi in Italia: a Padova 1820 (Bonato), a Torino 1821
(Capelli), in Sicilia ora quasi naturalizzata.
— β paradisiaca (L.)
Dell'Asia tropic. orient., coltivata fino
dal Cinquecento in Sicilia: 1565 (Mattioli)
e più tardi in altre parti d'Italia:
nel Veneziano 1796 (Fanzetti); in Sici-
lia ora quasi naturalizzata.

Fam. 25 Cannaceae

Canna L.

798 Canna indica L.
Delle Indie orientali, coltivata fino
dal Cinquecento: 1565 Cesalpino — 1585 (1583 in Michel)
Durante — 1642 Vestingio (2 varietà) —
1760 Allioni — 1798 Fanzetti. Ora
quasi naturalizzata in Sicilia.

Fam. 26 Orchidaceae

Cypripedium L.

799 Cypripedium Calceolus L.
1595 Bona — 1785 Allioni — 1754 Seguier
1816 Pollini — 1853 Ambrosi, Bon-
jean, Montini ecc. in Bertoloni IX.
1583 Michel —

Ophrys L.

800 Ophrys aranifera Huds.
1550 Cibo, 1585 Michel — 1696 Cupani — 1726 Zan-
nichelli — 1745 Seguier.
— β Tommasinii (Rchb.)
1851 Tommasini in Rchb. Ic. XIII
— γ cumulata (Parl.)
1838 Parlatore — 1853 Tineo in Bertoloni IX.
— δ quadriloba Rchb.
1868 Barla
— ε fucifera (Sm.) Rchb.
1842 Todaro — 1844 Gussone

35/0018-71

— ζ atrata (Lindl., non L.)
2(1853 Tommasini in Bertoloni IX
1(1830 Hoppe in Rchb. Fl. Exc. — 1842 Todaro
— η Morisii Martelli
1896 Martelli, Monocot. sard.
— δ specularia Rchb
1868 Barla
~~800 Ophrys Bertoloni~~

801 Ophrys bombyliflora Link
1806 Bivona-Bernardi — 1820 Tenore
— 1827 Moris

802 Ophrys apifera Huds.
1853 Michiel
1696 Cupani — 1754 Séguier — 1804
Bertoloni — 1821 Noua e Baltis.

802* Ophrys integra Sau. (X)
1871 Sauardo in N. giorn. bot. it. p. 165
1883 Gelmi in Bull. Soc. Veneto-trentina p. 37 ed ivi 1884 p. 186

803 Ophrys Bertolonii Moretti
1532 Cibo — 1696 Cupani — 1804
Bertoloni — 1823 Moretti.
— β Inzengae (Todaro)
1842 Todaro — 1889 N. Terracciano

803* Ophrys (aranifera) × (Bertolonii) Barla
1868 Sarato in Barla.

803** Ophrys bilineata Barla
(O. aranifera × Bertolonii?)
1868 Sarato in Barla.

803*** Ophrys Pseudoaranifera Murr
1898 Gelmi (Dubbia. Cfr. Asch. e Gräbn. III)

803**** Ophrys Pseudo-Bertolonii Murr (X)
1898 Gelmi.

803***** Ophrys Gelmii Murr (X)
1898 Gelmi

804 Ophrys Arachnites (L.) Lam.
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802
Suffren — 1804 Bertoloni.
— β oxyrrhynchos (Todaro)
1840 Todaro. Cfr. Parlatore III
— γ exaltata (Tenore)
1820 Tenore, Mauri.
— δ Scolopax (Cav.)
1868 Barla — 1897 Penzig
— ε cornuta (Stev.)
1866 Weiss, Florist. aus Istr. und Dalmat.
— ζ obscura (G. Beck)
1897 Pospichal — 1901 Murr. Cfr. Dalla Torre e Sarn. 1906.
804* Ophrys Arachnites × Bertolonii Goiran
1904 Goiran
804** Ophrys arachnitiformis Gren. et Philipp. (O. fuciflora × aranifera A. et G.)
1868 Barla
804*** Ophrys Nicotrae Zodda
1900 Zodda in Malpighia
805 Ophrys tenthredinifera W.
1696 Cupani — 1765 Sabbati — 1818 Sebastiani e Mauri
1820 Tenore

805* Ophrys bombyliflora × tenthredinifera Sommier
1896 Sommier in Bull. Soc. bot. it.

805** Ophrys Sommieri G. Camus
(O. tenthredinifera × aranifera)
1892 Sommier, Bull. Soc. bot. ital.
1904 Cortesi, Annali di Bot. Roma

805*** Ophrys Grampini F. Cort.
(O. aranifera × tenthredinifera)
1904 Cortesi, Annali di Bot. Roma

805**** Ophrys hybrida Pok.
(O. aranifera × myodes)
1898 Gelmi

806 Ophrys lutea Cav.
1696 Cupani – 1802 Viviani – 1807 Bivona-Bernardi

807 Ophrys fusca Link
1745 Sabbati 1830 Tenore – 1842 Todaro – 1844 Gussone
— β pallida (Raf.)
1810 Rafinesque – 1697 Cupani – 1844 Gussone

808 Ophrys myodes (L.) Jacq.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re – 1808 Biroli – 1821 Nova e Baltis
1776 Bartalini

1882 Arcangeli in Atti Soc. tosc. Sc. nat. III

808* Ophrys ripaënsis Porta
1905 Porta in Atti Anad. Rover.

809 Ophrys speculum Link
1696 Cupani – 1806 Bivona-Bernardi
1865 Moggridge. Cfr. Ardoino 1867

Serapias L.

809¹ Serapias triloba Viv.
(S. cordigera × Orchis papilionaceus)
1802 Viviani – 1842 Puccinelli – 1844 De Not.

809² Serapias Nouletii Rouy
(S. cordigera × Orchis laxiflorus)
1907 Berro in A. Gr. III – 1897 Penzig

809³ Serapias purpurea Doumenj
(S. longipetala × orchis laxiflorus)
1843 Ardoino. Cfr. Ardoino 1867.

809⁴ Serapias Tommasinii Kerner
(S. longipetala × Orchis coriophorus)
1865 Kerner Verhandl. zool. bot. ges. Wien.
1883 Goiran in N. gior. bot. ital.

809⁵ Serapias Fontanae Rigo et Goir.
(S. longipetala × Orchis Morio)
1883 Rigo e Goiran in N. Giorn. bot. it.

810 Serapias Lingua L.
1565 Michiel 1723 Micheli in Tilli – 1789 Ucria – 1798 Savi.
— β maculata Zodda
1902 Zodda in Bull. Soc. bot. ital.
— γ pallens Zodda
1902 Zodda in Bull. Soc. bot. ital.

R

35/0018-72

— δ elongata (Todaro)
1878 Todaro, Hort. bot. Panorm.

810¹ Serapias cordigera × Lingua Delaramb. et Timb.
1891 Debeaux

810² Serapias Barlae Richt.
(S. Lingua × Orchis papilionaceus Barl.)
1868 Barla.

811 Serapias occultata Gay
1837 Parlatore in Giorn. sc. lett. arti Sicil.
1853 Tineo in Bertoloni IX

812 Serapias longipetala (Ten.) Poll.
1551 Aldrovandi II
1550 Cibo — 1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

812¹ Serapias neglecta Forest.
(S. longipetala × Lingua Gren.)
1879 Caldesi

813 Serapias cordigera L.
1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli — 1789 Ucria — 1798 Savi.

Áceras Pers.

814 Aceras anthropophora (L.) R. Br.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

Loroglossum Spr.

815 Loroglossum hircinum (L.) Rich.
1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni
1776 Bartalini

Orchis L.

816 Orchis longebracteatus Biv.
1696 Cupani — 1806 Bivona-Bernardi — 1810 Bertoloni.

817 Orchis papilionaceus L.
1565 Michiel
1789 Allioni (Ucria) — 1696 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri.

— β Dastephani L. Marcello
1902 L. Marcello Bull. Sc. nat. Nap.

817¹ Orchis Gennarii Rchb.
(O. Morio × papilionaceus Timb.)
2 (1858 Gennari e Calandrini in Parlatore III
1 (1850 Gennari. Cfr. Rchb. Ic. XIII (1851)

817² Orchis Bornemanniae Asch.
(O. papilionaceus × longicornu Asch.)
1876 Bornemann. Cfr. Barbey 1884.

818 Orchis Morio L.
1550 Cibo — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

— β pictus (Lois.)
1858 Gentile, Savignone, Requien ex in Parlatore III.

R

818 Orchis papilionaceus × Morio
Timb. et Marg.
1891 Debeaux

819 Orchis longicornu Poir
1696 Cupani — 1820 Tenore — 1846
Gussone.

819¹ Orchis Bornemanni Aschers.
(O. longicornu × papilionaceus Asch.)
1857 Bornemann. Ex Barbey 1884.

820 Orchis intacta Link.
1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli —
1806 Bertoloni

821 Orchis coriophora L.
1745 Séguier — 1785 allioni — 1789
Ucria — 1802 Sprengel — 1805 Re
— β fragrans (Pollini)
1811 Pollini, Flora. Rob II — 1815 Sprengel.

821¹ Orchis coriophora × laxiflora β Timb.
1896 Haussknecht e Penzig in F. P. B.

822 Orchis ustulata L.
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Sprengel — 1805 Re.

822¹ Orchis ustulata × Morio Christ
1903 Christ in Bericht. Schweiz. bot Gesellsch. XIII.

822² Orchis coccinea Posp.
(O. ustulata × pyramidalis)
1897 Pospichal

823 Orchis tridentata Scop.
1697 Cupani — 1745 Séguier — 1785
Allioni.
— β lactea (Poir.)
1811 Tenore — 1824 Viviani.

823¹ Orchis Dietrichiana Bogenh.
(O. ustulata × tridentata Kern.)
1896 Bicknell — 1897 Penzig

823² Orchis Canuti Richt.
(O. tridentata × militaris Canut)
1868 Barla — 1897 Goiran.

824 Orchis fragrans Hadr.
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1745 Séguier
— 1785 allioni.
— β moravica (Jacq.)
1897 Pospichal.

824 Orchis hybrida Boenningh.
(O. fragrans × militaris G. G.)
1858 Facchini, Montini, Sanguinetti, Reguien in Portalupi III.

825 Orchis militaris L. e p.
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1745 Séguier — 1785 Allioni
— 1808 Bivona

Alcuni recenti autori botanici attribuiscono
~~il genere contrariamente all'uso più comune~~
il gen. maschile al nome bot. Orchis e simul
mente ~~attribuiscono il maschile~~ fanno
maschili i nomi botanici Bidens e Adonis,
i quali tutti e tre secondo ~~l'antico~~ l'uso più
comune e più antico ~~[illegible]~~ si riguar-
darono come femminili. Poiché non
appare che vi siano esempi di classici aut.
latini che attribuiscono a questi nomi assunti
come piante il genere maschile e viceversa
vi sia ~~tutte~~ una lunga tradizione di somme
autorità che li riguarda come femmine
[illegible] sia [illegible] meglio rinunziare al gusto
di novità, così imperante oggidì, e
mantenersi all'antico

35/0018-73

35/0018-74

825* Orchis Begrichii A. Kern.
(O. militaris × tephrosanthos Timb.)
1865 Kerner in Verhandl. zool. bot. Ges. Wien.

825² Orchis spurius Rchb.
(O. militaris × Aceras anthropophora)
1896 Bicknell e Parigi in F.P.B.

826 Orchis tephrosanthos Vill.
1558 Cibo – 1606 Colonna – 1818 Sebastiani e Mauri – 1825 Re.

826' Orchis Bergonii De Notaris
(O. tephrosanthos × Aceras anthropophora Pad. e Card.
1896 Bicknell – 1900 Paolucci e Cardinali N. Giorn. bot. it.

827 Orchis longicornis Link
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1807 Bivona – Bernardi – 1828 Frossi – Massanti.

827* Orchis Bivonae Tod. (×)
1840 Todaro. Cfr. Todaro 1842.

828 Orchis pyramidalis L.
1415 Rinio
1558 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

45

829 Orchis globosus L.
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Seppen – 1805 Re

830 Orchis sancta Tenore
1697 Cupani – 1829 Moris – 1830 Tenore.

831 Orchis laxiflora Lam.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1789 Moris – 1789 Allioni. – β palustris (Jacq.)
1789 Moris – 1826 Gussone – 1842 Todaro

831' Orchis alata Fleury
(O. Morio × laxiflora Rent.)
1864 Sanguinetti

831² Orchis Timbali Velen.
(O. laxiflora × coriophora α)
1896 Bicknell

831³ Orchis Barlae G. Camus
(O. laxiflora β × coriophora α)
1868 Barla

831⁴ Orchis Camusii Duff. (×)
1900 Foucaud.

831⁵ Orchis Nicodemi Tenore
(O. papilionacea × laxiflora Arch.)
1811 Tenore

832 Orchis patens Desf.
1804 Viviani – 1844 De Notaris –
1897 Penzig

833 Orchis masculus L.
1550 Cibo – 1726 Zannichelli – 1745
Séguier – 1802 Suffren

833.[1] Orchis Spitzelii Saut
(O. masculus × maculatus Halac.)
1842 Facchini in Ambrosi 1854
1853 Rota

834. Orchis quadripunctatus Cirillo
1811 Cirillo in Tenore – 1858 Gussone
in Parlatore III

835. Orchis provincialis Balbis
1798 Savi – 1696 Cupani – 1804 Berto-
loni – 1806 Balbis.
– β pauciflorus (Tenore)
1820 Tenore – 1842 Puccinelli
– γ caprarius Somm.
1898 Sommier

836. Orchis pallens L.
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1821
Noua e Balbis

837 Orchis sambucinus L.
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1804
Bertoloni – 1807 Bivona –

– β insularis (Somm.)
(+1869) Moris in Barbey 1884
1895 Sommier in Bull. Soc. bot. it.
ed in Isola del Giglio, 1900.

838 Orchis pseudosambucinus Ten.
1697 Cupani – 1811 Tenore – 1815
Sebastiani.

839 Orchis maculatus L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696
Cupani – 1726 Zannichelli – 1785
Allioni – 1802 Suffren.
– β saccifer (Brongn.)
1842 Todaro – 1844 Gussone
– γ longibracteatus Schur
1897 Pospichal
– δ Meyeri Rchb. fil.
1902 Chenevard
– ε helodes Rchb. fil.
1902 Chenevard

839* Orchis maculatus × angustifolius Chenev.
1902 Chenevard.

840 Orchis latifolius L.
1780 Turra – 1785 Allioni – 1802 ~~Suffren~~ Marzari
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854 – 1893
Gelmi
– β incarnatus (L.)
1415 Rinio – 1802 Suffren – 1824 Pollini – 1854 Ambrosi
1780 Turra –

35/0018-75

— γ angustifolius (Lois.)
1853 Ambrosi e Tommasini in Bertol. IX — (+1852) Facchini in Ambrosi 1854.

840¹ Orchis bosniacus Beck
1893 Klinge Revis. der Orch. cordig. Fries. Dorp.

840² Orchis monticola K. Richt.
(O. latifolius × sambucinus)
1902 Chenevard

840³ Orchis Braunii Hal.
(O. latifolius × maculatus)
1902 Chenevard

Gymnadenia R. Br.

841 Gymnadenia albida (L.) Rich.
1729 Micheli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1805 Re.

842 Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
1754 Séguier — 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re

843 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1562 Mattioli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

843¹ Gymnadenia intermedia Peterm.
(G. conopsea × odoratissima Murr)
1898 Gelmi

843² Gymnadenia Facchinii DT. e S.
(G. conopsea × Orchis latifolius)
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854.

Nigritella Rich.

844 Nigritella nigra (L.) Rchb. fil.
1565 Mattioli (Palma Chr. minor) — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

844² Nigritella suaveolens (Vill.) Koch
(N. nigra × Gymnadenia conopsea)
(1853 Ambrosi in Bertoloni IX
(+1852) Facchini in Ambrosi 1854 — 1869 Visiani e Sauardo.

844³ Nigritella Heufleri Kern.
(N. nigra × Gymnadenia odoratissima)
1893 Gelmi — 1883 Goiran Cfr. Goir. 1897.

844¹ Nigritella rubra Wettst.
1896 Gelmi — 1826 Pollini — 1897 Goiran —

Platanthera Rich.

845 Platanthera bifolia (L.) Rich.
1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1773 Vitman
1551 Aldrovandi II.

— β montana (Schmidt)
1835 Tenore — 1846 Tineo — 1854 Gussone (1842 Trevisan)
— γ Carducciana (Goiran)
1883 Goiran

Coeloglossum Hartm.

846 Coeloglossum viride (L.) Host
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Moria

847 Coeloglossum diphyllum (Lk) Fiori
1858 Moris in Parlatore III
1882 Reverchon in Barbey 1884

Herminium (L.) R. Br.

848 Herminium Monorchis
1729 Micheli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re.

849 Herminium alpinum (L.) Lindl
1620 C. Bauhin — 1785 Allioni — 1853 Molineri, Bonjean, Ambrosi in Bertoloni IX

Malaxis Sw.

850 Malaxis monophylla (L.) Sw.
1838. 1843 Facchini in Ambrosi 1854.

Liparis Rich

851 Liparis Loeselii (L.) Rich.
1818 Balbis — 1852 Paterno e Facchini in Hausmann — 1853 Montini e Ambrosi in Bertoloni IX.

Corallorhiza Hall.

852 Corallorhiza Neottia Scop.
1789 Allioni — 1824 Pollini — (+1852) Facchini in Ambrosi 1854 — 1853 Montini, Ambrosi in Bertoloni IX.
1893 Gelmi — 1883 Goiran.

Goodyera R. Br.

853. Goodyera repens (L.) R. Br.
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1824 Pollini — (+1852) Facchini in Ambrosi 1854

Spiranthes Rich

854 Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.
1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1805 Re.

855 Spiranthes autumnalis (Pers.) Rich.
1696 Cupani — 1729 Micheli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

Listera R. Br.

856 Listera ovata (L.) R. Br.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante —
1566 Calzolari

35/0018-76

857 Listera cordata (L.) R. Br.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1853 Molineri, Gherardi, Ambrosi in Bertoloni IX — 1844 Cesati

Neóttia L.

858 Neottia nidus-avis (L.) Rich.
1595 Porta — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1819 Bertoloni.

Epipógium Ehrh.

859 Epipogium aphyllum (Schm.) Sw.
1789 Allioni — 1853 Molineri in Bertoloni IX — 1858 Parlatore

Limodórum (Tourn.) Sw.

860 Limodorum abortivum (L.) Sw.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1696 Cupani — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

Epipógium Ehrh.

861. Epipógium aphyllum (Schmidt) Sw.
1789 Allioni — 1853 Molineri in Bertoloni IX — 1858 Parlatore

Cephalanthéra Rich.

862 Cephalanthera rubra (L.) Rich.
1652 Zanoni — 1696 Cupani — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
1551 Aldrovandi II

862 Cephalanthera ensifolia (Ehrh.) Rich.
1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1789 Ulevia — 1866 Balbis — 1820 Moricand.

863 Cephalanthera pallens (W.) Rich.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1789 Allioni

Epipactis Rich.

864 Epipactis palustris (L.) All.
1631 Donati — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1837 Sanguinetti —

865 Epipactis latifolia (L.) All.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1595 Porta — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli
— β rubiginosa (Crantz)
1844 Cesati — 1842 Trevisan — 1854 Ambrosi
— γ microphylla (Sw.)
1818 Sebastiani e Mauri — 1830 Tenore — 1842 Trevisan; Todaro — 1844 De Notaris

35/0018-77

Dicotyledones

Fam. 27 Juglandaceae

Juglans L.

866. Juglans regia L. R.
Originaria della Grecia e dell'Asia centr. introdotta fino dall'epoca romana, coltivata e spesso inselvatichita.
1415 Rinio 1550 Petrollini e Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

Fam. 28 Salicaceae

Salix (Tourn.) L.

867 Salix babylonica L.
Originario dell'Asia centr. e Giappone importato e coltivato fino dal Settecento ed ora qua e là inselvatichito:
1735 Micheli — 1760 Allioni — 1780 Farsetti

868 Salix alba L. R.
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1726 Zannichelli.
— β vitellina (L.) R
1660 Dalla Torre — 1767 Agosti — 1785 Allioni — 1808 Biroli

868¹ Salix triandra × alba Wimm.
1885 Borzì

869. Salix fragilis L. R.
1785 Allioni — 1806 Baltis — 1805 Re — 1871 Goiran. Cfr. Goiran 1897.

869¹ Salix viridis Fr.
(Salix fragilis × alba Wimm.)
1885 Borzì.

870 Salix triandra L. R.
1550 Cibo — 1745 Séguier — 1769 Agosti — 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

870¹ Salix speciosa Host
(S. amydalina × fragilis Wimm.?)
1897 Pospichal.

871 Salix pentandra L
1785 Allioni — 1816 Sartorelli — 1824 Pollini.

871¹ Salix hexandra Ehrh.
(S. pentandra × alba Kern.)
1885 Borzì.

871² Salix cuspidata Schultz.
(S. pentandra × fragilis Wimm.)
1852 Hausmann

872 Salix purpurea L. R.
1766 Arduino — 1717 Patarol — 1769 Agosti — 1785 Allioni — 1820 Moricand

872¹ Salix Pontederana Schl.
(S. purpurea × aurita Wimm.)
1853 Ambrosi — 1868 Ball

872². Salix pelorítana Prestandrea
(S. aurita ε × purpurea Borzì)
1846 Tineo.

872³ Salix rubra Huds
(S. purpurea × viminalis Wimm)
1802 Margari — 1855 Brumati in Pirona

872⁴ Salix purpurea × phylicifolia β Gelmi
1898 Gelmi.

873 Salix caesia Vill.
1789 Allioni — 1808 Biroli — 1853 Ambrosi

874 Salix incana Schrank
1769 Agosti — 1821 Nocca e Balbis — 1806 Balbis
— β lavandulifolia (Lap.)
1897 Pospichal

875 Salix viminalis L.
Originario dell'Europa centr. ed Asia ma coltivato dal ~~settecento~~ trecento e spesso affatto inselvatichito.
K 1561 Anguillara (Zenigole) — (+1320) Crescenzio, edit 1471.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1816 Sartorelli — 1897 Goiran.

876 Salix daphnoides Vill.
1791 Bellardi — 1802 Suffren — 1821 Nocca e Balbis — 1853 Ambrosi.

876¹ Salix Wimmeri Kerner
(S. incana × daphnoides Wimm.)
1885 Borzì.

877 Salix hastata L.
1785 Allioni — 1820 Moretti — 1821 Nocca e Balbis — 1851 Ambrosi.

878 Salix phylicifolia L.
1550 Cibo — 1857 Ambrosi.
— β nigricans (Sm.)
1551 Aldovandi — 1718 Pontedera — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— γ glabra Scopoli
1816 Sartorelli — 1824 Pollini — 1857 Ambrosi
— δ crataegifolia (Bertol.)
1813 Bertoloni in Desv. Journ. de Botanique

879 Salix aurita L.
1857 Ambrosi — 1853 Rota — 1844 Cesati
— β caprea (L.)
1595 Porta — 1561 Anguillara — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— γ grandifolia (Ser.)
1754 Séguier — 1824 Cornolli; Pollini
— δ cinerea (L.)
1550 Cibo — 1818 Sebastiani e Mauri — 1821 Nocca e Balbis — 1824 Pollini
— ε pedicellata (Desf.)
1830 Tenore — 1853 Grech — Delicata

879¹ Salix puberula Doell. (?)
(Salix aurita δ × phylicifolia β)
1885 Borzì.

Il tipo manca in Italia.

35/0018-78

49

879² Salix Hegetschweileri Heer
(S. phylicifolia × hastata Wimm.?)
1885 Bucci in Borzì — 1853 Rota

879³ Salix Seringeana Gaud.
(S. incana × aurita β Wimm.)
1867 Tommasini in Parlatore IV.

879⁴ Salix intermedia Host
(S. incana × aurita γ Anderss.)
1885 Sardagna in Borzì

879⁵ Salix oleifolia Vill.
(S. incana × aurita δ Anderss.)
1885 Borzì.

879⁶ Salix latifolia Forb.
(S. phylicifolia β × aurita β Brunn)
1898 Gelmi.

879⁷ Salix fruticulosa Kern.
(S. aurita γ × Myrsinites β)
1898 Gelmi.

880 Salix repens L. R
1745 Séguier — 1816 Sartorelli — 1818 Balbis — 1824 Pollini — 1825 Re
— β rosmarinifolia (L.)
1726 Zannichelli — 1818 Ruchinger — 1820 Moricand (1717 Patarol)

880¹ Salix ambigua Ehrh.
(S. aurita × repens)
1853 Rota — 1837 Sandi — 1897 Pospichal
— (1886) Franzoni, ed. 1890 —

881 Salix Lapponum L. ~~(manca il tipo)~~
— β helvetica Vill.
1785 Allioni — 1804 Balbis — 1824 Pollini
— γ glauca (L.) R.
1785 Allioni — 1818 Balbis — 1824 Pollini

881¹ Salix Huteri Kern.
(S. hastata × Lapponum β)
1885 Huter, Sardagna in Borzì.

881² Salix spuria Schb.
(S. Lapponum β × Myrsinites β Wimm.)
1893 Gelmi.

881³ Salix recondita Ausserd.
(S. Lapponum β × retusa Wimm.)
1874 Ausserdorfer in Kern. Schedae n. 1444 — 1885 Borzì.

881⁴ Salix Normani Anderss.
(S. Lapponum γ × Myrsinites)
1903 R. Keller in Bull.

881⁵ Salix Lapponum γ × hastata Gürke
1903 R. Keller.

882 Salix Myrsinites L.
1723 Micheli in Tilli — 1718 Pontedera — 1802 Marzari — 1804 Sternberg
— β Arbuscula (L.)
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1804 Sternberg

882' Salix ovata Seringe
(S. Lapponum γ × herbacea Anderss.)
1885 Borgi.

883 Salix reticulata L.
1742 Zanoni e Monti — 1745 Séguier
— 1785 Allioni — 1804 Sternberg

884 Salix herbacea L.
1697 Boccone — 1726 Zannichelli —
1785 Allioni — 1804 Sternberg.

885 Salix retusa L.
1697 Boccone — 1754 Séguier — 1785
Allioni — 1804 Sternberg — 1808 Biroli.
— β serpillifolia (Scop.)
1697 Boccone — 1844 Cesati; De Notaris — 1853 Rota.
— γ pedemontana Beyer
1891 Beyer, Beitr. Fl. Grisanche und Rhêmes, p. 27.

Populus L.

886 Populus nigra L. R.
1415 Pinio
1550 Petrollini e Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.
— β italica (Duroi, 1772)
1745 Séguier — 1816 Sartorelli — 1818 Sebastiani e Mauri — 1821 Noua e Balbis

— γ neapolitana Tenore
1835 Tenore.

886' Populus angulata Ait.
Degli Stati Uniti; coltivato fino dal principio dell'ottocento ed ora qua e là subspontaneo.
1815 Biroli — 1820 Bonato ecc.

887 Populus monilifera Ait.
Originario, coltivato e qua e là quasi inselvatichito, come il precedente
1806 Zuccagni — 1815 Biroli ecc.

888 Populus tremula L. R.
1550 Cibo — 1561 Anguillara — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

889 Populus alba L. R.
1550 Petrollini e Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara (álbara) — 1566 Calzolari
1585 Durante — 1595 Pona.
— β nivea (W.)
1858 Matthieu. Cfr. DC Prodr. XVI, 2, p. 324.

889' Populus canescens Sm.
(P. alba × tremula Wimm.)
1808 Biroli — 1811 Savi — 1827 Spadoni
— β lobata Parl.
1868. Parlatore IV.

Fam. 29 Betulaceae

35/0018-79

Bétula (Tourn.) L.

890 Betula alba L. R.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1595 Pona.

Alnus (Tourn.) L.

891 Alnus cordata (Lois.) Desf.
1811 Tenore; Savi — 1855 Soleirol
1723 Micheli in Tilli in Gren. Godr. III.

892 Alnus Alnobetula (Ehrh.) Hartig
1832 Cibo — 1697 Boccone — 1754 Séguier — 1790 Bellardi
— β suaveolens (Req.)
1697 Boccone — 1825 Requien
— γ brembana Rota
1853 Rota — 1897 Goiran
— δ Foucaudii Brig.
1900 Foucaud.

892¹ Alnus incana × Alnobetula (A. Kell.)
1903 R. Keller

893 Alnus glutinosa Gaertn. R.
1415 Rinio
1550 Petrotta Cibo — 1551 Aldrovandi — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1726 Zannichelli

893¹ Alnus elliptica Req.
(A. glutinosa × cordata?)
1825 Requien

893² Alnus pubescens Tausch
(A. glutinosa × incana)
1898 Pampanini in F. P.

894 Alnus incana (L.) DC.
1550 Petrotta Cibo — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1790 Bellardi

Jam 30 Cupuliferae

Cárpinus (Tourn.) L.

895 Carpinus Bétulus L. R.
1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona

896 Carpinus orientalis Mill.
1772 Scopoli — 1802 Suffren — 1811 Savi — 1818 Sartorelli.

Óstrya (Mich.) Scop.

897. Ostrya carpinifolia Scop.
1550 Petrotta Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1729 Micheli
— β corsica Fliche
1889 Fliche in Bull. Soc. bot. France

Corylus (Tourn.) L.

898. Corylus Avellana L. R.

1415 Plin. 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – + 1554 Matthioli) – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona.

— β tubulosa (W.)

1854 Tommasini in Bertoloni X –

1857 Rota – 1865 Sanguinetti

898¹ Corylus Colurna L. Originaria dell'Europa orientale, fu coltivata in principio dell'800 in Sicilia, sviluppandosi in seguito in Lombardia, 1857 Rota

Quercus (Tourn.) L.

899. Quercus Robur L. R.

1415 Plin. 1554 Matthioli – 1585 Durante – 1785 Allioni

— β Thomasii (Ten.)

1835 Tenore

— γ apennina (Lam.)

1846 Gussone

— δ sessiliflora (Salisb.)

1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1785 Allioni

— ε Virgiliana (Tenore)

1835 Tenore

— ζ Dalechampii (Tenore)

1830 Tenore

— η cuneata A. DC.

1835 Tenore

— θ pedemontana (Colla)

1836 Colla

— ι lanuginosa Lam. (pubescens W)

1821 Nouv. Balbis – 1822 Pollini

— κ leptobalanos (Guss.)

1846 Gussone

899¹ Quercus Kerneri Simk. et T. (Q. Robur ♂ × Robur ♀ Jurka)

1897 Jurka in Richt. et Jurk. Pl. eur.

899² Quercus sessiliflora × Farnetto Chiov. (Q. Robur ♂ × Q. conferta)

1898 Chiovenda, Malp. 417

= Q.

899³ Quercus conferta Kit (Farnetto Ten.) (Q. Robur × Cerris ?)

1879 Caldesi – 1885 Borzì

899⁴ Quercus Toza Sibth. (= Q. Robur ♂ Fior. e p.)

1836 Colla – 1905 Fontana, Ferrari, Bezzi no in Borzì, Boll. Ort. Palermo.

— β brachyloba Borzì

1905 Fontana in Borzì l.c.

— γ glabrescens Borzì

1905 Fontana in Borzì l.c.

899⁵ Quercus vulcanica Boiss. et Heldr. (= Q. Robur ♂ Rov. e. p.)

(†1886) Tineo – (†1866) Gussone – (1892) Todaro in Borzì l.c.

— β pinnatifida Borzì

1872 N. Terracciano (sub Q. Farnetto)

— γ rotundifolia Borzì

(†1899) Minà-Palumbo in Borzì l.c.

35/0018-80

899[6] Quercus conferta × Robur α (Chiov.)
1898 Chiovenda in Malpighia

899[7] Quercus crispata Stev.
(Q. Cerris × Robur ι (Gürke))
1897 Gürke in Richt. et Gürk. Pl. Eur.

899[8] Quercus Ilex × Robur α (Chiov.)
1898 Chiovenda in Malpighia.

900 Quercus Cerris L. R.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1583 Cesalpino — 1785 Allioni.

901 Quercus Aegilops L. R.
1867 Gussone in Parlatore IV — 1885 Borzì
— β macedonica (A. DC.)
1888 A. Longo in Riv. Sc. nat. Siena

902 Quercus coccifera L.
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino
1415 Rinio 1772 Scopoli — 1785 Allioni — 1816 Sartorelli — 1835 Allioni
— β callipinos (Webb)
1894 ~~Gussone~~ Arcangeli.
— γ pseudococcifera (Desf.)
1826 Gussone — 1827 Moris.

902[1] Quercus hispanica Lam.
(Q. Cerris × Suber Borzì)
2 (1775 Santi Viagg. Montam. — 1804 Savi
1 (1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli.

903. Quercus Suber L. R.
1550 Cibo — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1785 Allioni — 1798 Savi.

904 Quercus Ilex L. R.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1726 Zannichelli.

Castanea (Tourn.) Adans.

905 Castanea vesca Mill. R.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

Fagus (Tourn.) L.

906 Fagus silvatica L. R.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante

Fam. 31 Platanaceae

Platanus (Tourn.) L.

907 Platanus orientalis L. R.
Originario d'Oriente, ma fino dall'era romana diffusamente coltivato o naturalizzato:
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino.

908 Platanus occidentalis L.
Dell'America settentrionale; fino dal cinquecento coltivato e naturalizzato
1551 Aldrovandi — 1798 Fossetti — 1793 Zanoni

Fam. 32 Urticaceae.

Ulmus (Tourn.) L.

907 Ulmus pedunculata Fougeroux
1835 Comolli — (†1886) Franzoni — 1897 Pospichal

910 Ulmus campestris L. R.
1415 Plinio 1550 Gibelli Cibo — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino

911 Ulmus montana With.
1828 Spadoni — 1837 Narducci in Bertoloni III.

Celtis (Tourn.) L.

912 Celtis australis L. R (†)
1415 Plinio 1550 Gibelli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani.
— β microphylla Gorzan
1890 Gorzan in N. giorn. bot. ital.

913 Celtis Tournefortii Lam.
1696 Cupani — 1844 Guglielmo

(†) Il Lotus di Plinio (Columella e dì)

— β actuensis Tornab.
1855 Tornabene in Atto Acad. Gioenia di Catania

913 bis Celtis occidentalis L.
Dell'America sett., coltivato e talora subspontaneo nel Veronese
1890 Goiran in N. giorn. bot. it., Cfr. Goir. 1897.

Broussonetia L'Hérit.

914 Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
Della Cina e Giappone, introdotto e coltivato dalla fine del Settecento:
1780 Fossetti — 1780 Cfr. Targioni-Tozzetti, Introd. piante acc. — 1807 L. Andreis. 1776 Bartolini

Morus (Tourn.) L.

Delle Asia centr. ed India, introdotto in Italia dopo il 1300 Cfr. Targ. Tozz., Introd. piant. Coltivato estesamente e qua e là naturalizzato inselvatichito.
1551 Aldrovandi — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara.

915. Morus alba L.

916. Morus nigra L. R.
Dell'Armenia e Persia sett., introdotto e coltivato fino dall'epoca romana e qua e là naturalizzato inselvatichito.
1415 Plinio 1551 Aldrovandi — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

Ficus (Tourn.) L.

917 Ficus Carica L. R.
— α Caprificus (Risso)
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1720 Pontedera — 1745 Séguier
— β sativa Fiori.
1551 Aldrovandi e in Dendrol. — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante

Humulus L.

918 Humulus Lupulus L. R.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1558 Mattioli — 1585 Durante — 1726 Zannichelli.

918¹ Humulus japonica Sieb. et Z.
Della Cina e Giappone, introdotto e coltivato solo dal 1885 circa, fu trovato inselvatichito in Toscana nel 1903, Fiori. Cfr. Caruel p. 61.

Cannabis (Tourn.) L.

919 Cannabis sativa L. R.
Originaria dell'Asia centrale, fu introdotta e coltivata fino dall'era romana; ora qua e là avventizia.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino.

Urtica (Tourn.) L.

920 Urtica pilulifera L. R.
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli — 1696 Cupani.

921 Urtica membranacea Poir.
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri
— β neglecta Guss.
1828 Gussone — 1835 Tenore

923 Urtica rupestris Guss.
1821 Gussone — 1854 Visiani e Gussone in Bertoloni X.

924 Urtica dioica L. R.
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli.
— β Lamarckiana Gasparr. in Gussone

925 Urtica atrovirens Req.
1827 Requien in Loisel. — 1828 Moris.

Parietaria (Tourn.) L.

926 Parietaria officinalis L. R
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino
— β judaica (L.)
1808 Biroli — 1824 Cornolti; Pollini. — 1806 Sternberg —

35/0018-81

— γ populifolia (Nyman)
1844 Nyman in Linnaea XVIII p. 661

927 Parietaria lusitanica L.
1694 Bonone – 1789 Ucria – 1820 Mauri:
— β filiformis (Tenore)
1831 Tenore.

928 Parietaria cretica L.
1844 Gussone.

929 Parietaria Soleirolii Spreng.
1825 Viviani; Requien – 1827 Moris.

Fam. 33 Elaeagnaceae
Elaeagnus (Tourn.) L.

930 Elaeagnus angustifolia L.
2 (1562 Mattioli – 1642 Vesling – 1785 Allioni – 1797 Host
1 (Originario dell'Asia temperata, coltivato da più secoli e talora rinvenuto subspontaneo.

Hippophaë L.

931 Hippophaë rhamnoides L.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier.

Fam. 34 Lauraceae

Laurus (Tourn.) L.

932 Laurus nobilis L.
1415 Rimi 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1696 Cupani

Fam. 34¹ Magnoliaceae
Magnolia L.

932¹ Magnolia grandiflora L.
Della Florida e Canadà, introdotta e coltivata, sempre più diffusamente, dalla fine del settecento.
1780 Farsetti – 1787 [Pisa] Cfr. Targ. Tozz. Introd. piant. – 1796 Zuccagni

932² Magnolia Yulan Desf.
Della Cina merid., introdotta e coltivata fra noi avanti la metà dell'ottocento.
1823 de Spigno – 1842 de Visiani.

Fam. 34² Calycanthaceae
Calycanthus L.

932³ Calycanthus floridus L.
Dell'America Sett., coltivato comunemente fino dal principio dell'ottocento
1806 Zuccagni – 1801 Bonato – 1812 de Spigno

35/0018-82

932[4] Calycanthus (Chimonanthus) praecox L. 53
Del Giappone, coltivato comunemente da avanti la metà dell'ottocento
1812 de Spigno — 1829 Piccioli — 1842 de Visiani.

Fam. 35 Thymeleaceae

Daphne L.

933 Daphne Gnidium L. R.
1532 Cibo 1551 Aldrovandi II — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli — 1696 Cupani.

934 Daphne sericea Vahl
1898 Ross. Cfr. Keissler Die Art. Gatt. Daphne in Engl. Jahrb. XXV
— β collina (Sm.)
1532 Cibo 1551 Aldrovandi II — 1792 Civillo — 1583 Cesalpino.

935 Daphne Cneorum L. R
1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier
— β petraea (Leyb.)
1846 Facchini. Cfr. Ambrosi 1857.
— γ striata (Tratt.)
1836 Comolli — 1839 Facchini, Rainer ecc. in Bertoloni IV — 1853 Rota.

936 Daphne alpina L.
(+ 1673) Barrelier ed. 1714 — 1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni — 1808 Biroli

— β oleoides (L.)
1723 Micheli in Tilli — 1819 Bertoloni — 1826 Gussone.

937 Daphne Laureola L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1563 Cesalpino — 1571 Mattioli — 1585 Durante

938 Daphne Mezereum L.
1550 Pettolini Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.

Thymelaea (Tourn.) Scop.

939 Thymelaea Passerina (L.) Lange
1595 Pona — 1606 Colonna — 1696 Cupani — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli.

940 Thymelaea dioica All.
1789 Allioni — 1867 Lisa in Ardoino.

941 Thymelaea Tartonraira (L.) All.
1676 Boccone 1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni — 1811 Tenore
— β Thomasii (Duby)
1828 Thomas in Duby — 1839 Salis-Marsch. in Bertoloni IV.

942 Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1678 Boccone

Fam. 36 Santalaceae.

Ósyris L.

943. Osyris alba L.
1415 Rinio 1696 Cupani — 1717 Patarol — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

Thesium L.

944. Thesium rostratum M. et K.
1842 Facchini in Bertoloni V.

945. Thesium humile Vahl
1826 Gussone — 1827 Moris — 1860 Giannini e Parlatore in Carnel

946. Thesium alpinum L.
1563 Cesalpino — 1720 Pontedera — 1723 Micheli in Tilli — 1754 Séguier — 1822 Pollini.
— β tenuifolium (Saut.)
1898 Fiori in F.P.B. (?)
— γ pratense (Ehrh.)
1824 Tenore — 1844 Cesati — 1897 Goiran.

947 Thesium linophyllum L.
1676 Boccone 1713 Tita — 1720 Pontedera — 1723 Micheli in Tilli — 1855 Pirona
— β Parnassi (A. DC.
1877 Rigo.
— γ intermedium (Schrad.)
1720 Pontedera — 1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1822 Pollini.

— δ montanum (Ehrh.)
1720 Pontedera — 1745 Seguier — 1595 Pona — 1822 Pollini

Fam. 37 Loranthaceae

Loranthus L.

948 Loranthus europaeus Jacq. R.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1665 Aldrovandi, Dendrolog. nat. (1668) — 1697 Cupani — 1844 Gussone

Viscum (Tourn.) L.

949 Viscum album L.
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
— β laxum (Boiss. et Reut.)
1879 Sanardo in N. giorn. bot. ital. — 1885 Borzì.

Arceuthobium M.B.

450 Arceuthobium Oxycedri (DC) M.B.
1843 Biasoletto in Koch — 1897 Pospichal

Fam. 38 Balanophoraceae

Cynomorium (Mich.) L.

451 Cynomorium coccineum L.
1697 Boccone — 1729 Micheli — 1789 Ucria — 1827 Zerapha.

35/0018-83

Fam. 39 Cytinaceae

Cytinus L.

952. Cytinus Hypocistis L.
1415 Rinio 1550 Petrollini e Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — ~~1745 Sigeno~~ 1785 Allioni — 1823 Romano.

Fam. 40 Aristolochiaceae

Asarum (Tourn.) L.

953 Asarum europaeum L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona.

Aristolochia (Tourn.) L.

954 Aristolochia Clematitis L.
1550 Petrollini Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante.

955 Aristolochia altissima Desf.
1697 Cupani — 1820 Tenore — 1826 Presl

956 Aristolochia Pistolochia L. R.
1551 Aldrovandi (teste Bertol. Fl. ital. IX) 1785 Allioni — 1827 Moris — 1844 De Notaris

957 Aristolochia rotunda L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1696 Cupani.

958 Aristolochia longa L.
1415 Rinio 1551 Aldrovandi (loc. Bertol. IX) — 1696 Cupani — 1787 Acria.

— β microphylla Fiori
1894 Nicotra in Malp. VIII p. 88
— γ pallida (W.)
1554 Mattioli (Arist. rotund.) — 1694 Bouone — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1785 Allioni.
— δ sicula (Tineo)
1844 Tineo in Gussone.

Fam. 41 Polygonaceae

Polygonum (Tourn.) L.

959 Polygonum Fagopyrum L.
Originario dell'Asia centr. e bor., coltivato fino dal cinquecento in molti paesi e qua e là avventizio.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.

960. Polygonum tataricum L.
Della Siberia ed Asia centr., coltivato fino dal settecento, come il precedente.
1760 Allioni — 1802 Rodati — 1806 Zuccagni — 1812 Bonato.

961. Polygonum Convolvulus L. R
1550 Petrollini Cibo — 1563 Cesalpino —
1696 Cupani — 1726 Zannichelli —
1745 Séguier.
— β Bertolonii Goir. et Tonini.
1875 Goiran in N. pirin. bot. it. IX.

962. Polygonum dumetorum L.
1550 Petrollini Cibo — 1620 Pontedera — 1802
Suffren — 1806 Balbis.

962' Polygonum mixtum Goir. et Tonini.
2 (1875 Goiran
1 ((P. Convolvulus × dumetorum Goir.)

963 Polygonum orientale L.
Delle Indie orient., Afr. merid.,
Austral., Coltivato dal principio
del Settecento ed ora qua e là avventizio — 1415 Rinio
1713 Tita — 1717 Patarol — 1719
Pontedera Cat. ms. Horti patav.

964 Polygonum Bistorta L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1555
Fracastoro (Cfr. Bertol. IV) — 1558 Mattioli — 1595
Pona — 1720 Pontedera — 1726
Zannichelli — 1561 Anguillara.

965 Polygonum viviparum L.
1595 Pona — 1718 Pontedera — 1726
Zannichelli — 1745 Séguier.

966 Polygonum alpinum All.
1697 Bocone — 1785 Allioni — 1808
Biroli — 1822 Pollini.

967 Polygonum amphibium L.
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802
Suffren; Marzari — 1816 Nocca Balbis
— β terrestre (Leers)
1822 Pollini — 1842 Trevisan

968 Polygonum lapathifolium L.
1550 Petrollini Cibo — 1563 Cesalpino — 1726
Zannichelli — 1785 Allioni.
— β Persicaria (L.)
1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli —
1745 Séguier — 1805 Re
968' Polygonum minus β × lapathifolium b nodosum Nicotra
1889 Nicotra in Nyman.

969 Polygonum Hydropiper L.
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino —
1595 Pona — 1640 Castelli —
1726 Zannichelli.

969' Polygonum mite (Schrank)
(P. lapathifolium β × Hydropiper?)
1830 Tenore — 1839 Bertoloni —
1844 Cesati.

969² Polygonum condensatum Schultz
(P. mite × lapathifolium β)
1885 Rigo in Huter, Enum. pl. exsicc.
1897 Perzig

35/0018-84

970. Polygonum minus L.
1550 Petrell Cibo — 1595 Pona — 1785 Allioni — 1808 Biroli.
— β serrulatum (Lag.)
1563 Cesalpino — 1826 Jan — 1827 Gussone — 1830 Tenore — 1867 Ardoino.
970¹ Polygonum Hydropiper × minus β Nicotra
1889 Nicotra in Nyman
970² Polygonum strictum All. e. p.
(P. minus × lapethifolium β)
1785 Allioni — 1873 C. P. G.

971. Polygonum maritimum L.
1550 Petrell Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichell — 1785 Allioni — 1826 Moricand.
— β Roberti (Lois.)
1858 Moris — 1881 Nyman — 1898 Fiori I ~~in Fl. anal.~~

972. Polygonum herniarioides Del
1826 Jan — 1827 Gussone (dubbio inquilino sec. Fiori)

973. Polygonum aviculare L. R
1415 Rinio 1550 Petrell Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani.
— β patulum (M. B.)
1854 Gussone — 1882 Bianca in Arcangeli.
— γ Bellardi (All.)
1785 Allioni — 1806 Baltis — 1827 Gussone.

— ε effusum (Meisner)
1873 C. P. G. — 1882 Arcangeli.
1887 Groves.

974. Polygonum romanum Jacq.
1697 Boccone — 1745 Sabbati 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Bartoloni — 1826 Gussone

975. Polygonum arenarium W. K.
Originario dell'Europa orientale, Introdotto avventizio presso Genova
1889 Penzig — 1894 Arcangeli

976 Polygonum equisetiforme S. et S.
1696 Cupani — 1827 Gussone.
— β scoparium (Req.)
1697 Boccone — 1825 Viviani — 1827 Moris.
— γ elegans (Tenore)
1811 Tenore — 1839 Gussone e Ortini in Bertoloni IV.

Emex Neck

977 Emex spinosa (L.) Campd.
1696 Cupani — 1807 Bivona-Bernardi — 1826 Viviani — 1827 Gussone; Moris.

Rumex L.

978 Rumex alpinus L.
1550 Petrell Cibo — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1754 Séguier — 1785 Allioni
1565 e. Michiel

979 Rumex aquaticus L. R.
1532 Cibo — 1844 Facchini in Bertoloni — 1844 Casati — 1833 Salis-Marschl.

980 Rumex Hydrolapathum Huds.
1785 Allioni — 1822 Pollini — 1824 Comolli.
1826 Moretti — 1831 Romano.
— β maximus (Schreb.)
(+1897) Gennari — (+1886) Franzoni
Cfr. Fiori Fl. an.

981 Rumex crispus L. R.
2(1769 Agosti — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri
1(1640 Castelli
— β elongatus (Guss.)
1826 Gussone — 1830 Tenore.

982 Rumex Patientia L. R.
Originario dell'Europa orient., coltivato e inselvatichito, fino dal cinquecento, qua e là
1554 Mattioli — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1827 Gussone — 1839 Savi in Bertoloni IV

983. Rumex conglomeratus Murr.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1745 Séguier
1566 Calzolari — 1822 Pollini —

984 Rumex sanguineus L.
1858 Moris (+1886) Franzoni ed. 1890.

985 Rumex obtusifolius L.
1415 Rimo
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1745 Séguier — 1822 Pollini

985[1] Rumex acutus L.
(R. crispus × obtusifolius)
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1798 Savi — 1816 Sebastiani e Mauri — 1827 Gussone — 1860 Pirona. Cfr. Gortani 1906.

986 Rumex pulcher L.
1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren — 1798 Savi
— β Woodsii (De Not.) Arc.
1875 De Notaris in Cat. sem. Hort. bot. romani.
— γ divaricatus (L.) M. et K.
1723 Micheli in Tilli — 1857 Ambrosi
— δ suffocatus (Moris)
1839 Moris in Bertoloni IV

987. Rumex maritimus L.
1847? Zanardini — 1855 Pirona — ~~(+1866) Jan in Erb. padov.~~ — 1867 Ardoino
— β paluster (Sm.)
1697 Bocone — 1826 Gussone — (+1866) Jan in Erb. padov.

988. Rumex bucephalophorus L. R.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1806 Bivona Bernardi

35/0018-85

988. Rumex Bucephalophorus L.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1789 Ucria.

989. Rumex Acetosella L.
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1745 Séguier.

991. Rumex Acetosa L.
1415 Rinio — 1550 Petrollino Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1697 Bocone — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β arifolius (All.)
1550 Petrollino Cibo — 1697 Bocone — 1785 Allioni.
— γ hortensis (Vis.)
1554 Mattioli — . . . . . .
— δ alpinus Boiss.
1696 Cupani + 1827 Gussone
— ε nivalis (Heg. et H.)
1839 Murith in Bertoloni IV

990 Rumex tuberosus L.
1745 Séguier — 1839 Pollini in Bertoloni

992 Rumex thyrsoides Desf.
1832 Gussone — 1757 Latini
— β intermedius (DC.)
1785 Allioni — 1827 Gussone

993. Rumex scutatus L.
1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1696 Cupani — 1697 Bocone — 1745 Séguier.
— β aetnensis (Presl)
1822 Presl.
— γ reniformis Marchesetti
1896 Marchesetti

994 Rumex Lunaria L.
Originario delle isole Canarie, coltivato nell' Italia australe e talora inselvatichito in Sicilia
1884 Macchiati in N. G. bot. ital. XVI, 88.
1894 Arcangeli
1789 Ucria — 1827 Gussone
1757 Latini

995. Rumex vesicarius L.
Originario di Grecia, Persia etc., coltivato e talora inselvatichito in Sicilia
1882 Arcangeli
1789 Ucria — 1827 Gussone
1757 Latini

Oxyria Hill.

996 Oxyria digyna (L.) Hill
1657 Ambrosini — 1785 Allioni — 1808 Biroli.

fam. 42. Chenopodiaceae

Atriplex (Tourn.) L.

997 Atriplex hortense L. R
Originario di Siberia e Tartaria e forse anco d'Italia; Noto per certo anche ai Romani.
1415 Rinio — 1550 Petrollino Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino.

998 Atriplex hastatum L.
1550 Patrit. Cibo — 1565 Mattioli — 1789 Allioni — 1808 Biroli.
— β microspermum (W. K.)
1821 Rocca e Balbis — 1873 C. P. G.
— γ triangulare (W.)
1726 Zannichelli — 1818 Ruchinger — 1837 Sanguinetti — 1844 Gussone
— δ elongatum (Guss.)
1844 Gussone — 1887 Groves.
— ε salinum Wallr.
1838 Barbieri — 1855 Pirona — 1869 Saccardo e Visiani
— ζ patulum (L.)
1565 Mattioli (Atr. silv. II) — 1802 Saffren — 1818 Ruchinger — 1824 Pollini
— η oblongifolium (W. K.)
1897 Pospichal
— δ litorale (L.)
1697 Boccone — 1820 Moricand

999 Atriplex laciniatum L.
1565 Mattioli — 1772 scapoli — 1785 Allioni — 1827 Moris
— β Tornabeni (Tineo)
1844 Tineo in Gussone
— γ tataricum (L.)
1631 Donati — 1805 Willdenow Spec. pl. IV — 1818 Ruchinger — 1854 Zanardini in Bertoloni X.
— δ roseum (L.)
1690 Boccone (teste Bertol. X) — 1803 Bertoloni —
1757 Allioni

1000. Atriplex portulacoides L.
1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1631 Donati — 1696 Cupani.

1001 Atriplex molle Desf.
1849 Hooker ap. Moq.-Tand. in DC. Prodr. XIII, par. II, p. 99.

1002. Atriplex Halimus L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1785 Allioni.

Spinacia (Tourn.) L.

1003. Spinacia oleracea L.
Originaria del Caucaso, della Persia ecc., Ignota ai Romani; coltivata e qua e là spesso inselvatichita.
1415 Rinio 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1662 Dalla Torre — 1869 Visiani e Saccardo
— β glabra (Mill.)
1820 Moricand — 1824 Pollini — 1844 Cesati.

Beta (Tourn.) L.

1004. Beta vulgaris L.
— α macrocarpa (Gussone)
1827 Gussone
— β Cicla (L.)
1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1696 Cupani.

— γ esculenta Salisb.
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino.
— δ maritima (L.)
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1726 Zannichelli — 1797 Host.

1005. Beta trigyna W. et K.
Originaria dell'Europa orient., fu trovata avventizia presso Genova.
1898 Ad. Fiori in F. P. B.

Chenopodium (Tourn.) L.

1006. Chenopodium capitatum (L.) Asch.
1625 (Castelli) H. Farn., 85 — 1772 Scopoli — 1785 Allioni — 1822 Pollini.
— β virgatum (L.)
1785 Allioni — 1824 Comolli — 1833 Meneghini, Biasoletto etc. in Bertoloni I.

1007. Chenopodium Bonus-Henricus L.
1532 Cibo — 1565 Mattioli — 1595 Pona — 1696 Cupani — 1745 Séguier.

1008. Chenopodium polyspermum L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1554 Mattioli —

1009. Chenopodium Vulvaria L.

Petrollini 1551 Aldrovandi II — 1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1631 Donati.

1010 Chenopodium hybridum L.
1717 Patarol — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni

1011 Chenopodium murale L.
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli

1012 Chenopodium urbicum L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Maria —
— β intermedium W. K.
1855 Pirona — 1906 Gortani.
— γ rhombifolium Mühl.
1897 Gürke in Richt. et Gürk. Pl. Eur.

1013 Chenopodium rubrum L.
Petrolli 1550 Cibo — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren — 1811 Mazzucato.
— β botryoides (Sm.)
1824 Tenore — 1837 Sanguinetti — 1848 Maly.

1014 Chenopodium glaucum L.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1842 Trevisan — 1864 Saccardo.

1015 Chenopodium album L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β viride L.
1640 Castelli — 1785 Allioni — 1566 Calzolari — 1802 Biroli — 1818 Ruchinger
— γ ficifolium (Sm.)
1563 Cesalpino — 1830 Tenore
1897 Pospichal
— δ opulifolium (Schrad.)
1550 Cibo — 1820 Moricand — 1822 Pollini.

1016 Chenopodium ambrosioides L.
Originario dell'America sett. e trop., Forse naturalizzato ~~naturalizzato~~ fino dalla fine del secento in quasi tutta Italia.
1696 Cupani — 1745 Séguier — 1769 Agosti — 1772 Maratti — 1789 Ucria — 1802 Saffren — 1673 Barrelier

1017 Chenopodium Botrys L. R
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1640 Castelli — 1785 Allioni — 1822 Pollini.

1018 Chenopodium aristatum L.
Originario dell'America sett. Siberia e Cina, introdotto e coltivato fino dal settecento, p. e a Torino, 1772 (Allioni) ~~...~~ nel Veneziano 1798 (Farsetti) ecc. Ora qua e là largamente avventizio.
1833 Bertoloni I — (+1840) Viviani in C. P. G. (1874)

Roubiaeva Moq.

1019 Roubiaeva multifida (L.) Moq.
Originaria dell'America merid., coltivata fino dalla fine del settecento, p. e Firenze 1796 (Zuccagni), Padova 1812 (Bonato) e da tempo qua e là copiosamente avventizia.
1809 Franciosi — 1824 Pollini — 1826 Prest — 1827 Gussone —

Cycloloma Moq.

~~nel 1812 Padova (Bonato) nel 1815 (Biroli) e successivamente ora qua e là avventizia.~~

1020 Cycloloma platyphyllum (Michx) Moq.
Originario dell'Amer. bor. ~~Già coltivata a Torino~~
1873 C. P. G. — 1882 Gibelli e Pirotta
1890 A. Terracciano.

φ. Ora qua e là avventizio.

Kochia Roth

1021. Kochia scoparia (L.) Schrad.
Originaria della Russia, Paesi Danub. etc., ma dal cinquecento coltivata comunemente e spesso avventizia.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1561 Anguillara (Scope di Padova)
1585 Durante — 1642 Vestingio — 1785 Allioni — 1822 Pollini — 1864 Saccardo.

1022. Kochia hyssopifolia (Pall.) Schrad.
1830 Tenore — 1837 Orsini in Bertoloni III.

35/0018-87

1023 Kochia hirsuta (L.) Nolte
1726 Zannichelli — 1735 Micheli —
1820 Moricand — 1827 Moris.

1024 Kochia arenaria (Gärtn.) Roth.
1551 Cibo — 1819 Bertoloni — 1026 Naccari.
1745 Sabbati —

1025 Kochia prostrata (L.) Schrad.
1785 Allioni — 1837 Molineri in Bertoloni IV

1026 Kochia saxicola Gussone
1854 Gussone

Corispermum (Juss.) L.

1027 Corispermum hyssopifolium L.
1833 Moretti e Felisi in Bertoloni I.
— β Marschallii (Stev.)
1804 Viviani — 1833 Moretti e Barbieri in Bertoloni I.

Camphorosma L.

1028 Camphorosma monspeliaca L.
1696 Cupani — 1561 Anguillara — 1785 Allioni — 1789 Uoria.
— β canescens Moq.
1842 Gussone (Camph. monsp. β villosa)
— γ Vigintimilleis (Tineo)
1827 Tineo — 1829 Jan ex Moq. Chenop. monogr.

Polycnémum L.

1029 Polycnémum arvense L.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier —
1785 Allioni — 1808 Biroli.
— β majus (A. Br.)
1869 Sauardo e Visiani — 1873 Cesati in C. P. G. — 1877 Freyn.

Salicornia (Tourn.) L.

1030 Salicornia herbacea L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1631 Donati — 1726 Zannichelli —

1031 Salicornia fruticosa L.
1415 Rinio
1532 Cibo — 1631 Donati — 1726 Zannichelli — 1818 Ruchinger — 1819 Bertoloni.

Arthrocnémum Moq.

1032 Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung.
1820 Moricand — 1824 Naccari — 1827 Gussone.

Halocnémum M. B.

1033 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. B.
1827 Gussone — 1828 Moris.

Halopéplis Bunge

1034 Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.
1696 Cupani – 1822 Moretti – 1826 Gussone

Sálsola L.

1035 Salsola longifolia Forsk.
(+1673) Barrelier ed. 1714 – 1696 Cupani –
1697 Boccone – 1827 Gussone.

1036 Salsola vermiculata L.
1826 Jan – 1827 Gussone.
– β microphylla (Cav.)
1827 Moris (+1711) Cupani. Cfr
Guss. 1844 – 1827 Gussone.

1037 Salsola Kali L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1735 Micheli – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger
– β Tragus (L.)
1554 Mattioli – 1583 Cesalpino –
1585 Durante.

1038 Salsola Soda L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554
Mattioli – 1563 Cesalpino – 1631
Donati.

Halogéton C. A. Mey.

1039 Halogéton sativa (L.) Moq.
Originaria della Spagna merid. e Algeria, coltivata dal cinquecento e qua e là inselvatichita.
1583 Cesalpino – 1797 Host – 1802
Suffren – 1855 Pirona.

Suaeda Forsk

1040 Suaeda fruticosa (L.) Forsk.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1735
Micheli – 1785 Allioni.

1041 Suaeda maritima (L.) Dum.
1532 Cibo – 1631 Donati – 1735 Micheli
– 1785 Allioni.
– β Jacquini (Ten.)
1824 Tenore.

1042 Suaeda splendens (Pourr.) G. G.
1858 Moris

fam. 43 Amarantaceae

Achyranthes L.

1043 Achyranthes aspera L.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1789 Ucria
1822 Bertoloni (In Italia la sola forma
α sicula (L)
1651 Erbario Messinese. Cfr. Zodda

35/0018-88

Alternanthéra Forsk.

1043' Alternantheva repens (L.) Stend. Dell'America merid., ora coltivata negli orti botanici a Torino, 1772 (Allioni), a Firenze, 1793 (Zuccagni), a Padova, 1812 (Bonato); ora avventizia presso Genova importatavi probabilmente colle navi dall'America.
1904 Canneva in Sommier.

Amarantus (Tourn.) L.

1044 Amarantus spinosus L.
Originario dell'America centrale, coltivato in Sicilia, 1696 (Cupani) nel Veneziano, 1717 (Patarol), 1780 (Farsetti), a Torino 1760 (Allioni), ora avventizio presso Genova e Locarno.
~~Baglietto~~ 1885 Ascherson in Berichte Deutsch. bot. Gesellsch. III – 1889 Baglietto in Penzig.

1045 Amarantus caudatus L.
Originario delle Indie orient. Nubia ecc. coltivasi fino dal cinquecento ed talora ~~ora~~ incontrasi qua e là avventizio.
1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1640 Castelli – 1642 Veslingio.

1046 Amarantus retroflexus L.
Originariamente nativo dell'America sett. e trop. ma da secoli naturalizzato fra noi.
1532 Cibo – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1818 Ruchinger
– β chlorostachys (W.)
1824 Pollini – 1835 Tenore – 1844 Cesati.
– γ patulus (Bertol.)
(+1711) Cupani ed 1713 – 1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Moretti – 1837 Bertoloni.

1047. Amarantus hypochondriacus L.
Oriundo dell'America tropicale, coltivato a Torino, 1772 (Allioni) a Firenze, 1793 (Zuccagni) a Padova, 1801 (Bonato) e qua e là avventizio.
1824 Pollini – 1844 Cesati – 1897 Goiran – 1906 Gortani.

1048 Amarantus paniculatus L.
Oriundo dell'America tropicale, coltivato fino dalla fine del settecento, a Firenze, 1793 (Zuccagni), a Padova 1801 (Bonato) ecc. talora qua e là avventizio.
1868 Pasquale – 1897 Goiran; ~~1897~~ Pospichal

1049 Amarantus tricolor L.
Originario delle Indie orient., Cina e Giappone y coltivato fino dal cinquecento e talora avventizio.
1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1642 Veslingio
— β gangeticus (L.)
1872 N. Terracciano.

1050 Amarantus graecizans L.
(= A. silvester Desf.)
1551 Aldrovandi — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

1051 Amarantus albus L.
2 1723 Micheli in Tilli — 1772 Allioni — 1825 Re — 1827 Moris — 1844 De Notaris
1 Originario dell' America boreale, coltivato dal principio del settecento e fattosi ~~ed~~ ~~ecc~~ qua e là avventizio e ~~naturalizzato~~ subspontaneo.

1052. Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terracc.
1890 Terracciano.

1053. Amarantus ascendens Lois. R.
(= A. Blitum L. sec. mult. auct.)
1415 Rinio
1550 Petrolli Cibo — 1562 Mattioli — 1585 Durante — 1745 Séguier.

1054 Amarantus deflexus L.

1789 Ucria — 1804 Balbis; Bertoloni — 1818 Ruchinger; Sebastiani e Mauri.

1055 Amarantus polygonoides L.
1855 Sanguinetti — 1831 Tenore — 1898 Fiori (ex herb. Patav.).

1055[1] Amarantus glomeratus Pospich.
1897 Pospichal.

Celósia L.

1056 Celosia cristata L.
Originaria delle Indie orient., coltivata in tutti i giardini fino dal cinquecento e spesso avventizia.
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1640 Castelli — 1642 Veslingio

1056[1] Celosia argentea L.
Originaria delle Indie orient. e Cina, coltivata frequentemente fino dal seicento e talora avventizia.
1640 Castelli — 1642 Veslingio — 1760 Allioni.

Gomphréna L.

1056[2] Gomphrena globosa L.
Originaria delle Indie orient., coltivata comunemente fino dal seicento: Messina 1640 (Castelli) — nel Veneziano, 1717 (Patarol) e 1780 Farsetti ecc. — nel Veronese 1701 (Martini)

35/0018-89

Fam. 44 Theligonaceae

Theligonum L.

1057. Theligonum Cynocrambe L.
1563 Cesalpino – 1592 Colonna –
1620 Cortuso in C. Bauhin

Fam. 45 Phytolaccaceae

Phytolacca (Tourn.) L.

1058. Phytolacca decandra L.
Oriunda dell'America bor. e merid., coltivata fino dal seicento ed ora qua e là avventizia e quasi naturalizzata
1642 Vestingio – 1653 Volpari – 1713 Tita – 1785 Allioni – 1802 Marzari – 1818 Ruchinger.

1059 Phytolacca (Pircunia) dioica L.
Originaria dell'America mer., fu primamente coltivata nell'Orto botanico di Napoli nel 1840 c. da semi ricevuti dal Bonpland. Cfr. Tenore, Cat. del R. Orto bot. di Napoli, Ivi 1845, p. 90 n. 114. Ora inselvatichita nelle isole Eolie
1878 Lojacono.

Fam. 45[1] Nyctaginaceae

Mirabilis L.

1059[1] Mirabilis Jalapa L.
Originaria del Perù, coltivata fino dal ~~seicento~~ cinquecento e spesso qua e là avventizia.
1583 Cesalpino – 1585 Durante –
1640 Castelli – 1642 Vestingio –
1717 Patarol – 1796 Farsetti

~~[illegible]~~

Allionia Loefl. (1758)

1059[2] Allionia nyctaginea (Michx) Tourn.

Originaria dell'America sett., era coltivata a Padova nel 1831 (Visiani, Cat. sem. Horti Pat.) a Modena nel 1836 (Brignoli, Cat. pl. Horti Mutin.) ecc., ma fu trovata anche qua e là avventizia
1869 Saccardo e Vis. p. 277. – 1888 Bozzi – 1896 De Carlini in Fiori I. 1898, p. 325.

Fam. 46 Aizooaceae

Aizoon L.

1060. Aizoon hispanicum L.
Originario dell'Asia occid. ed Africa bor., coltivato negli orti botanici di Bologna, 1802 (Rodati), Padova 1820 (Bonato), Torino 1821 (Capelli) ecc., trovasi ora inselvatichito in Calabria.
1831 Guscone in Tenore.

Tetragonia L

1061 Tetragonia expansa Murr.
Originaria della Nuova Zelanda e Australia, introdotta e coltivata dal settecento ad ora qua e là avventizia; p. e. a Vittorio, 1905 (Sacc.), a Pavia, 1908 (Saccardo)
1788 Scopoli — 1804 Bonato — 1842 Vitman →

Mesembryánthemum (Dill.) L.

1062 Mesembryanthemum nodiflorum L.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1826 Gussone.

1063 Mesembryanthemum crystallinum L.
1789 Ucria — 1826 Gussone — 1827 Moris

1064 Mesembryanthemum acinaciforme L.
Originario del Capo di Buona Speranza, coltivato fino dal settecento a Padova 1713 (Tita), a Torino, 1772 (Allioni), nel Veneziano 1796 (Fassetti) ed ora qua e là, naturalizzato nella regione mediterranea
1854 Gussone — 1881 C. P. G. — 1894 Arc.
1857 Bornemann. Cfr. Barbey 1884

1065 Mesembryanthemum edule L.
1854 Gussone — 1885 A. Terracciano in Rio. ital. Sc. Nat. di Napoli (sub M. Bolleano Terr.) Cfr. Beg. La vegetaz. Bot. Pony. Roma 1905, p. 329.

Fam. 46¹ Begoniaceae

Begonia Plum.

1065¹ Begonia discolor R. Br.
Della Cina e Martinica, viene coltivata frequentemente fino dal 1820 a Padova (Bonato), 1824 a Pisa (Savi) ecc. e si riproduce spontaneamente, p. e. a Selva, Vittorio (Treviso), 1870 e Lucca (Saccardo)

Fam. 46² Passifloraceae

Passiflora L

1065² Passiflora caerulea L.
Del Perù e Brasile, coltivata anzi comunemente, fino dal 1610 a Firenze (Targioni-Tozzetti, Introd. piant.), dal 1662 a Padova (Castiglione) ecc.

Fam. 47 Cactaceae

Cactus L.

1065³ Cactus flagelliformis L.
Del Perù, coltivato frequentemente nel Veneziano fino dal 1780 (Fassetti), a Padova, 1801 (Bonato) ecc.

1065⁴ Cactus grandiflorus L.
Dell'America centrale, si coltiva ora assai comunemente dal settecento: a Padova 1712 (Tita), a Salò, 1780 (Fassetti), a Bologna, 1802 (Rodati), ecc.

35/0018-90

61

Phyllocactus Link

1065[5] Phyllocactus phyllanthoides (DC) Salm

Del Messico, introdotto in Europa appena al principio dell'Ottocento ma coltivato già comunemente p. e. a Padova, 1842 (Visiani) ed ora molto diffuso.

Opuntia (Tourn.) Mill.

1066 Opuntia vulgaris Mill.

— α nana Vis. (Indigeno)

1702 Martini 1785 Allioni — 1802 Marzari — 1823 Romano.

— β Ficus-indica (L.)

Dell'America sett. Coltivata e naturalizzata nelle regioni più calde fino dal cinquecento.

1565 Mattioli — 1713 Fitar — 1780 Farsetti — 1802 Rodati — 1802 Bonato. (Probabilmente questa var. β, americana, è da ascriversi ad una derivazione della seg. non dall'Op. nana)

1067 Opuntia Tuna (L.) Mill.

Dell'Amer. centr. e merid. Coltivata e naturalizzata nel mezzodì (il tipo però) non fu ancora constatato come inselvatichito.

— β maxima (Mill.)

1789 Ucria — 1827 Gussone — 1830 Tenore

— γ Dillenii (Haw.)

1894 Arcangeli — 1898 Fiori

1067[1] Opuntia monacantha Haw.

Dell'America meridionale. Naturalizzata nella Riviera da Nizza a Mentone

1899 Sauvaigo.

1067[2] Opuntia intermedia S. Dyck

Probabilmente dell'America merid. Naturalizzata a S. Giuliano e Livorno

1905 Arcangeli in Boll. Soc. bot. ital. p. 145

Fam. 48 Portulacaceae

Portulaca (Tourn.) L.

1068 Portulaca oleracea L. R.

1415 Rizio 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

— β sativa (Haw.)

1562 Mattioli — 1822 Pollini

1069 Portulaca grandiflora Hook.

Dell'Argentina. Scoperta nel 1829 da Gillies, fu tosto importata in Europa e trovasi coltivata a Modena nel 1836 (Brignoli) a Padova nel 1842 (Visiani) ecc. ed ora è spesso qua e là avventizia.

Montia (Mich.) L.

1070 Montia fontana L.

1729 Micheli — 1785 Allioni — 1788 Cirillo — 1798 Savi.

— β rivularis (C. C. Gmel.)

1729 Micheli — 1822 Pollini

nel 1756 nell' Orto bot. romano (Sabbati)

Fam. 49 Molluginaceae

Mollugo L.

1071 Mollugo Cerviana (L.) Seringe
Originaria di Spagna, Grecia, Russia merid. Coltivata già nel 1772 nell' orto di Torino (Allioni), nel 1793 in quello di Pavia (Brusati) di Sala, 1798 (Farsetti) ecc. Spesso poscia inselvatichita negli orti e vicinanze. Cfr. Traverso in Bull. Soc. bot. it. 1898 e 1906 p. 101: 1826 Jan – 1844 Bérenger – 1881 C. P. G.

1072 Mollugo verticillata L.
Originaria dell' America tropica, coltivata anche questa specie fino dal 1772 nell' orto bot. di Torino (Allioni) e di Pavia 1793 (Brusati) ecc. Non di rado ora fattasi avventizia.
1894 Arcangeli – 1897 Chiovenda – 1904 Traverso. Cfr. Trav. Bull. Soc. bot. ital. 1906 p. 101.

Glinus Loefl.

1073 Glinus lotoides L.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1789 Maria – 1818 Sebastiani e Mauri – 1827 Gussone

Telephium (Tourn.) L.

1074 Thelephium Imperati L.
1599 Imperato – 1785 Allioni – 1805 Re

Fam. 60. Paronychiaceae

Pteranthus Forsk.

1075 Pteranthus dichotomus Forsk.
1847 Todaro in Bertoloni VII – 1853 Grech – Delicata.

Scleranthus L.

1076 Scleranthus annuus L.
1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1696 Cupani – 1745 Séguier.
– β verticillatus (Tausch)
1881 C. P. G. – 1882 Arcangeli – 1906 Gortani. (1844 Cesati)

1077 Scleranthus perennis L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1824 Comolli – 1844 Cesati – 1853 Rota.
– β marginatus (Guss.)
1827 Gussone – 1856 Huet. Cfr. Nyman.

Corrigiola (Dill.) L.

1078 Corrigiola litoralis L.
1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1827 Gussone – 1830 Tenore.

1079 Corrigiola telephiifolia Pourr.
1828 Moris – 1837 Giraldi, Soleirol ecc. in Bertoloni III
1678 Boccone.

1076' Scleranthus intermedius Kittel.
(Scl. annuus × perennis Lasch)
1907 Fiori in App. Fl. anal.

35/0018-91

Illecébrum (Ruff.) L.

1080 Illecebrum verticillatum L.
1723 Micheli in Tilli — 1808 Biroli — 1827 Moris

Paronychia (Tourn.) Adans

1081 Paronychia cymosa (L) DC.
1867 Ardoino; Mabille —

1082. Paronychia echinata Lam.
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1723 Micheli in Tilli — 1826 Guiltone — 1827 Moris.

1083. Paronychia argentea Lam.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1827 Moris.

1083 Paronychia polygnifolia (Vill) DC.
1791 Rellardi — 1785 allioni — 1835 Soleirol in Bertoloni II.

1085 Paronychia nivea DC.
1827 Guiltone — 1835 Sassi in Bertoloni II.
— β macrosepala (Boiss.)
1878 A. Kerner ap. Ryman Consp. 255.

1086. Paronychia Kapela (Hacq.) A. Kern.
1835 Zanardini in Bertoloni II.
1855 Pirona.
Brumati in

— β serpyllifolia (DC.)
1785 allioni — 1826 Guiltone.

Herniaria (Tourn.) L.

1087. Herniaria glabra L.
1561 Anguillara — 1562 Mattioli — 1565 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1711 Petiver.
— β hirsuta L.
1532 Cibo — 1565 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier.

1087' Herniaria Empedocleana Lojac.
1884 Lojacono in Nat. Sicil. III, 284.

1088 Herniaria alpina Vill.
1785 allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1867 Ardoino
— β incana Lam.
1532 Cibo — 1678 Bocone.
1867 Ardoino.

Loeflingia L.

1089 Loeflingia hispanica L.
1696 Cupani — 1826 Presl — 1827 Guiltone.

Ortegia L.

1090 Ortegia hispanica L.
1785 allioni — 1805 Re — 1833 Molineri e Dalbis in Bertoloni I.

Polycarpon Loefl.

1091 Polycarpon tetraphyllum L.
1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
— β altinefolium (DC.)
1697 Cupani – 1697 Bouone – 1815 Bivona – Bernardi.

1092 Polycarpon peploides DC.
1696 Cupani – 1814 Bivona – Bernardi – 1827 Gussone.
— β rotundifolium (Rouy)
(+1851) Requien. Cfr Rouy, Fl. de Fr. III, 313.

Fam. 51 Caryophyllaceae

Spergularia Pers.

1093 Spergularia rubra (L.) Pers.
1785 Allioni – 1804 Savi – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Presl
— β diandra (Guss.)
1827 Gussone – 1830 Tenore
— γ nicaeensis (Sarato)
1868 Sarato in Lebel, Mém. Soc. Cherb. – 1892 Burnat.
— δ marina (L.)
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1818 Ruchinger.
— ε media (Pl.)
1726 Zannichelli – 1735 Micheli – 1785 Allioni – 1798 Savi.
— ζ macrorrhiza (Req.)
1827 Requien in Loiseleur.
1825 Soleirol – 1829 Moris

1093' Spergularia segetalis (L.) Don
(+1737) Micheli. Cfr. Baroni in Bull. S. bot. it. 1898 – 1785 Allioni – 1877 Ingegnatti – 1898 Sommier. Cfr Baroni l. c.

Spergula (Rupp.) L.

1094 Spergula arvensis L.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini.

1095. Spergula pentandra L.
1772 Scopoli – 1818 Balbis – 1839 Montini in Bertoloni IV.

Sagina L.

1096 Sagina procumbens L.
1563. Cesalpino – 1764 Arduino – 1745 Séguier – 1785 Allioni
— β apetala (L.)
1550 Petrus Cibo – 1696 Cupani – 1764 Arduino – 1785 Allioni.
— γ maritima (G. Don)
1824 Viviani – 1837 Moris e Soleirol in Bertoloni III.

35/0018-92

1097. Sagina Linnaei Presl
1735 Micheli — 1816 Pollini — 1808 Biroli
— β subulata (Swartz)
1819 Bertoloni — 1836 Comolli — 1827 Gussone.
— γ glabra (W.)
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1819 Bertoloni.
— δ pilifera (DC.)
1827 Moris — 1834 Salis-Marschlins

1098 Sagina nodosa (L.) Fenzl
1808 Biroli — 1833 Colla — 1847 Zanardini

Buffonia Sauv.

1099 Buffonia macrosperma J. Gay
1785 Allioni — 1833 Colla — 1836 Tenore
1835 Molineri e Re in Bertoloni II

Alsine (Tourn.) L.

1100 Alsine tenuifolia (L.) Wahl.
1696 Cupani — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1816 Noce e Balbis
— β arvatica (Presl)
1826 Presl — 1842 Gussone
1101 Alsine mucronata L.
1805 Re — 1806 Balbis — 1830 Tenore. — 1852 Rota.

— β fasciculata (L.)
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini

1102 Alsine verna (L.) Wahlb.
1745 Séguier i Sabbati — 1785 Allioni — 1802 Marzari — 1816 Pollini — 1826 Presl
— β recurva (Allioni)
1785 Allioni — 1822 Presl — 1837 Sandi

1103 Alsine austriaca (Jacq.) Wahlb.
1816 Pollini — 1837 Sandi — 1839 Facchini in Bertoloni IV.
— β Villarsii (Balbis)
1785 Allioni — 1805 Re — 1844 De Notaris — 1853 Rota.

1104 Alsine biflora (L.) Wahlb.
~~1785 Allioni — 1805 Re — 1806 Sternberg — 1808 Biroli — 1822 Zantedeschi in Pollini~~ 1848 Facchini in Maly.
1878 Nyman — 1884 C.P.G. 1873 Venzo in N. giorn. bot. ital.
1105 Alsine laricifolia (L.) Crantz
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1824 Comolli
— β liniflora (Hegetsch.)
1819 Bertoloni — 1826 Jan — 1830 Tenore
1837 Sandi.

1106 Alsine graminifolia (Ard.) Gmel.
1764 Arduino — 1827 Gussone — 1839 Montini, Zanardini, Ortini in Bertoloni IV.

1107 Alsine aretioides (Portsch.) M. K.
1853 Rota — 1839 Montini e Facchini in Bertoloni IV.

1108 Alsine Cherleria Fenzl
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini — 1824 Cornolli.

1109 Alsine lanceolata (All.) M. K.
1780 Allioni — 1808 Biroli — 18
1840 Cesati — Montini, Zanardini, Jan ecc. in Bertoloni IV.

1110 Alsine geniculata (Poir.) Strobl
1807 Bivona-Bernardi — 1817 Tineo — 1854 Gussone.

Arenaria L.

1111 Arenaria aggregata (L.) Lois.
1697 Bonone — 1785 Allioni — 1839 Sassi e Balbis in Bertoloni IV.

1112 Arenaria grandiflora L.
1755 Allioni — 1805 Re — 1827 Gussone
1822 Presl — 1839 Facchini ecc. in Bertoloni IV.

1113 Arenaria cinerea DC.
1867 Ardoino — 1892 Burnat

1112' Arenaria emarginata Brotero
— β Salzmanni (Presl) W. K.
1826 Presl.

1114 Arenaria modesta Duf.
1848 Soleirol in Gren. Godr. I.

1115 Arenaria serpyllifolia L.
1551 Aldrovandi — 1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli
— β tenuior M. et K.
1651 Erberio Messinese. Cfr. Lodda
1830 Tenore — 1844 Gussone — 1904 Goiran
— γ alpina Gaud.
1844 Cesati — 1868 Tissière

1116. Arenaria ciliata L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1745, Séguier
1822 Pollini

1117. Arenaria balearica L.
1827 Moris — 1834 Salis Marschlins
1839 Seraffini, Viviani in Bertoloni IV

1118 Arenaria biflora L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli
1806 Sternberg — 1822 Zantedeschi in Pollini.

1119 Arenaria Bertolonii Fiori
1742 Zanoni e Monti — 1772 Vitman
1810 Bertoloni.

1120 Arenaria Huteri Kern.
2 (1880 Venzo in Saccardo e Bizzozero
1 (1872 Huter in A. Kerner, Oesterr. bot. Zeitschr. XXII.

35/0018-93

Moehringia L.

84

1121 Moehringia trinervia (L.) Clairv.
1551 Aldrovandi — 1678 Bauhin — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Arduini

— β pentandra (J. Gay)
1872 Marsilly — 1877 Andrieux
1884 C.P.G.

1122 Moehringia Ponae Fenzl.
1595 Pona — 1713 Tilli — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

— β dasyphylla Bruno in Balb.
1804 Bruno in Balbis — 1844 De Notaris

— δ papulosa (Bert.)
1839 Narducci in Bertoloni IV
1843 Reuter. Cfr. Burnat I (1892)
1889 N. Terracciano.

— δ Tommasinii (March.)
1866 Loser — 1865 Tommasini. Cfr. Marchesetti 1896. p. 11.

1122' Moehringia coronensis Behr.
(M. bavarica × muscosa Behr.)
1904 Behrendsen in Allg. bot. Zeitschr.

1123 Moehringia muscosa L.
1606 Colonna — 1713 Tilli — 1785 Allioni — 1808 Viviani (1745 Séguier.)

— β glaucovirens (Bert.)
1844 Tanfaderchi in Bertoloni VI.

1124 Moehringia polygonoides (Wulf.) M. K.
1754 Séguier — 1785 Allioni
1822 Pollini.

Stellaria L.

1125 Stellaria nemorum L.
1583 Cesalpino — 1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni

1126 Stellaria media (L.) Cirillo
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari

— β neglecta (Weihe)
(1883 Strobl — 1904 Goiran) 1882 Arcangeli — Vg.

— γ grandiflora (Tenore)
1696 Cupani — 1886 C.P.G.

— δ apetala (Ucria)
1796 Ucria — 1879 Caldesi — 1892 Burnat.

1127. Stellaria bulbosa Wulf.
1772 Scopoli — 1882 Cesati in Arcangeli.

1128. Stellaria uliginosa Murr.
1785 Allioni — 1805 Re — 1816 Moris & Balbis — 1824 Comolli — 1839 Cesati, Facchini, Savi ecc. in Bertoloni IV.

1129 Stellaria Friesiana Seringe.
1848. Facchini in Maly

1130 Stellaria graminea L.
1713 Tita — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren

1131 Stellaria palustris Ehrh.
1821 Re — 1834 Massara — 1842 Trevisan — 1844 Cesati.

1132 Stellaria holostea L
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1816 Nocca e Balbis.

Holósteum (Dill.) L.
1133 Holosteum umbellatum L.
1713 Tita — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis.

Malachium Fr.
1134. Malachium aquaticum (L.) Fr.
1701 Martini. Cf. Sacc. 5 cod. bot.
1769 Agosti — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Biroli.

Cerastium L
1135 Cerastium trigynum Vill.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Cristofoli e Schouw in Pollini — 1855 Cernagai, Bramati in Pirona.

1136 Cerastium anomalum W. et K.
1830 Tenore — 1822 Pollini — 1821 Romano
1842 Trevisan.

1137 Cerastium illyricum Ard.
1764 Arduino — 1839 Soleirol in Bertoloni IV.

1138 Cerastium brachypetalum Desp.
1785 Allioni — 1827 Gussone — 1842 Trevisan — 1844 Cesati.
— β tauricum (Spr.)
1827 Gussone — 1855 Huet. Cf. Nyman Consp. 109 — 1879 Caldesi

1139 Cerastium glomeratum Thuill.
2 (1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri
1 (1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1745 Séguier

1140 Cerastium semidecandrum L
1816 Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Moricand.
— β glutinosum (Fr.) — 1853 Rota — 1830 Tenore — 1832 Gussone — 1864 Sauardo.
— γ siculum (Guss.)
1827 Moris — 1832 Gussone.
— δ pumilum (Curt.)
1827 Gussone — 1848 Grenier e Godron.

35/0018-94

65

1140' Cerastium divaricatum Herb.
1824 Herbich in Flora. (Sp. dubbia)

1141. Cerastium campanulatum Viv.
1583 Cesalpino — 1785 Allioni — 1804 Viviani — 1818 Sebastiani e Mauri.

1142. Cerastium triviale Link
1769 Agosti — 1785 Allioni — 1745 Séguier
1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini
— β spurium (Posp.)
1897 Pospichal.

1143. Cerastium silvaticum W. et K.
1826? Gussone — 1851 Facchini in Hausmann — 1839. G. Bertoloni, Montini, Ruchinger ecc. in Bertoloni IV — 1864 Sauardo.

1144. Cerastium alpinum L.
1773. Vitman — 1805 Re — 1819 Bertoloni (Non è il tipo Lec. Béguinot)
— β latifolium (L.)
1785 Allioni — 1754 Séguier — 1808 Biroli — 1822 Pollini —
— γ pedunculatum (Gaud.)
1839 De Notaris in Bertoloni IV — 1853 Rota.
— δ carinthiacum (Vest)
1851 Facchini in Hausmann — 1855 Pirona.

1145. Cerastium arvense L.
1563 Cesalpino — 1745 Séguier — 1802 Marzari; Suffren — 1816 Nova e Balbis.
— β suffruticosum (L.)
1806 Balbis — 1844 Cesati.
— γ subulatum (H. P. Rigo)
1879 Huter, Porta, Rigo, in Rigo N. Giorn. bot. ital.
— δ stenopetalum (Fenzl)
1848 Soleirol in Gren. e Godr. I.
1872 Marsilly.
— ε hirsutum (Ten.)
1830 Tenore.
— ζ apuanum (Parl.)
1892 Beuari in Parlatore — Caruel Fl. ital. IX.
— η Thomasii (Ten)
1824 Tenore
— ϑ lineare (All.)
1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri
— ι Boissieri Gren.
1848 Bernard in Gren. e Godr. I
1872 Marsilly.
— x lanigerum (Clem.)
1841 Clementi in Atti III Riun. scienziati italiani in Firenze.

1146 Cerastium tomentosum L.
1592 Colonna — 1696 Cupani — 1826 Presl — 1830 Tenore
1651 Erb. Messinese. Cfr. Zodda
1745 Sabbati.

— β repens (L.)
1811 Tenore — 1869 Sauardo e de Visiani (in parte: Euganei)
— γ grandiflorum (W. et K.)
1882 N. Terracciano in Arcangeli.

1147 Cerastium manticum L.
1703 Martini 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1806 Sternberg — 1822 Pollini.
— β tenue (Viv.)
1824 Viviani — 1848 Grenier e Godron
— γ erectum (L.)
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr. Freyn 1877.

Agrostemma L.

1148. Agrostemma Githago L. R.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino.

Lychnis (Tourn.) L.

1149. Lychnis coronaria (L.) Desv. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1554 Mattioli

1150 Lychnis Flos-Jovis (L.) Desv.
2 (1724 Zanoni — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Zantedeschi in Pollini
1 (1697 Boccone —

1151 Lychnis Flos-cuculi L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β Cyrilli (Richter)
2 (1844 Richter in Rchb. Ic. VI p. 55
1 (1838 Tommasini. Cfr. Freyn 1877.

1151[1] Lychnis chalcedonica L.
Originaria dell'Asia minore e Giappone, coltivata comunemente fino dal cinquecento
1583 Cesalpino — 1590 Cortuso.
1696 Cupani — 1713 Tita

1152. Lychnis Viscaria L.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re — 1816 Noua e Balbis — 1822 Pollini.

1153 Lychnis alpina L.
1697 Boccone — 1785 Allioni — 1824 Comolli — 1853 Rota.

1154 Lychnis Caeli-rosa (L.) Desv.
1640 Castelli — 1697 Boccone — 1696 Cupani — 1785 Allioni.

1155 Lychnis laeta Ait.
2 (1827 Moris — 1830 Tenore — 1834 Salis-Marschlins
1839 Seraffini in Bertoloni IV —
1 (1810 Loiseleur

35/0018-95

1156 Lychnis alba Mill.
1415 Rimo 1532 Cibo – 1563 Cesalpino –
1585 Durante – 1595 Pona
— β divaricata (Rchb.)
2(1827 Gussone – 1826 Presl
1(1640 Castelli – 1696 Cupani – 1789 Uoria

1157 Lychnis rubra (Weig.) P. M. E.
1532 Cibo – 1565 Michiel 1563 Cesalpino – 1595 Pona
– 1745 Séguier (La var. pleniflora era già coltivata nel 1703 Martini)

Cucúbalus (Tourn.) L.

1158 Cucubalus báccifer L.
1550 Petrolli Cibo – 1585 Durante – 1745
Séguier – 1802 Marzari; Suffren.

Siléne L

1159 Silene vulgaris (Mönch) Garke
1415 Rimo 1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1745 Séguier 1785 Allioni – 1726 Zannichelli
— β Boraeana Rouy et Fouc.
1837 Moris – 1896 Rouy et Fouc. Flore vol. III.
— γ alpina (Thomas)
1718 Pontedera – 1755 Allioni – 1839
Bonjean in Bertoloni IV.
— δ maritima (With.)
1806 Sternberg – 1826 Nauari

86 1160 Silene auriculata S. et S.
1819 Bertoloni –

1161 Silene Elisabethae Jan
1822 Zantedeschi in Pollini –
1831 Jan – 1836 Comolli – 1839
Alliati ecc. in Bertoloni IV.

1162 Silene pumilio (L.) Wulf
1767 Arduino in Linné Mant. I
1839 Facchini, Parolini, Montini
ecc in Bertoloni IV.

1163. Silene quadrifida L.
1532 Cibo – 1707 Martini –
1754 Séguier – 1811 Tenore.

— β monachorum (Vis.)
1888. Tineo in Lojacono.
— γ villosa Gelmi
1893 Gelmi.
— δ Veselskyi (Janka)
1873 Venzo – 1892 Freyn in
Parlatore – Carnel IX.

1164 Silene alpestris Jacq.
1806 Sternberg – 1811 Brocchi –
1822 Pollini – 1839 Brignoli in Bertoloni IV
1165 Silene rupestris L.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini.

1166 Silene acaulis L.
1595 Pona — 1707 Martini — 1713 Tita — 1745 Séguier — 1724 Zanoni.

1167 Silene saxifraga L.
1565 Mattioli — 1585 Durante — 1595 Pona — 1697 Boccone — 1726 Zannichelli.
— β fruticulosa (Sieb.)
1838 Cesati in Bibl. ital. p. 346 (S. Notarisii) — 1839 Orsini in Bertoloni IV (S. polyphylla)
— γ multicaulis Guss.
1723 Micheli in Tilli — 1826 Gussone.

1168 Silene Campanula Pers.
1789 Allioni — 1833 Colla — 1839 Molineri e Balbis in Bertoloni IV.

1169 Silene succulenta Forsk.
Il tipo finora solo in Creta, Siria ecc.
— β corsica (DC.)
1697 Boccone — 1824 Viviani — 1827 Moris

1170 Silene cordifolia All.
1785 Allioni — 1867 Lisa, Canut in Ardoino.

1171 Silene vallesia L.
1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni — 1819 Bertoloni

1172 Silene ciliata Pourr.
1824 Moretti — 1825 Gussone — 1830 Tenore — 1837 Sanguinetti

1173 Silene Armeria L.
1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1717 Patarol — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni

1174 Silene Behen L.
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1837 Moris; Sanguinetti

1175 Silene muscipula L.
1826 Gussone — 1811 Tenore
1844 De Notaris — 1867 Ardoino

1176 Silene linicola Gm.
1839 Montini, Mayer, Tommasini in Bertoloni IV — 1842 Trevisan
1851 Hausmann

1177 Silene cretica L.
1818 Sebastiani e Mauri — 1827 Moris — 1830 Tenore — 1839 Bertoloni IV.
— β tenuiflora (Guss.)
1826 Gussone — 1830 Tenore

1178 Silene inaperta L.
1723 Micheli in Tilli — 1826 Gussone — 1830 Tenore

35/0018-96

1179 Silene portensis L.
1828 Loiseleur ; Duby (+1870) Figari. Cfr. Parl. Caruel Fl. ital. IX.
1848 Grenier e Godron I.

1180 Silene nicaeensis All.
1697 Boccone — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1804 Viviani.

1181 Silene sedoides Poir.
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1807 Bivona-Bernardi — 1822 Bertoloni

1182 Silene fuscata Link
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1826 Gussone
1182' Silene Minae Strobl
1903 Strobl
1183 Silene rubella L.
1837 Moris! ; Sanguinetti? —
— β turbinata (Guss.)
1827 Gussone.

1184 Silene echinata Otth
1830 Tenore — 1839 Camilli, Gasparrini, Gussone ecc. in Bertoloni IV.

1185 Silene noctiflora L.
1785 Allioni — 1830 Tenore — 1839 Montini in Bertoloni IV — 1834 Massara — 1851 Hausmann.

1186 Silene conoidea L.
1785 Allioni — 1839 Molineri in Bertoloni IV — 1867 Ardoino.
— β conica (L.)
1697 Cupani — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni
1798 Savi.
1187 Silene apetala W.
1873 Sommier e Ajuti. Cfr Parlatore — Caruel, IX, p. 372.

1188 Silene sericea All.
1696 Cupani — 1717 Patarol — 1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli.

1189 Silene pendula L.
1696 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Presl.

1190. Silene trinervia Seb. Mauri
1818 Sebastiani e Mauri — 1839 Vanderlinden in Bertoloni IV.

1191. Silene nocturna L.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone.
— β brachypetala (Rob. et Cast.)
1837 Sanguinetti — 1839 Badarò in Bertoloni IV — 1844 De Notaris
— γ Boullui (Jord.)
1872 Marsilly.
— δ reflexa (Aiton)
1811 Tenore — 1827 Gussone.

1192 Silene gallica L. R.
1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli
— 1785 Allioni — 1789 Ucria.
— β anglica (L.)
1785 Allioni — 1869 Saccardo e Visiani
— γ Giraldii (Gussone)
1839 Giraldi in Bertoloni IV — 1854
Gussone — 1882 Arcangeli.

1193 Silene vespertina Retz
1807 Bivona-Bernardi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Presl — 1826 Gussone — 1830 Tenore.

1194 Silene dichotoma Ehrh.
3 { 1847 Savignone in Bertoloni VI — 1882
Arcangeli — 1852 Gennari — 1878
Smith — ~~1882 Marchesetti~~
2 { 1843 Tommasini in Marchesetti 1882
1 { Dell' Europa merid. orient. ed Asia occ.
ora naturalizzata qua e là

1195 Silene viscosa (L.) Pers.
1855 Pirona (secondo Gortani
da escludersi)

1196 Silene fruticosa L.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1820 Presl
1827 Gussone

1197 Silene Requieni Otth

1824 Viviani — 1834 Salis-Marschlins

1198. Silene mollissima (L.) S. et S.
1824 Viviani — 1839 Seraffini in Bertoloni IV.

1199. Silene italica (L.) Pers.
1550 Aldrovandi — 1696 Cupani — 1785
Allioni — 1789 Ucria
— β flocuosa Rohrb.
1851 Hausmann — 1855 Pirona — 1869
Saccardo e Visiani.
— γ Salzmanni (Badarò)
1824 Viviani — 1826 Badarò in
Moretti.
— δ pauciflora (Salzm.) Moris
1824 Viviani — 1834 Salis-Marschlins
— ε sicula (Ucria)
1796 Ucria — 1827 Gussone.

1200. Silene paradoxa L.
1675 Zanoni — 1726 Zannichelli —
1745 Séguier; Sabbati — 1822 Pollini.

1201 Silene nutans L.
1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli —
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini.

1202 Silene viridiflora L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria
1805 Re — 1839 Barbieri in Bertoloni IV

35/0018-97

1204 Silene Otites L.
1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726
(1551 Aldrovandi) Zannichelli – 1816 Nocca
e Balbis.

1205 Silene Roemeri Friv.
1832 Tenore – 1839 Mauri e Ortini
in Bertoloni IV.

Drypis (Mich.) L.

1206 Drypis spinosa L.
1595 Pona – 1729 Micheli – 1802
Suffren – 1811 Tenore – 1822 Pollini
1828 Fiorini-Mazzanti – 1855 Pirona.
(Queste citazioni comprendono in modo
impreciso le due forme α
Linnaeana e β Jacquiniana d.
Murb. e Wettst., Beitr. Fl. Süd Bosn.
und Herceg. Cfr. Béguinot in
Bull. Soc. bot. ital. 1905.

Saponaria L.

1207 Saponaria officinalis L. R.
1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1726
(1595 Pona –) Zannichelli – 1745 Séguier.

1208 Saponaria ocymoides L.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1563
Cesalpino – 1595 Pona.

– β calabrica (Guss.)
1825 Gussone.

1209 Saponaria depressa Biv.
1696 Cupani – 1814 Bivona – Bernardi
– 1820 Presl

1210 Saponaria bellidifolia Sm.
1606 Colonna – 1826 Gussone – 1832
Tenore.

1211 Saponaria lutea L.
1755 Allioni – 1839 Balbis e
Bonjean in Bertoloni IV – 1844
De Notaris.

1212 Saponaria Vaccaria L.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1595
Pona – 1785 Allioni.

Gypsophila L.

1214 Gypsophila muralis L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1816
Nocca e Balbis – 1822 Pollini –

1215 Gypsophila repens L.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1806
Sternberg – 1808 Biroli – 1822 Pollini

1213 Gypsophila porrigens (L.) Boiss.
Dell'Asia occidentale, ora qua e là avventizia
1804 Viviani – 1882 Marchesetti
1897 Pensig

Già coltivata a Firenze, 1799 (Zuccagni)
a Padova, 1801 (Bonato) ecc., ed

1216 Gypsophila Arrostii Guss.
1789 Ucria – 1826 Gussone; Presl
1651 Erbario massimo. Cfr. Zodda.

1217 Gypsophila elegans M. B.
Originaria dell'Asia occidentale già coltivata a Verona, 1812 (Pollini) a Torino, 1815 (Biroli) ecc. raramente avventizia presso Genova
1888 Baotreri. Cfr. Penzig 1889.

1217' Gypsophila hispanica Willk.
β papillosa (Porta)
1905 Porta. Cfr. Bég. in Bull. Soc. bot. ital. e 1905 e Bull. Natur. 1906.

Tunica (Rupp.) Scop.

1218 Tunica illyrica (Ard.) F. e B.
1764 Arduino – 1806 Bivona – Bernardi – 1826 Gussone.
← qui

1219 Tunica saxifraga (L.) Scop.
1550 Cibo – 1551 Alborad II – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1678 Boccone – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier
— β permixta (Gussone)
1832 Gussone.

1220 Tunica prolifera (L.) Scop.
1532 Cibo – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
— β velutina (Gussone)
1825 Gussone – 1826 Presl – 1827 Moris

— γ Nanteuillii Rouy et F.
1898 Foucaud e Simon.

— β paniculata Lanza
1905 Lanza in Boll. Ort. bot. Palermo
— γ armerioides (S. et S.)
1905 Lanza l. c.
— δ ochroleuca (S. et S.)
1905 Lanza l. c.

1220' Tunica glumacea B. H.
— β obcordata (Marg.)
X. Grecia e Dalmazia, Avventizia a Trieste
1853–1879. Marchesetti. Cfr. detto 1882.

Velezia L.

1221 Velezia rigida L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1697 Boccone – 1785 Allioni – 1839 Gussone, Parolini, Jan in Bertoloni IV.

Dianthus L.

1222 Dianthus Armeria L.
1532 Cibo – 1745 Séguier – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri.

1223 Dianthus barbatus L.
1415 Rinio – 1713 Tita – 1769 Agosti – 1772 Scopoli – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

35/0018-98

1223' Dianthus Mikii Reich.
(D. monspessulanus × barbatus)
1867 Reichardt in Verhandl. Zool. bot. Gesell. Wien.
1897 Pospichal – 1905 Sauardo in Erbario

1223² Dianthus sinensis L.
Della Cina, coltivato comunemente fino dal principio del Settecento e talora avventizio.
1713 Tita – 1760 Allioni – 1780 Farsetti

1224 Dianthus Carthusianorum L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – ~~1785~~ ~~Allioni~~ – 1802 Marzari – 1808 Bivoli.
— β vaginatus (Chaix)
1897 Pospichal.
— γ atrorubens (All.)
1785 Allioni – 1843 Reuter e Barla in Burnat 1892
— δ sanguineus (Vis.)
1745 Seguier – 1822 Pollini. Cfr. Goiran 1904 – 1877 Freyn.
— ε Balbisii (Seringe)
1653 Volpari
1824 Balbis in DC Prodr. I – 1825 Bartling in Wendl. Beitr.
— ζ vulturius (Guss. et Ten.)
1839 Guss. et Ten. Index Sem. Hort. neapolit.
— η ferrugineus (Mitt.)
1830 Tenore

1224¹ Dianthus exilis Posp.
(D. Carthusianorum ε × monspessulanus)
1897 Pospichal.

1224² Dianthus paradoxus R. Kell.
1903 R. Keller.

1225 Dianthus Seguierii Chaix
1745 Seguier – 1791 Bellardi – 1822 Pollini (D. Carthus. e. p.) – 1836 Comolli.

1226 Dianthus rupicola Biv.
2 (1806 Bivona – Bernardi – 1826 Presl
1 (1696 Cupani – 1805 Tenore Cat. pl. Bisign.

1227 Dianthus tripunctatus S. et S.
1830 Tenore – 1839 Gussone in Bertoloni IV

1228 Dianthus deltoides L.
1745 Sabbati
1789 Allioni – 1804 Savi – 1811 Tenore
— β glaucus (L.)
1830 Tenore – 1877 Ingegnatti
1228' Dianthus decrescens Borb.
(D. deltoides × Seguieri)
1877 Piccone in Borbas, Oest. bot. Zeitschr.

1229 Dianthus alpinus L.
1848 Maly – 1851 Hausmann

1230 Dianthus glacialis Hänke
1836 Comolli – 1839 Rainer in Bertoloni IV.

— β Lereschii Burn.
1892 Burnat
— γ dissimilis Burn.
1892 Burnat
— δ neglectus (Lois.)
1824 Re — 1883 Saint-Lager

1231[1] Dianthus Gyspergerae Rouy
1903 Mad. Gysperger in Rouy, Rev. de Bot. systém.

1232 Dianthus ciliatus Guss.
1825 Gussone — 1832 Tenore (Abr.)

1233 Dianthus Caryophyllus L.
1415 Rinio
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1785 Allioni — 1816 Nocca Balbis.
— β virgineus (L.)
1805 Re — 1834 Massara — 1830 Tenore
— γ inodorus (L.)
1532 Cibo — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1806 Balbis — 1816 Pollini
— δ pygmaeus Bert.
1839 Montini in Bertoloni
— ε tergestinus Rchb
1841 Sendtner. Cfr. Freyn 1877 — 1844 Reichenbach Ic. VI —
— ζ Arrostii (J. et C. Presl)
1822 Presl — 1842 Gussone
— η siculus (J. et C. Presl)
1822 Presl — 1842 Gussone

1234 Dianthus caesius Sm.
1839 Rainer in Bertoloni IV — 1893 Rodegher e Venanzi — (+1886) Franzoni, ed 1890.

1235 Dianthus superbus L.
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Biroli — 1822 Pollini —

1237 Dianthus monspessulanus L.
1532 Cibo — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini.
— β Sternbergii (Sieb.)
1844 Cesati — 1853 Rota — 1855 Pirona

1237[1] Dianthus controversus Gaud.
(D. Seguierii × monspessulanus R. et F.)
1897 Pospichal — 1873 Goiran. Cfr. Goir 1904

1236 Dianthus plumarius L.
1760 Allioni — 1713 Tita — 1822 Pollini — 1824 Comolli — 1844 Cesati (spesso coltivato e avventizio)

Fam. 52 Frankeniaceae
Frankenia L.
1238. Frankenia pulverulenta L. R.
1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1742 Zanoni e Monti.
1239 Frankenia levis L.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1729 Micheli — 1789 Uccia
— β hirsuta (L.)
1729 Micheli — 1789 Uccia — 1827 Gussone

35/0018-99

Fam. 53 Tamaricaceae

Tamarix L.

1240. Tamarix gallica L. R

1551 aldrovandi 1561 Anguillara ~~1554 Mattioli~~ 1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1726 Zannichelli. 1802 Suffren.

1241 Tamarix africana Poir. R.

1551 aldrovandi 1696 Cupani (1785 Allioni (T. gall.) — 1789 Ucria — 1826 Gussone — 1867 Ardoino — 1837 Sanguinetti

1241' Tamarix parviflora DC.

Della Grecia ed Asia minore. Coltivato da pochi anni e quasi naturalizzato qua e là nell'Istria.

1875 Freyn. Cfr. Freyn 1877.

Myricaria Desv.

1242 Myricaria germanica (L.) Desv.

1415 Rimini 1785 Allioni — 1754 Séguier — 1802 Suffren; Marzari — 1554 Mattioli.

— β squamosa (Desv.)

1829 Avé-Lallemant

Reaumúria L.

1243 Reaumuria vermiculata L.

1696 Cupani — 1697 Bonone — 1822 Bertoloni — 1827 Gussone (Importata dall'Africa?)

70 Fam. 54 Elatinaceae

Elatine L.

1244 Elatine Alsinastrum L.

1785 Allioni — 1836 Comolli — 1844 Cesati.

1245 Elatine Hydropiper L.

1844 Cesati — 1845 Walker-Arn. in Seub. Elatin. monogr.

— β pedunculata Moris

1827 Moris — 1839 Moris, Soleirol in Bertoloni IV.

— γ hexandra (DC.)

1809 Bellardi in Mem. Accad. Tor.

1844 Cesati.

— δ major (A. Br.)

1822 Pollini (E. hexandra)

— ε macropoda (Guss.)

1827 Gussone

— ζ hiandra (Schk)

1845 Jan sec Seub. Elat. monogr.

1890 Beuari in Parl.-Caruel IX.

— η Gussonei Somm.

1885 Solla — 1906 Sommier Boll. Ort. bot. Palerm. (?)

Fam. 55 Hypericaceae

Hypericum L.

1246 Hypericum helodes Huds.

1860 Caruel — 1875 Savi, Tassi, Figari in Parlatore V

1247 Hypericum aegyptiacum L.
1827 Seraphia – 1844 Gussone.

1248 Hypericum balearicum L.
1872 Figari in Parlatore V (pro – babitmente avventizio)

1249 Hypericum calycinum L.
Della Grecia ed Alta occid. Coltivato fino dal settecento ed ora inselvatichito in molti luoghi.
1780 Fassetti – 1807 L. Ardizzoni – 1812 Bonato – 1864 Savardi – 1872 Pigo e Figari in Parlatore V (forse avventizio; forse inselvatichito)

1250 Hypericum Androsaemum L.
1532 Cibo – 1556 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Porta – 1785 Allioni.

1251 Hypericum hircinum L.
1696 Cupani – 1789 Moris – 1820 Tenore – 1826 Presl – 1828 Fiorini-Mazzanti – 1862 Sanguinetti
1565 Michiel

1252 Hypericum quadrangulum L.
1565 Michiel
1532 Cibo – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Magazzi.
— β Delatangii (Lamotte)
1876 Mabille veneto; cfr. Burnat 1896
1869 Strafforello. Cfr. Burnat 1896
— γ acutum (Mönch)
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.
— δ corticum (Sternb.)
1825 Soleirol. Cfr. Gren. Godr. I

1253 Hypericum crispum L. R
1685 Tournefort – 1697 Bocconi – 1765 Turra in Forsetia – 1789 Moris.

1254 Hypericum perforatum L. R
1565 Rino
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1695 Bocconi.
— β alpicum Parl.
1872 Parlatore Fl. ital. V.

1255 Hypericum humifusum L.
1773 Vitman – 1785 Allioni – 1808 Viviani – 1816 Pollini.
— β australe (Ten.)
1830 Tenore – 1825 Soleirol
1820 Mauri – 1837 Moris.

1256 Hypericum nummularium L.
1697 Bocconi – 1785 Allioni – 1850 Bonjean, Balbis, Moretti in Bertoloni VIII – 1862 Cardosino.

1257 Hypericum barbatum Jacq.
1820 Tenore – 1850 Gussone in Bertoloni VIII.

1258 Hypericum Richeri Vill.
1785 Allioni – 1773 Vitman – 1735 Micheli

35/0018-100

1259 Hypericum perfoliatum L.
1697 Boccone; Cupani — 1554 Mattioli
— 1789 Uoria
— β annulatum (Moris)
1827 Moris.

1260 Hypericum pulcrum L.
1830 Tenore.

1261 Hypericum montanum L.
1551 al Mondi
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari —
1595 Pona — 1606 Colonna — 1773 Vitman

1262 Hypericum hirsutum L.
1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1745
Séguier — 1785 Allioni.

1263 Hypericum tomentosum L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Uoria
1827 Zeraphe — 1837 Moris.

1264 Hypericum hyssopifolium Vill.
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1833 Colla
1850 Ortini, Marzialetti in Bertoloni VIII

1265 Hypericum Coris L.
1561 Anguillara — 1566 Calzolari —
1554 Mattioli — 1583 Cesalpino

1266 Hypericum mutilum L.
Originario dell'America lett. Fiorasi

ora inselvatichito in più luoghi della Toscana
1834 P. Savi in Nuovo giorn. letterati di Pisa 1839 — 1842 Puccinelli —
1860 Caruel

Fam. 56 Cistaceae

Helianthemum (Tourn.) Adans.
1267 Helianthemum fumana (L.) Mill.
1563 Cesalpino — 1565 Michel — 1726 Zannichelli
— 1735 Micheli — 1745 Séguier.
— β ericoides (Cav.)
1826 Gussone — 1830 Tenore.

1267' Helianthemum Sieberi Bruegg.
(H. Fumana × chamaecistus?)
1880 Bruegger in Grosser Pflanzenreich IV, 193 (1903)

1268 Helianthemum arabicum (L.) Pers.
1826 Gussone; Presl — 1830 Tenore
— β Savii (Bertol.)
1806 Bertoloni — 1830 Tenore

R 1269 Helianthemum thymifolium (L.) Pers.
1696 Cupani — 1826 Badarò in Moretti
— β Barrelieri (Ten.)
1826 Presl — 1827 Gussone — 1830
Tenore
— γ viride (Ten.)
1811 Tenore — 1826 Badarò in Moretti

— δ juniperinum (Lag.)
1830 Tenore

1270 Helianthemum levipes (L.) Pers.
1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli —
1785 Allioni — 1802 Viviani.

1271 Helianthemum Lippii (L.) Pers.
Il tipo è solo proprio d'Egitto, Siria ecc.
— β sessiliflorum (Pers.)
1826 Gussone; Presl — 1830 Tenore

1272 Helianthemum rotundifolium Dun
(+1711) Cupani — 1822 Presl — 1825 Gussone
ed. 1713 —

1273 Helianthemum canum (L.) Dun.
1785 Allioni — 1595 Porta — 1745 Séguier
— β italicum (Pers.)
1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802
Suffren — 1819 Bertoloni — 1816 Pollini

1274 Helianthemum lunulatum (All.) DC.
1789 Allioni — 1833 Colla — 1867
Lisa in Ardoino

1275 Helianthemum lavandulifolium Mill.
1824 Figari. Cfr. Parlatore V — 1844
Grenier e Godron I

1276 Helianthemum apenninum (L.) Mill.
1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Presl
1830 Tenore

— β pulverulentum (DC.)
1818 Sebastiani e Mauri — 1745 Séguier
1822 Pollini — 1826 Presl.
— γ pilosum (L.)
1785 Allioni — 1805 Re.
— δ roseum Willk.
1745 Sebast. 1852 Kunze, Bracht, Rainer. Cfr.
Willk. Icon. et descript. pl. II p. 110.

1277 Helianthemum Chamaecistus Mill.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli
— β serpyllifolium (L.)
1696 Cupani — 1826 Presl — 1827 Gussone
— γ grandiflorum (DC.)
1785 Allioni — 1830 Tenore.
— δ Scopolii Willk.
1772 Scopoli (Cist. toment.)
— ε roseum DC.
1785 Allioni — 1826 Badarò in Moretti
— ζ Berterianum (Bertol.)
1833 Colla — 1842 Bertero in Bertoloni V
— η acuminatum (Pers)
1826 Badarò in Moretti — 1867 Ardoino
— δ leptophyllum (Dun.)
1887 Groves
— ι glaucum (Pers.)
1826 Presl — 1843 Gussone
— 2x bicolor (Presl)
1826 Presl — 1903 Strobl

35/0018-101

1277[1] Helianthemum Andersonii Sweet 72
(H. apenninum × Chamaecistus c)
1903 Huter in Grosser l.c.

1277[2] Helianthemum Chamaecistus α × c)
1903 Grosser l.c. — 1830 Tenore Fl.
(Nap. IV (H. stabianum)

1278 Helianthemum retrofractum Pers.
1852 Gussone in Willk. Ic. et descrip. plantar. p. 94.

1279 Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1826 Presl

1280 Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
1811 Tenore — 1822 Pollini — 1827 Gussone
1754 Séguier
— β intermedium Pers.
1826 Presl — 1852 Bernhardi in Willkomm Ic. et descript.

1281 Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
1785 Allioni — 1826 Presl — 1827 Gussone — 1837 Moris.

1282 Helianthemum guttatum (L.) Mill.
1595 Porta — 1606 Colonna — 1678 Boccone — 1696 Cupani — 1785 Allioni.
— β Vivianii (Pollini)
1804 Viviani — 1824 Pollini, III, 799.

— γ plantagineum (Pers.)
1827 Gussone — 1887 Grove — 1895 Rouy e Foucaud II.
— δ inconspicuum (Thib.)
1852 Fauché in Willk. l.c. — 1886 C.P.G. — 1894 Arcangeli.

1283 Helianthemum Tuberaria (L.) Mill.
1678 Boccone — 1785 All — 1826 Presl; Gussone 1867 Ardoino.

1284 Helianthemum halimifolium (L.) Pers.
(+1673) Barrelier — 1808 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

Cistus (Tourn.) L.

1285 Cistus Clusii Dun.
1826 Presl — 1827 Gussone

1286 Cistus monspeliensis L.
1551 Aldrovandi II
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni.

1286[1] Cistus florentinus Lam.
(C. monspeliensis × salvifolius L. et B.)
1786 Lamarck Enc. method — 1856 (ex Sperard (+1728)) Willkomm Ic. et descript. pl.
1884 Magnus in Barbey — 1896 Bicknell.

1287 Cistus salvifolius L. R
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli.

— β grandifolius Willk.
1875 Parlatore V.

1288 Cistus parviflorus Lam.
1843 Gussone

1288' Cistus Skanbergii Lojac.
(C. parviflorus × monspeliensis ?)
1844 Gussone — 1884 Lojacono.

1289 Cistus incanus L.
1551 Aldrovandi II
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino —
1697 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri.
— β villosus (L.) R
1551 Aldrovandi II
1554 Mattioli — 1824 Viviani — 1837
Moris — 1842 Tassinari e Targioni —
Tozzetti in Bertoloni V.
— γ corticus (Lois.)
1827 Loiseleur — 1848 Grenier
e Godron — 1884 Barbey.
— δ creticus (L.) R
1827 Gussone — 1830 Tenore — 1856
Willkomm Ic. et descript. plant.

1290 Cistus crispus L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria
— 1822 Bertoloni

1291 Cistus albidus L.
1785 Allioni — 1822 F. Fontana in
Pollini II — 1837 Moris
1678 Boccone —

1702 Martini —

1291' Cistus laurifolius L.
2 — 1806 Sternberg — 1817 Pollini in Bibl. ital.
1 — 1768 Bassi — 1785 Allioni — 1789 Ucria
1899 Sommier — Cfr. De Toni
Mem. Acad. Pad. 1894; Sommier Bull.
Soc. bot. ital. 1899; Pampanini, N. Giorn. bot. ital. 1906.
12 Fam. 57 Violaceae

Viola (Tourn.) L.

1292 Viola canina L.
1551 Aldrovandi II
1785 Allioni — 1798 Savi — 1808 Biroli
— 1816 Nocca e Balbis — 1822 Pollini.
— β lactea (Sm.)
1835 Felisi in Bertoloni II — 1897 Pospichal
1898 Piotti e Bell. in F. P. B.
— γ Ruppii (All.)
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1816 Nocca
e Balbis
— δ Schultzii (Billot)
1893 Rodegher e Venanzi — 1897 Pospichal
— ε persicifolia (Roth)
1886 C. P. G. — 1897 Pospichal
— ζ elatior (Fr.)
1558 Mattioli (escl. il col. dei fiori) — 1566
Calzolari — 1585 Durante — 1802 Suffren.
— η pumila (Chaix)
1812 Campana Cat. horti bot. Ferrar. p. 30
— θ silvatica (Fr.)
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1745 Séguier — 1798 Savi
— 1816 Nocca e Balbis — 1827 Gussone

35/0018-102

— ι insularis (Gr. Godr.)
1848 Bernard in Grenier e Godron I.

— κ arenaria (DC.)
1789 Allioni — 1805 Re — 1824 Vitiani in Pollini

73

1292¹ Viola spuria Clak.
(V. canina ϑ silvatica × mirabilis)
1893 Gelmi — 1904 Goiran.

1292² Viola Schalmausenii Rouy & F.
(V. canina κ arenaria × mirabilis)
1893. Gelmi.

1292³ Viola Uechtritziana Borb.
(V. mirabilis × V. canina ϑ b Riviniana)
1904 Goiran.

1292⁴ Viola Weinharti W. Becker
(V. canina γ × canina ϑ, b Riviniana)
1902 Burnat e Briq. Ann. Jard. bot. Génev.

1292⁵ Viola arborescens L.
1898 Nicotra in Malpighia

1293 Viola mirabilis L.
1742 Zanoni e Monti — 1785 Allioni —
1802 Suffren — 1805 Re — 1822 Pollini.

1294 Viola hirta L.
1532 Cibo — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

— β collina (Bess.)
1886 C. P. G. — 1890 Rostan in Parlatore-Caruel IX — 1904 Goiran

— γ ambigua (W. K.)
1882 Arcangeli — 1886 C. P. G.

— δ sciaphila (Koch)
1882 Arcangeli — 1890 Carestia e Rostan in Parlatore-Caruel IX — 1904 Goiran

— ε permixta (Jord.)
1882 Arcangeli — 1886 C. P. G.

— ζ Dehnhardtii (Ten.)
1830 Tenore.

— η adulterina (Godr.)
1893 Gelmi — 1897 Pospichal

— ϑ alba (Bess.)
1785 Allioni — 1696 Cupani; 1745 Séguier
1822 Pollini

— ι multicaulis (Jord.)
1882 Arcangeli — 1877 Freyn

— κ odorata (L.)
1415 Rimo 1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara. — 1583 Cesalpino — 1696 Cupani

R.

— λ Beraudii (Bor.)
1877 Freyn

— μ suavis (M. B.)
1886 C. P. G. — 1844 Cesati

1294¹ Viola hybrida Val de Lièvre
(V. hirta β collina × hirta α)
1899 Sauter

1295 Viola palustris L.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1844 Cesati — 1893 Gelmi.
— β uliginosa (Bess.)
1893 Chiovenda in Bull. Soc. bot. ital.

1295' Viola Rossii Chiov. uliginosa
(V. pinnata × palustris β +)
1893 Chiovenda in Bull. Soc. bot. ital.

1296 Viola pinnata L.
1766 Allioni — 1805 Re — 1822 Cristofoli in Pollini.

1297 Viola biflora L.
1532 Cibo — 1566 Calzolari — 1595 Porta (1551 Allorandi +)
1726 Zannichelli.

1298 Viola nummularifolia Vill. e. p.
1697 Bouone — 1755 Allioni — 1808 Biroli — 1867 Lisa in Ardoino

1299 Viola cenisia L.
1755 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Zantedeschi in Pollini —
— β Comollia (Massara)
1834 Massara — 1824 Comolli
~~1300~~ γ Valderia (All.)
1785 Allioni — 1822 Balbis e Piotta in Pollini.

1300 Viola calcarata L.

1742 Zanoni e Monti — 1785 Allioni
1808 Biroli
~~1802 Saffran~~ — 1804 Savi — 1842 Puccinelli
— β Eugeniae (Parl.)
1832 Tenore — 1818 Sebastiani e Mauri.
— γ nebrodensis (Presl)
1822 Presl — 1826 Jan.
— δ aetnensis (Gass.)
1696 Cupani — 1816 Bivona — Bernardi.
— 1826 Presl — 1856 Huet Cfr. Nym.
(1827 Gussone)

— ε corsica (Nyman)
1834 Salis-Marschlins — 1848 Grenier Godr.
— ζ gracilis (S. et S.)
1816 Bivona — Bernardi — 1827 Gussone

1301. Viola tricolor L. R
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1696 Cupani — 1745 Séguier.
— β Kitaibeliana (R. S.)
1822 Presl — 1830 Tenore
— γ parvula (Tineo)
1696 Cupani — 1817 Tineo — 1826 Presl.
— δ hortensis DC.
1696 Cupani — 1713 Tita — 1750 Manetti
Virid. Florent.
— ε saxatilis (Schm.)
(+ 1863) Morassi in Gortani 1906 — 1882 Arcangeli — 1898 Fiori I. ~~in F. R. B.~~
— ζ lutea (Huds)
1696 Cupani — 1830 Tenore — 1842 Gussone
— η declinata (W. et K.)
1808 Biroli — 1824 Comolli; Welden in Pollini

35/0018-103

1301 Viola cornuta L. 76
II (1853 Parlatore. Cf. Carnel 1860
I (1836 Guthnick. Cf. Gaud. Synops. H. helv. (Avvenbzia?)

Fam. 58 Resedaceae

Reseda (Tourn.) L.

1302 Reseda lutcola L. 2
1551 al Trevisano 1565 Matthioli-Michiel. 1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani
— β Guillonei (Boiss. et Reut.)
1825 Guillone – 1830 Tenore
— γ dimerocarpa Müll.
1882 Reverchon. Cf. Barbey 1884.

1303 Reseda alba L.
1551 al Trevisano VII 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1697 Boccone 1818 Kutzinsen (avvent.?) – 1760 Allioni (coltiv.) – 1867 Ardoino (avvent.?)
— β Hookeri (Guss.)
1565 Michiel – 1854 Guillone
— γ myriophylla (Tenore)
1830 Tenore

1304 Reseda lutea L.
1551 al Trevisano II 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier.
— β multifida (Presl)
1827 Presl – 1832 Guillone
— γ gracilis (Ten.)
1830. Tenore
— δ Rogeri (Porta e Rigo)
1889 Porta e Rigo in Rym. Suppl. II.

1305 Reseda Phyteuma L.
1595 Pona – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier.
— β inodora (Rchb.)
1855 Brumati in Pirona (R. mediterranea)
— γ odorata (L.)
δ. Dubbia origine; forse una derivazione culturale della R. Phyteuma. È coltivata tutt'al più saltuariamente e asilvaticita qualche volta.
1760 Allioni – 1776 Bartalini – 1796 Gasparrini – 1864 Savarido (avvent.) Avventizia
1904 Govan (avvent.) (1883 Cocconi H. Bol.)

Astrocarpus Neck

1306 Astrocarpus sesamoides (L.) DC.
1785 Allioni – 1834 Salis-Marschlins – 1837 Moris.
— β spathulatus Müll.
1834 Salis-Marschlins – 1837 Moris
— γ firmus Müll.
(+1870) Figari. Cf. Parlatore-Car. X
— δ alpinus Salis
1834 Salis-Marschlins – 1858 Boreau

Fam. 59 Capparidaceae

Capparis (Tourn.) L

1307 Capparis spinosa L. R
1415 Rinio 1583 Cesalpino – 1789 Uoria – 1745 Séguier – 1804 Bertoloni.
— β inermis Turra (1780)
(= C. rupestris S. et S. (1806))
1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1697 Cupani – 1745 Séguier.
— γ sicula (Duham.)
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1697 Boccone – 1826 Gussone.

Fam. 60 Cruciferae

Matthiola R. Br.

1308 Matthiola incana (L.) R. Br. R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani
— β rupestris (Raf.)
1814 Rafinesque (Hesperis r.) – 1828 Gussone.
— γ glabra (DC.)
1850 c. Kralik. Cfr Rouy et Fouc. I.
1882 Nyman – 1886 C. P. G.
— δ undulata (Tineo)
1827 Tineo, Cat. pl. hort. Panorm.
1696 Cupani – 1828 Gussone

1309 Matthiola sinuata (L.) R. Br.
1785 Allioni – 1827 Gussone – 1830 Tenore
— β numidica Coss.
1872 Marsilly / o Revelière – 1893 Rouy et Fouc. I.

1310 Matthiola tristis (L.) R. Br.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1805 Re – 1818 Sebastiani e Mauri.
— β valesiaca (Boiss.)
1802 Suffren – 1816 Poll. – 1893 Galmi
— γ sicula Conti M. coronopifolia Guss. non DC.
1697 Boccone; Cupani – 1789 Uoria – 1826 Presl – 1828 Gussone – 1897 Conti
— δ provincialis (L.)
1897 Conti in Bull. Herb. Boiss.
— ε italica Conti.
1897 Conti l. c.

1311 Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.
1676 Boccone 1696 Cupani – 1789 Cupani; Allioni – 1826 Presl – 1837 Moris.

Malcolmia R. Br.

1312 Malcolmia litorea (L.) R. Br.
1785 Allioni – 1823 Fiorini-Mazzanti. 1826 Presl
1313 Malcolmia maritima R. Br.
1666 Ambrosini 1785 Allioni – (1772 Maratti) 1820 Mauri
(Spesso coltivata e fuggiasca dagli orti)

35/0018-104

1314 Malcolmia Orsiniana Ten.
1832 Tenore – 1847 Mauri in Bertoloni VII, 109.

1315 Malcolmia parviflora DC.
1807 Bivona – Bernardi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone.

1315' Malcolmia confusa Boiss.
1847 Bubani e Orsini in Bertoloni VII (+1870) Orsini in Erb. Pad. – 1905 Lanza in Boll. Orto bot. Palermo.

1316 Malcolmia africana (L.) R. Br.
1697 Bocone – 1826 Presl – 1844 De Notaris.

Hésperis (Tourn.) L.

1317 Hesperis laciniata All.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1830 Tenore.

1318 Hesperis matronalis L.
1532 Cibo – 1785 Allioni – 1816 Nocca e Balbis – 1818 Sebastiani e Mauri – Coltivata anche spesso (fino dal 1644 a Padova [Veslingio]) e frequentemente avventizia.

Cheiranthus L.

75 1319 Cheiranthus Cheiri L. R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1785 Allioni – forse oriundo della Grecia, ma oggi largamente e completamente naturalizzato.

Erýsimum L.

1320 Erysimum cheiranthoides L.
1785 Allioni – 1826 Jan – 1847 Comolli; ~~1847~~ Montini in Bertoloni VII.

1321 Erysimum repandum L.
1785 Allioni – 1847 Tommasini in Bertoloni VII – 1878 Smith.

1322. Erysimum crepidifolium L.
(+1849) Kellner. Cfr. Arcangeli 1882 e Parlatore – Caruel IX. 939 – 1904 Goiran – 1906 Saccardo in herb! (Vittorio)

1323 Erysimum hieracifolium L.
1785 Allioni – 1802 Marzari – 1844 De Notaris; Cesati.
— β pannonicum (Crantz)
1853 Rota – 1855 Pirona.
— γ Cheiranthus (Pers. 1807) lanceolatum (R. Br. 1812)
1595 Pona – 1697 Bocone – 1755 Allioni – 1773 Vitman.
— δ pumilum (Gaud.)
1786 Turra – 1785 Allioni – 1826 Presl ~~– 1847 Comolli – 1853 Rota.~~
1855 Huet. Cfr. Nym.

— ε helvetica (DC.)
1836 Tenore — 1844 Casati — 1847 Comolli — 1852 Rota.

— ζ canescens (Roth)
2 { 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Presl — 1844 Casati; De Notaris Sibthorp
1 { 1595 Pona — 1745 Séguier. Cfr. Goiran 1904.

Braya Sternb. et H.

1324 Braya alpina S. et H.
1847 Facchini in Bertoloni VII.

Arabis L.

1325 Arabis glabra (L.) Bernh.
9 { 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1805 Re — 1822 Pollini. 1565 Michael

1326 Arabis pauciflora (Grimm) Garke
1785 Allioni — 1808 Viviani — 1821 Nocca e Balbis — 1837 Moris, Rainer, Manganotti, Margialetta ecc. in Bertoloni VII.

1327 Arabis Turrita L.
9 { 1697 Boccone — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1802 Suffren, Margaris 1565 Michael —

1328 Arabis alpina L.
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1696 Cupani — 1745 Séguier.

— β cortica Rouy & Foucaud
1850 c. Kralik. Cfr. Rouy et Fouc. I.

— γ albida (Stev.)
1826 Presl — 1830 Tenore — 1897 Fiori & Paoletti.

1329. Arabis hirsuta L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1724 Tournef. 1745 Séguier — Zanoni — 1876 Pollini.

1 — β Allionii (DC.)
1785 Allioni — 1847 Balbis e Molineri in Bertoloni VII.

— γ cilicica (Reynier, 1788)
2 { 1824 Re — 1847 Ghevardi in Bertoloni VII
1 { 1822 Pollini. Cfr. Goiran 1904

— δ sagittata (DC.)
1804 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri 1826 Presl

1330 Arabis muralis Bert.
1806 Bertoloni — 1815 Savi — 1826 Jan — 1830 Tenore.

— β rosea (DC.)
1847 Gussone in Bertoloni VII.

1331 Arabis caerulea (All.) Haenke
1702 mer. Hall. 1785 Allioni — 1805 Re — 1868 Viviani — 1847 Rainer, Facchini ecc. in Bertoloni VII

1332 Arabis vochinensis Spr.
1847 Brignoli e Cornaggia in Bertoloni VII — 1855 Pirona.

35/0018-105

76

1333 Arabis Scopoliana Boiss.
(+1814) Mazzucato. Cfr. Pirona 1855 (Draba cit.)
1772 Scopoli — 1843 Tommasini
in Koch.

1334 Arabis petraea (L.) Lam.
1851 Hausmann — 1885 Sardagna
La Fl. alp. Trent. — 1893 Gelmi.
(+1848) Cristofori. Cfr. Gelmi 1893

1335 Arabis serpyllifolia Vill.
1785 Allioni — 1805 Re — 1826 Gussone.

1336 Arabis pumila Wulf. in Jacq.
1745 Séguier — 1802 Suffren — 1815
Moretti — 1816 Pollini.

1337 Arabis bellidifolia Jacq.
1785 Allioni — 1806 Sternberg —
1754 Séguier — 1822 Pollini.
1565 Michiel —

1338 Arabis cebennensis DC.
(Il tipo trovasi nella Franc. centr., non in Italia)
— β pedemontana Boiss.
1842 Boiss. in Diagn. pl. or. I — 1882
Arcangeli — 1893 Rostan in Parl. Carnel
IX.

1339 Arabis Halleri L.
1785 Allioni — 1815 Moretti — 1822
Pollini — 1844 Casati

1340. Arabis arenosa (L.) Scop.
(+1805) Wulfen ed. 1850? — 1818 Balbis —
1847 Tommasini, Berini in Bertoloni VII.

1341. Arabis Thaliana L.
(+1673) Barrelier edit. 1714 — 1724 Zanoni
— 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1798 Savi

1342. Arabis verna (L.) R. Br.
1696 Cupani — 1726 Zannichelli —
1785 Allioni — 1789 Uoria.

1343. Arabis auriculata Lam.
1789 Allioni — 1808 Biroli — 1830
Tenore — 1893 Gelmi.

1344. Arabis saxatilis All.
1785 Allioni — 1805 Re — 1847 Facchini in Bertoloni VII — 1816 Pollini
1893 Gelmi.

Sisymbrium (Tourn.) L.

1345. Sisymbrium strictissimum L.
1785 Allioni — 1847 Comolli e Facchini
in Bertoloni VII — 1893 Gelmi.

1346 Sisymbrium dentatum All.
1785 Allioni — 1805 Re — 1847
Bergamaschi in Bertoloni VII

1348. Sisymbrium Irio L.
1606 Colonna — 1675 Zanoni — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Uersa.

1349 Sisymbrium austriacum Jacq.
1785 Allioni — 1833 Colla
— γ Tillieri (Bellardi)
1800 Bellardi in W. sp. pl. III.
1899 Valbusa in Malpighia.
2 — δ erysimifolium (Pourr.)
1785 Allioni (Sinap. maritim. All.?)
— β acutangulum (DC.)
1 1833 Colla — 1847 Gherardi e Bonjean in Bertoloni VII.

1350 Sisymbrium Loeselii L.
1804 Balbis — 1822 Pollini — 1844 Cesati — 1847 Sassi e Montini in Bertoloni VII

1351 Sisymbrium Columnae Jacq.
1606 Colonna — 1808 Biroli — 1826 Gussone; Badaró in Moretti — 1852 Rota.

1352 Sisymbrium altissimum L.
1847 Bertoloni — 1851 Hausmann — 1858 Sanguinetti
1882 Arcangeli; Marchesetti —
1836 Tenore

1353 Sisymbrium tanacetifolium L.
1785 Allioni — 1675 Zanoni — 1697 Boccone
1869 Lisa in Ardoino.

1354 Sisymbrium Sophia L.
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli

1355. Sisymbrium polyceratium L. R
1565 Mattioli (Un altro Irione) — 1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1735 Micheli

1356 Sisymbrium officinale (L.) Scop.
1550 Petrell. Cibo — 1563 Cesalpino — 1558 Mattioli — 1595 Pona — 1745 Séguier.

1357. Sisymbrium erysimoides Desf.
(+ 1711) Cupani (1713) — 1837 Moris.

Alliaria (Rupp.) Adans.

1358 Alliaria officinalis Andrz.
1563 Cesalpino — 1554 Mattioli
1561 Anguillara — 1566 Calzolari
1745 Séguier.

13 Barbaréa Beckm

1359 Barbarea vulgaris R. Br.
1550 Petrell. Cibo — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Mavzari.
— β rupicola (Moris)
1827 Moris — 1834 Colla.
— γ verna (Mill.)
1815 Savi — 1825 Re — 1837 Moris
1756 Sabbati

35/0018-106

— δ intermedia (Boreau)
1842 Boiss. Diagn. pl. orient. I — 1868 Tissière — 1882 Arcangeli — 1884 Petit
— ε sicula (Presl)
1822 Presl — 1828 Gussone.
— ζ bracteosa (Guss.)
1828 Gussone — 1830 Tenore — 1844 Cesati — 1847 Comolli.

1360 Barbarea dentata (L.) Fiori
1696 Cupani — 1789 Uoria — 1826 Jan
1844 Gussone.

Nasturtium (L.) R. Br.

1361 Nasturtium officinale R. Br. R
1415 Rinio 1550 Petroli Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583. Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

1362 Nasturtium asperum (L.) Boiss.
1867 Canut. Cfr. Parl. Carnel IX — 1867 Ardoino — 1892 Burnat.

1363 Nasturtium silvestre (L.) R. Br.
1532 Cibo — 1606 Colonna — 1735 Micheli — 1745 Séguier.
1364 Nasturtium lippizense (Wulf.) DC.
1788 Wulfen in Jacq. Collect. II, 161.
1832 Reichenb. Fl. excurs. — 1855 Pirona

1365. Nasturtium pyrenaicum R. Br.
1755 Allioni — 1808 Biroli — 1821 Noua e Balbis — 1822 Pollini.
1840 Lisa. Cfr. Burnat I.

1366 Nasturtium amphibium (L.) R. Br.
1650 J. Bauh. et Cherl. — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Biroli
— β austriacum (Crantz)
1844 Passerini — 1853 Passerini in Bertoloni IX.
— γ armoracioides (Tausch)
1844 Cesati — 1886 C. P. G.
— δ palustre (Leyss.)
~~[illegible]~~ 1745 Séguier — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1822 Pollini

1366' Nasturtium anceps (Wahl.) DC.
(N. amphibium × silvestre Asch.)
1735 Micheli — 1810 Bertoloni — 1815 Savi
1818 Sebastiani e Mauri.

1367 Nasturtium Armoracia (L.) Fr. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1558 Mattioli
1785 Allioni — 1822 Pollini — 1853 Rota.
Spesso qua e là inselvatichita, ma non propriamente spontanea fra noi, essendo originaria della Russia orient.

Cardamine (Tourn.) L.

1368. Cardamine asarifolia L.
1696 Cupani – 1697 Bocone – 1675 Zanoni – 1785 Allioni.

1369. Cardamine bellidifolia L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli
1780 Turra – 1834 Massara
– β alpina (W.)
1903 Schulz. Monogr. Gatt. Cardam.

1370 Cardamine Plumieri Vill.
1697 Bocone – 1785 Allioni – 1825 Viviani – 1834 Salis.

1371 Cardamine trifolia L.
1532 Cibo – 1565 Michiel 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren – 1822 Pollini.

1372 Cardamine amara L.
1532 Cibo – 1742 Zanoni e Monti – 1785 Allioni – 1789 Uoria – 1802 Suffren – 1805 Re.
– β calabrica (DC.)
1821 L. Thomas in DC. Regn. veg. syst. II, 262 – 1830 Tenore.
– γ grandifolia Bertol.
1847 Marzialetti e Orsini in Bertoloni VII

1373 Cardamine pratensis L.
1785 Allioni – 1745 Séguier – 1798 Savi – 1802 Suffren; Marzari

– β Hayneana (Welw. ex Rchb.)
1565 Mattioli – 1847 Moretti, Difesa d. Mattioli (Card. Mattioli) – 1853 Rota
– γ calabrica (Arc.)
1877 Arcangeli in Enum. sem. horti bot. flor.

1374. Cardamine hirsuta L.
(+1673) Barrelier edit. 1714 – 1696 Cupani – 1724 Zanoni e Monti – 1745 Séguier 1785 Allioni – 1789 Uoria.
– β silvatica (Link)
1822 Pollini – 1830 Tenore.

1375 Cardamine parviflora L.
1828 Fiorini – Mazzanti – 1830 Tenore – 1852 Piccaroli in Rota.
1847 Puccinelli, Savi ecc. in Bertoloni VII

1376 Cardamine glauca Spr.
1807 Bivona – Bernardi – 1826 Presl 1830 Tenore.
1651 Erbario mattinese – Cfr. Zoddi

1377 Cardamine impatiens L.
(+1617) Alpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1821 Nocca e Balbis.

1378 Cardamine resedifolia L.
1697 Bocone – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini.
– β hamulosa (Bert.)
1832 Bertoloni

35/0018-107

1379. Cardamine maritima Portenschl. 78
1848 Maly – 1882 Arcangeli.

1380 Cardamine graeca L.
1697 Bocone – (+1711) Cupani ed. 1713 – 1815 Savi – 1826 Presl.

1381 Cardamine Chelidonia L.
1592 Colonna – 1666 Ambrosini – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Tenore.

Dentaria (Tourn.) L.

1382 Dentaria enneaphyllos L.
1585 Durante – 1606 Colonna – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari – 1806 Sternberg.

1383 Dentaria pentaphyllos L.
1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1791 Bellardi – 1802 Suffren; Marzari.
– β polyphylla (W. K.)
1745 Sabbati 1820 Tenore – 1821 Nova e Balbis – 1847 Comolli – 1853 Rota.
– γ intermedia (Sonder)
2 (1885 Leybold Sec. Sonder in Flora, p. 129
1 ((+1852) Facchini in Gelmi 1893
– δ digitata (Lam.)
1565 Mattioli – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

1384 Dentaria bulbifera L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Séguier.

Succowia Medic.

1385 Succowia balearica (L.) Med.
2 (1826 Presl – 1828 Gussone – 1837 Moris – 1883 F. Major. Cfr. Parl. Car. IX
1 (1819 Webb. Cfr. Parl. Car. IX

Carrichtera Adans.

1386 Carrichtera annua (L.) Prantl
1696 Cupani – 1789 Acria – 1827 Gussone; Moris.
1387 ~~– ○○○ –~~ Vedi pag. seg.

Sinápis (Tourn.) L.

1388 Sinapis procumbens Poir.
1900 Sommier, L'isol. d. Giglio.

1389 Sinapis alba L. R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – (+1711) Cupani – 1785 Allioni

1390 Sinapis dissecta Lag.
(+1711) Cupani ed. 1713 – 1822 Bertoloni – 1826 Presl – 1827 Moris.

~~[illegible]~~ ([illegible]) L.

Da portarsi al segno ~~000~~ pag. preced.

Erúca (Tourn.) Adans

1387 Eruca sativa Mill. R
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

Brássica (Tourn.) L.

1391 Brassica pubescens (L.) Ard.
1696 Cupani – 1759 Arduino – 1806 Bivona – Bernardi – 1822 Bertoloni

1392 Brassica adpressa (Mönch) Boiss. R.
(+1711) Cupani – 1804 Bertoloni – 1826 Presl – 1827 Gussone

1393 Brassica nigra (L.) Koch
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani

1394 Brassica Sinapistrum Boiss.
1558 Mattioli (teste Bert.) – 1785 Allioni – 1745 Séguier – 1802 Suffren.
— β Schkuhriana (Rchb.)
1906 Sauardo in herb. (Vittorio)

1395 Brassica monensis (L.) Huds.
1785 Allioni – 1805 Re – 1832 Bertoloni – 1825 Viviani –
— β rectangularis (Viv.)
1825 Viviani – 1834 Salis – Marschlins

qui

1397 Brassica elongata Ehrh.
Dell'Europa orient., manca il tipo
— β persica Boiss.
1882 Marchesetti – 1889 Pergis (avventizia)

1397' Brassica palustris Pirona
1855 Pirona – 1869 Sauardo e Visiani.
Cfr. Béguinot in Bull. Soc. bot. It. 1905 p. 258

1396 Brassica fruticulosa Cir.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1792 Cirillo.
— β exaltata Hut. Port. Rig.
1879 Porta. Cfr. Hut. Bot. Zeitschr. ~~da~~ 1904, p. 142, ove la var. è assimilata a Brassica boetica Boiss. (= B. virgata Presl)

1398 Brassica amplexicaulis (Desf.) Pom.
1826 Presl – 1828 Gussone.

1399 Brassica campestris L.
2 1550 Cibo – 1696 Cupani – 1785 Allioni.
1802 Suffren. – 1565 Mattioli (α oleifera)
1 Nativa dell'Europa bor. e occid., coltivata in alcune var. fino dalle cinquanta colture! e spesso fuggiasca qua e là dalle
— β Rapa (L.) R
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara

1400 Brassica Napus L. R
Nativa delle rive del Baltico e della

35/0018-108

Russia media, coltivata (la var β) fino dall' era romana e spesso fuggiasca dalle colture.

1415 Rinio 1550 Pabulla Cibo — 1565 Mattioli — 1745 Séguier — 1822 Pollini

— β Napobrassica (L.) Prantl.
1554 Mattioli — 1561 Anguillara.

1401 Brassica oleracea L. R

Nativa dell'Europa bor. occid. coltivata in più varietà fino dall'era romana e fuggiasca qua e là dalle colture.

1415 Rinio 1550 Pabulla Cibo — 1554 Mattioli — 1661 Anguillara.

— α b acephala DC.
1565 Mattioli — 1822 Pollini

— α c capitata L.
1415 Rinio 1565 Mattioli — 1415 Rinio

— α d sabauda L.
1565 Mattioli — 1822 Pollini

— α e gemmifera DC
1898 F. P. B. (recente introduzione)

— α f. gongylodes L.
1415 Rinio — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1822 Pollini.

— α g. Botrytis L.
1561 Anguillara — 1822 Pollini.

— β Robertiana (J. Gay)
1867 Ardoino — 1886 C. P. G.

— γ rupestris (Raf.)
1810 Rafinesque — 1821 Gussone

— δ insularis (Moris)
1827 Moris — 1833 Colla.

— ε villosa (Biv.)
(+1911) Cupani — 1816 Bivona — Bernardi — 1826 Presl — 1828 Gussone.

— ζ incana (Tenore)
1828 Gussone — 1811, Tenore

1402 Brassica macrocarpa Guss.
1825 Gussone — 1826 Presl

— β depanensis (Carruel)
1891 Carruel in N. giorn bot. it.

1403 Brassica Richerii Vill.
1785 Allioni — 1805 Re — 1867 Lisa in Ardoino.

1404 Brassica Tournefortii Gouan
1825 Viviani — 1826 Gussone; Presl.

1404' Brassica valentina (L.) DC.
1844 Gasparrini in Gussone.

1405 Brassica repanda (W.) DC.
1785 Allioni — 1804 Balbis — 1850 Lisa. Cfr. Burnat 1892.

1406 Brassica gravinae Ten
1606 Colonna — 1826 Gussone — 1832 Tenore.

1407 Brassica ochroleuca Soy.-Will.
1848 Moly – 1867 Sanguinetti –
1893 Carestia in Part.-Casuel IX.

1408 Brassica Eruca strum L.
1785 Allioni – 1808 Bertoli – 1818
Rechinger – 1844 Casati – 1852 Rota.

1409 Brassica baetica Boiss.
1822 Presl – 1828 Gussone – 1830
Tenore

Diplotaxis DC.

1410 Diplotaxis erucoides (L.) DC.
1696 Cupani – 1789 Moris – 1807 Bivo-
na – Bernardi – 1818 Sebastiani e Mauri
– B apula (Tenore)
1811 Tenore
– γ verticolor Hut. P. R.
1877 Hut. Porta e Rigo Iter III ital.
n. 191. Cfr. Hut. Oest. bot. Zeitschr.
1904, p. 142.

1411 Diplotaxis viminea (L.) DC.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1789
Moris – 1818 Sebastiani e Mauri.

1412 Diplotaxis scaposa DC.
1844 Gussone – 1847 Calcara
Descr. d. isol. Lamped.

1413. Diplotaxis muralis (L.) DC.
1550 Cibo – 1696 Cupani – 1726
Zannichelli – 1785 Allioni.

1414. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1583
Cesalpino – 1585 Durante – 1726
Zannichelli

1415 Diplotaxis fruticulosa Ten.
(1854) Calcara e Todaro in
Parl. Casuel IX p. 962.

1416 Diplotaxis Harra (Forsk.) Boiss
1697 Boccone – 1810 Raffeneau –
1821 Gussone

Moricandia DC.

1417 Moricandia arvensis (L.) DC
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1822 Berto-
loni – 1826 Gussone; Presl – 1830 Tenore.

Conringia Heist.

1418 Conringia orientalis (L.) Andrz.
1595 Pona – 1745 Séguier – 1780
Turra – 1785 Allioni – 1877 Freyn.
– β austriaca (Jacq.)
1820 Tenore – 1847 Gennari, Otta-
viani, Marzidetti in Bertoloni VII –
1873 Casati

35/0018-109

Raphanus (Tourn.) L. 80

1419 Raphanus Raphanistrum L.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Suffren.
— β Landra (Moretti)
1561 Anguillara – 1745 Séguier – 1822 Pollini – 1826 Badarò in Moretti.

1420 Raphanus sativus L. R
Forse derivato colla coltura dal precedente; ovunque coltivato (fino dall'era romana) e spesso avventizio.
1415 Rivino 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1583 Cesalpino

Rapistrum (Tourn.) Medic.

1421 Rapistrum perenne (L.) Berg.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1820 Tenore – 1844 Tommasini in Bertoloni VI.

1422 Rapistrum rugosum (L.) Berg.
1551 Aldrovandi – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1789 Ucria.
— β hispanicum (Boiss. et Reut.)
1837 Moris – 1872 Marsilly.
— γ orientale (DC.)
1828 Fiorini – Mazzanti – 1830 Tenore – 1837 Moris.

Crambe (Tourn.) L.

1423. Crambe maritima L. R?
1785 All. – 1824 Figari. Cfr Parl. Carnel IX, 1025.

1424. Crambe tatarica Jacq.
1897 Pospichal (Avventizia?)

1425 Crambe hispanica L
1789 Ucria – 1828 Gussone – 1837 Moris.

Morisia J. Gay

1426. Morisia hypogaea (Viv.) J. Gay
1824 Viviani – 1833 Colla – 1837 Moris

Cákile (Tourn.) Gaertn.

1427 Cakile maritima Scop.
1561 Anguillara – 1631 Donati –

Erucária Gaertn.

1427' Erucaria aleppica Gärtn.
Nativa della Spagna merid., Algeria, Arabia petrea, Creta etc., Talora avventizia nel Genovesato e forse in via di naturalizzazione
1889 Gentile in Penzig –
1904 Canneva in Sommier

Bunias L.

1428 Bunias Erucago L.
1745 Séguier — 1785 Allioni —
1789 Ucria — 1808 Biroli — 1818 Ruchinger

Enarthrocarpus Labill.

1428' Enarthrocarpus pterocarpus DC.
Nativa d'Egitto e forse soltanto
avventizia nell'isola di Malta.
1889 Armitage in N. giorn. bot. ital.

Ochthodium DC.

1429. Ochthodium aegyptiacum (L.) DC.
Nativo dell'Asia occid. e forse anco
d'Egitto, avventizio in Toscana
1877 Caruel. Cfr. Parl. Car. IX, 1040 —
1882 Arcangeli.

Euclidium R. Br.

1430 Euclidium syriacum (L.) R. Br.
2 (1772 Scopoli — 1882 Marchesetti
1 { Nativo dell'Europ. or. e Asia occid.
e quindi in Italia forse solo avventizio.

Myagrum (Tourn.) L.

1431 Myagrum perfoliatum L.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1826
Gussone

Isatis (Tourn.) L.

1432 Isatis tinctoria L.
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1785 Allioni.
— β Villarsii (Gaud)
1789 Ucria — 1826 Moretti — 1828
Gussone

1433 Isatis alpina Vill.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1826
Gussone.

Peltaria L.

1434 Peltaria alliacea L.
1759 Arduino — 1785 Allioni —
1843 Koch

Clypeola L.

1435 Clypeola Jonthlaspi L.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1726
Zannichelli — 1785 Allioni.
— β Gaudini Trachsel.
1827 Gussone — 1903 Strobl

1436 Clypeola microcarpa Moris
1841 Moris in Atti Congr. Sc. it. Firenze
p. 539 — 1884 Barbey.

Alyssum L.

35/0018-110

1437 Alyssum sinuatum L. 81
1576 Lobelio, Plant. hist. p. 180 –
1820 Tenore – 1843 Koch – 1897
Pospichal.

1438 Alyssum saxatile L.
1820 Tenore – 1826 Guttone – 1897
Pospichal.
— β petraeum (Ard.)
1764 Ardino – 1802 Soffren.

1439 Alyssum argenteum (All.) Vitm.
1742 Zanoni – Monti – 1785 Allioni –
1808 Biroli – 1852 Rota.
1678 Barrelier

1440 Alyssum corsicum Duby
1828 Duby – 1834 Salis-Marschlins
1872 Marsilly.

1441 Alyssum Robertianum Bern.
1848 Bernard in Gren. Godr. I – 1872
Marsilly –
1844 Soleirol in Bertoloni VI (A. alpe-
stre ex Corsica)

1442. Alyssum alpestre L.
1755 Allioni – 1808 Biroli – 1817 Tineo –
1822 Pollini –
1834 Massara – 1855 Pirona.

1443. Alyssum montanum L
1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1745
Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini
1561 Michel

1444. Alyssum cuneifolium Ten.
1811 Tenore – 1864 Gussone in
Bertoloni VI
— β Wulfenianum Bernh.
1844 Parolini, Montini, Facchi-
ni, Tommasini in Bertoloni VI

1445. Alyssum fulvescens S. et S.
Nativo della Grecia ed Asia minore
fu trovato avventizio nel Genovesato
1844 Viviani in De Notaris.

1446. Alyssum campestre L
1696 Cupani – 1815 Savi – 1828
Viviani – 1828 Gussone

1447 Alyssum calycinum L.
1745 Séguier
1550 Cibo – 1728 Zannichelli –
1785 Allioni – 1802 Mazzari; Soffren.

1448 Alyssum foliosum Bory & Chaub.
1840 De Notaris in Cesati. – 1844
Gussone.

1449 Alyssum minimum W.
1857 Gennari – 1884 Stefani, Contr.
alla 91.ª Pirano.

1450 Alyssum maritimum (L.) Desv.
(†1673) Barrelier – 1714 – 1697 Bocone – 1785
Allioni – 1798 Savi – 1819 Bertoloni
(Spesso anche coltivato e avventizio)

1451 Alyssum saxatile Ten.
1820 Tenore – 1844 Ottavi, Gussone ecc. in Bertoloni VI.

1452 Alyssum halimifolium (all.) DC.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1867 Ardoino.

1453 Alyssum incanum L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1823 Romano – (1867 Ardoino) – 1844 Facchini, Raiser in Bertoloni VI –

1454 Alyssum mutabile Vent
1606 Colonna – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone.

Aubrietia Adans

1455 Aubrietia deltoidea (L.) DC.
Il tipo è proprio della Grecia e Asia minore
– β Columnae (Guss.)
1606 Colonna – 1826 Gussone; Presl – 1830 Tenore.

Fibigia Med.

1456. Fibigia clypeata (L.) Med.
1583 Cesalpino – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1823 Romano –

Lunaria (Tourn.) L.

1457 Lunaria annua L.
1532 Cibo – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1822 Pollini.

1458 Lunaria rediviva L.
1566 Calzolari – 1595 Pona – 1583 Cesalpino – 1745 Séguier – 1822 Pollini

Vesicaria Lam.

1459 Vesicaria utriculata (L.) DC.
1699 Boccone – 1735 Micheli – 1785 Allioni – 1805 Re – 1844 Ottaviani, Ottavi ecc in Bertoloni VI.

Draba L

1460 Draba aizoides L.
1566 Calzolari – 1595 Pona – 1606 Colonna – 1745 Séguier.
– β Zahlbruckneri (Host)
1851 Facchini in Haustm. – 1853 Rota
– γ eriocarpa (Lojac.)
1878 Lojacono, Contrib. Flora Sicil. Palermo.
– δ Bertolonii (Nym.)
1819 Bertoloni – 1830 Tenore – 1844 Gussone.
– ε Longirostra (Schott)
1886 C. P. G. (D. turg. v. cappad.) – 1903 Strobl.
– ζ olympicoides (Strobl)
1878 Strobl in Lojacono, Contr. Fl. Sicil.

35/0018-111

1461 Draba Loiseleurii Boiss.
1827 Loiseleur (D. rigida) – 1834 Salis-Marschlins – 1872 Martilly.

1462 Draba Sauteri Hoppe
1844 Facchini e Beggiato in Bertoloni VI.

1463 Draba tomentosa L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1844 Facchini ecc. in Bertoloni VI.
– β levipes (DC.)
1882 Arcangeli – 1906 Gortani
– γ stellata (Jaq.)
1844 Cesati – 1844 Montini, De Visiani ~~[illegible]~~ Comolli, De Notaris in Bertoloni VI.

1464. Draba fladnizensis Wulf
1834 Massara – 1844 Cesati – 1853 Rota.
– β carinthiaca (Hoppe)
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli
1851 Facchini in Hausmann – 1853 Rota.
– γ Traunsteineri (Hoppe)
1844 Facchini in Bertoloni VI – 1875 Favre.

1465 Draba incana L
1844 Cesati; Facchini in Bertoloni VI – 1853 Rota – 1878 Anzi, Auctar. Fl. novo-comensis

82

1466 Draba muralis L
1606 Colonne – 1697 Cupani – 1735 Micheli – 1785 Allioni

1467 Draba nemorosa L
1804 Balbis – 1833 Colla.

1468 Draba verna L
1551 Alberti
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
– β macrophylla Cus. et Ansb.
1895 Revélière in Rouy e Fouc. II, 221.
2 – δ glabrescens Rouy & Fouc.
1895 Cfr. R. et F. II p. 230-31.
1 – γ praecox (DC.) Bieb.
1826 Presl – 1830 Tenore – 1837 Moris
1872 Freyn.

Petrocallis R. Br.

1469. Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
1755 Allioni – 1780 Turra 1805 Re – 1822 Pollini.

Cochlearia (Tourn.) L.

1470 Cochlearia saxatilis L.
1595 Porta – 1707 Martini – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.
1471 Cochlearia brevicaulis Facch.
1833 Beggiato. Cfr. Bertoloni VI – 1836 Sieber in Flora p. 33 – 1841 Tausch in Flora p. 159 – 1843 Facchini in Koch

1472 Cochlearia glastifolia L.
1726 Zannichelli (?) – 1735 Micheli – 1844 Barbieri in Bertoloni VI. 1848 Grenier e Godron – (avventizia?)

1473 Cochlearia officinalis L.
Nativa dell'Europa bor. e media, Da noi coltivata (Vesling, 1642) e qua e là forse soltanto avventizia.
1772 Maratti – 1785 Allioni – 1869 Savi ardo e Visiani.

Chamaëlina Crantz

1474 Chamaelina sativa (L.) Crantz. R
1415 Rinio – 1561 Anguillara – 1565 Matthioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino 1726 Zannichelli.
– β silvestris (Wallr.)
1875 Favre – 1886 C. P. G.
(1854 Nyman)
– δ foetida (Fries)
1821 Nocca e Balbis – 1835 Tenore. 1844 Facchini e Montini in Bertoloni VI.

Nestlea Desv.

1475 Nestlea paniculata (L.) Desv. R
1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1802 Mazzari; Suffren.

Calepina Adans.

1476 Calepina Corvini (all.) Desv.
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1808 Brioli – 1816 Nocca Balbis – 1830 Tenore.
(1673) Barrelier

Coronopus (Rupp.) Gaertn.

1477 Coronopus didymus (L.) Sm.
Nativo dell'Amer. bor. e merid., Introdotto sulla fine del Settecento ed ora naturalizzato in molti luoghi.
1795 Savi in Santi Viagg. Tosc. II, p. 18 – 1804 Balbis – 1824 Pollini – 1844 Naccari e Montini in Bertoloni VI.

1478 Coronopus procumbens Gilib.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1571 Matthioli (Ambrosia) – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

Lepidium L.

1479 Lepidium Draba L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1561 Anguillara – 1595 Pona – 1666 Colonna.

1480 Lepidium humifusum (Lois.) Req.
1825 Requien in Viviani – 1834 Seb. – Maresch. – 1872 Marsilly.

1481 Lepidium hirtum (L.) DC.
1785 Allioni – 1830 Tenore – 1844 Passerini – 1867 Ardoino.
– β nebrodense (Raf.)
1814 Raf. nesque – 1697 Cupani – 1828 Guss.

35/0018-112

1482 Lepidium latifolium L. R 83
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani.

1483 Lepidium Ibéris L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli

1484 Lepidium ruderale L.
1785 Allioni – 1802 Suffren –
1818 Ruchinger – 1822 Pollini
1562 Mattioli (Iberide) –

1485 Lepidium virginicum L.
Nativo dell' America Sett., Antille e Perù, coltivato fino dalla fine del settecento, p.e. a Padova, 1801 (Bonato) ed ora qua e là avventizio
1856 Gennari – 1889 Bagliatto – 1882 A. Mazza. Cfr. Parl. Caruel, Fl. ital. IX p. 665. (1678 Boccone)
(Da escud. le loc. veron. Cfr. Goiran 1904)

1486. Lepidium sativum L. R
Di patria non accertata, ma coltivato fino dall' era romana e spesso avventizio.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino
1802 Mazzari – 1882 Marchesetti – 1855 Pirona
Cfr. Parl. Caruel, Fl. ital. IX p. 665.
1415 Rinio –

1487 Lepidium campestre (L.) R. Br.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1726 Zannichelli

1487' Lepidium subulatum L.
Di Spagna, trovato probabilmente avventizio nel Napolitano.
1842 Orsini in Tenore Fl. Nap. App. V.

1487² Lepidium perfoliatum L.
Nativo dei Paesi Danubiani e Russia merid. Talora avventizio
1882 Marchesetti – 1889 Savignone in Penzig.

Hutchinsia R. Br.

1488 Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
1565 c. Michiel 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1815 Savi

1489. Hutchinsia petraea (L.) R. Br.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni

1490. Hutchinsia procumbens (L.) Dom.
1785 Allioni 1804 Bertoloni – 1826 Presl – 1828 Gussone – 1844 Bérenger in Bertoloni VI
— β pauciflora (Koch)
1844 Perini e Facchini in Bertoloni VI; Cesati

Capsella Medic

1491 Capsella Bursa-pastoris (L.) Mönch.
1415 Rinio 1563 Cesalpino – 1558 Mattioli – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.
— β rubella (Reut.)
1864 Ascherson in Atti Soc. ital. Sc. nat.
1872 Freyn – 1886 C. F. G.
— γ grandiflora (Boiss.)
1877 Freyn – 1882 Marchesetti –

Bivonaéa DC

1492 Bivonaea albiflora (Dur.) Prantl.
1854 Todaro in Bertoloni X –
1882 Arcangeli – 1889 Lojacono.

1493 Bivonaea Saviana Car.
1843 P. Savi. Cfr. Carnel 1860.
1862 Ball – (1869 P. Savi in N. G. bot. it.) 1883 F. Major. Cfr.
Parl. Car. IX. 682.

1494 Bivonaea lutea (Biv.) DC.
1697 Cupani – 1806 Bivona – Bernardi
– 1826 Presl

Ionopsidium DC

1494' Ionopsidium acaule (Desf.) Rchb.
Nativo del Portogallo, coltivato talora negli orti bot. e giardini e spesso avventizio in prossimità ad essi, p. e a Treviso, 1880 (Saccardo e Bizzozero), Pavia 1905 (Saccardo!).

Aethionéma R. Br.

1495 Aethionema saxatile (L.) R. Br.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1745
Seguier – 1785 Allioni.

1496 Aethionema Thomasianum J. Gay.
1844 J. Gay in Bertoloni VI –
1882 Arcangeli.

Teesdálea R. Br.

1497. Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br.
1820 Mauri – 1826 Gussone – 1837 Moris.
– β Iberis (DC.)
1808 Biroli – 1821 Nocca e Balbis –
1844 Cesati; Passerini – 1830 Thomas in Tenore

Thlaspi (Tourn) L.

1498 Thlaspi arvense L.
1565 Mattioli (Thl. II); Michiel –
– 1726
Zannichelli – 1754 Séguier – 1785 Allioni

1499 Thlaspi alliaceum L.
(+1605) Aldrovandi. Cfr. Bauh. Chevl.
Hist. pl. II, p. 1651 – 1785 Allioni –
1821 Nocca e Balbis – 1828 Gussone.

1500 Thlaspi perfoliatum L.
1532 Cibo – 1606 Colonna – 1697
Cupani – 1745 Séguier.

1501 Thlaspi virgatum Gr. et Godr.
(+1867) Lisa in Parl. Carnel IX – 1882
Arcangeli – 1893 Rostan in Parl. Car. IX.

1502 Thlaspi alpestre L.
φ 1785 Allioni – 1842 Puccinelli – 1844
Turio, Fucchini, Sanguinetti in Bertoloni VI.
φ 1745 Séguier –

35/0018-113

1503 Thlaspi montanum L.
1785 Allioni — 1780 Turra — 1802 Marzari — 1806 Sternberg — 1822 Pollini.

— β praecox (Wulf.)
1666 Colonna — 1773 Maratti — 1802 Suffren — 1821 Nocca e Balbis

— γ alpinum (Jacq.)
1718 Pontedera — 1844 Cesati, Passerini — 1851 Ambrosi in Hausm. I — 1893 Gelmi — 1855 Pirona

1503¹ Thlaspi Mureti Gremli
1904 L. Vaccari.

1503² Thlaspi alpinum × rotundifolium Gyps.
1904 Sig.ra Gypsperger ap. Vaccari

1504 Thlaspi rivale Presl
1697 Cupani — 1822 Presl — 1827 Moris.

1505. Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud.
1755 Allioni — 1822 Pollini — 1824 Comolli.

Ibéris L.

1506 Iberis semperflorens L.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1697 Boicone — 1772 Maratti — 1789 Ucria — 1830 Tenore.

1507 Iberis saxatilis L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1827 Brocchi.

1508 Iberis sempervirens L.
1773 Vitman — 1789 Ucria — 1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1897 Pospichal — Spesso anche coltivata e qua e là fuggiasca dai giardini.

1509 Iberis Pruiti Tineo
1696 Cupani — 1817 Tineo — 1821 Gussone — 1822 Presl.

— β integerrima (Moris)
1827 Moris — 1882 Arcangeli

1510 Iberis spathulata J. P. Berg
Propria dei Pirenei

— β nana (All.)
1789 Allioni — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino.

1511 Iberis ciliata All.
1789 Allioni — 1823 Balbis, Cat. stirp. horti Taur. — 1867 Ardoino.

1512 Iberis linifolia L.
1789 Allioni — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino

1513 Iberis intermedia Guers.
1772 Scopoli — 1855 Pirona — 1843 Tommasini in Koch — 1881 Marchesetti in Kern. Fl. exs. austro-hung. n. 77.

1514 Isatis (Iberis) umbellata L.
1563 Cesalpino 1566 Anguillara — 1571 Mattioli — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

1515 Iberis amara L.
1785 Allioni — 1815 Savi — 1830 Tenore — 1844 Mayer in Bertoloni VI. Spesso fuggiasca dalle colture.

1516 Iberis pinnata L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1821 Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani e Mauri.

Biscutella L.

1517 Biscutella cichoriifolia Lois.
1844 Savi e Puccinelli in Bertoloni VI — 1882 Arcangeli.

1518 Biscutella auriculata L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1824 Comolli.

1519 Biscutella didyma L.
1606 Colonna — 1811 Tenore
— β lyrata (L.)
1674 Boccone — 1822 Presl — 1830 Tenore.

1520 Biscutella levigata L.

1565 Michiel
1595 Pona — 1606 Colonna — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β coronopifolia (L.)
1785 Allioni — 1805 Re
— γ Rotgesii Fouc.
1900 Rotges in Foucauld.
— δ corsica Rouy
1903 Sig.ra Gysperger ap. Rouy in Rev. Bot. system.

Fam. 61. Fumariaceae

Fumaria (Tourn.) L.

1521. Fumaria capreolata L.
1640 Castelli — 1583 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1789 Allioni
— β flabellata (Gasp.)
1842 Gasparrini — 1844 Gussone
— γ agraria (Lag.)
1640 Castelli — 1843 Bubani. Cfr. Baroni Suppl. Fl. tosc. p. 46. 1745 Sabbati
— δ major (Bad.)
1826 Badarò in Moretti
— ε bicolor (Somm.)
1897 Sommier in Nicotra, Fumar. ital.
— ζ serotina (Guss.)
1844 Gussone in Parlatore.
— η vagans (Jord.)
1850 c. Kralik. Cfr. Rouy et Fouc. I.
— δ Boraei (Jord.)
1873 Bornemann teste Hausskn. in Flora p. 522.
— ι muralis (Sond.)
1882 Arcangeli — 1904 Goiran.

35/0018-114

1521[1] Fumaria ~~pia~~ Nicotra 85
1905 Nicotra in Atti Acc. Dafnica

1521[2] Fumaria speciosa × Gussonei Somm.
(F. capreolata α b × capreolata ζ b)
1900 Sommier, L'Isol. del Giglio.

1522 Fumaria officinalis L. R.
1415 Rinio 1532 Cibo 1551 al Brandi II — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli.
— β anatolica (Boiss.)
1848 Kralik. Cfr. Rouy et Fouc. I p. 180 — 1905 Béguinot Prosp. piante vascol. Eug. e Pad.
— γ densiflora (DC.) Parl.
1640 Castelli — 1745 Séguier — 1822 Pollini — 1828 Gussone
— δ Reuteri (Boiss.)
1897 Sommier in Baroni Suppl. Fl. tosc. ~~II~~, p. 46.
— ε parviflora (Lam.)
1550 Cibo — 1696 Cupani — 1697 Boccone — 1818 Ruchinger + Sebastiani e Mauri.
— ζ Schleicheri (Soy.-Will.)
1873 Haussknecht in Flora p. 485.
— η Vaillantii (Lois.)
1842 Tenore — 1882 Arcangeli.
1733 Erb. Princ. Cattol. Cfr. Baroni

1523 Fumaria spicata L.
1789 Ucria — 1828 Gussone — 1847 Parlatore in Bertoloni VII.

Corydalis Vent.

1524 Corydalis capnoides (L.) Pers.
1843 Facchini in Koch e 1847 in Bertoloni VII.

1525 Corydalis lutea (L.) DC.
1565 Mattioli — 1561 Anguillara — 1595 Pona — 1717 Patarol — 1726 Zanuchelli.
— β ochroleuca (Koch).
1532 Cibo — 1551 al Brandi II — 1563 Cesalpino — 1773 Vitman — 1785 Allioni.
— γ acaulis (Pers.)
1847 Tommasini, Biasoletto in Bertoloni VII.

1526 Corydalis solida (L.) Sw.
1804 Balbis — 1745 Séguier — 1805 Re — 1818 Sebastiani e Mauri
— β intermedia (Mérat)
1821 Nocca e Balbis — 1820 Tenore — 1847 Bonjean, Ricasoli, Giannini in Bertoloni VII.
— γ densiflora Presl
1696 Cupani — 1822 Presl — 1828 Gussone

1527 Corydalis cava (L.) Sch. et Krt.
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1595 Pona — 1563 Cesalpino — 1745 Séguier.

Fam. 61* Papaveraceae

Hypécoum L.

1528 Hypecoum procumbens L. R.
1789 Acria – 1804 Balbis – 1826 Gussone – 1827 Moris
— β glaucescens (Guss.)
1826 Gussone – 1830 Tenore
— γ pseudograndiflorum (Petrov.)
1860 P. Savi in Caruel

Chelidonium (Tourn.) L.

1529 Chelidonium majus L. R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante
— β laciniatum (Mill.)
1842 Bertoloni V – 1882 Arcangeli.

Glaucium (Tourn.) Scop.

1530 Glaucium flavum Crantz R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1726 Zannichelli.

1531 Glaucium corniculatum (L.) Curt.
1785 Allioni – 1830 Tenore – 1842 Gussone e Berger in Bertoloni V

Roemeria Medic.

1532 Roemeria hybrida (L.) DC.
Nativa di Grecia, Caucaso, Turchia ecc. coltivata già a Torino, 1760 (Allioni), Firenze, 1806 (Zuccagni) ecc., trovasi av. ventizia qua e là
1882 Marchesetti – 1889 Penzig – 1892 Burnat I.

Papáver (Tourn.) L.

1533 Papaver alpinum L.
1773 Vitman – 1830 Tenore – 1842 Orsini in Bertoloni V.
— β pyrenaicum (W.)
1595 Porta – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

1534 Papaver hybridum L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1816 Nova e Balbis.
— β Argemóne (L.) R
1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1785 Allioni.

1535 Papaver Rhoeas L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1745 Séguier
— β strigosum (Boenn.)
1839 Moris e De Notaris – 1898 Gelmi. 1904 Goiran.
— γ obtusifolium (Desf.)
1827 Moris – 1828 Gussone
— ε dubium (L.)
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1805 Re 1818 Sebastiani e Mauri.
— ζ Simoni Fouc.
1898 Foucaud.
— δ pinnatifidum (Moris)
1827 Moris – 1853 Grech-Delicata – 1896 Bicknell

35/0018-115

— ~~β~~ γ Tinei Lanza
(+1856) Lanza in Boll. r. Orto bot. Palermo, 1905 p. 24
Tineo e (+1892) Todaro in

1536. Papaver somniferum L. R
α setigerum (DC.)
1640 Castelli — 1827 Moris — 1830 Tenore.

— β hortense (Hussen.)
1415 Rinio
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
(Coltivato e subspontaneo

— γ album (Mill.)
Coltivato e subspontaneo. Compreso in generale dagli autori nel precedente.

1536' Papaver ~~[illegible]~~ pinnatifidum × setigerum Genn. × ~~somniferum~~ ×
1866 Gennari.

Fam. 62 Nymphaeaceae

Nymphaea (Tourn.) L.
1537 Nymphaea alba L. R
1415 Rinio
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.

Nuphar S. et S.
1538 Nuphar luteum (L.) S. et S.
1415 Rinio
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.

Fam. 63 Ceratophyllaceae

Ceratophyllum L.
1539 Ceratophyllum demersum L.
1754 Séguier — 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1816 Pollini
— β submersum (L.)
(+1770 c.) Moreni. Cfr Pollini III — 1790 Bellardi — 1808 Biroli — 1821 Noua e Baltis.

Fam. 64 Ranunculaceae

Clématis (Rupp.) L.
1540. Clematis alpina (L.) Mill.
1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

1541. Clématis integrifolia L.
1802 Suffren — 1842 Trevisan — 1897 Pospichal — Coltivata e talora solo avventizia.
1745 Sabbati

1542 Clematis Viticella L.
1532 Cibo — 1551 al Bovardi II — 1562 Mattioli — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1595 Pona
(+1320) Crescenzio, edit. 1471.

1543 Clematis cirrosa L. R
1811 Tenore — 1824 Viviani — 1826 Gussone; Presl.
— β balearica (Rich
1824 Viviani — 1828 Gussone.

1544 Clematis recta L.
1532 Cibo – 1558 Matthioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren; Mazzari – 1816 Nocca e Balbis

1545 Clematis Flammula L.
1415 Pisa
1666 Ambrosini – 1583 Cesalpino – 1735 Micheli – 1819 Bertoloni

— β maritima (L.)
1631 Donati – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger

1546 Clematis Vitalba L.
1532 Cibo – 1551 Alfonso II – 1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1640 Castelli – 1726 Zannichelli – 1818 Ruchinger

Thalictrum (Tourn.) L.
1547. Thalictrum aquilegifolium L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

1548. Thalictrum calabricum Spr.
1696 Capeni – 1789 Moris – 1826 Presl – 1827 Sprengel

1549 Thalictrum alpinum L.

1842 Facchini e Rainer in Bertoloni V – 1893 Gelmi.

1550 Thalictrum foetidum L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re – 1808 Biroli – (+1863) Moretti in Gortani 1906.

— β minus (L.)
1583 Cesalpino – 1618 Barrelier – 1713 Tita – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

— γ elatum (Jacq.)
(+1770c) Moeni. Cfr. Pollini II – 1822 Pollini – 1842 Facchini e Bertero in Bertoloni V

1551 Thalictrum angustifolium L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni

— β simplex (L.)
1842 Trevisan – 1844 Cesati – 1855 Brumati in Pirona.

— γ exaltatum (Gaud.)
1844 Cesati – 1906 Gortani

— δ flavum (L.)
♀ 1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
♀ (+1320) Crescenzio ed. 1471

Anemone (Tourn.) L.
1552 Anemone alpina L.
1551 Alfonso II – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

— β sulphurea (L.)
1726 Zannichelli – 1822 Pollini – 1824 Comolli.

— γ millefoliata (Bert.)
1785 Allioni – 1819 Bertoloni.

35/0018 - 116

1553 Anemone vernalis L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli.
1824 Comolli – 1844 Cesati –
1906 Gortani.

1553' Anemone bolzanensis Gürke.
(A. montana × vernalis)
1902 Murr in Allg. bot. Zeitschr. Cfr.
Gürke in Richter Pl. Europ.

1554 Anemone Pulsatilla L.
1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1583 Cesalpino.
– β Halleri (All.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – (1806 Sternberg.)
– γ pratensis (L.)
1566 Calzolari – 1595 Pona – 1745
Séguier – 1822 Pollini – 1855 Pirona.

1555 Anemone narcissiflora L.
1563 Cesalpino – 1713 Tita – 1785
Allioni – 1791 Bellardi.

1556 Anemone apennina L.
1682 Mentzel – 1640, Castelli –
1694 Cupani – 1828 Gussone

1557 Anemone ranunculoides L.
1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1745
Séguier – 1785 Allioni.

1558 Anemone nemorosa L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1745
Séguier – 1785 Allioni.

1559 Anemone trifolia L.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1595
Pona | 1678 Boccone. – 1745 Séguier.

1559' Anemone Pittoni Glowaki
(A. nemorosa × trifolia)
1903 Gürke in Richt. Pl. Europ.
1907 Pampanini in Fiori App. IV

1560 Anemone baldensis L.
1767 Turra in L. Mant. II – 1785 Allioni
1806 Sternberg – 1816 Pollini.

1561 Anemone silvestris L.
1562 Mattioli – 1785 Allioni (?) –
1869 Spranzi in Sacc. o Visiani.

1562 Anemone palmata L.
1827 Moris – 1828 Gussone – 1842
De Notaris in Bertoloni V.

1563 Anemone hortensis L.
1551 Al Dorand II
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni.
1798 Savi.
– β pavonina (Lam.)
1833 Colla – 1842 Gennari, Mauri
ec. in Bertoloni V.

1564 Anemone coronaria L. R
Nativa di Grecia, Turchia ecc. Coltivata dal cinquecento e spesso inselvatichita qua e là.
1532 Cibo → 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1787 Haria.

1565 Anemone Hepatica L.
1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1861 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona.

Adonis (Rupp.) L.
1566 Adonis vernalis L.
1802 Bertini e Bramati in Saffren — 1855 Pirona — (+1849) Kittner
Cfr. Arcangeli 1882.

1567 Adonis distortus Ten.
1682 Mentzel — 1826 Gussone — 1830 Tenore.

1568 Adonis annua L. R
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1745 Séguier — 1808 Biroli — 1816 Nouv. Balbis.
— β microcarpus (DC.)
1844 Gussone — 1882 Arcangeli.
— γ flammeus (Jacq.)
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1826 Presl.
— δ aestivalis (L.)
1565 Mattioli — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Saffren.

Myosurus L.
1569 Myosurus minimus L.
1696 Cupani — 1826 Presl — 1897 Fiori — 1857 Tommasini in Bertoloni III.

Ceratocéphalus Pers
1570 Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.
1674 Bocone — 1806 Balbis — 1830 Tenore.

Fam. Ranunculus (Tourn.) L.
1571 Ranunculus hederaceus L.
1696 Cupani — 1828 Gussone.
— β homoeophyllus (Ten. em.)
1830 Tenore — 1843 Gussone.

1572 Ranunculus aquatilis L.
1785 Allioni — 1792 Savi — 1802 Saffren — 1818 Kuchinger
— β Baudotii (Godr.)
1877 Freyn — 1872 Duthie — 1889 Lacaita in Nyman Suppl.
— γ hololeucos (Lloyd)
1893 Rouy et Fouc. I — 1887 Lojacono
— δ tripartitus (DC.)
1826 Presl — 1828 Gussone
1696 Cupani

35/0018-117

— ε trichophyllos (Chaix)
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1606 Colonna — 1785 Allioni

— ζ paucistamineus (Tausch)
1869 Savaedo e Vitiani — 1894 Arcangeli — 1877 Freyn — 1904 Goiran.

— η foeniculaceus (Gilib.)
1820 Moretti — 1842 Trevisan 1844 Sutlone; Cesati — 1869 Savaedo e Vitiani.

— ϑ fluitans (Lam.)
1816 Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani e Mauri — 1830 Tenore — 1844 Cesati.

1573 Ranunculus amplexicaulis L.
Il tipo è proprio dei Pirenei.

— β plantagineus (All.)
1785 Allioni — 1868 Tillière — 1904 Vaccari.

— γ pyrenaeus (L.)
1805 Re — 1808 Viviani — 1842 Facchini, Moretti, Balbis ecc. in Bertoloni V.

1574 Ranunculus parnassifolius L.
1818 Balbis — 1842 Bonjean in Bertoloni V — 1844 Cesati.

1575 Ranunculus rutifolius L.
1713 Tilli — 1726 Zannichelli — 1844 Cesati.

— β anemonoides (Zahlbr.)
1595 Pona — 1745 Séguier — 1822 Pollini. Cfr. Goiran 1904.

1576 Ranunculus alpestris L.
1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1808 Viviani — 1837 Sandri

— β bilobus (Bert.)
1842 Zantedeschi in Bertoloni V.

— δ traunfellneri (Hoppe)
1855 Pirona — 1906 Goiran.

1577 Ranunculus crenatus W. K.
1830 Tenore — 1842 Gussone e Schouw in Bertoloni V — 1887 Groves.

1578 Ranunculus glacialis Vill.
1785 Allioni — 1802 Lusser — 1805 Re — 1822 Balbis in Pollini.
1837 Sandri

1578' Ranunculus aconitoides DC. (at var.)
(R. aconitifolius × glacialis)
1868 Tillière — 1904 Vaccari.

1579 Ranunculus Séguieri Vill.
1718 Portenschlag — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1806 Sternberg — 1816 Pollini.

1580 Ranunculus aconitifolius L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1595 Pona — 1719 Tilli
1571 Matthioli (Ran. II) —

— β platanifolius (L.)
1595 Pona — 1791 Bellardi — 1808 Biroli — 1822 Pollini.

1580' Ranunculus lacerus Bell.
(R. aconitifolius × amplexicaulis γ)
1791 Bellardi — 1864 De Notaris — 18[illegible] Burnat.

1580² Ranunculus Delponteii Pors
(R. glacialis × rutifolius)
1897 Pors in Bull. Soc. bot. ital.

1581 Ranunculus gramineus L.
1606 Colonna — 1804 Balbis — 1808 Biroli — 1862 Naccari, Jussieu, Moris in Bertoloni X.

1582 Ranunculus Lingua L.
1551 al Dodart II
1583 Cesalpino — 1666 Ambrosini — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1816 Nocca e Balbis

1583 Ranunculus Flammula L.
1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1805 Re — 1802 Suffren — 1816 Nocca e Balbis
— β reptans (L.)
1785 Allioni — 1826 Comolli — 1904 Goiran 1815 Pirona

1584 Ranunculus ophioglossifolius Vill.
1563 Cesalpino — 1806 Balbis — 1807 Sirona — Bernardi — 1810 Brignoli

— β fontanus (Presl)
1696 Cupani — 1822 Presl — 1828 Gussone
— γ Revelieri (Bor.)
1858 Revelière in Boreau Aun. Soc. acad. Angers — 1867 Mabille — 1872 Martilly.

1585 Ranunculus lateriflorus DC.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1826 Presl — 1828 Gussone.

1586 Ranunculus Ficaria L.
1532 Cibo — 1556 Mattioli — 1561 Anguillara — 1565 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante
— β ficariaeformis (F. Schultz)
1844 Gussone — 1848 Bernard in Grenier e Godron I
— γ nudicaulis (A. Kern.)
1877 Feyn — 1897 Sommier e Marcucci in Parona Suppl. Fl. Tosc. Cfr. Rouy e Fouc. Fl. de F. I, 1893 (notes)

1587 Ranunculus bullatus L.
1733 Principe di Cattolica Cfr. Parona
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1807 Sirona — Bernardi — 1824 Viviani.

1588 Ranunculus Thora L.
1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1566 Calzolari — 1726 Zannichell. 1745 Séguier — 1785 Allioni.

35/0018-115

(optius R. Ophora Crantz [1765])

1589 Ranunculus hybridus Biria (1811)
(+1770 c.) Moreni in Pollini II – 1840 Cesati – 1855 Pirona –
– β brevifolius (Tenore)
1826 Gussone – 1830 Tenore

1590 Ranunculus orientalis L.
Nell'Asia occid. e finora non sembra coltivato.
– β Marchesettii (Lojacono)
1886 Marchesetti e Palumbo in Lojacono, Giorn. Comiz. agr. Palermo.

1591 Ranunculus spicatus Desf.
Il tipo è proprio dell'Algeria.
– β superbus (Gussone)
1825 Gussone – 1842 Todaro e Parlatore in Bertoloni V.

1592 Ranunculus asiaticus L.
Nativo di Candia, Asia Minore, Persia ecc. Introdotto e coltivato in Italia fino dal 1595 c. a Padova nell'orto botanico (Clusio) già nel 1642 (Vesling)
– β sanguineus DC.
1887 Groves (Avventizio?)

1593 Ranunculus illyricus L.
1583 Cesalpino – 1811 Tenore – (+1814) Maggiucato e Bruneti in Pirona 1855.

1594 Ranunculus monspeliacus L.
1606 Colonna – 1837 Sanguinetti
1848 Grenier e Godron (1834 Bertoni. Cfr. Barone Soggetti H. Tor.)
– β saxatilis (Balb.)
1804 Balbis – 1843 Gussone

1595 Ranunculus flabellatus Desf.
1696 Cupani – 1697 Bocone – 1806 Bivona – Bernardi.

1595' Ranunculus Schouwii Tineo
1844 Tineo in Gussone.

1596 Ranunculus millefoliatus Vahl
(1551 Alborgandi. Cfr. Bertoloni V.)
1561 Anguillara – 1606 Colonna – 1696 (1822 Bertoloni) Cupani – 1896 Bicknell.
– β garganicus (Tenore)
(+1773) Barrelier – (1714) 1830 Tenore.
1892 Arcangeli.

1597 Ranunculus Agerii Bertol.
(1819 Bertoloni in Opusc. Sc. nat. Bologna – 1620 Ager in Bauhin, Prodr. p. 95 – Parkinson, Theatr. bot. 1640)

1598 Ranunculus cassubicus L.
Il tipo è più nordico e finora, pare, manca all'Italia
– β auricomus (L.)
1785 Allioni – 1802 Magazzi; Soffredi – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini.
Cfr. Goiran 1906.

1599 Ranunculus repens L.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
1554 Mattioli

1600 Ranunculus caucasicus M. B.
Il tipo è proprio del Caucaso ecc.
— β serbicus (Vis.)
1830 Tenore – (+1866) Gasparrini in Erb. Pad.

1601 Ranunculus brutius Ten.
1811 Tenore – 1842 Gussone in Bertoloni.

1602. Ranunculus geraniifolius Pourr.
1851 Heufler in Hausmann – 1819 Bertoloni (R. montanus in Alp. Apuanis) 1825 Favre
— β montanus (W.)
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1804 Balbis – 1816 Nocca – 1822 Pollini
— γ Villarsii (DC. p.p.
1830 Tenore – 1822 Pollini – 1845 Séguier – 1904 Goiran.
— δ aduncus (Gren. et Godr.)
1860 Carnel. Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc. – 1882 Arcangeli + Gibelli e Piotta
— ε pollinensis (N. Terr.)
1860 Carnel (R. mont. e. p.) – 1889 N. Terracciano – 1892 Chiovenda.
— ζ apenninus (Chiov.)
1892 Chiovenda – 1898 Fiori Fl. an.

— η Marschlinsii (Stend.
1834 Sabs-Marschlins – 1842 Soleirol e Gussone in Bertoloni V.
— ν aurimontanus Brig.
1905 Burnat in Briquet Spicil. Corsic.

1603 Ranunculus polyanthemos L.
1844 Cesati – 1852 Rota – (+1886) Franzoni.
— β Thomasii (Ten e. p.)
1830 Tenore – 1842 ~~[illegible]~~ Thomas in Bertoloni V.
— γ nemorosus (DC.)
1821 Romano – 1822 Pollini – 1842 Bertero, Manganotti, Facchini in Bertoloni V.

1604 Ranunculus acer L.
1415 Rinio
1595 Pona – 1745 Séguier – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren.
— β Steveni (Andrz.)
1879 Caldesi – 1883 Cocconi Fl. Bol. – 1894 Rodegher e Venanzi Prosp. Fl. Bergam.

1605 Ranunculus lanuginosus L.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari – 1816 Nocca e Balbis.

1606 Ranunculus velutinus Ten.
1818 Sebastiani e Mauri – 1828 Gussone
1825 Tenore Ind. sem. hort. Neap. – 1877 Freyn.
1551 Aldrovandi II –

35/0018-119

1607 Ranunculus bulbosus L.
1550 Petrollini Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.
— β aleae (Willk.)
1752 Sabbati 1879 Caldesi – 1891 Terracciano in N. giorn. bot. ital. – 1892 Chiovenda l.c. 1892; Burnat.
— γ neapolitanus (Tenore)
1842 Tenore – 1842 Gussone in Bertoloni V.
— δ heucherifolius (Presl)
1789 Ucria – 1826 Presl – 1843 Gussone
— ε macrophyllus (Desf.)
1824 Viviani – 1834 Salis-Marschlins 1889 Lojacono.
— ζ procerus (Moris)
1822 Presl – 1837 Moris – 1844 Cesati.

(da portarsi dopo 1606)
1606 Ranunculus petiolulatus Fouc. et S.
(R. bulbosus × velutinus)
1898 Foucaud et Simon

1608 Ranunculus sardous Crantz
1554 Mattioli (Ranunc. II) 1606 Colonna
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1735 Micheli – 1822 Pollini.
— β cordiger (Viv.)
1697 Bocone – 1824 Viviani.
— γ trilobus (Desf.)
1857 Gennari – 1867 Ardoino.
— δ Balbisii (Moris)
1827 Moris.

— ε intermedius (Poir.)
1696 Cupani – 1822 Presl – 1828 Gussone
— ζ trachycarpus (F. et M.)
1896 Marchesetti. Avventizio?

1609 Ranunculus parviflorus L.
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini.
— β chius (DC.)
1844 Gussone – 1877 Freyn 1892 Sommier, Bull. Soc. bot. it. – 1889 Lojacono

1610 Ranunculus muricatus L.
1785 Allioni – 1808 Bivona-Bernardi – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

1611 Ranunculus arvensis L.
1550 Petrollini Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni.
1611' Ranunculus pygmaeus Wahlb.
1848 Wendland in Flora p. 136
1612 Ranunculus sceleratus L.
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani.

Caltha (Rupp.) L.
1613 Caltha palustris L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.

Trollius (Rupp.) L.

1614 Trollius europaeus L.
1550 Cibo 1551 Alt. Provinz. II – 1563 Cesalpino – 1571 Mattioli – 1595 Pona – 1713 Tita 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.

Eranthis Salisb.

1615 Eranthis hiemalis Salisb.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari

Helleborus (Tourn.) L.

1616 Helleborus viridis L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1666 Ambrosini – 1697 Boccone – 1726 Zannichelli.
— β dumetorum (W. K.)
1842 Tommasini in Bertoloni V
(H. viridis e. p. – 1896 Sotta in Kern. Sched. Fl. exs. Austr. Hung. n. 2541.
— γ odorus (W. K.)
1889 Schiffner in Engl. Bot. Jahrb.
1891 Rossetti Contr. II Fl. Versil. – 1904 Goiran –
— δ Bocconei (Tenore)
1697 Boccone – 1826 Gussone – 1823 Tenore Fl. med. Napol.

1617 Helleborus niger L. R
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.

1618 Helleborus foetidus L.
1583 Cesalpino – 1735 Micheli – 1745 Séguier – 1785 Allioni 1804 Bertoloni.

1619 Helleborus lividus Ait.
1625 Castelli Hort. Farn. – 1824 Viviani – 1834 Salis-Marschlins.

Isopyrum L.

1620 Isopyrum thalictroides L.
1682 Mentzel – 1697 Boccone – (+1673) Barrelier, d. 1714 – 1802 Suffren 1831 Romano – 1842 Barbieri, Montini, Brignoli, Berini ecc. in Bertoloni V.

Nigella (Tourn.) L.

1621 Nigella damascena L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 Allioni – è pure coltivata frequentemente e spesso fuggiasca e avventizia.

1622 Nigella sativa L. R
Nativa dell'Asia minore, talora avventizia
1554 Mattioli – 1882 Arcangeli – 1898 Siemoni in Baroni Suppl. Fl. Tosc. – 1822 Pollini
1897 Pospichal

1623 Nigella arvensis L.
1562 Mattioli – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1808 Biroli.
— β divaricata (Beaupré)
(+1617) Alpino (1827) – 1696 Cupani – 1828 Presl
~~Brand~~ Cfr. Guss. – 1830 Tenore

35/0018-120

1623³ Nigella Nigellastrum (L.) Willk.
2 III 1785 Allioni – 1844 Risso – 1826 Presl.
II Avventizia ~~ma~~ ora pare scomparsa. 1867 Ardoino
I È propria della Spagna e Francia merid.

1623¹ Nigella gallica Jord.
Il tipo manca in Italia
— β divaricata (Willk.) Brand
1895 Citarda ap. Brand in Helios

1623² Nigella hispanica L.
Il tipo manca in Italia
— β intermedia Coss.
1897 A. Terracciano in Bull. R. Orto bot. di Palermo.

Aquilegia (Tourn.) L.
1624 Aquilegia alpina L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1806 Sternberg – 1822 Zantedeschi in Pollini – 1844 Cesati
— β Bernardi (Gr. et Godr.)
1848 Bernard in Grenier e Godron I.

1625 Aquilegia pyrenaica DC
Il tipo è proprio dei Pirenei
— β Kitaibelii (Schott)
(Le località italiane citate nella Fl. anal. sono da confermarsi)
— γ Bertolonii (Schott)
1773 Vitman – 1819 Bertoloni – 1882 Arcangeli.
— δ Einseleana (F. Schultz)

1842 Facchini; Montini in Bertol. V
1773 Tita – 1837 Sandi – 1844 Cesati – 1855 Pirona
— ε thalictrifolia (Schott et K.)
1806 Sternberg – 1853 Rota – 1906 Huber in Gortani.
— ζ pseudothalictrifolia Pamp.
(+1876) Vengo. Cfr. Pampanini in N. Giorn. bot. ital. 1906. p. 4e

1626 Aquilegia vulgaris L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino
— β atro-violacea Avé-Lall.
1566 Calzolari – 1595 Pona Cfr. Goir. – 1837 Sandi – 1851 Perini, Ambrosi in Hausmann.

Delphinium (Tourn.) L.
1627 Delphinium Consolida L.
1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari.
— β pubescens (DC.)
1830 Tenore – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino.

1628 Delphinium Ajacis L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1808 Biroli – 1816 Noua e Baltis – 1867 Ardoino – È pure assai sovente coltivato e spesso fuggiasco dagli orti e avventizio.

1629 Delphinium orientale J. Gray.
Nativo della Spagna ed Asia occid.
spesso coltivato nei giardini e talora
avventizio.
1894 Arcangeli – 1897 Baroni Suppl.
Fl. Tosc.

1629bis Delphinium peregrinum L. R
1757 Allioni – 1822 Bertoloni – 1842
Mayer, Montini, Zanardini in Berto-
loni V.
— β hatteratum (S. et S.)
1640 Castelli – 1789 Noria – 1822
Bertoloni – 1826 Presl – 1830 Tenore.
— γ verdunense (Balb.)
1813 Balbis, Cat. stirp. hort. bot. Taur.
1827 Moris.
— δ longipes (Moris)
1837 Moris – 1855 Huet. Cf. Nym.

1630 Delphinium Staphysagria L. R
1415 Rinio – 1551 Aldrovandi II
1561 Anguillara – 1554 Mattioli –
1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1785
Allioni.
— β pictum (W.)
1837 Moris – 1830 Tenore –
1872 Marsilly.

1631 Delphinium fistum W. et K.
1554 Mattioli (Acon. IIII) – 1735 Mi-
cheli – 1811 Tenore – 1815 Savi
– 1820 Bertoloni.

1632 Delphinium pentagynum Lam.
Il tipo è proprio dell'Africa sett.
— β emarginatum (Presl)
1696 Cupani – 1822 Presl – 1828 Gussone

1633 Delphinium elatum L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1842
Molineri e Moris in Bertoloni V.
— β montanum (DC.)
1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1842
Montini e Facchini in Bertoloni V.
– 1880 Spranzi in Savardo e Bizzozero.
— γ oxysepalum (Borb. et Pax)
1894 Huth in Engl. Bot. Jahrb.

1633' Delphinium Oliverianum DC.
Nativo della Siria e talora in-
selvatichito.
1903 Marcello, Fl. Cava dei Tirr. in
Boll. Soc. Natural. Napol.

Aconitum (Tourn.) L.
1532 Cibo – 1754 Seguier – 1802
1565 Michiel
Mazzari – 1822 Pollini – 1844 Cesati

1634 Aconitum variegatum L.
qui
— β Cammarum (L.)
(+1673) Barrelier ed. 1714 – 1785 Allioni –
1816 Noua e Balbis – 1852 Rota.
— γ paniculatum (Lam.)
1565 Mattioli – 1745 Seguier – 1822
Pollini – 1824 Comolli.

35/0018-121

92

1635 Aconitum Napellus L.
1415 Rinio 1550 Petrollio Cibo – 1558 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino 1595 Pona – 1697 Bocone – 1726 Zannichelli.

1635' Aconitum Clairvilleanum Bruegg.
(A. paniculatum × Napellus)
1898 Gelmi

1636 Aconitum Anthora L.
1558 Mattioli – 1566 Calzolari 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1713 Tita

1637 Aconitum Lycoctonum L.
1550 Petrollio Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

— β pyrenaicum (L.)
1830 Tenore – 1832 Sternberg in Reichenbach (?) – 1892 Chiovenda

1637' Aconitum giganteum Zum.
1860 Zumaglini. (Prob. una forma di Ac. Lycoctonum)

Paeonia (Tourn.) L.

1638 Paeonia officinalis L. R
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1785 Allioni – 1802 Suffren

— β peregrina (Mill.)
1805 Re – 1843 Koch – 1844 Cesati – 1867 Ardoino.

— γ paradoxa (Anders.)
1830 Tenore – 1893 Rouy et Fouc. I

— δ mascula (L.)
1554 Mattioli (Paeon. mas) – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

— ε triternata (Pall.)
1696 Capani – 1789 Ucria – 1816 Bivona – Bernardi.

— ζ corsica (Sieb.)
1828 Sieber ap. Tausch in Flora
Cfr. Rouy et Fouc. I p. 144.

Actaea L.

1639 Actaea spicata L. R
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

Fam. 65 Berberidaceae

Epimedium (Tourn.) L.

1640 Epimedium alpinum L.
1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari

Leontice L.

1640' Leontice Leontopetalum L.
Originario di Grecia ed Asia minore fu indicato da Toscana e di Puglia, ove non fu rinvenuto posteriormente. Era avventizio? Certo era coltivato del Cinquecento.
1554 Mattioli – 1821 De Candolle Regni veg. syst. nat. II
1532 Cibo – 1563 Cesalpino –

1641 Berberis vulgaris L.

Berberis (Tourn.) L.

1415 Rinio 1532 qui Cibo — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona 1726 Zannichelli — 1785 Allioni.

— β aetnensis (R. et S.)

1824 Viviani — 1826 Presl; Jan — 1827 Gussone.

Jam. 66 Droseraceae

Drósera L.

1642 Drosera rotundifolia L.

1585 Durante — 1785 Allioni — 1797 Host — 1808 Biroli — 1822 Pollini.

— β corsica (R. Maire)

1904 ~~Rouy~~ R. Maire in Rouy Revue de Bot. systém.

1643. Drosera longifolia L.

1835 Comolli — 1837 De Notaris, Balsamo-Crivelli in Bertoloni III — (+1863) Morassi in Gortani 1906 —

1644 Drosera intermedia Hayn.

1785 Allioni — 1797 Host — 1822 Pollini — 1824 Comolli — 1897 Pospichal.

Aldrovanda (Monti) L.

1645 Aldrovanda vesiculosa L.

1747 Monti, Inst. Bon. Comment. t. II pars III — 1785 Allioni — 1824 Rocchetti in Pollini — 1837 Montini, Barbieri, Molineri, Puccinelli in Bertoloni.

HI

Jam. 67 Saxifragaceae

Parnassia (Tourn.) L.

1646 Parnassia palustris L.

1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1785 Allioni — 1773 Vitman — 1802 Suffren; Marzari

Saxifraga (Tourn.) L.

1647 Saxifraga hederacea L.

1816 Bivona — Bernardi — 1823 Moretti 1827 Gussone.

1648 Saxifraga rotundifolia L.

1532 Cibo — 1551 Aldrovand II — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1773 Vitman 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren

1649 Saxifraga Tridactylites L.

1631 Donati — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

— β adscendens (L.)

1755 Allioni — 1839 Bonjean, Facchini etc. in Bertoloni IV — 1842 Gussone

— γ Bellardi (All.)

1785 Allioni — 1839 Balbis in Bertoloni IV

~~1842 Gussone~~

1650 Saxifraga petraea L.

1566 Calzolari — 1595 Pona — 1666 Ambrosini — 1745 Séguier — 1816 Pollini

— β berica Béguinot.

1904 Béguinot in Bull. Soc. bot. it.

35/0018-122

1651 Saxifraga arachnoidea Sternb.
1806 Sternberg — 1813 Zantedeschi in Atti Ateneo di Brescia — 1853 Rota

1652. Saxifraga cernua L.
1822 Moretti — 1824 Re — 1839 Parolini, Facchini in Bertoloni IV.

1653 Saxifraga granulata L.
1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1776 Bartalini Cat. — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1842 Puccinelli.

1654 Saxifraga bulbifera L.
1595 Pona — 1606 Colonna — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

1655 Saxifraga tenella Wulf.
1810 Brignoli — 1823 Moretti — 1855 Pirone — 1906 Gortani

1656 Saxifraga sedoides L.
1745 Séguier — 1808 Biroli — 1816 Pollini — 1823 Moretti
— β aphylla (Sternb.)
1839 Moretti in Bertoloni IV — 1844 Cesati — 1853 Rota

1657 Saxifraga Séguieri Spr.
1745 Séguier — 1810 Gebhard op. Sprengel in Sternberg ~~Plant.~~ Revis. Saxifr. ~~[illegible]~~ — 1822 Pollini — 1823 Moretti — 1904 Goiran.

1658 Saxifraga muscoides All.
1565 Michiel — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1815 Moretti — 1822 Pollini — 1837 Sandi.
— β Facchinii (Koch)
1843 Paterno e Facchini in Koch

1659 Saxifraga glabella Bert.
1824 Bertoloni, Virid. Bonon. — 1826 Gussone — 1832 Tenore.
1745 Sabbati —

1660 Saxifraga androsacea L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Pollini.

1661 Saxifraga pedemontana All.
1785 Allioni — 1825 Viviani — 1834 Salis-Marschlins — 1867 Ardoino

1661[1] Saxifraga aquatica Lap.
1872 Noisette in Engl. Monogr. Saxifr. (loc. da conferemarsi)

da trasportarsi avanti dopo 1666.
1666[2] Saxifraga inclinata Kern.
(S. autumnalis × mutata Goir.)
1892 Goiran Bull. Soc. bot. ital.
1893 Gelmi — 1904 Rigo in Goiran.

1662 Saxifraga exarata Vill.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1819 Bertoloni — 1837 Sandi — 1851 Perini in Hausmann.

1664 Saxifraga stellaris L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1824 Comolli — 1844 Puccinelli.
1565 c. Michiel.

1665 Saxifraga Hirculus L.
1785 Allioni — 1823 Moretti — 1839 Bertoloni.

1666 Saxifraga autumnalis L.
1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli — 1726 Zannichelli — 1773 Vitman — 1785 Allioni.

1666[1] Vedi indietro
1666[2] Saxifraga Hausmanni Kern.
(S. mutata × autumnalis b aizoides)
1889 Goiran. Cfr. Goiran 1904.

1667 Saxifraga bryoides L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1824 Comolli — 1816 Pollini
— β aspera (L.)
1785 Allioni — 1773 Vitman — 1805 Re — 1811 Brouli.

1668 Saxifraga cuneifolia L.
1554 Mattioli. Cfr. Bauh. et Cherl. III p. 684 — 1651 Bauh. et Cherl. l. c. — 1785 Allioni — 1802 Suffren 1824 Comolli —

1669 Saxifraga umbrosa L.
1839 Bonjean in Bertoloni IV — 1894 Rodegher e Venanzi.

1670 Saxifraga Geum L.
1851 Tappeiner in Hausmann
1881 C. P. G. (Prob. avventizia)

1671 Saxifraga florulenta Moretti
1818 Molineri. Cfr. Burnat III 1899 — 1823 Moretti — 1860 Ardoino in Bull. Soc. bot. Franc.

1672 Saxifraga mutata L.
1760 c. D. Vandelli. Cfr. Cesati 1840 — 1785 Allioni — 1786 Scopoli — 1824 Comolli.

1673 Saxifraga lingulata Bell.
1773 Vitman — 1789 Ucria — 1791 Bellardi — 1819 Bertoloni.
1745 Sabbati —

1674 Saxifraga crustata Vest.
1565 Michiel
1694 Ray — 1802 Suffren — 1811 Mazzucato — 1823 Moretti
— β cochlearis (Rchb.)
1830 Charpentier in Reichenbach — 1839 Viviani e Turio in Bertoloni IV — 1863 Ardoino.
1674[1] Saxifraga crustata × Aizoon β Engl.
1872 Engler, Monogr. Saxifr.

35/0018-123

1675 Saxifraga Aizoon Jacq.
1550 Tcholl Cibo — 1563 Cesalpino, 1595 Pona — 1713 Tita — 1745 Séguier — 1773 Vitman
— β ~~Hostii~~ elatior M. et K.
1713 Tita — 1769 Agosti — 1802 Marzari; Suffren — 1822 Pollini

1675' Saxifraga Hostii Tausch
(S. Aizoon α × ~~Aizoon β~~ elatior)
1898 Huter. Cfr. Bolzon.

1676 Saxifraga Cotyledon L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1844 Cesati — 1853 Rota

1677 Saxifraga media Gouan
Il tipo è proprio dei Pirenei
— β porophylla (Bert.)
1723 Micheli in Tilli — 1819 Bertoloni — 1823 Moretti — 1827 Brocchi

1677' Saxifraga aretioides Lap.
1872 Engler, Monogr. Saxifr.

1678 Saxifraga marginata Sternb.
1832 Tenore — 1839 Bertoloni

1679 Saxifraga diapensoides Bell
1791 Bellardi — 1805 Re — ~~1872 Boissier in Engler — 1893 Gelmi.~~
~~1879 Kerner e Porta in Nyman~~

1680 Saxifraga caesia L.
1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1773 Vitman — 1785 Allioni
— β squarrosa (Sieb.)
1713 Tita — 1802 Suffren — 1853 Rota.

1680' Saxifraga patens Gaud.
(S. caesia × autumnalis)
1881 C. P. G. — 1882 Arcangeli.
1879 Ball

1680² Saxifraga squarrosa × aizoides Engl.
1872 Engler Monogr. Saxifr.

1681 Saxifraga Vandellii Sternb.
1760 c. Vandelli. Cfr. Scopoli 1786 e Cesati 1840 — 1823 Moretti — 1824 Comolli
— β tombeanensis (Boiss.)
1872 Boissier in Engler Monogr. Saxifr.
1879 Kerner e Porta in Nyman — 1893 Gelmi

1682 Saxifraga Burseriana L.
1754 Séguier — 1822 Pollini — 1823 Moretti — 1893 Gelmi.

1683 Saxifraga purpurea All. (1772)
(β Saxifraga retusa Gouan, 1773)
1772 Allioni — 1823 Moretti — 1867 Ardoino — 1899 Burnat III.
— β augustana L. Vaccari
1903 L. Vaccari in Bull. Soc. bot. ital.

1684 Saxifraga biflora All.
1772 Allioni — 1805 Re — 1844 Cesati — 1853 Rota.

— β Muelleriana (Tillière)
(i sabbati)

1685 Saxifraga oppositifolia L.
1745 Séguier — 1772 allioni — 1805
Re — 1822 Pollini — 1853 Rota.
(Cristofori a Baltea in)

1685¹ Saxifraga spuria Kern.
(S. biflora × oppositifolia β)
1905 L. Vaccari in Bull. soc. bot. ital.

— β Muelleriana (Tillière)
1903 L. Vaccari, Bull. soc. bot. ital.
— γ Rudolphiana (Hornsch.)
1903 L. Vaccari in Bull. soc. bot. ital.
— δ Huteri Ausserd.
1899 Huter in Kern. Fl. exs. austro-hung. n. 2912 — 1903 L. Vaccari in Bull. soc. bot. ital.

1685² Saxifraga hybrida Kern.
(S. oppositifolia α × biflora)
1877 Kerner, Oest. bot. Zeitschr.

Zahlbruckneria Rchb.

1686 Zahlbruckneria paradoxa (Stern.) Rchb.
1839 Moretti in Bertoloni IV p. 485
— 1853 Rota — 1895 Sebm.

Chrysosplenium (Tourn.) L.

1687 Chrysosplenium alternifolium L.
1552 Cibo — 1745 Séguier — 1785
allioni — 1802 Jacquem; Margari
(Ad Ribes)

1685³ Saxifraga sarmentosa L. fil.
Dalla Cina e Giappone coltivata dalla fine del settecento p. e. a Padova 1801 / Bergamo ca. 1793 (Fuscagni) a Brescia 1900 Cocconi in Flora Cap. IC
(Dalla Cina a Padova, ora qua e là naturalizzata)

1688 Chrysosplenium oppositifolium L.
1789 allioni — 1836 Comolli — 1839
Bonjean in Bertoloni IV —

1689 Chrysosplenium macrocarpum Cham.
1830 Tenore — 1879 Gussone in Bertoloni.

Ribes (Rupp.) L.

1690 Ribes Grossularia L.
1550 Cibo — 1558 Matthioli — 1583
Cesalpino — 1585 Durante.
(Matthioli 1551 d'Orvand II)
— β Sardoum (Martelli)
1894 Martelli in Malpighia VIII

1691 Ribes nigrum L.
1785 allioni — 1805 Re — 1808 Brocchi
1864 Cesati.
1551 d'Orvand II

1692 Ribes multiflorum Kit.
1830 Tenore — 1835 Mauri in
Bertoloni II — 1882 Arcangeli.

1693 Ribes petraeum Wulf.
1806 Balbis — 1595 Pona — 1822
Pollini — 1834 Comolli — 1904 Goiran.

1694 Ribes rubrum L.
1550 Cibo — 1558 Matthioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1785 allioni
Largamente coltivato e spesso qua e là inselvatichito naturalizzato.

1695 Ribes alpinum L.
1785 Allioni – 1802 Mazzari – 1885 Re – 1830 Bertoloni – 1904 Goiran.

da trasportare indietro prima del 1690
Hydrangea L.

1689' Hydrangea Hortensia DC.
Originaria della Cina, coltivata comunemente fino dal principio dell'Ottocento, p.e. a Firenze, 1806 (Lucagni), a Padova 1812 (Moretti)

Philadelphus (Riv.) L.

1696 Philadelphus coronarius L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1585 Cesalpino – 1595 Pona – 1756 Seguier – 1785 Allioni
E' da ritenersi assolutamente indigeno d'Italia, tanto è diffuso e lungi dai luoghi coltivati, p.e. nel Trentino e Veronese. Cfr. Savard 1864, Goiran 1904 ecc.

Fam. 68 Crassulaceae

Cotyledon (Tourn.) L.

1697 Cotyledon Umbilicus L. R
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1785 Allioni – 1798 Savi

1698 Cotyledon horizontalis Guss.
1640 Castelli – 1684 Bononi – 1696 Cupani – 1827 Guss. – 1837 Sanguinetti

1698' Cotyledon orbiculata L.
Nativa del Capo di Buona Speranza; Insalvatichita nel Castello di Pisa 1850 Savi. – Cfr. Savi 1899.

Sempervivum (Rupp.) L.

1699 Sempervivum arboreum L. R
1561 Anguillara – 1565 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1827 Moris – 1834 Colla.

1699' Sempervivum hirtum L.
1745 Seguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini.
– β arenarium (Koch)
1851 Facchini in Hausmann.

1700' Sempervivum dubium Schott
1844 Haury ap. Schott. Cfr. Hausmann 1854 p. 1429.

1701 Sempervivum arachnoideum L.
1606 Colonna – 1713 Tilli – 1735 Micheli – 1785 Allioni – 1822 Pollini.
– β Doellianum (C. B. Lehm.)
1879 Nyman

1701' Sempervivum arachnoideum × montanum Brueggi.
1881 Brueggr. Cfr. Wohlfarth. I.

1701'' Sempervivum hybridum Brueggi
(S. Doellianum × montanum)
1881 Brueggr. Cfr. Wohlfarth I
1702 Sempervivum Funckii F. Braun
1848 Facchini in Moly e in Herb. Pat.
Cfr Vacari in Annal. Bot. Roma 1905

1703 Sempervivum montanum L
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re
1595 Pona? – 1819 Bertoloni.

1703' Sempervivum barbulatum Schott
(S. montanum × arachnoideum Focke)
1853 Kotschy in Schott. – 1879 Baker
in Garden Chron. – 1896 Evers in Verh

1703² Sempervivum rhaeticum Bruegg.
(S. montanum × alpinum Bruegg.)
1881 Bruegger. Cfr. Wohlfarth. I

1704 Sempervivum Braunii Funk
1851 Facchini in Hausmann

1704' Sempervivum Gaudini Christ
1851 Facchini in Hausmann
1905 Vaccari in Annal. Bot. Roma.

1704² Sempervivum Christii Wohlf
(S. Gaudini × montanum)
1894 Wilczek. Cfr. Vaccari l.c.

1704³ Sempervivum Vaccarii Wilczek
(S. Gaudini × arachnoideum)
1903 Vaccari. Cfr. Vaccari l.c.

1704⁴ Sempervivum Wolfianum Chenev.
(S. Gaudini × Funkii ?)
2(1905 Vaccari l.c. –
1(1898 Chenevard

1705 Sempervivum Wulfenii Hoppe
1848 Facchini in Maly – 1853
Rota. Cfr. Vaccari l.c.

1705' Sempervivum roseum Hut. et Gand.
(S. Wulfenii × arachnoideum)
1905 Longa in Vaccari l.c.

1705² Sempervivum Huteri A. Kern.
(S. Wulfenii × montanum)
(+1852) Facchini. Cfr. Facchini 1855
(sub S. Braunii) – 1905 Longa in
Vaccari l.c.

1705³ Sempervivum Comollii Rota
(S. Wulfenii × tectorum Dalla Torre)
1853 Rota

1706 Sempervivum tectorum L
1415 Rinio 1550 Petrollio Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

1706' Sempervivum piliferum Jord.
(S. tectorum × arachnoideum)
1891 Wohlfarth I – 1901 Rouy et Camus VII.

1706² Sempervivum Fontanae Bruegg.
(S. tectorum v. Mettenianum × arachnoideum
v. Doellianum)
1864 Bruegger. Cfr. Wohlfarth I

Sedum (Tourn.) L.

1707 Sedum maximum (L.) Sut.
1415 Rinio 1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1745
Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini

35/0018-125

1708 Sedum Telephium L.
1754 Séguier – 1802 Suffren – Marzari
1816 Noua e Balbis – 1822 Pollini.

1709 Sedum Fabaria Koch
1790 Re Viagg. al M. Ventasso – 1848
Maly – 1882 Gibelli e Pirotta.

1710 Sedum Anacámpseros L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1839 J. Bertoloni, Turro, Bonjean, Facchini in Bertoloni.

1711 Sedum roseum (L.) Scop.
1554 Mattioli – 1561 Anguillara –
1566 Calzolari – 1713 Tita – 1785 Allioni – 1585 Durante

1712 Sedum tenuifolium (S. et S.) Strobl R
1696 Cupani – 1826 Jan – 1827 Gussone –
1839 Giordano, Jan, Parlatore in Bertoloni IV.

1713 Sedum nicaeense All.
1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri
– 1827 Gussone; Moris.

1714 Sedum rupestre L.
1551 Aldrovandi II
1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785
Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re.
– β anopetalum (DC.)
1827 Gussone – 1834 Massara – 1844
Cesati; De Notaris – 1853 Rota.

1715 Sedum pruinatum Link.
1848 Maly – 1873 Cesati

1716 Sedum alpestre Vill.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1824
Cornolli – 1827 Moris.

1717 Sedum sexangulare L.
1554 Mattioli – 1563 Cesalpino –
1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
1802 Suffren; Marzari.
– β acre (Gilib.)
1415 Rinio
1550 Cibo – 1696 Cupani – 1745
Séguier – 1802 Suffren; Marzari

1718 Sedum album L.
1415 Rinio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1585
Durante – 1726 Zannichelli – 1745
Séguier – 1802 Suffren; Marzari.

1719 Sedum hirsutum All.
1785 Allioni – 1805 Re – ~~[illegible]~~ De
Notaris – 1826 Badaró in Moretti.
1869 Pangig in Malpighia.

1720 Sedum dasyphyllum L.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1745
Séguier – 1802 Suffren; Marzari
– β Donatianum Vis. et Sacc.
(+1659) Donati in Scarella, Galleria di Minerva VI p. 59-60 (1711 c.) – 1745 Séguier
Cfr. Facchini 1855, p. 54 e Goiran
1904, p. 453.

— γ brevifolium (DC.)
1834 Salis-Marschlins — 1872 Marsilly.

1721 Sedum magellense Tenore
1826 Gussone — 1816 Tenore

1722 Sedum moregalense Balb.
1804 Balbis — 1819 Bertoloni —
1828 Ph. Thomas in Duby.

1723 Sedum alsinefolium All.
1755 Allioni — 1808 Biroli — 1839
Molineri, Moris, Bertero in Bertoloni IV

1724 Sedum Cepaea L. R
1550 Cibo — 1563 Cesalpino —
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1818
Sebastiani e Mauri — 1824 Cornolli —
1823 Romano.

1725 Sedum stellatum L.
1594 Colonna*) — 1785 Allioni — 1789
Uoria — 1808 Biroli — 1844 DeMotaris — 1867 Ardoino. *)

1726 Sedum aetnense Tineo.
1844 Tineo in Gussone e 1847 in
Bertoloni VII.

1727 Sedum litoreum Guss.
1594 Colonna — 1826 Gussone — 1830
Tenore.

1728 Sedum annuum L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1824
Comolli — 1844 Cesati — 1853 Rota —

1729 Sedum atratum L.
1726 Zannichelli — 1754 Séguier —
1785 Allioni — 1822 Pollini.

1730 Sedum villosum L.
1785 Allioni — 1839 Rainer in
Bertoloni IV. — 1831 Romano.

1731 Sedum heptapetalum Poir.
1664 Ray. Cfr. Ray 1694 p. 277 — 1696
Cupani — 1789 Uoria — 1821 Gussone
— 1834 Salis-Marschlins.

1732 Sedum hispanicum L.
1551 Aldrovandi II
1696 Cupani — 1726 Zannichelli: Cfr.
Sacc. Un manip. Fl. M. Cav. 1907, p. 18 —
— 1806 Sternberg. — 1802 Suffren

1733 Sedum rubens L.
1550 Cibo — 1745 Séguier — 1726 Zannichelli: Cfr. Sacc. l. c. — 1785 Allioni — 1816
Nocca e Balbis

*) Viene escluso il sinonimo Cotyledon stellata Zanna Op. posthum. p. 45 di M. Cavallo, che quasi senza dubbio è da riferirsi a Sedum roseum o Rhodiola rosea.

35/0018-126

97

1734 Sedum caespitosum (Cav.) DC.
1806 Balbis — 1829 Tenore — 1867 Ardoino — 1877 Freyn

1735 Sedum andegavense DC.
1827 Moris — 1839 Moris e De Notaris.

1734' Sedum Sommierianum Palanza.
1899 Palanza Fl. Terra di Bari; per cura di A. Jatta.

1735' Sedum Notarjanni Ten.
1811 Notarjanni in Tenore — Probabilmente è una forma avventizia stentata del S. populifolium, che negli orti bot. si coltiva fino dal settecento.

1735² Sedum Sieboldii Sweet
Del Giappone; coltivato comunemente dal 1842 a Padova (de Visiani), 1845 a Napoli (Tenore)

1735³ Sedum sarmentosum Bunge.
Della Cina; introdotto dal 1880 circa ed ora volgarmente coltivato e talora subspontaneo, anche nella forma variegatum.

Rochéa DC.
1735⁴ Rochea falcata DC.
Dell'Africa australe; coltivata frequentemente fino dal principio dell'ottocento
1812 Spigno — 1815 Biroli — 1820 Bonato

Bulliarda DC.
1736 Bulliarda Vaillantii (W.) DC.
1696 Cupani — 1826 Gussone — 1827 Moris — 1835 Sassi in Bertoloni II

Tillaea (Micheli) L.
1674 B
1737 Tillaea muscosa L.
1674 Bovone — 1696 Cupani — 1729 Micheli — 1807 Bivona-Bernardi.

Fam. 69 Rosaceae

Prunus (Tourn.) L.
1738 Prunus Amygdalus Stok R
Originario dell'Asia, ma coltivato largamente colla sua varietà, fino dall'era romana ed ora spesso inselvatichito.
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante.
— β fragilis Arc. R
1554 Mattioli — 1561 Anguillara

1738' Prunus (Amygd.) hybrida Dierb.
(Prunus Amygdalus × Persica)
Coltivato in seguito a produzione culturale.

1739 Prunus Persica (L.) Stok R
Originario della Persia, ma coltivato dalla antichità e spesso inselvatichito.
1415 Rinio 1550 Cibo (1554 Mattioli) — 1561 Anguillara — 1591 Cortuso
— β Nuci-persica Rchb.
1561 Anguillara — 1591 Cortuso.

1739 Prunus (amygd.) nana L.
Della Russia, spesso coltivato nei giardini dal principio dell' ottocento.
1807 L. Arduino — 1814 Bonato

1740 Prunus Armeniaca L. R
Della Cina, coltivato dall'era romana.
1554 Matthioli — 1561 Anguillara
— β dasycarpa (Ehrh.)
Coltivato

1741 Prunus brigantiaca Vill.
1789 Allioni — 1805 Re — 1842 Bonjean ex Bertoloni V.

1742 Prunus Cocomilia Ten.
1830 Tenore — 1842 Gussone ex Bertoloni.
— β brutia (N. Terr.)
1888 N. Terracciano. Descr. d'una nuova sp. di Prunus (Atti Ist. incor. Napoli)

1743 Prunus domestica L. R
Nativo dell'Asia, ma probabilmente anche d'Europa, noto ai Romani.
1550 Cibo — 1554 Matthioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1785 Allioni.
— β Claudiana (Poir.)
1807 Arduino
— γ insititia (L.) R
Selvatico e coltivato a più varietà
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1862 Meyer

1744 Prunus spinosa L. R
1562 Matthioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.

1745 Prunus Myrobalana (L.) Loisel.
Originaria dell'Asia, coltivata comunemente da qualche secolo
1807 L. Arduino.

1746 Prunus prostrata Labill.
1827 Moris — 1834 Colla
— β humilis (Moris)
1827 Moris — 1834 Colla.

1747 Prunus avium L. R
1583 Cesalpino — 1745 Séguier — 1807 L. Arduino.
— β duracina L.
1583 Cesalpino — 1822 Pollini.
— γ Juliana L.
1554 Matthioli — 1822 Pollini

1748 Prunus Cerasus L. R
1554 Matthioli — 1785 Allioni — 1807 L. Arduino — 1822 Pollini
— β Marasca (Host)
1842 Visiani
— γ pumila L.
1642 Verling — 1880 Savardo e Aggazzotti — 1885 Borzì

35/0018 - 127

1749 Prunus Máhaleb L. R 98
1561 Anguillara – 1565 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona.
— β Cupaniana (Guss.)
(+1711) Cupani in Gussone 1842 – 1856 Huet. Cfr. Rym.

1750 Prunus Padus L.
1565 Mattioli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Sternberg – 1808 Biroli – 1906 Gortani.
(1585 Durante)

1751 Prunus Laurocerasus L.
Dell' Asia minore e spec. di Trebisonda, coltivato in Italia fino dal cinquecento e spesso qua e là inselvatichito.
1563 Cesalpino – 1591 Cortuso.
(Generalmente si afferma che il Laurocerasso fu importato in Europa da Costantinopoli nel 1576 (Cfr. Clus. Rar. pl. hist. p. 4); costa invece che prima ancora l'ebbe il principe Doria a Genova, donde lo ebbe il Cesalpino, che potè ~~fino dal 1565~~ coltivarlo a Pisa e inserirne un ramo nel suo Erbario nel 1563. Cfr. Targ. Tozz. Cenni stor. s. intr. piante e Caruel Ill. horti sicci Caesalp.

1752 Prunus lusitanica L.
Di Portogallo e Spagna, coltivato fino dalla fine del Settecento 1797 (Farsetti) a capo
1812 (Bonato) – e talora inselvatichito, 1904 (Goiran).

Keria DC.
2 Del Giappone, introdotto in Europa c. 1806 e tosto dopo in Italia: a Torino, 1814 (Balbis) a S. Sebastiano Piem., 1818 (Spigno) ecc. Ora comunemente coltivata per lo più ~~è più comune~~ la forma a fior. doppio e talora subspontanea 1869 Saccardo e Visiani – 1906 Gortani.
1 (1752' Keria japonica (L.) DC.

Spiraea (Tourn.) L.
1753. Spiraea chamaedryfolia L.
1837 Sandi – 1855 Pirona. Anche comunemente coltivata p. e Padova, 1812 (Bonato).
— β media (Schum.)
1843 Tommasini in Koch – 1882 Arcangeli.
— γ ulmifolia (Scop.)
1772 Scopoli – 1802 Suffren – 1811 Mazzucato – 1905 Minio N. giorn. bot. it.

1753' Spiraea cana W. K.
(+1872) G. v. Martens. Cfr. Aschers. Graebn. VI. p. 14.

1753² Spiraea lanceolata Poir.
Delle isole Mascarene, coltivata assai comunemente fino dalla I metà dell' ottocento, p. e. Napoli 1845 (Tenore)

1754 Spiraea hypericifolia L.
Il tipo è proprio della Tauride, Caucaso, Asia centr., Siberia e spesso è coltivato
— β obovata (W. K.)
1882 C. P. G — Arcangeli.
— γ flabellata (Bertol.)
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1842 Mauri in Bertoloni.
(+1673) Barrelier
ed. 1714.

1755 Spiraea lancifolia Hoffgg.
1802 Suffren — 1842 Brignoli in Bertoloni V — 1883 Bizzozero in Att. Ist. Ven. — 1906 Gortani.
— β decumbens Koch
1843 Grabowski e Bartling in Koch.
— 1844 Cesati — 1906 Gortani.

1756 Spiraea salicifolia L.
1797 Host — 1855 Pirona. Forse avventizia, giacchè è frequentemente coltivata fino dal settecento: nel Veneziano, 1798 (Farsetti) a Padova, 1801 (Bonato) ecc.

1756' Spiraea opulifolia L.
Dell'America settentrionale; frequentemente coltivata dalla fine del settecento: 1780 Farsetti; 1801 Bonato.

1757 Spiraea sorbifolia L.
Nativa della Siberia; coltivata comunemente fino dalla fine del settecento p. e 1798, Farsetti, 1801 Bonato ecc. ora qua e là naturalizzata: (+1870) Figari. Cf. Arcangeli 1882 — 1904 Goiran.

1758 Spiraea Filipendula L.
1532 Cibo — 1551 al Dorando — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1595 Pona.

1759 Spiraea Ulmaria L.
1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari — 1808 Biroli
— β denudata Presl.
1826 Presl; Gussone.

1760 Spiraea Aruncus L.
1550 Petrelli Cibo — 1566 Calzolari — 1595 Pona 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

Dryas L.

1761 Dryas octopetala L.
1595 Pona — 1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1773 Vitman — 1785 Allioni — 1802 Suffren

Geum L.

35/0018-128

1762 Geum rivale L.
1595 Pona — 1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier

(+1320) Crescenzio edit. 1471

1763 Geum urbanum L. R
1415 Rivi —
1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.
— β australe Guss.
1827 Gussone (G. intermed.)

1763' Geum intermedium Ehrh.
(G. rivale × urbanum G. Mey.)
1880 Burnat. Cfr. Burn. II, 233 — 1882 Arcangeli.

1764 Geum molle Vis. et Panc.
~~1827 Gussone~~ — 1830 Tenore — (+1876) Rolli in Chiov. Malp. 1897 — (+1823) L. Thomas. Cfr. Chiov. Malp. 1897

1765 Geum pyrenaicum Mill.
1880 Groves.
— β silvaticum (Pourr.)
1863 Bourgeau. Cfr. Nym. Consp. — 1867 Ardoino.

1765' Geum hybridum Wulf.
(G. montanum × rivale)
1867 Kerner in Oest. bot. Zeitschr. —
1876 Burnat. Cfr. Burn. 1896 II.

99 1766 Geum montanum L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1595 Pona.

1767 Geum reptans L.
1595 Pona — 1697 Bocone — 1805 Re — 1808 Biroli — 1811 Brocchi.

1767' Geum micropetalum Gasp.
1830 Gasparrini in Tenore e 1842 in Bertoloni V. (Specie da confermarsi)

1766' Geum rhaeticum Bruegg.
(G. montanum × reptans)
1882 Bruegger. Cfr. Nym. Consp. Suppl.

Potentilla L

1768. Potentilla sterilis (L.) Garke
— α Fragariastrum (Ehrh.)
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Uoria — 1818 Sebastiani e Mauri.
— β micrantha (Ram.)
1827 Moris — 1851 Tecilla e Facchini in Hausmann.

1769. Potentilla alba L.
1566 Calzolari — 1726 Zannichelli — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier

1770 Potentilla saxifraga Ard.
1848 Ardoino in De Notaris Ind. sem. Hort. Gen. — 1864 Moggridge — 1896 Burnat.

1771. Potentilla nitida L.
1595 Pona — 1697 Bocone — 1713 Tita — 1720 Pontedera — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

1772 Potentilla apennina Ten.
1697 Bocone — 1723 Micheli in Tilli — 1811 Tenore — 1827 Brouh.

1773 Potentilla clusiana Jacq.
(+1805) Wulfen. Cfr. Wulf. 1850 — 1855 Pirona — 1893 Huter in Parlat. Caruel X.

1774 Potentilla crassinervia Viv.
1825 Viviani — 1827 Moris — 1834 Salis-Marschlins

1775 Potentilla grammopetala Moretti
1826 Moretti — 1835 Colla — 1842 De Notaris in Bertoloni V.

1776 Potentilla valderia L.
1785 Allioni — 1842 Molineri, Baltis Bertero e Moris in Bertoloni V — 1844 De Notaris —
1763 Allioni in L. Sp. pl. ed. II

1777 Potentilla caulescens L.
1563 Cesalpino — 1707 Martini — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier — 1726 Zannichelli — 1773 Ustman.
— β petiolulosa Ser.
~~1904 Huter~~ 1904 Goiran
— γ nebrodensis (Strobl)
1696 Cupani — 1826 Presl — 1842 Gussone — 1903 Strobl.

1778 Potentilla Sibbaldi Hall. f.
1697 Bocone — 1785 Allioni — 1808 Biroli.

1779 Potentilla erecta (L.) Hampe
1415 Rinio 1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1745 Séguier.
— β procumbens (Sibth.)
1834 Salis-Marschlins — 1863 Boreau. Cfr. Rouy e Fouc. VI.

1780 Potentilla reptans L. R
1415 Rinio 1550 Petrollio Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli.
— β italica (Lehm.)
1842 Puccinelli — 1849 Lehman in Cat. sem. H. Hamb. — 1860 P. Savi, Caldesi, Grannini in Caruel.

1780' Potentilla ascendens Gremli
(P. reptans × erecta)
1883 S. Rossi, Fl. Ossol. — 1904 Ugolini in Comm. Aten. Brescia.

35/0018-129

1780 [2] Potentilla mixta Nolte (P. cossica)
1898 Foucaud e Simon.

1781 Potentilla norvegica L.
1785 Allioni — 1808 Sirodi — 1842 Caruana, Facchini in Bertoloni V

1782 Potentilla nivea L.
1808 Sirodi — 1818 Balbis — 1842 Moris e Savi in Bertoloni V.

1782' Potentilla Grayana Wits. et S.
(P. nivea × salisburgensis)
1904 Witczek in Vacari.

1783 Potentilla grandiflora L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Sirodi — 1842 Balbis, De Notaris, Facchini, Martini ecc. in Bertoloni V.

1783' Potentilla valesiaca E. Huet
(P. grandiflora × frigida Sieg.)
1904 Vacari.

1783 [2] Potentilla rhaetica Brügg
(P. grandiflora × salisburgensis Sieg.)
1904 Witczek in Vacari — 1904 Chenevard.

1784 Potentilla subacaulis L.
1804 Balbis — 1864 Allioni herb. Cfr. Burnat II — 1867 Ardoino. Cfr. Burn. II.
— β cinerea (Chaix)
1836 Tenore — 1844 Cesati — 1877 Freyn — 1894 Huter in Pard. Car. V

1784' Potentilla bellunensis Hut. P.
(P. baldensis × cinerea)
1883 Huter, Porta in Kerner Sched. ad n. 833.

1784 [2] Potentilla subcinerea Borb.
(P. incana × verna Asch.)
1904 Gorran

1785 Potentilla aurea L.
1785 Allioni — 1802 Viviani — 1824 Comolli — 1825 Savi — 1826 Jan.

1785' Potentilla aurea × salisburgensis
Roy et Cam.
1904 Chenevard.

1782 [2] Potentilla Trefferi Sieg.
(P. salisburgensis × aurea)
1878 Gebhri — 1904 Vacari.

1786 Potentilla verna L.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Sirodi — 1816 Pollini.
— β hirsuta DC
1785 Allioni — 1745 Seguier — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini — 1906 Gortani.
— γ Gaudini (Gremli)
1884 Zimmeter Eur. Art. Pot. — 1874 Burnat. Cfr. Burn. II. —
— δ opaca L. e. p.
1745 Seguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini (P. verna e. p.) — 1904 Gorran

— ε salisburgensis (Haenke)
1822 Pollini (P. aurea) — 1745, Séguier
1842 Bertoloni.
— ζ frigida (Vill)
1818 Balbis — 1842 Bonjean, Facchini ea. in Bertoloni V.
— η minima (Hall. f.)
1842 Bonjean e Facchini in Bertoloni V

1786[3] Potentilla Gaudini × longifrons Kell.
1903 Rob. Keller

2 1786[4] Potentilla Gelmiana (Siegfr.)
(P. bolzanensis × glandulifera)
1898 Gelmi.

1786[1] Potentilla Gardae Evers
1896 Evers

1 1786[2] Potentilla Laresciae Kell.
1903 Rob. Keller.

1786[5] Potentilla glandulifera × Gaudini Kell.
1903 Rob. Keller

1786[6] Potentilla opaca × Gaudini Wolf
1905 Murr. Cfr. Ascher. Graebn. VI.

1786[7] Potentilla Schroeteri Siegr.
(P. salisburgensis × Gaudini)
1903 Chenevard

1786[8] Potentilla Amthoris Huter
(P. minima × salisburgensis)
1903 Chenevard — 1904 Vacari

1786[9] Potentilla Vasonis Evers.
(P. tridentata × glandulifera)
1896 Evers — 1898 Gelmi.

1786[10] Potentilla Wolfii Siegr.
(P. frigida × nivea Gremli)
1884 Favre, Wolf in Zimmeter Monogr. Potent.

1786[11] Potentilla ambigua Gaud.
(P. frigida × multifida)
1828 Thomas in Gaudin Fl. Helv. III
— Cfr. Vaccari 1904.

1786[12] Potentilla semiternata Hut. et Port.
(P. minima × aurea)
1904 Vacari.

1787 Potentilla heptaphylla Mill.
1801 Balbis — 1844 Cesati — 1853 Rota
— β thuringiaca (Bernh.)
1893 Gelmi.
— γ camonica (Rota)
1853 Rota.

1788 Potentilla hirta L.
1785 Allioni — 1789 Horia — 1805 Re — 1816 Nocca e Balbis

35/0018-130

— β recta (L.)
1563 Cesalpino — 1566 Calzolari —
1726 Zannichelli — 1735 Micheli.

1789 Potentilla De-Tommasii Ten.
1811 Tenore — 1837 Sanguinetti — 1842
Mauri, Gasparrini, Ostini in Bertoloni V

1790 Potentilla argentea L.
1532 Cibo — 1562 Mattioli — 1585
Durante — 1726 Zannichelli.
— β calabra (Tenore)
1696 Cupani — 1811 Tenore — 1827
Gussone

1790[1] Potentilla Guentheri Pohl
(P. argenteo × verna)
1904 Goiran — 1898 Fiori ~~Fl. an~~ I.

1790[2] Potentilla dissecta Wallr.
(P. perargenteo × verna)
1893 Gelmi

1790[3] Potentilla ~~alpicola De la Soie~~ mutinensis Siegr ~~Johanniniana Goir.~~
(P. perverno × argentea)
1904 Goiran — ~~1893 Gelmi~~ 1898 Fiori
1894[2] Siegfried Exs. Potent.

1790[4] Potentilla inclinata Vill
(P. perhirto × argentea)
~~1824 Rec — 1898 Pospichal~~
1816 Noua e Baltis — Arcangeli.

101

1790[5] Potentilla Lamottei Siegfr.
(P. perhirto × argentea)
1824 Re — 1898 Pospichal

1790[6] Potentilla incrassata Zimm.
(P. perargenteo × hirta)
1898 Andr. Fiori in Fiori I

1790[7] Potentilla argentea × Guentheri Wolf
1903 Th. Wolf. Cfr. Asch. Graebn. VI

1790[8] Potentilla Goirani Zimm.
(P. argentea × ~~alpicola~~ Johanniniana)
1890 Goiran, N. giorn. bot. ital.

1790[9] Potentilla Hausmanni Uechtr.
1903 Th. Wolf. Cfr. Asch. Graebn. VI

1790[10] Potentilla Johanniniana Goir.
1875 Goiran — 1893 Gelmi

1790[11] Potentilla Schultzii P. J. Muell.
1904 Goiran

1790[12] Potentilla thyrsiflora Huels.
1903 Th. Wolf. Cfr. Asch. Graebn. VI — 1904 Goiran

1790[13] Potentilla alpicola De la Soie
1903 Chenevard — 1890 Goiran N. giorn. bot. ital.

1790[14] Potentilla Sadleri Rchb.
1884 Porta in Zimmeter, Europ.
Art. Potentill.

1790[15] Potentilla cana Jord.
1890 Goiran, N. Giorn. bot. ital.

1791 Potentilla anserina L.
1558 Mattioli – 1566 Calzolari –
1585 Durante – 1595 Pona.

1792 Potentilla supina L.
1666 Ambrosini – 1785 Allioni –
1806 Balbis – 1822 Pollini

1793 Potentilla rupestris L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1808
Biroli – 1823 Romano.

1794 Potentilla fruticosa L.
1785 Allioni – 1825 Re – 1867
Ardoino.

1795 Potentilla multifida L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1842
Bonjean in Bertoloni V

1796 Potentilla pensylvanica L.
Il tipo trovasi nella Spagna, Africa
Sett. ~~Siberia~~ ma probabilmente deriva
dalla Siberia e Amer. Sett.
in origine

– β sanguisorbifolia (Wolf.)
1808 Biroli – 1882 ~~Arcangeli~~ Carestia
in C. P. G. ; Arcangeli (P. multifida)

1797 Potentilla palustris (L.) Scop.
1785 Allioni – 1802 Suffren ; Marzari
1805 Re.

Fragaria (Tourn.) L.

1798 Fragaria vesca L. R
1550 Petrollio Cibo – 1558 Mattioli – 1566
Calzolari – 1595 Pona.
– β elatior (Ehrh.)
1842 Facchini in Bertoloni V – 1844
Cesati – 1847 Zanardini – Spesso
coltivata, già nel 1812, Bonato.
– γ collina Ehrh.
1415 Rinio 1583 Cesalpino – 1798 Savi – 1816
Noda e Balbis – 1818 Balbis.
– δ semperflorens Duchesne
Selvatica e coltivata 1864 Sanardo –
1822 Pollini – 1829 Piccioli ; 1904 Goiran

1798[1] Fragaria chiloensis (L.) Ehrh.
Del Cile ; introdotta in Europa nel
1715 ; già coltivata da oltre un secolo nel Veneto (1780
Farsetti, 1801 Bonato) e talora inselvatichita.

1798[2] Fragaria virginiana Duch.
Dell'America Sett., coltivata come
la precedente, ma di più recente intro-
duzione, p. e. 1812 (Spigno).

35/0018 - 131

1798³ Fragaria grandiflora Ehrh.
(F. chiloensis × virginiana Focke)
Già coltivata da lungo tempo (nel 1812 a Padova, Boneto) ed ora assai diffusamente coltivata e spesso inselvatichita. Cfr. Goiran 1904.

1799 Fragaria indica Andrews
Dell'Indie or. Cina e Giapp., già coltivata prima della metà dell'Ottocento, p. e. a Torino 1821, a Padova, 1823, a Modena 1836 ecc. ora avventizia, anzi largamente naturalizzata in più luoghi:
1856 Al. Malinverni. Cfr. Camus in Malpigh.
1857 Cesati Cfr. Camus l. c.
1905 — 1869 Sauardo a Visiani — 1884 Camus l. c. — 1888 P. Bolzon Boll. Nat. Sien. — 1891 — 1892 G. Nobili in Boll. Nat. Siena 1894. — (+1886) Franzoni ~~in Franzoni~~ edit. 1890.

Rubus (Tourn.) L.

1800 Rubus saxatilis L.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari

1801 Rubus idaeus L R
1550 Petrolla Cibo — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — (1561 Anguillara) — 1585 Durante.

1801' Rubus idaeus × caesius Mey.
1903 R Keller.

102 1802 Rubus fruticosus L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino.
— β panormitanus (Tineo)
1846 Tineo
— γ bifrons (Vest)
1877 Freyn — (+1886) Franzoni ~~in Franzoni~~ edit. 1890 —
— ε macrostemon (Focke)
1893 Gelmi — 1896 Bicknell — 1898 Pospichal.
— ζ thyrsoideus (Wimm.)
1842 Bertoloni — 1860 Caruel 1885 Borzì.
— η vestitus (Weihe et N.)
1854 Levier. Cfr. Baroni, Suppl. Fl. Tosc. — 1882 C. P. G.
— ϑ radula (Weihe)
1890 Favrat in Franzoni
— ι incanescens (Bert.)
1842 Bertoloni — 1894 Bolzon Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc.
— κ tomentosus Borkh.
1791 Bellardi — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1816 Noua.
— λ collinus (DC.)
1826 Presl; Jan — 1827 Gussone
— μ brachybotrys (Focke)
1884 Focke in N. Gior. bot. ital. — 1885 Borzì
— ν caesius (L.)
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

— ξ corylifolius (Sm.)
1822 Pollini — 1816 Nocca e Balbis
1842 Bertoloni V — 1844 Cesati
— ο suberectus (Anders)
1893 Gelmi — 1904 Goiran
— π plicatus (Weihe et N.)
1893 Gelmi —
— ρ sulcatus (Vest)
1893 Gelmi — 1898 Fiori — 1904 Goiran
— σ Bellardi (Weihe et N.)
1791 Bellardi — 1816 Nocca e Balbis
— 1827 Gussone — 1906 Gortani.
— τ hirtus (W. et K)
1822 Pollini: Cfr Goiran 1904 — 1882
C. P. G — 1885 Borzì — 1893 Gelmi.
— υ Guentheri (Weihe et N.)
1885 Borzì — 1893 Gelmi.
— φ Villarsianus (Focke)
1896 Bicknell — 1899 Burnat.
— χ saltuum (Focke)
1893 Gelmi — 1906 Gortani.
— ψ pallidus (Weihe et N.)
1882 Gibelli e Pirotta — 1896 Evers
— ω nitidus (Weihe et N.)
1899 Sauter.

1802¹ Rubus caesius × ulmifolius Focke
1899 Sommier. Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc.
1904 Goiran.
1802² Rubus caesius × tomentosus Focke
1899 Sommier. Cfr. Baroni Suppl Fl. Tosc.

1802³ Rubus baldensis Kerner
(R. tomentosus × ulmifolius)
1871 Kerner, Bericht. N. W. Innsb.
1899 Sommier; Levier. Cfr Baroni
Suppl. Fl. Tosc. — 1904 Goiran.

Agrimonia (Tourn.) L.

1803 Agrimonia Eupatoria L. R
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585
Durante — 1606 Colonna
— β odorata (Mill.)
1757 Latini 1811 Tenore — 1827 Gussone — 1837
Sanguinetti

1804 Agrimonia Agrimonoides L. *)
1551 Aldrovandi II 1606 Colonna — 1697 Capaci — 1704 Martini — 1713
Tita — 1789 Acria — 1816 Pollini

Alchemilla L.

1805 Alchemilla vulgaris L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1585
Durante — 1745 Seguier — 1802 Suffren; Mazzari.
— β strigosula (Buser)
1898 Fiori — 1904 Goiran — 1906 Gortani.
— γ hybrida (L.) W. Schm.
1844 De Notaris — 1893 Gelmi — 1904 Goiran
(1822 Pollini)

---

*) In talune opere più recenti viene usato l'addiettivo tautologico agrimonioides, mentre Linneo adottò, come specifico, il sostantivo Agrimonoides creato, come nome generico, dall'acuto Colonna.

35/0018-132

103

— δ Vetteri (Baser)
1867 Ardoino — 1896 Bicknell

— ε intermedia (Hall. fil.)
1896 Evers
— ζ fissa (Schum.)
1867 Ardoino — 1893 Gelmi — 1899 Burnat.

1806 Alchemilla pentaphyllea L.
1697 Boccone — 1785 Allioni — 1805 Re — 1835 Balbis, Bonjean, De Notaris, Moretti in Bertoloni II.

1807 Alchemilla alpina L.
1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1595 Pona — 1754 Séguier — 1773 Vitman — 1566 Calzolari — 1822 Pollini
— β Hoppeana Rchb.
1896 Bicknell — 1899 Briquet in Burnat III
— γ subsericea (Reuter)
1875 Reichenbach fil. Cfr. Burnat III, 1899 — (+1886) Franzoni ~~in publ.~~ 1890 — 1894 Arcangeli.

1808 Alchemilla Aphanes (L.) Scop.
1595 Pona — 1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren; Margari.
— β microcarpa (Boiss. et Reut.)
1872 Marsilly — 1881 Reverchon. Cfr. Barbey 1884.

— γ cornucopioides (R. et S.)
1872 E. Reverchon in Marsilly.

Poterium L.

1809 Poterium spinosum L. R
1565 Michiel — 1697 Cupani — ~~[illegible]~~ — 1824 Viviani — 1827 Moris
1650 Bauhin et Cherler

1810 Poterium Sanguisorba L.
1415 Rinio — 1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante.
— β polygamum (W. et K.)
1835 Bertoloni — 1844 Cesati — 1855 Pirona — 1904 Goiran.
— γ rupicola (Boiss. et Reut.)
1867 Ascherson et Reinhart. Cfr. Barbey 1884.

1811 Poterium dodecandrum (Moretti)
1829 Massara Cfr. Moretti, Bibl. ital. LXX, 1833 — 1835 Comolli e Bergamaschi in Bertoloni II. (B. et H.)

1812 Poterium officinale (L.) A. Gr.
1562 Mattioli — 1697 Boccone — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Biroli.

Rosa (Tourn.) L.

1813 Rosa moschata Herrm.
Di origine asiatica e abissina, coltivata almeno dalla fine del settecento (a Padova, 1801, Bonato) e ora naturalizzata qua e là in Sicilia
1885 Borzì — 1891 Lojacono.

1814 Rosa sempervirens L. R
1583 Cesalpino — 1561 Anguillara — 1696 Cupani — 1798 Savi — 1802 Viviani.
— β scandens (Mill.)
1867 Ardoino
— γ prostrata (DC.)
1842 Gussone — 1896 Bicknell.
— δ microphylla (DC.)
1842 Gussone (+1711) Cupani ed. 1713.
— ε Bicknellii Burn.
1899 Bicknell in Burnat III.

1814¹ Rosa ruscinonensis Désegl.
1879 Caldesi.

1814² Rosa corrugata Cald.
1879 Caldesi.

1815 Rosa arvensis Huds.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re — 1806 Sternberg — 1816 Nocca e Balbis

1815¹ Rosa arvensis × canina Chr.
1887 Borzì in Malpighia
1815² Rosa pervirens Gren. in Crép.
(R. arvensis × sempervirens?)
1899 Burnat III.

1816 Rosa stylosa Desv.
1885 Borzì — 1900 Rostan in Asch. et Graebn. VI.

1817 Rosa gallica L. R
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re — 1806 Sternberg.
— β eriostyla Gelmi.
1893 Gelmi.

1817¹ Rosa caudina N. Terracc.
1878 N. Terracciano.

1817² Rosa Polliniana Spr.
(R. gallica × arvensis)
1813 Pollini in Spreng. — 1885 Borzì

1817³ Rosa gallica × sempervirens Chr.
1873 Levier in Christ, Flora.

1817⁴ Rosa Chaberti Désegl.
(R. gallica × canina)
1894 Ferrari Cfr. Burnat III

1817⁵ Rosa centifolia L.
Probabilmente è una derivazione culturale della R. gallica, nota anche ai Romani.
1415 Rinio Petrelli 1550 Cibo — 1554 Mattioli.

1817⁶ Rosa damascena L. R
Probabilmente è un ibrido, modificato colla coltura, di R. gallica e canina. Coltivato dall'epoca romana
1415 Rinio Petrelli 1550 Cibo — 1583 Cesalpino

35/0018-133

1817[6] Rosa alba L.
Probabilmente un ibrido culturale di R. gallica e canina, spesso coltivato e talora subspontaneo. — 1660 Dalla Torre — 1713 Tita — 1780 Farsetti

1817[7] Rosa muscosa (L.) Ait. 104
Una varietà culturale della R. centifolia, coltivata fino dal principio dell'ottocento, p.e. a Padova 1801, Bonato, Firenze, 1806, Zuccagni, ecc.

1817[8] Rosa formosula Gren.
(R. gallica × agrestis Crép.)
1879 Caldesi.

1818 Rosa canina L. R
1550 Cibo — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β andegavensis (Bast.)
1884 Gibelli e Pirotta — 1893 Gelmi — 1906 Gortani
— γ dumalis (Bechst.)
1867 Ardoino — 1882 Marchesetti — 1884 Gibelli e Pirotta — 1886 Gelmi.
— δ verticillacantha (Merat.)
1898 Crépin in Fiori — 1906 Gortani
— ε scabrata (Crép.)
1898 Crépin in Fiori — 1882, Puyot
— ζ Blondaeana (Rip.)
1898 Crépin in Fiori — 1882, Puyot
— η dumetorum (Thuill.)
1885 Borzì — 1886 Gelmi — 1891 Lojacono.
— ϑ Deseglisei (Bor.)
1886 Gelmi — 1891 Lojacono — 1898 Crépin in Fiori

— ι tomentelloidea (Crép.)
1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori — 1904 Goiran.

1818[1] Rosa ischiana Crépin.
1854 Gussone (R. can. a, b) — 1869 Crépin in Bull. Soc. bot. Belg.

1819 Rosa tomentella Lém.
1886 Gelmi — 1891 Lojacono — 1896 Bicknell — 1898 Crépin in Fiori
— β obtusifolia (Desv.)
1867 Ardoino — 1898 Crépin in Fiori.

1819[1] Rosa tomentella × coriifolia Kell.
1901 R. Keller in Asch. Gräbn. VI.

1819[2] Rosa Allionii Burn. et Gr.
1883 Burnat e Gremli, Ros. Alp. marit. Suppl.

1819[3] Rosa Beatricis Burn. et Gr.
1883 Burnat. l.c. e Gremli

1820 Rosa Pouzini Tratt.
1885 Borzì — 1886 Burnat et Gremli — 1891 Lojacono — 1898 Crépin in Fiori

1820[1] Rosa Gallinariae Burn. et Greml.
1883 Burnat ~~l.c.~~ e Gremli

1821 Rosa glauca Vill.
1867 Ardoino Cfr. Burn. III — 1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori.
— β transiens (Kern.)
1870 Kerner in Oest. bot. Zeitschr.
1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori.
— γ imponens (Rip.)
1898 Crépin in Fiori.
— δ fugax (Gren.)
1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori
— ε Delasoiei (Lagg. et Pug.)
1898 Crépin in Fiori. 1882 Payot
— ζ Crepini (Mieg.)
1898 Crépin in Fiori
— η coriifolia (Fr.)
1879 Burnat e Gremli ~~Bot. Alp. mar.~~
1885 Borzì — 1886 Gelmi — 1904 Goiran
— ϑ Bellavallis (Pug.)
1882 Payot — 1898 Crépin in Fiori
— ι Friesii (Lagg. et Pug.)
1898 Crépin in Fiori.
— κ rigidula Pug.
1898 Crépin in Fiori
— μ caryophyllacea (Bess. e. p.)
1885 Borzì — 1898 Crépin in Fiori.

1822 Rosa montana Chaix
1867 Ardoino — 1886 Gelmi — 1891 Lojacono.
1809 Pyr. DC. Cfr. Burnat III.

II
1823 Rosa rubrifolia Vill.
1791 Bellardi — 1842 Facchini, Tommasini, Savi in Bertoloni V — 1886 Gelmi.

I
1822¹ Rosa Chavini Rap.
1879 Burnat et Gremli — 1904 R. Keller in Vaccari.
1822² Rosa abietina Gren
1901 R. Keller in Asch. Graebn. VI
1822³ Rosa uriensis Lagg. et Pug.
1901 R. Keller in Asch. Graebn. VI e 1903 in Bull. Herb. Boiss.

1824 Rosa micrantha Sm.
1879 Burnat e Gremli — 1885 Borzì — 1886 Gelmi — 1891 Lojacono — 1896 Bicknell.

1824¹ Rosa micrantha × rubiginosa Gelmi
1893 Gelmi.

1825 Rosa Seraphinii Viv.
1697 Cupani — 1824 Viviani — 1827 Gussone — 1834 Salis-Marschlins.

1826 Rosa agrestis Savi
1798 Savi — 1822 Pollini — 1867 Ardoino
1745 Séguier — 1886 Gelmi.

1826¹ Rosa rubiginosa × agrestis R. Kell
1904 Vaccari.

35/0018-134

1827 Rosa elliptica Tausch (Rosa graveolens Gren.)
1844 De Notaris – 1879 Burnat e Gremli – 1886 Gelmi.

1828 Rosa Strobliana Burn. et Gr.
1874 Strobl. Cfr. Lojacono 1891 –
1891 Burnat e Gremli in Lojacono.

1829 Rosa rubiginosa L.
1532 Cibo – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1816 Noca e Balbis – 1886 Gelmi.

1829¹ Rosa rubiginosa × tomentella Kell.
1901 R. Keller in Asch. e Graebn. VI.

1829² Rosa sanguisorbella De la Soie
1829 (R. rubiginosa × montana R. Kell.)
1901 R. Keller in Asch. e Graebn. VI.

1829³ Rosa rubiginosa × elliptica Kell.
1901 R. Keller in Asch. et Graebn. VI

1829⁴ Rosa consanguinea Gren.
(R. rubiginosa × gallica Chr.)
1885 Borzì (escl. Alp. marittime)

1830 Rosa glutinosa S. et S.
1829 Gussone (R. pulverulenta) – 1830 Tenore – 1842 Gasparrini in Bertoloni V.

1831 Rosa sicula Tratt.
1823 Trattinick Rosac. monogr. – 1885 Borzì – 1886 Burnat e Gremli – 1891 Lojacono
(1852 Panizzi. Cfr. Burnat. III)

– β Thuretii (Burn. et Gr.)
1842 Gussone (R. glutinosa) – 1883 Burnat e Gremli – 1877 Christ in Flora.

1832 Rosa tomentosa Sm.
1842 Moris, Facchini, Beggiato ea. in Bertoloni V. – 1886 Gelmi.
(1842 Tenore, Fl. Neap. Syll. App. V.)

1833 Rosa villosa L.
~~1773 Maratti e 1785 Allioni e 1816 Noca e Balbis~~
1875 Favre – 1882 Payot – 1898 Crépin in Fiori

– β pomifera (Herrm.)
2 (1885 Borzì – 1886 Gelmi – 1904 Goiran – 1906 Gortani –
1 (1785 Allioni – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino

1834 Rosa Heckeliana Tratt.
1696 Cupani – 1826 Presl – 1827 Gussone
– β Parnassi Burn. et Gremli
1898 Crépin in Fiori (da ricercarsi in Italia)

1835 Rosa Jundzilli Bess.
1885 Borzì – 1898 Belli e Ferrari ap. Crépin in Fiori.

1836 Rosa cinnamomea L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini – 1893 Gelmi – 1904 Goiran
– Qua e là soltanto avventizia

1833¹ Rosa pomifera × glauca R. Kell.
1891 R. Keller in Asch. e Graebn. VI

1836' Rosa blanda Ait.
Dell'America sett.; coltivata fino dal primo quarto dell'ottocento; p. e. a Torino 1815 (Biroli); a Palermo, 1821 (Gussone) ecc.

1837 Rosa pendulina L.
(= R. alpina L.)
1532 Cibo — 1780 Turra — 1790 Bellardi — 1802 Suffren.
— β pyrenaica Auct. non Gouan.
1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori — 1904 Goiran
— γ aculeata Ser.
1885 Borzì — 1886 Gelmi — 1898 Crépin in Fiori — 1904 Goiran.

1837' Rosa corii folia × pendulina Kell.
1902 R. Keller in Aschert. e Graebn. VI

(1837²) Rosa salaevensis Rap.
(Rosa glauca × pendulina Kell.)
1902. R. Keller in Aschert. e Graebn. VI

(1837³) Rosa pulcra Beyer
(Rosa pomifera × pendulina Kell.)
1902 R. Keller in Asch. e Graebn. VI.
1893 Gelmi

(1837⁴) Rosa spinulifolia Dem.
(Rosa tomentosa × pendulina Kell.)
1902 R. Keller in Asch. e Graebn. VI
1893 Gelmi —

1838. Rosa pimpinellifolia L.
1791 Bellardi — 1816 Pollini — 1830 Tenore (+1770) Moreni. Cfr. Poll. II
— β spinosissima (Auct. non L.)
1885 Borzì — 1886 Gelmi.
— γ myriacantha (DC.)
1898 Crépin in Fiori (Della Francia meridionale; da ricercarsi in Italia)

1838' Rosa reversa W. et K.
(R. pendulina × pimpinellifolia Kell.)
1882 F. Major in Arcang. Ricerche e lavori dell'Ist. bot. Pisa — 1899 Burnat III

1838² Rosa pomifera × pimpinellifolia Kell.
1902 R. Keller in Aschert. e Graebn. VI

1838³ Rosa rubella Sm.
(R. pimpinellifolia β × pendulina
1893 Gelmi

1838⁴ Rosa molvenoensis Evers.
1896 Evers

1839 Rosa lutea Mill.
Nativa dell'Asia occidentale, spesso coltivata fino dal settecento: a Torino 1772 (Allioni), a Firenze 1806 (Zuccagni); a Padova 1812 (Bonato), e in più luoghi naturalizzata
1551 al Bernardi II
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1816 Nocca e Balbis — 1842 Gasparrini in Bertoloni V

1839' Rosa sulphurea Ait.
Nativa d'Oriente, coltivata fino dal settecento: 1713 Tita — 1812 Bonato

1839² Rosa Banksiae R. Br.
Della Cina, comunemente coltivata fino dalla prima metà dell'ottocento.
1822 Savi — 1823 Spigno — 1829 Piccioli — 1842 Visiani.

35/0018-135

1839³ Rosa semperflorens Curtis
Della Cina e del Bengala, coltivata fino dai primi anni dell'ottocento ed ora spesso inselvatichita fra le siepi, spec. la variazione a fiori carnei. È pure spesso coltivata la var. ranunculiflora
1812 Bonato – 1806 Zuccagni – 1845 Tenore – 1821 Capelli –

1839⁴ Rosa indica L.
Della Cina, introdotta e coltivata fino dagli ultimi anni del settecento nelle sue numerose varietà (Rose thea ecc.)
1798 Farsetti – 1822 Savi – 1845 Tenore – 1821 Capelli –

1839⁵ Rosa microphylla Roxb.
Della Cina, introdotta nella prima metà dell'ottocento: 1841 a Firenze (Piccioli) 1842 a Padova (Vitiani) ecc. Ora è usata anche a far siepi e spesso trovasi inselvatichita.

Crataegus (Tourn.) L.

1840 Crataegus Crus-galli L.
Nativo dell'America Sett.; coltivato dalla fine del settecento e qua e là inselvatichito.
1780 Farsetti – 1801 Bonato – 1898 Fiori I.

1841 Crataegus Azarolus L.
Originario dell'Asia occid.; coltivato almeno dal cinquecento e qua e là inselvatichito.
1550 Petrolla Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1785 Allioni – 1787 Petagna.

1842 Crataegus Oxyacantha L. R
1550 Petrolla Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Porta – 1789 Uoria.
— β monogyna (Jacq.)
1785 Allioni – 1798 Savi – 1816 Nocca e Balbis – 1824 Comolli.
— γ Inzengae (Tineo)
1844 Gussone – 1847 Tineo in Bertoloni VII.
— δ triloba (Poir.)
1826 Presl – 1832 Gussone – 1830 Tenore
— ε laciniata (Uoria)
1696 Cupani – 1796 Uoria – 1826 Presl – 1827 Gussone

1842' Crataegus coccinea L.
Nativo dell'America settentrionale, coltivato fino dalla fine del settecento.
1780 Farsetti – 1801 Bonato
1806 Zuccagni.

Mespilus (Tourn.) L.

1843 Mespilus germanica R
1485 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1789 Uoria – 1785 Allioni

1843' Mespilus Smithii DC.
(Crataegus Oxyacantha × Mespilus germanica)
1891 Lojacono.

Cotoneaster (Rupp.) Med.

1844 Cotoneaster Pyracantha (L.) Spach
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1785 Allioni — 1811 Savi
1551 Al Ricardi II

1845 Cotoneaster integerrima Med.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re
— β tomentosa (Ait.)
1818 Balbis — 1830 Tenore
— γ nummularia (F. et M.)
1827 Gussone — 1889 N. Terracciano.

Amelanchier Medic.

1846 Amelanchier vulgaris Moench
1595 Pona — 1713 Tita — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

Photinia Lindl.

1847 Photinia serrulata Lindl.
Originaria della Cina e del Giappone, coltivata fino dal primo quarto dell'ottocento e sempre più diffusamente.
1822 Savi — 1823 Spigno — 1829 Piccioli — 1842 de Visiani.

Eriobotrya Lindl.

1848 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Nativa della Cina e del Giappone, coltivata comunemente dal primo quarto dell'ottocento.
1812 Spigno — 1815 Biroli — 1820 Bonato.

Pirus (Tourn.) L.

1849 Pirus Cydonia L. R
Oriundo dell'Asia occidentale, coltivato dall'era romana.
1415 Rinio
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante

1850 Pirus communis L. R
1415 Rinio
1554 Mattioli — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Moris — 1802 Suffren.
— β nivalis (Jacq.)
Coltivato nell'alta Italia. Cfr. DC Orig. des pl. cult. — Da alcuni avuto come una derivazione della var. seg. C Forse il Pero nespolino dei Toscani.
— γ amygdaliformis (Vill.)
1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1826 Jan — 1827 Moris — 1832 Gussone

1849' Pirus japonica Thunb.
Del Giappone. Coltivato dal primo quarto dell'ottocento.
1818 Savi — 1821 Gussone — 1829 Piccioli — 1842 Visiani.

1851 Pirus Malus L. R
1415 Rinio
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren (Queste citazioni si riferiscono tanto alla var. silvestris che alle forme coltivate)
— β dasyphylla Bl. et Fing.
1822 Pollini — 1904 Goiran.
1898 Fiori — 1906 Pampanini, Gortani; Fl. it. exs. n. 453.

35/0018-136

1851' Pirus florentina (Zucc.) Targ. Tozz 107
(P. torminalis × Malus)
1809 Zuccagni in Roem. Coll. I — 1819
1723 Micheli in Tilli (Bertoloni

1852 Pirus torminalis (L.) Ehrh. R
1532 Cibo — 1551 al Durand — 1562 Mattioli — 1563
Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595
Pona — 1726 Zannichelli

1852' Pirus latifolia (Lam.) Lindl.
(P. Aria × torminalis)
1882 Carestia in Arcangeli — 1904 Goiran
1853 Rota

1853 Pirus Aria (L.) Ehrh.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1595
Pona — 1726 Zannichelli

1853' Pirus Hostii (Jacq.) Heynh.
(P. Aria × Chamaemespilus)
1885 Borzì — 1882 Payot

1854 Pirus Chamaemespilus (L.) Ehrh. R?
1532 Cibo — 1713 Tita — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1805 Re.

1854' Pirus hybrida L.
(P. Aria × aucuparia)
1885 Borzì — 1882 Payot

1855 Pirus aucuparia (L.) Ehrh.
1532 Cibo — 1562 Mattioli — 1566
Calzolari — 1583 Cesalpino — 1745
Séguier.

1856 Pirus domestica (L.) Ehrh. R
1415 Rinio Petrotta
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561
Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585
Durante.

Fam. 70 Leguminosae

Albizzia Durazzini.

1857 Albizzia Julibrissin Dur.
Nativa dell' Asia centr. e merid., Giappone ed Abiss. Importata in Italia da Costantinopoli nel 1749 da Filippo Albizzi e successivamente coltivata in tutta Italia.
1780 Farsetti — 1812 Bonato; Pollini — 1815 Biroli

Acacia (Tourn.) W.

1857' Acacia Farnesiana W.
Nativa dell' Isola di S. Domingo, fu introdotta in Italia primamente nel giardino del Card. Farnese in Roma nel 1611 e successivamente diffusa dovunque.
1611 Cfr. Castelli 1625 — 1622 Cfr. Targioni-Tozetti, Cenni Stor. intr. — 1713 Tita.
1696 Cupani —

Gleditschia L.

1858 Gleditschia Triacanthos L.
Originaria dell' America Sett. coltivata dalla fine del settecento e spesso inselvatichita.
1772 Allioni 1780 Farsetti — 1801 Bonato — 1802 Rodati — 1807 L. Arduino

Ceratonia L.

1859 Ceratonia siliqua L. R
Originaria della ~~Grecia~~ Siria ed Asia minore; coltivata dall'epoca romana e qua e là naturalizzata nel mezzogiorno.
1415 Rinio 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante. 1696 Cupani

Cercis L.

1860 Cercis Siliquastrum L.
Nativo, pare, dell'Europa orient. e Asia occid. ma fino almeno dal cinquecento largamente naturalizzato.
1532 Cibo — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1745 Séguier.

Sophóra L.

1861 Sophóra japonica L.
Nativa del Giappone e della Cina, e soltanto introdotta fra noi negli ultimi anni del settecento; ora poi estesamente coltivata e talora avventizia.
1799 Zuccagni — 1812 Bonato; Pollini — 1817 Giani.

Anagýris (Tourn.) L. R

1862 Anagyris foetida L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli.

Lupínus (Tourn.) L.

1863 Lupinus angustifolius L.
1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1759 Allioni — 1789 Ucria — 1798 Savi.
— β linifolius (Roth)
1820 Tenore — 1828 Gussone.
— γ cryptanthus (Shuttlew.)
1872 Shuttleworth in Th. Campbell Enum. des pl. Cors. — 1897 Loret in Rouy et Fouc. IV.

1864 Lupinus albus L. R
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante — Nell' Ital. sett. soltanto coltivato e avventizio.
— β Termis (Forsk.)
1789 Ucria — 1806 Bivona — Bernardi — 1826 Presl — 1827 Gussone.

35/0018-137

108

1865. Lupinus pilosus Murr.
1885 Sotta — 1891 Lojacono.
— β digitatus (Forsk.)
1828 Cosentini in Gussone — 1820 Tenore
(L. hirsut.) — 1855 Huet. Cfr. Nym.

1866. Lupinus hirsutus L. R
1550 Cibo — 1745 Sabbati — 1837 Moris; Sanguinetti — 1828 Gussone
— β micranthus (Guss.)
1828 Gussone — (+1711) Cupani.

1867. Lupinus luteus L.
1789 Ucria — 1827 Gussone — 1828 Fiorini — Mazzanti.

Adenocarpus DC.
1868. Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay.
1678 Boccone
1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Spadoni — 1830 Tenore.
— β Bivonae (Presl)
1822 Presl — 1828 Gussone
— γ commutatus (Guss.)
1828 Gussone — 1835 Tenore

Cytisus (Tourn.) L.
1869 Cytisus Laburnum L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1723 Tilli (Queste citazioni in parte spettano prob. alla var. β)
— β Atschingeri (Vis.)
1833 Salisb. e 1841 Franzoni. Cfr. Webst. in Oest. bot. Zeitschr. 1891 — 1893 Gelmi — 1896 Marchesetti — 1904 Goiran.
(φ - Marschlins —

1870 Cytisus alpinus Mill.
1554 Mattioli — 1595 Pona — 1723 Tilli — 1822 Pollini

1871 Cytisus nigricans L.
1532 Cibo — 1595 Pona — 1713 Tita — 1735 Micheli — 1745 Séguier —

1872. Cytisus sessilifolius L.
1532 Cibo — 1735 Micheli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
1678 Boccone

1873 Cytisus scoparius (L.) Lk
1583 Cesalpino — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1808 Bivona — Bernardi

1870' Cytisus ramentaceus Sieber
1843 Fleischmann in Koch. La località richiede conferma, secondo Marchesetti, quantunque il Caruel (Fl. it. X 126) vi apponga il segno di verificazione (!).

1874 Cytisus emeriflorus Rchb.
1816 Sartorelli — 1847 Comolli — (+1886) Franzoni (edit. 1890) — 1830 Moretti in Reichenbach — 1843 Lagger in Koch.

1875 Cytisus aeolicus Guss.
1843 Gussone — 1847 Giordano in Bertoloni VII.
— β Bartolottae (Tod.)
1858 Mandralisca in Todaro, Ind. sem. Horti Panorm.

1876 Cytisus triflorus L'Hérit.
1696 Cupani — 1735 Micheli — 1789 Ucria — 1798 Savi.

1877. Cytisus Ardoini Fourn.
1847 Ardoino. Cfr. Ard. 1867.

1878 Cytisus purpureus Scop.
1697 Bocone — 1726 Zannichelli — 1735 Micheli — 1780 Turra.

1879 Cytisus hirsutus L. 1678 Bocone
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1735 Micheli — 1785 Allioni.
— β prostratus (Scop.)
1735 Micheli — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri.
— γ elongatus (W. K.)
1898 Pospichal.
— δ supinus (L. exp.)
1815 Savi — 1821 Nocca e Balbis — 1822 Pollini — 1904 Goiran.

1880 Cytisus spinescens Sieb.
1830 Tenore — 1847 Gussone in Bertoloni VII.
— β ramosissimus (Tenore)
1723 Micheli in Tilli
— γ pollinensis N. Terracc.
1889 N. Terracciano.

1881 Cytisus monspessulanus L.
1563 Cesalpino — 1735 Micheli — 1785 Allioni — 1828 Gussone.

1882 Cytisus argenteus L.
1675 Zanoni — 1754 Séguier 1780 Turra — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1822 Pollini — 1904 Goiran.

Genista L.

1883 Genista sagittalis L.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1804 Savi — 1906 Gortani

1884 Genista pedunculata L'Hérit.
1827 Tenore — 1864 Saccardo — 1860 Caruel
— β elata (Tenore)
1835 Tenore — 1847 Gussone in Bertoloni VII
— γ diffusa (W.)
1788 Wulfen in Jacq. Coll. II — 1802 Suffren — 1847 Manganotti e Tommasini in Bertoloni VII.

1885 Genista januensis Viv. (= Genista triangularis Kit.)
1735 Micheli — 1806 Bertoloni — 1802 Viviani — 1818 Balbis.
1678 Bocone —

1886 Genista tinctoria L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona.

35/0018-138

— β virgata (W.)
1816 Pollini — 1869 Visiani e Saccardo
— γ humilis (Tenore)
1820 Tenore — 1832 Bertoloni.
— ε ovata (W. K.)
1583 Cesalpino — 1735 Micheli — 1785 Allioni — 1821 Nova e Balbis.
— ζ mantica (Pollini)
1816 Pollini — 1818 Balbis — 1890 Favrat in Franzoni.
— η apennina Fiori
1899 Fiori
— δ tenuifolia (Lois.)
1810 Loiseleur — 1882 Gibelli e Pirotta

1887 Genista sericea L.
1788 Wulfen in Jacq. Coll. II — 1802 Suffren — 1847 Montini, Tommasini ecc. in Bertoloni VII — 1855 Pirona.

1888 Genista pilosa L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1815 Savi — 1855 Pirona — 1842 Trevisan

1889 Genista Cupani Guss.
1696 Cupani — 1821 Gussone — 1822 Presl.

1890 Genista hispanica L. R
1757 Allioni — 1844 Risso — 1847 Colla in Bertoloni VII.

1891 Genista silvestris Scop.
1802 Suffren — 1847 Mayor, Tommasini, Brignoli in Bertoloni VII
— β aristata (Presl)
1640 Castelli — 1671 Bocone — 1822 Presl — 1828 Gussone.
— γ dalmatica (Bartl.)
1820 Tenore — 1723 Micheli in Tilli (Gen. garganica, pumila) ✓

1892 Genista germanica L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier.
— β inermis Koch
1843 Biasoletto in Koch — 1847 Bertero in Bertoloni VII — 1855 Pirona

1893 Genista anglica L.
1837 Bartling e 1863 Tommasini
Cfr. Marchesetti 1896.

1894 Genista Scorpius (L.) DC.
1848 Grenier e Godron — 1872 Marsilly

1895 Genista corsica DC.
1824 Viviani — 1839 Moris — 1848 Grenier e Godron
1896 Genista Morisii Colla
1827 Moris — 1834 Colla — 1849 De Notaris in Bertoloni VII.

1897 Genista radiata (L.) Scop.
1551 al Durand II
1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1606 Colonna — 1802 Suffren.
— β holopetala (Fleisch.)
1837 Bartling — 1843 Fleischmann in Koch — 1863 Tommasini — Cfr Marchesetti 1896.

1898. Genista cinerea (Vill.) DC.
1791 Bellardi — 1834 Colla — 1847 Balbis in Bertoloni VII.

1899 Genista aspalathoides Lam.
Il tipo è proprio dell'Algeria e Tunisia.
— β Lobelii (DC.)
1828 Gussone — 1837 Moris.
— γ Salzmanni (DC.)
1555 Michiel
1825 Salzmann in DC. Prodr. II — 1834 Salis-Marschlins.
— δ acanthoclada (DC.)
1899 Biondi in Fiori.

1900 Genista ephedroides DC.
1825 Viviani; Gussone — 1848 Grenier e Godron.

1901 Genista aetnensis (Biv.) DC.
1814 (Rafinesque); (Bivona, Bernardi)
1902 Genista monosperma (L.) Lam.
II { 1828 Gussone — 1847 Schouw e Parolini in Bertoloni VII
I { Il tipo è proprio di Spagna, Portogallo ed Africa settentrionale.
β Gussonei (Webb)

1902 Genista cordifolia Porta
1905 Porta in Atti Acad. Rover.
(Dalla diagnosi l'entità non è chiara)

Spartium (Tourn.) L.
1903 Spartium junceum L. R
1415 Rinio 1572 Cibo — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.

Ulex L.
1904 Ulex europaeus L.
1551 al Durand II 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1798 Savi — 1828 Spadoni — 1834 Colla — 1855 Brumati in Pirona — 1860 Caruel

Calycotome Link.
1905 Calycotome spinosa (L.) Lk
1551 al Durand II 1554 Mattioli — 1701 Mattioli — 1723 Tilli — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni
β infesta (Guss.)
1723 Erbario Princ. Cattolica — Cfr. Baroni 1896.
1789 Ucria — 1828 Gussone.
— γ ligustica Burnat
1848 Lisa — 1888 Ferrari — Cfr Burnat II, 1896.
— δ villosa (Lk.)
1723 Michali in Tilli — 1804 Savi — 1824 Viviani — 1860 Caruel

Ononis L.
1906 Ononis spinosa L. R
1550 Cibo — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino (1554 Mattioli) — 1566 Calzolari.

35/0018 - 139

— β intermedia (C. A. Mey.)
1850 Kralik. Cfr. Rouy IV — 1877 Freyn (O. antiquorum)
— γ antiquorum (L.)
1789 Ucria — 1798 Savi — 1837 Moris.
— δ mitis L.
1785 Allioni — 1847 Comolli; Bertoloni VII (O. arvensis)
— ε procurrens (Wallr. e p.) Burn.
1806 Balbis — 1808 Biroli — 1847 Comolli.
— ζ Masquillierii (Bert.)
1839 Masquillioni in Bertoloni — 1847 Bertoloni, Gennari, Amidei in Bertoloni VII.

1907 Ononis hispida Desf.
(+1856) Tineo. Cfr. Lojacono III — 1891 Lojacono III

1908 Ononis mitissima L.
1696 Cupani 1757 Latini — 1807 Bivona — Bernardi — 1828 Gussone.

1909 Ononis serrata Forsk.
1697 Boccone — 1827 Gussone — 1837 Moris.
— β diffusa (Tenore)
1811 Tenore — 1828 Gussone; Fiorini Mazzanti.
— γ villosissima (Desf.)
1847 Gasparrini in Bertoloni VII

1910 Ononis alba Poir.
1820 Tenore — 1837 Moris.
— β oligophylla (Ten.)
1694 Ray — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1811 Tenore — 1828 Gussone.

1911 Ononis alopecuroides L.
1696 Cupani — 1824 Viviani — 1826 Gussone

1912 Ononis variegata L.
1694 Ray — 1674 Boccone — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1828 Gussone.

1913 Ononis striata Gouan
1867 Reuter, Bornet, Montolivo in Ardoino.

1914 Ononis pusilla L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1805 Re — 1822 Pollini

1915 Ononis minutissima L.
1676 Boccone 1755 Allioni — 1789 Ucria — 1804 Bertoloni — 1828 Gussone — 1837 Moris.

1916 Ononis Natrix L.
1532 Cibo — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1798 Savi.
— β inaequifolia (Ser.)
1834 Salis — Marschlins — 1825 Soleirol. Cfr. Gren. Godr. I, 1848

— β ramosissima (Desf.)
1671 Bouvre — 1694 Ray — 1696 Cupani — (1807 Bivona-Bernardi) 1828 Gussone

1917 Ononis ornithopodioides L.
1696 Cupani — 1789 Acria — 1808 Savi — 1828 Gussone.

1918. Ononis pubescens L
1887 Groves — 1889 Nyman Suppl.

1919 Ononis Sieberi Bess.
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1847 De Notaris in Bertoloni VII.

1920 Ononis viscosa L
1804 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri 1820 Tenore — 1827 Gussone.
— β breviflora (Ser.)
1757 Latini 1828 Gussone
— γ sicula (Guss.)
1821 Gussone.

1921. Ononis biflora Desf.
1696 Cupani — 1828 Gussone — 1829 Moris

1922. Ononis pendula Desf.
1696 Cupani — 1828 Gussone

1923. Ononis reclinata L.
(+1673) Barrelier ed. 1714 — 1798 Savi — 1837 Moris

— β mollis (Savi)
1696 Cupani — 1804 Savi — 1820 Tenore — 1822 Bertoloni
(1759 Allioni)
— γ inclusa (Bertol.)
1847 Soleirol in Bertoloni VII.

1924 Ononis cenisia L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1830 Tenore.

1925 Ononis fruticosa L
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino.

1926 Ononis rotundifolia L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1847 Molineri, Bonjean, Rainer in Bertoloni VII

Medicago (Tourn.) L.
1927 Medicago lupulina L
1550 Petrus Cibo — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1802 Suffren.
— β Cupaniana (Guss.)
1696 Cupani — 1827 Gussone — 1837 Sanguinetti
— γ secundiflora (Durr.)
1883 Arcangeli — Cfr. Baroni Suppl Fl. Tosc.

1928 Medicago arborea L. R
1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1826 Prest 1827 Spadoni — 1850 Rainer, Giraldi in Bertoloni VIII. È dubbio se sia fra noi veramente spontanea ♀ È propria della Grecia, Asia minore.

♀ quantunque Mattioli scriva "Nascitur sponte in Campania prope Neapolim."

35/0018-140

1929 Medicago marina L.
1550 Cibo – 1631 Donati – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

1930 Medicago sativa L. R
Originaria dell'Asia occ. e centr. e recata dalla Media in Europa più tutt'ora romana; ha formato colt. vasta e largamente naturalizzata
1550 Cibo – (1563 Cesalpino) – 1561 Anguillara + 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1735 Michel.

1930¹ Medicago varia (Martyn)
(M. sativa × falcata)
1855 Piroia – 1869 Visiani e Savastano

1930² Medicago falcata L.
1550 Cibo – 1565 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1765 Allioni – 1802 Suffren – Specie assolutamente indigena.
– β glutinosa (M. B.)
1801 Balbis – 1844 De Notaris – 1850 Sostegni in Bertoloni VIII.

1931 Medicago prostrata Jacq.
1723 Michele in Tilli – 1802 Suffren – 1825 Savi – 1906 Gortani.

1932 Medicago scutellata (L.) Mill.
1697 Cupani – 1785 Allioni – 1828 Gussone – 1860 Carmel – 1867 Ardoino.

1933 Medicago orbicularis (L.) All.
1595 Pona – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1765 Seguier – 1822 Pollini
– β marginata (W.)
1877 Freyn – 1882 Arcangeli –
1825 Soleirol. Cfr. Gr. Godr. I – 1844 Gussone
– γ cuneata (J. Woods)
1850 J. Woods, The Turnit-Flora – 1882 Todaro in Arcangeli.

1934 Medicago Blancheana Boiss.
Il tipo è proprio della Siria
– β Bonarotiana (Arcang.)
1876 Arcangeli in N. Giorn. bot. ital.

1935 Medicago rugosa Desr.
1696 Cupani – 1694 Ray – 1828 Gussone – 1837 Moris.

1936 Medicago Soleirolii Duby
1828 Soleirol in Duby – 1844 De Notaris – 1867 Loret in Ardoino.

1937 Medicago obscura Retz
1697 Cupani – 1723 Michele in Tilli – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone
– β aculeata Guss.
1826 Gussone
– γ falcix (W.)
1697 Cupani – 1828 Gussone – 1835 Tenore – 1837 Moris

— δ spinosa Guss.
1826 Gussone — 1837 Moris

— ε tornata (Mill.) Urb.
1900 Fiori (le ricerche si fecero)

— ζ muricata (W.) Urb.
1828 Gussone — 1835 Tenore — 1872
Marsilly.

1938 Medicago tuberculata W.
1818 Carmignani in Giorn. Sc. Lett.
2 Anad. ital. — 1828 Gussone — 1837 Moris
1 1798 Savi —
— β spinulosa (DC.)
1882 Arcangeli — ~~1839 Moris~~ De Not. ~~sub~~ Tabacco v. aculeata — 1891 Loja
como — 1899 Rouy V — 1896 Burnat II
— γ aculeata ~~(glandulosa)~~ Moris
1837 Moris — 1839 Moris e
De Notaris
1938' Medicago globosa Presl
1822 Presl — 1828 Gussone (Prob. solo avventizio)

1939 Medicago truncatula Gaertn
1694 Ray — 1696 Cupani — 1828
Gussone.
— β tribuloides (Desr.)
1818 Sebastiani e Mauri — 1828
Gussone — 1837 Moris.

1940 Medicago litoralis Rohde
1819 Tenore Cat. Orti Nap. App.
1820 Mauri — 1843 Sendtner Q. Freyn 1877.
— β Rouyana Fiori.
1899 Rouy V.
— γ depressa Urb.
1899 Rouy V

— δ cylindracea (DC.)
1826 Presl — 1828 Gussone — 1837 Moris.
— ε tricycla (DC.)
1828 Gussone — 1837 Moris — 1891 Loja como
— ζ pusilla (Viv.)
1828 Gussone — 1837 Moris.

1941 Medicago turbinata (L.) W.
1818 Carmignani in Giorn. Sc. Lett. Acad.
ital. — 1828 Gussone — 1837 Moris.
— β oliveriformis (Guss.)
1826 Gussone — 1827 Moris.
— γ aculeata (Gaertn.) Moris
1828 Gussone — 1837 Moris — 1867
Sarato in Ardoino.

1942 Medicago murex W.
1551 Alpinus Valtrago Scaliger
1810 Bertoloni — 1837 Moris.
— β orata (Carmign.)
1810 Carmignani in Giorn. Pisano —
1837 Moris.
— γ sicula (Tod.)
1868 Todaro in Cat. sem. Hort. Panorm.
— δ Sorrentini (Tines)
1859 Todaro in Cat. sem. Hort. Panorm.

1943 Medicago Pironae Vis.
1855 Pirona — 1869 Visiani e Savarda

1944 Medicago rigidula (L.) Desr.
1726 Zannichelli — 1745 Seguier
— 1785 Allioni — 1818 Ruchinger — 1821
Noue e Balby

35/0018-141

— β Morisiana (Jord.)
1837 Moris — 1844 Gussone —
— γ agrestis (Tenore)
1830 Tenore — 1867 Ardoino.

1945 Medicago laciniata (L.) Mill.
1785 Allioni — 1834 Colla — 1850 Molineri in Bertoloni VIII.

1946 Medicago minima Grufberg
1726 Zannichelli — ~~[illegible]~~
1802 Marzari — 1822 Pollini.
— β recta (W.)
1828 Gussone — 1696 Cupani — 1867 Ardoino.
— γ hirsuta (L.)
1745 Séguier — 1822 Pollini — 1850 Montini, Gasparrini in Bertoloni VIII

1947 Medicago coronata (L.) Desr.
1842 Tenore — 1850 Gussone in Bertoloni VIII — 1889 Terracciano.

1948 Medicago Tenoreana Ser.
1811 Tenore — 1828 Gussone

1949 Medicago disciformis DC.
1835 Tenore — 1850 Gussone in Bertoloni VIII.

1950 Medicago carsiensis Wulf.
(+1770) Moreni. Cfr. Pollini II — 1772 Scopoli — 1817 Pollini — 1821 Nocca e Balbis.

1951 Medicago arabica (L.) All.
1745 Sabbati —
1697 Cupani — 1776 Bartolini — 1785 Allioni — 1804 Savi — 1828 Biasoletto in Freyn 1877.

1952 Medicago hispida Gärtn.
1551 Aldrovandi II
1804 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri; Ruchinger
— β lappacea (Desr.)
1820 Moricand — 1837 Moris — 1860 Caruel —
— γ nigra (W.)
1696 Cupani — 1828 Gussone — 1830 Tenore — 1867 Ardoino.
— δ apiculata (W.)
1818 Balbis — 1820 Mauri — 1829 Gussone —
— terebellum (W.)
1827 Moris — 1828 Gussone — 1835 Tenore.

1953 Medicago praecox DC.
1828 Ph. Thomas e Stirn in Duby — 1834 Salis-Marschling — 1837 Moris.
— β pontificalis (Genn.)
1870 Gennari.

1954 Medicago intertexta (L.) Mill.
1798 Savi — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone.
— β Decandollei (Tineo)
1826 Gussone — 1835 Tenore
— γ muricoleptis (Tineo)
1817 Tineo — 1828 Gussone

— δ tuberculata (Moris)
1837 Moris.

— δ infesta (Guss.)
1828 Gussone — 1830 Tenore.

1955 Medicago ciliaris (L.) Krock
1828 Gussone — 1837 Moris —
1839 Moris e De Notaris.

1958 Melilotus neapolitana Ten. R
1811 Tenore — 1818 Sebastiani e Mauri;
Ruchinger — 1828 Gussone.

1955' Medicago radiata L.
Nativa dell'Asia occid., ma avventizia in più regioni d'Europa, e così nel Nizzardo ad Ighina. E' da notarsi che dal tempo di Zoboli fino a Limes (la specie era ritenuta italiana)
4(1854 Nyman — 1896 Bicknell
3(1832 Reichenbach (M. lunata)
2(1583 Cesalpino — 1585 Durante
1 { Si trova raramente coltivata negli orti botanici: Torino 1760 (Allioni) Padova 1820 (Bonato)

1959 Melilotus italica (L.) Lam. R
1561 Anguillara — 1696 Cupani — 1789
Ucria — 1785 Allioni

1960 Melilotus elegans Salzm.
1825 Salzmann in DC. Prodr. II.
1828 Gussone — 1837 Moris — 1839
Moris e De Notaris
— β Pertusiana (Gennari)
1858 Gennari in Mem. Acad. Torino
— δ sardoa O.E. Schulz
1901 Schulz Monogr. Gatt. melilot.

Melilotus (Tourn.) Adans.

1956 Melilotus messanensis (L.) All.
1696 Cupani — 1697 Bocone — 1789 Ucria
— 1785 Allioni

1961 Melilotus indica (L.) All.
1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1818
Sebastiani e Mauri — 1820 Moricand.
— β permixta (Jord.)
1896 Marchesetti
— γ exaltata (Bivona)
1857 Bianca in Atti Acad. Gioen. II. XIII
— δ densiflora Sommier
1898 Sommier in Bull. Soc. bot. it.
— ε Tommasinii (Jord.)
1837 Tommasini, Biasoletto. Cfr. Freyn 1877.

1957 Melilotus sulcata Desf.
1697 Cupani — 1824 Viviani — 1826 Moretti — 1828 Gussone.
— β segetalis (Ser.)
1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone — 1837 Moris.
— γ leiocarpa (Pomel)
1848 Grenier e Godron — 1898 Sommier in Bull. Soc. bot. ital.

1962 Melilotus officinalis (L.) Lam. R
1554 Mattioli — 1585 Durante — 1745
Seguier — 1816 Poiret — 1826 Balbis
in Moretti
1615 Rivio

— β neglecta (Tenore)
1835 Tenore

1963 Melilotus alba Desr.
1563 Cesalpino — 1726 Zanni-Selli — 1745 Seguier — 1816 Pollini.

1964 Melilotus albissima Thuill.
Il tipo è da ricercarsi in Italia.
— β macrorrhiza (Pers.)
1844 Casati — 1850 Bertoloni — 1855 Pirona — 1864 Gorjan
— γ linearis (Cav.)
1901 O. E. Schulz Monogr. Gatt. Melilot.
1907 Fiori Agg. (Comune, ma prova confuso con var. β)

1965 Trigonella L.

1965 Trigonella caerulea (L.) Ser.
2 { 1532 Cibo — 1551 (all'orto) — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante — 1595 Pona — 1647 Comolli
1 { È nativa della regione Danubiana Russia merid. e probabilmente in Italia è solo avventizia o naturalizzata.

1966 Trigonella Foenum-graecum L. R
Originaria dell'Asia occident., ma coltivata dall'epoca romana a quella e là avventizia.
1445 Rom. 1554 Matthioli — 1532 Cibo — 1565 Cesalpino — 1585 Durante

1967 Trigonella gladiata Stev.
1696 Caparri — 1785 Allioni — 1822 Presl — 1828 Gussone

1968 Trigonella monspeliaca L.
1675 Boccone. Pl. Sicul. Melit. Corsic. etc. ed. Boccone. Pavia 1830
1754 Seguier — 1785 Allioni — 1821 Nocca e Balbis — 1822 Pollini.

1969 Trigonella maritima Del.
1821 Gussone — 1828 Moris — 1853 Grech-Delicata.

1970 Trigonella corniculata L.
1532 Cibo — 1602 Matthioli — 1785 Allioni — 1847 Zanardini.

1970' Trigonella bicornis Boiss.
Nativa dell'Asia minore, insulare ha subito o avventizia presso Messina.
1887 Borzì in Malpighia I, 504.

1970" Trigonella polycerata L.
Nativa di Spagna e Algeria, già avventizia presso Nizza
1785 Allioni.

1970³ Trigonella Pes-anserum Bertol.
1850 Barbieri in Bertoloni VIII, la corrisponde a Trig. Balansae Boiss., propria dell'Asia occid. (Cfr. Chiovenda Malp. 1900) la quale in Bertoloni sarebbe una forma avventizia.

Trifolium (Tourn.) L.

1971 Trifolium ornithopodioides (L.) Sm.
1842 Gasparrini – 1848 Grenier e Godron – 1877 Freyn – 1887 Armitage
Cfr. Pirotta in Malp. I, 505.

1972 Trifolium uniflorum L.
1825 Savi – 1828 Gussone

1973 Trifolium subterraneum L.
1696 Cupani – 1735 Micheli – 1798 Savi – (1785 Allioni)
— β brachycladum Gib. et Belli
1892 Gibelli e Belli. Riv. cr. Trif. ital.
— γ longipes Gay
1892 Gibelli e Belli. l.c.

1974 Trifolium arvense L. R
1532 Cibo – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona.
— β Brittingeri (Weitenw.)
1869 Visiani e Sanardo.
— γ longisetum (Boiss. et Ball)
1879 Caldesi.
— δ gracile (Thuill.)
1828 Gussone. Cfr. Gib. e Belli l.c.

1974' Trifolium clypeatum L.
1785 Allioni (Certam. avventizio)

1975 Trifolium saxatile All.
1785 Allioni – 1810 Savi.

1976 Trifolium Bononei Savi
1697 Bonone – 1810 Savi – 1824 Viviani.

1977 Trifolium tenuifolium Tenore
1811 Tenore – 1826 Gussone.

1978 Trifolium striatum L.
1772 Wulfen in Scopoli – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1811 Tenore – 1818 Sebastiani e Mauri.

1979 Trifolium scabrum L.
1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
— β lucanicum (Gasp.)
1828 Gasparrini in Gussone – 1899 Fiori
— γ dalmaticum (Vis.)
1882 Marchesetti (Avventizio)

1980 Trifolium phleoides Pourr.
1825 Savi – 1828 Gussone – 1830 Tenore
— β Audigieri Fouc.
1900 Audigier in Foucaud

1981 Trifolium ligusticum Balb.
1723 Micheli in Tilli – 1810 Savi – 1818 Balbis.

35/0018-143

1982 Trifolium lappaceum L.
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1807 Bivona-Bernardi – 1818 Sebastiani e Mauri.

1983 Trifolium congestum Guss.
1821 Gussone – 1825 Savi.

1984 Trifolium Cherleri L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1807 Bivona-Bernardi – 1818 Sebastiani e Mauri.

1985 Trifolium hirtum All.
1789 Allioni – 1810 Savi.

1986 Trifolium stellatum L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1804 Bertoloni – 1815 Moretti
1678 Boccone

1987 Trifolium incarnatum L.
1532 Cibo – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari – 1819 Bertoloni – 1822 Pollini.
— β elatius Gib. et Belli
1892 Gibelli e Belli l. c. Coltivato estesamente e talora sporadico.

1988 Trifolium Lagopus Pourr.
1830 Tenore – 1850 Gussone in Bertoloni VIII

1989 Trifolium angustifolium L.
1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni. 1816 Pollini.
— β intermedium (Guss.)
1821 Gussone – 1825 Savi – 1830 Tenore

1989' Trifolium Loiseleuri Rouy
(+1737) Micheli. Cfr. Fiori II. Avvantaggio?

1990 Trifolium obscurum Savi
1723 Micheli in Tilli – 1810 Savi
1878 Arcangeli e 1881 Levier Cfr. Nym. Consp. Suppl. e Arcangeli 1894.

1991 Trifolium leucanthum M. B.
1821 Gussone – 1835 Tenore – 1837 Moris – 1848 Requien in Gren. Godr.

1992 Trifolium squarrosum L.
1826 Presl – 1828 Gussone – 1835 Tenore.
— β majus Rouy
1810 Savi. Cfr. Rouy V p. 115.
— γ dipsaceum (Thuill.)
1826 Presl – 1844 Gussone
— δ marsicum (Ten.)
1830 Tenore

1993 Trifolium maritimum Huds.
1798 Savi – 1806 Balbis – 1807 Bivona-Bernardi – 1847 Zanardini

1994 Trifolium echinatum M. B.
1745 Sabbati 1810 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1830 Tenore

1994¹ Trifolium latinum Sebast.
(T. echinatum × leucanthum?)
1813 Sebastiani

1994² Trifolium alexandrinum L.
E' originario della Turchia ed Asia minore, ed in Italia incontrasi qua e là sporadico.
1878 Tinao, in Lojacono
1882 Marchesetti — 1843 Tommasini in Koch — 1892 Arcangeli

1994³ Trifolium cinctum DC.
Della Dalmazia e Albania.
1882 Marchesetti — avventizio

1995 Trifolium ochroleucum Huds.
1550 Petrell Cibo — (+1711) Cupani — 1785 Allioni — 1805 Re — 1810 Savi.

1996. Trifolium pannonicum Jacq.
1785 Allioni — 1810 Savi — 1850 Panizzi e Molineri in Bertoloni VIII

1997 Trifolium noricum Wulf.
1850. Cernagai, Moretti in Bertoloni VIII.
1906 Gortani.
— β praetutianum (Guss.)
1825 Savi — 1826 Gussoni — 1835 Tenore.

1998 Trifolium pratense L.
1415 Rinio 1550 Petrell Cibo — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1785 Allioni — 1802 Suffren —
— β sativum (Mill.)
Compreso in generale nel tipo dagli autori citati

— γ expansum (W. K.)
1882 Marchesetti.
— δ bracteatum (Schousb.)
1850 c. Kralik. Cfr Rouy V, 121.
1891 Lojacono — 18
— ε nivale (Sieb.)
1844 Cesati — 1869 Visiani e Sauardo — 1873 Strobl — 1896 Burnat.
— ζ parviflorum Bab.
1899 Rouy V.
— η pallidum (W. et K.)
1723 Micheli in Tilli — 1810 Savi — 1828 Gussone
— ϑ diffusum (Ehrh.)
1872 Marsilly — 1882 Arcangeli.

1999 Trifolium medium L
1550 Petrell Cibo — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1806 Balbis — 1822 Pollini

2000 Trifolium alpestre L.
1550 Petrell Cibo — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re — 1806 Sternberg — 1822 Pollini

2001 Trifolium rubens L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier

2002 Trifolium vesiculosum Savi
1678 Boccone 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone — 1830 Tenore
— β multistriatum (Koch)
1843 Tommasini in Koch — 1882 Marchesetti.

35/0018-144

— γ mutabile (Potenschl.)
1828 Gussone — 1830 Tenore — 1850 Tommasini in Bertoloni VIII.

2003 Trifolium spumosum L.
1696 Cupani — 1723 Tilli — 1772 Allioni — 1810 Savi.

2004 Trifolium resupinatum L.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1798 Savi.
— β Clusii (Gren. et Godr.
1855 Huet. Cfr. Nym. 1878 Lojacono.

2005. Trifolium tomentosum L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1810 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

2006. Trifolium fragiferum L.
1550 Cibo — (+1711) Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

2007. Trifolium physodes Stev.
1696 Cupani — 1816 Bivona-Bernardi — 1817 Tineo — 1822 Bertoloni.

2008 Trifolium levigatum Poir.
1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni — 1789 Uoria — 1810 Savi.

2009 Trifolium arnuum Brot.
1872 Marsilly (la sola var. Perreymondi)

2010 Trifolium glomeratum L.
1696 Cupani (1785 Allioni) — 1806 Balbis — 1810 Savi

2009' Trifolium parviflorum Ehrh. Della Serbia, Crimea ecc. Avventizio presso Trieste e in Liguria. 1840 Tommasini. Cfr. Treyn 1877 e Marchesetti 1882 — 1897 Penzig

2011 Trifolium suffocatum L.
1696 Cupani — 1789 Uoria — 1806 Balbis — 1820 Mauri — 1810 Savi
(+1673) Barrelier (ad 1774) Aqua Farella oggi Ca' Farella, Roma)

2012 Trifolium isthmocarpum Brot.
Il tipo è proprio di Spagna e Afr. sett.
— β Jaminianum (Boiss.)
1828 Gussone — 1850 Todaro in Bertoloni VIII — 1855 Huet

2013. Trifolium nigrescens Viv.
1696 Cupani — 1729 Micheli — 1808 Viviani — 1828 Gussone
— β polyanthemum (Ten.)
1729 Micheli. Cfr. Tenore Fl. Nap. V, 151 — 1854 Gussone — 1878 Lojacono

2014. Trifolium Michelianum Savi
1723 Micheli in Tilli — 1798 Savi — 1821 Nona e Balbis.

2015 Trifolium hybridum L.
2 (1850 Tommasini e Passerini in Bertoloni VIII — 1855 Pirona.
1 (1842 Trevisan — 1844 Cesati —
— β elegans (Savi)
1550 Cibo — 1729 Micheli — 1798 Savi —
1805 Re.

2016 Trifolium Bivonae Guss.
1697 Cupani — 1821 Gussone —
1850 Tineo e Todaro in Bertoloni VIII

2017 Trifolium repens L.
1415 Rinio
1583 Cesalpino — 1697 Cupani — 1726 Zannichelli — 1729 Micheli.
— β pallescens (Schreb.)
1817 Contarini. Cfr. Bertol. Miscell bot. XIX (1857) — 1844 Cesati —
1855 Pirona — 1893 Gelmi.

2018 Trifolium Thalii Vill.
1808 Biroli — 1810 Savi — 1826 Gussone — 1893 Gelmi — 1844 Cesati

2019 Trifolium montanum L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1745 Séguier — 1822 Pollini
— β rupestre (Tenore)
1811 Tenore — 1867 Ardoino (var. Baltisianum)

2020 Trifolium alpinum L.
1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1729 Micheli — 1785 Allioni — 1810 Savi

2021 Trifolium filiforme L.
1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni —
1804 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri
1824 Viviani.
— β dubium (Sibth.)
1810 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

2022 Trifolium Sebastiani Savi
1815 Sebastiani in Savi Lett. al Sebast. — 1818 Sebastiani e Mauri —
1877 Freyn — 1878 Lojacono.

2023 Trifolium speciosum W.
1696 Cupani — 1817 Tineo — 1828 Gussone

2024 Trifolium brutium Ten.
1827 Tenore — 1850 Gasparrini, Gussone in Bertoloni VIII.

2025 Trifolium patens Schreb.
1532 Cibo — 1810 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini

2026 Trifolium campestre Schreb
1583 Cesalpino — 1696 Cupani —
1729 Micheli — 1745 Séguier — 1785 Allioni

2027 Trifolium aureum Pollich
1745 Sabbati — 1818 Sebastiani e Mauri
— 1835 Tenore — 1847 Comolli
1551 Aldrovandi II —

35/0018-145

2028 Trifolium badium Schreb.
1810 Savi – 1830 Tenore – 1834 Colla – 1847 Comolli – 1904 Goiran.

2029 Trifolium spadiceum L.
1810 Savi – 1830 Tenore; Orsini.
1853 Rota.

Circinus Medic.

2030 Circinus circinnatus (L.) O.K.
1583 Michiel 1696 Cupani – 1789 Allioni; Ucria – 1798 Savi – 1878 Nyman

Anthyllis (Riv.) L.

2031 Anthyllis tetraphylla L.
2 (1696 Cupani – 1757 Latini – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1819 Bertoloni
1 (1550 Cibo.

2032 Anthyllis vulneraria L.
1532 Cibo – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.
— β polyphylla Ser.
1882 Arcangeli – 1904 Goiran
— γ vulgaris Koch
1901 Fiori – 1904 Goiran – 1906 Gortani
— ε alpestris (Kit.)
1745 Séguier (f. baldensis) – 1822 Pollini – 1904 Goiran – 1853 Rota – 1893 Gelmi.
— ζ pyrenaica Rouy
1901 Fiori
— η macrophylla Rouy
1891 Lojacono – 1897 Rouy IV.
— ϑ hispida (Boiss. et Reut.)
1850 c. Kralik. Cfr. Rouy IV
— ι australis Rouy
1897 Rouy IV
— κ vulnerarioides (Bonj.)
1785 Allioni – 1847 Bonjean in Bertoloni VII.

2033 Anthyllis montana L.
(+1673) Barrelier, d. 1714 – 1745 Sabbati – 1773 Vitman
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1906 Gortani ~~1822 Pollini~~
— β Jacquini (A. Kern.)
1870 Kerner – 1754 Séguier – 1822 Pollini

2034 Anthyllis Barba-Jovis L. R
1532 Cibo – 1551 Al. Durand II – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1867 Ardoino.

2035 Anthyllis Hermanniae L. R
1675 Zanoni – 1785 Allioni – 1824 Viviani – 1826 Gussone
— β cretica (L.)
1850 c. Kralik. Cfr. Rouy IV.

2035' Anthyllis cytisoides L.
1824 Viviani. Forse fu soltanto avventizia ed ora è scomparsa.

Dorycnopsis Boiss.

2036. Dorycnopsis Gerardi (L.) Boiss.
1824 Viviani – 1837 Moris – 1848 Grenier e Godron I.

Dorycnium (Tourn.) Scop.

2037 Dorycnium pentaphyllum Scop.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1785 Allioni – 1798 Savi.
– β gracile Jord.
1867 Ardoino.
– γ suffruticosum (Vill.)
1676 Bauhin 1785 Allioni – 1844 De Notaris – 1828 Biasoletto Cf. Freyn 1877
1867 Ardoino – 1855 Pirona
– δ germanicum (Gremli) Rouy
1885 Gremli Exc. Cf. H. Schw. – 1901 Rikli ♀
2038 Dorycnium rectum (L.) Ser.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Moris – 1867 Ardoino.

2039 Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Moris – 1828 Biasoletto. Cf. Freyn 1877.
– β sericeum (Lois.)
1861 Bourgeau. Cf. Burnat II. 1843 Koch
– γ glabrum Sonn.
1901 Sommier in Bull. soc. bot. ital.

Lotus (Tourn.) L.

2040 Lotus corniculatus L.
1696 Cupani – 1806 Balbis – 1827 Moris – 1828 Gussone – 1892 Sommier. Cf. Baroni (suppl. H. Tosc.

2041 Lotus angustissimus L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1828 Gussone – 1837 Moris – 1850 Mayer, Sommier ecc in Bertoloni VIII
– β hispidus (Desf.)
1818 Sebastiani e Mauri – 1819 Bertoloni – 1828 Gussone – 1835 Tenore.

2042 Lotus parviflorus Desf.
1807 Bivona-Bernardi – 1828 Gussone – 1837 Moris.

2043 Lotus corniculatus L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1802 Mazzanti, Soffredi
– β alpinus (Schleich.)
1850 Bourgeau e De Notaris in Bertoloni VIII – 1906 Gorodn.
– δ pedunculatus (Cav.)
1899 Rouy V.
– δ decumbens (Poir.)
1789 Moris – 1828 Gussone
– ε tenuifolius L.
1532 Cibo + 1828 Gussone – 1837 Moris – (1822 Pollini)
– ζ uliginosus (Schk.)
1785 Allioni – 1819 Bertoloni – 1847 Connolli.

2044 Lotus creticus L.
1789 Moris – 1826 Viviani – 1827 Moris – 1828 Gussone.

♀ in Engl. Bot. Jahrbücher.

35/0018-146

— β cytisoides (L.)
1696 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Presl — 1827 Moris

2045 Lotus ornithopodioides L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1819 Bertoloni — (1818 Sebastiani e Mauri)

2046. Lotus pusillus Med.
1824 Viviani — 1826 Gussone — 1830 Tenore.

2047 Lotus edulis L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1867 Ardoino.

2048 Lotus conjugatus L.
1697 Cupani — 1828 Gussone — 1853 Grech-Delicata.
— β Requieni (Mauri)
1832 Mauri in Tenore — 1837 Sanguinetti.

2049 Lotus Tetragonolobus L.
(1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — ~~1806 Bivona-Bernardi~~ — 1818 Sebastiani e Mauri — 1853 Grech-Delicata — 1640 Castelli
— β Bivoneus Guss.
1806 Bivona-Bernardi — 1844 Gussone — 1697 Cupani)

2050 Lotus biflorus Desr.
1696 Cupani — 1806 Bivona-Bernardi — 1828 Gussone — 1853 Grech-Delicata.

2051 Lotus siliquosus L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re. (1551 Alfirardi II)

Biserrula L.

2052 Biserrula Pelecinus L.
1785 Allioni — 1696 Cupani — 1807 Bivona-Bernardi — 1818 Sebastiani e Mauri.
~~1553~~ Michiel — 1553

Astragalus (Tourn.) L.

2053 Astragalus Epiglottis L.
1696 Cupani — 1772 Allioni — 1828 Gussone — 1830 Tenore.

2053' Astragalus contortoplicatus L.
Nativo di Russia e Ungheria. Avventizio in Sicilia 1826 Jan

2054. Astragalus Pentaglottis L.
1696 Cupani — 1828 Gussone — 1846 De Notaris.

2055. Astragalus sesameus L.
1606 Colonne — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1828 Gussone.

2056 Astragalus baeticus L.
1674 Bocone — 1696 Cupani — 1742 Zanoni — Monti — 1789 Ucria.

2057 Astragalus tuberculosus DC.
1827 Moris — 1834 Colla — 1850 Bertoloni.

2057' Astragalus maritimus Moris
1837 Moris (Specie da riconfermarsi)

2058 Astragalus hamosus L.
1565 Matthioli – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

2058' Astragalus uncinatus Bert.
1850 Giuli e Soleirol in Bertoloni VIII.

2059 Astragalus depressus L.
1707 Martini – 1785 Allioni – 1830 Ortini – 1834 Colla.
– β leucophaeus (Sm.)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1822 Presl; Bertoloni.

2060 Astragalus caprinus L.
1696 Cupani – 1826 Jan – 1828 Gussone.

2061 Astragalus exscápus L.
1787 Scopoli – 1801 Balbis – 1808 Biroli – 1879 Ball.

2062 Astragalus glycyphyllos L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2063 Astragalus frigidus (L.) A. Gr.
1804 Balbis – 1834 Colla – 1850 Moretti, Rainer, Montini in Bertoloni VIII.

2064 Astragalus penduliflorus Lam.
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini.

2065. Astragalus australis (L.) Lam.
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – (1805 Re) – 1788 Wulfen in Jacquin Coll. II – 1797 Host
– β Gerardi (Vill.)
1850 Bonjean in Bertoloni VIII – 1882 Arcangeli – Cfr Rouy V.

2066 Astragalus alpinus L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1853 Rota

2067 Astragalus montanus L.
1707 Martini – 1713 Tita – 1723 Micheli in Tilli – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.
– β lapponicus (Wahlb.)
1850 Bonjean, Moretti, Rainer in Bertoloni VIII
– γ Parvopassuae (Parl.)
1850 Parlatore, Viaggio al M. Bianco.
– δ pyrenaicus (Gr. Godr.)
1900 Fiori – 1882 Arcangeli.

2068 Astragalus pilosus L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1830 Tenore – 1847 Comolli – 1879 Ball

2069 Astragalus foetidus Vill.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli 1879 Ball.

35/0018-147

2070 Astragalus campester L.
1785 Allioni – 1826 Gussone – 1830 Tenore – 1847 Comolli.

2071 Astragalus uralensis L.
Il tipo credesi proprio degli Urali
— β Halleri (Bunge)
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1847 Comolli – 1850 Rainer e Heufler in Bertoloni VIII
— γ sericeus (DC.)
1832 Sieber in Rchb. Fl. exc. p. 508

2072 Astragalus Hypoglottis L.
1789 Allioni – 1805 Re – 1850 Bonjean in Bertoloni VIII
— β Gremlii (Burnat)
1896 Burnat II – 1844 De Notaris
1883 Forsyth Major. Cfr.
— γ purpureus (Lam.)
~~1818 Baltis~~ – 1819 Bertoloni – ~~1821~~
~~Noaes Baltis~~. 1844 Lisa. Cfr. Burnat II – 1867 Ardoino.

2073 Astragalus Cicer L.
1565 Matthioli – 1585 Durante – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

2074 Astragalus odoratus Lam.
1894 Levier in Arcangeli II ediz. – 1900 Fiori – Forse avventizio

1553 Michiel

2075 Astragalus austriacus L.
1826 Jan – (+1860) Huguenin. Cfr. Rouy V – 1879 Ball.

2076 Astragalus monspessulanus L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1805 Re – 1851 Zacchini, Angelis, Perini in Hausmann I – 1904 Goiran.
— β illyricus (Bernh.)
1850 Tommasini in Bertoloni VIII
1878 Smith.

2077 Astragalus Muelleri Steud. et Hochst.
1829 Bertoloni ap. Visiani in Flora
1843 Koch – 1842 Puccinelli.

2078 Astragalus Onobrychis L.
1595 Pona – 1745 Séguier; Sabbati
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1864 Saccardo

2079 Astragalus leontinus Wulf.
1847 Comolli – 1850 Montini in Bertoloni VIII – 1879 Ball.

2080 Astragalus vesicarius L.
1785 Allioni – 1816 Pollini – 1805 Re – 1830 Tenore – 1879 Ball.

2081 Astragalus alopecuroides L.
1792 De Saussure – 1810 E. Thomas – 1816 Ph. Thomas – 1882 Caresta in Arcangeli – Cfr. Pampanini in N. Giorn. bot. ital. 1907 p. 340.

2082. Astragalus Tragacantha L.
1551 Aldrovandi II
1828 Gussone – 1834 Sabis-Marschlins.
— β sirinicus (Ten.)
1827 Moris; Tenore.

2083 Astragalus semperoirens Lam. R.
1772 Allioni – 1805 Re – 1828 Gussone.

2084 Astragalus siculus Bivona
1789 Ucria – 1809 Bivona-Bernardi Giorn. di Palermo n. 4 – 1810 Rafinesque – 1825 Gussone.
— β nebrodensis (Guss.)
1842 Gussone

2084' Astragalus calabrus (Ten.) Fisch.
1811 Tenore – (+1877) Parlatore in Herb. Patav. – 1907 Fiori.

Glycyrrhiza (Tourn.) L.
2085 Glycyrrhiza glabra L.
2 (1631 Donat. – 1696 Cupani –
1 (1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino

2086 Glycyrrhiza echinata L.
1553 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1820 Tenore.

Psoralea L.

2087 Psoralea bituminosa L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.

2088 Psoralea americana L.
Il tipo è proprio delle isole Canarie e Madera.
— β polystachya (Poir.)
1850 Gussone in Bertoloni VIII

Amorpha L.
2089 Amorpha fruticosa L.
Nativa della Carolina, coltivata fino dal settecento ed ora qua e là largamente naturalizzata,
1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1807 L. Arduino – 1869 Savardo e Visiani – 1898 Botzon – 1906 Gortani.

Galéga (Tourn.) L.
2090 Galega officinalis L.
Q. 1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.
(+1320) Crescenzio, edit. 1471.

Wistaria Nutt. (1818) (*)
2091 Wistaria floribunda (W.) DC.
Originaria della Cina e della Mongolia; introdotta di recente e già largamente diffusa e talora subspontanea.
1842 de Visiani – 1845 Tenore – 1904 Goiran – 1906 Gortani.

(*) Il nome Kraunhia Raf. (1808) quantunque anteriore non fu dalla Commissione del congresso di Vienna (1905) ritenuto preferibile all'usitatissimo nome Wistaria.

35/0018-148

Robinia L.

2092 Robinia Pseudacacia L.
Oriunda dell'America settentrionale, introdotta fra noi dopo la metà del seicento e già diffusa e subspontanea in quasi tutta Italia.
1662 Dalle Torre (Acacia Rubini) — 1713 Tita — 1723 Tilli — 1780 Farsetti.

— β umbraculifera DC.
Coltivata solo dall'ottocento.
1815 Biroli — 1818 de Spigno — 1821 Capelli — 1836 Brignoli

2092' Robinia hispida L.
Nativa della Carolina, coltivata qua e là fino dalla fine del settecento.
1794 Gilii. Cfr. Lais in Atti Acc. pont. N. Linc. 1879 — 1801 Bonato — 1806 Zuccagni — 1812 Pollini; Spigno — 1817 Giani.

Colutea (Tourn.) L.

2093 Colutea arborescens L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.

Scorpiurus L.

2094 Scorpiurus muricatus L.
1785 Allioni — 1830 Gussone — 1834 Colla — 1837 Moris
1551 Aldrovandi II.

— β sulcatus (L.)
1837 Moris

— γ acutifolius (Viv.)
1824 Viviani — 1834 Salis — Marschlins

— δ subvillosus (L.)
1565 Michiel
1785 Allioni — 1789 Ucria — 1804 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri. 1853 Grech — Delicata

2095 Scorpiurus vermiculatus L.
1785 Allioni — 1798 Savi — 1821 Nocca e Balbis — 1837 Moris — 1853 Grech Delicata.

Ornithopus L.

2096 Ornithopus exstipulatus Thore
1806 Balbis — 1808 Viviani — 1819 Bertoloni — 1828 Gussone.

2097 Ornithopus compressus L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1808 Biroli — 1828 Gussone.
1678 Boccone

2098 Ornithopus perpusillus L.
1773 Vitman — 1818 Savi — 1821 Nocca e Balbis — 1847 Comolli — 1860 Caruel

Coronilla (Tourn.) L.

2099 Coronilla scorpioides (L.) Koch
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1595 Pona — 1785 Allioni — 1821 Nocca e Balbis.

— β repanda (Poir.)
1802 Viviani — 1830 Tenore — 1844 Gussone.

2100. Coronilla cretica L.
1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Biasoletto. Cfr. Treyn 1877 — 1830 Tenore — 1887 Rigo Cfr. Goiran 1904 —

2101. Coronilla varia L.
1550 Petrolli Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.

2102. Coronilla coronata L.
1713 Tilà — 1726 Zannichelli — 1802 Suffren — 1822 Pollini — 1878 Smith —

2103. Coronilla minima L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1565 Mattioli — 1595 Pona — 1804 Savi — 1822 Pollini.
— β vaginalis Lam.
1651 Bauhin-Cherler (Polygalon Cortusi) — 1707 Martini — 1904 Goiran.
(1825 Savi — 1830 Tenore)

2104. Coronilla juncea L.
1785 Allioni — 1826 Gussone — 1834 Colla — 1867 Ardoino.

2105 Coronilla valentina L.
1789 Ucria — 1823 Fiorini-Mazzanti — 1844 Risso — 1867 Ardoino.
1828 Gussone —

— β glauca (L.)
1789 Ucria — ~~1785 Allioni~~ — 1806 Bivona-Bernardi — 1828 Gussone — 1844 De Notaris —

2106 Coronilla Emerus L.
1550 Petrolli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1696 Cupani — 1785 Allioni —
— β emeroides (Boiss. et Spr.)
1875 Heimerl in Verh. Zool. bot. Gesell. Wien — 1886 Borbas, in Oest. bot. Zeitschr. — 1891 Paolucci, Fl. March. — 1896 Marchesetti

Hippocrépis L.
2107 Hippocrepis comosa L.
1550 Petrolli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1566 Calzolari — 1606 Colonna — 1785 Allioni — 1802 Mazzari; Suffren.
— β glauca (Ten.)
1789 Ucria — 1820 Tenore — 1828 Gussone

2108 Hippocrepis multisiliquosa L.
1815 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone
— β ciliata (W.)
1785 Allioni — 1789 Ucria — 1820 Tenore — 1828 Fiorini-Mazzanti —
(1606 Colonna)

2109 Hippocrepis unisiliquosa L.
(1606 Colonna) — 1532 Cibo — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1776 Bartolini.

35/0018-149

Bonaveria Scop.

2110. Bonaveria Securidaca (L.) Desv.
1551 Cibo – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1815 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

Hedysarum (Tourn.) L.

2111 Hedysarum obscurum L.
1713 Tilli – 1726 Zannichelli (1) Esp. Securidaca Scadicea. 1785 Allioni – 1822 Pollini Zanbeccheri ni
– β exaltatum (Kern.)
1904 Rigo in Goiran – 1906 Porta in Goiran.

2112 Hedysarum spinosissimum L.
Il tipo è proprio della Spagna.
– β pallens (Rouy)
1696 Cupani – 1828 Gussone.
– γ capitatum (Desf.)
1813 Bobbi, Cat. stirp. Horti Taur. – 1830 Tenore.

2113 Hedysarum coronarium L.
1592 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1787 Moris. Qua e là soltanto avventizio in le gente alla fuggente coltivazione

(1) Correggo un mio errore occorso nella interpretazione della nomenclatura data dal Tilli a pag. 1726 dalle Zannichelli nel Corso Itinera alle Vette di Feltre, riferendo l'Astrag. semina Trifolii a maricae alli Astragalo montanos, mentre, anche dall'icongr. ms. di Zannich. risulta l'Hedysarum obscurum. Invece pel Astr. montanus ex ra pel depictus, spetta l'Astr. incanus saxatilis... dei Dalla Torre. Cfr. Sacc. e Traverso, La Flora delle Vette di Feltre. Venezia 1905, p. 15, 24, 60 e 61.

Onobrychis (Tourn.) Adans.

2114 Onobrychis viciifolia Scop.
1592 Cibo – 1595 Pona – 1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1802 Nazari e Soffren.
– β montana (DC.) 1844 Casali
1830 Ortini – 1855 Tenore – 1869 Savastano; Visiani – 1904 Goiran.
– γ Gaudiniana (Jord.)
1844 Casali – 1885 Gremli Fl. an. del Sulle.
– δ Tommasinii (Jord.)
1843 Tommasini in Koch – 1851 Jordan in Cat. dei pl. del Jardin Grenoble.
– 1855 Pirona.
– ε alba (Desf.)
1830 Ortini; Tenore – 1857 Sanguinetti
– ζ echinata (Dietr.)
1826 Gussone – 1830 Tenore.
– η supina (DC.)
1861 Bourgeau. Cfr. Burnat 1896 – 1867 Ardoino.

2115. Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
1757 Allioni – 1834 Colla – 1844 Ris. 1852 Passerini

2116 Onobrychis aequidentata (S. et S.) d'Urv.
1828 Gussone – 1830 Tenore

2111) Onobrychis Caput-galli (L.) Lam.
1685 Triumfetti – 1696 Cupani – 1745 Sebast. 1789 Allioni; Moris – 1798 Savi

2117' Onobrychis Crista-galli (L.) Lam.
Dell'Asia occid. e Africa boreale. Coltivata talora nei giardini fino dalla fine del Settecento, p. e. 1793 Zuccagni – 1801 Bonato e solo forse avventizia nel Rizzardo 1789 Allioni – 1842 Bertoloni, Mix. bot. II – 1850 Molineri in Bertoloni VIII

2117² Onobrychis Caliortachya Boiss.
Nativa dell'arcipelago greco. Avventizia presso Genova.
1886 Baglietto – 1897 Penzig

Árachis L.

2118 Arachis hypogaea L.
Oriunda del Brasile, introdotta presso di noi e coltivata solo dall'ultimo quarto del Settecento.
1772 Allioni – 1798 Farsetti – 1793 Zuccagni – 1807 L. arduino – 1822 Pollini – 1904 Goivan

Cicer (Tourn.) L.

2119 Cicer arietinum L. R
Probabilmente di origine asiatica, coltivato comunemente fino dall'era romana.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

Pisum (Tourn.) L.

2120 Pisum sativum L. R
Di origine probabilmente persiana o caucasica, coltivato fino dall'epoca romana
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1562 Mattioli.
— β arvense (L.)
1561 Anguillara – 1844 Cesati – 1906 Gortani.
— γ elatius (M. B.)
1810 Rafinesque – 1532 Cibo – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl.

Láthyrus (Tourn.) L.

2121. Lathyrus Áphaca L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino.

2122 Lathyrus Nissolia
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1797 Wulfen in Host 1802 Suffren – 1855 Pirona

2123 Lathyrus Ochrus (L.) DC.
1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli (Araco nero) – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

2124 Lathyrus articulatus L.
1806 Bertoloni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1828 Gussone.
— β ligusticus Burnat
1879 Burnat. Cfr. Burnat II.
— γ Clýmenum (L.)
1789 Ucria – 1830 Tenore.

2125 Lathyrus amphicarpus L.
2 (1726 Zannichelli — 1806 Balbis
1828 Gussone.
1 (1551 Aldrovandi.

2126 Lathyrus Cicera L. R
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino
— 1697 Cupani — 1759 allioni —
1798 Savi — 1831 Romano.
— β lativus (L.) R
1572 Cibo — 1561 Anguillara — 1583
Cesalpino — 1785 allioni — 1798 Savi —
— γ Gorgoni (Parl.)
1838 Parlatore, Giorn. litt. arti Sicil.
vol. 62 — 1844 Gussone

2127 Lathyrus Linifolius L.
1837 Moris — 1844 Risso.
Avventizio? Spagna. Delle Spagne merid.

2128 Lathyrus odoratus L.
1696 Cupani — 1787 Moris — 1826
Gussone — Anche coltivato e spesso
avventizio

2129 Lathyrus hirsutus L
1785 allioni — 1798 Savi — 1802 Sch-
reb — 1805 Re — 1892 Pollini.

2129' Lathyrus exaltatus (Ven. et Gall.)
C.P.G.
1830 Tenore. Esp. Tenore 1842 Syll. V.

2130 Lathyrus silvester L
1550 Cibo — 1696 Cupani — 1713 Vita
— 1785 allioni
— β (sativus (L.)
1550 Cibo — 1583 Cesalpino — 1665 Matthi-
oli — 1695 Pona — 1726 Zannichelli
— γ membranaceus (Bert)
1804 Bertoloni — 1822 Presl — 1826
Badaro in Moretti — 1828 Gussone
— δ heterophyllus (L.)
1550 Cibo — 1677 Moris — 1785 allioni

2131 Lathyrus grandiflorus S. et S.
1697 Cupani — 1825 Tenore, Ind. sem.
Hort. Neap. — 1828 Gussone.

2132 Lathyrus tuberosus L. R
1565 Mattioli (apros falso) — 1606
Clusius — 1785 allioni — 1808 Savi —
1822 Pollini.

2133 Lathyrus Hazaticus (Vent.) Vis.
1826 Gussone — 1850 Tenore —
1854 Colla.

2134 Lathyrus setifolius L.
2 (1696 Cupani — 1757 allioni — 1815
Savi — 1822 Pollini
1 (1691 Rivinus (Lath. Monty Baldi)
— β heterocarpus Lorr. et Barr.
1904 Goiran — 1899 Rouy V.

2135 Lathyrus angulatus L.
1806 Balbis – 1835 Tenore – 1837 Moris
1844 Cesati – 1852 Rota.

2136 Lathyrus sphaericus Retz
1745 Séguier – 1785 Allioni –
1805 Re – 1818 Sebastiani e
Mauri – 1822 Pollini.

2137 Lathyrus inconspicuus L.
1847 Tommasini in Bertoloni VII
– 1853 Rota.
— β erectus (Lag.)
1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr
Freyn 1877.

2138 Lathyrus pratensis L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi –
1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
1785 Allioni – 1789 Ucria

2139 Lathyrus palustris L.
1785 Allioni – 1808 Savi – 1822
Pollini – 1842 Trevisan.

2139' Lathyrus maritimus (L.) Bi
È proprio dell'Europa boreale;
ma fu trovato avventizio in Istria
1843 Biasoletto in Koch.

2140. Lathyrus inermis Roch.
1830 Thomas in Tenore – 1878 Nyman.

2141 Lathyrus digitatus (M. B.) Fiori
1830 ~~Tenore~~ Rosano e Thomas in Tenore

2142 Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay.
1806 Balbis – 1822 Pollini – 1847
Moris e Passerini in Bertoloni VII

2143 Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke ~~Garcke~~
1550 Cibo – 1808 Biroli – 1830
Tenore – 1847 Molineri in Bertoloni VII
— β varius (Hill)
1551 Aldrovandi – 1754 Séguier –
1806 Balbis – 1651 Bauhin et Cherler
1847 Bertoloni.

2144 Lathyrus Linnaei Rouy
1726 Zannichelli
1785 Allioni – 1847 Monti, Parolini in Bertoloni VII – 1906 Gortani
— β occidentalis (F. et M.)
1896 Marchesetti – 1906 Gortani.

2145 Lathyrus niger (L.) Bernh.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1745
Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren
1808 Biroli.

2146 Lathyrus Jordani (Ten.) C. P. G.
1830 Tenore – 1847 Gasparrini e
Giordano in Bertoloni VII

2147 Lathyrus montanus Bernh.
1785 Allioni – 1805 Re – 1810 Bertoloni
– 1822 Pollini.

35/0018-151

— β tenuifolius (Roth)
1810 Bertoloni — 1822 Pollini

2148 Lathyrus vernus (L.) Bernh.
1550 Petrell Cibo — 1551 Aldrovandi 1565 Michael — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni
— β flaccidus (Kit.)
1854 Nyman — 1891 Hallier — Wohlfarth — 1905 Minio, Erbor. bac. Natis.
— γ gracilis (Gaud.)
1847 Lagger e Montini in Bertoloni VII — 1847 Comolli — 1855 Pirona

2149 Lathyrus venetus (Mill.) H. et W.
1563 Cesalpino — 1592 Colonna — 1595 Pona — 1745 Sabbati — 1820 Tenore

Vicia (Tourn.) L.

2150 Vicia oroboides Wulf.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1822 Pollini — 1847 Zanardini in Bertoloni VII.

2151 Vicia faba L. R
Probabilmente d'origine orientale, ma coltivata dall'epoca romana.
1415 Rinio 1551 Aldrovandi — 1554 Matthioli — 1561 Anguillara.

2152 Vicia narbonensis L.
1550 Petrell Cibo — 1565 Matthioli — 1696 Cupani — 1785 Allioni.

— β serratifolia (Jacq.)
1821 Nocca e Balbis — 1828 Gussone — 1834 Colla.

2153 Vicia sepium L.
1554 Matthioli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Saffren.

2154 Vicia pannonica Crantz
1834 Colla — 1847 Tommasini in Bertoloni VII.
— β striata (M. B.)
1696 Cupani — 1807 Bivona — Bernardi — 1818 Balbis — 1828 Gussone — 1847 Montini in Bertoloni VII

2155 Vicia hybrida L.
1532 Cibo — 1651 Bauhin e Cherler — 1785 Allioni — 1798 Savi.
— β spuria (Rafin.)
1697 Cupani — 1810 Rafinesque — 1828 Gussone

2156 Vicia melanops S. et Sm.
1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone — 1830 Tenore.

2157 Vicia lutea L.
1550 Petrell Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1798 Savi.

— β hirta (Baltis)
1806 Baltis — 1815 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1828 Gussone.

2158 Vicia grandiflora Scop.
1772 Krapf in Scopoli II — 1802 Suffren — 1810 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri.
— β Barbazitae (Ten. et Guss.)
1842 Tenore e Gussone — ~~1828~~ ~~Gussone~~ 1847 Bertoloni — 1856 Huet. Cfr. Nym. Consp.

2159 Vicia peregrina L.
1796 Ucria — 1785 Allioni — 1810 Rafinesque — 1818 Sebastiani e Mauri.

2160 Vicia sativa L. R
1532 Cibo — 1551 al Brandi 1583 Cesalpino — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1802 Suffren.
— β macrocarpa Moris
1551 al Brandi II 1696 Cupani — 1827 Moris — 1828 Gussone
— γ nemoralis Pers.
1900 Fiori — 1904 Goiran — 1906 Gortani.
— δ linearis Lge
1844 Gussone — 1879 Caldesi.
— ε Cosentini (Guss.)
1828 Gussone — 1835 Tenore
— ζ pimpinelloides (Mauri)
1820 Mauri — 1847 Barbieri in Bertoloni VII
— η maculata (Presl)
1826 Presl — 1828 Gussone
— ϑ cordata (Wulf.)
1761 Wulfen. Cfr. Wulfen 1858.
1855 Pirona — 1877 Freyn.
— ι heterophylla (Presl)
1822 Presl — 1828 Gussone.
— κ cuneata (Guss.)
1828 Gussone — 1853 Grech-Delicata
— λ segetalis (Thuill.)
1835 Tenore — 1842 Trevisan
— μ angustifolia (L.)
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri
— ν Sallei (Timb.)
1896 Burnat II
— ξ amphicarpa (Dorthes)
1867 Ardoino — 1887 Groves — 1896 Burnat.

2161 Vicia lathyroides L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Savi — 1828 Biasoletto in Freyn 1877.

2162 Vicia sicula (Raf.) Guss.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1810 Rafinesque — 1822 Presl
2162' Vicia Sequenzae Huet
(V. sicula × peregrina?)
1856 Huet. Cfr. Nyman Consp.

2163 Vicia bithynica L.
1551 Alpinus – 1757 Allioni – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

2164 Vicia onobrychioides L.
1785 Allioni – 1797 Allioni – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1830 Tenore.

2165 Vicia althaeoides Desf.
1828 Gussone – 1830 Tenore.

2166 Vicia dumetorum L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1815 Savi – 1821 Nocca e Balbis

2167 Vicia pisiformis L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1821 Nocca e Balbis – 1802 Morgan – 1821 Nocca e Balbis.

2168 Vicia sylvatica L.
1785 Allioni – 1798 Savi – 1808 Biroli – 1852 De Notaris in Rota – 1860 Carnel.

2169 Vicia glauca Pers.
1822 Pers. – 1828 Gussone – 1837 Moris.

2170 Vicia argentea Lap.
1889 Huter, Porta, Rigo in Nyman Consp. Suppl.

2171 Vicia gracilis Ten.
1835 Tenore – 1877 Coemans e Cugini – 1888 Matteri. Cfr. Barone Suppl. Fl. Tosc.

2172 Vicia cassubica L.
1551 Alpinus – 1697 Cupani – 1818 Sebastiani e Mauri.
– β adriatica Freyn.
1877 Freyn
– γ multiflora (Pollich)
1820 Mauri – 1830 Tenore.

2173 Vicia orobaeoides Ten.
1811 Tenore – 1826 Jan – 1828 Gussone.

2174 Vicia Cracca L.
1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1726 Zannichelli – 1802 Morgan; Suffren.
– β incana (Vill.)
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1822 Pollini – 1906 Gorran.
– γ aetnensis Guss.
1828 Gussone – 1835 Tenore.
– δ consentina (Spr.)
1830 Tenore.
– ε tenuifolia (Roth)
1563 Cesalpino – 1818 Ruchinger – 1842 Trevisan – 1844 Cesati.
– ζ elegans (Gmel.)
1696 Cupani – 1828 Gussone

2175 Vicia atropurpurea Desf.
1818 Sebastiani e Mauri – 1828 Guss. – 1829 Moris.
— β perennis DC.
1899 Rony e ~~Foucaud~~ V.

2176 Vicia villosa Roth.
1822 Tobler – 1853 Gennari – 1889 Bicknell. Cf. Burnat 1896 – 1877 Freyn – 1904 Gorran.
— β dalycarpa (Ten.)
1563 Cesalpino – 1697 Cupani – 1818 Sebastiani e Mauri – 1831 Tenore – 1828 Gussone – 1844 Cesati.
— γ amphigena (Guss.)
1828 Gussone.
— δ microphylla (d'Urville)
1855 Huet. Cf. Nym. Consp.
— ε Rosani (Tenore)
1830 Tenore
— ζ litoralis (Salzm.)
1830 Tenore – 1867 Soleirol in Berto. Ten. VII.
— η Pseudocracca (Bertol.)
1563 Cesalpino – 1818 Bertoloni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Jan – 1828 Gussone

2177 Vicia monantha Retz.
1828 Gussone – 1830 Tenore – 1837 Moris

— β pauciflora (Gennari)
1870 Gennari.

2178 Vicia multifida Walbr.
1550 Tabernaemontanus Cibo – 1785 Allioni – 1815 Savi – 1837 Moris

2179 Vicia leucantha Biv.
1813 Bivona – Bernardi – 1814 Raffeneau – 1826 Gussone.

2180 Vicia tetrasperma (L.) Moench
1695 Cupani – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1798 Savi – 1805 Re.
— β remotiflora (Girard)
1899 Rony V.
— γ gracilis (Loisl.)
1811 Tenore – 1828 Gussone – 1837 Moris
— δ pubescens (DC.)
1828 Gussone – 1834 Sabis – Marschling – 1835 Tenore

2181 Vicia hirsuta (L.) Gray
1551 Alpinus II
1696 Cupani – 1745 Seguier – 1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri –
— β sardoa (Moris, 1827)
(= Ervum Terronii Ten. Syll. Add. V 1842)
1827 Moris – 1830 Tenore – 1867 Bertoloni

124

2182 Vicia disperma DC.
1550 Petr Cibo – 1819 Bertoloni – 1837 Moris.
— β cortica (Gr. Godr.)
1848 Bernard in Grenier e Godron I – 1900 A. Vacari in Fiori.

2183 Vicia Ervilia (L.) W. R
Di patria incerta, ma nota e coltivata fino dall'era romana.
1550 Petr Cibo – 1561 Anguillara – 1571 Mattioli – 1585 Durante – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini.

2184 Vicia Lens (L.) C. et G. R
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante
— β lentoides (Tenore)
1811 Tenore.
— γ Marschalii (Arcang.)
1828 Gussone – 1837 Moris – 1904 Goiran.

2185 Vicia Lenticula (Schreb.) Arc.
1810 Brignoli – 1819 Bertoloni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1828 Gussone

Apios (Boerh.) Moench
2186 Apios tuberosa Moench
Nativo dell'America Settentrionale, introdotto e coltivato fino dal seicento. ♀
1642 Veslingio – 1701 Martini in herb. Patav. – 1848 Barbieri – 1869 Saccardo & Visiani.
♀ ed ora largamente naturalizzato.

2187 Phaseolus vulgaris L.

Phaséolus (Tourn.) L.
Originario dell'America merid., importato e coltivato in Europa fino dal cinquecento; quindi ignoto ai romani che conoscevano invece l'affine, asiatico-africana Vigna unguiculata. Cfr. Penzig 1904.
1550 Petrus Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1561 Anguillara – 1642 Veslingio – 1822 Pollini.
— β romanus (Savi)
1822 Savi – Questa e le seguenti varietà furono discriminate dal Savi; ma coltivate anche anteriormente
— γ oblongus (Savi)
1822 Savi.
— δ sphaericus (Savi)
1822 Savi.
— ε tumidus (Savi)
1822 Savi.
— ζ gonospermus (Savi)
1822 Savi.
— η nanus (L.)
1554 Mattioli – 1807 L. Ardaino – 1822 Pollini. – 1801 Bonato –

2188 Phaseolus coccineus L.
Del Messico ed America Sett., coltivato comunemente fino dal seicento.
1642 Veslingio – 1796 Jarsetti – 1801 Bonato.

Vigna Savi
2189 Vigna unguiculata (L.) Walp. R.
D'origine asiatico-africana, coltivata fino dall'epoca romana. Cfr. Penzig 1904.

35/0018-153

1591 Cortuso (Dolicos) — 1772 Allioni — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato

— β sinensis (L.)

1801 Bonato — 1806 Zuccagni

— γ Catiang (L.)

1793 Zuccagni — 1801 Bonato

Dolichos Adans.

2189¹ Dolichos Lablab L.

Dell'Egitto, ma importato e coltivato fino dalla fine del cinquecento.

1592 P. Alpino — 1642 Vestingio — 1760 Allioni — 1796 Farsetti

Soja Moench.

2189² Soja hispida Moench

Nativa del Giappone e Giava, coltivata fino dalla metà del settecento e talora estesamente, come nel Trivigiano.

1701 Martini 1760 Allioni — 1786 Farsetti — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1807 L. Arduino. 1880 Savardo

Fam. 71 Myrtaceae

Eucalyptus L'Hér.

2190 Eucalyptus globulus Labill.

Dell'Australia, è una delle specie del genere introdotte fin di recente fra noi e largamente diffusa dal 1860 in poi. 1845 Tenore.

2191 Eucalyptus robusta Sm.

Nativo d'Australia come il precedente. 1803 Graefer, Syn. pl. regii Virid. Casert. — 1805 G. Durazzo, Cat. pl. jard. Pegli — 1815 Biroli — 1818 Spigno — 1820 Bonato.

2192 Eucalyptus amygdalina Labill.

Nativo d'Australia, come i precedenti. 1842 Padova Visiani. L e n

Oss. Nell'Orto bot. di Padova nel 1820 si coltivano Euc. aromatica e resinifera oltre il robusta; a Torino nel 1815 l'Euc. robusta, resinifera e saligna; nel 1812 dallo Spigno a S. Sebastiano (Piemonte) si coltivano Euc. resinifera e robusta.

Myrtus (Tourn.) L.

2193 Myrtus communis L. R

1415 Rinio 1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli — 1696 Cupani.

— β tarentina L.

1558 Mattioli — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1785 Allioni

Punica (Tourn.) L.

2194 Punica Granatum L. R

Oriundo dell'Africa sett., coltivato fino dall'era romana e talora inselvatichito.

1415 Rinio 1550 Petrus Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara 1585 Durante.

— β albescens DC.

1812 Spigno — 1829 Piccioli

35/0018-154

Fam. 72 Lythraceae

Rótala L

2195 Rotala ploriformis (Bell.) Hiern
1796 Bellardi, Act. Acad. Taur. – 1808 Brocchi – 1816 Nova e Balbis – 182

Ammannia L.

2196 Ammannia verticillata (Ard.) Lam.
1764 Ardoino – 1767 Monti, Comm. Inst. Bonon. I – 1815 Savi – 1826 Pollini
– β aegyptiaca (W)
(+ 1853) de Nelden. Cf. Koehne in N. G. bot. ital. 1884 p. 101.

(1851 Sub. Martinus)

Peplis L.

2197 Peplis Portula L.
1697 Boccone & Cupani – 1785 Allioni 1816 Nova e Balbis
– β borysthenica (Bell.)
1877 Ascherson, Koehne. Cf. Barbey 1884.

2198 Peplis nummulariifolia (Lois.) Jord.
1839 Badaro, P. Candolle, Serafini in Bertoloni IV.

Lythrum L

2199 Lythrum Salicaria L. R
1532 Cibo – 1554 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona

2200 Lythrum virgatum L
~~1835 Nyman Sylloge Boissier~~
~~1860 Trott. – 1884 Cesati~~ –
1821 Nova e Balbis – 1844 Cesati – 1852 Rota – 1854 Nyman

2201 Lythrum Graefferi Ten.
1826 Gussone – 1828 Fiorini-Mazzanti – 1830 Tenore – 1854 Sabi-Marsch. Bing
– β Preslii (Guss.)
1827 Presl – 1826 Gussone.

2202 Cf. Zodda Lythrum Hyssopifolia L.
1745 Segnier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Sassen – 1827 Pollini.
– β Thymifolia (L.)
1827 Moris.

2203 Lythrum tribracteatum Salzm.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1819 Salzm. Cfr. Nyman Consp. – 1900 Fiori II.
– β Candollei Koehne
1826 Gussone – 1862 Barbieri Savi, Moris in Bertoloni V (L. Thymifol.)

2203' Lythrum thesioides M. B.
Originario della Russia merid., Siberia e Caucaso; fuori d'Italia avvenuto nel Mantovano.
1842 Barbieri in Bertoloni V.

Fam. 73 Oenotheraceae

Epilobium L.

2204 Epilobium Dodonaei Vill.
1532 Cibo – 1595 Pona – 1715 Tita – 1745 Séguier – 1785 allioni – β nicaeense Burnat 1899 Barla in Burnat III – γ alpinum Burnat (DC.) 1843 Lisa. Cf. Burnat III – 1893 Gelmi.

2205 Epilobium angustifolium L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1713 Tita – 1726 Zanni Belli – 1822 Pollini.

2206. Epilobium montanum L
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1585 Durandi – 1697 Boccone – 1745 Séguier – 1822 Pollini.
β lanceolatum (Seb. et M.)
1818 Sebastiani e Mauri – 1827 Gussone – 1830 Tenore; Ortini.
γ Duriaei (J. Gay)
1872 Revelière in Marsilly.
δ collinum (C.C. Gmel.) 1745 Séguier – 1822 Pollini – 1893 Gelmi.

2206' Epilobium collinum × parviflorum Schm.
1893 Gelmi.

2206² Epilobium pseudohirsutum Borb.
(E. montanum × hirsutum Burnat)
1893 Gelmi – 1889 Bicknell, in Burnat III.

2207 Epilobium parviflorum Schreb.
1550 Cibo – 1640 Castelli – 1713 Tita – 1718 Pontedera – 1798 Savi.

2207' Epilobium intermedium Rchb.
(E. parviflorum × hirsutum)
1896 Evers.

2207² Epilobium persicinum Rchb.
(E. parviflorum × roseum)
1898 Gelmi – 1902 Chenevard e Favr.

2207³ Epilobium subhirsutum Genn.
1851 Gennari in De Notaris, Linnaea p. 20.

2208 Epilobium hirsutum L. R
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1713 Tita – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

2208' Epilobium collinum × hirsutum Gib. Pirotta
1882 Zibelli e Pirotta.

2208² Epilobium purpureum Fr.
(E. hirsutum × montanum)
1882 Zibelli e Pirotta – 1893 Gelmi.

2208³ Epilobium rebrodense Strobl
(E. hirsutum × Tournefortii)
1884 Strobl in Hausskn., Monogr. der Gatt. Epilobium.

2209 Epilobium palustre L
1713 Tita (?) – 1830 Tenore – 1832 Guss. – 1835 Barbieri, Facchini, Monti in Bertoloni IV.

35/0018-155

2210 Epilobium tetragonum L.
1565 Michiel – 1785 Allioni – 1789 Uoria – 1798 Savi – 1808 Biroli.
— β Lamyi (F. Schultz)
1884 Haussknecht l. c.
— γ Tournefortii (Michal.)
1825 Salzmann. Cfr. Rym. Consp. – 1827 Gussone.
— δ obscurum (Schreb.)
1884 Haussknecht l. c. – 1872 Burnat. Cfr. Burnat III.

2211 Epilobium alpinum L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1906 Gortani
— β alsinifolium (Vill.)
1697 Boccone – 1826 Gussone – 1830 Tenore
— γ nutans (F. W. Schm.)
1884 Haussknecht l. c. – 1906 Gortani.

2211¹ Epilobium salicifolium Facch.
(E. alsinifolium × montanum)
(+ 1855) Facchini in Gelmi 1893.

2211² Epilobium Huteri Borb.
(E. alsinifolium × collinum)
1879 Huter ap. Borbas, Oest. bot. Zeitschrift.
1902 Chenevard

2211³ Epilobium Haynaldianum Hauss.
(E. alsinifolium × palustre Hauss.)
1893 Gelmi – 1882 Burnat. Cfr. Burn. III.

2211⁴ Epilobium gemmiferum Boreau
(E. alsinifolium × gemmascens Hauss.)
1890 Bicknell. Cfr. Burnat III

2212 Epilobium roseum Schreb.
1839 Facchini, Heufler in Bertoloni IV. – 1904 Goiran.

2212¹ Epilobium gemmascens C. A. Mey.
1874 Burnat. Cfr. Burn. III

2212² Epilobium bicolor Haussk.
(E. gemmascens × roseum Hauss.)
1890 Bicknell. Cfr. Burnat III

2213 Epilobium trigonum Schrank.
1697 Boccone – 1718 Pontedera – 1836 Cornolli – 1839 Zanfossi, Facchini in Bertoloni IV

Ludwigia L.

2214 Ludwigia palustris (L.) Ellis
1697 Boccone – 1742 Zanoni Monti – 1785 Allioni – 1822 Pollini –

Oenothera L.

2215 Oenothera rosea Sol.
Nativa delle due Americhe, e coltivata spesso negli orti botanici. p. e 1796 Zuccagni, 1801 Bonato, 1815 Bivoli, ecc., trovasi ora qua e là inselvatichita.
1846 Bicchi e 1886 Cittadella. Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc. — 1898 Zodda in Boll. Nat. Siena.

2216 Oenothera biennis L.
Dell'America sett. introdotta in Europa (e precisamente a Padova) già nel 1612 (Cfr. Alpino 1627); spesso coltivata ed ora abbondantemente naturalizzata.
1651 Colonna in Hernandez Rer. med. Novae Hispan. thes. — 1642 Verlingio (Sysim. virgin.) 1612 Alpino Conf. ed. 1627 — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1822 Pollini.
— β muricata (L.)
1877 Chiamenti, Atti Soc. Ven.-Trent.
1903 Fiori. Cfr. Fiori 1907.
— γ grandiflora (Ait.)
1869 Visiani e Saccardo, p. 277. Subspontanea nell'orto Padovano
2217 Oenothera stricta Led.
Del Cile, coltivata qua e là: 1836 Brignoli — 1842 Visiani ecc.; ora inselvatichita in pochi luoghi.
1865 A. Tassi e 1892 Bolzon. Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc.

Fuchsia (Plum.) L.

2217' Fuchsia coccinea Ait.
Nativa del Cile, coltivata comunemente dal principio dell'ottocento.
1806 Zuccagni — 1812 Bonato.

Circaea (Tourn.) L.

2218 Circaea alpina L.
1666 Colonna — 1666 Ambrosini — 1713 Tila — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren.

2219 Circaea lutetiana L.
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Margari; Suffren.

2219' Circaea intermedia Ehrh.
(C. lutetiana × alpina)
1822 Pollini — 1837 Sandi — 1854 Facchini in Bertoloni X, 516.

Trapa L.

2220 Trapa natans L.
1415 Rinio Petrola 1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1703 Trionfetti Vindic. verit. p. 87. — 1745 Séguier
— β bicornis Mert. et K. (1823)
(= T. verbanensis De Not., 1875)
1875 De Notaris, N. Gior. bot. it. — 1904 Goiran.
— γ muzzanensis Jäggi
1891 Jäggi. Cfr. Hallier-Wohlf. I, 886.

35/0018-156

Fam. 74 Halorrhagidaceae

Myriophyllum L.

2221 Myriophyllum spicatum L.
1720 Pontedera – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1802 Suffren.
— β alterniflorum (DC
1837 Moris – 1839 Moris e De Notaris – 1844 Gussone

2222 Myriophyllum verticillatum L.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1720 Pontedera – 1745 Séguier.
— β pectinatum (DC.)
1820 Tenore – 1842 Trevisan – 1844 Gussone – 1854 Bertoloni

Hippuris L.

2223 Hippuris vulgaris L.
1554 Mattioli – 1745 Séguier – 1772 Maratti – 1785 Allioni – 1822 Pollini.

Fam. 75 Araliaceae

Hédera (Tourn.) L.

2224 Hedera Helix L. R
1415 Rinio – 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante
— β chrysocarpa (Walsh) R
1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1697 Cupani – 1827 Bertoloni; Prael. rei herb.

Fam. 76 Umbelliferae.

Hydrocótyle (Tourn.) L.

2225 Hydrocotyle vulgaris L.
1785 Allioni – 1798 Savi – 1805 Re – 1818 Sebastiani e Mauri – 1822 Pollini

2226 Hydrocotyle ranunculoides L.
1606 Colonna – 1723 Tilli – 1788 Civillo – 1827 Savi – 1837 Sanguinetti

Lagoécia L.

2227 Lagoecia cuminoides L.
3 (1887 Groves – 1888 Profeta in Parlat. Carnel VIII.
2 (1887 Groves e Profeta in C. P. G.
1 (Coltivata ~~anche~~ dal settecento: 1713 Tita – 1801 Boneti, ma spontanea nell'Italia meridionale.

Petagnia Guss.

2228 Petagnia saniculifolia Guss.
1827 Gussone – 1881 C. P. G.

Eryngium (Tourn.) L.

2229 Eryngium maritimum L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1640 Castelli – 1726 Zannichelli.

2230 Eryngium creticum Lam.
1884 Paolucci – 1885 Costa – Reghini. Cfr. Parl. Carnel VIII – 1896 Marchesetti.

2231 Eryngium tricuspidatum L.
1696 Cupani – 1697 Bouone – 1789 Uaria – 1806 Bivona – Bernardi

2233 Eryngium amethystinum L.
1563 Cesalpino – 1718 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2232 Eryngium campestre L.
(+1320 Crescenzio, edit. 1471)
1550 Cibo (Petrollier) – 1554 Mattioli – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante.

2234 Eryngium Barrelieri Boiss.
1696 Cupani – 1827 Gussone; Moris – 1837 Badaró e De Notaris in Bertoloni III.

2235 Eryngium dichotomum Desf.
1696 Cupani – 1742 Zanoni e Monti – 1789 Uaria – 1827 Gussone.

2236 Eryngium triquetrum Vahl
1671 Bouone – 1697 Cupani – 1827 Gussone.

2237 Eryngium planum L.
1702 Martini – 1726 Zannichelli – 1844 Fleischmann Fl. Krains – 1848 Malyx (Tutte 1855 Pirona
queste citazioni sono dubbie

2238 Eryngium Spina-alba Vill.
1867 Ardoino – 1882 Arcangeli – 1896 Bicknell – 1906 Burnat IV.

2239 Eryngium alpinum L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1808 Biroli – 1855 Pirona.

Astrantia (Tourn.) L.

2240 Astrantia major L.
1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1707 Martini – 1745 Séguier.

2241 Astrantia minor L.
1707 Martini – 1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Pollini.

– β carniolica (Wulf.)
1772 Scopoli – 1837 Brignoli in Bertoloni III – 1851 Hausmann – 1855 Pirona

– γ pauciflora Bertol.
1697 Bouone – 1745 Sabbati – 1773 Vitman – 1819 Bertoloni.

Sanicula (Tourn.) L.

2242 Sanicula europaea L.
1415 Pirio – 1550 Cibo (Pelo) – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona

35/0018-157

Hacquetia Neck.

2243 Hacquetia Epipactis (Scop.) DC.
1554 Mattioli — 1772 Scopoli — 1791 Bellardi — 1802 Suffren — 1855 Pirona.

Bupleurum (Tourn.) L.

2244 Bupleurum rotundifolium L. R
1550 Cibo — 1562 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona — 1726 Zannichelli.
— β suboratum (Lk)
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1837 Bertoloni.

2245 Bupleurum stellatum L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1824 Comolli — 1822 Pollini.

2246 Bupleurum rigidum L.
1676 Bocconi — 1811 Vincenzi. Cfr. Bertoloni III — 1882 Arcangeli.

2247 Bupleurum dianthifolium Guss.
1832 Gussone — 1840 Cesati — 1888 Todaro in Parl. Caruel VIII

2248 Bupleurum spinosum Gouan.
1828 Duby — 1872 Marsilly — (+1866) Gussone in herb. Patav.
Ph. Thomas in

2249 Bupleurum fruticosum L.
1550 Cibo — 1561 Anguillara — 1565 Mattioli (Seseli etiop. II) — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli.
— β insulare (Rouy et Carn.)
1850 Kralik. Cfr. Rouy VII.
— γ Lisae Briq.
1845 Lisa in Briquet Monogr. Bupl. 1897.

2250 Bupleurum falcatum L.
1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1837 Molineri in Bertoloni — 1853 Rota.
— β exaltatum (M. B.)
1830 Ortini — 1826 Gussone — 1829 Tenore.
→ qui

2251 Bupleurum graminifolium Vahl
1595 Pona — 1707 Martini — 1745 Séguier — 1789 Allioni — 1791 Bellardi.

2252 Bupleurum ranunculoides Vahl
1697 Boccone — 1707 Martini — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β gramineum (Vill.)
1808 Biroli — 1824 Comolli
1789 Wulfen in Jacq. Coll. III.

2253 Bupleurum elatum Guss.
1827 Gussone
Gasparrini in

2254 Bupleurum Odontites L.
1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren – 1818 Sebastiani e Mauri.
– β veronense (Turra)
1780 Turra – 1816 Pollini – 1826 Gussone – 1829 Tenore.
– γ Fontanesii (Guss.)
1825 Gussone – 1888 Parlat. Carnel VIII.

2255 Bupleurum semicompositum L.
(+1805) Nulfen, ed. 1858 – 1797, Host
1808 Savi – 1829 Tenore – 1855 Pirona
– β glaucum (Rob. et Cast.)
1826 Gussone – 1827 Moris.

2256 Bupleurum tenuissimum L.
1553 Michel 1606 Colonna – 1696 Cupani – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren

2257 Bupleurum Gerardi ~~Jacq.~~ All.
1563 Cesalpino – 1772 Allioni – 1805 Re – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino – 1852 Passerini.
– β virgosum Reichenb.
1827 Gussone – 1818 Richard. Cfr. Briquet + Monogr. Bupl. 1897

2258 Bupleurum junceum L.
II (1816 Pollini – 1829 Tenore –
I (1785 Allioni – 1789 Ucria

Trinia Hoffm.
2259 Trinia glauca (L.) Rchb.
1563 Cesalpino – 1745 Séguier – 1773 Vitman – 1802 Suffren – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini.

Ridolfia Moris
2260 Ridolfia segetum (L.) Moris
1415 Rinio 1789 Ucria – 1827 Moris; Gussone – 1829 Tenore – 1867 Ardoino.

Bunium L.
2261 Bunium flexuosum With.
1834 Salis-Marschlins – 1837 Moreis e Soleirol in Bertoloni III – 1844 De Notaris.
– β capillifolium (Guss.)
1827 Gussone – 1829 Tenore

2262 Bunium cynapioides (Guss.) Bert.
1826 Gussone – 1829 Tenore.

2263 Bunium Bulbocastanum L.
1563 Cesalpino – 1565 Mattiolo – 1585 Durante – 1606 Colonna – 1696 Cupani.

2264 Bunium ferulaceum S. et S.
1837 Cesati in Linnaea – 1843 Biasoletto in Koch – 1882 Arcangeli.
2265 Bunium montanum Koch
1837 Biasoletto in Bertoloni III – 1879 Freyn.

35/0018-158

2266. Bunium alpinum W. et K.
1811 Tenore – 1837 Mauri e Gussone in Bertoloni III.

Carum (Rupp.) L.

2267 Carum Carvi L. R
1558 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona.

2268 Carum carvifolium (DC.) Arc.
1826 Gussone – 1832 Tenore – 1860 Carnel – 1881 C.P.G.

2269 Carum rigidulum (Viv.) Koch
1802 Viviani – 1819 Bertoloni
1851 Simi. 1842 Puccinelli.

2269' Carum verticillatum (L.) Koch
1830 De Candolle Prodr. IV – 1880 C.P.G.
(Località di Corsica da confermare)

Ammi (Tourn.) L.

2270 Ammi majus L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

2271 Ammi Visnaga (L.) Lam.
2 (1571 Mattioli – 1585 Durante
1 (1561 Anguillara – 1563 Cesalpino 1745 Sabbati
1867 Ardoino – 1906 Burnat IV.

2272 Ammi crinitum Guss.
1826 Gussone – 1829 Tenore
1857 Gennari.

Petroselinum Hoffm.

2273 Petroselinum hortense Hoffm. R
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

2274 Petroselinum segetum (L.) Koch
1785 Allioni – 1834 Colla – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino.

2275 Petroselinum ammoides (L.) Rchb.
1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli (Ammi) – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri.

Apium (Tourn.) L.

2276 Apium graveolens L. R
1415 Rinio Petrot 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1606 Colonna.

2277 Apium leptophyllum (Pers.) F. Müll.
2 1804 Savi – 1829 Tenore – 1860 Carnel – 1844 Fleischmann, Flor. Krains – 1897 Penzig

(Nativo dell'America centr. e merid.; fu trovata qua e là avventizia. È probabile che il Seseli Ammi, ~~[illegible]~~ che si coltivava comunemente negli orti botanici nostri nel principio dell'ottocento, corrispondesse a questa specie (come lo riteneva il Savi); ciò spiegherebbe forse come esso potè trovarsi avventizio qua e là in Italia.

2278 Apium nodiflorum (L.) Rchb. f.
1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1816 Nova e Balbis — 1820 Moricand.

2279 Apium inundatum (L.) Rchb. f.
1785 Allioni — 1808 Savi — 1860 Caruel
1773 Vitman

— β crassipes (Rchb. fil.)
1834 Salis-Marschlins — 1840 Moris — 1872 Marsilly.

2280 Sium erectum Huds.
1551 Aldrovandi II
1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1745 Séguier.

2281 Sium latifolium L.
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1808 Biroli; Savi — 1818 Ruchinger.

2281' Sium Sisarum L. R
Del Giappone e Cina; talora coltivato fino dall'epoca romana
1822 Pollini

Cicuta L.

2282 Cicuta virosa L.
1824 Comolli; Navari — 1837 Bertoloni — 1852 Rota — ~~1855 e Pirona~~ 1904 Goiran (+1814) Mazzucato. Cfr. Pirona 1855

Specie rara, ignota ai nostri botanici ~~vecchi~~ cinquecentisti, già coltivata negli orti botanici:
1772 Allioni — 1798 Farsetti — 1801 Bonato.
Spontanea:

Sison L.

2283 Sison Amomum L.
1551 Aldrovandi II
1561 Anguillara — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1816 Nova e Balbis
1554 Mattioli — 1561 Anguillara

Pimpinella L.

2284 Pimpinella major (L.) Huds.
Petr. 1551 Aldrovandi II
1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1713 Tita — 1726 Zannichelli.

2285 Pimpinella saxifraga L. R
1615 Rinio 1551 Aldrovandi II
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1571 Mattioli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

— β hircina (Mill.)
1707 Martini — 1713 Tita — 1754 Séguier — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini.

2286 Pimpinella lutea Desf.
1832 Gussone — 1880 C. P. G.

2287 Pimpinella anisoides Briganti
1805 Briganti, De nova Pimpinellae spec. Neap. — 1829 Gussone

— β Gussonei (Presl)
1789 Ucria — 1821 Gussone — 1826 Jan — 1827 Tenore
1733 Erbario Princ. Cattol. Cfr. Baroni

2288 Pimpinella Tragium Vill.
1592 Colonna — 1696 Cupani — 1723 Tilli — 1789 Ucria.

2289 Pimpinella peregrina L.
Petr.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1697 Bocone.

2290 Pimpinella Anisum L. R
Probabilmente oriunda dall'Oriente, coltivata già all'epoca romana ~~nel cinquecento~~ e qua e là naturalizzata.
1615 Rinio 1563 Cesalpino — 1827 Zerapha — 1844 Cesati; De Notaris

35/0018-159

Falcaria (Riv.) Host

2291 Falcaria saxifraga (L.) Rchb. f.
1785 Allioni – 1805 Re – 1827 Moris – 1837 Jattani e Bertero in Bertoloni III.

2292 Falcaria Catholica Koch
1837 Tommasini in Bertoloni III – 1880 C.P.G.

Aegopodium L.

2294 Aegopodium Podagraria L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1745 Séguier – 1802 Suffren; Marzari.

2293 Falcaria vulgaris Bernh.
1562 Matthioli – 1585 Durante – 1785 Allioni – 1792 Host – 1837 Odoardi in Bertoloni III

Cryptotaenia DC.

2295 Cryptotaenia Thomasii (Ten.) DC
1829 Tenore – 1837 Gussone in Bertoloni III – 1880 C.P.G.

Seseli (Riv.) L.

2296 Seseli tommasinianum Vis.
1848 Maly – 1882 Arcangeli (Località da confermarsi) (Istria)

2297 Seseli montanum L.
1754 Séguier – 1808 Biroli – 1822

4

Pollini – 1818 Sebastiani e Mauri 1829 Tenore.
– β inaequale (N. Terracc.) 1889 N. Terracciano.
– γ glaucum (Jacq.) 1785 Allioni – 1826 Jan – 1837 Barbieri e Bergnoli in Bertoloni III.

2297' Seseli Gouani Koch
(= Seseli austriacum (Jacq.) Beck (*))
1745 Séguier – 1822 Pollini – 1837 Tommasini e Biasoletto in Bertoloni III

2298 Seseli tortuosum L.
1785 Allioni – 1789 Moris – 1804 Savi – 1827 Moris.

2299 Seseli Bocconi Guss.
1551 Aldrovandi (ex Bertol. III) – 1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1697 Bocconi.

2300 Seseli annuum L.
1718 Pontedera – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini

2301 Seseli carvifolium Vill.
1850 Parlatore Viagg. M. Bianco (fl. mont.) 1867 Ardoino.

(*) N. Celakovsky in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904 p. 253 identifica queste specie con Seseli austriacum Beck, che sembra altra cosa e di differente area geografica. Cfr. Hall. Wohlf. II, 1072.

2302 Seseli ramosissimum (Portsch.) Gr.
1847 Barbasita, Sagg. Fl. Lucan. – 1880 C. P. G.

2303 Seseli Libanotis (L.) Koch
1745 Seguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1826 Gussone – 1837 Moretti, Zanardini, Bignoli in Bertoloni III.

Silaus Bess.

2304 Silaus flavescens Bernh.
1785 Allioni – 1835 Comolli – 1825 Moretti – 1837 Molinieri in Bertoloni III.

Pachypleurum Led.

2305 Pachypleurum simplex (L.) Rchb.
1678 Morison – 1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Pollini.

Selinum L.

2306 Selinum Carvifolia L.
1785 Allioni – 1802 Suffren
1808 Biroli – 1816 Noce e Balbis

Cnidium Cuss.

2307 Cnidium Monnieri (L.) Cuss.
1802? Suffren – 1854? Reyman – 1855? Virone
Le varie citazioni probabilmente traggono tutte origine da quelle del Walfen (Plant. rariores 1805, p. 44), ma la pianta di quest'autore è dalle diagnosi che dagli esemplari orig. (Cp. Walfen Fl. Nor. p. 795) ritenuta essere Peucedanum venetum Koch!

2308 Cnidium silaifolium (Jacq.) Pasolini
1571 Malbiski – 1723 Tilli – 1785 Allioni
1789 Moris – 1816 Noce e Balbis

Meum (Tourn.) Adans.

2309 Meum Mutellina (L.) Gaertn.
1595 Cona – 1713 Tita – 1785 Allioni
1822 Pollini.

2310 Meum athamanticum Jacq.
1551 Aldrovandi –
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1565 Cesalpino – 1561 Anguillara – 1785 Allioni
1837 Bertero, Moris, Parolini in Bertoloni III
– β adonidifolium (Gay)
1906 Burnat IV.

Ligusticum L.

2311 Ligusticum corsicum J. Gay
1832 J. Gay in Ann. Sc. natural.
1834 Salis-Marschlins – 1872 Marsilly

2312 Ligusticum ferulaceum All.
1785 Allioni – 1834 Colla – 1824 Comolli – 1837 Balbis in Bertoloni III.

2312' Ligusticum cynapiifolium Vill.
1830 Viviani in DC. Prodr. IV – 1850 c. Kralik. Cp. Rouy VIII

2313 Ligusticum pyrenaeum Lonar
1826 Gussone – 1830 Tenore
– β Seguierii (Jacq.)
1592 Cibo – 1745 Seguier – 1822 Pollini – 1824 Comolli.

2314 Ligusticum cyprium Spr.
1887 Profeta in Groves – 1888 Parlatore – Carmela VIII

35/0018-160

Trochiscanthes Koch

2315. Trochiscanthes nodiflorus (Lam.) Koch
1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1818 Noua e Baltis – 1837 Bertoloni.

Kundmannia Scop.

2316. Kundmannia sicula (L.) DC.
1671 Bouone – 1675 Zanoni – 1696 Cupani – (+1711) Barrelier.

Foeniculum (Tourn.) Adans.

2317. Foeniculum peucedanoides (M. B.) Jacks.
1837. Gasparrini in Bertoloni VII – 1881 C. P. G – 1889 N. Terracciano.

2318 Foeniculum vulgare Mill. R
1415 Rinio 1550 Petrell Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1696 Cupani
– β piperitum (Ucria)
1415 Rinio 1561 Anguillara – 1696 Cupani – 1796 Ucria – 1819 Bertoloni.

Levisticum (Riv.) Koch

2319 Levisticum officinale Koch
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1785 Allioni – 1802 Marzari – 1855 Pirona.

2 Da considerarsi piuttosto come specie inselvatichita che veramente spontanea; essendo stata a lungo coltivata –

1

Bonannia Guss.

2320. Bonannia resinosa (Presl) Strobl
1696 Cupani – 1821 Gussone – 1822 Presl – 1829 Tenore

Krubéra Hoffm.

2321. Krubera peregrina (L.) Hoffm.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1826 Gussone – 1827 Moris.

Aethúsa L.

2322 Aethusa Cynapium L
1550 Cibo – 1772 Wulfen in Scopoli – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

Angélica (Tourn.) L.

2323 Angelica silvestris L
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1651 Bauhin – Cherler – 1726 Zannichelli – 1802 Marzari.

2324 Angelica Archangelica L.
1415 Rinio 1558 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1772 Scopoli – 1785 Allioni – 1822 Pollini – 1837 Bertoloni.

Férula (Tourn.) L

2325 Ferula communis L R
1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino – 1818 Sebastiani e Mauri – 1824 Viviani.
– β nodiflora (L.)

1554 Mattioli – 1585 Durante – 1818 Sebastiani e Mauri – 1827 Gussone – 1829 Tenore

— γ neapolitana (Ten.)
1829 Tenore – 1854 Gussone.

— δ glauca (L.)
1551 al Dorando II
1829 Tenore – 1887 Groves.

2326 Ferula nodosa (L.) Jacks.
1563 Cesalpino – 1827 Gussone – 1835 Tenore.

2327 Ferula ferulago L.
1550 Petroll Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1697 Bouone – 1726 Zannichelli.

2328 Ferula silvatica Bess.
(+ 1673) Barrelier ed. 1714 – 1697 Bouone
1824 Tenore.

Pastináca (Tourn.) L.

2329 Pastinaca Opópanax L.
1858 Mattioli (Pseudocosto) – 1563 Cesalpino – 1723 Tilli – 1735 Micheli – 1785 Allioni.

2330 Pastinaca hispida (Friv.) Fenzl.
1856 Huet in Nyman Consp. – 1877 Groves – 1882 Arcangeli. (Specie da identificare)

2331 Pastinaca Fleischmanni Hladn.
1867 Noë in Rchb. Ic. XXI – 1881 C.P.G – 1882 Arcangeli.

2332 Pastinaca corsica Car.
1834 Salis-Marschlins – 1848 Grenier e Godron – 1872 Marsilly.

2333 Pastinaca sativa L.
1532 Cibo – 1551 al Dorando II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

— β insularis Rouy et Cam.
1850 Kralik in Rouy VII.

2334 Pastinaca latifolia DC
1834 Salis-Marschlins – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino.

2335 Pastinaca divaricata Desf.
1828 Duby (P. Kochii α.) – 1834 Salis-Marschlins – 1872 Marsilly.

Anéthum (Tourn.) L.

2336 Anethum graveolens L. R
Nativo dell'India, Persia ecc., coltivato e naturalizzato dall'era romana.
1550 Petroll Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1785 Allioni – 1827 Zerapha – 1830 Reichenbach.

Peucédanum (Tourn.) L.

35/0018-161

2337 Peucedanum Carvifolia (L.) Vill.
1772 Scopoli – 1782 Hacquet – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

2338 Peucedanum Schottii Bess.
1835 Comolli – 1842 Puccinelli – 1843 Koch – 1867 Ardoino.

2339 Peucedanum gallicum Latour.
1837 Biasoletto e Tommasini in Bertoloni III – 1843 Koch – 1855 Brumat. in Pirona.

2340 Peucedanum officinale L.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi II 1561 Anguillara – 1566 ? Calzolari – 1585 Durante – 1785 Allioni.

2341 Peucedanum paniculatum Lois.
1806 Loiseleur – 1834 Salis-Marschlins – 1848 Soleirol in Grenier e Godron I.

2342 Peucedanum venetum (Spr.) Koch.
1550 Petrus Cibo – 1563 Cesalpino – 1723 Micheli in Tilli – 1769 Agosti 1822 Pollini.

2343 Peucedanum Cervaria (L.) Lap.
1550 Petrus Cibo – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1822 Pollini.

2344 Peucedanum Oreoselinum (L.) Moench
1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1718 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

2345 Peucedanum palustre (L.) Moench
1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Marzari – 1822 Pollini – 1842 Trevisan – 1844 Cesati.

2346 Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch
1532 Cibo – 1772 Scopoli – 1855 Pirona
1563 Cesalpino – 1842 Puccinelli.
– β rablense (Koch)
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

2347 Peucedanum Ostruthium (L.) Koch
1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1713 Tita 1745 Séguier –
– β angustifolium (Bell.)
1802 Bellardi – 1837 Balbis e Bertero in Bertoloni III.

2348 Peucedanum verticillare (L.) M.K.
1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino – 1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1822
1773 Vitman
1651 Aldrovandi in Bauhin-Cherler

Heracleum L.

2349 Heracleum Sphondylium L.
1532 Cibo – 1565 Cesalpino (var. Pollinianum) – 1554 Mattioli
1745 Séguier
– β longifolium (Jacq.)
1525 Pona – 1754 Séguier – 1822 Pollini – 1808 Biroli.
– γ elegans (Jacq.)
1621 Boccone – 1785 Allioni – 1904 Jordan
– δ cordatum (Host)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1822 Host – 1827 Gussone
– ε Panaces (L.)
1785 Allioni – 1829 Tenore.
– η Orsinii (Guss.)
1826 Gussone – 1829 Tenore
– ζ pyrenaicum (Lam.)
1554 Mattioli – 1585 Durante – 1595 Pona – 1754 Séguier – 1816 Pollini.

2350 Heracleum alpinum L.
1844 Colla – 1875 Favre – 1882 Arcangeli.

2351 Heracleum austriacum L.
1772 Scopoli – 1881 C. P. G. – 1894 Rudaglior e Venanzi.

2351' Heracleum minimum Lam
1882 Arcangeli – 1897 Perugia – 1906 Burnat.

Tordylium (Tourn.) L.

2352. Tordylium maximum L.
1563 Cesalpino – 1585 Allioni – 1789 Ucria – 1805 Re – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini.

2353 Tordylium officinale L. R
1606 Colonna – 1826 Gussone – 1829 Tenore.

2354 Tordylium apulum L.
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1866 Bivona – Bernardi.

Daucus (Tourn.) L.

2355. Daucus Carota L. R
(†1320) Crescenzio, ed. 1471
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1785 Allioni.
– β Gingidium (L.)
1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli.
– γ commutatus Paoletti
1674 Boccone – 1832 Gussone.
– δ maurítanicus (L.)
1789 Ucria – 1827 Gussone – 1829 Tenore.
– ε foliosus (Guss.)
1832 Gussone.
– ζ gibbosus (Bert.)
1832 Gussone – 1837 Bertoloni III.
– η Bocconei (Guss.)
1674 Boccone – 1827 Gussone – 1829 Tenore

35/0018-162

— √ Dentatus (Berk.)
1837 Moris in Bertoloni III.

— ι rupestre (Guss.)
1832 Gussone – 1847 Calcara

— κ parviflorus (Desf.)
(+1856) Tineo – (+1877) Parlatore. Cf. Parl. Carul VIII.

— λ lopadusanus (Tineo)
1846 Tineo – 1847 Calcara – 1853 Grech – Salicata.

— μ breviaculeatus Car.
1606 Colonna – 1837 Bertoloni – 1846 De Notaris.

— ν hispidus (Desf.)
1837 Bertoloni III.

— ξ gummifer (Lam.)
1551 Aldrovandi – 1697 Boccone – 1785 Allioni – 1864 Bertoloni

— ο siculus (Tineo)
1817 Tineo – 1827 Gussone; Moris.

2356 Daucus bicolor S. et S.
1830 Gussone in DC. Prodr. IV – 1877 Giraldi e Tenore in Bertoloni III.

2357 Daucus aureus Desf.
1696 Cupani – 1826 Gussone – 1830 Tenore.

2358 Daucus muricatus L.
1551 Aldrovandi – 1696 Cupani – 1813 Balbis in Cat. stirp. hort. Taur.

2359 Daucus Broteri Ten.
1550 Cibo – 1723 Micheli in Tilli – 1818 Sebastiani e Mauri.

2360 Daucus grandiflorus (L.) Scop.
1606 Colonna – 1713 Tilli – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1822 Pollini.

— β platycarpus (Scop.)
1532 Cibo – 1606 Colonna – 1640 Castelli – 1822 Pollini.

2361 Daucus pumilus (L.) Balb.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1807 Brocca – Bernardi.

2361' Daucus coadunatus Ten.
1835 Tenore (Species dubia)

2360' Daucus Daucorlaya (Mürb.) Fiori
1905 Rizzo in Degen, Bull. Soc. bot. ital. 1906 p. 75.

Siler (Moris.) Crantz

2362 Siler trilobum (L.) Scop.
1851 Hausmann – 1893 Ambrosi in Gelmi.

Laserpitium (Tourn.) L.

2363 Laserpitium nitidum Zanted.
1813 Zantedeschi in Comm. Aten. Brescia.
1822 Pollini – 1824 Conolli

2364 Laserpitium marginatum W.K.
1837 Tommasini in Bertoloni III
1879 Freyn.
— β alpinum (W.K.)
1898 Pospichal.
— γ Gaudini (Moretti)
1822 Moretti — 1824 Comolli —
1837 Martini, Zantedeschi, Rainer
in Bertoloni III

2365 Laserpitium latifolium L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565
Mattioli — 1595 Pona — 1713 Tita
1745 Séguier — 1822 Pollini.

2366 Laserpitium peucedanoides L.
1566 Calzolari — 1754 Séguier — 1802
Marzari — 1820 Moretti — 1822 Pollini

2367 Laserpitium Siler L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldovrandi II 1554 Mattioli — 1563
Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Po-
na — 1822 Pollini.
— β garganicum (Ten.)
1723 Micheli in Tilli — 1811 Tenore
— γ siculum (Spr.)
1696 Cupani — 1827 Gussone

2368 Laserpitium gallicum L.
1785 Allioni — 1816 Noua e Balbis —
1826 Gussone — 1827 Moris
1772 Maratti —

2369 Laserpitium prutenicum L.
1769 Agosti — (+1770) Moreni. Cf. Polli-
ni I — 1785 Allioni — 1802 Suffren —
1805 Re.

2370 Laserpitium Panax Gouan
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1824
Comolli — 1837 Pestalozza, Bassi,
Moretti in Bertoloni III — 1851
Hausmann.

Thapsia (Tourn.) L.

2371 Thapsia garganica L. R
1561 Anguillara — 1550 Cibo — 1583
Cesalpino — 1599 Imperato — 1640 Castelli
— 1671 Bocone —

2372 Thapsia polygama (Lam.) Desf.
1872 Revelière in Marsilly — 1901
Rouy VII.

2372' Thapsia villosa L.
1785 Allioni — 1844 De Notaris — 1867
Ardoino — 1906 Burnat IV

Elaeoselinum Koch

2373 Elaeoselinum Asclepium (L.) Bert.
1666 Colonna — 1671 Bocone — 1696
Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone
— β meoides (Desf.)
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1826
Gussone — 1827 Moris.

35/0018-163

2373' Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange
1848 Bernard in Grenier e Godron I
(Località da confermare)

Torilis Adans

2374 Torilis arvensis (Huds.) Link.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1798 Savi.
— β purpurea (Guss.)
1827 Gussone – 1829 Tenore – 1837 Sanguinetti.

2375 Torilis Anthriscus (L.) Bernh.
1578 C. Bauhin. Cfr. Prodr. p. 80 – 1551 Aldrovandi – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Suffren.

2376 Torilis leptophylla (L.) Rchb. f.
1804 Balbis – (+1805) Wulfen, ed. 1858 – 1772 Scopoli – 1852 Rota – 1829 Tenore 1835 Comolli –

2377 Torilis nodosa Gaertn.
1565 Michiel 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Suffren.

Caucalis (Tourn.) L.

2378 Caucalis daucoides L.
1550 Cibo – 1606 Colonna – 1745 Séguier – 1798 Savi – 1802 Suffren
— β muricata (Bisch.)
1880 Sauardo – 1898 Pospichal

Turgenia Hoffm.

2379 Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1550 Cibo – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

Anthriscus Bernh.

2380 Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.
1606 Colonna – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1805 Re.
— β nemorosa (Spr.)
1826 Presl – 1827 Gussone – 1829 Tenore.
— γ Candollei (Rouy et Cam.)
1901 Gandoger in Rouy VII.

2381 Anthriscus fumarioides Spr.
1835 Tommasini in Bot. Zeit.
1837 Biasoletto in Bertoloni III

2382 Anthriscus vulgaris Bernh.
1606 Colonna – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1824 Comolli.

2383 Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm. R
Nativo dall'Asia occid. e Russia, coltivato dall'epoca romana e frequentemente naturalizzato.
1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1713 Tita – 1822 Pollini
— β trichospermus (R. S.)
1837 Bertoloni III (A. longirostris)

Myrrhis Scop

2383 Myrrhis odorata Scop. R
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1565 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1822 Poll ini.

Scandix (Tourn.) L.

2384 Scandix australis L. R
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1827 Gussone; Moris – 1829 Tenore.
– β grandiflora (L.)
1832 Biasoletto in Rchb. Fl. exc. – 1898 Pospichal.

2385 Scandix brachycarpa Guss.
1696 Cupani – 1825 Gussone – 1829 Tenore.

2386 Scandix Pecten-Veneris L. R
1550 Cibo – 1558 Mattioli – 1585 Durante – 1583 Cesalpino – 1666 Calzolari.

Physocaulis Fausch.

2387 Physocaulis nodosus (L.) Koch
1785 Allioni – 1827 Moris – 1837 Molineri e Soleirol in Bertoloni VIII

Chaerophyllum (Tourn.) L.

2388 Chaerophyllum aromaticum L.
1697 Bocone – 1834 Colla – 1837 Jan e Felisi in Bertoloni III – 1851 Rainer in Hausmann.

2389 Chaerophyllum bulbosum L.
1785 Allioni – 1816 Nocca e Balbis – 1896 Marcheselli.

2390 Chaerophyllum hirsutum L.
1532 Cibo – 1745 Léyssier – 1785 Allioni 1780 Targa – 1802 Suffren; Margari
– β Villarsii (Koch)
1847 Facchini in Bertoloni – 1851 Hausmann – 1869 Visiani e Savardo.
– γ elegans (Gaud.)
1853 Rota – 1884 Gibelli e Pirotta.
– δ calabricum (Guss.)
1828 Gussone, Fl. sic. Syn. Hort. Boccad. 1830 Tenore.
– ε magellense (Ten.)
1829 Tenore – 1837 Ortisi, Gussone in Bertoloni III.

2391 Chaerophyllum aureum L.
1532 Cibo – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Sternberg – 1822 Pollini

2392 Chaerophyllum temulum
1696 Cupani – 1745 Léyssier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Suffren; Margari.

2392' Chaerophyllum coloratum L.
1882 Arcangeli (local. da confermarsi)

2392" Chaerophyllum bulbosum Vis
1882 Arcangeli (local. da confermarsi)
Sec. Ryman var. di Ch. bulbosum

35/0018-164

2392[3] Chaerophyllum minimum Vand.
1771 Vandelli, Fasc. plantar. p. 11 ed
in Schult. Syst. veg. VII p. 526 – Soc.
Comolli var. δ. C. hirsutum. (1)

(2392[4] Chaerophyllum pancedanifolium (Jan.?)
1879 Penzig, N. M. Generato)

Athamánta L.

2393. Athamanta macedonica (L.) Spr.
1615 Rivino 1785 Allioni – 1811 Tenore – 1844
De Notaris – 1847 Zanardini

2394 Athamanta Haula L.
1551 Aldrovandi. Cfr. Bertoloni III – 1640
Castelli – 1671 Boccone – 1696 Cupani
1789 Ucria.

2395. Athamanta cretensis L.
1615 Rivino 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1571 Mattioli
1595 Pona –
– β Matthioli (Wulf.)
1562 Mattioli – 1772 Scopoli –
Walfen in Jacq. Coll. I – 1802 Sieber

Hladnikia Koch

2396 Hladnikia Golaka (Hacq.) Rchb.f.
1782 Hacquet – 1826 Guthnick – 1830
Reichenb. Fl. excurs. – 1842 Facchini
in Bertoloni V, 619 – 1855 Pirona

(1) Il Chaerophyllum pancedanifolium (?) citato dal Penzig nel suo opuscolo "Il Monte Generoso" 1879 in base ad un Catal. MS. che si teneva per essere Dell'Ab. Ball, è da eliminarsi come provvisorio di un Caffaro calami; infatti non esiste alcuna specie di questo nome (Penzig in lett.)

Pleurospermum Hoffm.

2397 Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
1532 Cibo – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Brocchi – 1822 Pollini.

Colladonia DC.

2398 Colladonia angustifolia Bert.
1829 Tenore – 1837 Gasparrini
in Bertoloni III.

Molopospermum Koch

2399 Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1595 Pona

Physospermum Cuss.

2400 Physospermum aquilegifolium (All.) Koch
1550 Cibo – 1576 Lobel Stirp. hist. p.
457 – 1618 Boccone – 1785 Allioni – 1804 Balbis.

2401 Physospermum verticillatum (W. K.) Vis.
1822 Presl – 1827 Guthnick – 1829 Tenore

Smyrnium (Tourn.) L.

2402. Smyrnium Olusátrum L. R
1615 Rivino 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554
Matthiol. – 1583 Cesalpino – 1585 Dodonaeus – 1606 Colonna.

2403 Smyrnium perfoliatum L. R
1606 Colonna – 1640 Castelli – 1696
Cupani.

— β rotundifolium (Mill.)
1563 Cesalpino — 1571 Mattioli — 1696 Cupani — 1789 Ucria.

Conium L.
2404 Conium maculatum L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1563 (1554 Mattioli) Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante —

Coriandrum (Tourn.) L.
2 { Originario del bacino mediterr. or. ed Africa sett.; coltivato dall'era romana.
1 2405 Coriandrum sativum L. R
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1696 Cupani (1583 Cesalpino)

Bifora Hoffm.
2406 Bifora radians M. B.
1745 Séguier — 1822 Pollini — 1834 Comolli — 1837 Griolet, Barbieri, Montini in Bertoloni III.

2407 Bifora testiculata (L.) DC.
1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1798 Savi.

Magydaris Koch
2409 Magydaris pastinacea (Lam.) Paol.
1583 Cesalpino — 1674 Boccone — 1696 Cupani — 1735 Micheli

Hippomarathrum Hoffg. et Link
2409 Hippomarathrum Libanotis (L.) Koch.
1826 Jan — 1827 Gussone
— β pungens (Jan ap. Guss.)
1827 Gussone — 1829 Tenore.
— γ siculum (L.? Hoffg.)
1561 Anguillara — 1674 Boccone — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1827 Gussone.

Cachrys (Tourn.) L.
2410 Cachrys levigata Lam.
1789 Allioni — 1834 Colla — 1837 Balbis e Moris in Bertoloni III — 1844 De Notaris

Prangos Lindl.
2411 Prangos ferulacea (L.) Lindl.
1551 Aldrovandi: Cfr. Bertoloni III — 1563 Cesalpino — (1550 Cibo) — 1696 Cupani — 1789 Ucria.

Crithmum (Tourn.) L.
2412 Crithmum maritimum L. R
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1631 Donati.

Oenanthe (Tourn.) L.
2413 Oenanthe globulosa L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1798 Savi — 1853 Grech — Delicata.

Lecokia DC.
2412' Lecokia cretica (Lam.) DC.
1839 Pirazzoli in Bertoloni IV. Probabilmente avventizia. Si coltivava a Padova, 1801 (Bonato) nè si vede in altri giardini.

35/0018-165

2414 Oenanthe aquatica (L.) Poir.
1550 Petr. Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1822 Pollini

2415 Oenanthe fistulosa L.
1565 Mattioli – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1818 Ruchinger.

2416 Oenanthe pimpinelloides L.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 (1551 Aldrovandi) Mattioli – 1640 Castelli – 1726 Zannichelli.
— β virgata (Poir.)
1900 Fiori (Da ricercarsi in Italia)
— γ silaifolia (M. B.)
1789 Allioni – 1844 De Notaris; Cesati.
— δ peucedanifolia (Pollich)
1565 Michiel 1808 Biroli – 1834 Comolli – 1837 Balsamo-Crivelli, Cesati in Bertoloni III – 1842 Trevisan.
— ε Lachenalii (Gmel.)
1810 Brignoli – 1834 Salis-Marschlins – 1844 De Notaris; Cesati.
— ζ Lisae (Moris)
1835 Moris in Mem. Acad. Tor. e 1837 in Bertoloni III
— η Jordani (Tenore)
1827 Tenore in Ind. sem. Hort. Neap. 1837 Giordano in Bertoloni III.

2417 Oenanthe crocata L.
1565 Mattioli – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1827 Moris.

2417¹ Oenanthe gigantea Zumagl.
1849 Zumaglini (Sp. dubbia)

2417² Oenanthe densa J. Woods
1850 J. Woods, Tourist's flora – 1882 Arcangeli. (Sp. dubbia. Cfr. Burnat IV)

Echinóphora (Tourn.) L.
2418 Echinophora spinosa L.
1415 Rinio 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1631 Donati – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

2419 Echinophora tenuifolia L.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1626 Gussone – 1829 Tenore.
— β Sibthorpiana (Guss.)
1832 Gussone – 1837 Bertoloni

Fam. 77 Cornaceae

Cornus (Tourn.) L.
2420 Cornus sanguinea L. R
1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1562 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

2421. Cornus mas L. R

1415 Rinio 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

2421' Cornus stolonifera Michx

Dell'America sett., coltivato ~~poco~~ dalla fine del settecento, e raramente inselvatichito.

1795 Zuccagni – 1801 Bonato – 1812 Spigno – 1815 Biroli – 1890 Lenticchia in Frangoni (inselvatichito)

Aucúba Thunb.

2421² Aucuba japonica Thunb.

Nativa del Giappone; ♀ coltivato quindi ~~dal principio del secolo~~ ed ora diffusa largamente in tutti i giardini e parchi. ♀

1806 Zuccagni – 1812 Bonato; Spigno 1815 Biroli – 1817 Giani. Anche in Italia si ebbero intorno 1865 individui maschili; cioè poco dopo la loro introduzione in Europa per opera del Fortune e solo da allora si ebbero individui fruttificanti.

Fam. 78 Rhamnaceae

Paliúrus (Tourn.) L

2422 Paliurus Spina-Christi Mill. R

1532 Cibo – 1551 al Durandi II – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona.

Zizyphus (Tourn.) Juss.

2423 Zizyphus sativa Gaertn. R

Oriundo della Cina bor. coltivato però dall'epoca romana e spesso inselvatichito. (i soli indiv. ♀)

♀. Introdotta in Europa intorno 1783 per cura di John Graefer fondatore e direttore del giardino reale di Caserta;

1415 Rinio 1550 Petr Cibo – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1595 Pona.

2424. Zizyphus Lotus (L.) Lam. R

1696 Cupani – 1789 Uoria – 1806 Bivona Bernardi – 1827 Gussone.

Rhamnus (Tourn.) L

2425 Rhamnus Alaternus L. R

1550 Petr Cibo – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1789 Uoria – 1798 Savi.

2426 Rhamnus oleoides L R

1696 Cupani – 1796 Uoria – 1827 Gussone, Moris.

2427 Rhamnus persicifolia Moris

1827 Moris – 1882 Arcangeli.

2428 Rhamnus cathartica L.

(+1320) Crescenzio, edit. 1471 1563 Cesalpino – 1558 Mattioli – 1585 Durante – 1696 Cupani

— β hydriensis (Hacq.)

1782 Hacquet – 1907 Fiori

2429 Rhamnus saxatilis L. R

1565 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1806 Sternberg – 1822 Pollini

— β infectoria (L.) R

1785 Allioni – 1835 Biasoletto e Sassi in Bertoloni II

1726 Zannichelli –

35/0018-166

— γ tinctoria (W. K.)
1895 Sotta – 1900 Fiori.

2430 Rhamnus pumila Turra
1745 Séguier – 1765 Turra – 1785 allioni – 1802 Suffren (1855 Pirona)

2431 Rhamnus alpina L.
1785 allioni – 1805 Re – 1816 Nocca e Balbis – 1827 Moris – 1829 Tenore
— β glaucophylla (Sommier)
1860 Carnel. Gr. Sommier in N. giorn. bot. ital. 1894.

2432 Rhamnus rupestris Scop.
1772 Wulfen in Scopoli – 1802 Suffren – 1855 Pirona

2433 Rhamnus Frangula L.
1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Suffren.

Fam. 79 Aquifoliaceae

Ilex L.

2434 Ilex Aquifolium L. R
1550 Gio – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1696 Cupani.

Fam. 80 Ampelidaceae

Parthenocissus Planch.

2435 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Dell'America boreale, coltivata già dal seicento e qua e là naturalizzata.
1642 Vestingio (Hedera indica) – 1696 Cupani – 1713 Tita – 1780 Fusetti.

Vitis (Tourn.) L.

2436. Vitis vinifera L. R
1583 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 allioni – 1802 Suffren – 1822 Pollini (α silvestris)
— β sativa DC.
1550 Gio – 1554 Mattioli – 1585 Durante – 1822 Pollini.

2437 Vitis riparia Michx.
II { 1806 Zuccagni – 1812 Spreng – 1815 Biroli – 1826 Bonato
I { Dell'Amer. sett. e coltivata fino dal principio dell'ottocento.

2438 Vitis rotundifolia Michx
Dell'amer. boreale, introdotta e coltivata dal 1875 al 1885.

2439 Vitis rupestris Scheele
Originaria e coltivata come la precedente

2440 Vitis Labrusca L.
Nativa dell'America sett. e introdotta in Inghilterra dopo la metà del seicento e in Italia diffusa dalla metà dell'ottocento

2441 Vitis aestivalis Michx
Dell'America del Nord più calda, introdotta in Inghilterra dopo la metà del Seicento e fra noi solo fra il 1870 e 1880.

Fam. 81 Celastraceae

Evonymus (Tourn.) L.
Originario della Cina e Giappone introdotto nella prima metà dello ottocento e già diffuso in tutti i parchi e giardini e qua e là talora inselvatichito.
1841 Piccioli – 1842 de Vitiani – 1845 Tenore.

2442 Evonymus japonicus L. fil.

2443 Evonymus europaeus L.
1550 Petr. Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1595 Pona.

2444 Evonymus verrucosus Scop.
1772 Scopoli – (+1805) Wulfen, ed. 1850. – 1802 Suffren – 1855 Pirona

2445 Evonymus latifolius (L.) Mill. R.
1532 Cibo – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1820 Moretti.

Fam. 82 Sapindaceae

Staphyléa L.

2446 Staphylea pinnata L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1561 Anguillara – 1754 Séguier.
(+1320) Crescenzio, edit. 1471

Acer (Tourn.) L.

2447 Acer monspessulanum L.
1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1802 Suffren. 1822 Pollini.

2448 Acer campestre L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino.
— β collinum (Tenore)
1830 Tenore.

2449 Acer platanoides L.
1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren – 1811 Savi – 1821 Nocca e Balbis
— β Lobelii (Tenore)
1723 Tilli – 1820 Tenore

2450 Acer Opalus Mill.
1551 Aldrovandi II
1723 Tilli – 1735 Micheli – 1791 Bellardi – 1811 Savi.
(! vedi pag. seguente)

2451 Acer Pseudoplatanus L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1789 Ucria.

35/0018-167

— β villosum (Presl)
1696 Cupani — 1822 Presl — 1844 Gussone.

2452 Acer Negundo L.
Originario della Virginia, Introdotto fra noi sulla fine del settecento e successivamente assai diffuso e qua e là inselvatichito. (incontrasi)
1780 Farsetti — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1802 Rodati — 1812 Pollini; Spigno.

— β rotundifolium (Lam.)
1811 Savi — 1819 Bertoloni — 1820 Tenore.
— γ ambiguum Fiori
1906 Fiori in N. g. bot. it. p. 169.
— ε neapolitanum Ten.
1820 Tenore — 1826 Presl.
— ζ aetnense (Tin. ap. Tod.) Strobl
1844 Cosentini e Tineo in Gussone (Ac. obtusatum)

sotto il n° 2450

2451' Acer Peronae Schwerin
(A. ambiguum × monspessulanum)
1901 Perona ap. Schwerin in Mitt. Deutsch. Dendr. Gesell. — 1907 Fiori.

2451² Acer tataricum L.
1889 Bilimek. Cfr. Nym. Suppl. p. 76 —
1894 Soravia in Piccioli, Le piante legn. ital. p. 695 (Cadore) Qui probabilmente avventizio da precedente coltivazione.

Aesculus L.

2453. Aesculus Hippocastanum L.
Nativo degli alti monti della Grecia sett. (Tessalia, Epiro) (Cfr. Nym. Suppl. 76); Introdotto in Italia da Costantinopoli nel 1565 e successivamente diffuso fra noi quasi ovunque e spesso incontrasi inselvatichito.
1565 Mattioli — 1569 G. Bauhin in Bauh. et Cherl. I 2 p. 128 (1650) — 1595 G. V. Pinelli (lettera a G. F. Mussato, apogr. nell' Arch. dell' Orto Padovano) — 1644 Veslingio

Fam. 83 Anacardiaceae.

Pistacia L.

2454 Pistacia vera L. R
Originaria della Siria, ma già nota ai Romani e coltivata abbondantemente e inselvatichita nel mezzodì d'Italia.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara.

2454' Pistacia hybrida Gasp.
(P. vera × P. Terebinthus Planch.)
1838 Gasparrini in Poliorama pittor. di Napol. 27 ott. 1838 — 1872 Parlatore — 1885 Borzì.

Fam. 83* Sapindaceae

Cardiospermum L.

2453' Cardiospermum Halicácabum L.

Originario delle Indie. Coltivato, specie nel passato, assai comunemente.

1532 Cibo — 1551 Aldrovandi, 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1585 Durante — 1701 Martini.

2455 Pistacia Terebinthus L. R.
1532 Cibo – 1551 Alfonsi II – 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – (1563 Cesalpino) – 1585 Durante – 1595 Pona.

2455' Pistacia Saportae Burnat (P. Lentiscus × P. Terebinthus Sap. M.) 1896 Burnat.

2456 Pistacia Lentiscus L. R.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.

Rhus (Tourn.) L.

2457. Rhus Cotinus L. R
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

2458 Rhus hirta (L.) Sudw.
Nativo dell'America sett.; coltivato ~~dalla fine~~ fino dal seicento ora e spesso inselvatichito
1704 Mattioli – 1678 Bocone – 1793 Luccagni – 1812 Bonato; Pollini; Spigno – 1821 Capelli – 1864 Savardo – Anche l'affine Rhus glabra L., nord-americano, coltivato già 1780 (Farsetti) 1793 (Luccagni), 1801 (Bonato), trovasi talora inselvatichito.

2459. Rhus coriaria L. R
1415 Rinio – 1551 Alfonsi II + 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria.

2460 Rhus oxyacantha Cav.
1696 Cupani – 1796 Ucria – 1817 Tineo – 1826 Presl – 1827 Gussone –

2461 Rhus pentaphylla (L.) Desf.
1674 Bocone ♀ – 1817 Tineo – 1826 Presl – 1827 Gussone. ♀ 1733 Erb. Princ. Cattol. Cfr Baroni

2461' Rhus Toxicodendron L.
Dell'America sett. e giappone; coltivato fino dal seicento e non di rado inselvatichito
1642 Vestingio (Vitis indica trifolia) – 1772 Allioni – 1793 Luccagni – 1880 Savardo.

— β radicans (L.)
Coltivata e e talora inselvatichita come la precedente.
1762 Allioni – 1780 Farsetti.

Schinus L.

2461² Schinus Molle L.
Nativo dell'America merid. coltivato fino dal principio del seicento e talora subspontaneo nella regione mediterranea.
1605 E. Vorst (a Roma) Cfr Clus. Exot. p. 322 – 1629 N. Contarini (Venezia) Cfr. Targ. Tozz. Cenni introd. piante – 1780 Farsetti – 1801 Bonato (Il Durante ne aveva dato la fig. ottenuta ~~dall'estero~~ da un suo corrispondente nel 1585)

35/0018-168

Jam. 84 Balsaminaceae

Impatiens (Riv.) L.

2462 Impatiens Noli-tangere L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1606 Colonna.

2462¹ Impatiens Balsamina L.
Delle Indie orientali; coltivata dal cinquecento e non di rado avventizia presso i giardini.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1642 Vestingio.

Jam. 85 Polygalaceae

Chamaebuxus (Tourn.) Spach

2463 Chamaebuxus alpestris Spach
1532 Cibo (1583 Matthiol.) – 1779 Vitman – 1785 Allion. – (1595 Pona – 1745 Seguier)

Polygala (Tourn.) L

2464 Polygala major Jacq.
1818 Sebastiani e Mauri – 1821 Nocca e Balbis – 1825 Savi – 1847 Bertoloni.

2465 Polygala Preslii Spr.
1696 Cupani – 1789 Moris – 1826 Presl – 1827 Guffone.

2466 Polygala vulgaris L.
1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1785 Allion. – 1802 Suffren.

— β serpyllacea (Weihe)
1853 Rota – 1882 Arcangeli – 1869 Visiani e Savarda – 1893 Gelmi

— γ alpestris (Rchb.)
1830 Tenore – 1844 Cesati – 1868 Tibiéne – 1869 Visiani e Savarda.

— δ carniolica (A. Kern.)
1883 A. Kerner in Sched. Fl. austro-hung. n. 870 – 1896 Hallier-Wohlfahrt – 1898 Porsch.

— η flavescens (DC.)
1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1813 Sebastiani – 1825 Savi.

— ζ pisaurensis (Cald.)
1875 Calderini in N. giorn. bot. ital. – 1882 Arcangeli.

— ε Carueliana (Burnat)
1843 P. Savi – 1890 Burnat in Bull. Carniel IX – Cfr. Baroni Suppl. Fl. Tosc.

— ν nicaeensis (Risso)
1563 Cesalpino – 1772 Marsilea – 1820 Tenore – (1798 Savi) – 1844 Risso

— ι comosa (Schk)
1842 Trevisan – 1846 Patterson – 1852 Rota

— κ pedemontana (Perr.)
1863 Perrier e Verlot in Bull. Soc. bot. de France.

— λ apiculata (Porta)
1879 Porta.

2467 Polygala amara L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1802 Suffren – 1821 Noua e Balbis – 1822 Pollini
— β alpina DC.
1851 Gennari e Cfr. Burnat I. – 1882 Payot – 1868 Tissière
— γ calcarea (F. Schultz)
1853 Rota – 1882 Arcangeli.

2468 Polygala monspeliaca L.
1697 Boccone – 1789 Ucria – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl – 1827 Gussone.

2469 Polygala exilis DC.
1726 Zannichelli – 1818 Kuchinger 1847 Zanardini (e Kellner) [P. monspeliaca Auct. Venet., non L.].

Fam. 86 Geraniaceae

Geranium (Tourn.) L.
2470 Geranium macrorrhizum L.
1532 Cibo – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1822 Pollini.

2471 Geranium Robertianum L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1745 Séguier.
— β purpureum (Vill.)
1806 Balbis – 1894 Arcangeli – 1898 Pospichal – 1904 Goiran

— γ alpinum Tenore
1830 Tenore – 1889 N. Terracciano.

2472 Geranium lucidum L.
1558 Cibo – 1606 Colonna – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni

2473 Geranium phaeum L.
1595 Pona – 1745 Séguier – 1791 Bellardi – 1802 Suffren.
— β reflexum (L.)
(+1673) Barrelier, ed 1714 – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Tenore

2474 Geranium molle L.
1415 Rinio
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
— β villosum (Ten.)
1811 Tenore – 1842 Gasparrini
— γ pollinense (A. Terr.)
1889 N. Terracciano.

2475 Geranium pyrenaicum Burm. f.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1821 Noua e Balbis – 1826 Presl.

2475' Geranium luganense Chenev.
(G. molle × pyrenaicum)
1903 Chenevard, Bull. Herb. Boiss.

35/0018-169

2476 Geranium pusillum L.
1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1820 Moricand.
— β delicatulum (Ten. et Guss.)
1835 Tenore – 1842 Tenore e Gussone.

2477 Geranium divaricatum Ehrh.
1804 Balbis – 1847 Barbieri in Bertoloni VII – 1872 Facchini in Parlatore V.

2478 Geranium rotundifolium L.
1532 Cibo – 1595 Pona – 1789 Ucria – 1798 Savi – 1802 Suffren.

2479 Geranium columbinum L.
1563 Cesalpino – 1640 Castelli – (+1711) Cupani, ed 1713 – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

2480 Geranium dissectum L.
1615 Pinin
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1822 Pollini.

2481 Geranium lanuginosum Lam.
1835 Tenore – 1837 Moris – 1851 Facchini in Hausmann.

2482 Geranium argenteum L.
1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2483. Geranium cinereum Cav.
1820 Tenore – 1847 Gasparrini in Bertoloni VII.

2484. Geranium sanguineum L.
1532. Cibo – (+1673) Barrelier ed. 1714. 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

2485 Geranium tuberosum L. R
1562 Mattioli – 1565 Michiel – 1585 Durante – 1561 Anguillara – 1696 Cupani – 1735 Micheli.

2486 Geranium asphodeloides Burm. f.
1723 Tilli – 1735 Micheli – 1811 Tenore 1827 Gussone.

2487 Geranium silvaticum L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren 1822 Pollini.
— β rivulare (Vill.)
1804 Balbis – 1805 Re – 1808 Biroli – 1834 Massara

2488 Geranium pratense L.
1562 Mattioli – 1595 Pona – 1713 Tilli – 1745 Séguier.

2489. Geranium palustre L.
1853 Rota – 1855 Pirona.

2490 Geranium nodosum L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1822 Pollini.

2491 Geranium striatum L.
1640 Castelli – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1820 Tenore.

Erodium L'Herit.

2492 Erodium Gussonei Ten.
1697 Boccone – 1820 Tenore – 1826 Gussone.

2493 Erodium corticum Lém.
1805 Léman in DC. Fl. Franc. IV – 1837 Moris.

2493' Erodium Reichardi (Murr.) DC.
1697. Boccone – 1907 De Lens in Fiori.

2494 Erodium maritimum (Burm.f.) Sm.
1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri (1815 Savi) – 1839 Moris e De Notaris

2495 Erodium chium (Burm. f.) W.
1696 Cupani – 1826 Gussone – 1837 Moris.
— β alnifolium (Guss.)
1697 Boccone – 1826 Presl – 1827 Gussone.
— γ Soluntinum (Tod.)
1868 Todaro in Ind. Sem. Horti Pan.
— δ laciniatum (W.)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1807 Bivona – 1826 Presl – 1830 Tenore.

2496 Erodium malachoides (L.) W. R
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1798 Savi.

2497 Erodium gruinum (L.) Ait.
1800. Griolet. Cfr. Gennari 1857 1827 Gussone.

2498 Erodium Botrys (Cav.) Bert.
1697 Boccone – 1818 Sebastiani e Mauri – 1819 Bertoloni.

2499 Erodium ciconium (L.) W.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1697 Boccone – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

2500 Erodium alpinum (Burm. f.) L'Hérit.
1723 Micheli in Tilli – 1820 Tenore – 1847 Orsini, Ottaviani, Mauri in Bertoloni VII

2501 Erodium moschatum (Burm. f.) L'Hérit. R
1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1798 Savi.

2502 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

35/0018-170

1550 Cibo – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

— β romanum (W.)

1696 Cupani – 1745 Sabbati – 1806 Bivona – Bernardi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl

— γ chaerophyllum (Cav.)

1864 Saccardo – 1904 Goiran – 1906 Gortani

— δ bipinnatum (Cav.)

1837 Moris – 1872 Marcucci e Caldesi in Parlatore V.

— ε Jacquinianum (F. M. et A.)

1837 Moris – 1848 Grenier e Godron

Pelargonium L'Hérit.

2502[1] Pelargonium zonale (L.) W.

Del Capo; coltivato dalla metà del settecento assai comunemente e in numerose varietà e quasi naturalizzato nel mezzodì.

1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1901 Micheletti in Bull. Soc. bot. ital. (naturalizz.)

2502[2] Pelargonium inquinans (L.) Ait.

Come il precedente.

1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1899 Sauvaigo (naturalizz.)

2502[3] Pelargonium cucullatum (L.) Ait.

Come i precedenti.

1801 Bonato – 1806 Zuccagni – 1901 Micheletti l.c. (naturalizz.)

2502[4] Pelargonium radula Ait.

Come i precedenti, ma non naturalizzato

1798 Farsetti – 1801 Bonato

1793 Zuccagni

2502[5] Pelargonium odoratissimum (L.) W.

Come i precedenti; ma non naturalizzato.

1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1801 Bonato.

2502[6] Pelargonium capitatum (L.) W.

Come i precedenti, ma non naturalizzato

1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1801 Bonato.

2502[7] Pelargonium triste (L.) W.

Come i precedenti, ma non naturalizzato.

1662 Dalla Torre – 1713 Tita – 1760 Allioni – 1780 Farsetti.

Oxalis L.

2503 Oxalis Acetosella L.

1558 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

2504 Oxalis cernua Thunb.

Del Capo; già coltivata in molti giardini ed ora qua e là naturalizzata.

1796 Zuccagni – 1821 Gussone – 1845 Tenore – Naturalizzata: 1824 Viviani – 1837 Moris – 1844 Bernard in Gren. Godr. I. 1872 Parlatore; Marsilly.

2505 Oxalis corniculata L.

1415 Rinio – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1640 Castelli – 1745 Séguier

— β purpurea Parl.
1872 Parlatore — 1896 D. Savardo in Le piant. spont. Ott. bot. Padov. — 1898 Govran, De Boriy in Bolzn.
— γ stricta (L.)
1592 Cibo — 1785 Allioni — 1802 Suf fren — 1815 Savi — 1822 Bellini

2505¹ Oxalis violacea L.
Dell'America boreale; coltivata già nei giardini ed ora qua e là avventizia.
1725 Zuccagni — 1801 Bonato — avventizia: 1895 Béguinot in Bull. Soc. bot. ital. — 1904 Govran

2505² Oxalis humilis Thunb.
Del Capo, ora avventizia in pochi luoghi. Restituire probabilmente a questa specie (coltivata sotto il nome di O. floribunda o purpurea) le indicazioni di Bertoloni, Desf. spectat. in Bull. Nat. di Siena 1898 p. 49 e 73 / 1899 Zodda l. c.

Linum (Tourn.) L.

2506 Linum catharticum L.
1713 Tilli — 1723 Tilli — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1798 Savi.

2507 Linum decumbens Desf.
1696 Cupani — 1810 Raffeneau — 1826 Presl.

2508 Linum perenne L.
1884 C. P. G. (probabilm. è la var β; cfr. Gotom 1906.
— β alpinum (L.)
1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1824 (1742 Zannoni - Morte) Cornelli — 1827 Brocchi
— γ punctatum (Presl)
1696 Cupani — 1822 Presl — 1827 Guthnick
— δ austriacum (L.)
1827 Guthnick — 1829 Tenore — 1844 De Notaris
— ε Tommasinii (Rchb.)
1837 Tommasini in Bertoloni III, 540. Cfr. Marchesetti 1896.
— ζ collinum (Guss.)
1844 Gussone.

2509 Linum usitatissimum L. R
1551 Aldrovandi — 1554 Matthioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1726 Zannichelli
— β ambiguum (Jord.)
1850 c. Kralik — 1856 c. Revelière. Cfr. Rouy IV.
— γ cribrosum (Rchb.)
1844 Gussone — 1853 Tommasini. Cfr. Freyn 1877.
— δ angustifolium (Huds.)
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1827 Guthnick; Moris.

35/0018-171

— ε siculum Presl.
1826 Presl — 1850 c. Kralik. Cfr Rouy IV.

2510 Linum narbonense L.
1745 Séguier — 1802 Suffren — 1806 Sternberg — 1844 De Notaris — 1855 Brumati in Pirona — 1867 Ardoino.

2511 Linum viscosum L.
1532 Cibo — (+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni.

2512 Linum tenuifolium L.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1697 Boccone — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β salsoloides Lam.
1867 Ardoino — 1872 Barla, Gentile, Caldesi ecc. in Parlatore V.

2513 Linum maritimum L.
1585 Durante — 1726 Zannichelli — 1798 Savi — 1802 Suffren
(1565 Mattioli)

2514 Linum Muelleri Moris
1828 Moris — 1872 Müller, Gennari in Parlatore V.

2515 Linum gallicum L.
1550 Cibo — (1595 Pona) 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1819 Bertoloni.

2516 Linum strictum L.
1723 Micheli in Tilli — 1785 Allioni — 1805 Re — 1816 Nova e Balbis — 1822 Presl — 1828 Biasoletto. Cfr. Freyn. 1877.
— β corymbulosum (Rchb.)
2 (1844 Gussone; De Notaris 1872 Parlatore V
1 (1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr Freyn. 1877

2517 Linum nodiflorum L.
1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1772 Scopoli — 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini

2518 Linum flavum L.
1802 Suffren — 1835 Comolli — 1855 Pirona
(1785 Allioni).
— β campanulatum (L.)
1678 Boccone 1785 Allioni — 1819 Bertoloni — 1829 Tenore — 1844 De Notaris.
— γ capitatum (Kit.)
1723 Micheli in Tilli — 1827 Brocchi. 1829 Tenore.

2518' Linum pubescens Soland.
Della Grecia ed Oriente, indicato in Sicilia; probabilmente avventizio 1826 Presl.

Radiola (Dill.) Roth

2519 Radiola linoides Roth.
1729 Micheli — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1819 Bertoloni.

Fam. 86' Tropaeolaceae

Tropaeolum L.

2519' Tropaeolum majus L.
Originario del Perù; fu introdotto, prima che altrove, in Italia sulla fine del cinquecento (Linneo, Codex p. 355 lo nota in Europa solo nel 1684)
1553 1565 Michiel 1596 Franc. Malocchi. Cfr. Targ. Tozz. Cenni introd. piante — 1642 Veslingio — 1717 Patarol — 1713, Tita

Fam. 87 Zygophyllaceae

Fagonia (Tourn.) L.

2520 Fagonia cretica L.
1806 Bivona — Bernardi — 1822 Presl — 1827 Gussone — 1853 Grech-Delicata.

Zygophyllum L.

2521 Zygophyllum Fabago L.
1563 Michiel 1606 Colonna — 1837 Moris — 1872 Gennari in Parlatore V.

Tribulus (Tourn.) L.

2522 Tribulus terrester L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli

Péganum L.

2523 Peganum Hármala L.
1565 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1815 Tenore — 1867 Boissier Fl. Orient. I.

Fam. 88 Rutaceae

Ruta (Tourn.) L.

1676 Bouone
2524 Ruta chalepensis L.
1735 Micheli 1785 Allioni — 1842 Puccinelli — 1844 De Notaris. 1819 Bertoloni
— β bracteosa (DC.)
1696 Cupani — 1798 Savi — 1826 Presl — 1827 Moris; Gussone.
1651 Erbario messinese. Cfr. Zodda.

2525 Ruta cortica DC.
1697 Bouone — 1824 DC. Prodr. I — 1837 Moris. 1821 Salzmann in Flora —

2526 Ruta montana (L.) Mill.
1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis — 1872 Molineri, Figari in Parlatore V.

2527 Ruta graveolens L. R
1415 Rinio 1550 Petroli Cibo — 1551 Alberti II — 1554 Mattiolo — 1561 Anguillara — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren — 1806 Sternberg

2528 Ruta patavina L.
1726 Micheli in Zannichelli — 1829 Micheli — 1823 Romano 1806 Sternberg — 1822 Pollini

35/0018-172

Dictámnus L.

2529 Dictamnus albus L.

1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Léguier – 1822 Pollini.

Citrus L.

2530 Citrus medica L. R

Originario dall'India or., ma coltivato già all'epoca romana.

1415 Rinio 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1642 Veslingio

— β Limon (L.)

1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1642 Veslingio

2531 Citrus Aurantium L. R

Come il precedente.

1415 Rinio 1550 Petroff. Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1642 Veslingio

— β nobilis (Lour.)

Originario della Cina e Cocincina, importato nel 1805 in Inghilterra e successivamente a Metta e Palermo; nel 1816 da Palermo a Napoli (March. Ruffo) e nel 1824 a Firenze. Cfr. Targioni Tozzetti, Cenni introd. piante.

— γ Bergamia (Risso)

1646 Ferrari – 1708 Volkmar, Hesperid. 1822 Pollini – 1801 Bonato

— δ Limetta (Risso)

1646 Ferrari – 1793 Zuccagni

Questa e le seguenti sembrano varietà culturali:

— ε Bigaradia (Lois.)

1554 Mattioli (Citroni) – 1646 Ferrari 1793 Zuccagni – 1801 Bonato

— ζ grandis L.

1551 Aldrovandi – 1646 Ferrari – 1793 Zuccagni – 1801 Bonato

— δ Lumia Risso

1646 Ferrari (1793 Zuccagni) – 1801 Bonato

— ι Limonia-citrata-aurantia P. Nati

1644 Panciatichi. Cfr. P. Nati, Florentina phytol. obs. (La bizarria). Flor. 1674. – 1801 Bonato.

Fam. 89 Simarubaceae

Ailantus Desf.

2532 Ailantus glandulosa Desf.

Originario della Cina ed isole Molucche; importato a Londra intorno 1750, di qui a Padova c. 1760 e quindi diffuso in molti luoghi d'Italia e qua e là perfettamente naturalizzato. Cfr. Savardo in Atti Acad. Padova, 1890.

1760 Marsili – 1786 Savi. Cfr. Savi 1801 – 1796 Zuccagni; Farsetti (Rhus Vernix) – 1801 Bonato – 1864 Savardo – 1904 Goiran

2532' Ailantus excelsa Roxb.

Oriundo delle Indie or., coltivato nel Napolitano insieme al precedente.

1903 L. Marcello, in Boll. Soc. Nat. di Napoli.

Cneorum L.

2533 Cneorum tricoccum L.
1551 Aldrovandi II
1785 Allioni — 1833 Giuli in Bertoloni I. — 1731 L. Sabbati.

Fam. 90 Meliaceae

Melia L.

2534 Melia Azedarach L.
Originaria dell' Himalaja, Introdotta e coltivata fino dal cinquecento, incontrasi talora avventizia.
1550 Petri Cibo — 1551 Aldrovandi — 1565 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1869 Savardo e Visiani.

Fam. 91 Malvaceae

Málope L.

2535 Malope malachoides L.
1674 Bocone — 1675 Zanoni — 1696 Cupani — 1804 Savi

Althaéa (Tourn.) L.

2536 Althaea hirsuta L.
1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1789 Ucria.

2537 Althaea cannabina L.
1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli.

— β narbonensis (Pourr.)
1838 Barbieri — 1847 Bertoloni VII.

2538 Althaea officinalis L. R.
1415 Rinio
1550 Petri Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari

— β taurinensis (DC.)
1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1822 Pollini — 1825 Re.

2539 Althaea rosea (L.) Cav. R (*)
Originaria d'Oriente, ma coltivata già fino dall' ~~cinquecento~~ era romana e spesso qua e là naturalizzata.
1550 Petri Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1822 Pollini — 1864 Savardo.

2540 Althaea pallida W. et K.
1822 Pollini — 1857 Zersi — 1904 Goiran.

2540' Althaea ficifolia (L.) Cav.
Originaria della Russia e coltivata dal cinquecento come la precedente
1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1864 Savardo.

Lavatéra (Tourn.) L.

2541 Lavatera arborea L.
1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1735 Micheli — 1785 Allioni

(*) Figurata nei dipinti Pompejani. Cfr. Cornes Enum. delle piante rappres. nei dip. Pomp. Napoli 1880.

35/0018-173

2542 Lavatera cretica L.
(+1673) Barrelier ed. 1714 – 1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Tenore – 1826 Guss. e Presl

2543 Lavatera olbia L.
1550 Cibo – 1640 Castelli – 1696 Cupani – 1785 Allioni
– β hispida (Desf.)
1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl, Guss.

2544 Lavatera flava Desf.
Il tipo è proprio della Tunisia.
– β agrigentina (Tineo)
1696 Cupani – 1674 Bocone – 1817 Tineo – 1821 Guss.

2545 Lavatera thuringiaca L.
1816 V. Brigant. – 1826 Guss. – 1855 Pirone

2546 Lavatera punctata All.
1563 Cesalpino – 1789 Allioni; Savi – 1820 Tenore.

2547 Lavatera maritima Gouan
1785 Allioni – 1826 Badaro in Moretti – 1837 Moris – 1844 De Notaris.
– β bicolor (Shuttl.) Rouy
1897 de Coincy in Rouy IV. Cfr. Bertrat III.

2548 Lavatera triloba L.
1827 Moris – 1872 Thomas, Marcucci, Gennari ecc. in Parlatore V.
– β pallescens (Moris)
1837 Moris

2549 Lavatera trimestris L.
(+1711) Cupani, ed. 1713 – 1785 Allioni – 1826 Badaro in Moretti; Presl – 1828 Guss.

Malva (Tourn.) L.

2550 Malva cretica Cav.
1820 Tenore – 1826 Guss.
– β althaeoides (Cav.)
1820 Fiorini-Mazzanti – 1826 Presl.

2551 Malva moschata L.
1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino – 1606 Colonna – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria.
– β geranifolia (J. Gay)
1901 Fiori (da ricercarsi)
– γ Ortiniana (Ten.)
1835 Tenore.

2552 Malva Alcea L.
1532 Cibo – 1554 Matthioli – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1785 Allioni
– β multidentata Koch
1830 Reichenbach Fl. germ. excurs.
1897 Rouy IV.

— γ italica (Pollini)
1816 Pollini — 1842 Trevisan — 1844 Cesati
— δ fastigiata (Cav.)
1816 Pollini — 1550 Cibo — 1754 Séguier
— ε ribifolia (Viv.)
1825 Viviani — 1897 Rouy IV.

2553 Malva silvestris L. R
1550 Petroti Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante
— β mauritiana (L.)
1820 Tenore — 1828 Gussone — 1837 Moris
— δ ambigua (Guss.)
1828 Gussone
— ε orbicularis Deth.
1903 Strobl

2553' Malva crispa L.
Originaria dell'Europa sett. e Russia. Coltivata fino dalla seconda metà del cinquecento ed ora quasi naturalizzata in più luoghi dell'alta Italia.
1591 Cortuso — 1642 Vestingio — 1896 Sauardo! (Vittorio) — 1904 Goiran — 1906 Gortani

2554 Malva nicaeensis All.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Acria
1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Presl

2555 Malva rotundifolia L R
1550 Petr. Cibo — 1745 Séguier — 1802 Suffren — 1820 Moricand.

2556. Malva pusilla With.
1847 Moretti in Bertoloni VII — 1853 Rota — 1869 Vissani e Sauardo.

2557. Malva parviflora L.
1826 Presl — 1828 Gussone — 1837 Moris
— β microcarpa (Desf.)
1844 De Notaris — 1860 Carnel — 1867 Ardoino.

2557' Malva Sherardiana L.
2 (1884 Cesati in C. P. G. (avventizia?)
1 (Oriunda di Grecia e Macedonia, coltivata e qua e là avventizia
1793 Zuccagni; Tineo — 1802 Rodati — 1812 Bonato — 1723 Tilli)

Abutilon (Tourn.) L.
2558 Abutilon Avicennae Gaertn.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1566 Calzolari — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.

Hibiscus L.
2559 Hibiscus syriacus L.
Oriundo dell'Armenia e Caucasia; coltivato dal seicento e sempre più diffuso e qua e là naturalizzato.
1642 Vestingio — 1660 Dalla Torre — 1701 Martini — 1769 Agosti
1802 Suffren — 1812 p. 5 (nota) Pollini — 1864 Sauardo.

2560 Hibiscus Trionum L.
1532 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante

35/0018-174

2561 Hibiscus roseus Thore
1563 Cesalpino — 1701 Mattioli — 1726 Zannichelli
— 1735 Micheli — 1804 Savi

2562 Hibiscus pentacarpos L.
1726 Zannichelli — 1735 Micheli —
1802 Saffren — 1804 Savi.

Gossypium L.

2563 Gossypium herbaceum L. R
Probabilmente oriundo delle Indie
orient., coltivato fino dal sec.
XI in Sicilia, ma noto e adoperato anche dai romani. Cfr. Targ. Tozz. 1853
1415 c. Rinio — 1558 Mattioli — 1583
Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani
— β hirsutum (L.)
1789 Ucria — 1798 Farsetti

Fam. 92 Tiliaceae

Tilia (Tourn.) L.

2564 Tilia platyphylla Scop. R
1563 Cesalpino — 1754 Séguier —
1822 Pollini — 1801 Savi.

2565 Tilia vulgaris Hayne R
1842 Tommasini, Narducci in Bertoloni
V — 1844 De Notaris — 1853 Rota

2566 Tilia cordata Mill.
1532 Cibo — 1562 Mattioli — 1566
Celsolari — 1723 Micheli in Tilli —

2567 Tilia americana L.
Dell'America settentrionale, coltivata
fino dall'ultimi anni principio dell'ottocento.
2 (1812 Bonato — 1815 Biroli —
1 (1798 D. Pascal Elench. pl. Horti Parm.
— β truncata (Spach) (γ, ε, ζ)
Coltivata, come le seguenti, solo negli
ultimi trent'anni.
— γ laxiflora (Michx)
— δ pubescens (Ait.
1815 Biroli
— ε floribunda (A. Br.)
— ζ flavescens (A. Br.)

2568 Tilia alba Ait.
Dell'America settentr., coltivata
dal principio dell'ottocento
1812 Bonato —

2569 Tilia tomentosa Moench
2 (1812 Bonato — 1845 Tenore
1 (Dell'Ungheria e Turchia, coltivata
fino dal principio dell'ottocento.

Fam. 93 Euphorbiaceae

Euphorbia L.

2570. Euphorbia nutans Lag.
Originaria dell'America bor. e dell'Equa-

tore; coltivata in talun orti botanici ed ora naturalizzata in moltissimi luoghi (1)

1752 Sabbati — 1806 Zuccagni — 1814 Pollini — Naturalizzata: 1816 Pollini — 1825 Lanfossi — 1826 Presl — 1828 Gussone — 1880 Sacardo

2571 Euphorbia maculata L.
Originaria e naturalizzata come la precedente.
1875 Levier — 1876 Canepa — 1888 Rostetti — 1898 Sommier. Cfr. Chiovenda in Bull. Soc. bot. ital. 1895 e Baroni Suppl. Fl. Tosc. — 1901 e 1907 Fiori — 1904 Goiran — 1906 Gortani.

2572 Euphorbia prostrata Ait.
2 { 1827 Gussone — 1868 Pedicino; Sanguinetti. Cfr. Chiovenda l.c. — 1904 Goiran —
1 { Originaria e naturalizzata come la precedente —

2573 Euphorbia Engelmanni Boiss.
Del Cile; naturalizzata, ma finora meno diffusa delle precedenti.
1872 Goiran. Cfr. Chiovenda l.c. e 1897 — 1901 Fiori II (Da confermarsi)

2574 Euphorbia Chamaesyce L. R
1532 Cibo — 1551 al Durandi II — 1563 Cesalpino — 1565? Mattioli — 1620 C. Bauhin — 1640 Castelli — 1726 Zannichelli.

2575 Euphorbia humifusa W.
Nativa dell'Asia temperata —
1855 Salle in Grenier e Godron III — 1883 Caldesi. Cfr. Thell. l.c. — 1887 Borzì in Malp. — 1895 Chiovenda l.c. — 1897 Goiran — 1901 Fiori — 1906 Gortani

2576 Euphorbia Peplis L.
1532 Cibo — 1551 al Durandi II — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1585 Durante — 1631 Donati — 1640 Castelli.

2577 Euphorbia Lathyris L. R
1415 Rinio — 1532 Cibo — 1551 al Durandi II — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1822 Pollini.

2578 Euphorbia palustris L.
1550 Cibo — 1551 al Durandi II — 1583 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1802 Suffren.

2579 Euphorbia ceratocarpa Ten.
1696 Cupani — 1811 Tenore — 1826 Gussone
1651 Erb. Messinese. Cfr. Zodda.

2580 Euphorbia Bivonae Steud.
1697 Bonone — 1806 Bivona — Bernardi

---

(1) Per questa e le seguenti specie della sez. Chrisophyllum cfr. φ A. Thellung (in Bull. Herb. Boiss. 1907) che ne dà pure gli habitat in Italia.

φ Chiovenda (in Bull. Soc. bot. ital. 1895) e

35/0018-175

— β papillaris (Jan)
1826 Jan — 1862. Boissier in DC Prodr. XV.

— γ melitensis (Parl.)
1853 Grech-Delicata — 1867 Gulia in Parlatore IV.

2581 Euphorbia spinosa L.
1532 Cibo — 1551 Al Drovandi II 1563 Cesalpino — (+1673) Barrelier, ed 1714 — 1723 Tilli — 1735 Micheli.

2582 Euphorbia epithymoides L.
1606 Colonna — 1648 Boccone 1772 Scopoli — 1842 Tommasini, Jan, Berini e Boumat. in Bertoloni V.

— β fragifera (Jan)
1826 Jan

— γ Gasparrinii (Boiss.)
1832 Gussone — 1862 Gasparrini in DC. Prodr. XV — 1867 Tineo, Todaro in Parlatore IV.

— δ samnitica Fiori.
1901 Fiori II.

— 2 verrucosa (Lam.)
2 { 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1804 Bertoloni — 1816 Nocca e Balbis
1 { 1532 Cibo — 1551 Al Drovandi II 1563 Cesalpino

— ζ flavicoma (DC.)
1844 De Notaris — 1867 Ardoino

2583 Euphorbia Apios L.
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1585 Durante — 1830 Tenore.

2584 Euphorbia carniolica Jacq.
1595 Porta — 1820 Moretti — 1816 Pollini — 1830 Tenore — 1842 Bertoloni

2585 Euphorbia dulcis L.
1551 Al Drovandi II 1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1816 Nocca e Balbis — 1822 Pollini

— β angulata (Jacq.)
1853 Ambrosi in Bertoloni IX — 1867 Tommasini in Parlatore IV.

2586 Euphorbia hyberna L.
Il tipo è proprio dell'Europa occid.

— β insularis (Boiss.)
1824 Viviani — 1827 Moris — 1844 De Notaris.

— γ Gibelliana (Peola)
1892 Peola in Malpighia.

— δ Canuti (Parl.)
1867 Ardoino; Canut in Parlatore IV.

2587 Euphorbia pilosa L.
1583 Cesalpino — 1697 Cupani — 1785 Allioni.

2590 Euphorbia acheronocarpa Guss.
1674 Bocone – 1821 Guttone

2588 Euphorbia corallioides L.
1697 Cupani – 1811 Tenore – 1827 Guttone

2589 Euphorbia pubescens Vahl
1550 Cibo – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1798 Savi – 1820 Tenore 1827 Guttone.

2591 Euphorbia cuneifolia Guss.
1826 Guttone – 1830 Tenore – 1834 Salis – Marschling.

2592 Euphorbia platyphylla L. R
1550 Cibo – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Suffren – 1805 Re 1819 Bertoloni.
— β stricta (L.
1832 Guttone – 1842 De Notaris, Atti in Bertoloni V – 1864 Saccardo.

2593 Euphorbia helioscopia L. R
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1595 Pona 1640 Castelli.
— β pterantha Borbás 1904 Goiran (Append.)

H. Veron.

2594 Euphorbia pterococca Brot.
1821 Salzmann in Flora – 1826 Guttone – 1842 Badaró in Bertoloni V.

2595 Euphorbia Peplus L.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Daraste – 1745 Séguier
— β peplioides (Gouan)
1696 Cupani – 1811 Tenore – 1827 Guttone – 1867 Ardoino.

2596 Euphorbia falcata L.
1550 Cibo – 1583 Cesalpino 1696 Bocone – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier.
— β vernalis Fiori
1901 A. Vaccari in Fiori II.

2597 Euphorbia sulcata DeLens
1867 Cesati in Parlatore IV – 1901 E. Ferrari in Fiori II.

2598 Euphorbia exigua L.
1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

2599 Euphorbia aleppica L. R
1685 Triumfetti – 1735 Micheli – 1785 Allioni 1842 Molineri, Guttone in Bertoloni V.

2600 Euphorbia taurinensis All.
1785 Allioni – 1805 Re – 1842 Molineri, Balbis in Bertoloni V

35/0018-176

2601 Euphorbia segetalis L.
1565 Mattioli — 1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis — 1842 Bertoloni V
— β portlandica (L.)
1898 Foucaud e Simon.
— γ pinea (L.)
(+1673) Barrelier, ed 1714 — 1742 Zanoni e Monti — (1735 Micheli) — 1789 Ucria.

2602 Euphorbia terracina L.
1651 Erb. Messinese. Cfr. Zodda
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1789 Ucria — 1807 Bivona — Bernardi — 1808 Savi.
— β obliquata (Forsk.)
1901 Fiori II.

2603 Euphorbia Lagascae Spr.
1858 Moris — 1884 Barbey.

2604 Euphorbia dendroides L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — (+1673) Barrelier ed. 1714.

2605 Euphorbia biumbellata Poir.
1827 Gussone — 1842 Turio in Bertoloni V — 1844 De Notaris.

2606 Euphorbia Pityusa L. R
1674 Bocone — 1808 Savi — 1844 De Notaris
1563 Cesalpino — 1858 Moris.
— β bonifacensis (Req.)
1855 Grenier e Godron — 1858 Moris

— γ Cupani (Guss.)
1696 Cupani — 1827 Gussone — 1858 Moris
2606' Euphorbia lugubris Chab.
1900 Chabert in Journ. de Botanique.
2607 Euphorbia Paralias L.
1415 Rinio
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1631 Donati — 1640 Castelli.

2608 Euphorbia biglandulosa Desf.
(+1711) Cupani, ed. 1713 — 1826 Gussone — 1830 Tenore.
1651 Erb. Messinese. Cfr. Zodda.

2609 Euphorbia Myrsinites L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1640 Castelli — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1789 Ucria
— β corsica (Req.)
1825 Requien

2610 Euphorbia Séguieriana Neck
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Porta — 1745 Séguier.
— β japygica (Ten.)
1830 Tenore
— γ Gerardiana (Jacq.)
1745 Sabbati
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1816 Nocca e Balbis.
2611 Euphorbia Barrelieri Savi
(+1673) Barrelier ed. 1714 — 1735 Micheli
1808 Savi — 1811 Tenore
— β carnica (Boiss.)
1802 Suffren — 1820 Moretti — 1855 Pirona

2611 Euphorbia Valliniana Belli
1903 Vallino in S. Belli, Annali di Bot. Roma, I.

2612 Euphorbia Gayi Salis
1834 Salis-Marschlins - 1855 Kralik e Grenier-Godron III.
— β variabilis (Cesati)
1834 Salis-Marschlins - 1840 Cesati.

2613 Euphorbia Cyparissias L.
1532 Cibo - 1551 al Dorvandi II 1554 Mattioli - 1563 Cesalpino - 1560 Calzolari - 1595 Porta - 1726 Zannichelli - 1745 Séguier.

2614 Euphorbia Esula L.
1551 al Dorvandi II 1697 Bouone - 1785 Allioni - 1798 Savi 1808 Bitoli - 1842 Puccinelli - 1882 Bolzon. Cfr. Goiran 1897. I.
— β Triumfetti (Bertol.)
1685 Trionfetti - 1842 Gozzi in Bertoloni V.
— γ Sarati (Ardoino)
1867 Sarato in Ardoino.

2615 Euphorbia virgata W. et K.
1855 Pirona - 1896 Marchesetti
— β montana Rchb.
1842 Tommasini e Biasoletto in Bertoloni V

2616 Euphorbia serrata L.
1785 Allioni - 1830 Tenore - 1844 De Notaris - 1858 Moris - 1867 Ardoino.

2617 Euphorbia amygdaloides L.
1532 Cibo - 1551 al Dorvandi II 1563 Cesalpino - 1606 Colonna - 1726 Zannichelli - 1745 Séguier - 1802 Suffren; Marzari.
— β semiperfoliata (Viv.)
1824 Viviani - 1827 Moris - 1834 Salis-Marschlins.

2618 Euphorbia Characias L. R.
1554 Mattioli - 1551 al Dorvandi II 1561 Anguillara - 1563 Cesalpino - 1804 Bertoloni.
— β veneta (W.)
1805 Wulfen - 1896 Marchesetti
— γ melapetala (Gasparr.)
1830 Gasparrini, Ind. sem. H. Bouadif. - 1832 Gussone

Andrachne L.
2619 Andrachne telephioides L.
1415 Pirio 1697 Bouone - 1830 Tenore - 1550 Cibo - 1853 Grech-Delicata

Chrozóphora Neck.
2620 Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.
1532 Cibo - 1551 al Dorvandi II 1554 Mattioli - 1563 Cesalpino - 1585 Durante - 1640 Castelli.

35/0018-177

Mercurialis (Tourn.) L.

2621 Mercurialis corsica Coss.
1828 Duby – 1834 Salis-Marschlins
1848 Cosson, Not. pl. critiq. de France –

2622 Mercurialis perennis L.
1550 Petr. Cibo – 1554 Mattioli – 1563
Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595
Pona – 1696 Cupani – 1745 Séguier.
— β ovata (Stern. et Hoppe)
1550 Petr. Cibo – 1815 Sternberg e Hoppe
– 1835 Tenore – 1853 Ambrosi –
1864 Sauardo.

2623 Mercurialis annua L. R
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1554 Mattioli – 1551 Aldrovandi – 1561
Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585
Durante – 1696 Cupani
— β ambigua (L.)
1844 De Notaris – 1854 Zanardini,
1842 Trevisan Camilli in Bertoloni X –
1855 Soleirol in Grenier Godron III.

Acalypha L.

2624 Acalypha virginica L.
Nativa della Virginia e Carolina, coltivata già dal settecento e naturalizzata ora in molti luoghi d'Italia.
1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni.
Naturalizzata: 1812 Pollini, p. 5 nota –
1842 Manganotti. Cfr. Goiran 1897 – 1850
Passerini. Cfr. C. P. G. – 1882 Arcangeli

1898 Traverso; Rogger, Fiori. Cfr. Bolzon Suppl.
Fl. ven. –

Ricinus (Tourn.) L.

2625 Ricinus communis L. R
2 1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1554 Mattioli – 1563
Cesalpino – 1585 Durante
1 Originario probabilmente delle Indie orient., ma noto ai romani e coltivato ab antico e spesso naturalizzato nel mezzodì.
— β africanus (W.)
1640 Castelli – 1827 Moris – 1844
Gussone

fam. 94 Callitrichaceae

Callitriche L.

2626 Callitriche palustris L.
1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri
– 1826 Gussone – 1833 Bertoloni I.
— β verna (L.)
1606 Colonna – 1822 Pollini – 1826
Gussone – 1833 Bertoloni I – 1858 Moris.
— γ obtusangula (Le Gall.)
1867 Benari, Levier, Archerson in
Parlatore IV – 1906 Gortani
— δ hamulata (Kütz.)
1798 Savi – 1822 Pollini – 1842
Puccinelli – 1857 Ambrosi.
— ε pedunculata (DC.)
1826 Gussone – 1830 Tenore –
1833 Bertoloni I.

— β bifida (L.)
1787 Giulio Candida in Petagna — 1826 Guttone.
— γ truncata (Guss.)
1826 Guttone — 1833 Bertoloni I — 1867 Denarì in Parlatore
— δ capillaris (Parl.)
1867 Jennarì in Parlatore.

Fam. 95 Buxaceae.

Buxus (Tourn.) L.
2627 Buxus sempervirens L. R
1550 Cibo — 1551 Al Durand — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1745 Séguier.

2628 Buxus balearica W.
Delle isole Baleari e Spagna; coltivato fino dal principio dell'ottocento e raramente naturalizzato.
1806 Zuccagni — 1812 Bonato — 1815 Biroli Naturalizzato: 1866 Jennari.

Fam. 96 Coriariaceae

Coriaria (Niss.) L.
2629 Coriaria myrtifolia L.
1785 Allioni — 1826 Badarò in Moretti — 1844 Risso; De Notaris — 1867 Ardoino.

Fam 97. Empetraceae

Empetrum (Tourn.) L.
2630 Empetrum nigrum L.
1565 Mattioli — 1785 Allioni — 1808 Arcoli — 1815 Savi.

Fam. 98. Ericaceae

Hypopitys (Dill.) Adans
2631 Hypopitys multiflora Scop.
1785 Allioni — 1806 Savi — 1822 Pollini 1773 Vitman — 1853 Rota.

Pirola (Tourn.) L.
2632 Pirola uniflora L.
1595 Pona — 1745 Tilli — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni.

2633 Pirola secunda L.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Steffen

2634 Pirola minor L.
1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1802 Steffen — 1816 Nova e Baldini.

2635 Pirola rotundifolia L.
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier
— β media (Sw.)
1562 Mattioli — 1839 Montini, Parolini in Bertoloni IV

35/0018-178

2636 Pirola chlorantha Sw.
1844 Cesati – 1853 Rota – 1855 Pirona – 1872 Marsilly –

Rhododendron L.

2637 Rhododendron hirsutum L.
1583 Michiel 1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2637¹ Rhododendron intermedium Tausch (R. hirsutum × ferrugineum)
1851 Heufler in Hausmann – 1893 Gelmi – 1905 Pampanini in Fl. it. exsicc. sub n.º 125.

2637² Rhododendron halense Grembl. (R. super-ferrugineum × hirsutum)
1899 Sauter.

2638 Rhododendron ferrugineum L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

Rhodothamnus Rchb.

2639 Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Rchb.
1651 J. Bauhin-Cherler – 1726 Zannichelli – 1729 Micheli – 1745 Séguier – 1802 Suffren.

Loiseleuria Desv.

2641 Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
1697 Bouvre – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1822 Pollini.

Phyllodoce Salisb.

2640 Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
1827 J. Host in N. T. Host Fl. Austr. II ed. vol. I p. 473 – 1893 De Toni Ett. Fl. Canal del Ferro (specie secondo Gortani, dubbia come triulana e perciò da confermarsi)

Erica (Tourn.) L.

2642 Erica scoparia L.
1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1798 Tavi – 1827 Moris.

2643 Erica arborea L.
1550 Petroll. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.
(+1320) Crescenzio, edit. 1471

2644 Erica vagans L.
Il tipo è proprio dell'Europa occid.
— β verticillata (Forsk.)
1843 Koch – (+1866) Gussone. Cf. C.P.G. 1871 Tommasini, Fl. is. Luss. ed. 1895.

2645 Erica multiflora L.
1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1696 Cupani – 1789 Ucria

2646 Erica stricta Donn
1802 Viviani – 1810 Bertoloni – 1830 Tenore – 1834 Salis-Marschlins.

2 2648 Erica carnea L.
1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1735 Micheli – 1745 Séguier.

1 2647 Erica cinerea L.
1785 Allioni – 1809 Vitaliani in Bertoloni IV. – 1844 De Notaris.

Pentapera Klotzsch

2649 Pentapera sicula (Guss.) Kl.
1821 Gussone – 1855 Huet e Gubia
Cfr. Nym. Consp.

Calluna Salisb.

2650 Calluna vulgaris (L.) Salisb.
1532 Cibo – 1554 Matthioli – 1557 Alpino – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli.

Andromeda L.

2651 Andromeda polifolia L.
~~1535 Gesner~~ 1839 Montini in Bertoloni IV – 1844 Cesati – 1851 Facchini e Ambrosi in Hausmann.

Arctostaphylos Adans.

2652 Arctostaphylos Uva-ursi (L.) Spr.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1745 Séguier – 1807 Pollini.

2653 Arctostaphylos alpina (L.) Spr.
1742 Zanoni – Mont. – 1745 Séguier – 1802 Marzari-Pencati – 1885 Allioni.

Arbutus (Tourn.) L.

2654 Arbutus Unedo L.
1415 Rinio 1572 Cibo – 1551 Alpinovandi – 1561 Anguillara – 1565 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.

Oxycoccos (Tourn.) Adans

2655 Oxycoccos quadripetalus Gilib.
1862 Christ, Facchini, Puccinelli, Savi in Bertoloni IV – 1844 Cesati – 1851 Hausmann.
1745 Sabbati.

Vaccinium (Rupp.) L.

2656 Vaccinium Vitis-Idaea L.
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1595 Pona – 1713 Tilli – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2657 Vaccinium uliginosum L.
1563 Cesalpino – 1773 Vitman 1785 Allioni – 1805 Re – 1816 Nocca e Balbis.

2658 Vaccinium Myrtillus L.
1572 Cibo – 1561 Anguillara – 1562 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1713 Tilli.

Fam. 99 Ebenaceae

Diospyros L.

2659 Diospyros Lotus L
Originaria, come pare, dall'Armenia, Persia e China, coltivato già nel cinquecento ed ora qua e là naturalizzato.
Il Lotus di Plinio era per certo il Celtis australis, anche allora coltivato frequentemente in Roma.

35/0018-179

1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1642 Veslingio – 1696 Cupani – 1745 Séguier.

Fam. 100 Styracaceae

Styrax (Tourn.) L.

2660 Styrax officinalis L. R

1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1565 Cesalpino – 1585 Durante.

Fam 101 Primulaceae

Hottonia (Boerh.) L.

2661 Hottonia palustris L

1554 Mattioli – 1565 Cesalpino – 1720 Pontedera – 1754 Séguier – 1802 Suffren; Mayor – 1816 Nocca e Balbis.

Primula L.

2662 Primula acaulis Jacq.

1415 Pisano 1551 Aldrovandi – 1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1592 Colonna – 1595 Pona.

– β Sibthorpii (Hoffmgg)

1876 C. P. G – 1879 Caldesi – 1882 Arcangeli – 1904 Goiran.

– δ purpurascens Zersi.

1857 Zersi – 1858 Porpichal

– δ caulescens Koch

1822 Pollini – 1868 Bertoli – 1825 Re.

2662' Primula digenea Kern.

(P. elatior × acaulis)

1875 Kerner, Oest. bot. Zeitschr.

2663 Primula elatior (L.) Jacq.

1550 Cibo – 1558 Mattioli – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Mayor

– β intricata (Gren. et Godr.)

1867 Ardoino – 1875 Goiran

2663' Primula variabilis Goup.

(P. officinalis × acaulis Kern)

1867 Ardoino – 1875 Goiran

2663² Primula flagellicaulis Kern.

(P. super-acaulis × officinalis Pax)

1888 Porta in Parlatore – Carniol VIII

2663³ Primula ternovana Kern.

(P. acaulis × suaveolens)

1867 Glowacki in Kern. Oest. bot. Zeitschr.

2663⁴ Primula intricata × grandiflora Goir.

1904 Goiran

2663⁵ Primula intricata × officinalis Goir.

1904 Goiran.

2664 Primula officinalis (L.) Jacq.

1551 Aldrovandi II – 1558 Mattioli – 1606 Colonna – 1806 Balbis – 1824 Tenore.

— β pannonica (Kern.)
1882 Gibelli e Pirotta — 1893 Gelmi
in Schrod. Gl. austr. hung.

— γ suaveolens (Bert.)
1606 Colonna — 1735 Micheli 1745 Sabbati — 1804
Bertoloni — 1830 Orsini.

— δ Tommasinii (Gren. Godr.)
1850 Tommasini in Gren. Godron II
1882 Arcangeli.

2664' Primula media Peterm.
(P. elatior × officinalis)
1893 Porta in Gelmi.

2665 Primula farinosa L.
1551 Aldrovandi II
1595 Pona — 1785 Allioni — 1802 Suffren
1808 Biroli.

— β lepida (Duby)
1893 Gelmi

2666 Primula longiflora All.
1785 Allioni — 1834 Comolli. — 1853 Rota.

2667 Primula Palinuri Petagna
1592 Colonna 1747 Sabbati — 1787 Petagna — 1811
Tenore — 1835 Gussone, Giordano in
Bertoloni II.

2668 Primula Auricula L.
1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1585
Durante — 1595 Pona — 1713 Fita — 1726
Zannichelli.

— β Balbisii (Lehm.)
1820 Moretti — 1822 Pollini — 1835
Barbieri, Parolini, Montini in Bertoloni II.

— γ mollis Rch.

2668' Primula mollis (Rchb.)
(P. super-Auricula × viscosa)
1897 Bolzon in Bull. Soc. bot. ital.

2669 Primula carniolica Jacq.
1772 Scopoli — 1797 Host

2669' Primula venusta Host
(P. Auricula × carniolica Kern.)
2(1835 de Welden (?) in Bertoloni II
1(1827 Hladnik in Host. I.

2670 Primula marginata Curt.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli
1867 Ardoino.

2670' Primula pubescens Jacq.
(P. Auricula × viscosa)
1876 C. P. G — 1882 Arcangeli
1853 Rota — 1852 Hausmann

2670² Primula discolor Leyb.
(P. Auricula × oenensis)
1855 Leybold in Flora — 1893 Gelmi.

2671 Primula villosa Wulf
Il tipo è proprio della Stiria e Carinzia

— β cottia (Wid.)
1551 Aldrovandi II
1785 Allioni — 1805 Re.

35/0018-180

— γ viscosa (Vill.)
1723 Tilli — 1820 Moretti
— δ oenensis (Thom.)
1855 Leybold in Flora — 1888 Parlatore-Caruel VIII — 1893 Gelmi.
— ε apennina (Wid.)
2 (1888 Calandrini in Parlatore-Caruel VIII
1 (1860 Caruel (P. villosa)
— ζ pedemontana (Thom.)
1876 C.P.G — 1882 Arcangeli — 1888 Beccari, Ball ecc. in Parlatore-Caruel VIII
— η latifolia (Lap.)
1785 Allioni — 1835 Bertero in Bertoloni II

2672 Primula Allionii Lois
1789 Allioni — 1835 Balbis, Molinari in Bertoloni II

2672' Primula glaucescens × viscosa Fiori
1871 Levier. Cfr. Parl. Caruel VIII.

2673 Primula tirolensis Schott
1876 C.P.G — 1882 Arcangeli — 1888 Ambrosi, Ball ecc. in Parl. Caruel VIII.

2673' Primula juribella Sünderm.
(P. minima × tirolensis)
1889 Sündermann in Oest. bot. Zeitschr. — 1893 Gelmi.
2673² Primula pumila Kern.
(P. minima × spectabilis)
1875 Kerner in Oest. bot. Zeitschr. — 1893 Gelmi

2674 Primula glutinosa Wulf.
1822 Pollini — 1831 Moretti, De Primul. ital. — 1835 Meneghini, Montini ecc. in Bertoloni II.
2674' Primula Floerkeana Schrad.
(P. glutinosa × minima)
1876 C.P.G — 1882 Arcangeli — 1888 Huter, Zimmeter in Parl. Caruel VIII

2675 Primula minima L.
2 (1822 Pollini — 1831 Moretti, De Prim. ital.
1 (+1770) Moren. Cfr. Pollini — 1802 Suffren
1806 Sternberg.

2678. Primula integrifolia L.
1831 Moretti, De Prim. ital. — 1834 Comolli — 1876 C.P.G — 1882 Arcangeli.
2676'. Primula Venzoi Huter
(P. Wulfeniana × tirolensis Hut.)
1873 Huter in Venzo.

2677–78
~~2677~~ ~~2678~~ Primula spectabilis Tratt.
1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1822 Pollini
— β Parlatorii (Porta)
1888 Porta in Parl. Caruel VIII.
— γ baldensis (Goiran)
1886 Goiran in Parlatore-Caruel VIII
— δ Wulfeniana (Schott)
1888 Huter in Parlatore-Caruel VIII
— ε longobarda (Porta)
1888 Porta in Parlatore-Caruel VIII.

~~questi due numeri vanno posti uno sotto il Palla~~

— ζ glaucescens (Moretti)
1822 Moretti — 1834 Comolli.

2678 Primula obovata Huter
(P. Balbisii × tirolensis)
1873 Huter in Oest. bot. Zeitschr. (Da confermarsi)

Vitaliana Sesler (1)
(Douglasia Lindl. e Flor. anal.)

2679. Vitaliana primuliflora Bert.
1750 Sesler in Donati Stor. nat. mar. Adriat. — 1785 Allioni — 1805 Re — 1606 Colonna — 1822 Pollini — 1867 Ardoino.

Androsace (Tourn.) L.

2680. Androsace alpina (L.) Lam.
1768 Turra, ed. 1780 — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1822 Pollini.
— β pedunculata (Clairv.)
(+1854) Montini in Parlat. Carnel VIII
1902 Gortani in Fiori II.
— γ Charpentieri (Heer)
1840 Heer in Heg. Fl. Schweiz. 987
1888 Levier, Franzoni, Ball in Parl. Carnel VIII

— δ Wulfeniana (Koch)
1845 Kellner. Cfr. Parl. Carnel VIII
— ε pubescens (DC.)
1888 Rostan in Parl. Carnel VIII.
— ζ Hausmanni (Leyb.)
1852 Leybold in Flora — 1876 C.P.G. — 1882 Arcangeli — 1893 Gelmi
— η Mathildae (Levier)
1877 Levier in N. Giorn. bot. ital. — 1882 Arcangeli.

2681 Androsace imbricata Lam.
1832 Comolli — 1867 Ardoino — 1876 C. P. G. — 1853 Rota —
— β multiflora (Sand.)
1771 Vandelli fax. plant. — 1835 De Notaris in Bertoloni II

2682 Androsace helvetica (L.) Gaud.
1844 Cesati — 1876 C. P. G. — 1882 Arcangeli. 1837 Sandi
— β Heerii (Koch)
1878 Anzi, Auctar. ad fl. novo-com.

2683 Androsace villosa L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini.
— β Chamaejasme (W.)
1726 Zannichelli — 1822 Pollini — 1824 Comolli — 1853 Rota.

Nota
(1) Il genere Vitaliana fu bensì pubblicato per la prima volta dallo Sesler nel 1750, cioè avanti la classica data Linneana, ma fu pure riprodotto, vivente l'autore, nelle traduzioni tedesca (1853) e francese (1858) della Stor. nat. marina dell'Adriatico di Vital. Donati; quindi anche dopo la ~~[illegible]~~ data 1753 e perciò il nome generico Vitaliana è valido.

(Matth.)

~~Leyd. ex Ard.~~ (Ard.)

~~1822 Moretti — 1824 Casalis~~

2684 Androsace lactea L.

1606 Colonna — 1723 Tilli — 1791 Bellardi — 1822 Pollini (1745 Seguier)

2685 Androsace carnea L.

1785 Allioni — 1805 Re — 1853 Rota

2686 Androsace obtusifolia All.

1595 Pona — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Pollini — 1834 Comolli — 1853 Rota

— β pedemontana (Rchb. fil.)

1820 Biroli — 1855 Rchb. fil. Ic. XVII

2687 Androsace septentrionalis L.

1902 Lino Vaccari in Fiori II.

— β Chaixii (Gren. Godr.)

1867 Ardoino — 1869 Moggridge Contr. Fl. Mont.

— γ elongata (L.)

1696 Cupani — 1825 Guarona

2688 Androsace maxima L.

1565 Matthioli — 1785 Allioni — 1822 Pollini — 1835 Barbieri in Bertoloni II (1)

Cortusa L.

2689 Cortusa Matthioli L.

1532 Cibo — 1565 Matthioli — 1585 Durante — 1713 Tita — 1726 Zannichelli

Soldanella (Tourn.) L.

2690 Soldanella alpina L.

1532 Cibo — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier — 1773 Vitman

— β montana (W.)

1595 Pona — 1822 Pollini — 1844 Cesati

— γ pusilla (Baumg.)

1832 Bertoloni — 1835 Barbieri, Moretti, Meneghini in Bertoloni II — 1844 Cesati

— δ minima (Hoppe) Hornsch. 1862 Pirona mss. in Hort. pat. 1837 Sandri — 1889 Visiani e Saccardo — 1888 Montini, Pirona, Ambrosi in Parl. Carniol. VIII

Cyclamen (Tourn.) L.

2691 Cyclamen neapolitanum Ten.

1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1789 Ucria — 1798 Savi

— β Poli (Delle Chiaje)

1723 Micheli in Tilli — 1824 Delle Chiaje, Mem. sul Ciclamino Napol. — 1829 Tenore.

2692 Cyclamen vernale Mill.

1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1818 Sebastiani e Mauri — 1819 Bertoloni — 1827 Moris

— β Bertolonii Fiori

1835 Macabelli in Bertoloni II

---

(1) Androsace heterophylla Ard. in Rend. Ist. Lomb. 1903, istituita su esempl. incompleti, fu dallo stesso autore poi abolita e riconosciuta come una forma di Saxifraga, vicina a S. exarata. Cf. Ard. in Rend. Ist. Lomb. 1904

2693 Cyclamen europaeum L.
1415 Rinio Petroll. e Cibo
1550 Cesalpino – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1745 Séguier.

Lysimáchia L.

2694 Lysimachia vulgaris L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.

2695 Lysimáchia punctata L.
1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1802 Suffren 1818 Sebastiani e Mauri.

2696 Lysimachia nemorum L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1805 Re – 1827 Gussone – 1834 Comolli.

2697 Lysimachia nummularia L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante.

Trientális L.

2698 Trientalis europaea L.
1797 J. Host in N.T. Host – 1839 Facchini e Tappeiner in Bertoloni IV.

Asterolinum Lk. et Hoff.

2699 Asterolinum Linum-stellatum (Lam.) Duby
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1789 Uerich 1827 Gussone 1835 Biasoletto, Mayer etc. in Bertoloni II

Anagállis (Tourn.) L.

2700 Anagallis arvensis L.
1415 Rinio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante

— β caerulea (Schreb.)
1415 Rinio
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

— γ latifolia (L.)
1785 Allioni – 1858 Moris – 1870 Gennari.

— δ micrantha Gr. et Godr.
1866 Gennari – 1872 Marsilly.

2701 Anagallis linifolia L.
1827 Moris – 1882 Arcangeli.

2702 Anagallis crassifolia Thore
1894 Arcangeli

2703 Anagallis tenella L.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1822 Pollini.

Centúnculus (Dill.) L.

35/0018-182

2704 Centunculus minimus L.
1785 Allioni – 1804 Savi – 1806 Balbis
1729 Micheli –

Glaux (Tourn.) L.
2705 Glaux maritima L.
1785 Allioni – 1835 Beggiato e Zanardini in Bertoloni II – (+1851) Reboul.
Cfr. Parl. Carnel VIII.

Coris (Tourn.) L.
2706 Coris monspeliensis L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria
1804 Savi.

Samolus (Tourn.) L.
2707 Samolus Valerandi L.
1563 Cesalpino – 1565 c. Michiel 1726 Zannichelli –
1785 Allioni – 1802 Suffren.

Fam. 102 Plumbaginaceae

Plumbago (Tourn.) L.
2708 Plumbago europaea L.
1563 Cesalpino – 1565 Michiel 1606 Colonna – 1640
Castelli – 1796 Cupani.

Statice L.
2709 Statice monopetala L.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1824 Viviani
1674 Boccone

2710 Statice ferulacea L.
(+1711) Cupani ed 1713 – 1827 Gussone
– 1837 Tenore in Bertoloni III.

2711 Statice sinuata L.
1599 Imperato – 1696 Cupani – 1723
Tilli – 1867 Sarato in Ardoino.

2712 Statice echioides L.
1723 Micheli in Tilli – 1827 Moris – 1832
Gussone.

2713 Statice Limonium L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1640 Castelli.
– β serotina (Rchb.)
1844 Tineo in Gussone – 1858 Moris
– 1867 Ardoino – 1872 Marsilly.

2714 Statice oleifolia Scop.
1565 Cesalpino + 1726 Zannichelli – 1735 Micheli
1554 Mattioli 1723 Tilli
– β Sibthorpiana (Guss.)
1832 Gussone.
– γ laeta (Moris)
1858 Moris – 1873 C. P. G.
– δ densiflora (Guss.)
1685 Trionfetti – 1697 Boccone – 1826
Jan – 1827 Gussone.
– ε humilis Guss.
1832 Gussone – 1858 Moris

2715 Statice psiloclada Boiss.
1804 Savi – 1827 Gussone – 1860 Carruel
— β intermedia (Salz.)
1842 Gussone.
— γ panormitana (Tod.)
1857 Todaro in Index sem. Hort. panorm.
1873 C. P. G.
— δ gracilis Boiss.
1842 Gussone – 1884 Lojacono.
— ε albida (Guss.)
1842 Gussone – 1847 Calcara.

2716 Statice minuta L.
1873 C. P. G. (γ dissitiflo.) – 1882 Arcangeli.
— β cossyrensis (Guss.)
1842 Gussone.
— γ Sommieriana Fiori.
1860 Carruel – 1902 Sommier in Fiori.
— δ iharimensis (Guss.)
1854 Gussone.
— ε Tenoreana (Guss.)
1854 Gussone – 1873 C. P. G.
— ε* Doriae Sommier
1902 G. Doria in Sommier in Bull. Soc. bot. ital.
— ζ minutiflora (Guss.)
1827 Gussone – 1860 Carruel
— η acutifolia (Rchb.)
1827 Bertoloni in Moris – 1837 Badarò in Bertoloni III.
— θ virgata (W.)
1563 Cesalpino – 1827 Gussone – 1829 Tenore – 1840 Moris.
— ι remotispicula Lacaita
1884 Lacaita in N. Giorn. bot. ital.
— κ reticulata (Rchb.)
1829 Tenore – 1887 Grovey
— λ dubia (Mand.)
1832 Gussone – 1847 Calcara
— μ Calcarae (Tod.)
1827 Gussone – 1881 Todaro in Nyman Consp.
— ν dictyoclada (Boiss.)
1844 Tineo in Gussone – 1858 Moris – 1872 Marsilly
— ξ articulata (Lois.)
1785 Allioni – 1827 Moris – 1834 Salis-Marschlins – 1839 Moris e De Notaris.
— ο cumana (Tenore)
1829 Tenore – 1837 Gussone, Giraldi in Bertoloni III.
— π cordata (L.)
1674 Boccone – 1785 Allioni – 1867 Ardoino
— ρ cancellata (Bernh.)
1837 Gasparrini – 1837 Bernhardi, Tommasini, Visiani in Bertoloni III.

2717 Statice bellidifolia Gouan
1532 Cibo – 1697 Boccone – 1726 Zannichelli – 1735 Micheli.

35/0018-183

Armeria W.

2718 Armeria fasciculata (Vent.) W.
1824 Viviani — 1827 Moris — 1834 Salis-Marschlins.

2719 Armeria Morisii Boiss.
1827 Moris — 1873 C. P. G.
— β Gussonei (Boiss.)
1640 Castelli — 1827 Gussone
— γ macropoda (Boiss.)
1830 Tenore — 1873 C. P. G.

2720 Armeria leucocephala Koch
1827 Soleirol in Loisel. — 1834 Salis-Marschlins — 1872 Marsilly — 1873 C. P. G.
— β Soleirolii (Duby)
1827 Soleirol l. c. — 1834 Salis-Marschlins — 1830 Duby.
— γ procera Boiss.
1834 Salis-Marschlins — 1881 Nyman Consp.
— δ multiceps (Wallr.)
1834 Salis — 1850 Soleirol in Gren. e Godr. II — 1872 Marsilly.

2721 2722 Armeria vulgaris W.
1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli — 1772 Maratti — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β alpina (W.)
1745 Séguier — 1822 Pollini — 1834 Massara
— γ denticulata (Bert.)
1806 Bertoloni — 1835 Colla — 1840 De Notaris — 1860 Caruel

— δ majellensis (Boiss.)
1829 Tenore — 1873 C. P. G. — 1880 Groves. 1583 Cesalpino. Cfr Caruel 1860 —
— ε gracilis (Ten.)
1829 Tenore — 1873 Cesati — 1882 Arcangeli —
— ζ nebrodensis (Guss.)
1842 Gussone — 1873 C. P. G.
— η sardoa (Spr.)
1827 Moris; Sprengel Syst. veg. IV 2 —
— δ seticeps (Rchb.)
1816 Nocca e Balbis — 1852 Rota
— ι marginata Lev.
1888 E. Levier in Proc. verb. Soc. tosc. Sc. nat. Pisa (come var. di A. majell.)
— ϰ plantaginea (W.) [2722]
1785 Allioni — 1897 Penzig — 1899 Palanza

2722' Armeria pubescens Link
Originaria dell'Europa boreale, coltivata assai frequentemente fino dal principio del settecento.
1713 Tita — 1723 Micheli in Tilli — 1760 Allioni
1822 Pollini —

Fam. 103 Oleaceae

Jasminum (Tourn.) L.

2723 Jasminum officinale L.
Oriundo della Persia ecc.; coltivato fino dal cinquecento ed ora del tutto naturalizzato in molti luoghi d'Italia.
1415 Rinaldi 1532 Cibo — 1551 al Drovandi — 1558 Mattioli
1590 Cortuso — 1640 Castelli.

2723 [1] *Jasminum grandiflorum* L.
Del Malabar; Coltivato frequentemente fino dagli ultimi anni del cinquecento.
1590 Costeo — 1640 Castelli — 1715 Tita

2723 [2] *Jasminum nudiflorum* Lindl.
Della Cina; introdotto verso la metà dell'ottocento, ma ora largamente coltivato e del tutto rustico.
1858 Orto bot. Pad. MS. — 1867 Pasquale Cat. Orto bot. Napoli.

2724 *Jasminum fruticans* L.
1590 Costeo (coll.) — 1640 Castelli — 1867 Arduino — 1876 Negrio Rostan in C. L. G.

2724 [1] *Jasminum humile* L.
Originario dell'India or., Coltivato dal cinquecento e naturalizzato nella Flora Pedem.
1550 Gibo — 1551 Aldrovandi — 1565 Michel — 1898 Pospichal (naturalizz.)

2724 [2] *Jasminum odoratissimum* L.
Di Madera e Coltivato della fine del cinquecento.
1590 Costeo — 1633 Ferrari — 1713 Tita — 1780 Farsetti

Olea (Tourn.) L.

2725 *Olea europaea* L. R
Originario dell'Asia occid., ma coltivato dall'epoca di Tarquinio Prisco (616–578) a. C. per Plinio:
— α *Oleaster* (Hoffm. et Lk.)
1550 Gibo Pedem. — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli
— β *sativa* (Hoffm. et Lk.)
1550 Gibo Pedem. — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1640 Castelli

Phillyrea (Tourn.) L.

2726 *Phillyrea angustifolia* L.
1772 Maratti — 1785 Allioni — 1798 Savi
— β *media* (L.) Aldrovandi II
1572 Gibo — 1551 — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1772 Maratti — 1785 Allioni — 1798 Savi.
— γ *latifolia* (L.)
1572 Gibo — 1566 Colzlar. — 1583 Cesalpino — 1745 Seguier — 1822 Pollini.
— δ *stricta* (Bertol.)
1551 Aldrovandi — 1820 Mauri — 1833 Bertoloni I

Ligustrum (Tourn) L.

2727 *Ligustrum vulgare* L. R
1572 Gibo — 1583 Cesalpino — 1586 Colzlari — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier. 1615 Rivin.

35/0018-184

2728 Ligustrum japonicum L.
Nativo del Giappone, Cina ecc., coltivato fino dal primo quarto dell'ottocento, ed ora trovasi molto diffuso e non di rado avventizio.
1821 Capelli – 1823 de Spigno – 1836 Visiani Cat. sem. Horti Patav.

Forsythia Vahl

2728' Forsythia viridissima Lindl.
Della Cina settentrionale, coltivata comunemente dalla seconda metà dell'Ottocento.
1867 Pasquale, Cat. Ort. bot. Nap. – 1870 Orto botanico Pad.!

2728² Forsythia suspensa Vahl
Della Cina e Giappone, coltivata comunemente, come la precedente.

Syringa L.

2729 Syringa vulgaris L.
Nativa dell'Ungheria, della penisola Balcanica e Asia occid., coltivata fino dalla metà del cinquecento ed ora dovunque diffusa e spesso inselvatichita.
1565 Mattioli (che l'ebbe dal Cortuso)
1590 Cortuso – 1642 Vestingio – 1780 Farsetti.

2729' Syringa persica L.
Nativa della Persia, coltivata dal primo quarto del settecento ed ora molto diffusa nei giardini.
(+1724) Clarici, ed. 1727 – 1790 Allioni – 1780 Farsetti
1793 Zuccagni.

Fontanesia Labill.

2730. Fontanesia phillyreoides Labill.
Originaria dell'Asia minore, Siria e Palest., già coltivata dalla fine del settecento e naturalizzata (o spontanea?) presso Siracusa.
1796 Zuccagni – 1798 Pascal, Elench. pl. H. Parm. – 1801 Bonato – 1802 Rodati; Tineo Syn. pl. Horti Panorm. – Nat. o spontanea: 1826 Presl – 1827 Gussone.

Fraxinus (Tourn.) L.

2731 Fraxinus Ornus L. R
1532 Cibo – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1729 Micheli – 1745 Seguier.
– β rotundifolia (Lam.)
1830 Tenore – 1833 Gussone in Bertoloni.
– γ lanceolata
1878 E. Reverchon e Burnouf – Cf. Rouy IV
– δ argentea (Lois.)
1806 Loiseleur – 1828 Duby – 1833 Soleirol in Bertoloni I.

2732 Fraxinus excelsior L. R
1415 Rinio – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1729 Micheli.
– β australis (J. Gay)
1902 Fiori (Da ricercarsi)
– γ parvifolia (Lam.)
1696 Cupani – 1830 Tenore – 1833 Gussone in Bertoloni I.

— δ oxycarpa (W.)
1826 Gussone — 1858 Moris.
— ε angustifolia (Vahl)
1885 Borzì.

Fam. 104 Apocynaceae

Nerium L

2733 Nerium Oleander L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1640 Castelli 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone
(In qualche luogo solo naturalizzato)

Vinca L

2734 Vinca major L.
1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1697 Cupani — 1726 Zannichelli.

2735 Vinca difformis Pourr.
1723 Micheli in Tilli — 1835 Badarò, Fiorini-Mazzanti e De Notaris in Bertoloni II — 1860 Carnel

2736 Vinca minor L. R
1415 Rinio 1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1745 Séguier

Apocynum (Tourn.) L.

2737 Apocynum venetum L
1576 Lobel — 1631 Donati — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli.
1565 c. Michiel —

Fam. 105 Asclepiadaceae

Periploca L

2738 Periploca graeca L
1554 Mattioli — 1561 Anguillara 1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1678 Boccone — 1798 Savi.

2739 Periploca levigata Ait.
3 (1824 Viviani — 1827 Gussone.
2 (— β angustifolia Labill.
1 (Il tipo è proprio delle Canarie

Cynanchum L.

2740 Cynanchum acutum L.
1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino — 1640 Castelli — 1785 Allioni — 1789 Ucria.

2741 Cynanchum nigrum (L.) Pers.
1785 Allioni — 1592 Colonna — 1830 Tenore

2742 Cynanchum Vincetoxicum (L.) Pers.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona
— β laxum (Bartl.)
1822 Pollini — 1852 Rota; Hausmann
— γ contiguum (Koch)
1843 Tommasini in Koch — 1877 Freyn

Marsdenia R. Br.

2742' Marsdenia erecta (L.) R. Br. R.
Nativa dell'Albania, Grecia, Creta.
Coltivata frequentemente fino dall'epoca romana.
1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1713 Tita.

156

35/0018-185

— δ fuscatum (Link)
1865 Tommasini in Freyn 1877 – 1876 Reuter in C. P. G.
— ε Burnati (Brig.)
1901 Briquet, Rech. fl. mont. Corse.

Asclepias L.

2743 Asclepias fruticosa L.
1827 Moris; Gussone – 1829 Tenore – 1837 Soleirol e Moris in Bertoloni III – 1867 Ardoino.

2743' Asclepias syriaca L.
Originaria dell'America bor.; coltivata negli orti fino dalla prima metà del seicento e raramente avventizia (nel Pavese)
1642 Vestingio – 1713 Tita – 1657 Ambrosini
1902 Dr. De Carlini in Fiori II (avventizia)

2743² Asclepias curassavica L.
Delle Antille, coltivata frequentemente fino dal ~~sett~~ seicento.
1651 Erbario Messinese. Cfr. Zodda
1796 Farsetti – 1801 Bonato

Stapelia L.

2744 Stapelia europaea Guss.
1832 Gussone – 1876 C. P. G.

Fam. 106 Gentianaceae

Swertia L.

2745 Swertia perennis L.
(+1770) Moreni. Cfr. Pollini I – 1785 Allioni – 1822 Pollini – 1855 Pirona.

Pleurógyne Esch.

2746 Pleurogyne carinthiaca (Wulf.) Don
1797 J. Host apud N. T. Host – 1837 Facchini in Bertoloni III – 1852 Hausmann – 1855 Pirona

Gentiana (Tourn.) L.

2747 Gentiana lutea L.
1415 Rimio 1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

2748 Gentiana purpurea L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1818 Savi – 1822 Pollini – 1824 Comolli.
— β pannonica (Scop.)
1801 Baltis – 1837 Zantedeschi, Facchini in Bertoloni III – 1844 Cesati – 1853 Rota – 1855 Pirona.

2749 Gentiana punctata L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Pollini.
— β Burseri (Lap.)
1837 Bertero in Bertoloni III – 1867 Ardoino

2749' Gentiana Gaudiniana Thom.
(G. purpurea × punctata)
1902 L. Vaccari in Fiori II.

2749" Gentiana hybrida Schleich.
(G. purpurea × lutea)
1824 Rodegher e Venanzi.

2749³ Gentiana Charpentieri Thom.
(G. punctata × lutea)
1858 Hausmann Verhand. z. b. Gesell. (?)
1898 Gelmi

2750 Gentiana asclepiadea L.
1542 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona
– 1713 Tita – 1718 Pontedera – 1726
Zannichelli.

2751 Gentiana Pneumonanthe L.
1550 Cibo – 1565 Matthioli – 1595 Pona
– 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802
Suffren – 1818 Ruchinger.

2752 Gentiana Froelichii Jan
1876 C. P. G. – 1882 Arcangeli – 1883
Vergo, Huter in Parlatore – Carnel VI.

2753 Gentiana acaulis L.
1554 Cibo – 1566 Calzolari – 1595 Pona
– 1726 Pontedera – 1726 Zannichelli
— β Kochiana (Perr. et Song.
1820 Pontedera – 1745 Seguier – 1826 Zannichelli

1852 Rota – 1872 Pollini.
— β angustifolia (Vill.)
1882 Pagot – 1902 Fiori (da conferm. l'habitat in Italia)
— γ alpina (Vill.)
1791 Bellardi – 1822 Pollini – 1829
Tenore.

2754 Gentiana cruciata L.
1532 Cibo – 1558 Matthioli – 1565 Cesalpino – 1585 Durante – (1561 Anguillara)
– 1595 Pona.

2755 Gentiana verna L.
1550 Cibo – 1726 Zannichelli – 1745
Seguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren –
— β aestiva (Schultz.)
1852 Cristofoli, Perrini in Hausmann II –
1853 Rota – 1855 Pirona – 1869 Savarda –
Visiani
— γ pumila (Jacq.)
1785 Allioni – 1837 Facchini in Bertoloni III – 1855 Pirona
— δ imbricata (Froel.)
1837 Sandri – 1852 Moschini, Perrini in Hausmann – 1855 Pirona
— ε brachyphylla (Vill.)
1844 Cesati – 1852 Perrini in Hausmann II,
1853 Rota – 1904 Goiran.

2756 Gentiana bavarica L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1822 Pollini
(+1770) Moreni Cf. Pollini II – 1844 Cesati
— β Rostani (Rent.)
1822 Pollini – Cf. Goiran 1904 – 1864 Rostan. Cf. Nym. Consp.

35/0018-186

2757 Gentiana utriculosa L.
1550 Vetroli Cibo – 1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

2758 Gentiana nivalis L.
1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1805 Re – 1822 Pollini – 1837 Sandi

2759 Gentiana prostrata Haenke
1837 Facchini in Bertoloni III – 1893 Gelmi.

2760 Gentiana ciliata L.
1606 Colonna – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari

2761 Gentiana campestris L.
1697 Bocone – 1773 Vitman – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1816 Nocca e Balbis
— β neapolitana Froel.
1796 Froelich, De Gentiana libell. Erlang.
1829 Tenore.
1745 Sabbati.

2762 Gentiana Amarella L.
Il tipo è proprio dell'Europa boreale.
— β calycina (Koch)
1606 Colonna 1707 Martini – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
— γ antecedens (Wettst.)
1893 Gelmi – 1902 Andr. Fiori in Fiori II – 1904 Goiran – 1906 Gortani.

— δ pilosa (Wettst.)
1902 L. Vacari in Fiori II – 1906 Gortani
— ε Sturmiana (Kerner)
1906 Gortani.
— ζ germanica (W.)
1898 Pospichal (Da confermarsi)
— η raethica (Kerner)
1882 Kerner in Sched. ad fl. austro-hung. p. 124 – 1906 Gortani.
— ϑ obtusifolia (W.)
1745 Séguier – 1822 Pollini – 1904 Pollini.
— ι carnica M. Gortani
1903 M. Gortani, Cr. Fiori, 1907, IV in Bull. Soc. bot. ital.

2762' Gentiana solstitialis Wettst.
1905 Chenevard e Braun in Annuaire du Conserv. et Jard. bot. Genève.

2763 Gentiana tenella Rottb.
1785 Allioni – 1852 Facchini in Hausm. II. – 1855 Pirona – 1893 Gelmi.
— β glacialis (Thom.)
1808 Biroli – 1835 Cotta – 1844 Cesati.
— γ nana (Walf.)
1837 Sandi – 1852 Hausmann II.

Cicendia Adans.

2764 Cicendia pusilla (Lam.) Gris.
1835 Soleirol in Bertoloni II – 1842 Puccinelli – 1858 Moris – 1872 Marsilly.

2765 Cicendia filiformis (L.) Delarbr.
1827 Moris – 1829 Tenore – 1835 Soleirol, Seraffini, Bubani in Bertoloni II – 1860 Caruel.

Chlora (Ren.) Adans.

2766 Chlora imperfoliata L. f.
1850 Grenier e Godron – 1884 Gravis Herbor. mar. Pont. – 1894 Terracciano in N. giorn. bot. ital.
1897 Chiovenda, Malp.; Béguinot in Ann. Mus. civ. Genova.

2767. Chlora perfoliata L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1631 Donati – 1640 Castelli.
– β grandiflora (Viv.)
1830 Viviani – 1856 Huet. Cfr. Nym. Consp.
– γ serotina (Koch)
1842 Gussone – 1852 Rota – 1869 Vissani e Saccardo.

Erythraea (Ren.) Neck.

2768. Erythraea maritima (L.) Pers.
1606 Colonna – 1723 Tilli – 1806 Bertoloni – 1827 Gussone – 1829 Tenore, (all'occhio acuto di

2769 Erythraea spicata (L.) Pers.
1620 C. Bauhin – 1685 Trionfetti – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1798 Savi.

2770. Erythraea Centaurium (L.) Pers.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2771. Erythraea pulchella (Sw.) Horn.
1789 Allioni – 1816 Noua e Balbis – 1818 Sebastiani e Mauri – 1821 Romano
– β tenuiflora (Hoffm. et Link)
1832 Gussone – 1853 Grech – Delicata – 1872 Marsilly.

Menyánthes (Tourn.) L. *)

2772. Menyanthes trifoliata L.
1713 Tita – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1703 Martini – 1802 Marzari; Suffren
(Coltivata: 1644 Vesling – 1723 Tilli – 1789 Ucria).

Limnánthemum Gmel.

2773. Limnanthemum nymphoides (L.) H. et Lk.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1816 Noua e Balbis – 1820 Moricand
(Coltivato: 1772 Allioni – 1801 Bonato)

---

*) Merita considerazione il fatto che sia la Menyanthes trifoliata che il Limnanthemum nymphoides, piante così vistose e oggi abbastanza comuni fra noi, siano sfuggite a tutti i nostri botanici cinquecentisti Mattioli, Cibo, Cesalpino ecc., mentre erano note ai cinquecentisti francesi e tedeschi Dalechamps, Lobel, Bock ecc. Essendo le due piante native pure, la prima dell'America sett. ed Asia, la seconda dell'Asia temper. sarebbe forse supponibile una prima antica importazione al Nord d'Europa e una successiva diffusione al Sud? Si tratterebbe adunque di piante importate e naturalizzate? La loro vita acquatica favorirebbe l'ipotesi, che rimane però sempre una mera ipotesi.

35/0018-187

Fam. 107 Polemoniaceae

Polemonium (Tourn.) L.

2774 Polemonium caeruleum L.
1834 Comolli – 1835 Bergamaschi, Lanfossi in Bertoloni II – 1893 Gelmi (Si coltiva poi dal seicento: 1642 Veslingio – 1713 Tita – 1801 Bonato)

Phlox L.

2774¹ Phlox paniculata L.
Dell'America settentrionale; coltivata assai frequentemente dalla fine del settecento.
1796 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato

2774² Phlox Drummondi Hook.
Del Texas; coltivata comunemente dopo il 1835, anno in cui fu importata in Europa.
1842 de Visiani – 1867 Pasquale, Cat. del R. Orto bot. Nap.

Fam. 108. Borraginaceae

Cerinthe (Tourn.)

2775 Cerinthe minor L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1717 Patarol 1723 Micheli in Tilli – 1551 Alimanti 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini
— β maculata (L. e. p.)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1827 Gussone – 1829 Tenore

— γ auriculata (Tenore)
1829 Tenore.

2776 Cerinthe glabra Mill.
1837 Facchini in Bertoloni III – 1852 Perini in Hausmann – 1876 C. P. G.
— β longiflora (Viv.)
1830 Viviani – 1834 Salis-Marschlins – 1835 Soleirol in Bertoloni II.

2777 Cerinthe major L. R
1797 Host – 1805 Wulfen
— β aspera (Roth)
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri.

Onósma L.

2778 – 1879 Onosma echioides L.
1606 Colonna – 1595, Pona – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
— β Kochii Fiori
1843 Koch
— γ Visianii (Clementi)
1898 Pospichal –
— δ stellulatum (W. K.) [2778].
1842 Trevisan – 1830, Tenore
1852 Rota 1707 Martini
— ε cinereum (Schreb.)
1745 Séguier – 1822 Pollini – 1904 Goiran

Echium (Tourn.) L.

2780 Echium italicum L.
1565 Michiel
+ 1583 Cesalpino — 1723 Tilli — 1595 Pona
1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β altissimum (Jacq.)
1855 Pirona — 1898 Pospichal.

2781 Echium vulgare L.
1415 Pinio 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1595
Pona — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β pilosissimum ~~Fen~~ Bertoloni
1835 Bertero in Bertoloni II.
— γ Schifferi (Lang.)
1825 Re — 1835 Bertero, Bertoloni II.
— δ pustulatum (S. et S.)
1651 Erb. Medinese. Cfr. Zodda
+ 1789 Acria — 1816 Sebastiani e Mauri
1826 Gussone — 1831 Tenore.
— ε elegans (Lehm.)
1835 Bubani in Bertoloni II.

2782 Echium plantagineum L.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1755 Allioni
— 1818 Sebastiani e Mauri — 1827 Gussone
— β australe (Lam.)
1902 Fiori (da confermarsi)
— γ grandiflorum (Desf.)
1858 Moris.

2783 Echium confusum De Coincy
1697 Bouone — 1826 Jan — 1827 Gussone

2784 Echium arenarium Guss.
1696 Cupani — 1825 Gussone — 1830 Tenore

— β macranthum Fiori
1827 Gussone

2785 Echium parviflorum Moench
1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli —
1802 Viviani — 1827 Gussone; Moris

Lithospermum (Tourn.) L.

2786 Lithospermum rosmarinifolium Ten.
1674 Bouone — 1696 Cupani — 1785
Petagna.

2787 Lithospermum suffruticosum (L.) Kern.
1694 Bouone — 1723 Micheli in Tilli —
1773 Vitman — 1802 Marzari — 1806 Sternberg

2788 Lithospermum officinale L.
1415 Pinio 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585
Durante — 1595 Pona — 1696 Cupani
1726 Zannichelli.

2789 Lithospermum purpureo-caeruleum L.
1583 Cesalpino — 1745 Séguier — 1776
Bartalini — 1802 Marzari; Loffren

2790 Lithospermum calabrum Ten.
1829 Tenore — 1902 Andrea Fiori in Fiori II.

2791 Lithospermum apulum (L.) Vent.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1789 Acria
— 1827 Moris.

159

2792 Lithospermum minimum Moris
1827 Moris – 1830 Tenore

2793 Lithospermum arvense L.
1551 Dodonaeus II
1583 Cesalpino – 1606 Colonna – 1726
Zannichelli – 1745 Séguier – 1802
1785 Allioni
Morgani ; Lapeyr.

Myosotis (Dill.) L.

2794 Myosotis palustris (L.) Lam.
1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli –
1742 Martin Lanon. Monti – 1785
Allioni – 1802 Morgani ; Lapeyr.
– β pseudocaespitosa Bég.
1844 Cesati – 1847 Lanaridini – 1852
Rota – Cfr. 1907 Fiori IV.
– γ strigulosa (Rchb.)
1844 Cesati – 1852 Rota – 1876 C.P.G.
– δ hirsuta (Guss.)
1827 Gussone – 1835 Tenore – 1838
Moris – 1873 Martelli.

2795 Myosotis pusilla Loisl.
1810 Loiseleur – 1835 Soleirol e
Moris in Bertoloni II.

2796 Myosotis pyrenaica Pourr.
1834 Lahs-Marschlins – 1850 Grenier e
Godron – 1872 Martelli –
– β ambigens Bég.
1880 Carnel (M. stolonifera β c.p.) – 1904
Béguinot in Ann. Bot. Roma

– γ alpestris (Schmidt)
1696 Cupani – 1720 Pontedera –
1723 Micheli in Tilli – 1822 Pollini.
– δ praecox (W. K.)
1818 Smith – 1886 Stapf in Kerner
Sched. fl. exs. austro-hung. n. 1410.
1898 Ospichal.
– ε Gussonei (Vierhapper) Prod.
1842 Gussone – 1879 Fl. Mod.
1888 Strobl
– ζ silvatica (Hoffm.)
1595 Pona – 1720 Pontedera –
1842 Terracciano – 1855 Pirona
– η Soleirolii (Grem. Godr.)
1850 Soleirol in Grenier e Godron II.
1873 Martelli – 1904 Béguinot in
Ann. Bot. Roma.

2797 Myosotis arvensis (L.) Lam.
3 (1551 Dodonaeus II
1583 Cesalpino – 1696 Cupani –
1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
1822 Pollini – 1844 Cesati.
2 (– β collina (Hoffm.)
1 (1831 Tenore – 1834 Comolli – 1844
Cesati – 1864 Savard.
– γ stricta (Lk.)
1844 Cesati – 1886 Parlatore – Carnel VI
– δ Marcellyana (Burn. in Bég.)
1850 c. Magnabotti. Cfr. Béguinot in
Ann. Bot. Roma 1904.

2798 Myosotis versicolor (Pers.) Sm.
1835 Cesati, Balsamo-Crivelli, De Notaris in Bertoloni II — 1842 Trevisan — 1860 Caruel — 1867 Ardoino.

— β Capraviae Bég.
1904 Sommier in Béguinot, Ann. Bot. Rome.

1798¹ Myosotis sparsiflora Mik.
1846 Kellner. Cfr Bég. l.c. (habitat da confermarsi) — 1899 Sauter —

1798² Myosotis Rehsteineri Wartm.
1904 Schröter e Wilczeck in Boll. Soc. Ticin. Sc. nat.

Pulmonaria (Tourn.) L.

2799 Pulmonaria officinalis L.
1551 Al Brovandi II
1558 Mattioli — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona.

— β saccharata (Mill.)
1867 Ardoino — 1876 C. P. G — 1904 Goiran

— γ Villarsae (Kern.)
1878 Kerner Monogr. Pulmon. — 1904 Goiran.

— δ mollis (Wolff.)
1838 Tommasini in Bertoloni II — 1853 Rota.

— ε tuberosa (Schrank)
1697 Boccone — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1816 Nocca e Balbis

— ζ azurea (Bess.)
1852 — Hausmann — 1852 Rota — 1869 Visiani e Sauardo — 1855, Pirona

Alkánna Tausch

2800 Alkanna tinctoria (L.) Tausch
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1827 Gussone; Moris — 1829 Tenore

2800* Alkanna lutea (DC.) Moris
1834 Salis-Marschlins — 1835 Seraffini e Soleirol in Bertoloni II.

Nonnéa Med.

2801 Nonnea setosa (Lehm.) R. et S.
Originaria della Russia austro-orient. coltivata prima della metà dell'ottocento in qualche orto botanico e resasi e qua e là avventizia
1842 Visiani — 1845 Tenore (avventizia)
1876 C. P. G. — 1886 Passerini in Parl. Caruel VI — 1887 Groves

2802 Nonnea obtusifolia (W.) R. L.
Originaria della Grecia ed Asia minore
1876 Armitage, Canepa, Pirotta. Cfr Parl. Caruel VI. Probabilmente naturalizzata in Italia

2803 Nonnea ventricosa (S. et S.) Gris.
1887 Groves — 1894 Arcangeli.

2804 Nonnea vesicaria (L.) Rehb
1675 Zanoni — 1842 Gussone — 1886 Lojacono, Todaro ecc. in Parl. Caruel VI.

35/0018-189

2804 Nonnea pulla (L.) DC.
Originaria dell'Europa austro-orient. ed Asia occid. e coltivata dal principio dell'ottocento e talora avventizia nel Triestino
1806 Zuccagni – 1812 Bonato – 1815 Biroli – avventizia: 1898 Pospichal.

Lycópsis L.

2805 Lycopsis arvensis L.
1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1816 Noua e Balbis.

2806. Lycopsis variegata L.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1697 Boccone – 1742 Zanoni – Monti – 1785 Allioni

Anchúsa L.

2807 Anchusa sempervirens L.
Nativa dell'Inghilterra, Francia occid. e coltivata dal cinquecento e avventizia in pri. luoghi.
1563 Cesalpino – 1642 Vestingio, 1678 Boccone – 1713 Tita – avventizia: 1785 Allioni – 1835 Mayer in Bertoloni II – ~~[illegible]~~ 1842 Trevisan

2808 Anchusa Barrelieri (All.) Vitm.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1785 Allioni – 1791 Bellardi – 1811 Tenore

2809 Anchusa italica Retz R
1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1640 Castelli – 1696 Cupani

2809* Anchusa ochroleuca M.B.
Nativa della Russia merid. e Caucaso. Coltivata in qualche orto botanico avanti la metà dell'ottocento e talora avventizia
1842 De Visiani – 1845 Tenore – Avventizia: 1896 Marchesetti – 1902 Pellegrini, Sommier in Fiori II.

2810 Anchusa officinalis L.
1615 Rinio 1550 Cibo – 1675 Zanoni – 1745 Séguier – 1791 Bellardi – 1806 Biroli.

2811 Anchusa undulata L.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1697 Boccone – 1785 Allioni – 1806 Balbis – 1807 Bivona – Bernardi.
— β hybrida (Ten.)
1811 Tenore – 1818 Sebastiani e Mauri – 1827 Gussone.
— γ crispa (Viv.)
1825 Viviani – 1834 Salis – Marschling – 1858 Moris.

2812 Anchusa litorea Moris
1827 Moris – 1876 C. P. G.

2813 Anchusa aggregata Lehm.
1826 Jan – 1827 Gussone –

Borrágo (Tourn.) L.

2814 Borrago officinalis L.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1561 Anguillara – 1696 Cupani.

2815 Borrago laxiflora W.
1827 Moris – 1828 Duby.

Symphytum (Tourn.) L.

2816 Symphytum officinale L. R
1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1785 Allioni – 1802 Suffren.
— β patens (Sibth.)
1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1822 Pollini.

2817 Symphytum tuberosum L.
1415 Rinio 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.
— β Gussonei (F. Schultz)
1844 Gussone – 1875 Schultz in Flora
— γ mediterraneum (Koch)
1879 ? Caldesi – 1902 Fiori (da confer. marsi.)
— δ bulbosum (Schimp.)
1550 Cibo – 1745 Séguier – 1808 Biroli – 1824 Tenore – 1827 Gussone – 1904 Goiran.
— ε Zeyheri (Schimp.)
1842 Gussone – 1881 Todaro in Ryman Consp.

Cynoglossum (Tourn.) L.

2818 Cynoglossum apenninum L.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1789 Uoria – 1818 Sebastiani e Mauri.

2819 Cynoglossum officinale L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
— β montanum (L.)
1804 Balbis – 1819 Bertoloni – 1827 Moris.
— γ Dioscoridis (Vi
1813 Balbis Cat. Hort. Taur. – 1867 Lisa, Thuret, Stire in Ardoino – 1872 Marsilly.
— δ nebrodense Guss.
1827 Gussone – 1881 Todaro in Ryman Consp.

2820 Cynoglossum creticum Mill.
1550 Cibo – 1583 Cesalpino – 1606 Colonna – 1772 Scopoli – 1806 Sternberg – 1696 Cupani – 1822 Pollini.

2821 Cynoglossum clandestinum Desf.
1827 Gussone; Moris – 1829 Tenore

2822 Cynoglossum magellense Ten.
1606 Colonna – 1723 Tilli – 1826 Gussone – 1829 Tenore

2823 Cynoglossum cheirifolium L.
1606 Colonna – 1697 Cupani: 1723 Micheli in Tilli – 1532 Cibo – 1785 Allioni.

35/0018-190

2824 Cynoglossum Columnae Ten.
1606 Colonna — 1814 Bivona-Bernardi — 1827 Gussone — 1829 Tenore.

2824' Cynoglossum siculum Guss.
1832 Gussone — 1886 Caruel in Parlatore Caruel VI.

Omphalodes (Tourn.) Moench
2825 Omphalodes verna Moench
1768 Turra, ed. 1780 — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren — 1808 Biroli.

qui

Asperugo (Tourn.) L
2826. Asperugo procumbens L.
1606 Colonna — 1724 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

2825' Omphalodes linifolia (L.) Mönch
Oriunda del Portogallo, coltivata dalla metà del settecento e spesso avventizia qua e là.
1760 Allioni — 1793 Zuccagni — 1796 Farsetti
Avventizia: (+1847) Mutel. Cfr. Parl. Caruel VI — 1886 Caruel l.c. — 1901 Béguinot in N. giorn. bot. it. p. 308
1905 Trotter! (Avellino)

Lappula (Rupp.) Moench
2827 Lappula Myosotis Moench
1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren; Marzari.

2828 Lappula deflexa (Wahlb.) Gusche
1835 Jan in Bertoloni — 1852 Facchini in Hausmann II — 1853 Rota — 1893 Gelmi.

2828' Lappula patula (Lehm.) Fiori
Nativa della Russia merid. e Caucaso, non consta che sia coltivata; fu trovata avventizia alla stazione ferrov. di Modena, probabilmente per trasporto accidentale dei semi.
1884 Adr. Fiori. Cfr. Fiori II.

Eritrichium Schrad.
2829 Eritrichium nanum (Vill.) Schrad.
1697 Boccone — 1723 Tilli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β tergloviense (Hacq.)
1782 Hacquet — 1867 Ardoino

Heliotropium L.
2830 Heliotropium europaeum L.
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1585 Durante
— β tenuiflorum Guss.
1854 Gussone — 1876 C. P. G.
— γ suaveolens (M. B.)
1674 Boccone — 1825 Gussone — 1826 Jan.
— δ Eichwaldi (Steud.)
1844 De Notaris — 1854 Gussone

2831 Heliotropium supinum L.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1827 Gussone; Moris.

2831¹ Heliotropium peruvianum L.
Del Perù. Coltivato dalla metà del settecento quasi in ogni giardino.
1762 Allioni – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni – 1801 Bonato.

2831² Heliotropium curassavicum L.
Dell'America sett. Coltivato dalla fine del settecento e trovato, probabilmente avventizio, in un isola presso la Sardegna.
1793 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato – Avventizio: 1900 Cavara in Bull. Soc: bot. ital.

2831³ Heliotropium anchusaefolium Poir.
= Tournefortia heliotropioides Hook.
Dell'Argentina e Brasile. Coltivato da avanti la metà dell'ottocento e spesso fuggiasco dai giardini e avventizio.
1842 de Vitiani – 1867 Pasquale – Avventizio: 1875 Cocconi. Cfr. Cocconi Fl. Bologn. 349 – 1890 Goiran in Bull. Soc. bot. it. – 1894 Arcangeli.

Fam. 109. Convolvulaceae

Convólvulus (Tourn.) L.

2832 Convolvulus Cneorum L.
1599 Imperato – 1563 Cesalpino + 1565 Michiel
1696 Cupani – 1811 Tenore.

2833 Convolvulus Cantabrica L.
1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1789 Ucria.

2834 Convolvulus lineatus L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria
1685 Trionfetti.

2835 Convolvulus Sabatius Viv.
1824 Viviani – 1835 Sassi in Bertoloni II.

2836 Convolvulus siculus L.
1674 Bonone – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1828 Fiorini.
— β pseudosiculus (Cav.)
1858 Moris.

2837 Convolvulus humilis Jacq.
(+1711) Cupani, ed. 1713 – 1827 Gussone – 1844 De Notaris – ~~1835 Gussone in Bertoloni~~ – 1896 Bicknell.

2838 Convolvulus pentapetaloides L.
1811 Tenore – 1826 Gussone – 1827 Moris
1835 Badarò in Bertoloni II

35/0018-191

3839 Convolvulus hirsutus L.
1696 Cupani – 1897 Bouvier – 1789 Ucria – 1827 Guittone – Coltivato: 1660 Della Torre – 1713 Tita.
— β mesanthus (Hoffg. et Link)
1818 Sebastiani e Mauri – 1827 Guittone

3840 Convolvulus althaeoides L.
1611 Bauhin – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1811 Tenore.
— β elegantissimus (Mill.)
1671 Bauhin – 1696 Cupani – 1804 Savi.

3841 Convolvulus botanicifolius Mill.
Nativo d'Oriente. Raramente coltivato negli orti; p.e. 1845 Tenore.
Qua e là avventizio:
1857 Caldesi in Gennari – 1891 Borzì.

3842 Convolvulus arvensis L.
1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1595 Bauhin – 1745 Séguier.
— β Cherleri (Agardh)
1854 Nyman, Sylloge.

3843 Convolvulus Sepium L. R
1415 Rinio
1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.
— β inflatus (Desf.)
1811 Tenore – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Guittone.

3844 Convolvulus Soldanella L.
1415 Rinio
1550 Gibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

Ipomoea L.

3845 Ipomoea sagittata Poir.
1827 Guittone – 1887 Grovey.

3846 Ipomoea stolonifera (Cyr.) Gmel.
1599 Imperato – 1785 Petagna – 1788 Cirillo.

3847 Ipomoea Batatas (L.) Poir.
Originaria della America centrale. Coltivata a Firenze c. 1630, a Milano 1732 (Cobizzoni) Cfr. Targ. Tozzetti 1853. – a Padova 1812 (Donato) – Ora coltivata assai più largamente, specie nelle Italia sett.

3848 Ipomoea purpurea (L.) Roth.
Dell'America merid. Coltivata fin dal secento ed ora assai diffusamente e spesso fuggisca dai giardini.
1651 Ortt. mattiani (p. 2) 1703 Mattioli
1662 Vestingio – 1780 Forskål – 1796 Zuccagni
Naturalizzata – 1864 Saccardo – 1904 Soriano

3848' Ipomoea coccinea (Roxb.) Choisy.
Delle Indie orient. Coltivata frequentemente nei giardini dalla metà del settecento.
(†1729) Zannichelli: Erbar. nell'Orto Padov.
1760 Allioni – 1780 Forskål – 1793 Zuccagni

R

2848² Ipomoea Quamoclit L.
Delle Indie orientali. Coltivata fino dal 1580 ed ora assai diffusa nei giardini.
1580 Cesalpino. Cfr. Linn. Codex n. 1271 –
1606 Colonna – 1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda 1760 Allioni – 1796 Farsetti
1793 Zuccagni

2848³ Ipomoea coccinea L.
Delle Indie orientali. Coltivata comunemente dalla metà del settecento.
1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni

Cressa L.

2849 Cressa cretica L.
1671 Boccone – 1696 Cupani – 1757 Allioni – 1827 Gussone; Moris.

Cuscuta (Tourn.) L.

2850 Cuscuta Epithymum (L.) Murr.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino –
1585 Durante – 1696 Cupani – 1745 Séguier.
– β planiflora (Tenore)
1829 Tenore – 1844 Cesati – 1852 Rota.
– γ palaestina (Boiss.)
1844 Tineo in Gussone – 1877 Freyn – 1876 C. P. G.

2851 Cuscuta europaea L.
1558 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

2852 Cuscuta Epilinum Weihe
1415 Rinio 1842 Trevisan; Facchini in Bertoloni V –
1844 Cesati – 1852 Rota.

2853 Cuscuta australis R. Br.
1847 Requien, Tineo in Bertoloni VII –
– β Cesatiana (Bert.)
1847 Cesati in Bertoloni VII – 1849 De Notaris, Index sem. hort. Gen.
1869 Visiani e Savardo.

2854 Cuscuta racemosa Mart.
1872 E. Reveliére e P. Mabille in Marsilly – 1876 C. P. G. – 1882 Arcangeli.

2855 Cuscuta monogyna Vahl
1844 Cesati – 1876 C. P. G.

Fam. 110 Solanaceae

Datura L.

2856 Datura Metel L.
Dell'America tropicale. Coltivata dalla metà del cinquecento ed ora naturalizzata in più luoghi del mezzodì.
1551 al Dorandi II 1561 Anguillara – 1565 Mattioli – 1789 Ucria – 1904 Goiran – Naturalizz.: 1827 Gussone; Moris – 1870 Goiran. Cfr. Goiran, Bull. soc. bot. ital. 1890

2857 Datura Stramonium L.

B Cu
Ori
se
in
mi
pi
19
d

dopo il n. 2854

B Cuscuta Gronovii Willd.

Originaria dell' America settentrionale. Compar-
se da brevissimo tempo ed è già diffusa
in più luoghi del Ferrarese sulle legu-
minose e su molte altre famiglie di
piante.
1908 V. Peglion in Rendic. della R. Acad.
dei Lincei, XVII p. 343.

35/0018-192

Nativa assai probabilmente dell'Asia occidentale, ma dalla fine del cinquecento diffusa successivamente in quasi tutto il mondo.
1592 Colonna (che la ebbe come esotica dal Recchi) – 1585 Durante (che la dà come nativa del Malabar) – 1617 Pona – 1642 Vestingio – 1651 Erb. messinese. Gr. Zodda) Come naturalizzata o indigena: 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Attioni – 1802 Jaffren; Marzari – 1822 Pollini (*)

2857' Datura Tatula L.
Nativa assai probabilmente dell'America merid. Naturalizzata ma meno diffusamente e posteriormente dopo della precedente.
1675 Zanoni – 1726 Zannichelli – 1847 Zanardini – 1864 Savardo – 1873 Goiran.
Cfr. Goiran in Bull. soc. bot. ital. 1890

2858 Datura ferox L.
Nativa probabilmente della Cina, ma coltivata fino dal seicento, e tosto naturalizzata nell'Italia centr. o merid.
1674 Boccone – 1675 Zanoni – 1696 Cupani – 1827 Gussone

2858' Datura inermis Just.
Nativa dell'Abissinia, coltivata dalla fine del settecento e trovata già avventizia, di vado, in Sicilia.
1793 J. Tineo; Zuccagni – 1801 Bonato – Avventizia: 1839 Parlatore in Bertoloni IV – 1842 Gussone – 1875 C. P. G.

(*) Una prova che la Datura Stramonium non è indigena fra noi, e non si diffuse che sulla fine del cinquecento, la abbiamo nel fatto che un'erba così vistosa e venefica non sarebbe sfuggita all'attenzione di Plinio, Rinio, Mattioli, Cesalpino, Cibo ecc. che non ne trattano affatto.
φ, come vorrebbe il Bertoloni.

Hyoscyamus (Tourn.) L.

2859. Hyoscyamus niger L. R
1415 Rinio
1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1595 Pona
1561 Anguillara

2860 Hyoscyamus albus L.
1565 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.

2860' Hyoscyamus reticulatus L.
Nativo di Creta ed Egitto, coltivato raramente negli orti bot., almeno pel passato e trovato avventizio in Sicilia
1842 de Visiani – Avventizio: 1891 Borzì.

Scopolia Jacq.

2861 Scopolia carniolica Jacq.
1558 Mattioli – 1760 Scopoli – 1883 Rainer in Parl. Carnel VI.
— β Hladnikiana (Fleisch.)
1843 Koch (prob. fuori del confine ital.)

Nicotiana (Tourn.) L.

2862. Nicotiana glauca Grah.
Nativa dell'America merid., coltivata da poco dopo la metà dell'seicento ed ora qua e là avventizia.
1836 Brignoli – 1842 Visiani – Avventizia: 1884 Ascherson in Barbey – 1894 Arcangeli – 1653 Volpari.
1895 Saccardo (Napoli!)

2863 Nicotiana rustica L.
Nativa dell'America merid., coltivata da dopo la metà del cinquecento e qua e là avventizia.
1565 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – Avventizia: 1820 Moricand.
– β rugosa (Mill.)
Questa e le seguenti varietà sono entrate nelle colture da pochi lustri. Cfr. Comes Monogr. Nicotiana. Nap. 1899.
– γ asiatica Schrank
– δ pumila (Cav.)

2864 Nicotiana Tabacum L.
Nativa dell'America tropicale, importata a Firenze dal vesc. Alf. Tornabuoni nel 1570, indi largamente diffusa.
1570 Tornabuoni. Cfr. Targ. Tozz. 1853 – (+1589) Guilandino; Cfr. Schenck, Hortus Patav. 1600 – 1642 Veslingio.
1772 Bonelli.
– β havanensis (Lag.)
Questa e le seguenti varietà sono entrate da pochi lustri nelle colture. Cfr. Comes l.c.
– γ brasiliensis Comes
– δ virginica (Agardh)
– ε angustifolia (Ehrh.)
– ζ fruticosa (L.)

Petunia Juss.

2864¹ Petunia nyctaginiflora Juss.
Originaria dell'Argentina. Coltivata nei giardini dalla prima metà dell'ottocento, e non di rado avventizia in vicinanza dei giardini.
1828 Bonato Cat. semin. horti pat. – 1836 Brignoli – 1841 Piccioli.

2864² Petunia violacea Lindl.
Oriunda dell'Argentina. Coltivata e talora avventizia come la precedente.
1838 Visiani Cat. sem. horti pat. – 1841 Piccioli – Avventizia: 1907 Calestani in N. giorn. bot. ital.

Habrothamnus Endl.

2864³ Habrothamnus fasciculatus (Miers) Endl.
Oriundo del Messico e solo da pochi decennii entrato nelle coltivazioni.
1855 Visiani Cat. sem. horti patav.
1867 Pasquale.

Cestrum L.

2865 Cestrum Parqui L'Hérit.
Oriundo del Cile e Argentina. Coltivato fino dalla fine del settecento ed ora qua e là naturalizzato.
1795 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato
Naturalizzato: 1868 Pasquale – 1900 Casali e Ferraris in N. giorn. bot. ital.
1885 Borzì – [illegible]

Lycium L.

2866 Lycium afrum L.
Originario del Capo; coltivato fino dalla prima metà del settecento e in più luoghi naturalizzato.
1729 Micheli – 1713 Tita – 1723 Tilli
1829 Tenore – 1875 N. Terracciano

2867 Lycium europaeum L.

1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1696 Cupani.

— β ramulosum Dun.

1885 Solla – 1902 Andrea Fiori in Fiori II.

Nativo dell'America merid., Importato in Inghilterra nel 1586 da Guglielmo Raleigh, fosse assai coltivato e Padova e diffuso in tutta Italia.

2868 Lycium Chinense Mill.

Nativo dell'asia orientale. Coltivato fino dal primo quarto dell'ottocento ed ora frequentemente naturalizzato.

1815 Pirotti – 1821 Gussone – 1842 Visiani – Naturalizzato:

1837 Saingiovanni – 1852 Hausmann 1899 Traverso in N. giorn. bot. ital.

— β ovatum (Lois.)

1835 Montini, Nardacci, Manni, Parolini in Bertoloni II.

— γ lanceolatum (Lois.)

1835 Camilli in Bertoloni II.

1590 Costeo (Pinocomo) – 1597 GV. Pinelli a G. F. Muratori, Padova: lettera apogr. 3 dic. 1597 in Arch. Ort. bot. Padova – 1623 Magagnini. Cfr. Targ. Tozz. 1853 – 1713 Tita.

2868' Lycium barbarum L.

Dell'Europa austro-occid. e coltivato dal settecento e talora avventizio

1772 Allioni – 1780 Forsskål – 1842 Visiani

1877 Freyn.

Solánum (Tourn.) L.

2869 Solanum Dulcamara L.

1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1585 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

2870 Solanum tuberosum L.

2871 Solanum nigrum L.

1554 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

— β morellaeum (Presl)

1822 Presl – 1842 Gussone – 1853 Grech – Delicata – 1906 Goiran.

— γ humile (Bert.)

1824 Badarò – 1854 Gussone

— ε Billotii (Schultz)

1882 Gibelli e Pirotta.

— ζ humile (Bernh.)

1878 Smith – 1882 Gibelli e Pirotta.

— η ochroleucum (Bast.)

1854 Matthioli – 1857 Terrisi – 1858 Moris 1860 Carnel

— ϑ villosum (Bernh.)

1554 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1816 Nocca e Balbis – 1818 Sebastiani e Manni.

— ι miniatum (Bernh.)

1640 Castelli – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1822 Colla – 1827 Moris

— λ villosissimum (Dun.)
1854 Gussone — 1904 Goiran

2872 Solanum Melongena L.
Delle Indie orientali. Coltivato fino dal quattrocento.
1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1590 Cortuso
(1415 Rinio)

— β insanum (L.)
1772 Allioni — 1801 Bonato — 1806 Zuccagni — 1815 Biroli.
— γ ovigerum Lam.
1558 Mattioli — 1806 Zuccagni — 1842 Visiani.

2872¹ Solanum Pseudocapsicum L.
Di Madera. Coltivato fino dal cinquecento per ornamento.
1583 Michiel (1553) Cesalpino (Sol. arborescens) — 1713 Tita — 1780 Farsetti — 1801 Bonato.

2873 Solanum sodomaeum L.
Probabilmente originario del Capo. Coltivato dal principio del settecento e ora naturalizzato in molti luoghi della Italia centr. e merid.
1704 Martini — 1713 Tita — 1760 Allioni — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato.
Naturalizzato: 1789 Ucria — 1811 Tenore — 1827 Gussone — 1828 Fiorini — Mazzanti
— β Hermanni (Dun.)
1854 Gussone.

2874 Solanum Lycopersicum L.
Dell'America meridionale. Coltivato estesamente fino dal cinquecento e spesso avventizio
1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1565 Michiel — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1713 Tita — ~~Naturalizzato~~ Avventizio:
1864 Savardo — 1904 Goiran.
— β macrophyllum (Gust.)
1854 Gussone — 1906 Goiran
— γ piriforme (Poir.)
1854 Gussone — 1906 Goiran — 1801 Bonato
— δ Pseudolycopersicum (Jacq.)
1801 Bonato — 1854 Gussone.

2874¹ Solanum citrullifolium A. Br.
Dell'America Sett. Avventizio
1860 Bolle in Carnel — 1877 Freyn.

2874² Solanum bonariense L.
Nativo dell'Argentina; coltivato dalla fine del settecento ed talora avventizio
1793 Zuccagni — 1802 Rodati — 1812 Bonato — 1815 Biroli.
Avventizio: 1869 Pasquale.

2874³ Solanum aviculare Forst.
Dell'Australia; talor coltivato e avventizio.
1812 Bonato — 1815 Biroli — Avventizio
1899 Sauvaigo

2874⁴ Solanum marginatum L. fil.
Dell'Africa tropicale; coltivato e talora avventizio
1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1802 Rodati.
Avventizio: 1899 Sauvaigo.

φ — 1886 Goiran Cfr. Goiran Bull. Soc. bot. it. 1890

35/0018-194

Capsicum (Tourn.) L.

2875 Capsicum annuum L.
Oriundo della America tropicale, coltivato in molte varietà fino dal cinquecento.
1551 Aldrovandi II
1583 Cesalpino — 1611 Gregorio da Reggio, Capsicorum historia in Clusii Curae poster. Antw. — 1630 B. Ambrosini. De Capsicorum varietate. Bononiae.
1642 Vestirgio.
— β pyramidale (Mill.)
1611 Gregorio da Reggio l.c. — 1854 Gussone.
— γ cerasiforme (W.)
1611 Gregorio da Reggio l.c. — 1854 Gussone
— δ grossum (W.)
1630 Ambrosini l.c. — 1854 Gussone
— ε longum (DC.)
1562 Mattioli — 1630 Ambrosini l.c. — 1854 Gussone
— ζ cordiforme (Mill.)
1611 Gregorio da Reggio l.c. — 1630 Ambrosini l.c. — 1798 Farsetti

Physalis L.

2876 Physalis somnifera L.
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1789 Ucria — 1827 Gussone; Moris.

2877 Physalis Alkekengi L.
(1415 Rinio — 1551 Aldrovandi II —
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1640 Castelli.

2878 Physalis pubescens L.
Nativa dell'America merid. Coltivata dalla fine del settecento
1793 Zuccagni — 1812 Bonato — 1815 Biroli.
— β peruviana (L.)
Nativa e coltivata come la precedente e talora avventizia.
1793 Zuccagni — 1798 Farsetti — 1802 Rodati
— Avventizia: 1896 Bicknell.

Nicandra Adans.

2879 Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
Originaria del Perù. Coltivata dalla fine del settecento e qua e là naturalizzata.
1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1802 Rodati — 1812 Pollini.
Naturalizzata:
1830 Biasoletto in Rchb. Excurs. ed in Bertoloni II.
1870 Goiran ~~ed. 1904~~ cfr. Goiran Bull. Soc. bot. ital. 1890 — 1902 Palomba in Fiori II

Atropa L.

2880 Atropa Belladonna L.
1415 Rinio 1566 Calzolari — 1551 Aldrovandi II 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1595 Pona

Mandragora (Tourn.) L.

2881 Mandragora vernalis Bert
1550 Cibo — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1735 Micheli — 1824 Nacari
1415? Rinio

2882 Mandragora autumnalis Bert.
1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1640
Castelli – 1697 Cupani – 1735 Micheli
— β macrocarpa (Bert.)
1565 Cesalpino – 1723 Tilli – 1827 Moris

~~2882~~ Salpichroa Miers (Gill. et Hook.)
2882' Salpichroa rhomboidea Miers
Originario della Argentina; ~~Terra~~ ~~in cultura~~ completamente naturalizzata
~~spesso pure~~ ma ~~in coltura~~ ~~da noi~~,
~~negli orti botanici di Pisa, Firenze, Napoli~~
~~ove l'importazione è accidentale~~
1903 A. Fiori – 1904 L. Marcello –
1905 Sommier – 1906 Béguinot –
Cfr. Béguinot Sched. ad Fl. it. exsicc. n. 634
in N. giorn. bot. it. 1907, 259.

fam. 111 Scrophulariaceae

Verbascum L.

2883 Verbascum Thapsus L. R
1550 Gibo – 1554 Mattioli – 1583
Cesalpino – 1585 Durante – 1696
Cupani – 1726 Zannichelli
— β plantagineum (Moris)
1827 Moris

2883' Verbascum macrurum Ten.
(V. Thapsus × thapsiforme)
1827 Gussone – 1829 Tenore.

2883² Verbascum spurium Koch
(V. Thapsus × Lychnitis)
1893 Gabrini.

2883³ Verbascum montanum × Thapsus Chen.
1904 Chenevard.

2884 Verbascum montanum Schrad
1615 Rivino – 1551 al Strad. II
1723 Micheli in Tilli – 1819 Bertoloni
– 1822 Pollini – 1834 Cornelli.

2884' Verbascum montanum × Lychnitis G. P.
1882 Gibelli e Pirotta – 1904 Chenevard.

2885 Verbascum thapsiforme Schrad.
1583 Cesalpino – 1723 Micheli in Tilli.
– 1835 De Notaris, Balsamo-Crivelli,
Moretti in Bertoloni II.
— β cuspidatum (Schrad.)
1810 Bertoloni – 1875 Caruel in C. P. G.

2885' Verbascum ramigerum Link
(V. thapsiforme × Lychnitis)
1875 Caruel in C. P. G.

2886 Verbascum phlomoides L. R.
1615 Rivino 1551 al Strad. II
1532 Gibo – 1745 Séguier – 1785
Allioni – 1804 Sternberg.
— β australe (Schrad.)
1832 Tenore – 1835 Manni in Bertoloni II.
— γ viminale (Guss.)
1826 Gussone – 1829 Tenore.

2887 Verbascum longifolium Ten.
1723 Micheli in Tilli – 1811 Tenore
1826 Gussone – 1827 Brocchi

35/0018-195

2888 Verbascum Blattaria L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1723 Micheli in Tilli – 1726 Zannichelli.
— β virgatum (With.)
1563 Cesalpino – 1735 Micheli – 1823 Romano – 1842 Treviran – 1847 Zanardini.
— γ repandum (W.)
1842 Guglione.

2888' Verbascum geminatum Freyn.
(V. Blattaria × sinuatum)
1877 Freyn – 1891 Chiovenda – 1904 Goiran.

2889 Verbascum niveum Tenore
1811 Tenore – 1835 Ottaviano Bertoloni II

2890 Verbascum angustifolium Ten.
1829 Tenore – 1835 Gasparrini in Bertoloni II.
— β garganicum (Ten.)
1826 Guglione – 1829 Tenore

2891 Verbascum pulverulentum Vill.
1554 Matthioli (Verb. Lichnite) – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1822 Pollini – 1824 Cornolti.
— β Guglionei (Tineo)
1844 Tineo in Guglione.

2891' Verbascum pulverulentum × orientale Gelm.
1893 Gelmi.

2891" Verbascum Wirtgeni Franchet
(V. pulverulentum × nigrum Wirtg.)
1853 Rota – 1857 Gennari – 1879 Caldesi.

2891³ Verbascum pulverulentum × phlomoides Gelm.
1893 Gelmi – 1904 Goiran.

2891⁴ Verbascum hybridum Brot
(V. pulverulentum × sinuatum)
1817 Freyn – 1907 Sommier, Motta reale a. Fiori IV.

2892 Verbascum Lychnitis L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Matthioli – 1565 Cesalpino – 1595 Porta – 1723 Micheli in Tilli

2893 Verbascum Boerhaavei L.
2 (1867 Ardoino – 1872 Marsilly
1 (1835 Guglione – Gasparrini in Bertoloni II
— β bicolor (Bad.)
1785 Allioni – 1824 Badarò.
— γ rotundifolium (Tenore)
1811 Tenore

2894 Verbascum conocarpum Moris
1828 Moris – 1870 Gennari

2895 Verbascum sinuatum L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1565 Cesalpino – 1565 Matthioli – 1723 Micheli in Tilli – 1726 Zannichelli

2895' Verbascum sinuatum × Boerhaavei Ces.
1875 Cesati in C. P. G.

2896 Verbascum nigrum L.
1554 Matholi – 1585 Durante – 1595 Pona – 1723 Micheli in Tilli.
— β thyrsoideum (Host)
1898 Pospichal – 1904 Goiran
— γ lanatum (Schrad.)
1852 Hausmann – 1853 Rota – 1878 Smith – 1893 Gelmi.
2896¹ Verbascum semialbum Chaub.
(V. nigrum × Thapsus)
1893 Gelmi – 1906 Gortani.
2896² Verbascum nigrum × thapsiforme Fr.
(+1886) Franzoni, ed 1890 – 1903 R. Keller.
2896³ Verbascum Schiedeanum Koch
(V. nigrum × Lychnitis)
1893 Gelmi – 1899 Sauter – 1903 Chenevard – 1904 Goiran
2896⁴ Verbascum nigrum × phlomoides Kell.
1903 R. Keller

2897 Verbascum Chaixii Vill.
1595 Pona – 1704 Martini – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1826 Pollini – 1874 Goiran
— β austriacum (Schott)
1874 Goiran – 1878 Smith – 1893 Gelmi.
2897¹ Verbascum Chaixi × Lychnitis Goir.
1904 Goiran
2897² Verbascum Freynianum Borbas
(V. Chaixi × Thapsus Borbas)
1876 Borbas in Oest. bot. Zeitschr.
2897³ Verbascum ~~semi~~ lanatum Borb.
(V. chaixi × lanatum)
1877 Freyn. Cfr. Nym. Consp. 531.

2897⁴ Verbascum fluminense Kerner
(V. Chaixi × pulverulentum)
1889 Kerner in Nyman Consp. Suppl. p. 230.
2897⁵ Verbascum tomentosulum Freyn
(V. Chaixi × sinuatum)
1877 Freyn.

2898 Verbascum phoeniceum L.
1550 Cito – 1565 Michiel – 1595 Pona – 1735 Micheli – 1745 Séguier
2898¹ Verbascum rubiginosum W. K.
(V. phoeniceum × nigrum)
1821 Re – 1893 Gelmi.

2898² Verbascum magellense Ten.
1829 Tenore (Sp. dubbia)

2898³ Verbascum commutatum Ten.
1831 Tenore – 1875 C. P. G. (Sp. dubbia)

2898⁴ Verbascum alopecuroides A. Biv.
1838 Andrea Bivona – Bernardi – 1842 Gussone (Specie dubbia)

2898⁵ Verbascum argenteum Ten.
1829 Tenore (Specie dubbia)

2898⁶ Verbascum messanense Tin.
1844 Tineo in Gussone II p. 887
(Sec. Nyman var. del V. macrurum)

2898⁷ Verbascum annuum Mill.
1819 Roemer e Schult. Syst. veg. IV, 348 (nota)

35/0018-196

Celsia L.

2899 Celsia cretica L. f.
1814 Rafinesque – 1826 Gussone; Jan – 1827 Moris; Zerapha.

Linaria (Tourn.) Med.

2900. Linaria Cymbalaria (L.) Mill.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli
— β acutangula (Ten.)
1830 Tenore – 1854 Gussone

2901 Linaria hepaticifolia (Poir.) Duby
1827 Loiseleur – 1834 Salis-Marschlins – 1872 Marsilly.

2902 Linaria pallida Tenore
1826 Gussone – 1811 Tenore

2903 Linaria pilosa (L.) D.C.
1820 Tenore – 1872 N. Terracciano
— β pubescens (Presl)
1696 Cupani – 1806 Bivona-Bernardi – 1822 Presl.

2904 Linaria aequitriloba (Viv.) Spr.
1824 Viviani – 1858 Moris – 1860 Caruel – 1872 Marsilly

2905 Linaria Muelleri Moris
1857 Moris – 1875 C. P. G.

2906 Linaria Elatine (L.) Mill.
1550 Petroli Cibo – 1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli
— β Sieberi (Rchb.)
1844 Tineo in Gussone – 1872 Marsilly – 1877 Freyn.
— γ Biancae (Lojac.)
1881 Lojacono, Osserv. Linar. eur. dell. Sez. Elatinoides.
— δ convolvulacea (Lojac.)
1881 Lojacono l.c. – 1902 Béguinot in Fiori
1854 Gussone

2907 Linaria spuria Mill.
1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli

2908 Linaria commutata Bernh.
1835 Tenore – 1844 De Notaris – 1853 Grech-Delicata – 1858 Moris.

2909 Linaria cirrosa (L.) D. C.
1723 Micheli in Tilli – 1827 Moris – 1830 Tenore – 1834 Salis-Marschlins

2910 Linaria Pelisseriana (L.) Mill.
(+1673) Barrelier ed 1714 – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1816 Noua e Balbis.

2911 Linaria arvensis (L.) Desf.
1785 Allioni – 1806 Bivona Bernardi – 1831 Zerapha – 1847 Zanardini.

— β simplex (DC.)
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1844 De Notaris — 1858 Moris.
— γ micrantha (Spr.)
1827 Moris — 1844 Gussone, De Notaris in Bertoloni VI.

2912. Linaria vulgaris Mill.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona.
— β italica (Trev)
1852 Facchini in Hausmann — 1853 Rota — 1855 Pirona — 1869 Vitiani — Sauardo

2913 Linaria supina (L.) Desf.
1785 Allioni — 1805 Re — 1816 Nocca e Balbis — 1828 Gussone

2914 Linaria alpina (L.) Mill.
1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β petraea (Jord.)
1854 Jordan in Comptes-rendus Soc. Hallér.

2915 Linaria flava (Poir.) Desf.
1827 Moris — 1828 Loiseleur

2916 Linaria reflexa (L.) Desf.
1664 Ray, ed. 1694 — 1696 Cupani 1789 Ucria — 1806 Bivona-Bernardi

2917 Linaria pseudolaxiflora Lojac.
~~Il Lipo è proprio dell'Algeria e Marocco~~
1884 Swierlein in Lojacono — 1907 Sommier, Ross in Fiori IV

2918 Linaria triphylla (L.) Mill.
1674 Bocone — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1826 Gussone.

2919 Linaria dalmatica (L.) Mill.
1899 Palanza Fl. della terra di Bari (L. Iattae) — 1902 Béguinot in Fiori II.

2920 Linaria genistifolia (L.) Mill.
1830 Reichenbach Fl. excurs. — 1844 Cesati — 1879 C. P. G. — 1885 Ricasoli, Hater in Parl. Carnel VI.
— β linifolia Chav.
1879 C. P. G.

2921 Linaria heterophylla Desf.
1674 Bocone — 1789 Ucria — 1826 Gussone; Jan — 1830 Tenore
β humilis (Guss.)
1828 Gussone

2922 Linaria purpurea (L.) Mill.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1735 Micheli — 1818 Sebastiani e Mauri

35/0018-197

2923. Linaria Capraria Mor. et De Not.
1723 Tozzi in Tilli - 1839 Moris e De Notaris.

2924 Linaria chalepensis (L.) Mill.
1685 Trionfetti - 1696 Cupani - 1745 Seguier - 1792 Cirillo - 1822 Pollini.

2925 Linaria monspessulana (L.) Mill.
1785 Allioni - 1805 Re - 1808 Bivona - Bernardi - 1844 De Notaris.

2926 Linaria rubrifolia Rob. et Cast.
1789 Allioni - 1827 Moris - 1835 Tenore - 1844 De Notaris

2927 Linaria minor (L.) Desf.
1562 Mattioli - 1563 Cesalpino - 1585 Durante - 1745 Séguier.
— β litoralis (W.)
1825 Bernhardi ap. Spreng. Syst. veg. II
1843 Koch - 1875 C. P. G. - 1877 Freyn

2927' Linaria origanifolia (L.) DC
1906 E. Ferrari. Cfr. Fiori IV.

Antirrhinum (Tourn.) L

2928 Antirrhinum Orontium L.
1550 Petroll. Cibo - 1563 Cesalpino - 1565 Mattioli - 1595 Pona - 1696 Cupani - 1726 Zannichelli
— β calycinum (Vent.)
1830 Tenore - 1881 Nyman Consp.
1745 Sabbati -

2929 Antirrhinum latifolium DC.
1556 Petroll. Cibo - 1563 Cesalpino - 1697 Boccone - 1735 Micheli - 1816 Nocca e Balbis - 1844 De Notaris - 1852 Rota.

2930 Antirrhinum majus L. R
1532 Cibo - 1551 Aldrovandi - 1554 Mattioli - 1583 Cesalpino - 1696 Cupani - 1697 Boccone - 1726 Zannichelli
— β tortuosum (Bosc)
(+ 1673) Barrelier, ed. 1714 - 1818 Sebastiani e Mauri - 1822 Presl - 1828 Gussone - 1835 Tenore

2931 Antirrhinum siculum Ucria
1696 Cupani - 1796 Ucria - 1826 Gussone

Anarrhinum Desf.

2932 Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.
1785 Allioni - 1808 Biroli - 1816 Nocca e Balbis - 1822 Pollini
— β laxiflorum (Boiss.)
1857 Boreau

Scrophularia (Tourn.) L.

2933 Scrophularia vernalis L.
1606 Colonna - 1696 Cupani - 1726 Zannichelli.
— β brachycarpa Bég.
1902 G. Doria, Béguinot in Fiori II.

2934 Scrophularia peregrina L.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1798 Savi.

2935 Scrophularia Scopolii Hopp.
1723 Tilli – 1785 Allioni – 1842 Puccinelli.
– β grandidentata (Ten.)
1696 Cupani – 1830 Tenore

2936 Scrophularia aquatica L.
1551 Aldrovandi – 1704 Martini – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
– β alata (Gilib.)
1855 Pirona – 1864 Savardo – 1904 Goiran.
– γ Neesii (Wirtg.)
1904 Goiran
– δ auriculata (L.)
1785 Allioni – 1828 Moris – 1844 De Notaris – 1875 C. P. G.

2937 Scrophularia nodosa L.
1415 Primo 1550 Petrol. Cibo – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli

2938 Scrophularia trifoliata L.
1551 Aldrovandi II 1697 Boccone – 1827 Moris – 1870 Gennari

2939 Scrophularia lucida L.
1697 Boccone – 1820 Tenore

– β filicifolia (S. et S.)
1826 Gussone; Jan.
– γ laciniata (W. et K.)
1878 Smith – 1885 Noè in Parl. Caruel, VI.

2940 Scrophularia canina L.
1550 Petrol. Cibo – 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – (Sideritis III) – 1595 Pona – 1696 Cupani 1726 Zannichelli.
2 – γ ramosissima (Lois.)
1806 Loiseleur – 1828 Moris.
1 – β Hoppei (Koch)
1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone – 1829 Tenore – 1844 Cesati; Bonjean, Facchini ecc in Bertoloni VI – 1853 Rota

2940' Scrophularia scorodonia L.
1785 Allioni (Da confermarsi)

Paulownia S. et Zucc.

2941 Originaria del Giappone, introdotta in Europa poco prima della metà dell'ottocento ed ora molto diffusa e talora avventizia.
1850 Vitiani Cat. sem. Hort. pat. – 1867 Pasquale – 1864 Savardo – 1904 Goiran

Gratiola L.

2942 Gratiola officinalis L.
1415 Primo 1550 Petr. Cibo – 1563 Cesalpino – 1558 Mattioli – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.
1551 Aldrovandi

35/0018-198

Limosella L.

2943 Limosella aquatica L.
1808 Biroli – 1842 Trevisan – 1844 Cesati; Facchini in Bertoloni VI – 1802 Suffren –

Lindernia All.

2944 Lindernia Pyxidaria L.
1532 Cibo – 1765 Allioni – 1806 Balbis – 1808 Biroli – 1816 Nouae Balbis.

Verónica (Tourn.) L.

2945 Veronica lutea (Scop.) Wettst.
2 (1792 Host – 1810 Brignoli – 1820 Moretti – 1854 Ambrosi in Hausmann III.
1 (1729 Micheli – 1726 Zannichelli.

2945' Veronica Curchillii Huter
(V. super-lutea × Bonarota)
1871 Curchill in Huter Oest. bot. Zeitschr. 1873. Cfr Prohaska l. c. 1895 – 1906 Gortani

2946 Veronica Bonarota L.
1532 Cibo – 1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli.

2946' Veronica Pacheri Prohaska
(V. super-Bonarota × lutea)
1902 Béguinot in Fiori IV – 1906 Gortani.

2947 Veronica Beccabunga L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1595 Pona – 1697 Bouone – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Marzari; Suffren.

2948 Veronica Anagallis L.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1718 Pontedera – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari.
— β ovalis Vis
1866 N. Terracciano in Atti Acad. aspir. natur. – 1906 Gortani
— γ pusilla (Benth.)
1846 Bentham in DC Prodr. X.

2949 Veronica anagalloides Guss.
1826 Gussone – 1858 Moris – 1872 Marsilly – 1882 Bizzozero.

2950 Veronica Teucrium L.
1551 Aldrovandi II 1565 Mattioli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari
— β prostrata (L.)
1697 Bouone – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1816 Nouae Balbis – 1864 Saccardo
— γ austriaca (L.)
1797 Host – 1802 Suffren – 1833 Moretti, Brignoli, Biasoletto in Bertoloni I – 1855 Pirona.

2951 Veronica Chamaedrys L.
1532 Cibo – 1583 Cesalpino – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari.

2952 Veronica urticifolia Jacq.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1804 Savi — 1815 Moretti.

2953 Veronica officinalis L.
1532 Cibo — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1561 Anguillara — 1697 Bouone — 1551 Aldrovandi

2954 Veronica Allionii Vill
1755 Allioni — 1805 Re — 1833 Balbis, Bonjean, Bertero in Bertoloni I.

2955 Veronica scutellata L.
1772 Maratti — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1816 Bona e Balbis.

2956 Veronica montana L.
1606 Colonna — 1808 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini.

2957 Veronica aphylla L.
1532 Cibo — 1697 Bouone — 1745 Séguier.
— β longistyla (Ball)
1850 Ball, Ann. of Mag. and Nat. Hist.
— γ nudicaulis (Lam.)
1875 Cesati in C.P.G.

2958 Veronica longifolia L.
1532 Cibo — 1797 Host — 1816 Nova e Balbis — 1818 Moretti.

— β spuria (L.)
1875 C.P.G. — 1890 A. Terracciano.

2959 Veronica spicata L.
1550 Petrus Cibo — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1735 Micheli — 1726 Zannichelli
— β nitens (Host)
1804 Savi — 1822 Pollini — 1869 Visiani e Sauardo — 1906 Gortani.
— γ orchidea (Crantz)
1844 Cesati — 1869 Visiani e Sauardo

2960 Veronica fruticulosa L.
1754 Séguier — 1802 Suffren — 1808 Biroli — 1822 Pollini — 1834 Massara.
— β fruticans (Jacq.)
1595 Pona — 1713 Tita — 1785 Allioni — 1834 Massara — 1842 Puccinelli.

2961 Veronica Ponae Gouan
1822 Moretti — 1833 Thomas in Bertoloni I — 1872 Marsilly

2962 Veronica serpyllifolia L
1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1802 Suffren
— β tenella (All.)
1785 Allioni — 1822 Pollini — 1829 Tenore
— γ repens (DC.)
1824 Viviani — 1850 Soleirol in Grenier e Godron II — 1872 Marsilly

2962' Veronica apennina Tausch
1828 Tausch in Syll. plant. novar. a Soc. bot. ratisb. edita II p. 247 (specie dubbia)

35/0018-199

2963 Veronica bellidioides L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1833 Bertoloni I

2964 Veronica alpina L.
1755 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re.

2965 Veronica acinifolia L.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1806 Balbis

2966 Veronica brevistyla Moris
1839 Moris e De Notaris – 1858 Moris – 1872 Martilly.

2967 Veronica verna L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini

2968 Veronica arvensis L.
1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino – 1592 Colonna – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
— β pseudoarvensis (Tineo)
1817 Tineo

2969 Veronica peregrina L.
Originaria dell'America merid. Ha consta che sia stata coltivata, ma cominciò a comparire fra noi avventizia qua e là nel settecento.
1753 Linneo (Ver. romana)
1824 Tenore – 1831 Romano – 1833 Visiani in Bertoloni I – 1842 Trevisan – 1869 Visiani e Savardo

2970 Veronica triphyllos L.
1772 Maratti – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1820 Moricand
1745 Séguier

2971 Veronica praecox All.
1789 Allioni – 1805 Re – 1827 Gussone – 1833 Balbis, Orsini in Bertoloni I – 1834 Massara.

2972 Veronica persica Poir.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1808 Savi; Biroli – 1811 Tenore – 1818 Ruchinger.

2973 Veronica agrestis L.
1737 Sabbati – 1701 Martini – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1827 Gussone – 1833 Bertoloni – 1802 Marzari; Suffren.
— β didyma (Ten.)
1415 Rinio
1785 Allioni – 1844 Cesati – 1847 Zanardini – 1869 Visiani e Savardo

2974 Veronica hederifolia L.
1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Marzari; Suffren.

2975 Veronica Cymbalaria Bodard
1802 Viviani – 1804 Bertoloni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Moricand.
— β panormitana (Tineo)
1832 Tineo in Gussone

— ∫ cuneata (Guss.)
1854 Gussone — 1902 Béguinot in Fiori II.

2975' Veronica decipiens Nicotra
(V. Cymbalaria × panormitana)
1894 Nicotra in Malpighia VIII

2975² Veronica digitata Vahl.
1825 Re (V. orb. arvensi p.p. Era già coltivata nell'Orto bot. di Torino nel 1820: Capelli)

Wulfenia Jacq.

2976 Wulfenia carinthiaca Jacq.
1855 Pirona (*) 1879 Bak. Cadham.
ed. 1896 — 1906 Gortani — 1875 Jabornegg
cfr. O. Marinelli in Guida del Canal del Ferro
Udine, 1894.

Digitalis (Tourn.) L.

2979 Digitalis purpurea L.
Dell'Europa occ. i coltivata fino dall'incirca.
1561 Augustiana — 1566 Calzolari —
1583 Cesalpino — 1591 Cortuso
Naturalizz.: 1697 Bologna — 1808 Biroli —
1855 Pirone — 1879 Caldesi —
— β tomentosa (Hoffg. et Lk.)
1827 Moris — 1834 Salis-Marschlins
— 1844 Soleirol in Bertoloni VI p. 403.

2979' Digitalis Gyspergerae Rouy
1904 Mad. Sypperger in Rouy
Rev. bot. systémat.

2977 Digitalis ferruginea L.
1774 Bonelli — 1785 Allioni — 1816
Nocca e Balbis — 1818 Sebastiani.
e Mauri.

2978 Digitalis laevigata W. K.
1844 Tommasini e Biasoletto, Bernhardi
in Bertoloni VI — 1875 C. P. G. —
1878 Smith.

2980 Digitalis ambigua Murr.
1532 Gesner — 1595 Pona — 1697 Boccone
— 1726 Zannichelli — 1768 Turra, ed. 1780
— 1802 Sutter.

2981 Digitalis lutea L.
1551 Aldovrandi — 1563 Cesalpino —
1595 Pona — 1666 Calzolari — 1745
Segner — 1785 Allioni.

2981' Digitalis lutea × micrantha Bég.
1902 Béguinot in Fiori II

2981² Digitalis media Roth.
(D. ambigua × lutea J. May.)
1853 Rota — 1885 Burnat in Fl. Cal.
med VI.

2982 Digitalis micrantha Roth.
1829 Tenore — 1854 Gussone — 1879 Caldesi
A. Digitalis di-tellae Trotter
(D. ferrug. × micrantha)
1908 Trotter

Erinus L.

2983 Erinus alpinus L.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1829 Moris
— 1867 Ardoino.

Melampyrum (Tourn.) L.

(*) Il Pirona l.c. informa che la Wulfenia fu ancor prima rinvenuta presso Massfeld da re Federico Augusto II di Sassonia (1797–1854). ora il viaggio botanico ch'egli fece nel 1838 fu illustrato in un'opera del Dr Braunhofer, edita in Vienna nel 1841; ma in tale opera nessuna menzione è fatta della Wulfenia.

35/0018-200

2984 Melampyrum cristatum L.
1551 Aldrovandi – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1816 Noce e Baltis.

2985 Melampyrum arvense L.
1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli
— β versicolor Posp.
1898 Pospichal

2986 Melampyrum barbatum W. K.
1817 Pollini – 1823 Romano – 1827 Nacari – 1844 Bertoloni
— β variegatum Porta et Rigo
1877 ~~Porta~~ Rigo – 1908 Huter, Herbar-Studien, p. 120.

2987 Melampyrum nemorosum L.
1532 Cibo – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren.
— β pratense (L.)
1707 Martini – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari 1595 Pona –

2988 Melampyrum silvaticum L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1808 Biroli – 1822 Pollini.

Tozzia L.

2989 Tozzia alpina L.
1606 Colonna – 1729 Micheli – 1742 Zanoni-Monti – 1785 Allioni – 1805 Re.

Euphrasia L.

2990 Euphrasia salisburgensis Funck.
1697 Bocone – 1804 Balbis – 1808 Biroli – 1822 Pollini –
— β illyrica (Wettst.)
1893 Fritsch, Freyn, Castelli in Wettst – 1906 Gortani.
— γ Portae (Wettst.)
1896 Venzo in Wettstein – 1906 Gortani
— δ Marchesettii (Wettst.)
1896 Marchesetti

2991 Euphrasia tricuspidata L.
1532 Cibo (1707 Martini) – 1742 Zanoni-Monti – 1822 Pollini – 1844 De Bracht, Manganotti, Rainer ecc. in Bertoloni VI
— β cuspidata Host
(1835 Host) 1896 Pirona, Huter, Ball, Bizzozero in Wettstein – 1906 Gortani
— γ italica (Wettst.)
1896 Tenore (+1861), Groves, Porta in Wettstein – 1898 Pospichal – 1906 Gortani

2991' Euphrasia vestinensis Wettst
(E. tricuspidata × Kerneri)
1896 Evers.

2992 Euphrasia officinalis L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1802 Marzari i Suffren.
— β stricta (Host)
1697 Boccone – 1819 Bertoloni – 1894 Krasan, Bilimek in Wettstein
— γ liburnica (Wettst.)
1894 Freyn in Wettstein – 1896 Marchesetti
— δ tatarica (Fisch.)
1896 Bicknell; Marchesetti; Burnat, Rostan in Wettstein – 1898 Pospichal.
— ε nemorosa (Pers.)
1883 Cocconi Fl. Bologn. – 1893 Gelmi 1904 Goiran.
— ζ gracilis Fries
1898 Pospichal
— η minima (Jacq.)
1615 Rimio 1822 Pollini – 1853 Rota – 1869 Vitiani e Saccardo.
— ι brevipila (Burn. et Greml.)
1896 Bicknell + (Carestia III), (Rostan II (+1895)) (Venzo I (+1876)) in Wettstein
— κ pumila (A. Kern.)
1899 Sauter
— λ versicolor (A. Kern.)
1899 Sauter – 1904 Chenevard.

2993 Euphrasia alpina Lam.
1844 Montini, Pardini ec. in Bertoloni VI – 1867 Ardoino – 1896 Huter, Porta, Burnat, Levier ec. in Wettstein.
— β picta (Wimm.)
1896 Venzo (+1876), Porta in Wettstein – 1898 Pospichal – 1906 Gortani
— γ Kerneri (Wettst.)
1896 Kellner (+1849), Venzo (+1876), Huter in Wettstein – 1896 Marchesetti – 1898 Pospichal.
— δ Rostkoviana (Hayne)
1697 Boccone – 1819 Bertoloni – 1898 Pospichal – 1906 Gortani.
2993' Euphrasia hybrida Wettst.
(E. Rostkoviana × stricta)
1904 Chenevard.

Bartsia L.

2994 Bartsia alpina L.
1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni

2995 Bartsia Trixago L.
1606 Colonna – (+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1785 Allioni – 1808 Savi.

2996 Bartsia latifolia (L.) S. et S.
1606 Colonna – 1623 C. Bauhin – 1696 Cupani – 1745 Seguier.
2997 Bartsia viscosa L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – (+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1785 Allioni – 1808 Savi.

35/0018-201

Odontites Haller

2998. Odontites Bacconei (Guss.) Walp.
1696 Cupani – 1697 Bocone – 1821 Gussone – 1826 Presl.

2999. Odontites viscosa (L.) Rchb.
1785 Allioni – 1805 Re – 1867 Ardoino 1875 C. P. G.

3000 Odontites lutea (L.) Rchb.
1563 Cesalpino – 1565 Michiel – 1595 Pona – 1606 Colonna – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren; Marzari.

3001 Odontites lanceolata (Gaud.) Rchb.
1844 Bonjean in Bertoloni VI – 1867 Ardoino – 1875 C. P. G.

3002 Odontites serotina (Lam.) Dum
1595 Pona – 1606 Colonna – 1745 Séguier – 1844 De Notaris – 1821 Romano
1583 Cesalpino

— β verna (Bell.)
1790 Bellardi – 1816 Nocca e Balbis – 1818 Sebastiani e Mauri – 1847 Zanardini.

— γ sicula (Hoffm.)
1844 Gussone.

3004 Odontites rigidifolia (Biv.) Benth.
1696 Cupani – 1789 Noria – 1806 Bivona – Bernardi – 1828 Gussone.

— β Citardae (Tod.)
1867 c. Todaro Fl. sic. exs. n. 355 – 1881 Nyman, Consp.

3003 Odontites corsica (Lois.) G. Don
1806 Loiseleur – 1827 Moris – 1867 Mabille – 1872 Marsilly.

Rhinanthus L.

3005 Rhinanthus Alectorolophus (Scop.) Poll.
1551 Aldrovandi II
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1818 Sebastiani e Mauri.

— β patulus (Stern.)
1901 Sterneck

— γ Kerneri (Stern.)
1899 Chabert – 1901 Sterneck

— δ modestus (Chabert)
1899 Chabert – 1906 Gortani.

— ε Jeynii (Stern.)
1895 Sterneck, Oest. bot. Zeitschr. – 1898 Pospichal – 1906 Gortani

— ζ Sterneckii (Wettst.)
1897 Loss in Wettst. Oest. bot. Zeitschr. – 1901 Sterneck

— δ Facchinii (Chab.)
(+1852) Facchini. Cfr Chabert 1899 – 1906 Gortani.

3006 Rhinanthus major Ehrh.
1726 Zannichelli – 1745 Séguier

— β ovipugus (Chab.)
1899 Chabert

R

1

— γ divaricatus (Stern.)
1895 Sterneck, Oest. bot. Zeitschr. — 1900 Chabert
— δ Songeonii (Chab.)
1899 Chabert
— ε Burnati Chab.
1900 Chabert
— ζ mediterraneus (Stern.)
1895 Sterneck l.c. — 1899 Chabert
— η Wettsteinii (Stern.)
1895 Sterneck l.c.
— δ Beyerii Behrends.
(+1887) Malinverni in Behrends. Verh. bot. Verein. Brandenb. 1903
— ι serbtinus Schönh.
1902 Chenevard — 1903 Rostan, Beyer in Behrends. l.c.

3007 Rhinanthus angustifolius Gmel
1822 Pollini — 1844 Bertoloni; Cesat. — 1864 Sauardo — 1906 Gortani.
— β lanceolatus (Kováts)
1852 Hausmann (R. alp. p.p.)
1895 Sterneck l.c. — 1899 Chabert
— γ subalpinus (Sterne)
1895 Sterneck l.c. — 1900 Chabert — 1906 Gortani.
— δ Pampaninii Chab.
1905 Pampanin. in N. giorn. bot. it. — 1906 Gortani.

3008 Rhinanthus minor Ehrh.
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1822 Pollini — 1842 Trevisan — 1844 De Notaris
— β stenophyllus (Schur)
1852 Hausmann — 1900 Chabert

Elephas (Tourn.) Adans.
3009 Elephas Columnae Guss.
1606 Colonna — 1690 Cupani — 1828 Gussone — 1830 Tenore.

Pedicularis (Tourn.) L.
3010 Pedicularis verticillata L.
1726 Zannichelli — 1769 Agosti — 1785 Allioni — 1808 Biroli.

3011 Pedicularis tuberosa L.
1707 Martini — 1754 Séguier — 1815 Sprengel — 1816 Pollini — 1820 Moretti.
— β leptostachya Vis. e Sau.
1843 Pappenitz in Rchb. Ic. XX — 1869 Visiani e Sauardo.

3012 Pedicularis Barrelieri Rchb.
1844 Bergamaschi, De Notaris, Rainer in Bertoloni VI — 1847 Cornolli — 1853 Rota.
3013 Pedicularis incarnata Jacq.
1755 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1844 Bertero, Bonjean in Bertoloni VI. 1853 Rota — 1906 Gortani.

35/0018-202

— β helvetica Stein.
1887 Steininger
3013¹ Pedicularis incarnatoides Stein.
(P. incarnata × caespitosa)
1887 Steininger.
3013² Pedicularis atro-rubens Schl.
(P. incarnata × recutita)
1821 Re – 1844 Bonjean e Balbis in Bertoloni VI – 1882 Arcangeli.
3013³ Pedicularis Murithiana Arv. T.
(P. tuberosa × recutita)
1880 Arvé – Touv. in Bull. soc. Murith.

3014 Pedicularis rostrata L.
1726 Zannichelli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1834 Massara – 1853 Rota.
1713 Tita –
— β Jacquini (Koch)
1852 Perini, Leybold in Hausmann – 1853 Rota – 1893 Gelmi.
— γ caespitosa (Sieb.)
1887 Steininger – 1893 Gelmi.
— δ asplenifolia Floerke
1844 Facchini, Moretti in Bertoloni VI – 1837 Sandi – 1853 Rota.
— ε cenisia (Gaud.)
1835 Colla – 1844 Sassi; Bonjean in Bertoloni VI.
3014¹ Pedicularis erubescens Kern.
(P. rostrata × tuberosa)
1887 Steininger – 1893 Gelmi

3014² Pedicularis Bohatschii Stein.
(P. rostrata × leptostachya)
1887 Bohatsch in Steininger
3014³ Pedicularis affinis Stein.
(P. caespitosa × tuberosa)
1887 Siegfried e Graf in Steininger.

3015 Pedicularis gyroflexa W.
2(1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Pollini
1(1595? Pona – 1745 Séguier
— β elegans (Ten.)
1830 Tenore – 1875 C. P. G.
1844 Ottaviani, Manzi, Sanguinetti in Bertoloni VI
3015¹ Pedicularis Verloti Arvé – Touv.
(P. tuberosa × gyroflexa)
1887 Perini in Steininger – 1893 Gelmi
3015² Pedicularis Penzigi Stein.
(P. gyroflexa × tuberosa)
1879 Penzig, Il monte Generoso – 1887 Steininger
3015³ Pedicularis Kerneri Hut.
(P. gyroflexa × leptostachya)
1871 Huter e Porta. Cfr. Steininger 1887.
3016 Pedicularis palustris L. R
1769 Agosti – 1785 Allioni – 1802 Saffren 1808 Biroli – 1768 Turra, ed 1780

3017 Pedicularis silvatica L.
1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1844 Bertoloni.
3018 Pedicularis comosa L.
1697 Bouone – 1755 Allioni – 1802 Marzari – 1816 Nove e Balbis
1754 Séguier –
1415 Rusio – 1565 Michiel –

3019 Pedicularis petrolaris Ten.
1835 Tenore – 1875 C. P. G. (excl. Cor. Istria) – 1877 Aut. Porta, Rigo Exsicc. it. Fasc. 4. 429.
— β Friderici-Augusti Tomm.
1839 Tommasini in Linnaea e 1844 in Bertoloni VI.

3020 Pedicularis acaulis Wulf.
1802 Brocchi in Mayani – 1822 Pollini
(1754 Séguier) – 1893 Gelmi.

3021 Pedicularis foliosa L.
1713 Tilli – 1726 Zanichelli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Brocchi
— β summana (Spr.)
1754 Séguier – 1816 Pollini.

3022 Pedicularis recutita L.
1785 Allioni – 1806 Loiseleur – 1846 Boissier, Comolli, Facchini in Bertoloni VI – 1893 Gelmi.

3022' Pedicularis Huteri Kern.
(P. recutita × tuberosa Kern.)
1870 Huter in Kerner – 1893 Gelmi.

3023 Pedicularis rosea Wulf.
1837 Sandri – 1844 Cesati – 1852 Perini, Facchini in Hausmann – 1853 Porta 1893 Gelmi.
— β Allionii (Rchb. f.)
1755 Allioni – 1867 Ardoino.

3023' Pedicularis Hausmanni Hut.
(P. rosea × rostrata)
1873 Huter in Oest. Bot. Zeitschr. – 1899 Sauter.

3024 Pedicularis Oederi Vahl
1785 Allioni – 1805 Re – 1826 Moretti – 1853 Porta.

Jan. 112 Orobanchaceae
Kopsia Dum.

3025 Kopsia ramosa (L.) Dum.
1550 Cibo – 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1754 Séguier.
— β nana (Rõe)
1883 Lojacono – 1898 Pospichal

3026 Kopsia aegyptiaca (Pers.) Car.
1883 Lojacono – 1885 Port. Comit. VI.

3027 Kopsia Mutelii (F. Schultz) Bég.
1854 Gussone – 1858 Moris – 1867 Ardoino – 1884 Jeanbernat in Barbey.
— β angustiflora Beck.
1878 Lojacono

3028 Kopsia Lavandulacea (Rchb.) Car.
(† 1711) Cupani, ed. 1713 – 1826 Presl – 1843 Gussone.

3029 Kopsia Schultzii (Mat.) Beg.
H. bpo e prgni della Cina occ. Sprague mer. d., Africa lett e Asia occ.
— β stricta (Carval)
1827 Moric – 1870 Lemaire – 1875 C. P. G.
— γ Gussoneana (Lojac.)
1885 Lojacono – 1864 Gussone
1696 Cupani

3030 Kopsia purpurea (Jacq.) Bég.
1785 Allion. – 1805 Re – 1815 Savi – 1816 Nocca e Balbis.
— β Spitzelii Beck
1890 Beck.
— γ bohemica Celak.
1890 Rostan in Beck.

3031 Kopsia arenaria (Borkh.) Dum.
1852 Rota; Hausmann – 1867 Ardoino – 1875 C. P. G.

Orobánche (Tourn.) L.

3032 Orobanche carnea Loefl.
1874 Gussone – 1875 C. P. G. – 1878 Lojacono
1872 Marsilly

3033 Orobanche caerulescens Steph.
1855 Brameh in Pirona – 1869 Vitman e Savardo – 1875 C. P. G. (Habitat da confermarsi.)

3034 Orobanche caryophyllacea Sm.
1808 Brodi – 1816 Nocca e Balbis – 1822 Pollini – 1827 Vaucher

3035 Orobanche Teucrii Holl.
1851 Simi – 1867 Ardoino – 1875 C. P. G.
(1852) Facchini. Cfr. Zahn 1893

3036 Orobanche lutea Baumg.
1802 Viviani – 1842 Terracciano – 1864 Bertoloni – 1869 Vitman e Savardo

3037 Orobanche gracilis Sm.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1696 Cupani
– 1810 Bertoloni – 1822 Pollini – 1827 Vaucher

3038. Orobanche variegata Wallr.
1844 G. Bertoloni in Bert. VI – 1852 Rota – 1860 Carnel – 1867 Ardoino
— β Salzmii (De Not.)
1844 De Notaris – 1875 C. P. G. 1878 Lojacono.

3039. Orobanche sanguinea Presl
1822 Presl – 1883 Lojacono.
— β crinita (Viv.)
1824 Viviani – 1838 Lortet-Laur – 1855 Terracciano – 1854 Gussone
— γ nebrodensis Tineo
1844 Tineo in Gussone – 1875 C. P. G.

3040 Orobanche alba Steph.
1818 Sebastiani e Mauri – 1842 Pucci-
nelli; Trevisan – 1844 Tineo in Gussone
1853 Rota.

3041 Orobanche reticulata Wallr.
1852 Perini, Tappeiner in Hausmann.
1867 Ardoino – 1875 C. P. G.
— β pallidiflora (Wimm. Grab.)
1415? Rinio (+1852) Facchini in Rchb. Icon. XX
e in Gelmi 1893 – 1875 C. P. G. –
1885 Levier in Parl. Carnel VI.

3042 Orobanche arenata Forsk.
1696 Cupani – 1798 Savi – 1818 Se-
bastiani e Mauri – 1822 Pollini –
1827 Gussone.

3043 Orobanche major L.
3(1890 Rostan in Beck.
2(+1859) O. Sendtner. Cfr. Vis. Suppl. I Fl. Dalm.
1(1844 Bertoloni VI (O. centaurina?)

3044 Orobanche alsatica Kirschl.
1898 Pospichal
— β caudata (De Not.)
1844 De Notaris – 1875 C. P. G. – 1882
Arcangeli.
— γ Chironii (Lojac.)
1878 Lojacono, Contr. Fl. Sicil.

3045 Orobanche denudata Moris.
1829 Moris – 1875 C. P. G.

3046 Orobanche flava Mart.
1890 Huter in Beck.

3047 Orobanche Salviae F. G. Schultz.
1867 Ardoino – 1875 C. P. G.
— β pedemontana Beck.
1862 Rchb. fl. Ic. XX p. 96 exp. (Tenda)
Cfr. Beck 1890.

3048 Orobanche lucorum A. Br.
1852 Heufler in Hausmann; Rota.
1853 Rota – 1875 C. P. G. – 1878 Anzi.

3049 Orobanche Rapum-Genistae Thuill.
1827 Moris – 1842 Trevisan – 1844
Bertoloni VI; De Notaris – 1852 Rota
— β bracteosa Reuter
1854 Gussone – 1875 C. P. G. – 1883
Lojacono.

3050 Orobanche rigens Lois.
1844 Moris in Bertoloni VI – 1870
Gennari – 1875 C. P. G.

3051 Orobanche amethystea Thuill
1844 Gussone – 1848 Facchini in Maly –
1858 Moris – 1867 Ardoino – 1872 Marsilly.

3052 Orobanche loricata Rchb.
1844 P. Savi in Bertoloni VI – 1860 Ca-
rnel – 1872 Marsilly – 1875 C. P. G.
— β Picridis (Schultz)
1827 Vaucher – 1853 Rota.

175

3053 Orobanche minor Sutton
1763 Cesalpino – 1819 Bertoloni – 1827 Vaucher i Gussone.
— β pumila (Koch et Roë)
1829 Brocchetto in Flora – 1873 Tommasini in Oest. bot. Zeitschr. Cfr. Freyn 1877 p. 155.
— γ Crithmi-maritimi (Schultz)
1827 Vaucher – (†1849) Kellner. Cfr. Rchb. Ic. XX.
— δ Litorea Guss.
1828 Gussone – 1875 C.P.G.

3054 Orobanche versicolor F. G. Schultz
1844 P. Savi in Bertoloni VI – 1854 Gussone – 1872 Martilly.

3055 Orobanche Hederae Duby.
1819 Bertoloni – 1827 Vaucher – 1842 Tenore – 1853 Rota – 1880 Savardo.

3056 Orobanche canescens Presl
1822 Presl – 1853 Grech – Delicata – 1858 Moris – 1875 C.P.G.

3057 Orobanche foliginosa Reut.
1853 Lojacono

3058 Orobanche concolor Duby
(1867 Ardoino – 1875 C.P.G. –
(1855 Sanguinetti Fl. Rom. prodr. alt.

3058' Orobanche Teucrii Bertol.
1844 P. Savi in Bertoloni VI – 1850 Carmel – 1883 Lojacono (Specie dubbia)

3058" Orobanche Pyrrha Rchb. f.
1863 Reichenbach f. Cfr. Rchb. f. Icon. XX (1862) – Loc Beck forma depauperata N. O. Hederae.

Lathraea L.

3059 Lathraea Squamaria L.
1565 Matholi – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1785 allioni – 1802 Seffner – 1815 Moretti

3060 Lathraea clandestina L.
1664 Ray, ed. 1694 – 1820 Tenore
1842 Puccinelli – 1875 C.P.G.

Fam. 113 Bignoniaceae

Catalpa Scop.

3061 Catalpa bignonioides Walt.
Dell'America Sett. Coltivata dalle metà del settecento ed ora qua e là quasi naturalizzata.
1760 allioni – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni – 1801 Bonato – 1822 Pollini – 1864 Savardo.

Tecoma Juss.

3062 Tecoma radicans (L.) Juss.
Dell'America Sett. Coltivata fino dalla prima metà del Seicento e ora qua e là quasi inselvatichita.
1633 Ferrari – 1760 allioni – 1780 Farsetti
1822 Pollini – 1906 Goiran

Fam. 113* Martyniaceae

Martynia (Houst.) L.

3062' Martynia proboscidea Glox.
Originaria della Florida. Coltivata dalla seconda metà del settecento e di rado qua e là avventizia
1772 Allioni – 1780 Farsetti – 1789 Ucria – 1793 Zuccagni – avventizia: 1904 Goiran.

Fam. 114 Labiatae

Ajuga L.

3063 Ajuga Tenorii Presl (*)
1823 Brocchi – 1822 Presl – 1831 Tenore – 1844 Gussone.

3064 Ajuga reptans L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1565 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli.

3064' Ajuga hybrida A. Kern.
(A. reptans × genevensis)
1904 Goiran.

3066 Ajuga genevensis L.
1550 Cibo – 1620 C. Bauhin – 1713 Tita – 1754 Seguier – 1802 Suffren; Marzari.

3065. Ajuga orientalis
1696 Cupani – 1822 Bertoloni – 1828 Gussone

3067 Ajuga pyramidalis L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Sternberg – 1808 Biroli.
1768 Turra, ed 1780

3068 Ajuga Iva (L.) Schreb.
1664 Ray, ed. 1694 – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria.

3069 Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb.
1418 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.
— β grandiflora Vis.
1848 Bentham in DC. Prodr. XII.
1854 Gussone – 1880 Goiran, App. bot. Verona – 1887 Groves.

Teucrium L.

3070 Teucrium Arduini L.
1764 Arduino – 1881 Freyn in Nyman – 1898 Pospichal.

3071 Teucrium massiliense L.
1827 Moris – 1835 Colla – 1872 Marsilly.

3072 Teucrium Scorodonia L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1565 Cesalpino – 1785 Allioni – 1822 Pollini (excl. loco Eugan.)

Nota (*) I floristi tutti, Gussone, Bertoloni, Caruel, Nyman, Arcangeli, Béguinot ecc. tengono come valido il nome di A. acaulis Brocchi; ma questo fu pubblicato nel fasc. genn.-marzo 1823 vol. XXIX φ; mentre Presl pubblicò la sua Ajuga Tenorii in Delic. Prag. 1822; nome che perciò deve essere preferito.

φ della Bibl. italiana

35/0018 - 205

3073. Teucrium siculum (Raf.) Guss.
1814 Rafinesque - 1818 Sebastiani e Mauri - 1822 Pollini (T. Scorodonia e. p. in Eugan.) - 1823 Romano.

3074. Teucrium spinosum L.
1620 C. Bauhin - 1671 Boccone - 1696 Cupani - 1789 Ucria - 1828 Gussone.

3075. Teucrium fruticans L.
1671 Boccone - (+1673) Barrelier ed 1714 - 1696 Cupani - 1742 Zanoni - Monti.
— β latifolium (L.)
1826 Jan - 1828 Gussone - 1874 C.P.G.

3076. Teucrium creticum L.
1551 Aldrovandi II
1843 Gussone - 1883 Pasquale in Parl. - Carnel VI - 1874 C.P.G.

3077 Teucrium campanulatum L.
1696 Cupani - 1723 Micheli in Tilli - 1789 Ucria - 1828 Gussone.

3078 Teucrium Botrys L.
1532 Cibo - 1551 Aldrovandi - 1555 Mattioli - 1585 Durante - 1745 Séguier.

3079 Teucrium Scordium L. R
1532 Cibo - 1551 Aldrovandi - 1555 Mattioli 1585 Durante - 1745 Séguier

— β scordioides (Schreb.)
1563 Cesalpino - 1820 Tenore - 1827 Gussone - 1844 De Notaris - 1853 Grech - Delicata.

3080 Teucrium Marum L.
1565 Mattioli - 1585 Durante - 1827 Moris - 1834 Salis - Marschlins
1551 Aldrovandi

3081 Teucrium flavum L.
1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino - 1671 Boccone - 1697 Cupani - 1785 Allioni.

3082 Teucrium Chamaedrys L. R
1415 Rinio
1532 Cibo - 1551 Aldrovandi - 1561 Anguillara - 1563 Cesalpino
1554 Mattioli - 1585 Durante

3083 Teucrium lucidum L.
1785 Allioni - 1808 Biroli - 1844 De Notaris - 1867 Ardoino.

3084 Teucrium Polium L.
1415 Rinio - 1551 Aldrovandi II
1554 Mattioli - 1563 Cesalpino - 1585 Durante - 1606 Colonna
— β capitatum (L.)
1827 Moris - 1870 Gennari - 1872 Marsilly
— γ intermedium Celak.
1785 Allioni - 1820 Tenore - 1828 Fiorini - Mazzant.
— δ luteum (Mill.)
1791 Bellardi - 1826 Jan - 1835 Colla.

3085 Teucrium montanum L.
1551 Aldrovandi II
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1726 Zannichelli

Rosmarinus (Tourn.) L.

3086 Rosmarinus officinalis L. R
1415 Rinio Petrolo
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1760 Scopoli

Prasium L.

3087 Prasium majus L.
1664 Ray, ed. 1694 — 1671 Boccone — 1675 Zanoni — 1696 Cupani

Scutellaria L.

3088 Scutellaria alpina L.
1772 Scopoli — 1785 Allioni — 1805 Re — 1802 Brignoli in Suffren — 1831 Tenore

3089 Scutellaria peregrina L.
1671 Boccone — 1696 Cupani — 1723 Tilli — 1785 Allioni
— β altissima (L.)
1828 Gussone — 1835 Tenore
— γ Columnae (All.)
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone.

3090 Scutellaria hastifolia L.
1735 Micheli — 1801 Balbis — 1815 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri

3091 Scutellaria galericulata L.
1583 Cesalpino — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

3092 Scutellaria minor Huds.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1822 Pollini — 1857 Zersi.

Lavándula L.

3093 Lavandula Stoechas L. R
1550 Petrolo Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1565 Cesalpino — 1585 Durante — 1678 Boccone

3094 Lavandula dentata L.
Originaria della Spagna e Madera, e Algeria, ~~coltivata~~ coltivata dal principio del seicento e talora quasi naturalizzata nel mezzodì
1623 N. Contarini in Bauhin Pin. — 1642 Verlingio — 1678 Boccone — 1704 Martini — 1827 Zeraphe — 1830 Tenore — 1875 C. P. G.

3095 Lavandula Spica L.
1415 Rinio Petrolo
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1697 Cupani.

3096 Lavandula latifolia (L. f.) Vill.
1550 Petrolo Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1558 Mattioli — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni.

3097 Lavandula multifida L.
1717 Patarol (Colt.?) — 1826 Gussone — 1835 Tenore — (+1856) Tineo, Pasquale in Parl. Carnel VI

35/0018-206

Marrubium (Tourn.) L.

3098 Marrubium vulgare L.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante —

3099 Marrubium Alysson L.
1585 Durante — 1827 Moris — 1829 Tenore — 1844 De Notaris.

3100 Marrubium candidissimum L.
1772 Scopoli — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone — 1829 Tenore — 1847 Zanardini.

3101 Marrubium peregrinum L.
1822 Fontana in Pollini (M. creticum Poll.)
1753 Linné Sp. pl. — 1897 Penzig. Avventizio?

Sideritis L.

3102 Sideritis sicula Ucria
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1696 Cupani
1796 Ucria — 1810 Rafinesque.
1551 Aldrovandi II

3103 Sideritis hyssopifolia L.
1773 Vitman — 1834 Massara (—1836 Bentham, Lab. gen. et sp.) 1853 Rota — 1874 C. P. G.
— β Peyrei (Timb.)
1903 Béguinot in Fiori III (da ricercarsi)

3104 Sideritis hirsuta L.
1785 Allioni — 1844 Ghorardi, Molineri e Moris in Bertoloni VI — 1869 Ardoino.

3105 Sideritis romana L.
1664 Ray, ed. 1694 — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1797 Host

3106 Sideritis montana L.
1606 Colonna — 1789 Allioni — 1798 Savi — 1808 Biroli — 1822 Pollini.

3106¹ Sideritis perfoliata L.
Nativa d'Oriente. Coltivata dalla metà del settecento e trovata (avventizia?) sull'Etna.
1760 Allioni — 1780 Fursetti — 1793 Tineo 1801 Bonato. Avventizia?: 1789 Ucria.

3106² Sideritis incana L.
Originaria di Spagna e già illustrata da Barrelier e Bocone, fu trovata (avventizia?) nel Nizzardo da Allioni
1785 Allioni.

Dracocéphalum L.

3107 Dracocephalum Ruyschiana L.
1675 Zanoni — 1785 Allioni — 1805 Re — 1844 Molineri in Bertoloni VI — (+1842) Sieber. Cfr. Parl.-Caruel VI

3108 Dracocephalum austriacum L.
1844 Facchini in Bertoloni VI — (+1861) Huguenin in Parl. Carnel VI — 1852 Pappeiner in Hausmann II.

3108' Dracocephalum Moldavica L.
D'origine asiatica. Coltivata dal cinquecento e incontrasi qua e là avventizia
1571 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1642 Vestingio — 1805 Re

3108² Dracocephalum virginianum L.
Nativo dell'America Sett. e Messico. Coltivato dalla fine del seicento.
1694 Bouone — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato

Népeta L.

3109 Nepeta tuberosa L.
1696 Cupani — 1697 Bouone — 1821 Gussone — 1826 Jan.

3110 Nepeta Apulejii Ucria
1674 Boccone — 1696 Cupani — 1796 Ucria —

3111 Nepeta italica L.
1753 Rathgeb in Linn. Sp. pl. ed. I.
1839 Marzialetti in Parl. Carnel VI.
1840 Viviani in De Notaris 1844.

3112 Nepeta nuda L.
Il tipo è proprio dell'Albania e Grecia e probabilmente manca all'Italia
— β pannonica (Jacq.)
1532 Cibo — 1697 Bouone — 1718 Pontedera — 1768 Turra, ed. 1780 — 1785 Allioni — 1835 Tenore.
— γ violacea (Vill.)
1830 Tenore — 1855 Pirona — 1899 Pospichal.

3113 Nepeta cataria L.
1415 Rinio — 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante.

3114 Nepeta Nepetella L.
1696 Cupani — 1697 Bouone — 1785 Allioni — 1805 Re — 1830 Tenore — 1844 De Notaris
1676 Boccone

3115 Nepeta agrestis Lois.
1827 Loiseleur — 1834 Salis-Marschlins — 1872 Marsilly.

3116 Nepeta foliosa Moris
1827 Moris — 1835 Colla — 1875 C.P.G.

Glechoma L.

3117 Glechoma hederacea L.
1415 Rinio — 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1562 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante
1563 Cesalpino —

35/0018-207

— β sardoa Bég.
1903 Nicotra e Marcialis in Fiori III.

3118 Glechoma hirsuta W. et K.
1820 Moricand — 1896 Marchesetti — 1899 Pospichal — 1904 Goiran.
— β heterophylla (Opiz)
1903 Béguinot in Fiori III — 1904 Goiran.

Brunella (Tourn.) L.
3119 Brunella hyssopifolia L.
1785 Allioni — 1844 De Notaris — 1850 Grenier Godron II — 1867 Ardoino +

3120 Brunella vulgaris L.
1415 Pinio 1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1561 Anguillara — 1558 Mattioli — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1595 Pona.
— β laciniata (L.)
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1776 Bartalini.
— γ grandiflora (Jacq.)
1713 Tita — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Marzari — 1804 Bertoloni.
3120¹ Brunella intermedia Link.
(B. laciniata × vulgaris)
1822 Pollini — 1893 Gelmi — 1904 Goiran.
3120² Brunella spuria Stapf
(B. grandiflora × vulgaris)
1885 Stapf in Kerner Schedae Fl. austro-hung. n. 1421 — 1903 Béguinot in Fiori III.

3120³ Brunella bicolor Beck
(B. grandiflora × laciniata)
1896 Bicknell — 1891 Briquet

Melittis L.
3121 Melittis Melissophyllum L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli.

Phlomis (Tourn.) L.
3122 Phlomis Herba-venti L.
1822 Presl — 1830 Tenore — 1875 C. P. G. 1844 Sebastiani, Orsini, Todaro, Parolini ecc. in Bertoloni VI.

3123 Phlomis viscosa Poir
Il tipo è proprio di Grecia, Creta ecc.
— β ferruginea (Ten.)
1811 Tenore — 1822 Presl.

3124 Phlomis fruticosa L.
1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1640 Castelli — 1696 Cupani — 1789 Ucria 1828 Gussone.

3125 Phlomis lanata W.
1830 Tenore — 1875 C. P. G.
3125¹ Phlomis italica L.
1759 Linné Syst. nat. ed. X — 1792 Smith Spicil. bot. I (Non pare spontanea in Italia e Linneo forse l'ebbe dall'Italia, ma coltivata)

3125² Phlomis Lychnitis L.
È originaria della penisola iberica; col tivata già dal cinquecento e trovata (avventizio?) nel Nizzardo.
1583 Cesalpino – 1793 Zuccagni + G. Tineo – Avventizio?: 1785 Allioni – 1844 De Notaris

3125³ Phlomis Portae Kern.
1881 Kerner in Nym. Consp. (forse coltiv. nell' orto bot. di Verona. Cfr. Goiran 1904)

Galéopsis L.

3126. Galeopsis Tetrahit L.
1550 Cibo – 1745 Séguier – 1802 Suffren; Margari.
— β bifida (Boenn.)
1842 Trevisan – 1852 Hausmann – 1853 Rota – 1904 Goiran.
— γ speciosa (Mill.)
1802 Suffren – 1822 Pollini – 1844 Bertoloni – 1853 Rota.
— δ pubescens (Bess.)
1844 Cesati – 1853 Rota – 1864 Sauardo – 1899 Pospichal – 1904 Goiran
— ε Eversii (Murr)
1894 Murr, Deutsch. bot. Monatschr. XII – 1904 Goiran.

3127 Galeopsis dubia Leers.
2 (1852 Precht in Hausmann – 1893 Gelmi
1 (1804 Balbis – 1818 Ruchinger – 1820 Moricand

3128 Galeopsis Ladanum L.
1551 Aldrovandi II – 1565 Michiel
1550 Cibo – 1595 Pona – 1785 Allioni – 1802 Suffren. (1563 Cesalpino)
— β intermedia (Vill.)
1843 Lisa. Cfr. Briquet 1891 – 1860 Caruel – 1867 Ardoino.
— γ Reuteri (Rchb. f.)
1858 Reuter in Rchb. Ic. XVIII – 1867 Ardoino – 1891 Briquet.

Lamium L.

3129 Lamium Orvála L.
1595 Pona – 1697 Boccone – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger

3130 Lamium Galeobdolon (L.) Crantz
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

3131 Lamium flexuosum Ten.
1820 Tenore – 1828 Gussone – 1844 Schouw, Orsini in Bertoloni VI.
— β pubescens (Sibth.)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1828 Gussone.

3132 Lamium garganicum L.
1723 Micheli in Tilli – 1820 Tenore – 1826 Gussone – 1844 Gasparrini in Bertoloni VI.
— β grandiflorum (Pourr.)
1723 Micheli in Tilli – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Gussone – 1830 Tenore.
— γ corsicum (Gr. et Godr.)
1850 Bernard in Grenier e Godron – 1872 Martilly – 1874 C. P. G.
(1858 Mons

3133 Lamium amplexicaule L.
1583 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni
— β intermedium (Fr.)
1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr. Freyn 1877.

3134 Lamium bifidum Cir.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1723 Tozzi in Tilli — 1788 Cirillo — 1815 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri.

3135 Lamium purpureum L.
1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1785 Allioni — 1802 Suffren.

3135' Lamium hybridum Vill.
(L. amplexicaule × purpureum)
1747 Sabbati — 1852 Rota — 1862 Ardoino — 1874 C.P.G.

3136 Lamium album L.
1554 Mattioli — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari

3137 Lamium maculatum L.
1563 Cesalpino — 1561 Anguillara
1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier — 1802 Suffren; Marzari.

Leonúrus L.

3138 Leonurus Cardiaca L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1863 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante.

3139 Leonurus Marrubiastrum L.
1697 Bouvne — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

Molucélla L.

3140 Molucella spinosa L.
1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1640 Castelli — 1696 Cupani — 1789 Ucria.

Ballóta L.

3141 Ballota frutescens (L.) Woods
1757 Allioni — 1835 Colla — 1844 De Notaris — 1862 Ardoino

3142 Ballota nigra L.
1550 Petroli Cibo — 1554 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β meridionalis Bég.
1899 Pospichal II (+1892) Todaro. Cfr. Béguinot in Fiori III.
— γ ruderalis (Swartz)
1846 Comolli (+1848 Bracht) e (+1849) Kellner. Cfr. Béguinot in Fiori III

3143 Ballota rupestris (Biv.) Vis.
2 (1814 Bivona-Bernardi; Rafinesque —
1 (1671 Bouvne — 1696 Cupani.
1551 Aldrovandi II.

3144 Ballota Pseudodictamnus (L.) Benth.
1827 Zerapha — 1830 Tenore — 1874 C.P.G.

3144' Ballota hirsuta Benth.
Originaria della Spagna e dell'Africa boreale e forse solo inselvatichita in Corsica.
1894 Debeaux.

Stachys L.

3145. Stachys densiflora Benth.
1720 Pontedera – 1742 Zanoni – Monti – 1785 Allioni – 1844 De Notaris.

3146. Stachys officinalis (L.) Trev.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona
– β danica (Mill.)
1805 Re – 1819 Bertoloni – 1844 Cesalpino
– γ serotina (Host) Bég.
1899 Pospichal – 1904 Goiran.

3147. Stachys Alopecuros L.
1697 Boccone – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
– β Jacquini (Gr. Godr.)
(+1886) Franzoni, ed. 1890 – 1906 Gortani

3148 Stachys germanica L.
1615 Rinio Pabrell 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona – 1696 Cupani.

3149. Stachys italica Mill.
1551 Aldrovandi II 1606 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1775 Bonelli – 1826 Gussone –

3150. Stachys heracléa All.
1551 Aldrovandi II 1785 Allioni – 1820 Tenore – 1828 Gussone – 1830 Viviani

3151. Stachys alpina L.
1532 Cibo – 1735 Micheli – 1754 Séguier.

3152. Stachys palustris L.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

3152' Stachys ambigua Sm.
(S. palustris × silvatica)
1852 Rota – 1869 Morassi, Pirona in Viviani e Savardo – 1879 Caldesi.

3153. Stachys silvatica L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1775 Martelli e Sabbati 1785 Allioni.

3154 Stachys corsica Pers.
1824 Viviani – 1827 Moris – 1828 Duby – 1834 Salis – Marschlins.

3155 Stachys marrubiifolia Viv.
1825 Viviani – 1830 Tenore –

3156 Stachys arvensis L.
1697 Cupani – 1785 allioni – 1789 Ucria – 1808 Biroli – 1818 Sebastiani e Mauri.

3157 Stachys glutinosa L.
1675 Zanoni – (+1747) Valle e Allioni ed. 1760 – 1824 Viviani – 1827 Moris.

3158 Stachys annua L. 1561 attribuito a Dioscoride
1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1726 Zannichelli – 1784 Séguier – 1802 Marzari; Suffren.

3159 Stachys hirta L.
1696 Cupani – 1757 allioni – 1815 Savi: 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Guarone.

3160 Stachys arenaria Vahl
1828 Guarone – 1831 Tenore.

3161 Stachys recta L.
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni. 1862 Suffren; Marzari.
– β latifolia Bertol.
1819 Bertoloni – 1853 Rota – 1887 Zersi. 1551 al Dioscoride II
– γ hirta Tenore
1830 Tenore – 1891 Briquet –
– δ subcrenata (Vis.)
1726 Zannichelli – 1820 Tenore – 1899 Poyrichel – 1904 Goiran.

3162 Stachys maritima L.
1631 Donati – 1699 Boccone – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren. 1615 Pisano

3163 Stachys pubescens Ten.
1830 Tenore – 1846 Ottavi in Bertoloni VI.

3163' Stachys spinulosa S. et S.
1830 Reichenbach H. germ. exc. 1882 Arcangeli – 1904 Hallier – Wohlfarth. (Habitat da confermarsi)

3163² Stachys lusitanica Prot.
1886 Levier in Janka, Mag. nov. Lapok.

Horminum (Tourn.) L.
3164 Horminum pyrenaicum L.
1595 Pona – 1718 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Suffren; Marzari.

Salvia L.
3165 Salvia officinalis L.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Aquilleva – 1583 Cesalpino – 1772 Scopoli – 1797 Host – 1802 Suffren. 1551 al Dioscoride II 1615 Pisano
3166 Salvia triloba L. fil.
1554 Mattioli – 1789 Ucria – 1826 Guarone – 1833 Tenore in Bertoloni I.

3167 Salvia canariensis L.
Nativa delle Canarie. Coltivata dalla metà del settecento e naturalizzata presso Palermo.
1760 Allioni – 1789 Ucria – 1793 G. Tineo; Zuccagni – Naturalizzata: 1826 Presl – 1827 Gussone – 1874 C. P. G.

3168 Salvia Horminum L.
1583 Cesalpino – 1775 Bonelli-Sabbati 1785 Allioni – 1824 Nauari.
— β viridis (L.)
1697 Bocone – 1696 Cupani – 1789 Ucria 1826 Gussone – 1830 Tenore.

3169. Salvia Sclaréa L.
1550 Petr Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.

3170 Salvia Aethiops L.
1550 Petr Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1861 Anguillara – 1563 Cesalpino.

3171 Salvia argentea L.
Il tipo è proprio di Dalmazia, Grecia, Spagna ecc.
— β Gussonei (Boiss.)
1532 Cibo – 1696 Cupani – 1827 Gussone – 1829 Tenore.

— γ. Saccardiana Pamp.
1904 Pampanini in N. gior. bot. ital.

3172. Salvia glutinosa L.
1615 Rivio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1802 Suffren; Marzari

3173. Salvia silvestris L.
1576 Lobel – 1785 Allioni – 1844 De Notaris – 1860 Mazzetti in Bicchi Agg. fl. lucch.
— β campestris (M. B.)
1893 Pospichal, ed. 1899 – 1903 Andrea Fiori in Fiori III.

3174. Salvia virgata Jacq.
1563 Cesalpino – 1815 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1832 Tenore.

3175 Salvia pratensis L.
1615 Rivio 1550 Petr Cibo – 1561 Anguillara – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.
— β Bertolonii (Vis.)
1833 Comolli in Bertoloni I – 1881 Nyman – 1899 Pospichal.
— δ haematodes (L.)
(+1673) Barrelier, ed 1714 – 1685 Trionfetti – 1723 Micheli in Tilli – 1818 Sebastiani e Mauri.
— ε ceratophylloides (Ard.)
1764 Arduino – 1785 Petagna – 1829 Tenore.

3176 Salvia Verbenáca L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1676 Bocone – 1772 Maratti – 1785 Allioni – 1820 Moricand.

35/0018-210

— β clandestina (L.)
1685 Trionfetti — 1806 Bertoloni — 1808 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1874 C. P. G.

— γ multifida (S. et S.)
(+ 1673) Barrelier, ed. 1714 — 1830 Tenore — 1874 C. P. G.

3177 Salvia verticillata L.
1698 Cupani — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

3177¹ Salvia hispanica L.
Nativa dell'America intertropicale, coltivata fino dal settecento e inselvatichita qua e là in Piemonte e Liguria
1772 Allioni — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato — Naturalizzata: 1785 Allioni — 1833 Molineri in Bertoloni I

3177² Salvia pinnata L.
Dell'Asia minore. Coltivata già sulla fine del settecento e avventizia in Sicilia
1789 Ucria — 1793 G. Tineo — Avventizia: 1887 Borzì — 1894 Arcangeli

3177³ Salvia pendula Vahl
Dell'Europa orientale. Era coltivata nello orto bot. di Padova nel 1842 (Visiani), fu poi trovata avventizia a Trieste.
1899 Pospichal.

3177⁴ Salvia napifolia Jaq.
Della Grecia. Coltivata già sulla fine del settecento ed ora avventizia a Trieste.
1793 Zuccagni; Tineo — 1801 Bonato (e prima già Marsili. Cfr. Bertoloni I)
Avventizia: 1899 Pospichal

3177⁵ Salvia splendens Sellow.
Originaria del Brasile. Coltivata assai diffusamente dalla prima metà dell'ottocento.
1829 Piccioli — 1836 Brignoli — 1842 Visiani

3177⁶ Salvia fulgens Cav.
Del Messico. Coltivata dalla prima metà dell'ottocento.
1827 V. Tineo — 1842 Visiani — 1845 Tenore

3177⁷ Salvia Grahami Benth.
Del Messico. Coltivata dalla prima metà dell'ottocento, e talora subspontanea nel mezzodì.
1842 Visiani — 1867 Pasquale — 1903 Béguinot in Fiori III

Melissa (Tourn.) L.

3178 Melissa officinalis L.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1585 Durante

Satureja (Tourn.) L.

3179 Satureja Thymbra L.
~~1565~~ Michel 1553) 1595 Pona (colt.) – 1785 Allioni – 1827 Moris – 1883 Gennari in Parl. Carnel VI.

3180 Satureja hortensis L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1904 Goiran.

3181 Satureja montana L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1802 Suffren, Marzari.
— β variegata (Host)
1830 Reichenbach – 1855 Pirona – 1896 Marchesetti – 1899 Pospichal
— γ subspicata (Bartl.)
1554 Mattioli – 1830 Reichenbach 1896 Marchesetti – 1899 Pospichal

3182 Satureja cuneifolia Ten.
1811 Tenore – 1826 Gussone – 1844 Parolini in Bertoloni VI.

3183 Satureja Juliana L.
1551 Aldrovandi II 1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1723 ~~Michali in~~ Tilli – 1785 Allioni 1789 Ucria – 1847 Zanardini (avvent.)

3184 Satureja graeca L.
1571 Mattioli (Saxifr. I) – 1640 Castelli – 1671 Bonone – 1785 Allioni
— β congesta Briq.
1826 Presl – 1830 Tenore.
— γ longiflora (Presl)
1826 Presl
— δ garganica Briq.
1895 Briquet.
— ε canescens (Guss.)
1826 Gussone – 1835 Tenore.
— ζ fasciculata (Raf.)
1671 Bonone – 1696 Cupani – 1814 Rafinesque – 1816 Bivona-Bernardi 1820 Tenore.

3185. Satureja nervosa Desf.
1826 Gussone – 1835 Tenore – 1844 Parlatore in Bertoloni.

3186 Satureja microphylla (Urv.) Guss.
1697 Gussone – 1826 Gussone – 1835 Tenore.

3187 Satureja filiformis (Ait.) Nym.
1834 Salis-Marschlins – 1850 Grenier e Godron
— β cordata (Moris)
1854 Moris in Bertoloni X.

3188 Satureja fruticosa (L.) Bég.
(+1853) Moretti in herb. Pat. – 1875 Porta e Rigo, It. ital. II, n° 387 – 1897 (?) Penzig

35/0018-211

3189 Satureja thymifolia Scop.
1562 Mattioli (Satur. di Diosc.) – 1760 Scopoli – 1788 Wulfen in Jacq. Coll. II – 1855 Pirona.

3190 Satureja Piperella (All.) Bertol.
1785 Allioni – 1835 Colla – 1844 Sassi, Boissier, Balbis, Re in Bertoloni VI.

3191 Satureja grandiflora (L.) Scheele
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1745 Séguier.

3192 Satureja Calamintha (L.) Scheele
1415 Pinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona.
— β ascendens Briq.
1844 De Notaris (Melissa Calam. e. p.)

3193 Satureja Nepeta (L.) Scheele
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1697 Bouone – 1718 Pontedera.
— β glandulosa (Req.)
1825 Requien – 1834 Salis-Marschlins.
— γ nepetoides (Jord.)
1830 Giusta ecc. Cfr Briquet 1895 – 1893 Gelmi – 1899 Pospichal – 1904 Goiran
— δ subnuda (Host)
1899 Pospichal – 1906 Gortani

3194 Satureja vulgaris (L.) Bég.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani.

3195 Satureja Acinos (L.) Scheele
1550 Petrolo Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1696 Cupani.
— β graveolens (M. Bieb.)
1830 Tenore – 1844 Orsini, Mauri in Bertoloni VI.

3196 Satureja alpina (L.) Scheele
1697 Bouone – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Margari.
1595 Pona
— β suaveolens (Sm.)
1551 Aldrovandi – 1826 Gussone – 1830 Tenore.
— γ patavina (Jacq.)
Originaria di Dalmazia e Croazia. Coltivata fino dal seicento nell'orto bot. di Padova (donde il nome di patavina errato)
1642 Veslingio – 1697 Bouone – 1812 Bonato.

3197 Satureja corsica (Pers.) Car.
1806 Loiseleur – 1830 Duby – 1872 Revelière in Marsilly.

3198 Satureja cristata Gris.
1856 Parlatore (Avventura?)
Nativa dell'Asia minore, Macedonia, Serbia (e Italia centr.?)

Monarda L.

3197² Monarda didyma L.
Originaria dell'America sett. Qua e là coltivata comunemente.
1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1801 Bonato – 1906 Gortani

Zizyphora L.

3198 Zizyphora capitata L.
1815 Savi – 1820 Tenore – 1860 Caruel – 1879 Caldesi.

Hyssopus (Tourn.) L.

3199 Hyssopus officinalis L. R
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1571 Mattioli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re.

Thymus L.

3200 Thymus capitatus (L.) H. et L. R.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1571 Mattioli – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1789 Ucria.

3201 Thymus striatus Vahl
1696 Cupani – 1697 Boccone – (+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1808 Viviani.
— β conspersus Celak.
1810 Rafinesque – 1826 Presl

3202 Thymus vulgaris L. R
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1816 Bocca e Ballis.

3203 Thymus Serpyllum L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.
— β nitidus (Guss.)
1844 Gussone.
— γ ovatus (Mill.)
1819 Bertoloni – 1825 Re – 1895 Briquet – 1904 Goiran.
— δ longicaulis (Presl)
1826 Presl – 1844 Tommasini, Savi ecc. in Bertoloni VI – 1877 Freyn – 1899 Pospichal.
— ε subcitratus (Schreb.)
2 (1895 Briquet – 1906 Gortani
1 (1819 Bertoloni – 1820 Moricand – 1822 Pollini
— ζ polytrichus Kern.
1904 Goiran – 1906 Gortani
(1895 Briquet)
— η lanuginosus (Mill.)
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1805 Re 1822 Pollini.
— δ Herba-barona (Lois.)
1806 Loiseleur – 1824 Viviani – 1830 Duby – 1834 Salis

Origanum (Tourn.) L.

3204 Origanum vulgare L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante

35/0018 - 212

— β hirtum (Lk)
1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino — 1844 Tommasini, Biasoletto in Bertoloni VI — 1858 Moris — 1877 Freyn.

— γ creticum (L.)
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1820 Moricand — 1828 Gussone.

3205 Origanum Onites L.
1550 Petr. Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1828 Gussone.

3206 Origanum Majorana L.
2 { 1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1822 Pollini — 1877 Freyn — 1904 Goiran
1 { Originario dell'Asia centr. e Africa sett. Coltivato dall'era romana e non di rado avventizio

3206' Origanum Dictamnus L. R
Originario di Creta. Coltivato dal cinquecento.
1550 Petr. Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1822 Pollini — 1904 Goiran.

Lycopus (Tourn.) L.
3207 Lycopus europaeus L.
1550 Petrolli Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli

3208 Lycopus exaltatus L. f.
1550 Petrolli Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1745 Séguier — 1791 Bellardi — 1816 Nova e Balbis.

Mentha L.
3209 Mentha rotundifolia (L.) Huds.
1550 Petrolli Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1585 Durante.

— β intermedia Bég.
1867 Mabille — 1889 Briquet

— γ insularis (Req.)
1847 Requien — 1850 Grenier e Godron
1866 Gennari

3209' Mentha velutina Ley.
(M. rotundifolia ~~[illegible]~~ × longifolia Briq.)
1823 Tenore — 1896 Bicknell

3209² Mentha Timbali Briq.
(M. rotundifolia × longifolia Briq.)
1889 Bicknell in Briquet

3209³ Mentha niliaca Jacq.
(M. rotundifolia × longifolia Briq.)
1879 Caldesi — 1896 Bicknell — 1906 Gortani

3210 Mentha longifolia (L.) Huds.
1615 Rinio 1550 Petr. Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1697 Cupani — 1726 Zannichelli

— β cordata Posp.
1899 Pospichal — 1906 Gortani

— γ grisella (Brig.)
1899 Pospichal — 1906 Gortani
— δ mollissima (Borkh.)
1904 Goiran — 1906 Gortani, 1899 Pospichal

3211 Mentha viridis L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1785 Allioni — 1822 Pollini.

3211' Mentha dumetorum Schultes
(M. aquatica × longifolia)
1853 Rota — 1893 Gelmi — 1896 Bicknell.

3211² Mentha pyramidalis Ten.
(M. aquatica × rotundifolia)
1811 Tenore — 1826 Gussone — 1844 Todaro in Bertoloni VI

3211³ Mentha piperita L.
(M. aquatica × viridis × citrata)
1551 Aldrovandi — 1780 Farsetti — 1793 Zuccagni — 1822 Pollini (È coltivata anche di frequente, e spesso trovasi qua e là inselvatichita come nel Trivigiano!)

3211⁴ Mentha citrata Ehrh.
(M. aquatica × viridis)
1820 Moricand — 1822 Pollini — 1842 Trevisan.

3212 Mentha aquatica L.
1415 Rinio
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1562 Mattioli
1697 Cupani — 1745 Séguier — 1802 Marzari
(+ 1320) Crescenzio, edit. 1471

3212' Mentha verticillata L.
(M. aquatica × arvensis)
1842 Trevisan — 1855 Pirona — 1891 Briquet — 1899 Pospichal.

3213 Mentha arvensis L.
1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1745 Séguier — 1821 Romano — 1844 Bertoloni —
— β austriaca (Jacq.)
1822 Pollini — 1855 Pirona — 1864 Saccardo.
— γ parietariaefolia (Becker)
1785 Allioni (M. gentil.) — 1891 Briquet — 1899 Pospichal.
— δ palustris (Moench)
1898 Gelmi — 1899 Pospichal
— ε agrestis (Sole)
1785 Allioni (M. austriaca) — 1891 Briquet.

3213' Mentha rubra Smith.
(M. aquatica × arvensis × viridis)
1415 Rinio
1899 Pospichal — 1906 Gortani

3213² Mentha gentilis L.
(M. arvensis × viridis)
1816 Nocca e Balbis — 1842 Cesati — 1855 Pirona — 1899 Pospichal

3213³ Mentha carinthiaca Host
(M. arvensis × rotundifolia)
1899 Pospichal — 1906 Gortani

3214 Mentha Pulegium L. R
1415 Rinio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1674 (Boccone) – ß Serpentosa (Sm.) 1674 Boccone – 1846 De Notaris.

3215 Mentha Requieni Benth.
1824 Viviani – 1825 Requien – 1827 Moris – 1872 Marsilly.

Ocimum L.

3216 Ocimum Basilicum L. R
Originario delle zone calde dell'Asia. Coltivato fino dall'era romana
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Matthioli – 1585 Durante

3216' Ocimum minus L.
Delle Indie orientali. Coltivato dal trecento
(+1320) Crescenzio, ed 1471 – 1415 Rinio 1554 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

Prostia Opiz (L.)

3216² Prostia cervina Fres.
Della Spagna e Francia merid. Coltivata dal seicento e talora avventizia.
1657 Ambrosini – 1662 Dalla Torre – 1704 Martin – 1713 Tita
1881 Nyman (Avventizia?)

Perilla L. (*)

3216³ Perilla ocimoides L. Arduino in Linn. Gen. plant. VI ed. 1764 p. 578
Originaria dell'India orient. Coltivata fino dalla metà del settecento e spesso avventizia.
1793 S. Tinzo (Bonato) 1764 Arduino – 1798 Fasoletti – 1802
Avventizia: 1880 Savardo (Il nome Perilla ... 1764 ...)
Il tipo nostro fu portato botanum frutescens L. viene dalla stessa Linnea excluso. Cfr. Viviani in Notiz. sulla vita e scritti di Arduino p. 25–27)

Fam. 115 Verbenaceae

Vitex (Tourn.) L.

3217 Vitex Agnus-castus L. R
1415 Rinio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli

Verbena (Tourn.) L.

3218 Verbena officinalis L. R
1415 Rinio
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1885 Allioni

3219 Verbena supina L.
1826 Jan – 1827 Moris – 1828 Gussone

3219' Verbena chamaedryfolia Link.
Del Brasile. Coltivata comunemente solo dalla prima metà del ottocento.
1836 Bonpland. – 1842 Viviani – 1867 Pozzoche

3219² Verbena tenera Spreng.
Del Brasile. Coltivata dalla metà del ottocento! (comunemente)

3216⁴ Elsholtzia
Originaria dell'Asia centrale e
1801 Bonati

Nota
(*) Frank Glaser Britton danno come sinon. di Perilla un supposto volgare in Siria che non si trova; è attribuito più probabile che sia una dedica alla giovane poetessa Perilla di cui parla Ovidio nei Tristia.

Elsholtzia W.

3216[4] Elsholtzia cristata W.

Originaria dell' Asia; coltivata dalla fine del sette-
cento e qua e là fuggiasca e avventizia.

1801 Bonato - 1802 Rodati — 1806 Zuccagni

35/0018 - 213

Lippia Houst.

3220. Lippia nodiflora (L.) Rich.
1599 Imperato – 1620 C. Bauhin
(+1673) Barrelier, ed. 1714 – (1671 Boccone

3220¹ Lippia citriodora (Lam.) H.B.K.
Del Perù e Cile. Coltivata assai spesso fino dalla fine del settecento e spesso subspontanea
1793 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato – 1802 Rodati.

Clerodendron

3220² Clerodendron fragrans Vent.
Della Cina. Coltivato frequentemente fino dal principio dell' ottocento
1812 Bonato – Spigno – 1806 Zuccagni
1827 V. Tineo.

3220³ Clerodendron foetidum Bunge
Della Cina. Coltivato fino dalla metà del secolo XIX e raramente avventizio.
1867 Pasquale
Avventizio: 1893 Rodegher e Venanzi.

Lantana L.

3220⁴ Lantana Camara L.
Del Brasile. Coltivata frequentemente fino dal principio dell' settecento
1789 Ucria
1793 Zuccagni – 1796 Farsetti – 1801 Bonato
1760 Allioni
1704 Martini –

fam. 116 Acanthaceae

Acanthus (Tourn.) L.

3221 Acanthus spinosus L. R
1827 Zerapha – 1853 Grech-Delicata
1885 Grovas 1726 Zannichelli
– β spinosissimus (Pers.)
1735 Micheli – 1820 Tenore – 1844 Gussone in Bertoloni VI – 1879 Caldesi.

3222 Acanthus mollis L. R
1415 Rinio
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1843 Koch

3223 Acanthus longifolius Host
1748 Targioni – Tozzetti in Micheli.
1844 Tommasini in Bertoloni VI – 1878 Smith.

fam. 117 Lentibulariaceae

Pinguicula (Tourn.) L.

3224 Pinguicula vulgaris L.
1595 Porta – 1745 Séguier – 1785 Allioni; Petagna – 1822 Pollini.
– β leptoceras (Rchb.)
1772 Vitman – 1804 Balbis – 1819 Bertoloni – 1824 Comolli.

35/0018 - 214

— γ grandiflora (Lam.)
1833 Charpentier in Reichenbach — 1872 Marsilly.

— ε hirtiflora (Tenore)
1811 Tenore — 1877 C. P. G.

— δ corsica (Bern. et Gren.)
1850 Bernard in Grenier e Godron II.

3225 Pinguicula alpina L.
1595 Pona — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

Utricularia L.

3226 Utricularia minor L.
1697 Boume — 1772 Moretti — 1802 Suffren — 1828 Brocchi — 1822 Pollini.

3227 Utricularia intermedia Hayne
1852 Hausmann — 1853 Rota — 1869 Visiani e Saccardo

3228 Utricularia vulgaris L.
1550 Tabernaemontanus Cibo — 1754 Séguier — 1772 Moretti — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren — 1818 Ruchinger

— β neglecta (Lehm.)
1854 Nyman — 1867 Ardoino — 1876 C. P. G.

3228' Utricularia dubia Rosellini
1846 Rosellini. Cf. C. P. G. 1876 (? conformati)

Fam. 118 Globulariaceae

Globularia (Tourn.) L.

3229 Globularia vulgaris L.
1532 Cibo — 1561 Anguillara — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1595 Pona — 1726 Zannichelli.
1565 Michiel
1678 Bauone —

3230 Globularia nudicaulis L.
1532 Cibo — † 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini.
1707 Martins —

3231 Globularia cordifolia L.
1707 Martins — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1822 Pollini
— β bellidifolia (Ten.)
1824 Tenore — 1827 Brocchi.
— δ repens (Lam.)
1773 Vitman — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini

3232 Globularia Alypum L.
1583 Cesalpino — 1696 Caspari — 1785 Allioni — 1789 Ucria.

3233 Globularia incanescens Viv.
1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli — 1742 Zanoni-Monti — 1808 Visiani
1815 Rino

Fam. 119 Plantaginaceae

Plantago (Tourn.) L.

3234 Plantago major L. R
1415 Rini e Peto 1551 Aldrovandi II — 1561 Anguillara
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante.
— β paludosa (Le deb.)
1869 Visiani e Sanardo — 1877 Freyn.
(1873 C. P. G.) — 1882 Arcangeli.

3235 Plantago Cornuti Gouan
1726 Zannichelli — 1818 Ruchinger — 1819 Bertoloni.

3236 Plantago media L.
1550 Peto Cibo — 1562 Mattioli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren
— β brutia (Ten.)
1824 Tenore — 1835 Parolini in Bertoloni II

3237 Plantago amplexicaulis Cav.
1826 Gussone — 1873 C. P. G.

3238. Plantago montana Lam.
1697 Boccone — 1785 Allioni — 1805 Re — 1822 Pollini — 1835 Fucchini, Rainer, Barbieri ecc in Bertoloni II

3239. Plantago fuscescens Jord
1791 Bellardi — 1835 Balbis in Bertoloni — 1896 Bicknell.

3240 Plantago Lagopus L.
1671 Boccone — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Presl; Pollini.

3241. Plantago argentea Chaix
1606 Colonna — 1808 Biroli — 1822 Pollini — 1833 Bertoloni

3242. Plantago lanceolata L.
(1415 Rini — 1551 Aldrovandi II — 1561 Anguillara —
1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni
— β maritima Gren. e Godr.
1785 Allioni — 1820 Moricand
— γ lanuginosa (DC.)
1825 Biasoletto, Sternberg in Freyn 1877 — 1852 Cesati in Rota
— δ altissima (L.)
2 (1893 Gelmi — 1899 Porpichal — 1906 Gortani
1 (1785 Allioni — 1818 Ruchinger — 1820 Moricand

3243. Plantago Bellardi All.
2 (1785 Allioni — 1798 Savi — 1820 Moricand — 1818 Sebastiani e Mauri
1 (1726 Zannichelli (Opusc. p. 27) (Pl. angustif. albida)

3244 Plantago altissima L.
1640 Castelli — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Uoria — 1827 Moris

3245 Plantago Coronopus L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1631 Donati — 1640 Castelli
— β commutata (Guss.)
1832 Gussone — 1873 C. P. G.
— γ Weldenii Rchb.
1842-43 Heldreich e Rapperitz in Rchb. Ic. XVII, 1855 — 1877 Freyn.

35/0018-215

— δ macrorrhiza (Poir.)
1733 Erb. Princ. Cattolica Gr. Baroni
1826 Gussone — 1829 Tenore
— ε ceratophylla (Link)
1832 Gussone — 1831 Tenore

3246 Plantago Cupani Guss.
1696 Cupani — 1827 Gussone — 1783 Nicotra
Prodr. Fl. Messan.

3247 Plantago Serraria L.
1606 Colonna — 1671 Boccone — 1696
Cupani — 1827 Gussone.

3248 Plantago crassifolia Forsk.
1785 Allioni — 1789 Uoria — 1802 Suf-
fren — 1818 Sebastiani e Mauri; Rechinger.

3249. Plantago maritima L.
1558 Mattioli — 1583 Cesalpino —
1631 Donati — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier.
— β serpentina (Vill.)
1802 Suffren — 1785 Allioni — 1804 Ber-
toloni — 1808 Biroli — 1822 Pollini.
— γ alpina (L.)
1824 Comolli — 1829 Tenore — 1853
Rota.

3250 Plantago subulata L.
1696 Cupani — 1826 Gussone; Jan.
1824 Tenore
— β carinata (Schrad.)
1816 Noua e Baltis — 1829 Tenore —
1905 Minio — 1906 Gortani

— γ insularis Gr. Godr
1834 Salis-Marschlins — 1850 Gre-
nier e Godron
— δ capitellata (Ram.)
1873 C. P. G. — 1903 Béguinot in Fiori III

3251 Plantago Cynops L.
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1785
Allioni — 1754 Pontedera in Séguier —
1808 Biroli — 1822 Pollini.

3252 Plantago Psyllium L. R
1615 Rinio
1674 Boccone — 1696 Cupani — 1789 Uoria
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1808 Bertoloni.

3253 Plantago ramosa (Gilib.) Asch.
1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino —
1585 Durante — 1785 Allioni

3253¹ Plantago lusitanica W.
Biunda del Portogallo. Coltivata
fino dalla fine del settecento e talora
avventizia
1793 Zuccagni; G. Tineo — 1815 Biroli
Avventizia: 1847 Savignone. Cfr. Penzig
1889.

3253² Plantago Loeflingii L.
Della Spagna, Canarie e Marocco. Colti-
vata dalla fine del settecento e di
rado avventizia.
1789 Uoria — 1793 G. Tineo — 1798
Zuccagni — 1802 Bonato — 1815 Biroli —
Avventizia: 1897 Penzig.

Litorella Berg.

3254 Litorella uniflora (L.) Asch.
1824 Pollini – 1854 Rainer, De Bracht in Bertoloni X – 1872 Marsilly, 1882 Reverchon.
Cfr. Barbey 1884.

Fam. 120 Rubiaceae

Putoria Pers.

3255 Putoria calabrica (L. f.) DC.
1696 Cupani – 1675 Zanoni – 1789 Uoria
1853 Grech – Delicata – 1826 Gussone

Rubia (Tourn.) L.

3256 Rubia peregrina L.
1678 Bocone – 1726 Zannichelli
1675 Zanoni 1798 Savi – 1774 Giganni
— β lucida (L.)
1798 Savi – 1785 Petagna
— γ angustifolia (L.)
1827 Gussone – 1830 Tenore.

3257 Rubia tinctorum L. R
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1551 Aldrovandi – 1785 Allioni
1808 Biroli; Savi. 1566 Calzolari – 1595 Pona
(+1320) Crescenzio, edit. 1471.

Galium (Tourn.) L.

3258 Galium Cruciata (L.) Scop.
1550 Petr. Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 Michiel – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren – 1816 Pollini.

3259 Galium vernum Scop.
1583 Cesalpino – 1620 C. Bauhin – 1735 Micheli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

3260 Galium pedemontanum (Bell.) All.
1788 Bellardi – 1789 Allioni – 1806 Balbis – 1827 Gussone – 1904 Goiran
— β reflexum (Presl)
1822 Presl – 1832 Gussone

3261 Galium boreale L.
1785 Allioni – 1805 Re – (+1814) Marzuoto in Pirona 1855 – 1835 Molineri, Meneghini in Bertoloni II – 1851 Facchini in Hausmann – 1855 Pirona.

3262 Galium rotundifolium L.
1652 Zanoni – 1678 Bocone – 1785 Allioni – 1804 Savi – 1819 Bertoloni – 1829 Tenore.

3263 Galium ellipticum W.
1821 Salzmann in Flora – 1822 Presl – 1827 Loiseleur; Gussone; Moris.

3264 Galium maritimum L.
1697 Bocone – 1785 Allioni – 1791 Bellardi – 1806 Loiseleur.

3265 Galium verum L.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante.

35/0018-216

— β Wirtgeni (F. Schultz)
1879 Caldesi — 1904 Goiran.
— γ decolorans (Gren. Godr.)
1880 C. P. G — 1893 Gelmi.
— δ ambiguum (Gren. Godr.
1899 Pospichal — 1906 Gortani
— ε approximatum (Gren. Godr.)
1880 Rostan in C. P. G. — 1903
R Keller — 1904 Chenevard
(Queste e le precedenti var. sono da
aversi come differenti ibridi fra G. verum e
G. Mollugo α et β.)

3266. Galium purpureum L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1606
Colonna 1676 Boccone — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier — 1802 Suffren — 1819 Bertoloni

3267. Galium silvaticum L.
1551 Aldrovandi 1853 Rota — 1893 Gelmi — 1899
Pospichal — 1904 Goiran.

3268. Galium aristatum L.
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1595
Pona — 1697 Boccone — 1785 Allioni —
1853 Rota — 1857 Zersi.
— β Schultesii (Vest)
1873 Freyn — 1899 Pospichal.
3269 Galium litorale Guss.
1827 Gussone — 1880 C. P. G.

3270 Galium lucidum All.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1566
Calzolari — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni
— β corrudifolium (Vill.)
1785 Allioni — 1822 Pollini — 1860 Carnel
— γ aetnicum (Biv.)
1651 Grb. messinese. Cfr. Zodda
1816 Bivona — Bernardi — 1822 Presl
— 1827 Gussone.
— δ venustum (Jord.)
1850 Jordan in Grenier e Godron II —
1872 Marsilly.
— ε Bernardi (Gr. Godr.)
1850 Bernard in Grenier e Godron II
— 1872 Marsilly.
— ζ cinereum (All.)
1785 Allioni — 1816 Nova e Balbis —
1822 Pollini — 1834 Salis-Marschlins.

3270' Galium Terracciani Lojac.
1902 Citarda in Lojacono III.

3271 Galium Mollugo L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β erectum (Huds.)
1806 Loiseleur — 1819 Bertoloni — 1829
Tenore — 1904 Goiran — 1906 Gortani
3271' Galium rubrum × Mollugo Sard.
1881 Sardagna in Oesterr. bot. Zeitschr.

3272 Galium rubrum L.
1754 Séguier — 1765 Turra, ed 1780 —
1785 Allioni — 1804 Savi — 1819 Bertoloni.
— β Grenieri Briq.
1850 Soleirol in Grenier e Godron II.
— γ obliquum (Vill.)
1785 Allioni — 1804 Savi — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini — 1904 Goiran.

3273 Galium pyrenaicum Gouan
1819 Bertoloni — 1834 Colla — 1882 Arcangeli. — 1880 C. P. G —

3274 Galium pusillum L.
1878 Schmuck in Oest. bot. Zeitschr.
— 1894 Cugnola — 1898 Foucaud e Simon.
— β hypnoides (Vill.)
1880 C. P. G — 1882 Gibelli e Pirotta

3275 Galium silvestre Pollich.
1678 Bouone — 1745 Séguier — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini — 1852 Rota
— β austriacum (Jacq.)
1829 Tenore — 1877 Ingegnatti) 2
(+1814) Mappucato in Pirona 1855 — 1816 Pollini) 1
— γ anisophyllum (Vill.)
1785 Allioni — 1805 Re — 1834 Massara
1904 Goiran.
— δ argenteum (Vill.)
1850 Grenier in Gren. Godr. II — 1894 Arcangeli.

3276. Galium hercynicum Weig.
1785 Allioni — 1844 De Notaris —
1851 Perini in Hausmann — 1906 Gortani (1831 Tenore)
3276.' Galium Villarsii Req.
1903 Rouy VIII.
3277. Galium helveticum Weig
1852 Rota — 1867 Ardoino — 1880 C. P. G.

3277.' Galium cometerrhizon Lap.
1903 Coste, Fl. France II — 1905 Soulié in Rouy IX.

3278. Galium margaritaceum Kern.
1860-70 Pirona, Venzo in herb. Pat. et herb. Sacc. Gr. Béguinot in Fiori III —
1870 Kerner. — 1906 Gortani.

3279. Galium baldense Spr.
1806 Sternberg — 1813 Sprengel —
1816 Pollini — 1904 Goiran.
— β Tendae (Rchb.)
1843 Reichenbach fil., Reuter, Lisa in Rchb. Icon. XVII, 1855.

3280. Galium uliginosum L.
1785 Allioni — 1834 Colla — 1844 Cesati.
1847 Zanardini.

3281 Galium palustre L.
1735 Micheli — 1745 Séguier — 1769 Agosti — 1785 Allioni — 1802 Saffren
1583 Cesalpino —

35/0018 - 217

— β elongatum (Presl)
1822 Presl — 1830 Tenore — 1832 Gussone — 1847 Zanardini — 1864 Savardo

3282 Galium constrictum Chaub.
1842 Trevisan — 1869 Visiani e Savardo — 1872 Freyn — 1879 Caldesi — 1880 C. P. G.
— β congestum (Jord.)
1879 Caldesi

3283 Galium setaceum Lam.
1827 Gussone — 1828 Moris — 1834 Colla — (+1711) Cupani, ed. 1713

3284 Galium parisiense L.
1532 Cibo — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1735 Micheli — 1819 Bertoloni
— β divaricatum (Lam.)
1826 Presl; Jan — 1696 Cupani — 1827 Gussone.
— γ decipiens (Jord.)
(+1892) Todaro. Cfr. Lojac. III, 1903 — 1903 Strobl.

3285 Galium Aparine L R
1550 Cibo — 1554 Mattioli — 1566 Calzolari — 1583 Cesalpino — 1745 Séguier 1785 Allioni
— β tenerum (Schleich.)
1903 Rouy VIII; Béguinot in Fiori III

— γ spurium (L.)
1805 Re — 1844 Cesati — 1857 Gennari — 1904 Goiran.
— δ Vaillantii (DC.)
1852 Rota — 1860 Carnel — 1877 Freyn — 1904 Goiran.

3286 Galium Vaillantia Web.
1696 Cupani — 1735 Micheli — 1757 Allioni — 1806 Balbis.

3287 Galium tricorne With.
(+1711) Cupani, ed. 1713 — 1735 Micheli — 1789 Ucria — 1818 Ruchinger — 1821 Re — 1835 Bertoloni — 1904 Goiran.

3288 Galium verticillatum Danth.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1827 Gussone — 1829 Tenore.

3289 Galium murale (L.) All.
1696 Cupani — 1757 Allioni — 1798 Savi — 1819 Bertoloni

3289¹ Galium recurvum Req.
β pauciflorum (Kotsch.)
(+1856) Tineo. Cfr. Lojacono III, 1902.
(Il tipo è dell'Arcipelago greco.

3289² Galium messanense Tineo
(+1856) Tineo e (+1866) Gussone in Lojacono III, 1902

3289[3] Galium graecum L.
Originario della Grecia e d. Creta.
Coltivato dal seicento e probabilmente
solo avventizio nel Litorale friulano.
1642 Verbizio — Avventizio? : 1855
Brunati in Pirona.

3289[4] Galium rubioides L.
Originario dell'Europa merid. orient. Ri-
venuto forse soltanto avventizio in
Toscana e Liguria.
1796 Savi I ed in Bertoloni I, 1833 —
1772 Moretti — 1853 Sanguinetti

3289[5] Galium megalospermum Vill.
1785 Allioni — 1867 Ardoino —
1880 C. P. G. — (specie da chiarire)

Vaillantia (Tourn.) L.

3290 Vaillantia muralis L.
1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1726
Zannichelli — 1729 Micheli.

3291 Vaillantia hispida L.
1808 Viviani — 1829 Tenore — 1867
Carut in Ardoino — 1880 C. P. G.
— 1884 Archerson in Barbey.

Sherardia L.

3292 Sherardia arvensis L.
1696 Cupani — 1745 Séguier; Sabbati
1785 Allioni — 1798 Savi — 1802 Suffren
— β maritima Gmel.
1884 Archerson in Barbey — 1897 Porcius.

Asperula L.

3293. Asperula arvensis L.
1532 Cibo — 1723 Micheli in Tilli —
1745 Séguier — 1772 Bonelli — 1785
Allioni — 1808 Viviani.

3294. Asperula taurina L.
1551 ad Dioscoride II
1581 Lobel — 1595 Pona — 1713 Tilli
1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802
Marsari; Suffren.

3295. Asperula odorata L.
1532 Cibo — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier — 185 Allioni.

3296 Asperula laevigata L.
1696 Cupani — 1735 Micheli — 1798 Savi
— 1808 Viviani.

3297 Asperula glauca (L.) Boiss.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Viviani
— 1815 Savi.

3298 Asperula tinctoria L.
1835 Barbieri, Jan in Bertoloni II —
1842 Gussone — 1847 Zanardini
— β palustris (Ten.)
1824 Tenore — 1880 C. P. G.

35/0018 - 218

3299 Asperula tomentosa Ten.
1811 Tenore — 1882 Arcangeli.
— β commutata (R. et S.)
1811 Tenore — 1835 Giraldi in Bertoloni II — 1882 Arcangeli.
— γ deficiens (Viv.)
1830 Viviani — 1840 Moris — 1882 Arcangeli.

3300 Asperula rupestris Tineo
1827 Tineo — 1835 Jan in Bertoloni II.

3301 Asperula hexaphylla All.
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino.

3302 Asperula lutea S. et S.
1828 Moris — 1880 C. P. G — 1884 Barbey.

3303 Asperulea Gussonei Boiss.
1827 Gussone — 1855 Huet. Cfr. Nym. Consp. — 1880 C. P. G.

3304 Asperula cynanchica L.
1563 Cesalpino — 1606 Colonna — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β capillacea Wk. et Lge.
1903 Béguinot in Fiori III.
— γ densiflora Gr. et Godr.
1903 Béguinot in Fiori III — 1904 Goiran — 1906 Gortani
— δ nitens (Guss.)
1826 Gussone — 1830 Tenore — 1880 Groves
— ε neglecta (Guss.)
1826 Gussone — 1829 Tenore
2 — η longiflora W. et K.
1819 Bertoloni — 1822 Pollini — 1827 Gussone — 1828 Fiorini-Mazzanti — 1904 Goiran — 1906 Gortani
1 — ζ aristata (L. fil.)
1826 Jan — 1829 Tenore — 1906 Gortani
— ν scabra (Presl)
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1822 Presl — 1827 Gussone
— ι canescens Vis.
1832 Gussone — 1842 Gasparrini in Gussone

Crucianella L.

3305 Crucianella latifolia L.
1563 Michiel 1599 Imperato — (1673) Barrelier ed. 1714 — 1785 Allioni — 1789 Ucria

3306 Crucianella angustifolia L.
1563 Michiel 1774 Martelli e Sabbati — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1805 Re.

3307 Crucianella maritima L.
1774 Martelli e Sabbati — 1696 Cupani — 1789 Ucria — 1818 Sebastiani e Mauri.

3308 Crucianella rupestris Guss.
1832 Gussone — 1880 C. P. G.

Fam. 121 Caprifoliaceae.

Adóxa L.

3309 Adoxa Moschatellina L.
1745 Séguier – 1768 Turra, ed. 1780 – 1774 Martelli e Sabbati – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

Sambúcus (Tourn.) L.

3310 Sambucus Ebulus L. R
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1554 Mattioli – 1585 Durante – 1595 Pona.

3311 Sambucus nigra L. R
1415 Rinio 1550 Pelo Cibo – 1551 Aldrovandi II 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

3312 Sambucus racemosa L.
1561 Anguillara – 1562 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

Viburnum L.

3313 Viburnum Tinus L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.

3314 Viburnum Lantana L. R
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1726 Zannichelli.

3315 Viburnum Opulus L. R
1550 Pelo Cibo – 1551 Aldrovandi II 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1595 Pona – 1726 Zannichelli:

— β roseum L. (flor. steril.) Comunemente coltivato fino dal seicento e talora avventizio.
1642 Vestingio – 1696 Cupani – 1713 Tita – 1802 Bonato – 1822 Pollini

Lonicéra L.

3316 Lonicera implexa Ait.
1415 Rinio 1532 Cibo (+1708) Trionfetti. Cfr. Bertoloni II – 1735 Micheli – 1824 Viviani.

— β adenocarpa (Guss.)
1832 Gussone – 1880 C. P. G.

3317 Lonicera Caprifolium L.
1550 Pelo Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona.

— β stabiana (G. Pasq.)
1831 Tenore – 1875 G. Pasquale in atti Acad. Napol.

3318 Lonicera etrusca Savi
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1735 Micheli – 1789 Uoria – 1795 Savi.

3319 Lonicera Periclymenum L. R
1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1795 Savi.

35/0018-219

3320 Lonicera biflora Desf.
1827 Gussone – 1880 C. P. G – 1882 Arcangeli (+1877) Parlatore in Parl. Carnel VII (+1856) Tineo e

3321 Lonicera nigra L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli 1844 Casati 1869 Visiani e Savardo – 1853 Rota

3322 Lonicera Xylosteum L.
1550 Petri Cibo – 1551 Aldrovandi – 1745 Séguier – 1768 Turra, ed. 1780 – 1785 Allioni.

3323 Lonicera alpigena L.
1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1768 Turra, ed. 1780 – 1802 Suffren; Marzari.

3324 Lonicera caerulea L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re – 1822 Pollini – 1844 Casati – 1853 Rota

3324¹ Lonicera pyrenaica L.
Indigena de' Pirenei, ma non pare d'Italia; dove era certo coltivata dalla metà del settecento.
1760 Allioni – 1789 Ucria – Spontanea o avventizia: 1785 Allioni – 1822 Zantedeschi in Pollini – 1880 C. P. G.

3324² Lonicera japonica Thunb.
Della Cina e Giappone. Coltivata fino dal primo quarto dell'ottocento ed ora qua e là naturalizzata o avventizia
1820 Bonato – 1821 Gussone; Capelli – Avventizia: 1907 A. Tonelli e Fiori in Fiori IV.

3324³ Lonicera flexuosa Thunb.
Della Cina e Giappone. Coltivata come la precedente dal primo quarto dell'ottocento.
1824 Savi – 1867 Pasquale.

3324⁴ Lonicera sempervirens L.
Della Carolina. Coltivata frequentemente fino dall'ultimo quarto del settecento.
1789 Ucria – 1802 Bonato – 1806 Zuccagni – 1815 Biroli.

Symphoricarpus (Dill.) Adans.

3324⁵ Symphoricarpus racemosa Michx.
Nativo del Canadà. Coltivato fino dalla ~~seconda~~ prima metà dell'Ottocento ed ora assai diffuso e talora subspontaneo
1780 Forsetti – 1802 Bonato – 1806 Zuccagni – 1820 Savi – 1842 Visiani – 1904 Goiran – 1906 Goitani

3324⁶ Symphoricarpus vulgaris Michx
Dall'America sett. Coltivato fino dalla seconda metà del settecento.

Linnaéa Gron.

3325 Linnaea borealis L.
1620 C. Bauhin – 1745 Séguier – 1801 Baltis – 1851 Sieber, Facchini in Hausmann I – 1853 Rota – 1857 Zersi.

fam. 122 Valerianaceae

Valeriana (Tourn.) L.

3326. Valeriana officinalis L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1592 Colonna — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier.
— β tenuifolia Vahl
1830 Tenore — 1853 Rota — 1904 Goiran
— γ exaltata (Mik.)
1844 Cesati — 1851 Hausmann — 1878 Smith.
— δ excelsa (Poir.)
1832 Cibo — 1851 Gredler in Hausmann — 1877 Staub, Veget. Fiume.

3327 Valeriana tuberosa L.
1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1599 Imperato —
1561 Anguillara — 1565 Mattioli — 1566 Calzolari
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1785 Allioni

3328 Valeriana dioica L.
1562 Mattioli — 1595 Pona — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren.
— β simplicifolia Rchb.
1903 Béguinot in Fiori III.

3329 Valeriana Phu L.
1532 Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1802 Marzari — 1808 Biroli — 1824 Naccari — 1855 Bramati in Pirona (In alcune località solo avventizia)

3330 Valeriana tripteris L.
1550 Pitti Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.

— β intermedia (Vahl)
1844 Cesati — 1853 Rota — 1857 Zersi — 1904 Goiran.

3331. Valeriana montana L.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1745 Séguier
1707 Martini — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1819 Bertoloni.
— β cuspidata Bert.
1830 Bertoloni in DC Prodrom. IV — 1894 Rodegher e Venanzi

3332 Valeriana elongata L.
1833 Hausmann, Montini in Bertoloni I — 1851 Meneghi, Facchini in Hausmann I — 1869 Visiani e Sauardo.

3333 Valeriana saxatilis L.
1563 Cesalpino — 1565 Michiel — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1707 Martini — 1745 Séguier 1802 Suffren; Marzari.

3334 Valeriana celtica L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1785 Allioni — 1833 Bonjean, Balbis, Molineri in Bertoloni I.

3335 Valeriana saliunca All. R
1785 Allioni — 1837 Sanguinetti — 1844 Cesati — 1852 Gennari.

35/0018 - 220

3336. Valeriana supina L.
1833 Beggiato in Bertoloni I – 1854 Massari – 1857 Sandi – 1864 Cesati – 1883 Rota.

Centranthus DC.

3337 Centranthus ruber (L.) DC.
1551 Aldrovandi II
1588 Cesalpino – 1595 Pona – 1642 Vestingio – 1720 Pontedera – 1745 Seguier – 1785 Allioni – 1802 Morgan.

3338 Centranthus angustifolius (All.) DC.
1785 Allioni – 1805 Re – 1831 Tenore – 1880 C. P. G.

3339 Centranthus trinervis (Viv.) Beg.
1824 Viviani – 1828 Moris – 1854 Jahn – Marschling – 1872 Marsilly

3340 Centranthus Calcitrapa (L.) Dufr.
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Urvia – 1804 Savi – 1807 Viviani – Bernardi.
— β orbiculatus (Dufr.)
1840 Moris – 1903 Béguinot in Fiori III.

Valerianella (Tourn.) Pollich

3341 Valerianella echinata (L.) DC.
1606 Colonna – 1798 Savi – 1806 Balbis – 1822 Pollini – 1855 Brunaffini Viviani – 1877 Fregni.

3342 Valerianella olitoria (L.) Pollich
1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1785 Allioni – 1838 Ruchinger; Nouet e Balbis.

3343 Valerianella costata Betcke
1827 Guglielmo e in Bertoloni I – 1852 Sanguinetti – 1880 C. P. G.

3344 Valerianella carinata Lois.
1810 Loiseleur – 1827 Moris; Guglielmo – 1832 Tenore – 1834 Jahn – Marschling.

3345 Valerianella rimosa (W.) DC.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1816 Nouet e Balbis – 1822 Pollini – 1834 Jahn – Marschling – 1867 Viviani e Savardi.

3346 Valerianella pumila (W.) DC.
1826 Guglielmo – 1867 Ardoino – 1872 Marsilly. (1831 Tenore)
— β latifolia (Bertol.).
1833 Gasparrini – 1880 C. P. G.

3347 Valerianella dentata Pollich
2 (1827 Guglielmo – 1833 Bertoloni – 1842 Trevisan (1844 Cesati; De Notaris –
1 (1745 Seguier – 1822 Pollini.

3348 Valerianella puberula (Bert.) DC.
1826 Guglielmo – 1829 Moris – 1830 Tenore – 1833 Mauri in Bertoloni I.

3349. Valerianella microcarpa Lois.
1834 Salis-Marschlins – 1842 Gussone – 1853 Grecti-Delicata – 1882 Gibelli e Pirotta.

3350 Valerianella truncata Bekke
1867 Ardoino – 1878 Nyman – 1880 C.P.G. – 1882 Arcangeli.

3351 Valerianella eriocarpa Desv
2(1869 Pasquale – 1833 Biasoletti etc in Bertoloni I 2
1(1696 Cupani – 1810 Loiseleur – 1816 Bivona-Bernardi

3352 Valerianella vesicaria (L.) Mönch
1826 Jan – 1827 Gussone – 1880 C.P.G.

3353 Valerianella brachystephana (Ten.) Bert.
1830 Tenore – 1880 C.P.G.
(1833 Gasparrini in Bertoloni I

3354 Valerianella coronata (L.) Desv.
1820 Moricand – 1822 Pollini – 1847 Zanardini – 1857 Zersi – 1860 Carnel
1606 Colonna

3354' Valerianella fallax Coss. et Dur.
2(1864 Gasparrini, Schouw in Krok Monogr. gen. Valerianell. (1864) –
1(La specie è principalmente nativa dell'Africa sett. per l'Italia è da confermarsi

Fedia Gaertn.

3355 Valerianella discoidea (L.) Lois.
1785 Allioni – 1805 Re – 1844 De Notaris – 1860 Carnel.

Fedia Gaertn.

3356 Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn.
1826 Gussone – 1827 Zerapha – 1830 Tenore – 1844 De Notaris.
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.

Fam. 123 Dipsaceae.

Dipsacus (Tourn.) L.

3358 Dipsacus silvester L. R
1415 Rhino 1551 Aldrovandi – 1562 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1726 Zannichelli.

3357 Dipsacus fullonum L.
1415 Rhino 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli (Forse soltanto naturalizzato da precedente coltura)

3359 Dipsacus laciniatus L.
1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren

3359' Dipsacus fallax Simonk
(D. laciniatus × silvester)
1899 Pospichal

3360. Dipsacus ferox Lois
1806 Loiseleur – 1827 Moris – 1835 Bonjean, Babani in Bertoloni II.

3361 Dipsacus pilosus L.
1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1595 Pona – 1702 Martini – 1785 Allioni – 1802 Suffren.

35/0018-221

Cephalaria Schrad.

3362 Cephalaria alpina (L.) Schrad.
1726 Zannichelli — 1785 Allioni —
1808 Biroli — 1815 Savi.

3363 Cephalaria syriaca (L.) Schrad.
Della Spagna e Francia merid. e Africa bor.; in Italia prob. avventizie; dove è anche coltivata dal settecento
1760 Allioni — 1789 Uccia — 1793 Zuccagni — Avventizia:
1844 De Notaris — 1852 Gennari
Bicknell

3364 Cephalaria transylvanica (L.) Schrad.
1697 Cupani — 1785 Allioni — 1798
Savi — 1806 Balbis — 1822 Pollini — 1857 Zersi.

3365 Cephalaria joppensis (Rchb.) 1824 Coult.
1697 Cupani — 1829 Tenore — 1832
Gussone

3366 Cephalaria leucantha (L.) Schrad.
1676 Boccone — 1785 Allioni — 1802 Suffren —
1772 Scopoli — 1797 Host —
— β leucantheona (R. S.)
1824 Viviani — 1899 Pospichal

Succisa (Mattioli) M. et K.

3367 Succisa pratensis Moench
1415 Rinio 1550 Cibo — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1585 Durante — 1592 Colonna
— 1595 Pona.

3368 Succisa australis (Wulf.) Rchb.
1532 Cibo — 1685 Trionfetti — 1795
Bertoloni. Cfr. Bertol. II — 1810
Brignoli.

Knautia L.

3369 Knautia integrifolia (L.) Bertol.
1653 Volpari 1757 Allioni — 1789 Uccia — 1798 Savi —
1816 Bivona-Bernardi — 1855 Pirona
— β hybrida (Coult.)
1651 Erb. Mesm. Cfr. Zodda —
1789 Allioni — 1816 Bivona-Bernardi —
1827 Gussone — 1852 Rota

3370 Knautia arvensis (L.) Coult.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1697 Boccone — 1726 —
Zannichelli — 1785 Allioni.
— β campestris Koch
1893 Gelmi.
— γ rigidiuscula Koch
1899 Pospichal — 1906 Gortani
— δ collina Wohlf.
1867 Ardoino — 1877 Freyn.
— ε mollis (Jord.)
1867 Ardoino
— ζ transalpina (Christ)
(+ 1847) Rainer. Cfr. Borbas, Revisio Knaut. (1904) — 1904 Degen in Borbas l.c.
1902 Ducommun in Briq. Ann. Jard. bot. Genève. (1902)

3371 Knautia longifolia (W. K.) Koch
1851 Perini, Boni in Hausmann — 1853 Rota — 1855
Pirona — 1869 Visiani e Saccardo

— β magnifica (Boiss. et Orph.)
1892 Kerner. Cfr. Kern. Sched. f. Austr. hung. n. 2280 (1893)
— γ brachytricha Brig.
1902 Briquet l.c.

3372 Knautia silvatica (L.) Duby
1550 Cibo (Pelo) 1565 Michiel — 1583 Cesalpino — 1745 Séguier — 1785 Allioni

— β pannonica (Heuff.)
(+1886) Franzoni, ed. 1890 — 1896 Marchesetti.

— γ dipsacifolia (Heuff.)
(+1886) Franzoni, ed 1890 — 1905 Minio.

3372¹ Knautia subcanescens Jord.
1904 Scheichberg in Borbas l.c.

3372² Knautia centrifrons Borb.
1904 Degen in Borbas l.c.

3372³ Knautia Breindlii G. Beck.
1894 Breindl, Porta, Degen. Cfr. Borbas l.c.

3372⁴ Knautia velutina Briquet
1907 Pampanini in Fiori IV

Scabiosa (Tourn.) L.

3373 Scabiosa brachiata S. et S.
1826 Gussone — 1829 Tenore — 1879 C. P. G.

— β Sibthorpiana (S. et S.)
1726 Zannichelli. Cfr. Freyn 1877 — 1847 Savignone. Cfr. Penzig 1889 — 1877 Freyn — 1887 Groves.

3374 Scabiosa dichotoma W.
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1796 Ucria — 1827 Gussone.

3375 Scabiosa canescens W. et K.
1852 Rota — 1857 Zersi — 1879 C. P. G.

— β vestina (Facch.)
1843 Facchini in Koch — 1851 Boni; Facchini in Hausmann.

3375¹ Scabiosa affinis Gr. et Godr.
1904 Goiran.

3376 Scabiosa silenifolia W. et K.
1685 Trionfetti — 1696 Cupani — 1826 Gussone — 1829 Tenore.

3377 Scabiosa gramontia (*) L.
1558 Mattioli — 1532 Cibo — 1720 Pontedera — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1819 Bertoloni.

— β agrestis (W. et K.)
1837 Biasoletto, Tommasini. Cfr. Freyn 1877 — (+1886) Franzoni, ed. 1890 —

— γ mollis (W.)
1811 Tenore — 1877 Freyn — 1882 Arcangeli.

— δ pyrenaica (All.)
1678 Boccone — 1785 Allioni — 1802 Viviani — 1805 Re — 1893 Gelmi.

— ε holosericea (Bert.)
1720 Micheli in Tilli — 1810 Bertoloni — 1827 Moris.

3378 Scabiosa columbaria L.
1550 Cibo (Pelo) — 1551 Aldrovandi II — 1585 Durante — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren; Marzari

*) Questo addiettivo deriva dal piccolo paese di Gramont (Tarn-et Garonne) dove il Sauvages raccolse la specie (1751); quindi gramontia e non gramontia.

35/0018 - 222

— β uniseta (Savi)
1592 Colonna — 1798 Savi — 1811 Tenore — 1822 Pollini
— γ Hladnikiana (Host)
1843 Koch — 1879 C. P. G. — 1882 Gibelli e Pirotta — 1854 Nyman — 1872 Reuter. Cfr. Hall. Wohlf. 1892
— δ ochroleuca (L.)
1808 Biroli — 1829 Tenore — 1904 Goiran.
— ε Scopolii (Lk.)
1879 C. P. G. (Habitat da confermarsi)
— ζ lucida (Vill.)
1788 Bellardi — 1834 Massara — 1851 Perini, Facchini in Hausmann — 1853 Rotz — 1904 Goiran.

3379 Scabiosa atropurpurea L.
Raramente spontanea al meggodì; più comunemente coltivata e avventizia.
1553 Michiel 1620 C. Bauhin — 1642 Vesling — 1713 Tita — 1789 Ucria — 1827 Gussone; Jan.
— β maritima (L.)
1550 Pelo Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Michiel 1789 Ucria 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri
— Scab. Cornucopiae Viv. è una forma virescente e prolifera: 1696 Cupani — 1826 Gussone.
— γ Cupani (Guss.)
1696 Cupani — 1827 Gussone.

3380 Scabiosa limonifolia Vahl
1696 Cupani — 1827 Gussone — 1879 C. P. G.

3381 Scabiosa cretica L.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1789 Ucria
— β heterophylla Pasq.
1869 Pasquale.

3382 Scabiosa graminifolia L.
1550 Pelo Cibo — 1551 Alborgati II 1620 C. Bauhin — 1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1822 Pollini

3383 Scabiosa stellata L.
1785 Allioni — 1827 Moris — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino.

3384 Scabiosa sicula L.
1771 Linné Mant. alt. — (+1837) Bivona — Bernardi. Cfr. Parl. Carnel VII — 1842 Gussone. (Da confermarsi)

3385 Scabiosa crenata Cirill.
1592 Colonna — 1696 Cupani — 1785 Petagna — 1788 Cirillo.
— β glabriuscula Ten.
1697 Boccone — 1832 Tenore.

3386 Scabiosa argentea L.
1726 Zannichelli — (+1766) Ginanni, ed. 1774 — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β eburnea (S. et S.)
1842 Gussone — 1879 C. P. G.

3386[1] Scabiosa Levieri Hut. P. R.
1877 Levier, Huter, Porta, Rigo. Cfr. N. Giorn. bot. ital. 1879, p. 289.
(Sec. Huter Herbar-Studien, p. 60 è una ~~var.~~ forma di S. gramontia ε holosericea)

3386[2] Scabiosa prolifera L.
Della Siria e Palestina. Coltivata fino dalla seconda metà del settecento e resasi qua e là avventizia.
1772 Allioni – 1793 Zuccagni; g. Tineo. Avventizia: 1789 Ucria – 1889 Bastreri. in Penzig.

2 3386[4] Scabiosa lucida × Succisa pratensis Wohlf.
1892 Hallier-Wohlfarth.

1 3386[3] Scabiosa cephalarioides Lojac.
1902 Riccobono in Lojacono III.

Pycnocómon Hoffg. et Lk.
3387 Pycnocomon rutifolium (Vahl) H. et L.
1674 Boccone – 1802 Viviani – 1815 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

Fam. 124 Cucurbitaceae.

Lagenária Ser.

Momórdica L.
3389[1] Momordica Balsámina L.
Nativa delle Indie orient. Coltivata fino dal quattrocento.
1415 Rinio – 1558 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1642 Vestingio – 1801 Bonato

3388 Lagenaria vulgaris Ser. R
Originaria delle Indie e dell'Abissinia. Coltivata fino dall'era romana in più varietà.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1588 Durante.

Ecballium A. Rich.
3389 Ecballium Elaterium (L.) A. Rich.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

Bryonia (Tourn.) L.
3390 Bryonia alba L. R
1532 Cibo – 1585 Durante – 1831 Tenore – 1882 C. P. G. (L'indigenato italiano è tuttora dubbio) 1877 Strobl in Staub. Veg. Fiume

3392 Bryonia dioica L.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1586 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona – 1818 Pollini.

II 3391 Bryonia cortica R. Maire
~~3391~~ (= Bryonia syriaca G. Cam. e Fl. anal. non Boiss.)
1884 Petit – 1904 R. Maire. Cfr. Rouy
I X (1908) β marmorata (Petit)
1884 Petit

3393. Bryonia acuta Desf.
1844 Gussone – 1856 Huet. Cfr. Nym. Consp.
– β sicula (Guss.)
1844 Gussone – 1856 Huet. Cfr. Nym. Consp.

35/0018 - 223

Cúcumis L.

3394. Cucumis Colocynthis L.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1844 Gussone – 1854 Tineo in Bertoloni X.

3395 Cucumis Citrullus (L.) Ser. R
Originario dell'Africa intertropicale, noto fino dall'era romana. Cfr. Penzig 1904.
(+1320) Crescenzio, ed. 1471 1415 Rinio – 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1585 Durante –

3396 Cucumis Sativus L R
Delle Indie orientali. Coltivato fino dall'era romana.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante

3397 Cucumis Melo L. R
Nativo dell'India e della Guinea. Coltivato fino dall'epoca romana in parecchie varietà.
1415 Rinio 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante.
var. flexuosus (L.)
(+1375) Boccaccio. Cfr. Targ. Tozz. 1853 – Jam. 125.
1415 Rinio 1558 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino.

Cucurbita L.

3398 Cucurbita moschata Duch.
Originaria, come sembra, dell'Asia merid. Coltivata in Italia pare solo dagli ultimi anni dell'settecento
1806 Francioli – 1787 Duchesne in Encycl. meth. II. – 1810 Gallizioli, Elem. bot. agrar. III – 1822 Pollini

3399 Cucurbita maxima Duch.
Nativa, come pare, dell'America merid. Coltivata fino dal cinquecento in numerose varietà.
1558 Mattioli – 1583 Cesalpino

3400 Cucurbita Pepo L R
Oriunda, come sembra, dell'Asia meridionale. Coltivata fino dall'era romana in più varietà.
1550 Cibo – 1583 Cesalpino – 1558 Mattioli – β Melopepo (L.)
1651 Bauhin-Cherler – 1760 Allioni – 1789 Acria – 1798 Farsetti

Sicyos L.

3401 Sicyos angulatus L.
Originario dell'America Sett. Coltivato dalla ~~seconda metà~~ principio del settecento e naturalizzato qua e là nel Trentino
1701 Martini 1762 Allioni – 1793 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato – Naturalizzato o avventizio: 1854 Ambrosi, Montini in Bertoloni X.

Campanulaceae

Jasióne L

3402. Jasione montana L.
1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1696 Cupani – 1745 Séguier – 1785 Allioni.
— β dentata DC.
1696 Cupani – 1827 Gussone – 1883 Strobl

3403 Jasione perennis Lam.
1884 Petit – 1894 Arcangeli
— β supina (Sieb.)
1877 Huter, Porta, Rigo in Rigo. Cfr. Part. Carnel VI.

Phyteuma L.

3404 Phyteuma pauciflorum L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1837 Sandi.
— β globularifolium (Sternb. et H.)
1857 Sandi – 1834 Comolli – 1835 Colla; De Notaris, Meneghini, Montini ecc. in Bertoloni II – in qui

3405 Phyteuma hemisphaericum L.
1606 Colonna – 1713 Tita – 1785 Allioni – 1808 Biroli.
— β graminifolium (Sieb.)
1860 Zumaglini – 1879 Bizzozero in herb. Patav.

3406 Phyteuma humile Schleich.
1817 Biroli – 1834 Comolli – 1835 Badarò ecc. in Bertoloni II.

3407 Phyteuma serratum Viv.
1825 Viviani – 1830 Duby – 1835 Soleirol in Bertoloni II

3408 Phyteuma Sieberi Spr.
1837 Sandi (Ph. Marzani) – 1851 Facchini (Heufler) in Hausmann I – 1853 Rota – 1869 Visiani e Savardo – 1879 C. P. G.

3409 Phyteuma orbiculare L.
1595 Porta – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
— β Columnae Tenore
1606 Colonna – 1811 Tenore
— γ lanceolatum (Vill.)
1822 Pollini – 1837 Sandi – 1893 Gelmi – 1904 Goiran.
— δ ellipticifolium (Vill.)
1822 Pollini – 1869 Visiani e Savardo – 1904 Goiran.
— ζ austriacum (Beck)
1893 Gelmi

3410 Phyteuma Scheuchzeri All.
1757 Bassi – 1785 Allioni – 1802 Saffren 1808 Biroli – 1822 Pollini

3411 Phyteuma Charmelii Vill.
1789 Allioni – 1830 De Candolle Monogr. Campanul. – 1867 Ardoino.

35/0018 - 224

3412 Phyteuma Michelii Bertol.
1563 Cesalpino – (+1617) Alpino, ed. 1627 – 1723 Micheli in Tilli – 1757 Bassi – 1785 Allioni.

3413 Phyteuma Balbisii DC. f.
1806 Balbis – 1830 A. De Candolle, Monograph. Campanul. – 1879 C. P. G.

3414 Phyteuma spicatum L.
(+1805) Walfen, ed. 1850 – 1835 Bonjean in Bertoloni II – 1851 Facchini in Hausmann I – 1853 Rota – 1855 Pirona.
– β nigrum (Schm.)
1853 Rota – 1855 Pirona – 1857 Zersi – 1895 Gelmi.
1678 Boccone

3415 Phyteuma Halleri All.
1563 Cesalpino – (+1673) Barrelier, ed 1714 – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier
– 1595 Pona – 1822 Pollini

3416 Phyteuma comosum L.
1532 Cibo – 1533 Michiel – 1595 Pona – (+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1713 Tila – 1745 Séguier.

3417 Phyteuma limonifolium (L.) S. et S.
1811 Tenore – 1826 Gussone – 1877 Groves – 1879 C. P. G.

3418 Phyteuma trichocalycinum (Ten.) Tanf.
1811 Tenore – 1824 Schouw – 1827 Gussone.
– β Minae (Strobl) Tanf.
1883 Strobl – 1842 Gussone. cf. Parl. Carnel VI (*)

Campanula (Tourn.) L.

3419 Campanula Erinus L.
1583 Cesalpino – 1592 Colonna – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1820 Moricand – 1847 Zanardini.

3420 Campanula Medium L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1565 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante

3421 Campanula alpestris All.
1755 Allioni – 1768 Turra, ed. 1780 – 1805 Re – 1835 Balbis, Molineri, Bonjean in Bertoloni II.

3422 Campanula alpina Jacq.
1822 Pollini – 1835 Barbieri in Bertoloni II – 1837 Sandi – 1844 Cesati.

3423 Campanula barbata L.
1620 C. Bauhin – 1713 Tila – 1745 Séguier
1785 Allioni – 1802 Saffren

Nota
*) Molti ibridi fra le varie specie di Phyteuma furono raccolti nel Tirolo e specialmente presso Innsbruck dal Murr e da esso descritti in Deutsch. bot. Monatschrift, 1896.

3424. Campanula sibirica L.
1785 Allioni – 1822 Pollini – 1806 Balbis
1824 Schouw – 1830 Orsini.
— β divergens (W.)
1877 Cesati in C. P. G. – 1879 Caldesi
– 1883 Rossi – 1904 Goiran.

3425. Campanula dichotoma L.
1640 Castelli – 1674 Bouone – 1696
Cupani – 1789 Ucria – 1807 Bivona
– Bernardi.

3426. Campanula lingulata W. K.
1829 Tenore – 1877 C. P. G.

3427. Campanula petraea L.
1595 Pona – (+1673) Barrelier, ed. 1714
– 1745 Séguier – 1816 Pollini.

3428 Campanula Cervicaria L.
1620 C. Bauhin – 1785 Allioni – 1802
Mazzari – 1806 Sternberg – 1837 Sandri
– 1864 Sauardo

3429 Campanula glomerata L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1697 Bouone – 1718
Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745
Séguier – 1773 Vitman.

3430 Campanula foliosa Ten.
1811 Tenore – 1826 Gussone – 1830 Orsini.

3431 Campanula thyrsoides L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1824
Comolli; Schouw – 1835 Bonjean in
Bertoloni II – 1837 Sandri – 1855 Pirona

3432 Campanula spicata L.
1723 Micheli in Tilli – 1754 Séguier
1595 Pona 1785 Allioni – 1802 Suffren.
1864 Sauardo

3433 Campanula Rapunculus L.
1415 Rinio Feto 1551 Aldrovandi II
1550. Cibo – 1563 Cesalpino – 1565 Mat-
tioli – 1585 Durante – 1592 Colonna
– 1726 Zannichelli.
— β Lambertiana (DC.)
1879. Freyn.

3433' Campanula primulifolia Brot.
1892 Todaro in Lojacono III.

3434. Campanula patula L.
1785 Allioni – 1805 Re – 1802 Suffren
1822 Pollini – 1824 Schouw.

3435 Campanula ramosissima S. et S.
1812 Pollini, Elem. di Bot. – 1813 Balbis
– 1853 Rota – 1904 Goiran.
Felice Lorei in
— β longisepala Rossi e Chiov.
1890 Rossi – 1903 Béguinot in Fiori III

3436 Campanula persicifolia L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1565
Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona
1606 Colonna.

35/0018-225

3437 Campanula cenisia L.
1755 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1824 Schouw — 1875 Favre.

3438 Campanula Zoysii Wulf.
1788 Wulfen in Jacq. Coll. — 1843 Koch — 1848 Maly (+1863) Morassi in Gutani II.

3439 Campanula Tommasiniana Reut.
1845 Freyer in Rchb. Ic. XIX — 1865 Tommasini in Reuter Cat. grains Jord. Genève — 1878 Smith — 1879 Freyn.

3440 Campanula Morettiana Reichenb.
1822 Cristofoli in Pollini — 1826 Moretti — 1831 Reichenbach — 1837 Sandi — 1851 Facchini, Perini ecc. in Hausmann I.

3441 Campanula Raineri Perp.
1817 Lena-Perpenti in Bibl. ital. V — 1822 Zantedeschi in Pollini — 1824 Comolli — 1853 Rota — ~~1857~~ 1871 Zersi.

3442 Campanula pyramidalis L.
1745 Séguier (1785 Allioni — 1797 Host) — 1802 Suffren — 1818 Ruchinger — 1822 Pollini.

3443 Campanula versicolor S. et S.
1813 Tenore Cat. horti Neap. App. I — 1824 Moretti in Schouw — 1826 Gussone.

3444. Campanula isophylla Moretti
1824 Moretti; Viviani — 1844 De Notaris — 1872 C. P. G.

3445 Campanula fragilis Cir.
1532 Cibo — 1674 Boccone — 1788 Cirillo — 1824 Schouw.
— β Cavolini (Ten.)
1664 Ray, ed. 1694 — (+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1824 Schouw — 1829 Tenore.

3446 Campanula Elatines L.
1772 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1824 Schouw — 1835 Molineri, Balbis, De Notaris in Bertoloni II.
— β istriaca (Feer)
1839 De Candolle, Prodr. VII — 1843 Koch — 1896 Feer in Journ. of Bot.
— γ garganica (Ten.)
1723 Micheli in Tilli — 1785 Petagna — 1827 Tenore, Cat. sem. horti Neap.
— δ Barbeyi (Feer)
1890 Feer l.c. — 1903 Béguinot in Fiori III.

3447 Campanula elatinoides Moretti
2 (1696 Zwinger, Theatr. bot. — 1
1 (1611 Gregorio da Reggio in Clus. Cur. poster.
1822 Zantedeschi in Pollini — 1835 De Notaris, Balsamo-Crivelli ecc. in Bertoloni II — ~~1857~~ 1871 Zersi

3448 Campanula excisa Schleich.
1824 Re; Moretti — 1835 De Notaris, Walden in Bertoloni II.

3449 Campanula caespitosa Scop.
1697 Bouone — 1785 allioni — 1802 Suffren — 1824 Schouw — 1834 Comolli!

3450 Campanula Bellardi All.
1785 allioni — 1805 Re — 1822 Presl — 1824 Schouw; Massara — 1896 Mariotti.

1 (1713 Tita — 1754 Séguier —

3451 Campanula rotundifolia L.
1563 Cesalpino — 1561 Anguillara — 1697 Bouone — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1773 Vitman — 1802 Mazzari.

— β tenuifolia (Hoffm.)
1835 Colla — 1868 Tillière — 1882 Arcangeli.

— δ micrantha (Bert
1842 Marzialetti in Bertoloni — 1877 C. P. G.

— ε macrorrhiza (Gay)
1846 De Notaris — 1853 Rota — 1862 Ardoino.

— ζ Forsythii Arc.
1843 Moris — 1887 Arcangeli, atti soc. tosc. sc. nat. — 1888 Tamsani in Parl. Carnel VIII.

— η rotundifolia (Bert.)
1844 De Notaris — 1877 C. P. G.

2 — ι linifolia (Scop.)
1822 Pollini — 1830 Reichenbach — 1848 Maly — 1880 Gorran.

— κ Scheuchzeri (Vill.)
1532 Cibo — 1755 Allioni — 1873 Vitman — 1804 Savi.

— λ stenocodon (Boiss. et Reut.)
1867 Ardoino — 1877 C. P. G. — 1882 Arcangeli. — 1904? Gorran.

3452 Campanula rhomboidalis L.
1697 Bouone — 1785 allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1837 Zossi — 1867 Ardoino.

— β lanceolata (Lap.)
1888 Burnat in Parl. Carnel VIII

3453 Campanula bononiensis L.
1550 Cibo — 1651 Jger in Bauhin et Cherler II — 1745 Séguier — 1802 Mazzari — 1816 Nouc e Balbis.

3454 Campanula rapunculoides L.
1718 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1768 Turra, ed 1780 — 1785 Allioni — 1802 Mazzari.

3455 Campanula Trachelium L.
1550 Cibo — 1551 aldrovandi — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1595 Bona — 1726 Zannichelli — 1785 allioni.

3456. Campanula latifolia L.
1550 Cibo – 1551 aldrovandi – 1785 allioni – 1805 Re – 1808 Pirolo – 1831 Tenore

3456' Campanula Hausmanni Rchb. fil.
(C. barbata × Phyteuma hemisphaericum)
1873 Hausmann. Cf. Rchb. fil. in Flora, 1877, p. 30.

Adenóphora Fisch.

3457 Adenophora liliifolia (L.) Bess.
1620 C. Bauhin – 1767 Tozza – 1802 Suffren – 1855 Pirona – 1864 Saccardo (C. Alpini e. p.)
– β Alpini Borbas
(+1617) Alpino, ed. 1627 – 1864 Saccardo (C. Alpini, ex max. parte)
1904 Porta in Borbas, Recens. Adenoph.

Specularia (Heist.) A. DC.

3458 Specularia Speculum (L.) A. DC.
1551 aldrovandi – 1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier.
– β cordata Vis.
1879 Caldesi – 1895 Hellier – Wohlfarth.

3459 Specularia hybrida (L.) A. DC.
1696 Cupani – 1745 Seguier – 1789 Mera – 1811 Tenore – 1818 Sebastiani e Mauri.

3460 Specularia falcata (R. S.) A. DC.
1798 Savi – 1785 allioni – 1805 Re – 1811 Tenore

Hedraeánthus A. DC.

3461 Hedraeanthus dalmaticus A. DC.
1877 Vetterlein, Monogr. der Gatt. Edraeanth. Wien.

3462 Hedraeanthus graminifolius (L.) A. DC.
1592 Colonna – 1818 Sebastiani e Mauri – 1830 Ortini.
– β siculus Strobl
1696 Cupani – 1824 Schouw – 1827 Gussone – 1883 Strobl.

3463 Hedraeanthus tenuifolius (W. et K.) A. DC.
1674 Boccone – 1835 Tommasini in Bertoloni – 1877 C. P. G. – 1878 Smith.

3463' Hedraeanthus croaticus A. Kern.
1843 Koch – 1877 C. P. G. – 1882 Arcangeli. (De cospermasi l'habitat in Italia)

Wahlenbergia Schrad.

3464 Wahlenbergia nutabunda (Guss.) A. DC.
1826 Gussone – 1843 Moris
1850 Laveillé in Grenier & Godron II.

3464' Wahlenbergia hederacea Rchb.
1772 Maratti – 1855 Deakin, Fl. of Colon. Rom. (Da confermare l'habitat in Italia).

Trachelium (Tourn.) L.

3465. Trachelium caeruleum L.
1595 Pona – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1811 Tenore – 1818 Sebastiani e Mauri – In alcune località del tutto avventizio.
— β halleratum (Bianca)
1864 Bianca Nova Trach. spec. e in Todaro Fl. sic. exs. n. 88 – 1877 C. P. G.
— γ lanceolatum (Gaud.) Heyn. Clf. Wym. Corp. 1879 Nyman
1862 Gussone (1856 Huet) – 1877 C. P. G.

Laurentia (Mich.) Reck.

3466 Laurentia Michelii A. DC.
1697 Boccone – 1729 Micheli – 1834 Salij-Marschlins – 1837 Sanguinetti – 1839 Moris e De Notaris.

3467 Laurentia tenella (Biv.) A. DC.
1696 Cupani – 1697 Boccone – 1806 Bivona-Bernardi – 1827 Gussone; Moris; Tineo.

3467' Laurentia commutata Tod.
1872 Todaro, Fl. d. sem. hort. bot. Panorm. Adnot. pag. e in N. giorn. bot. it. 1873, p. 160 (specie da confermare)

Fam. 126 Compositae
Sottofam. Tubuliflorae.

Eupatorium (Tourn.) L.

3468 Eupatorium cannabinum L.
1532 Cib. – 1588 Matthioli – 1561 Anguillara 1565 C. Rivio 1615 – 1753 Alpino – 1566 Colgolani – 1585 Durante
— β syriacum (Jacq.)
1817 Freyn – 1895 Hoffmann in Hallier-Wohlf. II – 1906 Fortarin
— γ corticum (Req.)
1827 Requien in Loiseleur – 1880 Duby

Ageratum L.

3468' Ageratum caeruleum Desf.
Dell'America merid. Coltivato frequentemente fino dal Settecento.
1720 Pontedera – 1793 Zanoni – 1862 Rodati – 1812 Bonato. 1704 Mentzel

Adenostyles Cass.

3469 Adenostyles alpina (L.) B. et F.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1745 Seguier.

— β australis (Tenore)
1829 Tenore — 1844 Gussone
1789 Ucria

γ Alliariae (Gouan)
1415 Rinio 1595 Pona — 1713 Tita — 1720 Pontedera — 1822 Pollini.

— δ macrocephala (Hut. P. R.)
1877 Huter, Porta, Rigo. Cfr. Huter Herbar-Stud. p. 71.

— ε hybrida (DC.)
1827 Re, Mem. r. acad. Torino.

— ζ leucophylla (W.)
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1808 Biroli — 1898 Mari.

Cacalia L. em. DC.

3469' Cacalia sonchifolia L.
Delle Indie or. e Cina. Coltivata fino dal settecento.
1780 Farsetti — 1801 Bonato.

Homógyne Cass.

3470 Homogyne alpina (L.) Cass.
2 (1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1754
1 (1704 Martini — 1566 Calzolari — 1595 Pona

— β discolor
1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier.

3471 Homogyne silvestris (Scop.) Cass.
1853 Brignoli e Tommasini in Bertoloni IX — 1855 Pirona.

Petasites (Tourn.) Adans.

3472 Petasites fragrans (Vill.) Rchb.
1696 Cupani — 1784 Martelli e Sabbati — 1789 Ucria — 1822 Pollini — 1864 Sauardo (Spontanea nell' Italia merid.; avventizia nell' Italia sup.)

3473 Petasites officinalis Mönch.
1560 Petit Cibo — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1595 Pona 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren.

— β fallax Uechtr.
1899 Pospichal.

3474 Petasites niveus (Vill.) Baumg.
1532 Cibo — 1565 Michiel — 1723 Micheli in Tilli — 1754 Seguier — 1772 Vitman — 1806 Balbis — 1822 Pollini.

3475 Petasites albus (L.) Gaertn.
1595? Pona — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Marzari — 1805 Re

3475' Petasites tomentosus (Stroh.) DC.
1855 Brumati in Pirona (Da confermarsi).

Tussilágo (Tourn.) L.

3476 Tussilago Farfara L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1785 Allioni

Senecio (Tourn.) L.

3477. Senecio vulgaris L. R
1415 Rima 1550 Tatio Cibo — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli.
— β siculus Guss.
1844 Gussone —
— γ carnosus Posp.
1899 Pospichal

3478 Senecio lividus L.
1723 Tilli — 1820 Tenore — 1820 Moris.

3478¹ Senecio sonchoides Loj.
1902 Reina in Lojacono II
3478² Senecio aegyptius L.
(+1892) Todaro. Cfr. Lojacono II

3478³ Senecio lividus × vulgaris Loj.
1902 Citerda e Riccobono in Lojacono II.

3479 Senecio silvaticus L.
1785 Allioni — 1825 Savi — 1837 Sanguinetti — 1844 Risso.

3480 Senecio viscosus L.
1768 Turra, ed. 1780 — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re — 1807 Bivona — Bernardi.

3481 Senecio delphinifolius Vahl.
1674 Boccone — 1696 Cupani — 1819 Bertoloni — 1825 Viviani.

3482 Senecio gallicus Chaix.
1674 Boccone — 1824 Viviani — 1844 De Notaris.

3483 Senecio coronopifolius Desf.
1674 Boccone — 1844 Gussone.

3484 Senecio leucanthemifolius Poir.
1685 Trionfetti — 1696 Cupani — 1697 Boccone — 1818 Sebastiani e Mauri — 1824 Moretti — 1843 Moris.
— β pectinatus Guss.
1844 Gussone
— γ incrassatus (Guss.)
1844 Gussone
— δ Marmorae (Moris)
1828 Moris — 1834 Colla
— ε pinnatifidus Fiori
1843 Moris — 1844 Gussone.
— ζ vernus (Biv.)
1806 Bivona — Bernardi — 1844 Gussone
— η pedunculosus (DC.)
1821 Salzmann. — 1827 Moris — 1828 Duby
1850 Grenier e Godron.
— δ crassifolius (W.)
1820 Tenore
— ι Reichenbachii Fiori
1854 Stalio in Rchb. Ic. XVI — 1903 Fiori III

35/0018 - 228

— λ pygmaeus (DC.)
1844 Gussone — 1879 Duthie in Nyman

3485 Senecio nebrodensis L.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1822 Presl
— 1844 Gussone.
— β sardous Fiori.
1853 Moris in Bertoloni IX — 1866
Gennari.
— γ calabrus Fiori.
1903 Arcangeli in Fiori III
— δ rupestris (W. K.)
1563 Cesalpino — 1723 Tilli — 1818
Balbis — 1819 Bertoloni — 1822 Pollini.
— ε pinnatifidus Fiori
1903 Fiori III — 1906 Gortani.

3486 Senecio squalidus L.
1674 Boccone — 1696 Cupani — 1819
Bertoloni — 1826 Jan
— β glaber (Ucria)
1796 Ucria — 1822 Presl
— γ aetnensis (Jan)
1789 Ucria — 1807 Bivona — Bernardi —
1822 Presl — 1826 Jan.
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.

3487 Senecio abrotanifolius L.
1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785
Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

3488 Senecio Jacobaea L.
1415 Rinio Petr
1550 Cibo — 1562 Mattioli — 1566
Calzolari — 1583 Cesalpino — 1720 Ponte-
dera — 1785 Allioni — 1802 Marzari.
— β barbareifolius (Krock.)
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1806
Bertoloni — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier — 1816 Pollini.
— γ aquaticus (Huds.)
1818 Ruchinger — 1828 Fiorini —
Mazzanti — (+1849) Kellner. Cfr
Fiori III — 1855 Brumati in Pirona.

3489 Senecio erucifolius L.
1550 Petr Cibo — 1745 Séguier ~~1790 Bellardi~~ — 1816
Pollini — 1864 Sauardo
— β lycopifolius (Desf.)
1826 Jan — 1829 Tenore — 1844 Gusso-
ne.
— γ tenuifolius (Jacq.)
1822 Pollini — 1790 Bellardi — 1904
Goiran.
— δ praealtus (Bert.)
1718 Pontedera — 1818 Moretti — 1819
Bertoloni — 1864 Sauardo.

3490 Senecio Cineraria DC.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1785
Allioni — 1789 Ucria — 1804 Berto-
loni; Savi.
— β bicolor (Tod.)
1834 Colla — 1835 Tenore — 1844 Gusso-
ne.

— γ gibbosus (DC.)
(+1711) Cupani, ed 1716 — 1789 Uaria
— 1821 Gussone — 1835 Tenore.
— δ ambiguus (DC.)
1789 Uaria — 1815 Bivona — Bernardi — 1844 Gussone.
— ε nebrodensis (Guss.)
1821 Gussone — 1822 Presl; Bertoloni

3490[1] Senecio neapolitanus Evers
(S. Cineraria × Jacobaea β b)
2 (1893 Evers, Oest. bot. Zeitschr. —
1 (1839 Moris e De Notaris

3490[2] Senecio Jacobaea β b × Cineraria Fiori
(+1870) Orsini in herb. Flor. Ent. Cf. Fiori III.

3490[3] Senecio incanus × abrotanifolius Sieg.
1890 Siegfried in Franzoni.

3490[4] Senecio lyratifolius Rchb.
(S. alpinus × erucifolius)
1844 Cesati — 1879 C. P. G.

3491 Senecio incanus L.
1697 Bocone — 1785 Allioni — 1805 Re — 1822 Zantedeschi in Pollini
— β carniolicus (W.)
1851 Ambrosi, Boni, Perini, Facchini in Hausmann I — 1853 Rota — 1906 Gortani.

— γ italicus Pers.
1807 Persoon Syn. plant. II — 1844 De Notaris — 1853 Di Negro in Bertoloni IX.

3492 Senecio uniflorus All.
1772 Allioni — 1805 Re — 1853 Rota — 1857 Zersi.

3493 Senecio paludosus L.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.

3494 Senecio Doria L.
1550 Petr. Cibo — 1563 Cesalpino — 1595 ? Pona — 1785 Allioni — 1802 Suffren

3495 Senecio nemorensis L.
1550 Petr. Cibo — 1595 Pona — 1713 Tita — 1745 Séguier
1802 Marzari; Suffren.
— β Fuchsii (Gmel.)
1563 Cesalpino — 1769 Agosti (+1852) Facchini in Ambrosi 1857, II — 1904 Goiran
2 — δ Cacaliaster (Lam.)
1802 Suffren — 1818 Sebastiani e Mauri — 1826 Gussone.
1 — γ fluviatilis (Wallr.)
1899 Pospichal

3496 Senecio Doronicum L.
1707 Martini — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1805 Re — 1816 Pollini.

— β apenninus (Tausch)
1830 Tenore —
— γ tomentosus DC.
1854 Reichenbach Icon. fl. germ. XVI.
— δ pseudoarachnoideus Fiori.
1903 Fiori III.
— ε arachnoideus (Sieb.)
(+1673) Barrelier, ed 1714 — 1811 Tenore — 1856 Huet. Cfr. Nym. Consp.

3497 Senecio alpinus (L.) Scop.
1532 Cibo — 1595 Porta — 1697 Boccone — 1707 Martini — 1720 Pontedera — 1816 Pollini.
— β appendiculatus Sacc.
1830 Tenore — 1903 Sacardo in Fiori — 1904 Goiran — 1906 Gortani.
— γ Samnitum (Huet)
1830 Tenore — 1889 N. Terracciano.
— δ glabratus Ten
1830 Tenore.

3498 Senecio alpester (Hoppe) DC.
Il tipo non sembra constatato in Italia.
— β ovirensis (Koch)
1831 N. T. Host — 1903 Fiori III.
— γ pappotus (Less.)
1899 Pospichal — 1869 Visiani e Sacardo
— δ crispatus (DC.)
1899 Pospichal — 1906 Gortani.
— ε pseudocrispus Fiori
1855 Pirona — 1906 Gortani

— ζ Gaudini (Gremli)
1595 Porta — (+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1697 Boccone — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1822 Pollini.
— η brachychaetus (DC.)
(+1849) Cernagai. Cfr. Gortani II — 1853 Bertoloni fil., Tommasini, Amidei ecc. in Bertoloni IX — 1904 Goiran — 1906 Gortani.
— δ Balbisianus (DC.)
1550 Cibo — 1785 Allioni — 1844 De Notaris.

3499 Senecio campester (Retz) DC.
1844 De Notaris; Cesati — 1853 Rota; Malinverni in Bertoloni IX (1851 Boni in Hausmann I.
— β aurantiacus (Hoppe)
1785 Allioni — 1808 Biroli — 1844 De Notaris — 1848 Comolli — 1853 Rota.

3499¹ Senecio cruentus (L'Her.) DC.
Delle isole Canarie. Coltivato fino dal primo quarto dell' ottocento.
1815 Biroli — 1818 Spigno — 1820 Bonato — 1829 Piccioli.

3499² Senecio mikanioides Otto
Del Capo di Buona Speranza. Naturalizzato nel Nizzardo
1899 Sauvaigo.

3499³ Senecio ficoides (L.) Sch. Bip.
Del Capo di Buona Speranza. Coltivato fino dal settecento e naturalizzato nelle isole Eolie.
1780 Farsetti – 1789 Ucria – 1801 Bonato – Naturalizzato: (+1856) Tineo dall' erb. Mandralisca. Cfr. Nyman Suppl. II (1889) – 1878 Lojacono

Doronicum L.

3500 Doronicum austriacum Jacq.
1595 Pona – 1551 Al, Dorandi – 1707 Martini – 1745 Séguier – 1789 Allioni – 1822 Pollini

3501 Doronicum plantagineum L.
1849 Zumaglini – 1898 Mari.
– β Lobelii Tenore
1830 Tenore – 1903 Fiori III.

3502 Doronicum Pardalianches L.
1554 Mattioli – 1585 Durante – 1532 Cibo 1785 Allioni – 1805 Re – 1821 Nocca e Balbis – 1837 Sandi

3503 Doronicum caucasicum M. B.
1691 Boccone – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1835 Gussone in Tenore.

3504 Doronicum Columnae Ten.
1550 Cibo – 1606 Colonna – 1773 Vitman – 1816 Tenore, Giorn. encicl. Napoli. – 1819 Bertoloni.

– β cordifolium (Sternb.) 1745 Séguier 1532 Cibo – 1565 Mattioli – 1816 Pollini –

3505 Doronicum grandiflorum Lam.
1565 Mattioli – 1726 Zannichelli – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1805 Re.
– γ glaciale (Wulf.)
1816 Pollini – 1853 Ambrosi, Montini
1707 Martini Brignoli, Pestalozza in Bertoloni IX

3506 Dononicum corsicum (Lois.) Poir.
1806 Loiseleur – 1834 Salis-Marschlins – 1853 Viviani, Gussone, Requien Soleirol in Bertoloni IX.

3505¹ Doronicum Portae Chab.
1906 Porta in Chabert Bull. soc. bot. Franc., 1906, p. 547.

Árnica L.

3507 Arnica montana L.
1558 Mattioli – 1585 Durante
1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

Bellis (Tourn.) L.

3508 Bellis annua L.
1685 Trionfetti – 1696 Cupani – 1697 Boccone – 1729 Micheli.

35/0018 - 230

3509 Bellis perennis L. R
1532 Cibo – 1558 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier –
— β Bernardi (Boiss. et R.)
1852 Bernard in Boiss. et Heldr
Pugill. pl. nov. – 1879 C. P. G.
— γ hybrida (Tenore)
1550 Cibo – 1830 Tenore – 1832 Bertoloni – 1844 Gussone
— δ margaritifolia (Hut. P. R.)
1879 Hut. Porta e Rigo in Porta.
1904 Micheletti. N. giorn. bot. ital.
1906 p. 331. (Cfr. Fiori in)

3510 Bellis silvestris Cirillo
1551 Aldrovandi – 1562 Mattioli – 1735 Micheli – 1789 Ucria – 1792 Cirillo.

Bellium L.

3511 Bellium minutum L.
1882 Ajuti in Arcangeli.

3512 Bellium bellidioides L.
1699 Bouvne – 1804 Viviani – 1806 Loiseleur – 1825 Requien.

3513 Bellium crassifolium Moris
1827 Moris – 1834 Colla.

Bellidiastrum Cass.

3514 Bellidiastrum Michelii Cass.
1729 Micheli – 1745 Séguier – 1773 Vitman – 1802 Marzari; Suffren.

Agathea Cass.

3514' Agathea amelloides (L.) DC
Del Capo. Coltivata comunemente fino dalla fine del settecento.
1780 Farsetti – 1793 Zuccagni – 1801 Bonato.

Aster (Tourn.) L.

3515 Aster alpinus L.
1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1806 Sternberg.
— β Garibaldii (Bruegg.)
1878 Anzi in C. P. G. – 1898 Mari.

3516 Aster amellus L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1566 Calzolari – 1720 Pontedera – 1745 Séguier – 1816 Pollini

3517 Aster Novi-Belgii L.
Originario dell'America sett. Coltivato e perfettamente naturalizzato fino dal settecento in molti luoghi d'Italia.
1701 Martini
1713 Tita – 1754 Séguier – 1760 Allioni – 1822 Pollini – 1827 Martens in Naccari IV – 1864 Savardo
(= Aster salignus Auct. ital.)

— β corigatus (Lam.)
1853 Rota — 1903 E. Ferrari in Fiori III.

3519' Aster Novae-Angliae Art.
Dell' America bor. Coltivato spesso fino dal Settecento e talora avventizio.
1713 Tita — 1719 Pontedera — 1760 Allioni — 1780 Farsetti — Avventizio: — 1864 Saccardo / Aster Novi-Belgii)

3518 Aster salicifolius Scholl.
Dell' America bor. Coltivato fino dal Settecento e talora inselvatichito
1793 Zannoni — 1801 Bonato — Avventizio: 1903 Beccari in Fiori III.
1904 Goiran.

3519 Aster Tradescanti L.
Dell' America bor. Coltivato dal Settecento e talora avventizio nel Canton Ticino.
1760 Allioni — 1780 Farsetti — 1793 Zannoni — 1801 Bonato — Avventizio: 1890 Mari, Schneider, Favrat in Franzoni.

3520 II Aster Tripolium L.
(1551 ad Orsini II)
1583 Cesalpino — 1631 Donati — 1726 Zannichelli — 1760 Valle — 1785 Allioni.

3520' Aster Sorrentinii Lojac.
1857 Todaro in Ind. sem. horti Panorm.
1902 Lojacono II — 1907 Fiori IV.

3521 — Aster acer L.
1537 Cibo — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1862 Facchinelli — 1864 De Notaris.

3522 Aster Linosyris (L.) Bernh.
(1551 ad Orsini II) (1598 Pona)
1550 Cibo — 1565 Cesalpino — 1606 Colonna — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
— β paludosus (Savi)
1818 Savi — 1853 Fiorini-Mazzanti in Bertoloni IX
— γ anacamptophyllus (Ambrosi)
(+1852) Facchini in Ambrosi 1857.

3522' Aster Linosyris L.
Della Cina e Giappone. Coltivato fino dal Settecento e talora avventizio presso i giardini.
1760 Allioni — 1756 Manetti, Orid. florentin. — 1796 Jussieu — 1801 Bonato avventizio: 1864 Saccardo.

Solidago L.

3523 Solidago canadensis L.
Dell' America bor. Coltivata fino dal Settecento e talora avventizia.
1713 Tita — 1760 Allioni — 1793 Zannoni 1801 Bonato — Avventizia: 1864 Saccardo. 1904 Goiran

35/0018 - 231

3524 Solidago serótina Ait.
Dell' America sett. Coltivata fino dal principio dell' ottocento e qua e là naturalizzata.
1812 Spigno – 1815 Biroli – 1842 Visiani – Naturalizzata: 1882 Arcangeli – 1890 Goiran, Bull. Soc. bot. ital. – 1894 Cavara, Malpighia VIII p. 95 – 1895 Fiori, Malpighia IX p. 121 – 1895 E. De Toni Not. Flor. Friul. IV p. 16. – 1904 [illegible]

3525 Solidago Virgaurea L.
1532 Cibo (1551 al Brovardo) – 1561 Anguillara – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante 1726 Zannichelli
— β pygmaea (Bert.)
1697 Boccone – 1826 Jan – 1842 Puccinelli – 1844 Bertoloni fil.
— γ alpestris (W. K.)
1822 Pollini. Cfr. Goiran 1904 – (+1886) Franzoni, ed. 1890 – 1903 Gelmi
— δ minuta (L.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1853 Molineri, Balbis in Bertoloni IX.
— ε litoralis (Savi)
1804 Savi – 1842 Puccinelli – 1844 De Notaris
1723 Micheli in Tilli

Erigeron L.

3526 Erigeron crispus Pourr.
1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri – 1825 Savi – 1826 Presl – 1839 Moris e De Notaris

3527 Erigeron canadensis L.
Dell' America settentr. Coltivato dalla prima metà del seicento, presto si diffuse ovunque
1644 Vestingio (Virga aurea indica seu virginiana) – 1675 Zanoni – 1674 Boccone – 1726 Zannichelli
Naturalizzato: 1720 Pontedera – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari (*)
(= Stenactis bellidiflora A. Br.)

3528 Erigeron annuus (L.) Pers.
Dell' America sett. Coltivato fino dal principio del settecento, sulla fine del quale secolo era già naturalizzato diffusamente.
1701 Martini
1717 Pontedera Cat. pl. Hort. Pat. MS. – 1760 Allioni – Naturalizzato: 1768 Turra ed. 1780 – 1802 Suffren – 1816 Pollini – 1818 Ruchinger; Balbis

3529 Erigeron Karwinskyanus DC.
Originario del Messico
Il tipo non fu ancora trovato avventizio fra noi e non risulta coltivato.
— β mucronatus (DC.)
Coltivato da circa un trentennio e ora quasi naturalizzato in molte parti d' Italia.
1896 A. Metz – 1899 W. Retzdorff
1898 Micheletti – 1900 Mazza. Cfr. Micheletti N. giorn. bot. ital. 1901 p. 189

(*) G. B. Scarella in Galleria di Minerva di Venezia, VII parte X (1713) scrive che la Virga aurea virginiana da parecchi anni prima d'allora, si era diffusa per 14 o 20 miglia intorno all' orto bot. di Padova e tanto copiosamente da diventare una "molesta paesana"
φ, stupito,

3530 Erigeron acer L.

1550 Cibo – 1551 alibi Saltuto – 1565 Cesalpino – 1595 Pona – 1606 Colonna – 1726 Zanoni – Micheli – 1745 Seguier

– β droebachensis (O. F. Muell.)

1875 Favre – 1882 Arcangeli ; Pagot 1851 Hausmann I – 1906 Gortani

3530 Erigeron Heidelbergensis Wilkke (+1877) De Notaris ex Chiovenda (E. acer × canadensis) fr. Fiori IV.

3531 Erigeron alpinus L.

1532 Cibo – 1607 Martinis – 1745 Seguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini.

– γ Steirophyllus Fiori 1906 Gortani

1903 Fiori III (sotto specie raccolta ai piani cuoghi da molti autori, ma considerata come E. uniflorus)

– δ intermedius Schleich.

(E. acer × alpinus ?)

(+1886) Franzoni, ed. 1870)

– ε atticus Vill.

1791 Bellardi – 1808 Allioni – 1822 Treviranus e Pollini in Pollini III.

– ζ Schleicheri (Gremli)

(+1894) Gravesi, E. Fenarari, Gaudin fr. Fiori in Fiori III.

– η glebatus (Hoppe)

1851 Heufler in Hausmann – 1864 Cesati 1883 Rota – 1880 Savardo

– θ uniflorus (L.)

1707 Martini – 1785 Allioni – 1808 Arioli – 1906 Gortani

– ι neglectus Kern.

1872 Kerner, Bericht d. nat.-med. Ver. Innsbruck – 1903 Rouy VIII

3530² Erigeron Christii J. O. Wolff (E. uniflorus × Schleicheri)

1904 Chenevard.

3530³ Erigeron rhaeticus Brügg. (E. alpinus × uniflorus)

1880 Brueggen, Jahresb. Naturforsch. Gesell. Graub. – 1904 Chenevard.

Dichrocephala DC.

3532 Dichrocephala latifolia (Lam) DC.

Originaria dell'Asia media ed Africa trop. ed austr. Coltivata, dopo l'epoca dell'ottocento ed ora qua e là avventizia nel Padovano.

1850 Vitman Cat. sem. horti Pat. – Avventizia ; 1869 Vitman e Savardo 1895 Ugolini in Fiori, Saltypkie IX.

Matricaria (Tourn.) L.

3533 Matricaria aurea (L.) Boiss.

1872 Duthie – 1882 Sommier in Arcangeli.

3534 Matricaria Chamomilla L. R

1515 Rinio 1550 Cibo – 1554 Matthioli – 1561 Anguillara – 1565 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona

35/0018 - 232

3535 Matricaria inodora L.
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli — 1821 Nocca e Balbis

3535' Matricaria discoidea DC.
Dell'America bor.-occid. e Asia or. Coltivata da prima della metà dell'Ottocento, ma di rado
1842 Viviani — Avventizia: 1896 Marchesetti

Chrysanthemum (Tourn.) L.
3536 Chrysanthemum Mycorus L.
1563 Cesalpino — 1798 Savi — 1785 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri.
— β hybridum (Guss.)
1789 Ucria — 1821 Gussone — 1826 Presl — 1843 Moris.

3537. Chrysanthemum segetum L. R
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria.

3538 Chrysanthemum coronarium L.
1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1558 Michiel — 1785 Allioni — 1822 Pollini (Nell'Italia sett. soltanto avventizio)

3539 Chrysanthemum flosculosum L.
(+1617) Alpino, ed 1627 — 1821 Salzmann in Flora — 1824 Viviani — 1834 Salis-Marschlins

3540 Chrysanthemum discoideum All.
1757 Allioni — 1844 De Notaris; Risso — 1834 Colla.

3541 Chrysanthemum Leucanthemum L.
1550 Petr. Cibo — 1562 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1566 Calzolari — 1720 Pontedera.
— β amplifolium Fiori
(+1876) Venzo in Fiori III — 1903 E. Ferrari in Fiori III.
— γ maximum (Ram.)
Cfr. Fiori III (Da ricercarsi)
— δ pallens (Gay)
1415 Rino 1867 Ardoino — 1896 Bicknell
— ε laciniatum (H. P. R.)
1877 Huter, Porta, Rigo in Rigo — Cfr Huter Herbar-Studien.
— ζ latifolium (W.)
1831 Tenore — 1878 Nyman, Consp.
— η heterophyllum (W.)
1785 Allioni — 1806 Balbis.
— δ montanum (L.)
1713 Tita — 1745 Séguier — 1785 Allioni

3542 Chrysanthemum ceratophylloides All.
1785 Allioni — 1832 Bertoloni — 1834 Colla — 1844 De Notaris
— β tridactylites (Kern. et Hut.)
1820 Tenore — 1826 Gussone

(R.

— γ tenuifolium (Ten.)
1820 Tenore — 1826 Gussone
— δ coronopifolium (Vill.)
1785 Allioni — 1867 Ardoino — (+1886)
Franzoni, ed. 1890 — 1894 Rodegher
e Venanzi.

3543 Chrysanthemum alpinum L.
1532 Cibo — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re
1808 Biroli — 1822 Pollini
— β minimum (Vill.)
1844 D. Notaris — 1848 Comolli
— γ tomentosum (Lois.)
1806 Loiseleur — 1834 Salis-Marschlins — 1850 Grenier e Godron
Soleirol in

3544 Chrysanthemum Balsamita L.
Dell'Asia occid. Raramente coltivato.
— β tanacetoides Boiss.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1563
Cesalpino — 1585 Durante.

3545 Chrysanthemum indicum L.
Della Cina e Giappone. Coltivato
comunemente dalla fine del sette
cento e talora inselvatichito.
1797 Scannagatta Cat Hort. Ticin. —
1796 Secco Suardi Hort. Luran. Bergom. — 1798
Fasselti — 1801 Bonato
— β sinense (Sabine)
Come il precedente
— γ rusticanum Goivan
1904 Goivan (talora inselvatichito)

3546 Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh.
1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli
1563 Cesalpino — 1585 Durante.

3547 Chrysanthemum corymbosum L.
1554? Mattioli — (+1673) Barrelier, ed
1714 — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier
1785 Allioni — 1802 Marzan
— β achilleae (L.)
1551 Aldrovandi II 1729 Micheli — 1785 Allioni — 1798 Savi — 1804 Bertoloni

3547' Chrysanthemum cinerariifolium (Trev.) Vis.
1899 Heimerl in Oest. bot. Zeitschr.
1905 Untchy in Fl. ital. exs. n. 179. ed
in N. giorn. bot. ital.

3548 Chrysanthemum macrophyllum W. K.
1854 Noé in Reichenb. Ic. XVI —
1879 C. P. G.

3549 Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
1415 Rinio 1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1720 Pontedera
— β siculum (Guss.)
1826 Presl — 1844 Gussone
— γ Audiberti (Req.)
1825 Requien — 1827 Moris — 1834
Salis-Marschlins

3549' Chrysanthemum annuum (L.) fiori
Dell'Africa bor. occid. e dell'Europa
occid. merid.
1785 Allioni — 1867 Ardoino (Avventizio?)

35/0018-233

Nonánthea DC

3550 Nonanthea perpusilla (Lois.) DC.
1810 Loiseleur – 1830 Duby – 1834 Salis – Marschlins – 1843 Moris

Artemisia (Tourn.) L.

3551 Artemisia camphorata Vill.
1415 Rinio 1550 Petro Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1816 Pollini.
— β saxatilis (W. et K.)
1835 Tenore – 1878 Todaro Pl. sic. exs. n. 1478.
— γ alba (Turra)
2 (1768 Turra, ed. 1780 – 1802 Marzari –
1 (1566 Calzolari – 1595 Pona – 1745 Séguier

3552. Artemisia arborescens L.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl – 1827 Zerapha.

3553. Artemisia Absinthium L. R
1550 Petro Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante (spesso coltivata e avventizia)

3554. Artemisia glacialis L.
1755 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Pollini –
x 1837 Sandi – 1853 Rota.
— β Mutellina (Vill.)
1595 Pona – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Cristofoli in Pollini.

— γ nitida (Bert.)
1773 Vitman – 1832 Bertoloni – 1842 Puccinelli.

3555 Artemisia Genipi Weber
1697 Bouone – 1755 Allioni – 1808 Biroli – (1806 Sternberg –
— β petrosa (Jan)
1829 Tenore – 1826 Jan – 1867 Ardoino

3556 Artemisia pedemontana Balb.
1810 Balbis – 1834 Colla – 1853 Bertero in Bertoloni IX

3557 Artemisia vulgaris L.
1415 Rinio x 1550 Petro Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1745 Séguier

3558 Artemisia pontica L.
Dell'Europa mer. orient. e Caucaso coltivata fino dal quattrocento e talora avventizia in Piemonte.
1415 Rinio 1551 Aldrovandi – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1849 Zumaglini.
Avventizia.

3559 Artemisia Abrótanum L. R
Originaria probabilmente di Spagna. Coltivata dal cinquecento e talora qua e là ~~avventizia~~ naturalizzata.
1554 Mattioli – Q 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1851 Eschenlohr in Hausmann – 1877 Freyn.
Q Naturalizzata:

3560 Artemisia atrata Lam.
1755 Allioni – 1808 Biroli – 1853 Tommasini in Bertoloni IX.

3561 Artemisia chamaemelifolia Vill.
1757 Allioni – 1834 Colla – 1853 Moggi in Bertoloni IX.

3562 Artemisia annua L.
Originaria dell'Europa orient. e Asia occid. Coltivata dal settecento in Cina e talora avventizia
1772 Allioni – 1798 Fasetti – 1801 Donato – Avventizia: 1897 Chiovenda – 1903 Matteri in Fiori III.

3563 Artemisia Dracunculus L.
1550 Gibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Matthioli – 1563 Cesalpino – 1822 Pollini
Originaria della Russia or. e Asia bor. Coltivata dal cinquecento e talora qua e là subspontanea

3564 Artemisia borealis Pallas.
Il tipo è proprio delle regioni artiche.
– β nana (Gaud.)
1785 Allioni – 1842 Facchini. Cfr. Ambrosi 1857 – 1851 Hausmann – 1854 Huguenin in Rchb. Ic. XVI

3565 Artemisia campestris L.
1554 Matthioli – 1585 Durante – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1785 Allioni – 1802 Magrini; Suffren.
– β variabilis (Ten.)
1664 Ray, ed 1694 – (+1711) Cupani ed 1713 – 1789 Moris – 1830 Tenore

3566 Artemisia caerulescens L.
1550 Gibo – 1563 Cesalpino – 1606 Colonna – 1651 Donati – 1726 Zannichelli.
– β palmata (Lam.)
1853 Barbieri e Dalla Agata in Bertoloni IX.
– γ cretacea Fiori
1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino – 1735 Micheli – 1818 Sebastiani e Mauri
– δ densiflora (Viv.)
1830 Viviani – 1834 Sabi-Marschlins

3567 Artemisia valesiaca All.
1785 Allioni – 1834 Colla – 1853 Balbis, Moggi in Bertoloni IX.

3568 Artemisia scoparia W. K.
Nativa dell'Europa media or. e Asia media. Coltivata dal principio dell'ottocento e qua e là avventizia
1815 Biroli – 1827 Tineo – Avventizia: 1852 Pollerini – 1897 Perugia.

Anthemis L.

3568 Anthemis mixta L.
(+1711) Cupani, ed 1713 – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.

3569 Anthemis Cotula L.
1415 Rinio
1585 Durante – 1697 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

3570 Anthemis fuscata Brot.
(+1711) Cupani, ed. 1713 – 1785 Allioni – 1806 Loiseleur – 1807 Bivona – Bernardi – 1824 Re.

3571 Anthemis chia L.
1826 Gussone – 1902 Borzì in Lojacono III.

3572 Anthemis peregrina L.
1820 Tenore – 1844 Gussone
– β Guicciardii (Heldr. et Sart.)
1877 Hater, Porta e Rigo, Exsicc. n. 232 e in Rigo.

3573 Anthemis arvensis L.
1532 Cibo – 1697 Cupani – 1726 Zannichelli – 1729 Micheli – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Manzari.
– β cotiformis Fiori.
1887 Groves – 1903 Fiori III.
– γ incrassata (Lois.)
1810 Loiseleur – 1844 De Notaris; Gussone
1640 Castelli –

– δ clavata (Guss.)
1844 Gussone – 1889 N. Terracciano
– ε sphacelata (Presl)
(+1711) Cupani, ed 1713 – 1822 Presl – 1844 Gussone.

3573' Anthemis brevifolia Lojac.
1902 Todaro in Lojacono III

3574 Anthemis secundiramea Biv.
1807 Bivona – Bernardi – 1826 Gussone
– β intermedia (Guss.)
1844 Gussone – 1855 Huet. Cfr. Nyman Conspect.
– γ Urvilleana DC.
1822 Dumont d'Urville, Enumer. pl. Archipel. Parisiis.

3574' Anthemis concolor Lojac.
(+1856) Tineo in Lojacono III.

3575 Anthemis muricata Guss.
1789 Ucria – 1844 Gussone.

3576 Anthemis cretica (L.) Nym.
1844 Gussone – 1853 Soleirol in Bertoloni IX

3577 Anthemis nobilis L.
1586 Mattioli – Camerarius De plant. epit. – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1820 Moricand –

3578 Anthemis alpina L.
1723 Micheli in Tilli — 1754 Séguier
1822 Pollini — 1837 Sandi — 1844 Cesati

3579 Anthemis mucronulata Bert.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1819 Bertoloni — 1826 Gussone — 1830 Orsini.
— β Barrelieri (Ten.)
1561 Anguillara — (+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1729 Micheli — 1820 Tenore — 1826 Gussone.

3580 Anthemis montana L.
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1830 Orsini — 1837 Sandi.
(1592 Colonna)
— β Columnae Ten.
1592 Colonna — 1820 Tenore
— γ aetnensis (Schouw)
1826 Schouw in Spreng. Syst. veg. III — 1844 Gussone.
— δ petraea (Ten.)
1820 Tenore — 1826 Gussone.
— ε flosculosa DC.
1844 Gussone — 1882 Arcangeli
— ζ alpina (L.)
1729 Micheli — 1826 Gussone — 1830 Tenore.

3581 Anthemis punctata Vahl.
1844 Gussone — 1902 Lojacono III
— β incana Guss.
1696 Cupani — 1844 Gussone.

3582 Anthemis hydruntina Groves
1887 Groves — 1894 Arcangeli.
— β silensis Fiori
1900 Fiori, N. giorn. bot. ital.

3583 Anthemis maritima L.
1696 Cupani — 1723 Micheli in Tilli — 1757 Allioni — 1818 Sebastiani e Mauri
— β incana Guss.
1842 Gussone — 1883 Nicotra, Prodr. flor. Mess.

3583' Anthemis aeolica Lojac.
1902 Lojacono III

3584 Anthemis Cota L.
1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1798 Savi.

3585 Anthemis brachycentros J. Gay
1651 Bahuin et Charles II — 1820 Tenore — 1844 Gussone — 1855 Brumati in Pirona — 1896 Marchesetti.

3586 Anthemis austriaca Jacq.
1628 Boccone 1843 Koch — 1855 Pirona — 1897 Penzig (arventizia)

3587 Anthemis Triumfetti (L.) DC
1685 Triumfetti — (+1673) Barrelier, ed. 1714 — 1696 Cupani — 1785 Allioni — (+1849) Kellner in Reichenbach, Icon. fl. Germ. XVI.

35/0018-235

— β discoidea (W.)
1785 Allioni — 1831 Tenore — 1903 Fiori III.
— γ villosa Fiori
(+1891) Groves; Pasquale; Huter in Fiori III.
— δ rigescens (W.)
1854 Tommasini in Reichenbach, Ic. XVI

3587' Anthemis Palumbi Lojac.
(+1892) Todaro in Lojacono 1902 III.

3588 Anthemis tinctoria L. R
1550 Petr Cibo — 1554 Mattioli 1565 Michiel 1585 Durante — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1822 Pollini.
— β discoidea (S. et S.)
1831 Tenore — 1882 Arcangeli

3588' Anthemis palaestina Rent
Nativa di Palestina e Rodi: Avventizia in Liguria
1897 Penzig.

3588² Anthemis ruthenica M. B.
1853 Rota — 1871 Zersi (Specie da confermare)

Anacyclus L.

3589 Anacyclus radiatus Lois.
1785 Allioni — 1804 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1830 Tenore — 1850 Grenier e Godron.

— β discoideus Chior.
1897 Chiovenda.

3590 Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
1834 Salis-Marschlins — 1879 C. P. G.
— β tomentosus (DC.)
1785 Allioni — 1696 Cupani — 1807 Bivona² — Bernardi — 1844 Gussone.
— γ discoideus Guss.
1844 Gussone.

3590' Anacyclus valentinus L.
1831 Tenore — 1853 Gherardi e Balbis in Bertoloni IX (Da confermarsi)

3590² Anacyclus pedunculatus Pers.
1844 Viviani in De Notaris — 1868 Debeaux (Avventizio?)

Achilléa L.

3591 Achillea macrophylla L.
1685 Trionfetti — 1697 Boccone — 1742 Zanoni — Monti — 1785 Allioni — 1797 Host — 1822 Zantedeschi in Pollini.

3591' Achillea obscura Nees
(A. macrophylla × moschata)
1854 Reichenbach f. Ic. fl. germ. XVI
1895 Weiss in Hallier-Wohlf. II.

3591² Achillea Thomasiana Hall. f.
(A. macrophylla × atrata)
1905 Chenevard e Braun.

3591³ Achillea Dumasiana Vatke
(A. macrophylla × Clavenae)
1872 Vatke, Oest. bot. Zeitschr.

3592 Achillea Clavénae L.
1595 Pona – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1816 Pollini
1609 N. Chiavena Hist. abs. umbell.
— β intercedens Heimerl
2 (1903 Fiori III – 1904 Goiran – 1906 Gortani.
1 (1895 Weiss in Hallier-Wohlf. II
— γ capitata (W.)
1903 Fiori III – 1906 Gortani
— δ glaberrima Avé-Lall.
1857 Facchini in Ambrosi II – 1893 Gelmi.

3593 Achillea nana L.
1532 Cibo – 1697 Boccone – 1755 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli – 1822 Schouw in Pollini – 1904 Goiran.

3593¹ Achillea Laggeri Sch.-Bip.
(A. atrata × nana)
1895 Weiss in Hallier-Wohlf. II.

3593² Achillea intermedia Schleich.
(A. moschata × nana)
1890 Rossi – 1895 Weiss in Hallier-Wohlf. II.

3593³ Achillea graja Beyer
(A. Morisiana × nana)
1890 Beyer, Verh. bot. Verein. Brandenb.

3594 Achillea atrata L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini – 1837 Sandi
1726 Zannichelli
1713 Tita

3594¹ Achillea Kraetkliana Bruegg.
(A. atrata × moschata)
1895 Weiss in Hallier-Wohlf. II

3595 Achillea moschata Wulf.
1595 Pona – 1785 Allioni – 1786 Scopoli – 1808 Biroli – 1822 Pollini
— β calcarea Hut. Porta, Rigo
1830 Tenore – 1879 Hut. Porta, Rigo in Porta.
— γ Haussknechtiana (Asch.)
1903 L. Vaccari in Fiori III.

3596 Achillea Herba-rota L.
1666 Ambrosini – 1755 Allioni – 1805 Re – 1867 Ardoino.
— β Morisiana (Rchb.)
1854 Moris in Reichenbach f. Ic. fl. germ. XVI.
— γ rupestris Hut. Porta, Rigo
1879 Huter, Porta, Rigo Exs. e in Porta

3597 Achillea Ptarmica L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1566? Calzolari – 1585 Durante – 1697 Boccone – 1785 Allioni – 1844 Cesati – 1853 Rota.

3597' Achillea alpina Koch
(A. Ptarmica × macrophylla)
(+1859) Thomas. Cfr Gremli; Fl. anal. Suiss. e Weiss in Hallier-Wohlf II.

3598 Achillea Ageratum L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1797 Host. (*)

3600 Achillea tomentosa L.
1565 Mattioli – 1585 Durante – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari – 1819 Bertoloni.

3601 Achillea Millefolium L.
1415 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli.
— β collina (Becker)
1853 Rota – 1899 Pospichal – 1903 Fiori III – 1906 Gortani
— γ sudetica (Opiz)
1853 Rota – 1904 Goiran.
— δ setacea (W. K.)
1550 Petr. Cibo – 1853 Rota; Orsini in Bertoloni IX
— ε stricta (Schleich.)
1822 Pollini – 1899 Pospichal
— ζ compacta (Lam.)
1844 Cesati – 1904 Goiran.
— η tanacetifolia (All.)
1550 Petr. Cibo – 1554 Mattioli – 1785 Allioni – 1821 Nova e Balbis.
— ϑ dentifera (DC.)
1785 Allioni – 1896 Bicknell – 1906 Gortani.

3602 Achillea nobilis L.
1551 Aldrovandi II 1566 Calzolari – 1595 Pona – 1697 Boccone – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1816 Pollini.
— β odorata (L.)
1867 Ardoino – 1899 Pospichal.
— γ paucidentata Ambrosi.
1855 Brumati in Pirona – 1857 Ambrosi II – 1906 Gortani
— δ punctata (Ten.)
1820 Tenore – 1830 Orsini – 1899 Pospichal.

3603 Achillea ligustica All.
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1772 Allioni – 1814 Refinesque – 1899 Pospichal
— β silvatica (Ten.)
1835 Tenore – 1899 Pospichal
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.

Note
*) Il N° 3599 manca nella Flora analitica.

3603' Achillea filipendulina Lam.
Originaria della regione Caspica e Caucasica. Coltivata fino dal principio dell'ottocento e di rado, pare, avventizia nel mezzodì.
1802 Zuccagni – 1815 Biroli – 1827 Tineo – Avventizia:
1820 Rosano in Tenore.

Santolina (Tourn.) L.

3604 Santolina Chamaecyparissus L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1606 Colonna – 1785 Allioni
— β pectinata (Berth.)
(+1711) Cupani, ed 1713 – 1835 Tenore – 1842 Puccinelli – 1844 Gussone
— γ pinnata (Viv.)
2 (1802 Viviani – 1819 Bertoloni – 2
1 (1735 Micheli – 1742 Zanoni – Monti.

Lonas Adans.

3605 Lonas inodora Gaertn.
1696 Cupani – 1834 Colla – 1844 Gussone – 1879 C. P. G.

Diotis Desf.

3606 Diotis maritima (L.) Sm.
1565 Mattioli (Graphal.) – 1789 Ucria – 1804 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri
1551 Aldrovandi II

Micropus L.

3607 Micropus erectus L.
1785 Allioni – 1821 Nocca e Balbis – 1826 Gussone – 1835 Tenore – 1844 De Notaris.

— β bombycinus (Lag.)
1844 De Notaris – 1852 Rota – 1882 Arcangeli:

3608 Micropus supinus L.
1785 Allioni – 1834 Colla – 1844 Risso – 1853 Balbis, Savi in Bertoloni IX

Evax Gaertn.

3609 Evax pygmaea (L.) Pers.
1671 Bocone – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1872 Marsilly,
— β asteriniflora (Pers.)
1818 Sebastiani e Mauri; Savi – 1835 Tenore – 1843 Moris.

3610 Evax rotundata Moris.
1841 Moris in Atti III Riun. Sc. ital.
1850 Clément in Grenier e Godron II – 1872 Marsilly.

4 3612 Evax exigua (Sibth.) D.C.
1842 Parlatore – 1844 Gussone.

1 3609' Evax carpetana Lange
1902 Lojacono II.

3611 Evax discolor (Guss.) D.C.
1842 Parlatore – 1853 Gussone in Bertoloni IX.

Filago L.

35/0018 - 237

3613 Filago germanica L.
1415 Rino
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Marzari; Suffren.
— β eriocephala (Guss.)
1826 Gussone – 1828 Duby.
— γ spathulata (Presl)
1822 Presl – 1842 Parlatore – 1844 De Notaris; Gussone
— δ prostrata (Parl.)
1841 Parlatore – 1844 Gussone
— ε Gussonei (Lojac.)
1844 Gussone – 1884 Lojacono

3613' Filago cuneata Lojac.
1902 Lojacono II.
3613² Filago micropodioides Lange
1902 Lojacono II

3614 Filago arvensis L.
1697 Cupani – 1785 Allioni – 1806 Balbis – 1776 Bartalini – 1860 Carnel
— β Lagopus (Parl.)
1842 Parlatore – 1844 Gussone

3615 Filago heterantha (Raf.) Guss.
1696 Cupani – 1814 Rafinesque – 1842 Parlatore – 1844 Gussone
3616 Filago minima (Sm.) Fr.
1791 Bellardi – 1821 Nocca e Balbis – 1831 Tenore – 1837 Sanguinetti

3617 Filago gallica L.
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri – 1802 Marzari –
— β tenuifolia (Presl)
1822 Presl – 1842 Parlatore.

3617' Filago neglecta DC
1865 Amidei in Carnel – 1877 Marsilly – 1879 C. P. G. (Da confermarsi)

Antennaria Gaertn.
3618 Antennaria dioica (L.) Gaertn.
1532 Cibo – 1745 Séguier – 1773 Vitman – 1785 Allioni – 1806 Balbis – 1802 Marzari; Suffren.

3619 Antennaria carpathica (Wahl.) R. Br.
2(1785 Allioni – 1805 Re – 1822 Pollini
1(1595 Pona – 1726 Zannichelli –

Leontopodium R. Br.
3620 Leontopodium alpinum Cass.
1532 Cibo – 1565 Mattioli – 1566 Calzolari – 1585 Durante – 1595 Pona – 1713 Tita – 1802 Suffren; Marzari
— β nivale Ten.
1811 Tenore – 1856 Huet. Cf. Nyman Consp. 383

Gnaphalium L.

3621 Gnaphalium undulatum L.

2 (1853 Jaspar in n. Bertoloni IX

1 (Originario del Capo di B. S. Col. trato pro dalla fine del Lette cento e naturalizzato in pari Giardini presso Napoli:

1772 Allioni — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1802 Rodati — Naturalizzato:

3622 Gnaphalium luteo-album L.

1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1726 Zannichelli — 1754 Seguier — 1802 Mazzari; Saffren.

3623 Gnaphalium uliginosum L.

3 (1754 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Mazzari — 1808 Viviani — 1822 Bellardi (1864 Saccardo).

2 (— β ramosum (Lam.)

1 (Il tipo non fu ancora constatato in Italia ed è a ricercarsi sulle Alpi (Fiori)

3624 Gnaphalium silvaticum L.

1532 Cibo — 1563 Cesalpino — 1565 Mattioli — 1707 Martini — 1754 Seguier — 1808 Viviani — 1822 Bellardi

— β norvegicum Gunner

2 (1853 Rota — 1857 Ambrosi —

1 (1802 Balbis — 1844 Cesati

3625 Gnaphalium supinum L.

1674 Bocone — 1785 Allioni — 1808 Viviani — 1837 Sandri — 1844 Cesati.

— β Hoppeanum (Koch)

1855 Pirona — 1851 Hausmann I (+1891) Gravet, Add. Fiori in Fiori III — 1906 Gortani.

Helichrysum (Vaill.) Gaertn.

3626 Helichrysum frigidum (Lab.) W. — Ber moretti

1808 Viviani — 1834 Sabi — Manchlin 1850 Soleirol in Grenier e Godron II.

3626' Helichrysum orientale (Tourn.) DC. Nativo di Creta e Grecia. Coltivato pro dalla metà del Lettecento

1762 Allioni — 1773 Tita — 1780 Forskal — 1801 Bonato

3627 Helichrysum inodorum (Desf.) Fiori

1697 Cupani — 1789 Ucria — 1814 Rafinesque — 1844 Gussone.

— β scandens (Guss.)

1844 Gussone — 1879 C. P. G.

— γ stramineum (Guss.)

1844 Gussone — 1902 Lojacono III

— δ pandulum (Bert.)

1822 Presl — 1879 C. P. G.

— ε siculum (Boiss.)

1696 Cupani — 1822 Presl — 1830 Tenore

35/0018-238

209

3628 Helichrysum Stoechas (L.) DC.
1735 Micheli – 1818 Savi – 1844 Risso
1867 Ardoino.
1651 Erb. messinese. Cfr. Lodda.
— β psammiticum Fiori
1904 Adv. Fiori e Sommier in Fiori III.

3629 Helichrysum saxatile Moris
1828 Moris – 1844 Gussone
— β Errerae (Tineo)
1846 Tineo – 1885 Lojacono in Nat. sicil.
— γ litoreum (Guss.)
1651 Bauhin – Cherler II – 1830 Tenore – 1844 Gussone.

3630 Helichrysum italicum (Roth) G. Don.
2 (1651 Bauhin – Cherler II – 1726 Zannichelli – ~~1822 Pollini~~
1 (1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1562 Mattioli – 1563 Cesalpino –
3 (1820 Moricand – 1822 Pollini – 1891 Goiran in N. giorn. bot. ital. (Opera e là in ~~N. giorn. bot. it.~~ solo avventizio)
— β ericoidéum Fiori
1844 Gussone – (+ 1892) Todaro in Fiori III.
— γ microphyllum (Camb.)
1824 Viviani – 1843 Moris
— δ pseudolitoreum Fiori
1904 Sommier e Martelli in Fiori III.

Phagnálon Cass.

3631 Phagnalon sordidum (L.) DC.
1532 Cibo – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1802 Viviani.

3631' Phagnalon saxatile × sordidum Bick.
1896 Bicknell.

3632 Phagnalon rupestre (L.) DC.
1696 Cupani – 1620 C. Bauhin –
1820 Tenore – 1826 Gussone – 1827 Gussone
— β graecum (Boiss.)
1820 Tenore – 1844 Gussone.
— γ Moritianum (C. P. G.)
1843 Moris – 1879 C. P. G.

3633 Phagnalon saxatile (L.) Cass.
1678 Boccone –
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria
– 1867 Ardoino.
— β intermedium (Lag.) DC.
1697 Boccone – 1830 Tenore – 1844 Gussone.

Ínula L

3634. Inula Helenium L. R
1615 Rinio
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1720 Pontedera – 1785 Allioni.

3635 Inula Vaillantii (All.) Vill.
1785 Allioni – 1834 Colla – 1844 De Notaris – 1853 Molineri, Balbis, Bertero, Moretti in Bertoloni IX.

3635' Inula semiamplexicaulis Reut.
(I. Vaillantii × salicina)
1879 C. P. G. – 1882 Arcangeli.
(Da confermarsi)

3636. Inula hirta L.
1550 Petr Cibo — 1563 Cesalpino — 1676 Boccone — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Marzari; Suffren.
— β rotundifolia G. Beck.
1881 Beck, Inulae Europae. Vindob.

3637 Inula ensifolia L.
1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.
3637' Inula Hausmanni Huter
(I. ensifolia × hirta)
1863 Huter, Oest. bot. Zeitschr. — 1881 Beck l.c.

3638 Inula spiraeifolia L.
1550 Petr Cibo — 1563 Cesalpino — 1723 Micheli in Tilli — 1745 Séguier.
3638' Inula Savii G. Beck
(I. spiraeifolia × salicina)
1825 Savi — 1881 Beck l.c.

1415 Rinio 1697 Boccone (Aster mont. tab. 18)
3639 Inula salicina L.
1701 Martini — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari.
— β aspera (Poir.)
1881 Freyn — 1895 Weiss in Hallier Wohlf. II — 1904 Fiori III.
3639' Inula semicordata Borb.
(I. per-hirta × salicina)
1881 Beck l.c. — 1899 Pospichal — 1904 E. Ferrari in Fiori III.

3639² Inula rigida Doell
(I. per-salicina × hirta)
1898 Gelmi — 1904 Fiori III.

3640 Inula Britannica L.
1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari
1595 Pona

3641 Inula candida (L.) Cass.
1565 Michiel 1675 Zanoni — 1820 Tenore — 1853 Gussone in Bertoloni IX.

3642 Inula montana L.
1595 Pona — 1697 Cupani — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1831 Romano —

3643 Inula Oculus-Christi L.
1837 Biasoletto, Tommasini, Cfr. Freyn 1877 — 1899 Pospichal.

3644. Inula Conyza DC
1550 Petr Cibo — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1720 Pontedera — 1785 Allioni

3645. Inula bifrons L.
1685 Trionfetti — 1697 Boccone — 1785 Allioni — 1821 Nova e Balbis
3646 Inula crithmoides L.
1415 Rinio 1532 Petr Cibo — 1551 Al Brandt II — 1558 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1631 Donati — 1726 Zannichelli.

3647 Inula gravéolens (L.) Desf.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1776 Bartalini – 1785 Allioni – 1860 Carnel

3648 Inula viscosa (L.) Ait.
1550 Cibo – 1551 Aldrovandi II – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1674 Boccone – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1818 Ruchinger

3648[1] Inula germanica L.
1855 Bramati in Pirona (Da confermarsi)

3648[2] Inula thapsoides Spr.
1854 Nyman (Da confermarsi)

3648[3] Inula suavéolens Jacq.
(I. Conyza × Oculus-Christi)
1802 Suffren – 1855 Pirona (Da confermarsi)

Iasonia Cass.

3649 Iasonia glutinosa (L.) D.C.
1674 Boccone – 1827 Zerapha – 1829 Bertoloni in Annali St. nat. Bologna II – 1844 Gussone.

Pulicaria Gaertn.

3650 Pulicaria sicula (L.) Moris
1674 Boccone – 1696 Cupani – 1789 Ucria – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

3651 Pulicaria vulgaris Gaertn.
1551 Aldrovandi – 1554 Mattioli – 1702 Martini – 1785 Allioni – 1802 Suffren

— β graeca (Schultz Bip.)
1843 Moris – 1844 Gussone – 1904 Fiori III.

3652 Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.
1415 Rinio – 1550 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1585 Durante.

3653 Pulicaria odora (L.) Rchb.
2(1606 Colonna – 1696 Cupani – 1785 Allioni
1(1550 Cibo – 1563 Cesalpino

Carpesium L.

3654 Carpesium cernuum L.
1565 Michiel – 1595 Pona – 1606 Colonna – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Magari; Suffren.

3655 Carpesium abrotanoides L.
1788 Wulfen in Jacq. Collect. II – 1802 Suffren – 1853 Bramati, Tommasini, Moretti, de Visiani in Bertoloni IX

Buphthálmum L.

3656 Buphthalmum speciosum Schreb.
1843 Tommasini e Noè in Koch.
1853 Tommasini in Bertoloni IX – 1899 Pospichal

3657 Buphthalmum speciosissimum Ard.
1764 Arduino – 1816 Pollini –
1848 Comolli – 1853 Rota

3658 Buphthalmum salicifolium L.
1532 Cibo – 1720 Pontedera – 1723
Micheli in Tilli – 1726 Zannichelli.
1745 Seguier – 1785 Allioni –
— β grandiflorum (L.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1879
C. P. G.
— γ flexile (Bert.)
1697 Bocone – 1735 Micheli – 1819
Bertoloni – 1825 Savi

3659 Buphthalmum inuloides Moris
1827 Moris – 1879 C. P. G.

Asteriscus (Tourn.) Moench

3660 Asteriscus maritimus (L.) Less.
1696 Cupani – 1697 Bocone – 1785
Allioni – 1804 Savi – 1814 Rafinesque

3661 Asteriscus aquaticus (L.) Less.
1675 Zanoni – 1696 Cupani – 1785 Allio
ni – 1808 Birolis – 1867 Ardoino.
(1837 Biasoletto, Tommasini in Freyn 1877.

3662 Asteriscus spinosus (L.) Gr. Godr.
1615 Rinio 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli (Un
altro Ast. attic.) – 1696 Cupani –
1726 Zannichelli.
1678 Bocone –

— β aureus (Salzm.)
1904 Fiori III.

Calendula L.

3663 Calendula officinalis L.
— α arvensis (L.) R
1551 Aldrovandi – 1583 Cesalpino –
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1798
Savi – 1802 Suffren
— β micrantha (Tin.)
1844 Gussone – 1902 Lojacono III.
— γ aegyptiaca (Desf.)
1904 Ajuti in Fiori III.
— δ parviflora (Raf.)
1810 Rafinesque – 1902 Lojacono III
— ε hydruntina Fiori
1887 Groves – 1904 Fiori III
— ζ bicolor (Raf.)
1810 Rafinesque – 1844 Gussone – 1902 Lojacono III
— η hortensis Fiori. R
1615 Rinio 1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558
Mattioli – 1583 Cesalpino – 1592 Colonna
— ϑ hymenocarpa (Coss.)
1879 Huter, Porta, Rigo in Porta
— ι sicula (Cir.)
(+1799) Cirillo in Balbis Cat. hort. Taurin.
1804 – 1844 Gussone
— κ fulgida (Raf.)
1810 Rafinesque – 1789 Uoria – 1844
Gussone.
— λ marginata (W.)
1904 Martelli in Fiori III.

35/0018-240

— μ maritima (Guss.)
1825 Gussone — 1853 Grech-Delicata

3663' Calendula cerato-sperma Vis.
1902 Sojacono III.

Siegesbeckia L.

3664 Siegesbeckia orientalis L.
Nativa dell' Oriente e reg. del Nilo.
Coltivata dal settecento e qualche volta avventizia
1760 Allioni — 1793 Zuccagni — 1802 Rolfi — 1812 Bonato — avventizia: 1895 D. Saverio, Le piant. ogn. nell'Orto bot. Pad. — 1898 Bolzon

Eclipta L.

3665 Eclipta alba (L.) Hassk.
Originaria dell' America trop. e subtrop.
Coltivata sino dalla fine del Settecento.
Ricercata finora soltanto la var. B oa
Rodigina N. Terracc. (in Bonato avventizia:
1793 Zuccagni — 1801 Bonato — 1802 Rolfi — Avventizia:
1900 N. Terracciano in Bull. soc. bot. ital. 1902.

Rudbeckia L.

3666 Rudbeckia laciniata L.
Originaria degli Stati Uniti d'America
Coltivata fino dal seicento e qua e là avventizia
1642 Verbigio (1701 Matthioli) = 1713 Tita — 1760 Allioni — 1801 Bonato — Avventizia: (+1854) Montin. in Saccardo 1880 — 1883 Penzig in Bizzozero, Atti Ist. Veneto — 1895 Trinchinetti in Malp. IX —

— β digitata (Mill.)
= 1893 Omati in Rodegher e Venanzi.
((1890 Mozzi in Micheletti, N. giorn. bot. ital.

Helianthus L.

3667 Helianthus annuus L.
Del Perù e Messico. Coltivato frequentemente fino dal cinquecento.
1568 Costeo in Mattioli e Dodoneo, (1651 Erb. mattiniano Ch. Zadde.) Plant. coron. — 1662 Dalla Torre — 1760 Allioni.

3668 Helianthus tuberosus L.
Dell'America Sett. Coltivato fino dal seicento.
1606 Colonna (dall'orto Farnes.) — 1662 Dalla Torre — 1760 Allioni.

3668' Helianthus multiflorus L.
Della Virginia. Coltivato fino dal seicento.
1660 Dalla Torre — (1701 Matthioli) 1713 Tita — 1760 Allioni.

Dahlia Cav.

3669 Dahlia pinnata Cav.
Nativa del Messico. Coltivata fino dagli ultimi anni del Settecento.
1798 Pascal Silvestri (pl. Horti Parm.) — 1801 Bonato — 1803 Nocca Jgnogr. pl. horti bot. Ticin.

Bidens L.

3670 Bidens cernuus L.

2 (1720 Pontedera — 1745 Séguier —
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1808 Biroli

1 (1583 Cesalpino — 1685 Trionfetti — 1701 Martini

— β radiatus DC.

1785 Allioni — 1685 Trionfetti

3671 Bidens bullatus L.

1551 Aldrovandi II 1764 Arduino — 1735 Micheli — 1785 Allioni — 1822 Pollini — 1844 De Notaris.

— β hirtus (Jord.)

1872 Marsilly — 1879 Caldesi — 1904 E. Susan in Fiori III.

— γ glabrescens Fiori

(+1875) Barbieri; E. Ferrari in Fiori III.

3672 Bidens tripartitus L.

1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Margari; Suffren.

— β tenuis DC

1904 Fiori III — 1869 Visiani e Savardo

3673 Bidens frondosus L.

Originaria dell' America Sett. Coltivata fino dal settecento e talora fattosi avventizia

1760 Allioni — 1796 Farsetti — 1799 Zuccagni — 1801 Bonato — Avventizio:

(1849 Caruel, ed. 1860. — 1860 Parlatore, Todaro in Caruel.

3674 Bidens bipinnatus L.

Originaria dell' America bor. e trop. coltivata fino dai primi anni del settecento e già dalla metà di quel secolo ~~settecento~~ diffusamente naturalizzata

1701 Martini — 1713 Tita — 1760 Allioni
1789 Ucria — 1801 Bonato.

Naturalizzato: 1754 Séguier — 1816 Pollini — 1822 Sandri in Pollini — 1823 Romano — 1864 Savardo.

3675 Bidens heterophyllus Ortega

Del Messico. Coltivata dalla fine del settecento e qua e là avventizia.

1799 Zuccagni — 1802 Rodati — 1812 Bonato — Avventizia:

1905 Pampanini in Bolzen, Bull. Soc. bot. ital.

— β Wrightii A. Gray

1904 Paolucci in Fiori III.

3675¹ Bidens chrysanthemoides Michx.

Dell' America Sett. Coltivata ~~non di frequente~~ rado negli orti botanici fino dalla prima metà dell' ottocento e talora, più di secente, per foraggio e qua e là avventizio

1827 Tinea — Avventizio:

(1891 Scagnetti in Paolucci. Flor. Marchig.

3675² Bidens pilosus L.

— β leucanthus (L.)

Dell' America trop. Coltivata dalla fine del settecento e dal principio dell' ottocento ~~e probabilmente anche prima~~ fu rinvenuta anche avventizia.

1801 Bonato — 1802 Rodati — 1815 Biroli. Avventizio:

1785 Bellardi in Allioni — 1849 Zumaglini

Galinsóga Ruiz et Pav.

3676 Galinsoga parviflora Cav.

35/0018 - 241

Originaria dell' America sett. e merid. Coltivata in qualche orto botanico fino dal principio dell' ottocento ed ora diffusa in molta parte d' Italia.
1801 Bonato – 1806 Zuccagni – Naturalizzata: 1820 Paterno in Ambrosi 1857, II – 1847 Kellner in Zanardini – 1851 Ambrosi in Hausmann – 1869 Saccardo e Visiani – 1873 Goiran, in Bull. soc. bot. it. 1890.

Zinnia L.

3677[1] Zinnia elegans ~~Cav~~ Jacq.
Del Messico. Coltivata comunemente fino dalla seconda metà del settecento e talora sporadica.
1780 Farsetti – 1795 Zuccagni – 1812 Bonato – 1815 Biroli.

Coreopsis L.

3677[2] Coreopsis tinctoria Nutt.
Dell' America sett. Coltivata dalla prima metà dell' ottocento e talora sporadica presso i giardini.
1825 Bonato ms. – 1827 V. Tineo – 1836 Brignoli – 1845 Tenore – Sporadica: 1864 Saccardo ms!

Cosmos Cav.

3677[3] Cosmos bipinnatus Cav.
Del Messico. Coltivato dalla fine del settecento
1798 Farsetti – 1801 Bonato – 1845 Tenore

Gaillardia Fougeroux

3677[4] Gaillardia pulchella Foug.
Del Texas e Messico. Coltivata fino dalla prima metà dell' ottocento.
1836 Brignoli – 1837 Vis. Cat. sem. hortr. Patav. – 1845 Tenore
1827 V. Tineo

Tagetes L.

3677[5] Tagetes erecta L. *)
Del Messico. Coltivato fino dal cinquecento e talora sporadico presso i giardini.
1532 Cibo – 1562 Mattioli – 1555 Michiel – 1642 Veslingio – 1822 Pollini.

3677[6] Tagetes patula L.
Del Messico. Coltivato fino dal cinquecento e talora sporadico presso i giardini.
1532 Cibo – 1642 Veslingio – 1562 Mattioli – 1822 Pollini.

Madaria DC.

3677[7] Madaria elegans (Don) DC.
Della California. Coltivata verso la metà dell' ottocento e qualche volta avventizia nel Trentino.
1842 Visiani – Avventizia: 1850 Facchini, ed. 1855.

Ambrosia (Tourn.) L.

(*) Leonardo Fuchs fu il primo (1547) ad usare il nome di Tagetes facendolo femminile e fu seguito dal Linneo e dai più. Non sembra quindi corretto mutarlo in maschile, come fecero Tournefort ed altri.

3677 Ambrosia maritima L.
1631 Donati – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1774 Ginanni – 1785 Allioni – 1820 Moricand.

Xanthium (Tourn.) L.

3678 Xanthium spinosum L.
Originario dell'America merid. e forse anche della Russia. Non sembra coltivato nel seicento, ma fino dal principio del settecento trovasi largamente naturalizzato.
1704 Martini – 1713 Tita (Lappa lusitanica) 1745 Seguier – 1784 Martelli e Sabbati – 1785 Allioni.

3679 Xanthium strumarium L.
1532 Cibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1566 Calzolari – 1595 Porta – 1785 Allioni –

3679' Xanthium italicum × strumarium Fiori
1904 Goiran

3680 Xanthium italicum Moretti
♀ 1784 Martelli e Sabbati – 1806 Zuccagni – 1818 Balbis – 1821 Nocca e Balbis – 1823 Moretti – 1822 Pollini – 1864 Saccardo (Indigeno o naturalizzato?)
— β Nigri (Casati)
1869 Franc. Negri. Cfr. C.P.G. 1877 – 1896 Bicknell

♀ 1745 Sabbati –

3680' Xanthium ambrosioides Hook et Arn.
Dell'Argentina e Cile, donde recentemente importato, fu trovato avventizio in Liguria
1904 Canneva in Sommier.

Echinops L.

3681 Echinops sphaerocephalus L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi II 1558 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Porta – 1720 Pontedera.

3682 Echinops exaltatus Schrad.
1843 Tommasini in Koch – 1896 Marchesetti.
— β commoratus (Juratzka)
1904 Fiori III.

3683 Echinops Ritro L.
1772 Scopoli – 1785 Allioni – 1805 Re – 1821 Nocca e Balbis – 1843 Koch
— β elegans Bert.
1826 Gussone – 1837 Sanguinetti
— γ siculus (Strobl)
1844 Gussone – 1882 Strobl

3684 Echinops spinosus L.
1846 Tineo – 1884 Lojacono

3685 Echinops viscosus DC.
1844 Gussone – 1901 Nicotra in N. giorn. bot. ital.

3685 Echinops strigosus L.
Originario d. Portogallo, Spagna e Africa
Sett. Coltivato fino dal principio del
sec. scorso (probabilmente avventizio) in Toscana
1733 Erb. Princ. Cattolica — Bertoloni — Fossetti
1793 Zuccagni — Ilmeo — 1798 Pascal — 1801 Bonato — 1803 Nava
— avventizio
1904 Arcangeli in Fiori III.

Cardopatium Juss.

3686 Cardopatium corymbosum (L.) Pers.
1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1581
Durante — 1696 Cupani

Atractylis L.

3687 Atractylis cancellata L.
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789
Moris — 1820 Tenore.

Carlina (Tourn.) L.

3688 Carlina gummifera (L.) Less.
1665 Zanoni — 1666 Ray, ed. 1694 — 1671 Bocone
1686 Colonna — 1696 Cupani
— β Fontanesii (DC.)
1828 Moris — 1850 Grenier e Godron.

3689 Carlina acanthifolia All.
1551 Aldrovandi — 1565 Cesalpino —
1735 Micheli — 1785 Allioni — 1805 Re
1802 Soppen
— β Cynara (Pourr.)
1879 C. P. G. — 1897 Penzig.

3690 Carlina acaulis L.
1550 Gbo — 1551 Aldrovandi — 1554
Mattioli — 1565 Cesalpino — 1585
Durante — 1595 Pona — 1726 Pontedera
— β alpina Jacq.
1554 Mattioli — 1565 Cesalpino —
1745 Séguier — 1804 Bertoloni

3691 Carlina vulgaris L.
1562 Mattioli — 1595 Pona — 1726
Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier.
— β longifolia (Rchb.)
1697 Bocone — (+ 1852) Facchini in
Ambros., 1857, II — 1858 Rota.

3692 Carlina macrocephala Moris
1828 Moris — 1850 Grenier e Godron
— β nebrodensis (Guss.)
1837 Guss. in DC. Prodr. VI.

3693 Carlina sicula Ten.
1813 Tenore in Cat. hort. Neap. — 1822
Presl — 1826 Gussone.

3694 Carlina corymbosa L.
1565 Cesalpino — 1606 Colonna — 1664
Ray, ed. 1694 — 1697 Bocone — 1785
Allioni
— β graeca (Heldr. et Sart.)
1876 Hallier-Wohlfarth II.
1895 Boissier, Fl. orient. III — 1878 Smith.

— *A. viscidula* (Pourr.)
1651 Sab. mettinega · Cat. Sadda —
1704 Ad. Fiori e Sommier in Fiori III
— *B. globosa* Arcang.
1606 ? Colonna — 1789 Ucria — 1807
Bivona-Bernardi — 1844 Gussone

3695 *Carlina racemosa* L.
1843 Moris — 1879 C. P. G.

3696 *Carlina lanata* L.
1606 Colonna — 1671 Boccone — 1696
Cupani — 1785 Allioni.

Xeranthemum (Tourn.) L.

3697 *Xeranthemum cylindraceum* S. et S.
1567 Cesalpino — 1580 Cibo — 1785
Allioni — 1802 Seffner — 1816 Pollini.
1904 Goiran

3698 *Xeranthemum inapertum* W.
1696 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri.
— 1822 Presl — 1826 Gussone — 1904
Goiran

3699 *Xeranthemum annuum* L.
1793 Martelli e Sabbati — 1745 Séguier
1842 Puccinelli — 1853 Montini in
Bertoloni IX — 1904 Goiran (? alcun.
indighi forse soltanto avventizii)

Staehelina L.

3700 *Staehelina dubia* L.
1757 Allioni, 1772 Moretti ↖ 1797 Host — 1821 Nocca
e Balbis († 1888) Bizzozero in Bolzon 1898
1852 Roth.

Saussurea DC.

3701 *Saussurea alpina* (L.) DC
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli
Facchini
— β. *lapathifolia* (L.)
1532 Cibo — 1726 Zannichelli —
1822 Pollini — 1904 Goiran.

3702 *Saussurea pygmaea* (L.) Spr.
1850 Tommasini in Bertoloni VIII —
Ambrosi

Berardia Vill.

3703 *Berardia subacaulis* (Lam.) Fiori
1723 Tilli — 1785 Allioni — 1805 Re

Arctium L.

3704 *Arctium Lappa* L. R
1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli —
1561 Anguillara — 1583 Cesalpino —
1585 Durante — 1720 Pontedera
— β. *tomentosum* (Mill.)
1565 Mattioli — 1785 Allioni — 1822
Pollini — 1904 Goiran.
— γ. *minus* (Bernh.)
1615 Rivin. ↖ 1532 Cibo — 1565 Cesalpino ↗ 1830 Tenore
(1822 Pollini
— δ. *nemorosum* (Lejeune)
1904 Fiori III — 1906 Gortani
— ε. *pubens* (Bab.)
1904 E. Ferrari e Ad. Fiori in Fiori III
— 1906 Gortani

(Quest'ultimo habitat deve essere confermato)

35/0018 - 243

Jurinéa Cass.

3705 Jurinea mollis (L.) Rchb.
1532 Cibo – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1818 Sebastiani e Mauri –
— β moschata (DC.)
1825 Gussone – 1830 Tenore

3706 Jurinea humilis (Desf.) DC.
Il tipo è proprio della Spagna e Francia meridionale.
— β Bouoni (Guss.)
1696 Cupani – 1697 Bouone – 1826 Prest; Gussone.

Serrátula L.

3707 Serratula tinctoria L.
1415 Rinio 1550 Cibo – 1551 Alfonsi II 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1697 Bouone – 1802 Marsari; Suffren.
— β indivisa (Poir.)
1726 Zannichelli – 1864 Sauardo
— γ Vulpii (Fisch. – Oost.)
(+1871) Giannini in Fiori III – 1890 Faorat in Franzoni – 1896 Marchesetti
— δ praealta L.
1697 Bouone – 1785 Allioni – 1882 Goiran in Arcangeli.

3708 Serratula radiata (W.K.) M.B.
1850 Tommasini in Bertoloni VIII.

3709 Serratula lycopifolia (Vill.) Fiori
1742 Zanoni e Monti – 1850 Tommasini in Bertoloni VIII.

3710 Serratula nudicaulis (L.) DC.
1697 Bouone – 1791 Bellardi – 1830 Tenore.

3711 Serratula cichoracea (L.) DC.
1696 Cupani – 1723 Tilli – 1792 Civilli.
— β mucronata (Desf.)
1697 Cupani – 1789 Uoria – 1844 Gussone.

Crupina Cass.

3712. Crupina vulgaris Cass.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1805 Re – 1818 Sebastiani e Mauri.

3713. Crupina Crupinastrum (Moris) Vis.
1789 Uoria – 1807 Bivona – Bernardi – 1827 Moris.

Centauréa L.

3714 Centaurea Lippii L.
1884 Zwierlein in Lojacono

3715 Centaurea salmantica L.
1696 Cupani – 1704 Martini 1789 Uoria – 1807 Bivona – Bernardi – 1820 Mauri
— β Duriaei (Spach)
1844 Gussone – 1902 Lojacono III –
(An = Microlonch. Duriaei Spach, 1845?)

— γ Iserniana (Graells.)
1902 Lojacono III.

3716. Centaurea Rhapontica L.
1550 Cibo — 1585 Durante — 1713 Tita — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli.

— β Cyrata (Bell.)
1713 Tita — 1726 Zannichelli — 1822 Pollini

— γ Bicknelli Briq.
(+1877) De Notaris in Briquet 1902.

3717 Centaurea conifera L.
1785 Allioni — 1789 Uoria — 1805 Re — 1806 Bivona — Bernardi
1678 Boccone

3718 Centaurea alba L.
1551 Aldrovandi II
1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1745 Séguier — 1822 Pollini — 1848 Comolli.

— β splendens (L.)
1785 Allioni — 1830 Tenore — 1904 Goiran.

— γ angustifolia DC.
1826 Gussone — 1887 Groves

— δ densa (Ten.)
1811 Tenore — 1818 Sebastiani e Mauri — 1822 Pollini — 1848 Comolli.

— ε nobilis Groves
1887 Groves —

— ζ conocephala Fiori.
1816 Tenore (C. Lippii) — 1904 Andr. Fiori; Ricca in Fiori III.

— η Pestalotii (De Not.)
1838 De Notaris in Bibl. ital. + XCI
1844 Cesati — 1853 Reichenbach Ic. XV —
1882 Carnel in Arcangeli — 1904 Goiran.

— δ Tenoreana (Wk)
1811 Tenore — 1853 Gussone in Bertoloni IX — (+1891) Groves in Fiori III

— ζ Diomedéa Gasp.
1837 Gasparrini — 1879 C. P. G.

3719 Centaurea Jácea L.
1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren — 1816 Pollini — 1820 Moricand.

— β amara L.
1666 Ambrosini — 1696 Cupani — 1697 Boccone — 1720 Pontedera — 1785 Allioni.

— γ vochinensis (Bernh.)
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1720 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1768 Turra, ed 1780 — 1802 Marzari; Suffren.
1565 Michiel

— δ neapolitana (Boiss.)
1840 Heldreich in Reich. Ic. XV (C. incana)
1820 Tenore — 1849 Boissier Diagnos. pl. II.

— ε transalpina (Schleich.)
1830 Tenore — 1853 Rota — 1855 Pirona — 1882 Arcangeli — 1904 Goiran

— ζ pratensis (Thuill.)
1869 Visiani e Sanardo — 1904 Fiori III; Goiran.

— η nigra (L.)
1853 Bertoloni IX — 1879 C. P. G.

3720 Centaurea procumbens Balb.
1806 Balbis — 1844 De Notaris — 1850 Grenier e Godron.

35/0018 - 244

3721. Centaurea pectinata L.
1789 Allioni – 1867 Ardoino – 1902 Briquet

3722. Centaurea rhaetica Moritzi
1853 Rota; Moritzi e Heufler in Bertoloni IX – 1893 Gelmi.
— β ensifolia (Rota)
1853 Rota.

3723 Centaurea uniflora L.
1697 Bouone – 1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Biroli.
— β tineana Gremli
1902 Gremli in Briquet.
— γ pluricephala Fiori
(+1895) Rostan; Carestia L. Vaccari, E. Ferrari in Fiori III
— δ nervosa (W.)
1595? Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Soffren – 1855 Pirona
— ε Thomasiana (Dalla Torre)
(+1891) Groves, Borzì in Fiori III.
— ζ adscendens (Moritzi)
1789 Allioni – ~~1853 Reichenbach cf. Ic. fl. germ. XVI~~ – 1867 Ardoino.
— η flosculosa (Balb.)
1804 Balbis – 1853 Moritzi in Bertoloni IX

3724 Centaurea phrygia L.

Il tipo è proprio dell'Europa centrale
— β pseudophrygia (C. A. Mey.)
1837 Sandi – 1855 Pirona – 1853 Rota
— γ stenolepis (A. Kern.)
1826 Gussone – 1835 Tenore

3725 Centaurea sempervirens L.
1674 Bouone – 1820 Tenore.

3726 Centaurea Cyanus L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1558 Mattioli – 1566 Calzolari – 1583 Cesalpino – 1592 Colonna

3726' Centaurea depressa M. B.
1902 Lojacono III

3727 Centaurea montana L.
1550 Petrus Cibo – 1558 Mattioli – 1566 Calzolari – 1595 Pona – ~~1685 Trionfetti~~ – 1720 Pontedera
— β Triumfetti (All.)
1532 Cibo – 1685 Trionfetti – 1785 Allioni.
— γ variegata (Lam.)
1844 Gussone.
— δ nana Tenore

3728 Centaurea horrida Bad.
1824 Badaró – 1843 Moris – 1879 C. P. G.

3728² Centaurea super-filiformis × horrida Lev.
1904 Forsyth-Major in Fiori III.

3728¹ Centaurea super-horrida × filiformis Lev.
1904 Forsyth-Major in Fiori III.

3729 Centaurea filiformis Viv.
1825 Viviani – 1828 Moris
— β ferulacea (Martelli)
1896 Martelli in N. giorn. bot. ital.

3730 Centaurea Cineraria L.
1620 C. Bauhin – (+1673) ad 1714 – 1789 Ucria – 1879 C. P. G.
— β Circae Somm.
1685 Frionfelt – 1844 Gussone 1894 Sommier in N. giorn. bot. ital.
— γ cinerea (Lam.)
1785 Allioni – 1825 Savi – 1844 Gussone
— δ Veneris Somm.
1894 Sommier in N. giorn. bot. ital.
— ε gymnocarpa (Moris e De Not.)
1839 Moris e De Notaris.
— ζ busambarensis (Guss.)
1844 Gussone – 1879 C. P. G.
— η Friderici (Vis.)
(1882 Arcangeli – 1876 Marchesetti in Boll. soc. adr. Sc. nat.
1847 Stalio, Botteri in Visiani Fl. Dalm. II
— ϑ aeolica (Guss.)
1837 Gussone in DC. Prodr. VI – 1878 Lojacono.

— ι pandataria Fiori et Bég.
1854? Gussone – 1904 Béguinot in Fiori III
— κ sicula Lacaita
1905 Lacaita in Fiori IV, 1907.

3731 Centaurea dissecta Ten.
1811 Tenore – 1826 Gussone – 1830 Orsini.
— β adscendens (Ten.)
1830 Tenore.
— γ nigra Fiori
1830? Tenore – 1904 Levier, Martelli in Fiori III
— δ melanocephala Fiori
1830? Tenore – 1880 Groves.

3730¹ Centaurea soluntina Tineo
(+1856) Tineo in Lojacono III, 1902

3730² Centaurea panormitana Lojac.
1902 Lojacono III

— ε macrocephala Groves
1904 Groves in Fiori III.
— ζ virescens Ten.
1830 Tenore.
— η pseudomaculosa Fiori
1819 Bertoloni – 1804 Savi – 1842 Puccinelli – 1860 Caruel
— ϑ ilvensis Somm.
1903 Sommier.
— ι maritima Lacaita
1830? Tenore – 1904 Lacaita in Fiori III

— λ Parlatoris (Heldr.)
1843 Heldreich in Ann. Aspir. nat. Nap. I.
1879 C. P. G.
— x tomentosa (Guss.)
1844 Gussone
— μ ambigua (Guss.)
1826 Gussone – 1879 C. P. G.
— ν glabrata Ten
1842 Tenore.

3732 Centaurea paniculata L.
1631 Donati – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1845 Séguier – 1822 Pollini.
— β vallesiaca DC.
1853 Reichenbach f. Ic. fl. germ. XV
1886 Baglietto.
— γ leucophaea (Jord.)
1853 Reichenbach f., Reuter e Barla in Rchb. Ic. fl. germ. XV – 1844 De Notaris
— δ eupaniculata Brig.
1902 Bicknell in Briquet.
— ε Pseudocineraria Fiori
1844 De Notaris – 1867 Ardoino.
— ζ Carneliana Mich.
1891 Micheletti in N. giorn. bot. ital.
— δ cosana Fiori
2 1904 Adr. Fiori in Fiori III.
— η lunensis Fiori
1 (+1877) Parlatore; Passerini in Fiori III.
— ι carsiana (Scop.)
1772 Scopoli – 1853 Jan, Tommasini, Cernazai, Moretti in Bertoloni IX – 1855 Pirona.

— x spinoso-citrata (Bernh.)
1853 Tommasini, Biasoletto ecc. in Rchb. Ic. fl. germ. XV – 1900 Weiss in Hallier-Wohlfarth II.
— λ cristata (Bartl.)
1853 Montini, Felisi; Tommasini ecc. in Bertoloni IX.
— μ Tommasinii (A. Kern.)
1873 A. Kerner in Nyman Comp. Suppl.
(+1876) Narducci in Fiori III – 1882 Arcangeli.
— ν subtilis (Bert.)
1820 Tenore – 1853 Gussone in Bertoloni IX.
— ο haplólepa (Mor.)
1826 Moretti – 1844 De Notaris; Gussone.
— π Aethaliae Somm.
(+1870) Amidei; Caldesi in Fiori III
1903 Sommier.

3732' Centaurea hybrida All.
(C. maculosa × solstitialis)
1785 Allioni – 1805 Re – 1806 Balbis
1844 Cesati.
3733 Cent. diffusa Vedi al verso.
3734 Centaurea Scabiosa L.
1551 Aldrovandi II – 1726 Zannichelli
1562 Mattioli – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Marzari – 1822 Pollini.
— β tenuifolia Schleich.
(+1857) Ambrosi II, 1857. Facchini

— γ grinensis (Reut.)
1857 Reuter in Ind. sem. horti Genev.
— δ coriacea (W. et K.)
1853 Rota — 1879 C. P. G.
— ε badensis (Tratt.)
1902 Briquet
— ζ spinulosa (Roch.)
1851 Hausmann I — 1882 Arcangeli — 1893 Gelmi.
— η variifolia (Lois.)
1830 Tenore — 1853 Tommasini in Bertoloni IX
— ϑ calcarea (Jord.)
1902 Briquet
1872-73 Strafforello; Angern Sternberg in Briquet
1902 —
— ι alpina Gaud.
1879 Gibelli in C. P. G — 1882 Arcangeli.
— κ menteyerica (Chaix)
1879 C. P. G — 1882 Arcangeli —
1904 Ajati in Fiori III
— λ cinereocephala Evers.
1896 Evers.

3733 Centaurea diffusa Lam.
Oriunda di Turchia, Russia media ecc.
Non sembra coltivata, ma comparisce avventizia qua e là.
1882 Marchesetti — 1878 Smith — 1879 Cesati in C. P. G. — 1886 Baglietto

alla pag. precedente

3735 Centaurea ragusina L.
Coltivata fino dal seicento; spontanea però nelle isole Pelagosa e naturalizzata in più luoghi d'Italia.
1675 Zanoni 1702 Martini — 1784 Martelli — Sabbati — 1796 Farsetti — 1793 Zuccagni — Naturalizzata: 1853 De Bracht, Montini, Kellner in Bertoloni IX e in Rchb. Ic. fl. germ. XV — 1860 Carual — 1864 Sacardo — Spontanea: 1875 Stossich in Bull. soc. adr. sc. nat. Trieste — 1876 Marchesetti l.c.

3735' Centaurea Damanti Lojac.
1902

3736 Centaurea rupestris L.
1550 Cibo — 1802 Suffren; Viviani — 1819 Bertoloni
— β inermis Groves
1887 Groves
— γ maculosa DC.
1772 Scopoli — 1853 Tommasini in Bertoloni IX — 1877 Freyn.
— δ ceratophylla (Ten.)
1606 Colonna — 1820 Tenore

3736' Centaurea dichroantha A. Kern.
1874 A. Kerner in Oest. bot. Zeitschrift — 1904 Huter, Porta in Fiori III (Probabilmente forma ibrida)

3736² Centaurea sordida W.
1853 Freier, Papperitz in Reichenbac Ic. fl. germ. XV. — 1855 Pirona — 1899 Pospichal (Probabilmente forma ibrida)

35/0018-246

3737. Centaurea collina L.
1785 Allioni – 1804 Balbis – 1844 De Notaris – 1850 Grenier e Godron.

3738 Centaurea Centauroides L.
1606 Colonna – 1820 Tenore.

3739 Centaurea tauromenitana Guss.
1844 Gussone – 1879 C. P. G.

3740 Centaurea tagana Brot
(+1856) Tineo e 1882 Taormina in Lojacono III.

3741 Centaurea alpina L.
1620 C. Bauhin – 1701 Martini – 1713 Tita – 1745 Séguier – 1785 Allioni.

3742 Centaurea Centaurium L. R
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1561 Anguillara – 1562 Mattioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1820 Tenore

3743 Centaurea crassifolia Bertol.
1827 Zerapha – 1829 Bertoloni, Ann. stor. nat. Bologna.

3744 Centaurea melitensis L.
1606 Colonna – 1674 Bocone – 1696 Cupani – 1827 Zerapha

3745 Centaurea solstitialis L
1550 Cibo – 1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1805 Re – 1818 Sebastiani e Mauri.
— β Adami (W.)
1696 Cupani – 1835 Tenore
— γ Schouwii (DC.)
1697 Cupani – 1789 Ucria – 1843 Moris – 1844 Gussone
3745.[1] Centaurea Damanti Lojac.
1902 Lojacono (Da confermarsi)
3745.[2] Centaurea filaginoides Lojac.
1902 Lojacono (Da confermarsi)

3746. Centaurea nicaeensis All.
1674 Bocone – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1789 Ucria.
3746[1] Centaurea Riaeana (Rchb. fil.)
[= Centaurea Duriaei Lojac.]
(C. nicaeensis × napifolia?)
1902 Lojacono III.

3747 Centaurea Calcitrapa L.
1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1592 Colonna – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli –
— β macracantha (Guss.)
1789 Ucria – 1844 Gussone.
— γ Torreana (Ten.)
1829 Tenore, Ind. sem. hort. Neap.
— δ myacantha (DC.)
1860 P. Savi in Carnel

3747[1] Centaurea arrectispina Bert.
1853 Bertoloni IX 1879 C.P.G. (Probabilmente forma ibrida)

3747[2] Centaurea Pouzinii DC
(C. Calcitrapa × aspera)
1844 De-Notaris – 1879 C. P. G.

3747[3] Centaurea adulterina Mor.
(C. Calcitrapa × paniculata)
1836 Moretti in DC. Prodr. VI –
1879 C. P. G. – 1882 Arcangeli

3747[4] Centaurea paniculata × Calcitrapa Ces.
1879 Cesati in C. P. G.

3748 Centaurea aspera L.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1804 Bertoloni; Savi
— β subinermis DC.
1841 De Notaris; 1867 Sarato in Briquet 1902.

3749 Centaurea sphaerocephala L.
1563 Cesalpino – 1664 Ray, ed. 1694
1745 Sabbati – 1788 Cirillo – 1807 Bivona-Bernardi
— β lonchifolia (L.)
1671 Boccone – 1675 Zanoni – 1789 Ucria.
— γ Seridis (L.)
1785 Allioni – 1844 Risso

3750 Centaurea napifolia L.
1532 Cibo – (+1673) Barrelier, ed. 1714 –
– 1818 Sebastiani e Mauri – 1826 Presl.

3750[1] Centaurea orientalis L.
Dell'Europa orient., Caucaso, Tauria. Coltivata dalla fine del settecento e talora avventizia in Liguria.
1793 Tineo – 1796 Zuccagni – 1802 Rodati – Avventizia 1886 Baglietto – 1897 Penzig

3750[2] Centaurea glomerata Vahl
Originaria d'Egitto. Non sembra coltivata; ~~tuttavia~~ fu però trovata avventizia in Liguria
1897 Penzig.

3750[3] Centaurea iberica Trevir.
Dell'Asia occid. e centr. Di rado coltivata ed talvolta avventizia in Liguria
1845 Tenore – Avventizia: 1889 G. Bastreri in Penzig.

3750[4] Centaurea hyalolepis Boiss.
Di Palestino, Cipro, Mesopotamia. Non sembra coltivata; ma incontrasi avventizia in Liguria
1882 Cittadella in Arcangeli – 1896 Bicknell – 1904 Canneva in Sommier

3750[5] Centaurea virgata Lam.
Dell'Asia occid. e centr. Non apparisce coltivata e fu indicata come spontanea in Friuli; è però da confermarsi.
1855 Pirona.

3750[6] Centaurea intybacea Lam.
Della Francia mer. e Spagna. Di rado coltivata e indicata in Corsica
1868-69 Debeaux, ed. 1891 (Spontanea?)
1842 Visiani (colt.) –

Amberboa (Pers.) DC.
3750[8] Amberboa moschata (L.) DC.
Nativa d'Oriente. Coltivata fino dal cinquecento.
1583 c. Michiel — 1642 Veslingio (Cyanus turcicus) — 1666 Ambrosini, Phytolog. p. 187 — 1702 Martini — 1861 Bonato

218

35/0018-247

3750[7] Centaurea gennensis Hausskn. (C. Bertolonii × Ponzinii?)
1894 Haussknecht, Mitth. Thür. bot. Ver.

qui

Cnicus (Vaill.) L. e. p.
3751 Cnicus benedictus L.
1550 Petr. Cibo — 1558 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1802 Suffren — 1820 Tenore.

Carthamus (Tourn.) L.
3752 Carthamus lanatus L.
1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi — 1554 Mattioli — 1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1595 Pona — 1822 Pollini.
— β elatus (Gasp.)
1842 Gasparrini — 1879 C. P. G.
3752[1] Carthamus dentatus Vahl
1879 Reina in Lojacono III, 1902.
3753 Carthamus tinctorius L.
Dell'Africa tropicale. Conosciuto e coltivato fino dal cinquecento e talora avventizio.
1415 Rinio 1532 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — Avventizio: 1852 Passerini — 1897 Penzig
~~3753[1] Carthamus gracilis Lojac.~~
3754 Carthamus caeruleus L.
1696 Cupani — 1789 Ucria — 1818 Sebastiani e Mauri — 1834 Salis — Marschlins — 1843 Moris

— β tingitanus (L.)
1697 Cupani — 1818 Sebastiani e Mauri — 1824 Viviani — 1843 Moris.

Carduncellus Adans.
3755 Carduncellus Monspeliensium All.
1785 Allioni — 1834 Colla — 1896 Bicknell.

3756 Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
1826 Presl — 1844 Jussone.

3754[1] Carthamus gracilis (Lojac.) Fiori
1902 Lojacono III
3754[2] Carthamus multifidus Desf.
(+1856) Tineo e (+1892) Todaro in Lojacono III, 1902.

Carduus (Tourn.) L.
3757 Carduus nutans L.
1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1785 Allioni — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1802 Suffren — 1818 Ruchinger.
— β macrocephalus (Desf.)
1835 Tenore
— γ longispinus Moris
1843 Moris — 1889 N. Terracciano
— δ nigrescens (Vill.)
1785 Allioni — 1819 Bertoloni
2 — ζ litoralis (Borbas)
1899 Pospichal
1 — ε platylepis (Sant.)
1857 Ambrosi — 1893 Gelmi.

3757 Cardus longispinus × chrysacanthus Fiori
(+1891) Groves in Fiori III.

3757² Cardus per-nutans × pycnocephalus C. Mass.
1899 C. Massalongo in Bull. soc. bot. ital.
— 1904 Goiran.

3757³ Cardus orthocephalus Wallr.
(C. nutans × acanthoides)
1898 Gelmi

3758 Cardus chrysacanthus Ten.
1825 Tenore, Cat. sem. hort. bot.
Neap. — 1879 Freyn.
— β semiglaber Fiori
1825 Tenore

3759 Cardus defloratus L.
1820 Moretti — 1826 Pollini — 1848
Comolli — 1850 Bertoloni VIII.
— β glaucus (Baumg.)
1816 Pollini — (+1849) Kellner;
Comolli in Fiori III
— γ subdecurrens (Bert.)
1850 Bertoloni
— δ transalpinus (Suter)
1816 Pollini — 1853 Rota.
— ε alpestris (W. K.)
1848 Comolli — 1871 Zersi.
— ζ medius (Gouan)
1882 Payot — 1904 Fiori III.
— η rhaeticus DC.
(+1673) Barrelier, ed 1714 — 1745 Séguier —
1816 Pollini — 1850 Bertoloni VIII — 1857
Ambrosi.

— δ Bauhinis Ten.
1842 Tenore — (+1891) Groves in Fiori III
— ε carduncellus (Lam.)
1816 Pollini — 1819 Bertoloni.

3759¹ Cardus chrysacanthus × carduncellus Fiori
1882 Gennari in Arcangeli — 1879
C. P. G.

3759² Cardus Brunneri Doell.
(C. nutans × defloratus)
(+1830) Steinberg, (+1872) Reuter, Ajut
in Fiori III.

3759³ Cardus laxus G. Beck.
(C. acanthoides × defloratus)
1904 Autherdorfer in Fiori III.

3760 Cardus Cardunculi (L.) Gren.
1850 Ambrosi, Montini, Contarini in
Bertoloni VIII — 1855 Pirona.

3761 Cardus affinis Guss.
1826 Gussone — 1837 Sanguinetti — 1850 Te
nore
— β vulturius Fiori
1904 Biondi in Fiori III.
— γ brutius Huter, Porta, Rigo
1879 Huter, Porta, Rigo in Porta.

3761¹ Cardus affinis × chrysacanthus Levier
(+1870) Ortini; Levier in Fiori III.

3762 Cardus Personata (L.) Jacq.
1763 Gouan — 1785 Allioni — 1800 Biroli —
1820 Moretti
1904 Goiran.

35/0018-248

— β simplicifolius (Sang.)
1862 Sanguinetti — 1850 Orsini
Marsiletti, Sanguinetti in Bertoloni VIII (C. Personata e.p.)

3762' Carduus Michaleti Beck
(+1878) Hausmann in Kern. Sched. fl. austro-hung. n. 1781 (1888) — 1906 Huter Herbar-Studien.

3763 Carduus candicans W. K.
1850 Tommasini in Bertoloni VIII.
— β collinus (W. K.)
1842 Tenore — 1879 C. P. G.

3764 Carduus crispus L.
1857 Ambrosi — 1879 C. P. G.
— β multiformis (Gaud.)
1857 Ambrosi — 1882 Marchesetti — 1853 Rota

3765 Carduus acanthoides L.
1820 Balbis in Spreng. Syst. veg. III — 1834 Colla — 1850 Barbieri in Bertoloni VIII — 1893 Gelmi — 1879 C. P. G.

3766 Carduus litigiosus Nocca et B.
1785 Allioni — 1821 Nocca e Balbis — 1822 Moretti — 1827 Loiseleur —
— β intricatus (Rchb. fil.)
1853 Charpentier in Reichenbach f. Ic. fl. germ. XV.

3767 Carduus fasciculiflorus Viv.
1825 Viviani — 1827 Balbis in Moris — 1843 Moris.

3768 Carduus cephalanthus Viv.
1824 Viviani — 1827 Loiseleur — 1834 Salis-Marschlins.
— β congestus (Guss.)
1830 Tenore — 1844 Gussone.

3769 Carduus pycnocephalus L. R
1745 Séguier — 1701 Martini — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1798 Savi — 1805 Re.
— β brevisquámus Fiori
1828 Moris — 1844 Gussone.
— γ tenuiflorus (Curt.)
1822 Pollini — 1830 Reichenbach — 1904 Martelli in Fiori III.
— δ sardóus (Moris)
1827 Moris — 1850 Soleirol in Bertoloni.

3769' Carduus membranaceus Lojac.
1902 Lojacono

3769² Carduus rugulosus Lojac.
(+1856) Tineo, (+1866) Gussone e Gasparrini in Lojacono III, 1902.

3770 Carduus marmoratus Boiss. et Held.
1882 Sommier in Arcangeli — 1884 Lojacono

3771 Carduus argyrous Biv.
1696 Cupani – 1813 Bivona – Bernardi – 1844 Gussone.
– β fastigiatus (Moris)
1828 Moris – 1834 Colla.
– γ confertus (Moris)
1840 Moris II.
3771' Carduus glaberrimus Lojac.
1902 Lojacono III.

3772 Carduus corymbosus Ten.
1696 Cupani – 1826 Presl – 1830 Tenore.
3772' Carduus Reuterianus Boiss
(+1892) Todaro in Lojacono III, 1902

3773 Carduus acicularis Bert.
1829 Bertoloni in Ann. Sc. nat. Bot. – 1830 Tenore

3774 Carduus leucographus L.
1785 Allioni – 1818 Sebastiani e Mauri
1834 Colla – 1844 De Notaris.
3774' Carduus hamulosus Ehrh.
Della Francia merid. e Reg. Danub. Probabilmente imputato e avventizio in Corsica.
1868 Debeaux.
3774² Carduus uncinatus M. B.
Della Russia merid. e Caucaso. Indicato di Basilicata, ma probabilmente avventizio
1830 Tenore – 1840 Barbazita, Saggio delle Fl. Luc.

Cirsium (Tourn.) Adans
3775 Cirsium gnaphaloides (Cir.) Spr.
1788 Cirillo – 1811 Tenore

3776 Cirsium stellatum (L.) Spr.
1685 Trionfetti – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1830 Tenore.

3777 Cirsium Casabonae (L.) DC.
1599 Imperato – (+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1824 Viviani

3778 Cirsium strictum Ten.
(+1673) Barrelier, ed. 1714 – 1685 Trionfetti – 1811 Tenore – 1819 Bertoloni

3779 Cirsium microcephalum Moris
1827 Moris – 1834 Colla.

3780 Cirsium afrum (Jacq.) DC.
Il tipo è proprio della reg. Balcanica ed Asia minore
– β niveum (Spr.)
1696 Cupani – 1820 Tenore – 1822 Presl.

3781 Cirsium syriacum (L.) Gaertn.
1664 Ray ed 1694 – 1696 Cupani – 1815 Sebastiani – 1824 Viviani.
3782 Cirsium Acarna (L.) Mönch.
1785 Allioni – 1798 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Tenore

35/0018-249

3783 Cissium italicum DC.
1696 Cupani – 1818 Sebastiani e Mauri; Savi – 1819 Bertoloni – 1844 Gussone –

3783' Cissium crinitum Boiss.
(+1892) Todaro in Lojacono III, 1902 – 1905 Briquet, Spicileg. corsic.

3784 Cissium lanceolatum (L.) Scop.
1615 Rinio 1551 Aldrovandi – 1563 Cesalpino – 1713 Tita – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1822 Pollini.
— β silvaticum (Tausch)
1904 Goiran; Fiori III – 1906 Gortani.
1899 Porpichat

3784' Cissium lanceolatum × arvense Wimm.
1894 Rodegher e Vananzi.

3784² Cissium Gerhardi Sch. Bip.
(C. lanceolatum × eriophorum)
1894 Arcangeli – 1889 Borbas in Nyman Consp. suppl.

3784³ Cissium sabaudum Ruhmer
(C. lanceolatum × acaule Naeg.)
1853 Rota – 1894 Rodegher e Vananzi.

3784⁴ Cissium Cardo-Leonis Lojac.
1902 Reina in Lojacono III

3784⁵ Cissium dubium Lojac.
(+1856) Tineo e (+1892) Todaro in Lojacono III.

3785 Cissium eriophorum (L.) Scop.
1583 Cesalpino – 1595 Pona – 1720 Pontederai – 1754 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.
— β spathulatum (Gaud.)
1822 Moretti – 1853 Rota – 1893 Gelmi – 1904 Goiran.
— γ spurium DC.
1879 Caldesi.
— δ Morisianum (Rchb.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1830 Tenore
— ε Lobelii (Ten.)
1830 Tenore – 1551 Aldrovandi.
— ζ Vallis-Daemonii (Lojac.)
1888 Lojacono in Naturalista sicil.
— η ferox (All.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1844 De Notaris.

3786 Cissium echinatum (Desf.) DC.
1844 Gussone; De Notaris

3787 Cissium scabrum (Poir.) B. et B.
1696 Cupani – 1796 Acria – 1817 Tineo – 1826 Gussone; Presl.
1651 Erb. messin. Cpr Zodda.

3788 Cissium arvense (L.) Scop.
1550 Petr. Cibo – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1606 Colonna – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli.
— β horridum W. Grab.
1893 Gelmi – 1904 Goiran
— γ incanum (Fisch.)
1893 Gelmi – 1904 Goiran

— δ argentatum (Vest)
1869 Visiani e Savarda — 1904 Goiran
— ε hydrophilum G. Beck
1904 Fiori III (Da ricercarsi)
— ζ macrostylum (Moretti)
1832 Moretti e Strobl in Reichenbach
3788[1] Cirsium Celakovskianum Krasan
(C. arvense × palustre Näg.)
1896 Weiss in Hall. Wolff. II — 1904 Goiran.
3788[2] Cirsium argentoides Porta
(C. argentatum × palustre)
1905 Porta in Atti acad. Rovereto

3789 Cirsium palustre (L.) Scop.
1745 Seguier — 1772 Maratti — 1773 Vitman — 1785 Allioni — 1802 Soffredi.
— β horridum Posp.
1899 Pospichal — 1904 Andr. Fiori, Pospichali in Fiori III.
3789[1] Cirsium semidecurrens Richt.
(C. palustre × tuberosum)
1891 Penzig — 1904 Goiran
3789[2] Cirsium Haleri Haussm. in Treuinf.
(C. palustre × Erisithales)
1879 Celak. in C. P. G.
3789[3] Cirsium rigidum Porta
(C. palustre × heleonidas)
1905 Porta in Atti acad. Rovereto.
3789[4] Cirsium Concilii Porta
(C. palustre × tricephaloides)
1905 Porta in Atti Acad. Rovereto

3789[5] Cirsium palustre × monspessulanum
1907 Gretino in Fiori IV G. G.
3789[6] Cirsium ?
3790 Cirsium polyanthemum (L.) DC
(1651 Seb. Mellinum. Cfr Zoldo)
1685 Ferrapetti — 1696 Caparri — 1789 Moris — 1819 Bertoloni
— β creticum (Urv.)
1806 Bivona-Bernardi — 1830 Tenore — 1844 Gussone

3791 Cirsium canum (L.) All.
1565 Michel
1720 Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745 Séguier — 1785 Allioni.
3791[1] Cirsium tiliaceum Schultz
(C. canum × palustre)
1899 Pospichal.

3792 Cirsium monspessulanum (L.) All.
1554 Matthioli — 1563 Cesalpino — 1585 Dalechamps — 1785 Allioni — 1869 Ardoino.
— β hirsuto-dentatum Holuby
1900 Selmi e Murr in Selmi
— δ floccosum Posp.
1899 Pospichal
— δ glomeratum Fiori
(†1876) Narducci in Fiori III.
3793[1] Cirsium hemipterum Borb.
(C. pannonicum × palustre)
1894 Arcangeli
3793[2] Cirsium Fregerianum Koch
(C. pannonicum × acaule)
1899 Pospichal

alla sez. seguente ↓

35/0018-250

3793³ Cirsium elatum Porta
(C. pannonicum × oleraceum)
1905 Porta in Atti Quad. Rovereto.

3793 Cirsium pannonicum (L. f.) Gaud.
1713 Tita – 1785 Allioni – 1822 Pollini
⁘
qui

3794 Cirsium acaule (L.) Scop.
1615 Rinio 1595 Pona – 1713 Tita – 1773 Vitman 1785 Allioni
1820 Moretti – 1822 Pollini
— β dubium (W.)
1853 Bertoloni IX p. 35 (ex descript.) –
1899 Pospichal.
3794¹ Cirsium acaule × palustre Gelmi.
1898? Gelmi, sec. Fiori III.
3794² Cirsium molle (Vill.)
(C. acaule × heterophyllum)
1888 Goller in Kerner Sched. Flor. austro-hung. n. 1778 –
1898 Gelmi.
3794³ Cirsium acaule × tricephalodes Fiori
1898 Gelmi e Eichenfeld in Gelmi.
3794⁴ Cirsium acaule × Erisithales Treuinf.
1898 Gelmi e Eichenfeld in Gelmi.
3794⁵ Cirsium fissibracteatum Peterm.
(C. acaule × spinosissimum)
2 (1898 Gelmi e Eichenfeld in Gelmi
1 ((+1895) Rostan in Fiori III
3794⁶ Cirsium rigens Ait.
(C. acaule × oleraceum)
1888 Goller in Kerner Sched. n. 1779
1904 Ausserdorfer in Fiori III.

3794⁷ Cirsium Scolopendron Porta
(C. helenoides × acaule)
1905 Porta in Atti Quad. Rovereto
3794⁸ Cirsium Solanum Porta
(C. Erisithales × acaule)
1905 Porta in Atti Quad. Rovereto.

3795 Cirsium tuberosum (L.) All.
1754 Séguier – 1785 Allioni – 1822
Pollini – 1844 De Notaris.
— β anglicum (DC.)
1837 De Candolle Prodrom. VI –
1830 Tenore – 1879 C. P. G.
3795¹ Cirsium medium All.
(C. tuberosum × acaule)
1785 Allioni – 1869 Ardoino – 1896 Bicknell
3795² Cirsium Lachenalii (Gm.) Koch
(C. tuberosum × oleraceum)
1904 Goiran
3796 Cirsium heterophyllum (L.) All.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini
1904 Goiran.
3796¹ Cirsium affine Tausch
(C. heterophyllum × oleraceum)
1899 Sauter.

3796² Cirsium ambiguum All.
(C. heterophyllum × tricephalodes)
1789 Allioni – 1805 Balbis (Cfr. Bertol. IX, 17)
1898 Gelmi.

3796³ Cirsium Hausmanni Rchb. f.
(C. heterophyllum × Erisithales)
1853 Hausmann in Reichenbach f. Ic.
fl. germ. XV — 1893 Gelmi
3796⁴ Cirsium purpureum All.
(C. heterophyllum × spinosissimum)
1785 Allioni — 1893 Gelmi.
3796⁵ Cirsium heterophyllum × spinosissimum
× tricephalodes Fiori
1898 Gelmi.
3797 Cirsium tricephalodes (Lam.) DC
2(1785 Allioni — 1806 Balbis — 1816 Pollini
1(1728 Pontedera — 1745 Séguier.
3797¹ Cirsium tricephalodes × arvense (Ces.)
1879 Cesati in C. P. G.

3798 Cirsium Erisithales Scop
1551 Aldrovandi — 1595 Pona — 1718
Pontedera — 1726 Zannichelli — 1745
Séguier — 1802 Mayari — 1806 Sternberg
— β ochroleucum (All.)
1785 Allioni — 1834 Colla.
3798¹ Cirsium Dollineri Sch. Bip.
(C. Erisithales × pannonicum)
1843 Naegeli in Koch — 1858
Hausmann in Verh. zool. bot. Gesell. —
1899 Pospichal.
3798² Cirsium Norrisii Bickn.
(C. Erisithales × tuberosum)
1896 Bicknell.
3798³ Cirsium digeneum Burn
(C. Erisithales × tricephalodes)
1888 Porta in Kern. Sched — n. 1770 e 1771

3798⁴ Cirsium Candolleanum Naeg.
(C. Erisithales × oleraceum)
1843 Naegeli in Koch.

3799 Cirsium spinosissimum (L.) DC
1713 Tita — 1718 Pontedera — 1785 Allio
ni — 1805 Re — 1837 Sandi.
— β Bertolonii (Spr.)
1819 Bertoloni — 1842 Puccinelli.
3799¹ Cirsium spinosissimum × palustre Gelmi.
1898 Gelmi.
3799² Cirsium spinosissimum × palustre
× Erisithales Gelmi.
1898 Gelmi.
3799³ Cirsium spinosissimum × palustre ×
heterophyllum Gelmi.
1898 Gelmi.
3799⁴ Cirsium aleutrense Porta
(C. spinosissimum × tricephalodes)
2(1886 Porta in Huter Enum plant.
exsicc. — 1898 Gelmi.
1((+1877) Parlatore in Fiori III
3799⁵ Cirsium flavescens Koch
(C. spinosissimum × Erisithales)
1843 Facchini in Koch

3800 Cirsium carniolicum Scop.
1840 Facchini in Ambrosi II 1857 —
1893 Porta in Gelmi. (1869 Vitiani e Saccardo
3800¹ Cirsium benacense Treuinf.
(C. carniolicum × Erisithales)
1893 Gelmi e Porta in Gelmi.

222 (+1320) Crescenzio, edit. 1471. 35/0018-251

3800² Cistium benacense Porta
(C. carniolicum × tricephalodes)
1905 Porta in Atti Anad. Rovor.

3801 Cistium oleraceum (L.) Scop.
1595 Pona — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1820 Moretti — 1822 Pollini.

3801' Cistium Pironianum Gortani
(C. oleraceum × palustre)
1906 Gortani II.

Galactites Moench (*)

3802 Galactites tomentosa (L.) Moench
1554 Mattioli (Spina alba) — 1583 Cesalpino — 1664 Ray, ed 1694 — 1696 Cupani — 1789 Acria — 1785 Allioni
— β elegans (All.)
1785 Allioni — 1853 Barla e Reichenbach in Reich. Ic. fl. germ. XV.

Silybum (Vaill.) Gaertn

3803 Silybum Marianum (L.) Gaertn
1550 Petr. Cibo — 1551 Aldrovandi II — 1554 Mattioli — 1561 Anguillara — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1818 Ruchinger.

Cynara (Vaill.) L

3804 Cynara Cardunculus L. R.
1562 Mattioli — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1798 Savi — 1818 Sebastiani e Mauri — 1824 Viviani.
— β Scolymus (L.) R
1550 Petr. Cibo — 1551 Mattioli — 1585 Durante — 1726 Zannichelli — 1822 Pollini
Coltivata fino dall'era romana e probabilmente derivata colla coltura dal tipo

Onopórdon (Vaill.) L

3805 Onopordon Acanthium L.
1415 Rinio — 1550 Petr. Cibo — 1563 Cesalpino — 1562 Mattioli — 1566 Calzolari — 1595 Pona — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Marzari; Suffren.

3806 Onopordon tauricum W.
1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Tenore — 1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.
— β elatum (S. et S.)
1819 Ryman, Consp. — 1883 Nicotra Prodr. flor. messan.
— γ apulum Fiori
1904 Adr. Fiori in Fiori III
— δ horridum (Viv.)
1824 Viviani — 1844 Gussone

3806' Onopordon ferox Rouy
1860 c. Kralik. Cfr Rouy, Bull. Soc. bot. de France 1896 e Fl. de France IX (1905)

Nota
(*) = Lupsia Neck. — Fiori III — nome da abbandonarsi sec. la Commiss. del Congr. bot. di Vienna, 1905, quantunque anteriore a Galactites.

3807 Onopordon Sibthorpianum B. et H.
1853? Grech-Delicata — 1904 Sommier, Ajuti in Fiori III.

3808 Onopordon illyricum L.
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda
1696 Cupani — 1664 Ray, ed. 1694 — 1789 Ucria — 1818 Sebastiani e Mauri — 1820 Tenore.
— β squarrosum Fiori.
1904 Andr. Fiori, Biondi in Fiori III.
— γ arabicum (L.)
1834 Colla — 1843 Moris.

3808' Onopordon acaulon L.
Oriundo di Spagna, Africa bor. occid.
Coltivato dal settecento e raramente trovato (spontaneo?) in Corsica
1772 Allioni — 1793 Zuccagni — 1801 Bonato — Spontaneo?
1898 Foucaud et Simon

Sottofam. Liguliflorae

Scolymus (Tourn.) L.

3809 Scolymus maculatus L.
1696 Cupani — 1735 Micheli — 1789 Ucria — 1818 Sebastiani e Mauri.
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda.

3810 Scolymus hispanicus L.
1615 Rinio
1550 Cibo — 1551 Aldrovandi — 1561 Anguillara — 1563 Cesalpino — 1595 Pona — 1631 Donati.

3811 Scolymus grandiflorus Desf.
1696 Cupani — 1820 Tenore — 1826 Gussone — 1834 Colla.

Catanánche (Vaill.) L.

3812 Catananche caerulea L.
1565 Mattioli — 1585 Durante — 1785 Allioni — 1844 Risso; De Notaris.
— β armerioides O. Deb.
1894 O. Debeaux (Da ricercarsi entro il confine d'Italia)

3813 Catananche lutea L.
1696 Cupani — 1697 Boccone — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1807 Bivona-Bernardi — 1818 Sebastiani e Mauri.

Cichorium (Tourn.) L.

3814 Cichorium spinosum L.
1599 Imperato — 1671 Boccone — 1697 Cupani — 1789 Ucria — 1844 Gussone.

3815 Cichorium Intybus L. R
1615 Rinio
1550 Petroll. Cibo — 1561 Anguillara — 1562 Mattioli — 1583 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1720 Pontedera.
— β glabratum (Presl)
1826 Presl — 1844 Gussone — 1879 Caldesi.
— γ indivisum (Vis.)
1562 Mattioli — 1822 Pollini — 1844 Gussone
— δ apulum Fiori.
1887 Groves — 1899 Fiori in Bull. soc. bot. ital.
— ε pumilum Jacq.
1826 Gussone — 1830 Tenore

35/0018-252

3816 Cichorium Endivia L. R

Forse originario dell'Asia orient.; coltivato però fino dalle era romane e talora avventizio.

1550 Gio (1615 Rivin Pet.) – 1554 Matthioli – 1561 Aguillara – 1585 Durante – 1822 Poiret.

Lapsana L.

3817 Lapsana communis L.

1532 Gio – 1551 Aguillara – 1566 Cesalpino – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier.

— β pubescens (Horn.)

1830 Tenore – 1904 Adr. Fiori III.

— γ hirta Guss.

1844 Gussone.

— δ macrocarpa (Coss.)

1879 Nyman, Consp. – 1908 Rouy X.

Rhagadiolus (Tourn.) Scop.

3818 Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. R.

1532 Gio – 1551 Aldrovandi (1561 Michel) – 1585 Cesalpino – 1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni

— β edulis (Gaertn.)

1585 Cesalpino – 1696 Cupani – 1789 Moris – 1818 Sebastiani e Mauri.

Arnoseris Gaertn.

3819 Arnoseris minima (L.) Link.

1785 Allioni – 1818 Savi – 1821 Nocca e Balbis – 1842 Racchetti.

Aposeris Neck

3820 Aposeris foetida (L.) Less.

(1702 Magnol) 1606 Colonna L. 1729 Micheli – 1745 Séguier – 1773 Vitman – 1802 Lessen.

Hyoseris L.

3821 Hyoseris radiata L.

1697 Bonone – 1785 Allioni – 1798 Savi – 1804 Bertoloni.

— β baetica (Sch. Bip.)

1844 Gussone – 1882 Arcangeli.

3822 Hyoseris scabra L.

1696 Cupani – 1697 Bonone – 1785 Allioni – 1789 Moris – 1806 Viviani – Bernardi.

Hedypnois (Tourn.) W.

3823 Hedypnois polymorpha DC.

1844 Gussone – 1879 C. P. G.

— β rhagadioloides (W.)

1802 Viviani – 1875 C. P. G.

— γ cretica (L.)

1802 Viviani – 1818 Sebastiani e Mauri – 1820 Tenore.

— δ tubiformis Ten.

1820 Tenore – 1844 Gussone.

Tolpis Adans.

3824 Tolpis barbata (L.) Gaertn.

1606 Colonna – 1664 Ray, ed. 1694 – 1785 Allioni – 1789 Moris – 1808 Savi – 1818 Sebastiani e Mauri.

— β umbellata (Bert.)
1803 Bertoloni — 1869 Bivona — Bernardi
Monograf. della Tolpidi — 1842 Pacchiarelli — 1844 D. Notaris.

3825 Tolpis virgata (Desf.) Bert.
1805 Bertoloni — 1804 Balbis — 1808 Savi — 1688 Trionfetti, Syllab. pl. hort. Rom

— β grandiflora (Ten.)
1829 Tenore — 1846 Gussone

Hypochaeris (Vaill.) L.

3826 Hypochaeris glabra L.
1606 Colonna — 1807 Bivona-Bernardi — 1785 Allioni — 1808 Brocchi — 1822 Pollini.

— β Balbisii (Lois.)
1810 Loiseleur — 1820 Mauri.

— γ arachnoidea (Poir.)
1829 C. P. G. — 1904 Fiori III.

3827 Hypochaeris radicata L.
1550 Clus. — 1551 alt. Crescentio — 1565 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni

— β neapolitana (DC.)
1835 Gussone in DC. Prodr. V — 1843 Moris — 1850 Kralik.

3828 Hypochaeris maculata L.
1702 Tilli — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re.

3829 Hypochaeris uniflora Vill.
1778 Tilli — 1785 Allioni — 1805 Re — 1806 Sternberg — 1822 Sandri in Pollini.

— β Facchinana (Ambr.)
1840 Facchini in Ambrosi II, 1857

3830 Hypochaeris cretensis (L.) Boiss.
1899 Fiori in Bull. Soc. bot. ital.

— β glabrata (Gust.)
1826 Gussone.

— γ hispida (W.)
1696 Cupani — 1816 Bivona-Bernardi 1844 Gussone.

— δ pinnatifida (Cirillo) ap. Ten.
(+1799) Cirillo — 1811 Tenore — 1843 Moris — 1872 N. Terracciano.

3831. Hypochaeris Achyrophorus L.
1696 Cupani — 1807 Bivona-Bernardi — 1817 Tineo — 1844 Gussone.

— β albicans (Ucria)
1796 Ucria — 1807 Bivona — 1817 Tineo 1822 Presl.

3832. Hypochaeris radicata (L.) C.P.G.
1696 Cupani — 1745 Sabbati — 1785 Allioni — 1804 Bertoloni — 1818 Sebastiani e Mauri.

Robertia DC.

3833 Robertia taraxacoides (Loisl.) DC.
1696 Cupani — 1807 Bivona-Bernardi — 1827 Brocchi — 1832 Bertoloni.

35/0018-253

Leóntodon L.

3834. Leontodon Muelleri (Schultz) Ball
1827 Müller in Schultz Bip., Flora
p. 725 (1833) — 1854 Nyman — 1843 Moris
1882 Arcangeli — 1897 Pengig

3835. Leontodon hirtus L.
1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli —
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1804 Bertoloni
— β Rothii (Ball.)
1850 — Grenier e Godron II

3836. Leontodon tuberosus L.
(+1711) Cupani, ed 1713 → 1789 Ucria —
(1785 Allioni) — 1804 Bertoloni — 1806
Balbis — 1822 Pollini.

3837. Leontodon cichoriaceus (Ten.) Boiss.
1814 Bivona-Bernardi — 1820 Tenore —
1837 Sanguinetti

3838. Leontodon autumnalis L.
1554 Matthioli, 1707 Martini — 1745 Seguier —
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1822 Pollini
— β pratensis (Rchb.)
1882 Arcangeli — 1853 Rota.

3839. Leontodon Taraxaci (All.) Lois.
1785 Allioni — 1754 Séguier — 1805 Re
1808 Biroli — 1822 Pollini

— β breviscapus (DC.) (in Bertoloni VIII
1835 Tenore — 1850 Orsini, Mauri, Gussone
— γ pedemontanus Chab.
(L. Taraxaci × pratensis?)
1896 Chabert in Bull. herb. Boiss.
p. 364.

3840 Leontodon pyrenaicus Gouan
1785 Allioni — 1805 Re — 1808 Biroli

3841 Leontodon hispidus L.
1606 Colonna — 1696 Cupani — 1726
Zannichelli — 1785 Allioni — 1802 Suffren;
Marzari.
— β opimus Bischoff
1853 Rota — 1904 Gortani in Fiori III.
— δ alpester DC.
1830 Tenore — 1879 Nyman
— ζ danubialis Jacq.
1551 Al. Brosch II
1726 Zannichelli — 1745 Séguier —
1785 Allioni.
— η Brumati (Schiede)
1855 Pirona — 1860 Tommasini in
Reichenbach f. Ic. fl. germ. XIX.
— ϑ hyoseroides (Wehr.)
1842 Trevisan — 1855 Pirona — 1869 Visiani e Saccardo
— ε pseudocrispus Schultz Bip.
1853 Rota — (+1877) Parlatore, Ferrari
in Fiori III — 1893 Gelmi.
— γ siculus (Guss.)
1844 Gussone — 1879 C. P. G.

3842. Leontodon Villarsii (W.) Lois.
1757 Allioni – 1818 Savi – 1825 Tenore
Ind. sem. horti Neap. – 1844 Risso;
De Notaris.

3843 Leontodon crispus Vill.
1745 Séguier – 1806 Balbis – 1802 Suffren
1808 Biroli – 1822 Pollini – 1844 De Notaris.
— β saxatilis (Ten.)
1820 Tenore
— γ apulus Fiori
1820 Tenore – 1877 Porta e Rigo –
1887 Groves
— δ tergestinus (Hoppe)
1855 Pirona – 1838 Hoppe in DC. Prodr.
VII – 1899 Pospichal.
— ε asper (W.)
1887 Groves – 1894 Arcangeli
— ζ intermedius (Hut. P. R.)
1877 Huter, Porta, Rigo Exsicc. ital. III
n. 236 – 1889 V. Terracciano.
— ν Autrani (Chab.)
1896 Chabert in Bull. herb. Boiss. p. 360

3844 Leontodon incanus (L.) Schrank
1772 Scopoli – 1802 Suffren 1822 Pollini – 1893 Gelmi.
— β tenuiflorus (Rchb.)
1883 Bizzozero – 1893 Gelmi. –
1853 Rota (1904 Goiran
— γ anomalus (Ball)
2 (1877 Rigo e Porta – 1897 Penzig – 1904 Gortani
1 (1850 Ball in Ann. and Mag. Nat. Hist.

3844¹ Leontodon subincanus Fiori
(L. incanus × tergestinus)
1905 Gortani in Fiori, Bull. soc. bot.
ital.
3844² Leontodon tenuiflorus × hastilis Christ.
1903 Christ in Bericht. Schw. bot. Gesellsch.
XIII.

3845 Leontodon Berinii (Bartl.) Rchb.
1820 Bartling, De littor. ac insul.
maris liburn. dissert. geogr. botan. Hannoverae
– 1850 Bracht, Montini ecc. in
Bertolon. VIII.
3845¹ Leontodon tulmetinus Fiori
(L. Berinii × tergestinus)
1905 Gortani in Fiori Bull. soc. bot. ital.
3845² Leontodon Gortani Fiori
(L. hispidus × incanus?)
1905 Gortani in Fiori, Bull. soc. bot. ital.

Picris L.

3846. Picris hieracioides L.
1583 Cesalpino – 1696 Cupani – 1745
1551 Aldrovandi Séguier – 1785 Allioni
— β spinulosa (Bert.)
1844 Bertoloni in Gussone – 1830 Tenore
— γ grandiflora (Ten.)
1830 Tenore – 1882 Arcangeli
— δ paleacea (Vest)
1879 Levier in C. P. G. – 1882 Arcangeli.
1893 Gelmi.

— ε hispidissima (Bartl.)
1825 Bartling in Bartl. et Wendl. Beitr. II, p. 125 — 1830 Reichenbach — 1837 Koch, I ed. — 1850 Tommasini in in Bertoloni VIII.
— ζ scaberrima (Guss.)
1830 Gussone in Tenore.

3847 Picris pauciflora W.
1785 Allioni — 1806 Balbis — 1867 Ardoino.

3848 Picris Sprengeriana (L.) Poir.
1842 Trevisan — 1844 De Notaris — 1899 Pospichal.

Helminthia Juss.

3849 Helminthia echioides Gaertn.
1550 Cibo — 1563 Cesalpino — 1726 Zannichelli — 1785 Allioni
— β pratensis (Chev.)
1854 Gussone — 1904 Fiori III — 1906 Gortani.
— γ humifusa (Trevir.)
1830 Tenore — 1850 Gussone in Bertoloni VIII.

3850 Helminthia aculeata (Vahl) DC.
1696 Cupani — 1826 Gussone — 1830 Tenore

Urospermum Scop.

3851 Urospermum picroides (L.) Schm.
1563 Cesalpino — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1804 Bertoloni

3852 Urospermum Dalechampii (L.) Schm.
1563 Cesalpino — 1585 Durante — 1696 Cupani — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1798 Savi

Geropógon L.

3853 Geropogon glaber L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1789 Ucria — 1843 Moris.

Tragopógon (Tourn.) L.

3854 Tragopogon pratensis L.
1415 Rino 1551 Aldrovandi — 1563 Cesalpino — 1554 Mattioli — 1585 Durante — 1720 Pontedera — 1785 Allioni — 1818 Ruchinger
— β minor Fr.
(+ 1886) Franzoni, ed. 1890 — 1896 Bicknell
— γ orientalis L.
1879 C. P. G. — 1891 Sauardo in Malpighia — 1904 Goiran.
— δ Tommasinii (Schultz Bip.)
1850 Tommasini in Bertoloni VIII.

3855 Tragopogon dubius Scop.
1532 Cibo — 1821 Nocca e Balbis — 1822 Cristofoli in Pollini — 1825 Re — 1830 Tenore — 1836 Tonini in Goiran 1904, II.

3856 Tragopogon porrifolius L. R
1550 Cibo – 1565 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1791 Bellardi – 1819 Bertoloni – 1896 Marchesetti.
— β australis (Jord.)
1867 Ardoino – 1882 Arcangeli
— γ trachyphyllus Bois.
1904 Fiori III (Da ricercarsi)
— δ Cupanii (Guss.)
1696 Cupani – 1789 Ucria – 1827 Zorapha – 1844 Gussone

3857 Tragopogon crocifolius L
1606 Colonna – 1697 Cupani – 1785 altron. (1550 Cibo) – 1818 Sebastiani & Mauri.
— β nebrodensis (Guss.)
1696 Cupani – 1844 Gussone
— γ Samaritani (Heldr. et Sart.)
1873 N. Terracciano (T. floccos.) – 1904 Patelli, Palomba, Ricca in Fiori III.

Scorzonera L
3858 Scorzonera laciniata L.
1671 Bonone – 1696 Cupani – 1726 Zannichell. – 1785 altron. – 1820 Moricand.
— β Salzmaniana (Boiss.)
1892 Colonna – 1844 Gussone – 1879 Nyman.
— γ Tenorii (Orph.)
1822 Orph. – 1826 Gussone – 1835 Tenore.
— δ intermedia (Guss.)
1844 Gussone – 1879 C. P. G.
— ε decumbens (Guss.)
1826 Gussone – 1830 Tenore
— ζ calcitrapifolia (Vahl)
1826 Gussone – 1850 Tenore.

3859 Scorzonera hirsuta L.
1606 Colonna – 1697 Cupani – 1785 altron. – 1822 Bellardi – 1830 Tenore – 1904 Fiori.
— villosiformis Fiori
1826 Gussone – 1830 Tenore – 1877 Porta, Rigo, Huter.

3860 Scorzonera villosa Scop.
1606 Colonna – 1772 Scopoli – 1802 Suffren – 1825 Gussone – 1850 Tommasini, Cernagai in Bertoloni VIII.
— β Callosa (Moris)
1827 Moris – 1879 C. P. G.

3861 Scorzonera hispanica L.
1550 Cibo – 1565 Matthioli – 1583 Cesalpino – 1585 Durante – 1713 Tilli – 1772 Scopoli – 1785 altron.
— β glastifolia (W.)
1835 Tenore – 1850 Moris, Ortino, Mauri in Bertoloni VIII
— γ trachysperma (Guenth.)
1879 Porta, Rigo – 1904 Adv. Fiori N. Terracciano in Fiori III.

35/0018-255

3862 Scorzonera aristata Ram.
1806 Balbis – 1816 Pollini – 1850 Bertoloni VIII – 1857 ambros.

3863 Scorzonera humilis L.
1846 De Notaris – 1850 Montini, Parlatore, Bracht u. Bertoloni VIII – 1857 ambros.
– β Calcifrons G. Beck.
1595 Pona – 1745 Séguier – 1822 Pollini.

3864 Scorzonera austriaca W.
1707 Martini – 1697 Tournef. – 1802 Lapeyr. – 1822 Pollini – 1857 ambros.
– β Hemphylla G. Beck
1893 Selmi – 1906 Gortani
– γ platyphylla G. Beck
1893 Selmi – 1906 Fiori III
1857 ambros.

3865 Scorzonera purpurea L.
1713 Hill – 1595 Pona – 1802 Lapeyr.
1906 Gortani
– β rosea (W.K.)
1850 Montini, Ambros, Arcangeli u. Bertoloni VIII.

3866 Scorzonera deliciosa Guss.
1664 Ray, ed. 1694 – 1696 Cupani – 1789 Moris – 1825 Guss. Prodr.

Taraxacum (L.) Juss.

3867. Taraxacum officinale Web.
1415 Rimini Pelt. 1551 Attaviti II. 1550 Cibo – 1558 Manioli – 1561 Anguillara – 1585 Calpino – 1720 Pontedera – 1726 Zannichell. – 1802 Lapeyr.; Mazzari.
– β alpinum (Scop.)
1850? Tenore – 1855 Rota – 1893 Selmi – 1904 Gortani – 1906 Gortani.
– γ Levigatum (W.)
1837 Sandri – 1855 Rota – 1869 Visiani e Saccardo – 1893 Selmi
– δ apenninum (Ten.)
1822 Bertoloni – 1826 Guglielmi – 1852 Tenore.
– ε palustre (Scop.)
1805 Re – 1818 Ruchinger – 1821 Romano 1811 Balbis
– ζ commutatum (Hoppe)
1879 Poyrichal – 1906 Fiori III – 1906 Gortani 1847 Hoppe in Koch
– η Pachoi (Sch. Bip.)
1900 Weill u. Hallier – Wohlf. II –
– θ minimum (Berg)
1876 Briganti – 1869 N. Terracciano u. atti Ist. Incoragg. Napoli.

3867¹ Taraxacum Caramanicae Lojac.
(†1846) Tineo – 1902 Lojacono III

3867² Taraxacum Gasparrinii Tineo
(†1856) Tineo u. Lojacono 1902 III
– 1880 Strobl

Chondrilla L.

3868 Chondrilla juncea L.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1560 Mattioli – 1585 Durante – 1592 Colonna – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1802 Suffren; Marzari

— β latifolia (M. B.)
1844 De Notaris – 1869 Visiani e Sauardo – 1904 Goiran.

Willemetia Neck.

3870 Willemetia stipitata (Jacq.) Hoffm.
1844 Cesati – (+1852) Facchini in Ambrosi 1857, II – 1879 C. P. G. – 1906 Gortani.

3869 Chondrilla prenanthoides Vill.
1664 Ray, ed. 1694 – 1764 Arduino – 1802 Suffren – 1772 Scopoli – 1864 Saccardo.

Sonchus (Tourn.) L.

3871 Sonchus tenerrimus L.
1696 Cupani – 1735 Micheli – 1785 Allioni – 1804 Bertoloni – 1821 Romano.

3872 Sonchus oleraceus L. R
1550 Cibo (Petri) – 1551 Aldrovandi II – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1802 Marzari; Suffren.

— β asper (Hill) R
1550 Cibo (Petri) – 1551 Aldrovandi II – 1560 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1697 Bonono – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1822 Pollini.

3873 Sonchus palustris L.
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1829 Pollini ~~(Spaccio da confermarsi)~~ (1850 Molineri in Bertoloni VIII.

3874 Sonchus arvensis L.
1554 Mattioli – 1585 Durante – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marzari; Suffren.

— β aliginosus (M. B.)
1883 Cocconi, Flora Bologn. – 1904 Goiran.

— γ maritimus (L.)
1696 Cupani – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1802 Suffren – 1818 Ruchinger.

Mulgedium Cass.

3875 Mulgedium alpinum (L.) Less.
1595? Pona – 1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1806 Sternberg – 1808 Biroli – 1822 Cristofoli in Pollini

3875' Mulgedium macrophyllum DC
Del Caucaso. Quasi naturalizzato intorno l'Istituto forestale di Vallombrosa, forse da precedente coltura. 1904 Fiori III.

Prenanthes (Vaill.) L.

35/0018-256

3876 Prenanthes purpurea L.
1583 Cesalpino – 1606 Colonna – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Margari.
— β tenuifolia (L.)
1785 Allioni – 1805 Re – 1808 Pirolo – 1822 Pollini

Lactuca (Tourn.) L.

3877 Lactuca perennis L.
1583 Cesalpino – 1554 Mattioli – 1588 Durante – 1595 Pona – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren
— β lenerrima (Pourr.)
1801 Balbis – 1805 Re – 1867 Ardoino.

3878 Lactuca virosa (L.) Pers.
1606 Colonna – 1696 Cupani – 1785 Allioni – 1805 Re.
— β latifolia Fiori
1830 Tenore – 1840 Barbagallo, Saggio fl. Lucan.
— γ chondrilliflora (Bor.)
1867 Moggridge in Ardoino.
— δ ramosissima (Gr. Godr.)
1757 Allioni – 1844 Risso; Da Notaris

3879 Lactuca Saligna L.
1726 Pontedera – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Margari – 1818 Ruchinger

— β virgata (Tausch)
1904 Goiran; Fiori III – 1906 Gorbani 1896 Marchesetti

3880 Lactuca Scariola L.
1554 Mattioli – 1563 Cesalpino – 1585 Durante – 1595 Pona – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Margari.
— β augustana (All.)
1785 Allioni – 1834 Colla – 1850 Balbis in Bertoloni VIII.
— γ sativa (L.) R
1550 Gibo – 1554 Mattioli – 1561 Anguillara – 1583 Cesalpino – 1822 Pollini.

3881 Lactuca virosa L. R
1583 Cesalpino – 1726 Zannichelli – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1805 Re – 1822 Pollini.

3882 Lactuca quercina L.
1802 Bellardi – 1834 Colla – 1896 Bicknell.
— β Chaixii (Vill.)
1830 Reichenbach – 1850 Tommasini in Bertoloni VIII.

3883 Lactuca longidentata Moris.
1827 Moris – 1834 Colla

3884 Lactuca muralis (L.) Fres.
1563 Cesalpino – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Suffren; Margari.

Launaea Cass.

3885 Launaea resedifolia (L.) O Ktze
1674 Boccone – 1696 Cupani – 1807 Bivona-Bernardi – 1826 Jan.

Reichardia Roth

3886 Reichardia picroides (L.) Roth
1563 Cesalpino – 1696 Cupani – 1757 Allioni – 1789 Ucria – 1804 Bertoloni.
— β maritima (Boiss.)
1904 Fiori III.
— γ intermedia (Jan)
1826 Jan – 1879 Nyman – 1882 Arcangeli – 1902 Lojacono III

3887 Reichardia tingitana (L.) Roth
Il tipo nativo di Spagna, Canarie, Africa sett. ecc., fu trovato avventizio in Liguria
1897 Penzig
— β orientalis (L.)
1902 ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ Lojacono III
1904 Ajuti, Ross in Fiori III.

Zacyntha (Tourn.) Gaertn.

3888 Zacyntha verrucosa Gaertn
1532 Cibo – 1562 Cesalpino – 1565 Mattioli – 1802 Marzari – 1818 Sebastiani e Mauri – 1819 Bertoloni –

Melitella Somm.

3888' Melitella pusilla Somm.
1907 Sommier in Nuovo giorn. bot. italiano.

Andryala L.

3889 Andryala integrifolia L.
1696 Cupani – 1785 Allioni – 1804 Savi.
— β sinuata (L.)
1785 Allioni – 1830 Tenore – 1843 Moris
— γ undulata (Presl)
1822 Presl – 1844 Gussone.
— δ tenuifolia (DC.)
1827 Tineo, Cat. hort. Panorm. – 1844 Gussone.
— ε dentata (S. et S.)
1835 Tenore – 1844 Gussone.
— ζ cosyrensis (Guss.)
1844 Gussone
— η longipes E. Petit
1884 E. Petit
3890 Andryala ragusina L.
1899 Falqui Contr. alla flora del bacino del Liri (Da confermare)
— β incana (DC.)
1850 Soleirol, Kralik in Grenier e Godron II.

Pterotheca Cass.

3891 Pterotheca nemausensis (Gouan) Cass.
1785 Allioni – 1791 Bellardi – 1844 De Notaris

35/0018-257

3892 Pterotheca bifida (Vis.) F. et M.
1850 Visiani, Biasoletto, Tommasini in Bertoloni VIII

Crepis (Vaill.) L.

3893 Crepis Dioscoridis L.
1785 Allioni – 1803 Balbis ed in Pollini 1822, II – 1808 Savi
1830 Tenore – 1812 Casale e Gussone in Tenore Racc. viaggi fisico botan.

3894 Crepis aspera L.
1802? Suffren – 1850 Marzialetti in Bertoloni VIII.

3895 Crepis rubra L.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1820 Tenore.
— β scapigera Ten.
1830 Tenore.
— γ tenuis Ten.
1830 Tenore.

3896 Crepis foetida L.
1696 Cupani – 1720 Pontedera – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1785 Allioni
1802 Marzari; Suffren.
— β glandulosa (Guss.)
1825 Gussone – 1826 Presl
— γ insularis (Moris et De Not.)
1839 Moris e De Notaris
— δ rhaeadifolia (M. B.)
1879 Casati in C. P. G – 1899 Pospichal

3897 Crepis albida Vill.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1867 Arddino.

3898 Crepis alpina L.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1853 Rota, 1871 Zersi.

3899 Crepis vesicaria L.
1606 Colonna – 1653 Volpari – 1773 Vitman – 1789 Ucria – 1798 Savi – 1828 Biasoletto in Freyn 1877.
— β purpurea (Guss.)
1671 Bocconi – 1697 Cupani – 1816 Bivona-Bernardi.
— γ taraxacifolia (Thuill.)
1532 Cibo (+1711) Cupani ed 1713.
1804 Balbis; Bertoloni – 1813 Bivona-Bernardi.
— δ spathulata (Guss.)
1821 Gussone in Cat. plant. Bocca dif.

3900 Crepis bursifolia L.
1696 Cupani – 1697 Bocconi – 1785 Allioni – 1789 Ucria – 1806 Bivona-Bernardi.
— β hirticalyx Fiori
1844 Gussone – 1904 Fiori III.

3901 Crepis bellidifolia Lois
1828 Moris; Duby — 1879 Allioni
C. P. Gia — 1806 Bivona-Bernardi.
— β Thuretii (Sarato)
1904 Sarato in Fiori III.
— γ caespitosa (Moris)
1843 Moris — 1850 Bernard in Grenier e Godron.

3902 Crepis leontodontoides All.
1696 Cupani — 1789 Allioni — 1807 Bivona-Bernardi.
— β Preslii Nicotra
1822 Presl — 1854 Sassone — 1883 Nicotra, Prodr. Fl. Messan. II.

3903 Crepis setosa Hall.
1551 Aldrovandi — 1726 Zannichelli — 1801 Balbis
1745 Séguier — 1802 Suffren.

3904 Crepis Suffreniana Lloyd.
1865 P. Savi e Caruel in Caruel — 1879 C. P. G. — 1904 Marcello in Bull. Soc. Nat. Napoli —
— β apula Fiori
1887 Groves — 1904 Martelli e Groves in Fiori III.

3905 Crepis neglecta L.
1532 Cibo — 1723 Tilli — 1735 Micheli — 1795 Savi — 1802 Suffren — 1852 Rota.
— β corymbosa (Tenore)
1830 Tenore — 1879 Nyman.
(Cesati e Caruel in)

3906 Crepis virens L. 1842 Trevisan
1785 Allioni — 1805 Re — 1844 Cesati — 1852 Rota.

3907 Crepis nicaeensis Balb.
1806 Balbis — 1834 Colla — 1844 Risso — 1867 Ardoino.

3908 Crepis tectorum L.
1785 Allioni — 1816 Pollini — 1831 Romano — 1852 Rota — 1871 Zersi.

3909 Crepis biennis L.
1802 Suffren — 1808 Biroli — 1821 Romano — 1822 Pollini — 1837 Sandi. 1842 Trevisan.

3910 Crepis pulcra L.
1606 Colonna — 1745 Séguier — 1785 Allioni — 1808 Biroli — 1818 Ruchinger. 1822 Pollini

3911 Crepis lacera Ten.
1723 Tilli — 1815 Sebastiani — 1820 Tenore — 1834 Colla.

3912 Crepis chondrilloides Jacq.
1802 Suffren — 1810 Brignoli — (1772 Scopoli) — 1830 Reichenbach — 1855 Pirona
— β Kerneri Fiori.
(+1876) Venzo in Fiori III

35/0018-258

3913 Crepis pygmaea L.
1697 Boccone – 1785 Allioni – 1835 Tenore – 1846 Comolli.

3914 Crepis tergloviensis (Hacq.) Kern.
1879 Ball, edit. 1896, ed in Fiori III.
1782 Hacquet

3914' Crepis hybrida Kern.
(C. tergloviensis × Jacquini)
1907 Huter in Oest. bot. Zeitschr. Herbar-Studien

3915 Crepis Jacquini Tausch
1822 Pollini – 1826 Jan –
(+1770) Moreni in Pollini II, 1822 –
1904 Goiran.

3916 Crepis jubata Koch
1895 Muret e Bernoulli in Jaccard Cat. fl. Valais – 1878, C. P. G.

3917 Crepis alpestris (Jacq.) Tausch
1882 Gibelli e Pirotta – 1900 Sommier Bull. Soc. bot. ital.
1850 Lagger in Bertoloni VIII – 1879 C. P. G.
— β mucronata (Bert.)
1850 Ambrosi e Montini in Bertoloni VIII – 1893 Gelmi.
— γ Allionii Froel.
1785 Allioni – 1838 Froelich in DC. Prodr. VII.

3918 Crepis pontana (L.) Dalla Torre
1664 Ray, edit. 1694 – 1697 Boccone – 1785 Allioni – 1805 Re

3919 Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre
1785 Allioni – 1802 Suffren – 1805 Re – 1893 Gelmi
— β pappoleuca (Froel.)
1904 E. Ferrari in Fiori III.
— γ glabrescens Froel.
1904 E. Ferrari in Fiori III.
— δ Degenianae Borb.
1902 Degen ap. Borb. in Mag. bot. Lapok.

3920 Crepis blattarioides (L.) Vill.
1785 Allioni – 1808 Biroli – 1851 Boni in Hausmann – 1853 Rota.

3921 Crepis mollis (Jacq.) Aschers.
1848 Comolli – 1882 Arcangeli
— β succisifolia (All.)
1785 Allioni – 1834 Colla – 1850 Balbis in Bertoloni VIII – 1853 Rota.

3922 Crepis paludosa (L.) Moench
1726 Zannichelli – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1822 Pollini – 1837 Sandi

3923 Crepis praemorsa (L.) Tausch
1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Marjari – 1806 Sternberg – 1816 Pollini.

— β Froelichiana (DC.)
1848 Comolli — 1853 Rota —
— γ incarnata (Walf.)
1772 Scopoli — 1802 Soffren — 1804
Sternberg — 1822 Pollini.

3924 Crepis aurea (L.) Rchb
1713 Tilli — 1754 Seguier — 1785
Allioni — 1802 Soffren + Nagari —
1816 Pollini.
— β Columnae (Tenore)
1606 Colonna — 1826 Guglione — 1823
Tenore —

3925 Crepis bulbosa (L.) Tausch
1583 Cesalpino — 1592 Colonna — 1696
Cupani — 1785 Allioni — 1867 Ardoino.

3925' Crepis pulmonarifolia Froel.
1838 Jan in Froelich ap. DC. Prodr
VII (Da confermare)

3925² Crepis paniculata Presl
1826 Presl — 1846 Guglione (Da
confermare)

3925³ Crepis setosa (Presl) Sall.
(+ 1711) Cupani, edit. 1713 — 1822
Presl — 1846 Guglione (Da con
fermare)

Hieracium L.

3926 Hieracium staticifolium Vill
1754 Seguier — 1785 Allioni — 1802 Soff
fren.

3927 Hieracium Rostani Arv. T.
1888 Rostan in Arvet — 1896 Bicknell
(H. staticifolium × murorum ?)

3928 Hieracium Pseudopilosella Ten
1840 Barbagita Sagg. Fl. Lucan. —
1842 Tenore e Guglione

3929 Hieracium Pilosella L.
1532 Gio — 1558 Mattioli — 1561 An
guillara — 1563 Cesalpino — 1586
Colonna — 1585 Durante — 1785 Allioni

3929' Hieracium poliocephalum N. P.
(H. tardans × glaciale)
1901 Zahn. (da inserirsi avanti prima del n. 3930)

— β nigrescens Gr. Godr.
1906 Belli in Fiori III.
— δ pachylodes N. P.
1906 Belli in Fiori III.
— γ stolonifrum Belli
1906 Belli in Fiori III.
— ε vicanum (Arv. T.)
1906 Belli in Fiori III.
— ζ murorum Belli
1906 Belli in Fiori III — 1906 Fiori

35/0018-259

— η depilatum Belli
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani.
— δ tardans N. P.
1883 Burnat e Gremli — 1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— ι anadenum Belli
1904 Belli in Fiori III — 1904 Goiran.
— κ villosissimum Belli
1904 Belli in Fiori III

3930 Hieracium Hoppeanum Schult
1595? Pona — 1822 Pollini — 1850 Montini in Bertoloni VIII — 1904 Goiran.
— β stenolepis Bellis
1830 Tenore — 1844 Gussone — 1906 Gortani.

3930¹ Hieracium hypeuryum N. P.
(H. Hoppeanum × Pilosella)
1903 Zahn in Chevard

3930² Hieracium latisquamum N. P.
(H. Hoppeanum × Auricula)
1904 Chevevard

3930³ Hieracium lathraeum N. P.
(H. Hoppeanum × brachycomum)
1901 Zahn

3931 Hieracium Pelleterianum Mérat
1883 Burnat e Gremli — 1894 Arcangeli — 1904 Goiran; Belli in Fiori III.
— β depilatum Belli
1904 Belli in Fiori III

3932 Hieracium Auricula L. e. p.
1745 Séguier 1785 Allioni — 1802 Suffren; Marzari — 1819 Bertoloni
— β melanocephalum Belli
1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani.
— γ chlorolepis Belli
1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani.

3932¹ Hieracium xystolepium N. P.
(H. Pelleterianum × Auricula)
1901 Zahn

3932² Hieracium Soleirolianum Arv. T. et Briq.
1901 Burnat e Briquet ap. Briquet, Ann. Lab. et Jard. bot. Genève

3932³ Hieracium Kralikii Rouy
1850 Kralik in Rouy IX.

3933 Hieracium serpyllifolium Fr.
1855 Huet, Pl. neap. exsicc. — 1878 C. P. G.
— β tardoum Belli
1843 Moris (H. Auricula)

3934 Hieracium auriculiforme Fr.
(H. Auricula × Pilosella?)
1894 Arcangeli 1899 Pospichal — 1904 Ferrari, Vallino Gola ecc. in Belli ap. Fiori III.
— β Schultesii (F. Schultz)
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3935 Hieracium brachiatum Bert.
1815 Bertoloni in DC. Fl. Franc V –
1842 Puccinelli – 1844 De Notaris.
— β anomalum Belli
1904 Belli in Fiori III.

3936 Hieracium Smithii Arv. T.
(H. glaciale × Auricula?)
1904 Belli in Fiori III – 1906 Gortani

3937 Hieracium glaciale Reyn.
1806 Balbis – 1848 Comolli – 1850
Bonjean in Bertolon. VIII.
— β Laggeri (Schultz Bip.)
1875 Favre – 1883 Burnat e Gremli
– 1878 C. P. G – 1901 Zahn

3937' Hieracium densicapillum N.P.
(H. sabinum × glaciale)
1905 Chenevard e Braun
3937² Hieracium pumilum Lap.
1905 Soulié in Rouy IX.

3938 Hieracium corymbuliferum Arv. T.
1904 Ferrari, Berrino, Longa in Belli
ap. Fiori III.

3939 Hieracium Faurei Arv. T.
1894 Arcangeli – 1904 Rostan, Ferrari, Longa, Mattirolo in Belli ap.
Fiori III – 1906 Gortani
— β hypoleucum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III.

— γ subrubens Arv. T.
1904 Belli in Fiori III

3940 Hieracium furcatum Hoppe
1850 Montini in Bertoloni VIII –
1878 C. P. G. – 1893 Gelmi.
— β stolonosum Belli
1904 Belli in Fiori III – 1906 Gortani

3940' Hieracium brachycomum N.P.
(H. furcatum × Auricula)
1904 Chenevard

3941 Hieracium alpicola Schl.
1875 Favre – 1882 Arcangeli – 1904
Chiovenda in Belli ap. Fiori III
3941' Hieracium Chaberti F.O. Wolf
(H. alpicola × Laggeri)
1894 F. O. Wolf in Bull. Soc. bot. de
France.

3942 Hieracium cymosum L.
1822 Pollini – 1850 Moretti in Bertoloni
1745 Séguier VIII – 1853 Rota
— β cymellum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III
— γ Nestleri (Vill.)
1904 Goiran; Belli in Fiori III.
3942' Hieracium sciadophorum N.P.
(H. cymosum × Auricula)
1901 Zahn

35/0018 - 260

3942² Hieracium cruentum N. P.
(H. cymosum × aurantiacum)
1901 Zahn

3943 Hieracium sabinum Seb. e M.
1606 Colonna — 1785 Allioni (H. praemors.)
1813 Sebastiani e Mauri — 1844 De Notaris — 1867 Ardoino.

3943¹ Hieracium tendinum N. P.
(H. sabinum × Smithii)
1901 Gelmi in Zahn.

3944 Hieracium florentinum All.
1415 Rinio 1550 Cibo — 1726 Zannichelli — 1754 Séguier — 1785 Allioni — 1802 Suffren.
— β stagalligerum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— ε praealtiforme Belli.
1904 Belli in Fiori III.
— γ subfallax Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— δ praealtum (Vill.)
1551 Aldrovandi — 1904 Belli in Fiori III
— ζ Berninae Griseb.
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— η glareosum Koch
1843 Koch — 1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— ϑ piloselloides (Vill.)
1563 Cesalpino — 1893 Gelmi — 1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani

— ι obscurum (Rchb.)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— κ litoranum Belli
1904 Belli in Fiori III

3944¹ Hieracium tephroides N. P.
(H. florentinum × tardans)
1901 Zahn

3944² Hieracium sulphureum Doell.
(H. florentinum × Auricula)
1901 Zahn — 1906 Gortani

3944³ Hieracium calodon Tausch
(H. florentinum × echioides)
1901 Zahn

3944⁴ Hieracium sclerotrichum Arv. T.
(H. praealtum × cymosum)
1905 Burnat in Briquet Spicileg. corsic.

3945 Hieracium hybridum Chaix
(H. Pilosella × Pelleterianum × cymosum?)
1888 Arvet — 1896 Bicknell — (+1895) Rostan; Ferrari in Belli ap. Fiori III

3946 Hieracium florentinoides Arv. T.
(H. florentinum × Pilosella?)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
1899 Pospichal
— β argenteum (N. P.)
1904 Belli, Ferrari in Belli ap. Fiori III
— γ caricinum Arv. T.
1904 Goiran in Belli ap. Fiori III.

3947 Hieracium Bauhini Schultes
1850 Tommasini in Bertoloni VIII —
(†1866) Gastone in Fiori III — 1906 Gortani.
— β trichocalycinum Arv. T.
1904 Martelli in Belli ap. Fiori III

3948 Hieracium aurantiacum L.
1606 Colonna — 1785 Allioni — 1808
Biroli — 1822 Pollini — 1893 Zahn

3948' Hieracium stoloniflorum W. K
(H. aurantiacum × Pilosella)
1901 Zahn

3948² Hieracium substoloniflorum N. P.
(H. aurantiacum × Hoppeanum)
1901 Zahn.

3948³ Hieracium pyrranthes N. P.
(H. aurantiacum × Auricula)
1901 Zahn

3948⁴ Hieracium aurantellum N. P.
(H aurantiacum × glaciale)
1901 Zahn

3948⁵ Hieracium fulgens N. P.
(H. aurantiacum × furcatum)
1901 Zahn.

3948⁶ Hieracium fuscum Vill
(H. aurantiacum × Sendtneri)
1901 Zahn.

3948⁷ Hieracium Montzianum Heg.
1899 Sauter.

3949 Hieracium aurantiacoides Arv. T.
(†1895) Rostan; Mussa, Novelli in
Belli ap. Fiori III.

3950 Hieracium Burnati Burn. et Gr.
1883 Burnat e Gremli — (†1895)
Rostan; Ferrari, Vallino ecc. in
Belli apud Fiori III.
— β Florianum Belli
1904 Arv. Fiori in Belli ap. Fiori III.

3951 Hieracium hispidulum Arv. T.
1904 Chiovenda, Bicknell in Belli
ap. Fiori III — 1906 Gortani

3952 Hieracium Iguelidum Arv. T.
(†1886) Franzoni in Belli ap Fiori III
— (H. humile × murorum ?)

3953 Hieracium lacerum Rent.
1904 Longa e Goiran in Belli ap
Fiori III.

3954 Hieracium humile Jacq.
1812 Vacchetti — 1850 Rainer, Gian
nini, Margheretta in Bertoloni VIII —
1904 Belli in Fiori III.
— β glabrescens Belli.
1904 Belli in Fiori III
— γ hirsutum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— δ opimum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III.

35/0018-261

→ qui

3955 Hieracium Bocconei Griseb.
1697 Bocconi – 1853 Grisebach in Goetting. Abhand. V – (+1895) Rostan; Negri, Chiovenda in Belli ap. Fiori III – 1906 Gortani.

3956 Hieracium alpinum L.
1606 Colonna – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1844 De Notaris – 1855 Pirona.
— β tubulosum (Huter)
1904 Huter in Belli ap. Fiori III – 1906 Gortani.
— γ Halleri (Vill.)
1850 Bertero, Moris, De Notaris, Montini in Bertoloni VIII.

3954[1] Hieracium Kaeserianum Zahn
(H. humile × glaucum)
1901 Correns in Zahn
3954[2] Hieracium caerulaceum Arv. T.
(H. humile × Schmidtii)
1901 Zahn
3954[3] Hieracium bernense Christener
1903 Chenevard – 1901 Zahn
3954[4] Hieracium Vollmannii Zahn
(H. alpinum × vulgatum × silvaticum)
1901 Zahn

3956[1] Hieracium rhaeticum Rota (1853) non Fr.
1853 Rota

3956[2] Hieracium cochlearifolium Zahn
(H. alpinum × glandulosum)
1901 Zahn

3956[3] Hieracium Areolae Murr.
(H. alpinum × silvaticum × villosum)
1901 Zahn
3956[4] Hieracium dolichaetum Arv. T.
(H. alpinum × vulgatum)
1901 Zahn
3956[5] Hieracium nigrescens W.
(H. alpinum × silvaticum)
1901 Zahn
3956[6] Hieracium cadinense Evers
(H. amplexicaule × porrifolium)
1893 Gelmi – 1896 Evers – 1901 Zahn

3957 Hieracium cochleare Huter
1884 Huter in Dalla Torre, Atlas Alpenfl. 1901 Zahn – 1906 Gortani

3958 Hieracium stenodontum Arv. T. et Bell.
1904 Longa in Belli ap. Fiori III – 1906 Gortani

3959 Hieracium rhaeticum Fr. (1862) non Rota
1882 Arcangeli – 1904 Gola, Chiovenda, Carestia in Belli ap. Fiori III – 1906 Gortani.

3960 Hieracium neglectum Arv. T.
1888 Arvet – 1904 Gortani in Belli ap. Fiori III.

3961 Hieracium Pseudocerinthe Koch
1850 Bernard in Grenier e Godron — 1882 Arangli — 1878 C. P. G. — 1904 Mabbrolo, Ferrari em. in Belli ap. Fiori III.

3962 Hieracium Berardianum Arv. T.
1888 Arvet — 1904 Belli in Fiori III; Govan — 1906 Gortani
— β eriopodum Arv. T.
1904 Gola in Belli ap. Fiori III
— γ virgatum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III.
— δ Derbezianum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III.

3963 Hieracium amplexicaule L.
1532 Cbo — 1718 Pontedera — 1745 — Lejeune — 1785 allioni — 1817 Bertoloni — 1822 Rothan.
— β palaeum (Arv. T.)
1896 Bicknell — 1904 Belli in Fiori III
— γ subhirsutum Arv. T.
1901 Zahn — 1904 Belli in Fiori III
— δ petrophilum
1901 Zahn — 1904 Belli in Fiori III

3964 Hieracium pulmonarioides Vill.
1875 Favre — 1878 C. P. G. — 1882 Arrangeli — 1901 Zahn.

3965 Hieracium pedemontanum Burn. et Gr.
1883 Burnat e Gremli — 1896 Bicknell

3966 Hieracium urticaceum Arv. T.
1860 De Notaris in Reichenbach fil. Ic. fl. germ. XIX (+1902) Nori; Sommier in Belli ap. Fiori III.

3967 Hieracium rupigenum Arv. T.
1904 Chiovenda, Gola in Belli ap. Fiori III.

3963' Hieracium auriculifolium Arv. T. et Br.
1905 Chenevard e Braun (Cfr. anche Bull. Herb. Boiss. 1894, p. 626)

3965' Hieracium Garibaldianum Arv. T. et Gaut.
(H. amplexicaule × caesium?)
1905 Ferrari e Valbusa in Rouy IX —
1905 Burnat in Burnat Spicil. corsicum.

3968 Hieracium Pseudopicris Arv. T.
1901 Zahn — 1904 Chiovenda, Huter in Belli ap. Fiori III.

3969 Hieracium conyzaceum Arv. T.
(+1893) Pollerini; Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3970 Hieracium convizifolium Arv. T.
(+1898) Sibelli; Belli, Ferrari in Belli ap. Fiori III

3971 Hieracium ochroleucum Schl.
1882 Payot — 1878 C. P. G. — (+1895) Rohan; Ferrari, Bicknell in Belli ap. Fiori III.

35/0018-262

— β fuscum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ hirsutum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III

3972 Hieracium picroides Vill.
1878 C. P. G. — 1883 Burnat e Gremli
— 1904 Ferrari, Belli, Hutor in
Belli ap. Fiori III
— β cinereum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ hirsutum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— δ tantosianum (Burn. et Gr.)
1883 Burnat e Gremli

3972' Hieracium Christii Arv. T.
(H. juranum × picroides)
1901 Zahn

3973 Hieracium cinerascens Wulf.
1785 Allioni — 1848 Comolli — 1850 Ma
lineri, Balbis, Bertero, Moretti ecc
in Bertoloni VIII.
— β tabulosum (Lam.)
1904 Belli in Fiori III

3974 Hieracium adenoclinium Arv. T.
2 (1896 Bicknell — 1904 Ferrari, Hutter,
Groves in Belli ap. Fiori III —
1 (1881 Reverchon, Plant. Sard. exsicc.

3975 Hieracium viscosum Arv. T.
(+1874) Grex; Gibelli, Rostan, Ferrari in Belli
ap. Fiori III.
— β ambigens Arv. T.
1883 Burnat e Gremli

3976 Hieracium consimile Arv. T.
(+1895) Rostan; Bicknell, Ricca, Fer
rari in Belli ap. Fiori III.

3977 Hieracium polyadenum Arv. T.
1883 Burnat e Gremli —
(+1878) Haussmann; Rostan, Fontana in
Belli ap. Fiori III.
— β calcifolium Belli
1904 Belli in Fiori III
— γ interruptum Belli
1904 Belli in Fiori III

3978 Hieracium asperum Arv. T. et Belli
1904 Belli in Fiori III

3979 Hieracium Bicknellianum Belli et Arv. T.
1896 Bicknell — 1904 Ferrari, Berto
ni, Bicknell in Belli ap. Fiori III

3980 Hieracium neocerinthoides Arv. T.
1904 Chiovenda in Belli ap. Fiori III

3981 Hieracium saxatile Vill.
1853 Rota — 1878 C. P. G. — 1883 Burnat
e Gremli. 1867 Ardoino.

3982 Hieracium longifolium Schl.
1868 Tissière – 1904 Ferrari, Masson in Belli ap. Fiori III

3983 Hieracium intertextum Arv. T.
(+1871) P. Savi; Beccari in Belli ap. Fiori III – 1901 Zahn.

3984 Hieracium Jordani Arv. T.
1904 U. Martelli in Belli ap. Fiori III.

3985 Hieracium lanatum (L.) Vill.
1785 Allioni – 1842 Puccinelli – 1844 De Notaris – 1867 Ardoino.

3985' Hieracium pogonites N. P.
(H. tomentosum × piliferum)
1901 Zahn

3986 Hieracium Liottardi Vill.
(+1895) Rostan; Vallino, Ferrari, Gola, Berrino in Belli ap. Fiori III.

3987 Hieracium andryaloides Vill.
1875 Favre – 1878 C. P. G. – 1867 Ardoino
1785 Allioni – 1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3988 Hieracium Ferrarianum Belli
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III

3989 Hieracium lanticum Arv. T.
(+1898) Carvel in Belli ap. Fiori III.

3990 Hieracium thapsoides Arv. T.
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III
— β coronarifolium Arv. T.
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3991 Hieracium Gibellianum Arv. T. et Belli
1904 Vallino, Gola, Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3992 Hieracium melandryfolium Arv. T.
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III

3993 Hieracium menthifolium Arv. T.
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3994 Hieracium pteropógon Arv. T.
(+1867) Lisa; Rostan, Mussa, in Belli ap. Fiori III

3995 Hieracium Pámphili Arv. T.
1896 Bicknell – 1904 Belli in Fiori III
— β eriophyllum (W. e. p.)
1878 C. P. G. – 1883 Burnat e Gremli
1896 Bicknell

3996 Hieracium Burnati Arv. T.
1885 Naegeli e Peter – 1904 Belli, Vallino, Ferrari, Gola in Belli ap. Fiori III.

3997 Hieracium Michelianum Arv. T. et Belli
1904 Ferrari, Bicknell in Belli ap. Fiori III.

35/0018 - 263

3998 Hieracium corruscans Fr.
1852 Reuter, Cfr. Burnat e Gremli
1883, p. 8 — 1878 C. P. G. — 1904
Ferrari in Belli ap. Fiori III.

3999 Hieracium chloropsis Gr. Godr.
1843 Reichenbach, in Rchb. Ic.
fl. germ. XIX (1860) — 1867 Ardoino —
1883 Burnat e Gremli.
— β chloropsiforme (Arv. T.)
(+1895) Rostan in Belli ap. Fiori III

4000 Hieracium digeneum Burn. et Gr.
1883 Bicknell in Burnat e Gremli
— 1904 Belli in Fiori III.

4001 Hieracium pseudolanatum Arv. T.
(+1895) Rostan in Belli ap. Fiori III

4002 Hieracium Portanum Belli.
1877 Huter, Porta Rigo Pl. exs. ex it. ital.

4003 Hieracium rupestre All.
1789 Allioni — 1850 Molineri, Baltis
in Bertoloni VIII — 1867 Ardoino.

4004 Hieracium Staui Belli
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III

4005 Hieracium pictum Schl.
(+1883) Cesati in Belli ap. Fiori III —
1894 Arcangeli.

— β chlorospermum Arv. T.
(+1869) Moris in Belli ap. Fiori III

4006 Hieracium lychnioides Arv. T.
(+1895) Rostan in Belli, ap. Fiori III.

4007 Hieracium pellitum Fr.
1894 Arcangeli — 1904 Ferrari,
Bicknell in Belli ap. Fiori III

4008 Hieracium pictiforme Belli et Arv. T.
1904 Bicknell, Ferrari, Hanbury
in Belli ap. Fiori III.
— β caelatum (Arv. T.)
(+1895) Rostan; Bicknell in Belli ap. Fiori III

4009 Hieracium lanatellum Arv. T.
(+1895) Rostan; Mattirolo, Ferrari, Vallino, Gola in Belli ap. Fiori III.

4010 Hieracium farinulentum Jord.
1883 Burnat e Gremli — 1904 Ferrari
in Belli ap. Fiori III.

4009' Hieracium pulchellum Gr. Godr.
(H. pictum × sorrentosum)
1901 Zahn

4011 Hieracium gnaphalodes Arv. T.
1904 Levier in Belli.

4012 Hieracium oligocephalum Arv. T.
(+1868) Sanguinetti, Levier, Profeta,
N. Terracciano in Belli ap. Fiori III.

4013 Hieracium villosum L
1595 Pona – 1726 Zannichelli – 1745 Seguier – 1773 Vitman – 1785 Allioni – 1816 Pollini
— β adpressum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ perpilosum (Arv. T.)
(+1876) Venzo, (+1892) Tanfani, Gortani in Belli ap. Fiori III.

4014 Hieracium Gortanianum Arv. T. et Belli
1904 Gortani in Belli ap. Fiori III.

4015 Hieracium dentatum Hoppe
1819 Bertoloni – 1878 C. P. G.

4015¹ Hieracium Gremlii Arv. T.
1905 Chenevard e Braun
4015² Hieracium Braunianum Zahn et Chen.
1905 Chenevard e Braun

— β gapense (Arv. T.)
(+1895) Riva; Chiovenda in Belli ap. Fiori III
— γ Gisleri (Lagg.)
1904 Huter in Belli ap. Fiori III

4016 Hieracium elongatum W p. p.
1894 Arcangeli – 1901 Zahn – 1906 Gortani
— β Ferrarianum Belli
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III

4017 Hieracium sixtinum Arv. T.
(+1884) Ausserdorfer, (+1895) Rostan, Pichler, Beuari in Belli ap. Fiori III

4018 Hieracium chlorifolium Arv. T.
(+1895) Rostan, (+1901) Picone; Ferrari, Bicknell in Belli ap. Fiori III

4019 Hieracium pulcrum Arv. T.
(+1895) Riva, Ferrari, Beuari in Belli ap. Fiori III

4020 Hieracium cenisium Arv. T.
1901 Zahn – 1904 Belli, Mattirolo, Ferrari in Belli ap. Fiori III.

4019¹ Hieracium subspeciosum N. P.
1901 Zahn
4019² Hieracium crinisquámum N. P.
1901 Zahn

4021 Hieracium callianthum Arv. T.
(+1875) Simi, (+1877) Parlatore, (+1895 Defilippi, Ferrari, Beuari in Belli ap. Fiori III.

4022 Hieracium scorzonerifolium Vill.
1855 Huet de Pav. Exsicc. Pl. neap. – 1878 C. P. G.
1882 Arcangeli
— β glabratum (Hoppe)
1878 C. P. G. – 1904 Belli in Fiori III.

35/0018-264

— γ Boissieri (Huet)
1855 Huet de Pav. Exs. Pl. neap. —
1904 Levier, Profeta in Belli ap.
Fiori III.
— δ divaricatum (H. P. R.)
1877 Huter, Porta, Rigo, Exs. Iter. ital.
— 1904 Belli in Fiori III
— ε squamatum (Arv. T.)
1904 Belli, Ferrari in Belli ap.
Fiori III.
— ζ majellense (Huet)
1855 Huet de Pav. Exs. pl. neap.
1904 Belli in Fiori III

4023 Hieracium piliferum Hoppe.
1875 Favre — 1878 C. P. G. — 1904
Belli in Fiori III
— β tubulosum Belli.
1904 Belli in Fiori III.

4024 Hieracium anadenum Arv. T.
1883 Burnat e Gremli — 1904 Bicknell, Ferrari, Vallino, Gola in Belli
ap. Fiori III.

4025 Hieracium subnivale Gr. Godr.
1883 Burnat e Gremli — 1894
Arcangeli — 1904 Belli in Fiori III.

4026 Hieracium glanduliferum Hoppe
1850 Bertero, De Notaris Montini
in Bertoloni VIII — 1853 'Rota —
1874 C. P. G. — 1904 Belli in Fiori III

— β calvescens Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ fuliginatum Huter
1904 Longa, Gortani in Belli ap.
Fiori III

4027 Hieracium amphigenum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— β tubulosum Belli.
1904 Belli in Fiori III.
— γ Favreanum (Arv. T.)
1904 Gola in Belli.

4028 Hieracium leucochlorum Arv. T.
1904 Belli, Ferrari, Chiovenda, Longa, Mattirolo in
Belli ap. Fiori III

4029 Hieracium armerioides Arv. T.
1904 Belli in Fiori III.
— β piliferum Arv. T.
1904 Belli.
— γ puberulum Arv. T.
1904 Belli.

4030 Hieracium ustulatum Arv. T.
1904 Ferrari, Belli, Mattirolo, Vallino,
Huter in Belli ap. Fiori III.
— β tubulosum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
4031 Hieracium dasytrichum Arv. T.
1904 Caresta in Belli ap. Fiori III.

4032 Hieracium Rigoanum Arv. T. et Belli
1877 Huter, Rigo, Porta in Exsicc. Itin. ital. n. 661 — 1904 Belli in Fiori III.

4033 Hieracium Sartorianum Boiss. et Held.
1904 Levier, Martelli in Belli ap. Fiori III.
— β calabricum (Huet)
1855 Huet de Pav. Exs. pl. neap. — (+1856) Tineo, (+1866) Gussone, (+1883) Cesati in Belli ap. Fiori III.
— γ acutifolium Belli.
1904 Ross in Belli ap. Fiori III.

4034 Hieracium Mattirolianum Arv. T. et Belli.
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.

4035 Hieracium Schmidtii Tausch
1904 Belli in Fiori III.

4036 Hieracium lasiophyllum Koch
(+1890) Marcucci; Marchesetti, Beccari in Belli ap. Fiori III
1878 C. P. G.

4037 Hieracium cinerescens Gr. Godr.
~~1904~~ Bicknell, Gola, Berrino, Ferrari
(+1831) Bertero; in Belli ap. Fiori III

4036' Hieracium ilvanum Arv. T.
1902 Sommier in N. giorn. bot. ital.

4038 Hieracium brunelliforme Arv. T.
1843 Moris — (+1895) Rostan, Martelli, Ascherson in Belli ap. Fiori III.

4039 Hieracium cyaneum Arv. T.
(+1869) Bertoloni; Rostan, Ferrari in Belli ap. Fiori III

4040 Hieracium rupicola Fr.
(+1883) Pedicino; Ferrari, Terracciano in Belli ap. Fiori III.
— β microcephalum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III

4041 Hieracium ceratodon Arv. T.
1904 Ferrari, Belli in Belli ap. Fiori III.

4042 Hieracium undulatum Boiss.
1904 Chierici, Levier in Belli ap. Fiori III.

4043 Hieracium pornifolium L.
1699 Bouone — 1754 Seguier + 1769 agosti 1802 Suffren — 1816 Pollini.
— β albinum Belli
1904 Goiran in Belli ap. Fiori III

4044 Hieracium glaucum All.
1785 Allioni — 1802 Suffren — 1805 Re

4044' Hieracium illyricum Fr.
1901 Zahn — 1906 Gortani

35/0018 - 265

4045 Hieracium stupposum Rchb.
(+1879) Tommasini in Belli ap. Fiori III – 1901 Zahn –

4046 Hieracium falcatum Arv. T.
(+1867) Lisa; Ferrari in Belli ap. Fiori III.

4047 Hieracium chondrilloides Vill.
(+1895) Rostan, Ferrari in Belli ap. Fiori III.
— β glaucopsis (Gr. Godr.)
1904 Belli in Fiori III.
— γ Delasoiei (Lagg.)
2 (1904 Bicknell in Belli ap. Fiori III
1 (1882 Payot –

4048 Hieracium inclinatum Arv. T.
(+1852) Cornelli; Ferrari in Belli ap. Fiori III.
1876 Goiran, edit. 1904

4049 Hieracium bupleuroides Gm.
1853 Rota – 1878 C. P. G. – (+1878)
(+1897) Perini, Ambrosi in Belli ap. Fiori III –
— β calycinum (Arv. T.)
(+1876) Venzo; Ferrari, Longa, Huter in Belli ap. Fiori III

4050 Hieracium lucidum Guss.
1825 Gussone – (+1856) Tineo, Todaro, Lojacono, Riccobono in Belli ap. Fiori III
4050 Hieracium cophanense Lojac.
1696 Cupani – 1902 Lojacono III.

4052 Hieracium crinitum S. et S.
1651 Erb. messinese. Cfr. Zodda
1696 Cupani – 1835 Tenore – 1844 Gussone.
1745 Sabbati
— β angustidens Belli.
1904 Belli.

4053 Hieracium Virgaurea Coss.
1850 Bertoloni VIII e. p. – 1860 Caruel – 1878 C. P. G. – 1883 Burnat e Gremli – 1897 Belli.
— β italicum (Fr.)
1904 Belli in Fiori III
1847 Fries, Symbol. Hierac.
— γ ageratoides (Fr.)
1904 Belli in Fiori III.
— δ lateriflorum Arv. T. et Belli
(H. Virgaurea × heterospermum ?)

4054 Hieracium cirritum Arv. T.
2 (1904 Belli in Fiori III –
1 (1896 Bicknell
— β melanops (Arv. T.)
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III
— γ Pseudoleontodon Arv. T. et Belli.
1906 Gortani

4054' Hieracium Thomasianum Zahn
1905 Chenevard e Braun
4055 Hieracium acanthodontoides Arv. T. et Belli
(+1891) Groves in Belli ap. Fiori III.

4050' Hieracium Garibaldianum Fr.
1862 Schlanbusch in Fries Epicr. Hieracior.

— γ resedifolium Belli et Arv. T.
1906 Gortani.

4056 Hieracium Longanum Belli et Arv. T.
1904 Longa in Belli ap. Fiori III

4057 Hieracium Trachselianum Christen.
1904 Chiorenda, Huter in Belli ap Fiori III.

4057' Hieracium patulum N. P.
1901 Zahn.

4058 Hieracium austriacum Uechtr.
(+1878) Hausmann; Huter in Belli ap. Fiori III.
— β plurifolium Arv. T.
1904 Gortani in Belli ap. Fiori III — 1904 Goiran.

4058' Hieracium chenodon
(H. vulgatum × villosum)
1901 Zahn

4058² Hieracium Ausserdorferi Hausm.
(H. vulgatum × incisum)
1901 Zahn

4058³ Hieracium Dollineri Sch. Bip.
(H. vulgatum × glaucum)
1901 Zahn

4058⁴ Hieracium ramosum W. K.
1901 Zahn

4058⁵ Hieracium carnosum Wiesb.
(H. vulgatum × silvaticum × glaucum)
1901 Zahn

4058⁶ Hieracium tephropógon Zahn
(H. Dollineri × incisum)
1896 Evers.

4059 Hieracium hypochaerideum Arv. T.
(+1884) Ausserdorfer; Rostan, Chiorenda, Ferrari, Huter in Belli ap Fiori III.

4060 Hieracium incisum Hoppe
1851 Ambrosi, Boni in Hausmann I — 1882 Arangeli — 1896 Bicknell — 1906 Gortani.
— β oreites (Arv. T.)
1904 Bicknell, Valbusa in Belli ap Fiori III — 1906 Gortani.
— γ subcorymbosum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III.

4061 Hieracium Profetanum Belli
1904 Profeta in Belli ap. Fiori III

4062 Hieracium caesioides Arv. T.
1883 Burnet a Gremli (H. caesium?)
1904 Belli in Fiori III.
— β erucoides (Arv. T.)
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III
— γ coriifolium (Arv. T.)
1904 Bicknell in Belli ap. Fiori III.
— δ lepidum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III

4063 Hieracium Mairanum Belli
1904 Ferrari in Belli ap Fiori III

4064 Hieracium atratum Fr
1875 Favre — 1904 Chiorenda in Belli ap. Fiori III.

35/0018-266

— ι nemorense Gr. Godr
1906 Gortani
— x fragile Jord
1906 Gortani
— ν silvaticum L.
1822 Pollini — 1883 Burnat e Gremli
1896 Bicknell
— 1904 Goiran — 1906 Gortani

4065 Hieracium bifidum Kit (Goiran
1901 Zahn — 1904 Belli in Fiori III;
— 1906 Gortani
— β laevibifidum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III — 1906
Gortani.

4065¹ Hieracium Mureti Gremli
1901 Zahn.
4065² Hieracium caesium Fr.
(H. silvaticum × glaucum)
1901 Zahn — 1882 Payot

4066 Hieracium murorum L.
1550 Cibo — 1595 Pona 1720 Pontedera — 1713
Tita — 1726 Zannichelli — 1745 Sé-
guier — 1802 Suffren; Margari.
— β microcephalum Gremli
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— γ Chiovendanum Belli
1904 Chiovenda in Belli ap. Fiori III.
— δ sublanigerum Arv. T.
1904 Martelli in Belli ap. Fiori III.
— ε lepidotorum Arv. T.
1904 Bicknell, Belli in Belli ap.
Fiori III
— ζ atratum Belli.
1904 Valbusa in Belli ap. Fiori III.
1906 Gortani
— η subcaesium (Fr.)
1875 Favre — 1904 Belli in Fiori III;
Goiran — 1906 Gortani

4066¹ Hieracium Paicheanum Arv. T.
(H. silvaticum × piliferum × villosum)
1901 Briquet in Zahn.
4066² Hieracium aphyllum N. P.
(H. piliferum × villosum × silvaticum)
1903 Chenevard — 1905 Bernoulli
in Ic. fl. germ. et helv.
4066³ Hieracium Wiesbaurianum Uechtr
β pseudograniticum Besse
1903 Besse in Bull. Soc. Murith.
4066⁴ Hieracium predilense N. P.
(H. silvaticum × porrifolium)
1901 Zahn.

4067 Hieracium Grovesianum Arv. T.
1888 Arvet Touvet — (+1891) Groves;
Sotta, Fiori in Belli ap. Fiori III

4068 Hieracium rapunculoides Arv. T.
(+ 1877) Parlatore, Ferrari, Gola in Belli
ap. Fiori III.

4069 Hieracium vulgatum Kochs
1696 Cupani — 1785 Allioni — 1802 Suf-
fren — 1804 Bertoloni — 1904 Goiran
— β argutidens (Fr.)
1904 Belli in Fiori III

— η ericetorum (Jord.
1906 Gortani
— δ subramosum Arv. T.
1906 Gortani
— ι umbrosum (Jord.)
1906 Gortani.

— γ anfractum (Fr.)
1904 Gortani in Belli ap. Fiori III
— δ levicaule (Jord.)
(+1895) Rostan in Belli ap. Fiori III — 1906 Gortani.
— ε translucens (Arv. T.)
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III — 1906 Gortani.
— ζ sciaphilum Jord
1906 Gortani

4070 Hieracium subalpinum Arv. T.
1896 Bicknell — 1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— β exilentum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III — 1896 Bicknell
— γ alpestre Arv. T.
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— δ epimedium (Fr.)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— ε hemiplecum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III

4070' Hieracium subtilissimum Zahn
(H. prenanthoides × Schmidtii)
1901 Zahn

4071 Hieracium crepidifolium Arv. T.
(+1895) Rostan; Bicknell in Belli ap. Fiori III.

4072 Hieracium jurassicum Gris.
1878 C. P. G. — 1883 Burnat e Gremli.
1904 Goiran
1875 Favre

— β jaceoides (Arv. T.)
1896 Bicknell — 1904 Belli in Fiori III
— γ subperfoliatum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III
— δ orfentanum Belli
1904 Belli in Fiori III
— ε coarctatum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III.
— ζ pseudojuranum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III
— η jurellum (Arv. T. et Belli)
1904 Profeta in Belli ap Fiori III

4073 Hieracium seneppense Arv. T.
1904 Bicknell in Belli ap Fiori III

4074 Hieracium intybellifolium Arv. T.
1904 Gola in Belli.

4075 Hieracium valdepilosum Vill.
(+1852) Facchini in Gelmi, 1893 — 1882 Arcangeli
— β Kalsianum (Huter)
1884 Huter in Dalla Torre, Atl. Alpenfl.
1904 Belli in Fiori III

4075' Hieracium subelongatum N. P.
(H. valdepilosum × silvaticum)
1904 Chenevard

4076 Hieracium cottianum Arv. T.
1904 Berrino, Belli, Chiovenda, Ferrari in Belli ap. Fiori III.

35/0018-267

4076' Hieracium Lemanianum Arv. T.
1903 R. Keller.

4077 Hieracium parcepilosum Arv. T.
1904 Ferrari, Berrino, Belli, Chiovenda in Belli ap. Fiori III

4077' Hieracium mespilifolium Arv. T.
1901 Zahn

4078 Hieracium prenanthoides Vill.
1563 Cesalpino – 1785 Allioni – 1808 Biroli – 1821 Nocca e Balbis – 1822 Pollini – 1853 Rota
— β adenanthum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ anadenum Belli
1904 Belli in Fiori III
— ε megacephalum Belli
1904 Ferrari in Belli ap. Fiori III.
— ζ Huguenini Belli
(+1860) Huguenin in Belli ap. Fiori III

4078' Hieracium glaucocephalum N. P.
(H. prenanthoides × glaucum)
1901 Zahn.

4078² Hieracium Salassorum Zahn et Besse
(H. prenanthoides × silvaticum)
1903 L. Vaccari La flore des Alp. graies orient.

4078³ Hieracium praetensum Arv. T. et Brig.
1903 R. Keller.

4079 Hieracium sarracenicum Arv. T. et Belli
1904 Bicknell in Belli ap. Fiori III

4080 Hieracium Neoprenanthes Arv. T.
(+1877) Parlatore; Ferrari, Bicknell in Belli ap. Fiori III – 1906 Gortani.

4081 Hieracium odontinum Arv. T.
1904 Ferrari, Bicknell, Ajuti in Belli ap. Fiori III
— β stylodontophyllum (Arv. T.)
1904 Ferrari, Belli in Belli ap. Fiori III.

4082 Hieracium lanceolatum Vill.
(+1867) Lisa, (+1877) Parlatore, (+1886) Delponte; Ferrari ecc. in Belli ap. Fiori III.
— β transalpinum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III.

4083 Hieracium vallisiacum Fr.
1563 Cesalpino (H. elatum Fr. sec. Carwel)
1785? Allioni – (1895) Rostan (+1898) Gibelli in Belli ap. Fiori III.
— β tetraphyllum (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III
— γ subsabaudum Gr. Godr.
1904 Belli in Fiori III

4084 Hieracium umbellatum L.
1572 Cibo – 1745 Séguier – 1785 Allioni – 1802 Luffren – 1820 Moricand

— β filifolium Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— γ aliflorum (Fr.)
1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— δ monticola (Jord.)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— ε coronopifolium (Bernh.)
1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani (1851 Hausmann
— ζ brevifolium (Tausch)
1896 Bicknell — 1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— η ericetorum Arv. T.
1904 Goiran; Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— ϑ serotinum (Host)
1883 Goiran, edit. 1904 — 1899 Pospichal — 1904 Belli in Fiori III
— ι halimifolium (Froel.)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— κ jacobaeifolium (Froel.)
1904 Belli in Fiori III
— λ Lactaris (Bertol.)
1803 Bertoloni — 1822 Pollini — 1850 Barbieri, Montini, Mayer in Bertolon. VIII — 1853 Rota — 1904 Goiran

4084' Hieracium lejosoma N. P.
(H. umbellatum × porrifolium)
1896 Evers — 1901 Zahn

4085 Hieracium subvirens Arv. T.
+(1877) Parlatore, (+1888) Bubani; Ferrari, Gola in Belli ap. Fiori III.

4086 Hieracium rigidum Hartm.
1875 Favre — 1853, Rota — 1882 Arcangeli — 1904 Belli in Fiori III
— β tridentatum
1875 Favre — 1882 Arcangeli — 1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani

4087 Hieracium corymbosum Fr.
(+1884) Ausserdorfer, (+1895) Rostan in Belli ap. Fiori III

4088 Hieracium latifolium Spr.
(+1831) Balbis, (+1895) Defilippi e Rostan; Gola, Gortani in Belli ap. Fiori III

4089 Hieracium boreale Fries
2 (1844 De Notaris — 1850 Montini, Parolini ecc. in Bertoloni VIII — 1904 Goiran
1 (1745 Séguier — 1816 Pollini
— β pubescens (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III
— γ subsabaudum (Fr.)
1904 Belli in Fiori III — 1906 Gortani
— δ virens Arv. T.
1904 Belli in Fiori III
— ε pseudoboreale (Arv. T.)
1904 Belli in Fiori III

35/0018 - 268

— ι virgultorum Arv. T.
1906 Gortani

— ζ ericetorum Arv. T.
1904 Belli in Fiori III

— η sabaudum (L. e.p.) Belli
1904 Belli in Fiori III

— υ pyramidale Belli
1906 Gortani

4089¹ Hieracium lactescens Rouy
1850 Bernard in Grenier e Godron
(H. virosum)

4089² Hieracium Notarisii Rchb.
1848 De Notaris in Rchb. fil.
Ic. fl. germ. XIX (1860)

4089³ Hieracium trichodes Griseb.
1853 Bamberger in Rchb. Ic. fl.
germ. XIX (1860)

4090 Hieracium siculum Guss.
1844 Gussone — 1855 Huet de Pav.
Exs. pl. Neap. et sicul. — 1904 Ross
in Belli ap. Fiori III —

4091 Hieracium australe Fr.
1847 Tommasini in Fries Symb.
Hierac. — 1904 Belli in Fiori III
— 1906 Gortani

4091¹ Hieracium sanctum N. P.
1901 Zahn

4092 Hieracium symphytaceum Arv. T.
1785 Allioni (H. sabaud.) — (1884) Del-
ponte, (1895) Rostan, Negri in
Belli ap. Fiori III

— β oligadenum Belli
1904 Ferrari, Berrino in Belli
ap. Fiori III

4093 Hieracium heterospermum Arv. T.
1882 Arcangeli — 1849 Jordan, Observ.
pl. critiq. VII — 1904 Goiran —
1906 Gortani — 1901 Levier in N. giorn.
bot. ital.

4093¹ Hieracium lactucaceum Froel.
1838 Froelich in D. C. Prodr. VII

4093² Hieracium racemosiforme Zahn
(H. racemosum (= heterosp.) × porrifolium)
1901 Zahn

4093³ Hieracium Helwegeri Murr et Zahn
1901 Zahn

Species dubiae v. incertae sedis.

4093⁴ Hieracium alpigenum Evers
1896 Evers

4093⁵ Hieracium Balbisianum Arv. T. et Brig.
1899 Arvet T. e Briquet Not.
Fl. alp. Leman. — 1902 Chenevard

4093⁶ Hieracium coriifolioides Evers
1896 Evers.

4093⁷ Hieracium Flahaultianum Arv. T. et Gaut.
1905 Mad. Gysperger in Briquet
Spicileg. Corsic.

4093[8] Hieracium glauciforme N. P.
1896 Evers.

4093[9] Hieracium knollense Evers.
1896 Evers.

4093[10] Hieracium mixtum Rota
1853 Rota.

4093[11] Hieracium praealpinum Belle et Zahn
1903 L. Vaccari) ~~ecc Belle Excurs. bo-~~
~~tanique et minéral. Val d'Aosta~~
(La Flore des Alp. graies orient.

4093[12] Hieracium roveretanum Evers.
1896 Evers.

4093[13] Hieracium tesinense Evers
1896 Evers.

4093[14] Hieracium trafojense Evers
1896 Evers.

4093[15] Hieracium auriculigenum Arv. T.
1906 Gortani.

~~4093[16] Hieracium sulphureum Doell.~~
~~(H. Auricula × florentinum)~~
1906 ~~Evers~~ Gortani.

4093[17] Hieracium amphitrichum Arv. T.
1906 Gortani.

4093[18] Hieracium subula Belli
1906 Gortani

4093[19] Hieracium jantropodum Arv. T.
1906 Gortani.

4093[20] Hieracium nervulosum Arv. T.
— β subpubens Arv. T.
1906 Gortani.

4093[20] Hieracium macilentum Fr
— β subattenuatum Arv. T.
1906 Gortani.

4093[21] Hieracium auriflorum Belli et Arv. T.
1906 Gortani

4093[22] Hieracium carnicum Belli.
1906 Gortani.

4093[23] Hieracium leucospermum Arv. T.
(et Belli
1906 Belli.

35/0018-269

~~Appendice contenente talune~~ Giunta di altre piante più comunemente coltivate in Italia, non comprese nel testo.

~~Fam. 5' Ginkgoaceae~~

Ginkgo L. [Ginkgoaceae]

81 A. Ginkgo biloba L.
Originario della Cina e del Giappone, Coltivato ~~poco~~ dalla fine del Settecento.
1787 Cfr. Targioni-Tozzetti, ~~ed.~~ 1853 – 1795 Lucagni – 1798 Farsetti.

88 A. Pinus Strobus L. [Conif.]
Originario dell'America settentrionale. Coltivato dal principio dell'ottocento.
1812 Spigno – 1815 Biroli – 1820 Bonato.

Cedrus Loud. [Coniferae]

88 A. Cedrus Libani (Barrel.) Loud. R
Originario dell'Asia minore, Siria e Urali e già conosciuto in Italia dall'èra romana in poi (Plinio, Mattioli 1565, Cesalpino 1583 ecc.), ma coltivato fra noi solo dalla seconda metà del Settecento.
1760 Marsili, ed. 1840 – 1787 Savi Cfr. Targ. Tozz. 1853 – 1820 Bonato.

88 B Cedrus Deodara (Roxb.) Loud.
Del Nepal (Imalaja). Coltivato solo dalla prima metà dell'ottocento.
1828 Cfr. De Toni, ed. 1887 – 1867 Pasquale

Cryptomeria Don [Coniferae].

91 A Cryptomeria japonica Don.
Originaria del Giappone. Coltivata dalla metà dell'ottocento.
1850 Cfr. De Toni, ed. 1887 – 1867 Pasquale

91 B Cryptomeria elegans Veitch.
Nativa del Giappone. Coltivata dalla seconda metà dell'ottocento.
1867 Pasquale.

Araucaria Juss. [Coniferae].

91 C. Araucaria imbricata Pavon
Originaria del Cile. Coltivata dalla prima metà dell'ottocento.
1822 Gius. Pucci. Cfr. Targ. Tozz. 1853 – 1825 Cos. Ridolfi. Cfr. Targ. Tozz. l.c. 1842 Visiani.

Taxodium Rich. [Coniferae].

91 D Taxodium distichum (L.) Rich.
Dell'America settentrionale. Coltivato dalla seconda metà del Settecento
1760 Allioni – 1812 Bonato; Spigno – 1815 Biroli – 1821 Gussone.

118 A. Saccharum officinarum L. [Gram.]
Originario delle Indie or. e Cocincina. Introdotto dagli Arabi in Sicilia e coltivatovi fino dal IX secolo; più tardi abbandonato.
860 c. Cfr. V. Niccoli, Sagg. Stor. bibl.

1532 Cibo –

dell' Agricolt. ital. Torino 1902, p. 219. – 1176 Pirro Cfr. Niccoli l. c. – 1232 Cfr. Bianchini Stor. econ. d. Sicil. – 1583 Cesalpino; Porta Suae villae pomarium – (+1596) Soderini, Tratt. degli Orti, ed. 1814.

Eulalia Kunth [Graminaceae]

119 A. Eulalia japonica Trin.

Del Giappone. Introdotta ~~[illegible]~~ dopo la metà ~~[illegible]~~ dell' ottocento.

1878 Todaro, Index sem. Horti bot. Panorm.
1882 Savardo, Semina tub. et bulb. Horti Patav.
1884 Briosi, Detect. sem. Horti Ticin.

Gynerium H. B. K. [Graminaceae]

Del Paraguay. Introdotto verso la metà dell' ottocento.

212 A. Gynerium argenteum Nees.

1850. Catal. d. piante d. Orto bot. Padova. MS. – 1853 c. Cfr. ~~[illegible]~~ I. Giardini, ann. 1855 (Milano), periodico di

Arundinaria Rich. [Graminaceae].

362 A. Arundinaria japonica Sieb. et Z.
= Bambusa Metake Hort.

Del Giappone. Introdotta in Europa dal Siebold intorno 1850 e tosto dopo coltivata anche fra noi ed ora quasi naturalizzata.

1858. Cat. d. piante dell' ~~Orto bot.~~ Padova – 1863 I Giardini, period. di Milano

Bambusa Schreb. [Graminaceae].

362 A Bambusa mitis Poir.
= B. edulis Carr.

Originaria della Cina e Cocincina. Coltivata dalla seconda metà dell' ottocento e con tendenza a naturalizzarsi. Si coltivano pure sovente e sono del tutto rustiche le assai affini B. nigra Lodd. e B. aurea C. Riv., ambedue della Cina.

1858. Cat. d. piante dell' Orto bot. Padova. MS. – 1867 Pasquale (B. nigra e B. aurea).

Tritoma Ker [Liliaceae].

726 A. Tritoma Uvaria (L.) W.

Del Capo di B. S. Coltivata dalla fine del Settecento.

1793 Zuccagni – 1801 Bonato – 1821 Gussone.

Rohdea Roth(*) [Liliaceae].

728 B. Rohdea japonica (Thunb.) Roth

Del Giappone. Coltivata dal primo quarto dell' ottocento.

1815 Biroli – 1820 Bonato – 1836 Brignoli.

Aspidistra Gawl. [Liliaceae].

728 C. Aspidistra elatior Blume.

Oriunda della Cina. Introdotta nella prima metà dell' ottocento.

1845. Catal. d. piante d. Orto bot. Padova. MS. – 1847 Ruchinger, Cenni stor. d. Orto bot. Venezia – 1863 I Giardini, periodico di Milano.

(*) Rohdea, non Rhodea. Cfr. Pritz. Thes. II ed. p. 267.

35 /0018-270

Montbretia DC. [Iridaceae]

796 B Montbretia crocosmiflora Nichols.
(Crocosma aurea Planch. × Tritonia Pottsii Benth.)
I parenti sono originari dell'Africa australe; ~~fu~~ e l'ibrido fu ottenuto ~~[illegible]~~ in Inghilterra int. 1880 e poco dopo comparve anche in Italia.
1884 Contini e Ramoni; Catal. speciale per bulbi; Intra; ecc.

Freesia Benth. et Hook. [Iridaceae]

796 C. Freesia refracta (Jacq.) Klatt
Del Capo di B. S. Introdotta negli orti botanici da prima della metà dell'ottocento, ma solo in questi ultimi lustri assai generalizzata.
1842 Visiani – 1845 Tenore – 1884 Contini e Ramoni, Catal. speciale bulbi ecc. Intra ecc. ecc.

866 A Juglans nigra L. [Juglandaceae]
Originario dell'America sett. Coltivato da dopo la metà del settecento.
1760 Marsili. Cfr. De Toni 1887 – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni.

Maclura Nutt. [Urticaceae]

914 A. Maclura aurantiaca Nutt.
Originaria della Luisiana. Coltivata dal primo quarto dell'ottocento.
1822 Cosimo Ridolfi. Cfr. Targ. Tozzetti, 1853 – 1842 Visiani – 1845 Tenore
– Anche la Cudrania triloba Hance (= Maclura tricuspidata Carr.) della Cina comincia a coltivarsi fra noi ed è rusticissima.
dal 1890 c.

917 A. Ficus stipulata Thunb. [Urticac.]
= Ficus repens W., F. scandens Lam.
Originario della Cina e Giappone. Si coltiva dal principio dell'ottocento e vive all'aperto e fruttifica anche nell'Italia sett., come a Padova.
1806 Zuccagni – 1812 Bonato; Spigno – 1815 ~~[illegible]~~ Biroli.

930 A. Elaeagnus reflexa Dcne
Del Giappone. Coltivato dalla seconda metà dell'ottocento.
1845 Tenore – 1867 Pasquale – 1887 De Toni.

Camphora Nees [Lauraceae]

932 A. Camphora officinarum Nees
Originaria del Giappone. Coltivato dal principio dell'ottocento
1806 Zuccagni – 1812 Bonato – 1818 March. Pucci. Cfr. Targ. – Tozzetti 1853 – 1821 Capelli; Gussone.

932 C. Magnolia purpurea Curt. (1790)
= M. obovata Thunb. (1794)
Oriunda del Giappone. Coltivata fino dal principio dell'ottocento.
1812 Spigno – 1815 Biroli – 1820 Bonato.

Asimina Adans. [Anonaceae]

932 E Asimina triloba (L.) Dunal
Nativa dell'Amer. sett. Coltivata fino dal principio dell'ottocento.
1801 Bonato – 1818 Spigno – 1836 Brignoli

Anona L. [Anonaceae]

932 F. Anona Cherimolia Mill.

Originaria del Perù — Coltivata dal secondo quarto dell' ottocento, ed ora specialmente in Calabria e Sicilia.

1841 Picciolo — 1845 Tenore — 1867 Pasquale — 1827 Tineo

Liriodendron L. [Magnoliaceae]

932 D. Liriodendron Tulipifera L.

Originario del Canadà, Virginia e Florida. Coltivato fino dalla metà del settecento

1760 Morelli, ed. 1840 — 1793 Zuccagni — 1815 Viviani — 1827 Tineo.

da trasportare dopo 932 C

Mühlenbeckia Meisn. [Polygonac.]

976 D Mühlenbeckia complexa Meisn.

Originaria della Nuova Zelanda. Coltivata da Sallardo (Orto bot. di Padova!) a Crep 1880 c.

Rheum L. [Polygonaceae]

996 A Rheum Rhaponticum L.

Originario della Siberia altaica. Coltivato dal principio del seicento in pochi luoghi dell' Italia settentr.

1801 Bonato — 1805 Bellardi, la coltivaz. del Rabarbaro. Torino.

1612 Alpino, De Rhapont. dispat. Patavii — 1642 Verlingio

Polygonum tinctorium Lour. [Polyg.]

976 A. Polygonum tinctorium Lour. [Polyg.]

Nativo dell Asia orient. Fu coltivato in più luoghi d' Italia nella I^a metà dell' ottocento.

1839 Targioni-Tozzetti Ant., Brevi not. sul Pol. tinctor. Firenze; Bonafous, Sull' introd. d'una nuova pianta tint. Torino — 1842 Viviani — 1843 Ingegno, Trattato sull' industria del Polyg. tinct. in Sicilia — 1845 Tenore.

976 B. Polygonum sachalinense F. Schmidt.

Nativo dall' Isola di Sachalin (Siber. orient.). Coltivato fra noi dal 1900 c.

976 C. Polygonum cuspidatum Sieb. et Z. — P. Sieboldii Hort.

Del Giappone. Coltivato dalla metà circa dell' ottocento.

1858 Cat. d. piante dell Orto bot. Padovano

Alternanthera paronychioides A. St. Hil. [Amarantaceae]

1043 B Alternanthera paronychioides A. St. Hil.

Nativa del Brasile. Introdotta recentemente nei nostri giardini, dove si coltiva ora comunemente.

1870 Sallardo (Ort. bot. Padova!)

1869 L. Croff, Catal. d. gr. stabil. Orticolt. di Milano.

Iresine P. Brown [Amarant.]

1043 C. Iresine Herbstii Hook = Achyranthes Verschaffeltii H. Lem.

Nativa dell America equatoriale. Introdotta soltanto poco dopo la metà dell ottocento ed ora coltivata in tutti i giardini.

1866 I Giardini, periodico di Milano

1867 Pasquale

35/0018-271

Datisca L. [Datiscaceae]

1065 C. Datisca cannabina L.
1594 Silv. Todeschini. Cfr. Alpino, De plant. exot. 1627 – 1617 Porta (Canape acquatica) – 1642 Veslingio – 1772 Allioni.

Boussingaultia H. B. K. [Basellaceae]

1070 A Boussingaultia basellordes Kth.
Oriunda dell' America merid. Coltivata fino dalla prima metà dell' ottocento.
1850 Cat. d. piant. dell' Orto bot. Padova. MS – 1845 Tenore

Thea L. [Theaceae]

1245 A Thea japonica (L.) Baill.
= Camellia japonica L.
Originaria del Giappone. Coltivata da poco dopo la metà del settecento.
1760 (a Caserta) Cfr. Targ. Tozzetti, 1853 – 1794 (a Firenze) Cfr. Targ. Tozzetti 1853 – 1798 Farsetti – 1820 Bonato – 1827 Tineo.

1245 B Thea Bohea L.
Nativa delle Indie or. e Cina. Raramente coltivata fino dalla fine del seicento, con tentativi di acclimatazione verso la fine dell' ottocento
1697 Boccone – 1798 Farsetti – 1842 Visiani – 1883 Todaro – 1899 Cavara. Cfr. V. Niccoli Saggio stor. bibl. agricolt. ital. Torino 1902

Dicentra DC. [Fumariac.]

1527 A Dicentra spectabilis (L.) DC.
Nativa della Siberia e del Giappone. Introdotta vivente in Europa dal Fortune solo int. 1845 e coltivata poco appresso anche in Italia.
1855 Catal. d. piante d. Orto bot. Padova. MS. – 1867 Pasquale –

1638 A. Paeonia Moutan Sims [Ran.]
Nativa della Cina. Coltivata fino dal primo quarto dell' ottocento
1821 Capelli – 1823 Spigno – 1842 Visiani.

Akebia DC. [Lardizabalaceae]

1641 D Akebia quinata Dcne
Originaria del Giappone. Coltivata dalla seconda metà dell' ottocento.
1867 Pasquale – 1880 Savardo (Giardini di Padova!)

1641 A. Berberis Aquifolium Pursh [Berb.?]
Nativo dell' America sett., Coltivato dalla prima metà dell' ottocento
1841 Piccioli – 1842 Visiani – 1845 Tenore – 1840 Tagliabue, Nomencl. veget. (coltivati a Lainate. Milano)

Menispermum L. [Menispermaceae]

1641 C Menispermum canadense L.
Originario del Canadà. Coltivato dalla fine del settecento e talora quasi inselvatichito nei giardini.
1793 Zuccagni; G. Tineo – 1801 Bonato.

Nandina Thunb. [Berberidaceae]

1641 B Nandina domestica Thunb.

Originaria della Cina e Giappone. Coltivata fino dal primo quarto dell'ottocento

1821 Gussone — 1823 Spigno — 1841 Picciotti — 1842 Visiani

1695 A. Ribes sanguineum Pursh [Saxifrag.]
Oriundo dell' America sett. e Coltivato fino dalla prima metà dell' ottocento.
1840 Tagliabue, Nomenclatore de' veget. colt. a Lainate – 1842 Visiani.

1695 B Ribes aureum Pursh
Originario dell' America sett. Coltivato fino dalla prima ~~metà~~ quarto dell' ottocento
1823 Spigno – 1840 Tagliabue l. c. – 1841 Piccioli – 1842 Visiani

Pittosporum Banks [Pittosporac.]
1696 C Pittosporum Tobira Dryand.
Originario della Cina e Giappone. Coltivato dal primo quarto dell' ottocento.
1820 Bonato – 1821 Gussone – 1829 Piccioli.

3 Liquidambar L. [Hamamelidac.]
1696 D Liquidambar orientale Mill.
Oriundo dell' Asia minore. Coltivato fino dai primi anni dell' ottocento.
1800 Cfr. De Toni 1853 – 1812 Bonato – 1815 Biroli – 1821 Gussone.

Deutzia Thunb. [Saxifrag.]
1696 A Deutzia scabra Thunb.
Del Giappone. Coltivata dalla prima metà dell' ottocento.
1840 Tagliabue, Nomencl. de' veget. colt. a Lainate – 1842 Visiani – 1845 Tenore.

1696 B Deutzia gracilis Sieb.
Del Giappone. Coltivata dalla seconda metà dell' ottocento.
1855 Catal. d. piante dell' Orto bot. Padova. MS. – 1869 Croff. Cat. grand. stabil. Ortic. Milano.

1839 F Rosa multiflora Thunb. [Rosaceae]
Originaria della Cina e Giappone. Coltivata fino dal principio dell' ottocento.
1814 Savi, ed. 1818 – (1818 Spigno – 1815 Biroli – 1836 Brignoli.

1857 A Pirus (Malus) coronaria L. [Rosac.]
Dell' America sett. Coltivato dalla fine del settecento
1787 (A Pisa) Cfr. Targ.-Tozzetti 1853 – 1798 Zuccagni – 1820 Bonato.

Mimosa L. [Leguminosae]
1857 A Mimosa pudica L.
Originaria del Brasile. Coltivata fino dalla metà dell' settecento.
1760 Allioni – 1780 Farsetti – 1801 Bonato.

Poinciana L. [Leguminosae]
1858 A. Poinciana Gilliesii Hook.
Originaria dell' Argentina. Coltivata da poco innanzi la metà dell' ottocento.
1842 Visiani – 1850. Cfr. I Giardini, periodico di Milano, ann. 1857-58.

Gymnocladus Lam. [Leguminosae]
1858 B Gymnocladus canadensis Lam.
Guilandina dioica L.
Del Canadà. Coltivato fino dalla fine del settecento.
1793 G. Tineo – 1803 Noua, Syn. pl. Horti bot. Trin. – 1812 Bonato; Spigno – 1815 ~~Cupelli~~ Biroli – 1821 Gussone.

Cassia L. [Leguminosae]

1859 A. Cassia obovata Collad.
= C. Senna Lam.
Originaria dell'Egitto. Coltivata in Italia fino dal cinquecento e più comunemente ~~[illegible]~~ nei secoli XVI - XVII. 1532 Cibo
1565 Mattioli - 1583 Cesalpino - 1585 Durante - 1623 C. Bauhin (Senna italica) - 1793 Zuccagni - 1796 Farsetti - 1812 Bonato.

× qui

2092 Robinia Pseudacacia L.
— γ monophylla C. Koch
Coltivata in qualche orto bot. dalla seconda metà dell'ottocento, ma solo da cina un lustro molto divulgata lungo le vie pubbliche.
1875 Sauardo (Orto bot. di Padova!)
1907 Fiori IV.

Lagerstroemia L. (Lythraceae)

2203 A. Lagerstroemia indica L.
Della Cina e Giappone. Coltivata dalla fine del settecento.
1800 Cfr. Savi 1818 - 1801 Bonato - 1806 Zuccagni - 1815 Biroli.

Lopezia Cav. (Oenotherac.)

2217 A. Lopezia coronata Andr.
= L. racemosa Cav., Pisaura automorpha Bon.
Del Messico. Coltivata dalla fine dell'ottocento.
1795 Zuccagni - 1796 Farsetti - 1801 Bonato.

× qui

Hovenia Thunb. [Rhamnac.]

2433 A. Hovenia dulcis Thunb.
Della Cina, Nepal e Giappone. Coltivato dalla prima metà dell'ottocento.
1842 Visiani - 1867 Pasquale

Celastrus L. [Celastraceae]

2445 A. Celastrus scandens L.
Originario dell'America sett. Coltivato dalla seconda metà del settecento.
1780 Farsetti - 1795 Zuccagni - 1801 Bonato

× Virgilia Lam. (~~Papilion~~ Leguminosae)

1861 A. Virgilia lutea Michx
Originaria dell'America sett. Coltivata dalla prima metà dell'ottocento.
1836 Cfr. De Toni 1887 - ~~1842 Visiani~~
1840 Tagliabue, Nomencl. piante colt. a Lainate - 1842 Visiani - 1845 Tenore.

Aralia L. [Araliaceae]

2224 A. Aralia spinosa L.
Dell'America settentrionale. Coltivata fino dalla fine del settecento.
1793 G. Tineo - 1799 Zuccagni - 1801 Bonato - 1803 Noua.

Ceanothus L. [Rhamnac.]

2433 A. Ceanothus azureus Desf.
Originario del Messico. Coltivato dal primo quarto dell'ottocento.
1823 Spigno (C. caeruleus) - 1842 Visiani - 1867 Pasquale

Koelreutera Laxmann (Sapindac.)

2453 A Koelreutera paniculata Lax. Della Cina. Coltivata dall'ultimo quarto del settecento.

1785 Freylin, Cat. piant. d. giard. di Buttigliera. Cfr. Targ. – Tozz. 1853 – 1799 Zuccagni – 1812 Bonato.

2518 B Linum trigynum Roxb. [Originario delle Indie orient. Coltivato dal primo quarto dell'ottocento.

1820 Bonato; Savi, ed. 1822 – 1829 Piccioli – 1842 Visiani.

Xanthoxylon L. [Rutaceae].

2529 A. Xanthoxylon fraxineum W. Originario dell'America sett. Coltivato da circa la metà del settecento.

1760 Marsili, ed. 1840 – 1812 Spigno – 1815 Biroli, 1820 Bonato – 1821 Capelli; Gussone.

2558 A. Abutilon striatum Dicks. (Malvac.) Dell'Uruguay e Brasile. Coltivato dalla metà dell'ottocento.

1854 Ceni, Guida dell'Orto bot. Padova 1867 Pasquale

2558 B Abutilon venosum Hook. Del Messico e Brasile. Coltivato, come il precedente, dalla metà dell'ottocento.

1854 Ceni l. c. – 1867 Pasquale

2562 A. Hibiscus esculentus L. [Malvac.] Delle Indie orientali. Coltivato dalla fine del settecento.

1789 Ucria – 1793 Zuccagni – 1798 Farsetti – 1801 Bonato.

Sterculia L. [Sterculiaceae]

2563 A. Sterculia platanifolia L. fil. Originaria della Cina. Coltivata dopo la metà del settecento.

1760 Marsili, ed. 1840 – 1780 Farsetti – 1793 Zuccagni; Fineo – Cfr. anche Saccardo, Int. un ragg. indiv. di Sterculia plat. Padova 1887.

Corchorus L. [Tiliaceae]

2569 A. Corchorus olitorius L. Originario delle Indie or. e del Cordofan. Coltivato dalla fine del cinquecento ~~principio del settecento~~ ed ora, fra noi, assai meno.

1713 Tita – 1760 Allioni – 1793 Zuccagni – 1592 Alpino (Melochia) – 1642 Verlingio

2637 A Rhododendron ponticum L. [Ericaceae] Oriundo dell'Asia minore. Coltivato ~~poco~~ dalla fine del settecento.

1796 Zuccagni – 1812 Spigno, 1815 Biroli – 1821 Capelli.

2637 B Rhododendron arboreum Smith. Delle Indie orientali. Coltivato da avanti la metà dell'ottocento.

1841 Piccioli – 1842 Visiani – 1845 Tenore

1840 Tagliabue Nomencl. piante colt. a Lainate

Azalea L. [Ericaceae]

2641 A. Azalea indica L.
Delle Indie orient. e Cina. Coltivata dal primo quarto dell' ottocento.
1820 Savi, ed. 1822 — 1836 Brignoli — 1842 Visiani — 1845 Tenore.

2641 B Azalea pontica L.
Dell' Asia minore e Caucaso. Coltivata da poco avanti la metà dell' ottocento.
1836 Brignoli — 1840 Tagliabue l.c. — 1842 Visiani.

2659 A. Diospyros virginiana L. [Ebenac.]
Oriundo dell' America sett. — Coltivato da poco dopo la metà del settecento.
1760 Marsili, ed. 1840 — 1772 Allioni — 1793 Savi in Giorn. Agric. Tosc. —

2659 B. Diospyros Kaki L. fil.
Originario del Giappone. Coltivato dal primo quarto dell' ottocento
1815 Biroli — 1821 Capelli — 1836 Brignoli — 1842 Visiani.

2678 B Primula sinensis Lindl.
Della Cina. Introdotta ~~nella prima~~ poco dopo la metà dell' ottocento e già diffusa in tutti i giardini.
1860 Cfr. I Giardini, period. di Milano ann. 1866 — 1867 Pasquale.

2678 C. Primula obconica Hance
Della Cina. Introdotta in Europa nel 1882 ed in Italia int. 1890.
1893 Gribaldo Prezz. corr. gener. d. piante coltt. in Padova.

2693 A. Cyclamen persicum Mill.
Originario della Grecia e non della Persia (sec. Boiss.). Coltivato dal principio dell' ottocento.
1812 Bonato; Spigno — 1815 Biroli — 1840 Tagliabue l.c. — 1842 Visiani.

Ceratostigma Bunge [Plumbagin.]

2708 A. Ceratostigma plumbaginoides Bunge = Plumbago Larpentae Lindl.
Della Cina. Coltivata dalla metà dell' ottocento.
1850 Cat. d. piante d. Ort. bot. Pad. MS. 1867 Pasquale — 1869 L. Croff, Cat. grand. stab. Ortic. Milano.

2724 C. Jasminum azoricum L. [Oleac.]
Nativo delle isole azore. Coltivato fino dal principio del settecento
1713 Tita — 1723 Tilli — 1780 Farsetti.

2724 D. Jasminum Sambac Ait.
Originario delle Indie orient. Coltivato fino dal principio del seicento.
1606. M. Caccini. Cfr. Clusii Curae posteriores, 1611 — 1713 Tita — 1642 Vestingio.

2725 A. Olea fragrans Thunb. [Oleac.]
Originaria della Cina e Giappone. Col-
tivata fino dalla fine del settecento.
1801 Bonato – 1812 Spigno – 1815 Biroli.

Cobaea Cav. [Polemoniac.]

2774 C Cobaea scandens Cav.
Originaria del Messico. Coltivata
fino dal principio dell'ottocento, specie
nel mezzodì d'Italia.
1806 Zuccagni – 1803 Nocca – 1812
Bonato; Spigno.

[Convolv.]

2848 D Ipomoea Nil (L.) Roth
Dell'America merid. – Coltivata fi-
no dal cinquecento.
1532 Cibo – 1551 Aldrovandi – 1563
Cesalpino – 1796 Farsetti.

2848 E Ipomoea Learii (Lindl.) Post.
Dell'America merid. Coltivata dalla
metà dell'ottocento.
1850 Cat. piante Ort. bot. Padova. MS.
1867 Pasquale – 1873 Scarlatti, Prezzo corr.
Stab. agr.-bot. di Firenze.

2848 F. Ipomoea Bona-nox L.
= Calonyction speciosum Choisy.
Dell'America merid. Coltivata fino
dalla seconda metà del settecento.
1772 Allioni – 1793 Zuccagni – 1801
Bonato.

2848 G. Ipomoea versicolor Mussa.
= Mina lobata Llav. et Lexarza
Del Messico. Introdotta in Europa
nel 1845 c., ma diffusa soltanto
per non dopo il 1890.
1895 Ferrario, Prezzo – corr. d. Habl. Orto
di Milano.

2858 B. Datura fastuosa L.
Originaria dell'Egitto. Coltivata fino
dal cinquecento.
1563 Cesalpino – 1617 Pona – 1642 Vestingio
1789 Ucria.

2858 C Datura arborea L.
= Brugmansia candida Pers.
Originaria del Perù. Coltivata fino
dalla fine del settecento
1803 Noua – 1806 Zuccagni – 1812 Bona-
to (D. suaveolens) – 1829 Picciotti.

Freylinia Pang. [Scrophul. I.

2932 A. Freylinia lanceolata (L. f.) Sacc. *)
Originaria del Capo d. B. S. Coltivata in
molti giardini d'Italia dal principio dell'ottocento
1817 Pangelli – 1818 Spigno – 1823 Colla
1821 Capelli – 1854 Cenni, Guida Orto bot.
Padova

*) Nomenclatura giusta e sinonimia:
Freylinia Maurizio Pangelli in Gazz. Piemon-
tese, Torino, Suppl. al n° 59, 17 Magio 1817;
Colla, Freyliniae genus. Taur. 1823.
Freylinia lanceolata (L. fil.) Sacc., Capraria
Lanceolata L. fil. Suppl. plant. 1781, p. 284;
Freylinia oppositifolia M. Pangelli l. c.; Spigno 1818
p. 29; Buddleja glaberrima M. de Lamarck, Hérb
gén. Encyl. IV p. 266 (1819); Capelli 1821, p. 15;
Freylinia cestroides Colla l. c.

Sesamum L. [Pedaliaceae]

3062 A Sesamum indicum L.

Originario delle isole della Sonda. Coltivato dal cinquecento.

1532 Cibo – 1696 Cupani. Cfr. Ucria – 1772 Allioni – 1789 Ucria – 1812 Bonato.

3062 B Sesamum orientale L.

Originario delle isole della Sonda, come il precedente, di cui può avere come conto una razza particolare. Coltivato dal cinquecento.

1561 Anguillara – 1563 Cesalpino – 1565 Matholi. – 1696 Cupani – 1760 Allioni – 1766 Bolognini in Giorn. d'Italia (Venezia)

Leonotis Pers. [Labiatae]

3121 B Leonotis Leonurus Pers.

Originario del Capo di B. S. Coltivato dalla prima metà dell'ottocento.

1841 Piccioli – 1842 Visiani – 1845 Tenore.

Gardenia L. [Rubiaceae]

3255 A. Gardenia florida L.

Originaria dalle Indie or. e Cina. Coltivata dalla fine del settecento.

1798 Fasetti – 1812 Spigno – 1815 Biroli

Abelia R. Br. [Caprifoliac.]

3325 A. Abelia triflora R. Br.

Delle Himalaja. Coltivata solo dopo la metà dell'ottocento.

1855 Catal. d. piante dell'Orto Bot. Padova MS. – 1867 Pasquale – 1872 Scarlatti (Prezzo-corr. agrario-bot. in Firenze). Stab.

3325 B Abelia biflora Turcz.

Della Cina. Coltivata, come la precedente, dopo la metà dell'ottocento, talora sotto i nomi delle affini specie A. uniflora, A. sinensis e A. rupestris e talora pure in una forma ibrida (A. triflora × A. rupestris).

1858 Cat. d. piante dell'Or. Bot. Padova MS. (A. rupestris) – 1867 Pasquale. – 1872 Scarlatti l. c.

Sechium P. Br. [Cucurbitaceae]

3401 A Sechium edule (Jacq.) Swartz = Carjota edulis Jacq.

Originario dell'America tropicale. Coltivato da poco dopo della metà dell'ottocento nell'Italia merid. e Sicilia. Cfr. Pasquale (V. Tenore) Atlante di Botan. popol. Napol. 1875, vol. II p. 104. I

1867 Pasquale II 1863 Todaro. Cfr. Atti Soc. agr. in Sicilia

Chrysanthemum L. [Compositae]

3538 A. Chrysanthemum carinatum Schousb.

Nativo della Barberia. Coltivato fino dal principio dell'ottocento.

1801 Bonato – 1812 Spigno – 1842 Visiani

3548 A. Chrysanthemum frutescens L.

Delle Isole Canarie. Coltivato in molte varietà fino dal principio dell'ottocento.

1812 Bonato – 1806 Zuccagni – 1815 Biroli

3548 B. Chrysanthemum carneum (Bieb.) Steud.
= Pyrethrum roseum Lindl.
Originario del Caucaso. Coltivato dal primo quarto dell'ottocento ed oggi assai più comunemente
1815 Biroli — 1820 Bonato MS. 1842 Visiani — 1845 Tenore

3630 A Helichrysum bracteatum W. [Compos.]
Originario della Nuova Olanda. Coltivato fino dal principio dell'ottocento.
1808 Cfr. Savi 1818 — 1842 Visiani — 1845 Tenore — 1867 Pasquale.

Sanvitalia Lam. [Compositae]
3675 Sanvitalia procumbens Lam.
Originaria del Messico. Coltivata ~~fino~~ dalla ~~[illegible]~~ fine del settecento
1801 Bonato — 1793 Zuccagni — 1798 Farsetti — 1815 Biroli

Madia Molina [Composita]
3676 A. Madia sativa Mol.
Oriunda del Cile. Coltivata in qualche luogo dalla prima metà dell'ottocento
1836 Brignoli — 1840 Balzani, Madia sativ. una nuova pianta oleifera. Como — 1842 Visiani

I Elenco

La Flora italiana nei vari secoli (*)

A Piante esotiche

φ [Epoca romana (**)]

Epoca romana (**)

Filices

Ceterach officinarum
Polypodium vulgare
Nephrodium Filix-mas
Asplenium Adiantum-nigrum
— Trichomanes
Scolopendrium vulgare
Pteris aquilina
Adiantum Capillus-Veneris
Equisetaceae
Equisetum limosum

Coniferae

Pinus Cembra
— Pinea
— silvestris
Larix decidua
Abies alba
— excelsa
Cupressus sempervirens
Juniperus Oxycedrus
— Sabina
Taxus baccata

Gramineae

Sorghum vulgare
— — ε cernuum
Saccharum Ravennae
Setaria italica
Panicum miliaceum
Arundo Donax
Phragmites communis
Avena sativa
— fatua
Cynodon Dactylon
Lolium temulentum
Triticum aestivum
— — ∇ spelta
Secale Cereale
Hordeum vulgare
— — β hexastichum
— — γ distichum

Cyperaceae

Cyperus esculentus
— rotundus
— longus
— Papyrus.
Scirpus Holoschoenus

Palmae

Phoenix dactylifera
Chamaerops humilis

Typhaceae

Typha latifolia

Araceae

Acorus Calamus
Colocasia antiquorum
Arum italicum
Dracunculus vulgaris
Arisarum vulgare

Lemnaceae

Lemna minor

Alismataceae

Sagittaria sagittifolia
Alisma Plantago

Juncaceae

Juncus maritimus

Liliaceae

Veratrum album
Colchicum autumnale
Lilium candidum
— bulbiferum
— pomponium
Ornithogalum umbellatum
Urginea maritima
Hyacinthus orientalis
Muscari comosum
Allium Sativum
— fistulosum
— Cepa
— Ascalonicum
Asphodelus ramosus
Asparagus officinalis
— acutifolius
Ruscus aculeatus
— Hypophyllum
— — β Hypoglottum

(**) Si può ritenere che l'epoca romana, nei riguardi degli autori che trattano di piante, decorra da due secoli prima a un secolo dopo Cristo da Porzio Catone (†149 a.C.) a Columella (fiorito c. l'anno 62 d.C.) modificato

(*) Questo Elenco comprende senza distinzione le piante indigene (vale a dire spontanee) e le esotiche (fatte venire e coltivate), che naturalizzate o od avventizie. Nel II Elenco poi le piante esotiche sono contraddistinte (dalle iniziali C. N. A.) a seconda delle rispettive categorie, accennate, qui

successivo

Piante classiche

Smilax aspera

Dioscoreaceae
Tamus communis

Amaryllidaceae
Narcissus serotinus
— poeticus
— Pseudonarcissus
Pancratium maritimum

Iridaceae
Crocus sativus
Iris germanica
— Pseudacorus
Gladiolus communis

Orchidaceae
Serapias Lingua
Orchis Morio

Juglandaceae
Juglans regia

Salicaceae
Salix alba
— — β vitellina
— fragilis
— triandra
— purpurea
— repens

Salix Lapponum γ glauca
Populus nigra
— tremula
— alba

Betulaceae
Betula alba
Alnus glutinosa

Cupuliferae
Carpinus Betulus
Corylus Avellana
Quercus Robur
— Cerris
— Aegilops
— Suber
— Ilex
Castanea vesca
Fagus silvatica

Platanaceae
Platanus orientalis

Urticaceae
Ulmus campestris
Celtis australis
Morus nigra
Ficus Carica
Humulus Lupulus
Cannabis sativa
Urtica pilulifera

Urtica dioica
Parietaria officinalis

Lauraceae
Laurus nobilis

Thymeleaceae
Daphne Gnidium
— Cneorum

Loranthaceae
Loranthus europaeus

Aristolochiaceae
Aristolochia Pistolochia

Polygonaceae
Polygonum Convolvulus
— aviculare
Rumex aquaticus
— crispus
— Patientia
— bucephalophorus

Chenopodiaceae
Atriplex hortensis
Beta vulgaris β Cicla
— — γ esculenta
Chenopodium Botrys

Piante dassiche II

35/0018-277 2

Amarantaceae
Amarantus ascendens

Portulacaceae
Portulaca oleracea

Caryophyllaceae
Agrostemma Githago
Lychnis coronaria
Silene gallica
Saponaria officinalis

Frankeniaceae
Frankenia pulverulenta

Tamaricaceae
Tamarix gallica
— africana

Hypericaceae
Hypericum crispum
— perforatum
— Coris

Cistaceae
Cistus salvifolius
— incanus β villosus
— — δ creticus

Violaceae
Viola hirta x odorata
Viola tricolor

Resedaceae
Reseda luteola

Capparidaceae
Capparis spinosa

Cruciferae
Matthiola incana
Cheiranthus Cheiri
Sisymbrium polyceratum
Nasturtium officinale
— Armoracia
Eruca sativa
Sinapis alba
Brassica adpressa
— campestris β. Rapa
— Napus
— oleracea
Raphanus sativus
Crambe maritima?
Isatis tinctoria
Chamaelina sativa
Neslea paniculata
Lepidium latifolium
— sativum

Fumariaceae
Fumaria officinalis

Papaveraceae
Hypecoum procumbens
Chelidonium majus
Glaucium flavum
Papaver hybridum β Argemone
— somniferum

Nymphaeaceae
Nymphaea alba

Ranunculaceae
Clematis cirrosa
Anemone coronaria
Adonis annua
Ranunculus sardous
Helleborus niger
Nigella sativa
Delphinium peregrinum
— Staphysagria
Paeonia officinalis
Actaea spicata

Crassulaceae
Cotyledon Umbilicus
Sempervivum arboreum
Sedum tenuifolium
— Cepaea

Rosaceae
Prunus Amygdalus
— — β fragilis

Piante daniche

Prunus Persica
— Armeniaca
— Domestica
— — γ insitiva
— spinosa
— avium
— Cerasus
— Mahaleb
Geum urbanum
Potentilla reptans
Fragaria vesca
Rubus idaeus
— fruticosus
Agrimonia Eupatoria
Poterium spinosum
Rosa sempervirens
— gallica
— centifolia
— damascena
— canina
Crataegus Oxyacantha
Mespilus germanica
Pirus Cydonia
— communis
— Malus
— torminalis
— Chamaemespilus
— Domestica

Leguminosae
Ceratonia Siliqua

Anagyris foetida
Lupinus albus
— hirsutus
Genista tinctoria
— hispanica
Spartium junceum
Ononis spinosa
Medicago arborea
— sativa
Melilotus neapolitana
— italica
— officinalis
Trigonella Foenum-graecum
Trifolium arvense
Anthyllis Barba-Jovis
— Hermanniae
Lotus corniculatus
Astragalus sempervirens
Psoralea bituminosa
Bonaveria securidaca
Onobrychis Crista-galli
Cicer arietinum
Pisum sativum
Lathyrus Cicera
— — β latifolius
— tuberosus
Vicia Faba
— sativa
— Ervilia
— Lens
Vigna unguiculata

Myrtaceae
Myrtus communis
Punica Granatum
Lythraceae
Lythrum Salicaria
Oenotheraceae
Epilobium hirsutum
Araliaceae
Hedera Helix
— — β chrysocarpa
Umbelliferae
Bupleurum rotundifolium
Carum Carvi
Petroselinum hortense
Apium graveolens
— Dulce
Pimpinella Saxifraga
— Anisum
Foeniculum vulgare
Ferula communis
Anethum graveolens
Tordylium officinale
Daucus Carota
Thapsia garganica
Myrrhis odorata
Scandix australis
— Pecten-Veneris
Smyrnium Olus-atrum
— perfoliatum
Conium maculatum
Crithmum maritimum

Cornaceae
Cornus sanguinea
— mas

Rhamnaceae

Paliurus Spina-Christi

35/0018-278

III Piante classiche

Zizyphus sativa
— Lotus
Rhamnus Alaternus
— oleoides
— saxatilis
— β infectoria

Aquifoliaceae
Ilex Aquifolium

Ampelidaceae
Vitis vinifera

Celastraceae
Evonymus latifolius

Sapindaceae
Acer monspessulanum
— campestre

Anacardiaceae
Pistacia vera
— Terebinthus
— Lentiscus
Rhus Cotinus
— coriaria

Geraniaceae
Geranium tuberosum
Erodium malachoides
— moschatum
Linum usitatissimum

Zygophyllaceae
Tribulus terrester

Rutaceae
Ruta graveolens
Citrus medica
— Aurantium

Malvaceae
Althaea officinalis
— rosea
Malva silvestris
— rotundifolia
Gossypium herbaceum

Tiliaceae
Tilia platyphylla
— vulgaris

Euphorbiaceae
Euphorbia Chamaesyce
— Lathyris
— platyphylla
— helioscopia
— aleppica
— dendroides
— Pityusa
— Myrsinites
— Characias
Mercurialis annua
Ricinus communis

Buxaceae
Buxus sempervirens

Ericaceae
Arbutus Unedo

Ebenaceae
Styrax officinalis

Oleaceae
Olea europaea
Ligustrum vulgare
Fraxinus Ornus
— excelsior

Apocynaceae
Nerium Oleander
Vinca minor

Asclepiadaceae
Marsdenia erecta

Borraginaceae
Cerinthe major
Anchusa italica
Symphytum officinale

Convolvulaceae
Convolvulus sepium
Cuscuta Epilinum

Solanaceae
Hyoscyamus niger

Piante classiche

Scrophulariaceae

Verbascum Thapsus
— phlomoides
Linaria spuria
Antirrhinum majus
Rhinanthus major
Pedicularis palustris

Labiatae

Teucrium Scordium
— Chamaedrys
Rosmarinus officinalis
Lavandula Stoechas
Salvia officinalis
Satureja hortensis 16
— Calamintha
? Hyssopus officinalis
Thymus capitatus
— vulgaris
— Serpyllum
Origanum Onites
— Dictamnus
Mentha piperita
— Pulegium
Ocimum Basilicum

Verbenaceae

Vitex Agnus-castus
Verbena officinalis

Acanthaceae

Acanthus spinosus
— mollis

Plantaginaceae

Plantago major

Rubiaceae

Galium Aparine
Rubia tinctorum

Caprifoliaceae

Viburnum Lantana
— Opulus
Lonicera Periclymenum

Valerianaceae

Valeriana celtica
— saliunca

Dipsaceae

Dipsacus silvester

Cucurbitaceae

Lagenaria vulgaris
Bryonia alba
Cucumis Citrullus
— sativus
— Melo
Cucurbita Pepo

Compositae

Tussilago farfara
Senecio vulgaris
Bellis perennis
Aster Amellus
Matricaria Chamomilla
Chrysanthemum segetum
Artemisia Absinthium Parthenium
— Abrotanum
Anthemis chia
— Tinctoria
Santolina Chamaecyparissus
Inula Helenium
Calendula officinalis α arvensis
— — η hortensis
Arctium Lappa
Centaurea Cyanus
— Centaurium
Carduus pycnocephalus
Cynara Cardunculus
— — β Scolymus
Cichorium Intybus
— Endivia
Rhagadiolus stellatus
Urospermum picroides
Tragopogon porrifolius ~~20 (404)~~
Lactuca Scariola γ sativa virosa
Lonchus oleraceus
— — β asper
(Totale 408 piante)

(800 - 1499)

B. Piante medievali

[Secolo IX - XV (800-1499)]

Filices

Asplenium Ruta-muraria

Botrychium Lunaria

Equisetaceae

Equisetum hiemale

Coniferae

Juniperus communis

Saccharum officinarum

Graminaceae

Sorghum vulgare

Setaria viridis

Digitaria sanguinalis

Oryza sativa

Cynosurus cristatus

Lolium perenne β italicum

Najadaceae

Posidonia oceanica

Liliaceae

Lilium Martagon

Allium Ampeloprasum β Porrum

Asphodelus ramosus β albus

Aloe vera

Polygonatum officinale

Iridaceae

Iris florentina

Orchidaceae

Orchis pyramidalis

— latifolia β incarnata

Cupuliferae

Quercus coccifera

Thymeleaceae

Daphne Laureola

Santalaceae

Osyris alba

~~A Piante medievali~~

35/0018-279

4

Loranthaceae

Viscum album

Cytinaceae

Cytinus Hypociotis

Aristolochiaceae

Asarum europaeum

Aristolochia rotunda

— longa

Polygonaceae

Polygonum Hydropiper

— orientale

Rumex Acetosa

— obtusifolius

Chenopodiaceae

Spinacia oleracea

Salicornia fruticosa

Paronychiaceae

Herniaria glabra

Caryophyllaceae

Lychnis alba

Silene vulgaris

Dianthus barbatus

— Caryophyllus

Tamaricaceae

Myricaria germanica

Cruciferae

Brassica oleracea c. capitata

— — f. gongylodes

Capsella Bursa-pastoris

Papaveraceae

Papaver Rhoeas

Nymphaeaceae

Nuphar luteum

Ranunculaceae

2 (Thalictrum angustifolium δ flavum

1 (Clematis flammula

— Viticella

Anemone Hepatica

Ranunculus Thora

— acer

Helleborus viridis

Nigella damascena

Aquilegia vulgaris

Aconitum Napellus

Berberidaceae

Berberis vulgaris

Crassulaceae

Sempervivum tectorum

Sedum maximum

— sexangulare β acre

— album

Rosaceae

Potentilla erecta

Fragaria vesca γ collina

Alchemilla vulgaris

Piante medievali.

Poterium Sanguisorba

Leguminosae

Medicago marina
Trifolium pratense
— repens
Glycyrrhiza glabra
Galega officinalis

Oenotheraceae

Trapa natans

Umbelliferae

Eryngium maritimum
Sanicula europaea
Ridolfia segetum
Ammi majus
Petroselinum hortense
Foeniculum vulgare β piperitum
Angelica Archangelica
Peucedanum officinale
Heracleum Sphondylium
— — ε Panaces
Laserpitium Siler
Chaerophyllum temulum
Athamantha macedonica
— cretensis
Oenanthe pimpinelloides
Echinophora spinosa

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica
— Frangula

Sapindaceae

Staphylea pinnata

Geraniaceae

Geranium molle
— dissectum
Oxalis corniculata

Rutaceae

Dictamnus albus

Euphorbiaceae

Euphorbia exigua
— Paralias
Andrachne telephioides

Ericaceae

Erica arborea

Primulaceae

Primula acaulis
Cyclamen europaeum
Anagallis arvensis β caerulea

Plumbaginaceae

Statice Limonium
— minuta ρ cancellata

Oleaceae

Jasminum officinale

Gentianaceae

Gentiana lutea
— asclepiadea
Chlora perfoliata
Erythraea Centaurium

Borraginaceae

Cerinthe minor
Echium vulgare
Lithospermum officinale
Anchusa officinalis
Borrago officinalis
Symphytum tuberosum
Cynoglossum officinale

Convolvulaceae

Convolvulus Soldanella
Cuscuta Epithymum

Solanaceae

Solanum nigrum
— Melongena
Physalis Alkekengi
Atropa Belladonna

Scrophulariaceae

Verbascum montanum
Linaria Cymbalaria
Scrophularia nodosa
Gratiola officinalis
Veronica Beccabunga
— agrestis β didyma

B Piante medievali

35/0018 - 280

5

Euphrasia officinalis γ minima
Pedicularis comosa
Orobanche reticulata ? β
pallidiflora

Labiatae
Ajuga reptans
— Chamaepitys
Teucrium Polium
Lavandula Spica
Marrubium vulgare
Nepeta Cataria
Glechoma hederacea
Brunella vulgaris
Leonurus Cardiaca
Stachys germanica
— maritima
Salvia glutinosa
— pratensis
Melissa officinalis
Satureja montana
~~[illegible]~~ 16
Origanum vulgare
Mentha longifolia
— aquatica
Ocimum minus

Globulariaceae
Globularia cicanescens

Plantaginaceae
Plantago lanceolata

Rubiaceae
Galium verum

Caprifoliaceae
Sambucus Ebulus
Lonicera implexa

Dipsaceae
Dipsacus fullonum
Succisa pratensis
Knautia arvensis

Cucurbitaceae
Ecballium Elaterium
Momordica Balsamina
Bryonia dioica
Cucumis Colocynthis
— Melo var. flexuosus

Campanulaceae
Campanula Rapunculus

Compositae
Eupatorium cannabinum
Adenostyles alpina γ Alliariae
Senecio Jacobaea
Chrysanthemum Balsamita β
tanacetoides
— vulgare
Artemisia camphorata
— vulgaris
— pontica
— Dracunculus

Anthemis Cotula
Achillea Ageratum
— Millefolium
Filago germanica
Inula salicina
— crithmoides
Pulicaria dysenterica
Asteriscus spinosus
Arctium Lappa γ minus
Serratula tinctoria
Carthamus tinctorius
Cirsium lanceolatum
— acaule
Onopordon Acanthium
Scolymus hispanicus
Tragopogon pratensis ~~20~~ (186)
Taraxacum officinale
Hieracium florentinum
(Totale 189 piante

C Piante cinquecentesche α P. cinquecentesche 35/0018-281 6

[Secolo XVI (1500 – 1599)]

Filices

Notholaena Marantae
Polypodium Dryopteris
Aspidium Lonchitis
— aculeatum
Nephrodium Thelypteris
Cystopteris fragilis
— — β alpina
Asplenium Filix-femina montana
— germanicum septentrionale
Scolopendrium Hemionitis attosorus crispus
Blechnum Spicant
Pteris cretica
Ophioglossum vulgatum
Osmunda regalis

Marsiliaceae

Salvinia natans
Marsilia quadrifolia

Equisetaceae

Equisetum arvense
— maximum
— ramosissimum
— variegatum

Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum
— annotinum

Selaginella spinosa
— denticulata

Isoetaceae

Isoetes velatum

Coniferae

Pinus Pinaster
— halepensis
— silvestris
— montana β pumilio
Juniperus communis γ nana
— macrocarpa
— phoenicea

Graminaceae

Zea Mays
Coix Lacrima
Andropogon Ischaemum
Sorghum halepense
Setaria glauca
— verticillata
Panicum Crus-galli
Stipa pennata
Phleum asperum
Sporobolus pungens
Agrostis alba δ vulgaris
Ampelodesma tenax
Holcus lanatus
Avena fatua β sterilis
Arrhenatherum elatius
— — β bulbosum

Eragrostis poaeoides β mega stachya
Briza media
— maxima
Poa trivialis
Festuca ovina β duriuscula
— spadicea
Bromus rubens
— sterilis
— — γ madritensis
— molles
— arvensis
Lolium temulentum β speciosum
— perenne
Agropyrum repens
Triticum aestivum β hibernum
— — η dicoccum
— — ι compositum
Aegilops ovata
— — γ triaristata
Hordeum murinum

Cyperaceae

Cyperus flavescens
Eriophorum polystachyum
Scirpus maritimus
— lacuster
— triquetrus
Cladium Mariscus
Carex vulpina
— muricata
— remota

Carex verna
— pendula
— glauca
— distans
— extensa
— riparia

Typhaceae
Typha angustifolia
Sparganium erectum

Araceae
Arum maculatum
Biarum tenuifolium

Lemnaceae
Lemna trisulca

Najadaceae
Potamogeton natans
Zannichellia palustris

Hydrocharitaceae
Stratiotes aloides
Hydrocharis Morsus-ranae

Alismataceae
Damasonium Alisma
Butomus umbellatus

Juncaceae

P. cinquecentesche

Juncus glaucus
— conglomeratus
— — β effusus
— articulatus
Luzula nivea
— — δ albida
— campestris

Liliaceae
Tofieldia calyculata
Veratrum nigrum
Erythronium Dens-canis
Tulipa silvestris
— Gesneriana
Fritillaria imperialis
Gagea arvensis
Ornithogalum comosum
— narbonense
— pyrenaicum
Scilla bifolia
Muscari moschatum
— racemosum
Allium Scorodoprasum
— Ampeloprasum
— vineale
— Schoenoprasum
— Victorialis
— carinatum ζ pulchellum
— suaveolens β ochroleucum
— ursinum
— nigrum

Asphodeline lutea
— liburnica
Anthericum ramosum
— Liliago
Hemerocallis flava
— fulva
Paris quadrifolia
Convallaria majalis
Majanthemum bifolium
Streptopus amplexifolius
Polygonatum verticillatum
— multiflorum
Asparagus tenuifolius

Amaryllidaceae
Galanthus nivalis
— — β major
Leucojum aestivum
— vernum
Sternbergia lutea
Narcissus Jonquille
Pancratium illyricum

Iridaceae
Crocus biflorus
— vernus
Iris foetidissima
— graminea
Hermodactylus tuberosus
Gladiolus segetum

Musaceae
Musa sapientum β paradisiaca.

β P. Cinquecentesche 35/0018-282 7

Cannaceae
Canna indica

Orchidaceae
Cypripedium Calceolus
Ophrys aranifera
— apifera
— Bertolonii
Serapias longipetala
Orchis papilionacea
— purpurea
— militaris
— tephrosanthos
— laxiflora
— mascula
— maculata
Gymnadenia conopsea
Nigritella nigra
Platanthera bifolia
Listera ovata
Neottia Nidus-avis
Limodorum abortivum
Cephalanthera rubra
— ensifolia
— pallens
Epipactis latifolia

Salicaceae
Salix phylicifolia
— — β nigricans
Salix aurita β caprea
— — γ cinerea

Alnus Alnobetula
— incana

Cupuliferae
Ostrya carpinifolia
Quercus Robur γ sessiliflora
— hispanica

Platanaceae
Platanus occidentalis

Urticaceae
Morus alba
Urtica membranacea
— urens

Elaeagnaceae
Elaeagnus angustifolia
Hippophaë rhamnoides

Thymeleacae
Daphne sericea β collina
— Mezereon
Thymelaea Passerina
— hirsuta

Santalaceae
Thesium alpinum
— Linophyllum γ montanum

Aristolochiaceae
Aristolochia Clematitis
— longa γ pallida

Polygonaceae
Polygonum Fagopyrum
— dumetorum
— Bistorta
— viviparum
— lapathifolium
— — β Persicaria
— minus
— — β serrulatum
— maritimum
Rumex alpinus
— conglomeratus
— pulcher
— Acetosella
— Acetosa β arifolius
— — γ hortensis
— scutatus

Chenopodiaceae
Atriplex hastatum
— — ζ patulum
— laciniatum
— portulacoides
— Halimus
Chenopodium Bonus-Henricus
— polyspermum
— Vulvaria
— murale

P. cinquantesima

Chenopodium rubrum
— album
— — β viride
— — γ ficifolium
— — δ opulifolium
Kochia scoparia
— arenaria
Camphorosma monspeliaca
Salicornia herbacea
Salsola Kali β Tragus
— Soda
Halogeton sativa
Suaeda fruticosa
— maritima

Amarantaceae
Amarantus candatus
— retroflexus
— bicolor
— graecizans
Celosia cristata
Theligonum Cynocrambe

Nyctaginaceae
Mirabilis Jalapa
Datiscaceae
Datisca cannabina
Molluginaceae
Thelephium Imperati

Paronychiaceae
Scleranthus annuus

Passifloraceae
Passiflora caerulea.

Cornigera litoralis
Herniaria glabra β hirsuta
— alpina β incana
Polycarpon tetraphyllum

Caryophyllaceae
Sagina procumbens
Arenaria serpyllifolia
Moehringia trinervia
— Ponae
Stellaria nemorum
— media
— holostea
Cerastium glomeratum
— campanulatum
— arvense
— tomentosum
Lychnis Flos-cuculi
— chalcedonica
— rubra
Cucubalus baccifer
Silene quadrifida
— acaulis
— saxifraga
— Armeria
— italica
— nutans
— Otites

Dryas Spirosa
Saponaria ocymoides
— Vaccaria

Tunica saxifraga
— prolifera
Dianthus Armeria
— Carthusianorum
— Caryophyllus γ inodorus
— monspessulanus
Hypericum Androsaemum
— hircinum
— quadrangulum
— — γ acutum
— perfoliatum
— montanum

Cistaceae
Helianthemum Fumana
— canum
— Chamaecistus
— guttatum
Cistus monspeliacus
— incanus

Violaceae
Viola canina
— — γ elatior
— — δ silvatica
— hirta
— biflora

Resedaceae
Reseda alba β Hookeri
— lutea
— Phyteuma

155

Capparidaceae

Capparis spinosa β inermis

Cruciferae

Hesperis matronalis i

Erysimum hieraciifolium γ Cheiranthus

— — ζ canescens

Arabis glabra

— Turrita

— alpina

— hirsuta

— bellidifolia

Sisymbrium Sophia

— officinale

Alliaria officinalis

Barbarea vulgaris

Nasturtium silvestre

Cardamine trifolia

— amara

— pratensis β Haynaana

— Chelidonia

Dentaria enneaphyllos

— pentaphyllos

— — δ digitata

— bulbifera

Brassica nigra

— Sinapistrum

— campestris

— Napus β Napobrassica

Brassica oleracea b acephala

— — δ sabauda

— — g Botrytis

Diplotaxis muralis

— tenuifolia

Conringia orientalis

Raphanus Raphanistrum β Landra

Rapistrum rugosum

Cakile maritima

Isatis tinctoria

Alyssum sinuatum

— montanum

— calycinum

Fibigia clypeata

Lunaria annua

— rediviva

Draba aizoides

— verna

Cochlearia saxatilis

Coronopus procumbens

Lepidium Draba

— Iberis

— ruderale

— campestre

Hutchinsia alpina

Thlaspi arvense

— perfoliatum

Iberis semperflorens

— umbellata

Biscutella levigata

Fumariaceae

Fumaria capreolata

— officinalis ε parviflora

Corydalis lutea

— β ochroleuca

— cava

Papaveraceae

Papaver alpinum β pyrenaicum

Ranunculaceae

Clematis alpina

— recta

— Vitalba

Thalictrum aquilegifolium

— angustifolium

Anemone alpina

— Pulsatilla

— — γ pratensis

— narcissiflora

— ranunculoides

— nemorosa

— trifolia

— silvestris

— hortensis

Adonis vernalis

— annua δ autumnalis

Ranunculus aconitifolius ε trichophyllus

— velutinus

— bulbosus

— arvensis

— sceleratus

Piante cinquecentesche

Caltha palustris
Trollius europaeus
Eranthis hiemalis
Helleborus foetidus
Nigella arvensis
Aquilegia vulgaris β atrovioleacea
Delphinium Consolida
— Ajacis
— fissum
Aconitum variegatum
— — γ paniculatum
— Anthora
— Lycoctonum
Paeonia officinalis
— — δ mascula

Berberidaceae

Epimedium alpinum
Leontice Leontopetalum

Saxifragaceae

Paenestia palustris
Saxifraga rotundifolia δ
— petraea
— granulata
— bulbifera
— muscoidea
— Hellanj
— autumnalis
— cuneifolia
— Geum
Saxifraga crustata
— Aizoon
— caesia
Ribes Grossularia
— nigrum
— petraeum
— rubrum
Philadelphus coronarius

Crassulaceae

Sempervivum montanum
Sedum roseum
— rupestre
— sexangulare
— dasyphyllum
— stellatum
— litoreum
— hispanicum
— rubens

Rosaceae

Prunus Persica β Nucipersica
— avium β duracina
— — γ Juliana
— Padus
— Laurocerasus
Spiraea Filipendula
— Ulmaria
— Aruncus
Dryas octopetala
Geum rivale
— reptans
— montanum
Potentilla alba
— nitida
— canescens
— hirta β recta
— argentea
— anserina
Rubus Saxatilis
— fruticosus γ caesius
Agrimonia Agrimonoides
Alchemilla alpina
— Aphanes
Poterium officinale
Rosa rubiginosa
— pendulina
— lutea
Crataegus Azarolus
Cotoneaster Pyracantha
— integerrima
Amelanchier vulgaris
Pirus Aria
— aucuparia

Leguminosae

Cercis Siliquastrum
Lupinus angustifolius
Cytisus Laburnum
— alpinus
— nigricans
— sessilifolius
— scoparius
— hirsutus
— monspessulanus
Genista tinctoria ε ovata
Cassia obovata

δ P. cinquecentesche

35/0018-284

Genista germanica
— radiata
— aspalathoides γ Salzmanni
Ulex europaeus
Calycotome spinosa
Ononis Natrix
Medicago lupulina
— falcata
— orbicularis
— Murex
— hispida
— radiata
Melilotus alba
Trigonella caerulea
— corniculata
Trifolium incarnatum
— ochroleucum
— medium
— alpestre
— rubens
— fragiferum
— hybridum β elegans
— montanum
— alpinum
— patens
— campestre
— aureum
Circinus circinnatus 10
Anthyllis tetraphylla
— vulneraria
Dorycnium pentaphyllum
Lotus corniculatus ε tenuifolius

Lotus siliquosus
Bisernula Pelecinus
Astragalus hamosus
— glycyphyllos
— Cicer
— Onobrychis
— Tragacantha
Glycyrrhiza echinata
Psoralea bituminosa
Colutea arborescens
Scorpiurus muricatus
— — δ subvillosus
Coronilla scorpioides
— varia
— minima
— Emerus
Hippocrepis comosa
— unisiliquosa
Hedysarum coronarium
Onobrychis vicifolia
Lathyrus Aphaca
— Ochrus
— annuus
— ~~Cicera~~ silvester
— — β latifolius
— — δ heterophyllus
— pratensis
— pannonicus
— — β varius
— niger
— vernus
— venetus

Vicia oroboides
— narbonensis
— sepium
— hybrida
— lutea
— sativa β macrocarpa
— — μ angustifolia
— bithynica
— cassubica
— Cracca
— — ε tenuifolia
— villosa β dasycarpa
— — ~~β~~ η Pseudocracca
— multifida
— hirsuta
— disperma
Phaseolus vulgaris
— — η nanus
Dolichos Lablab
Myrtus communis β tarentina

Oenotheraceae

Epilobium Dodonaei
— angustifolium
— montanum
— parviflorum
— tetragonum
Circaea Lutetiana

Halorrhagidaceae

Hippuris vulgaris

Umbelliferae

Eryngium amethystinum
Astrantia major
Hacquetia Epipactis
Bupleurum rotundifolium β suboratum
— fruticosum
— falcatum
— graminifolium
— tenuissimum
— Gerardi
Trinia glauca
Bunium Bulbocastanum
Ammi Visnaga
Petroselinum ammoides
Apium nodiflorum
Sium erectum
Sison Amomum
Pimpinella major
— Tragium
— peregrina
Falcaria saxifraga
— vulgaris
Aegopodium Podagraria
Seseli Bouonei
Cnidium silaifolium
Meum Mutellina
— athamanticum
Ligusticum pyrenaeum β Seguieri
Trochiscanthes nodiflorus
Aethusa Cynapium
Angelica silvestris

P. cinquecentesche

Ferula communis β nodiflora
— — δ glauca
— nodosa
— Ferulago
Pastinaca sativa
Peucedanum opoponax venetum
— Cervaria
— Oreoselinum
— austriacum
— — β rablense
— Ostruthium
— verticillare
Heracleum Sphondylium β longifolium
— — ζ pyrenaicum
Tordylium maximum
— apulum
Daucus Carota β Gingidium
— — ξ gummifer
Daucus muricatus
— Broteri
— grandiflorus β platycarpus
Laserpitium latifolium
— peucedanoides
Elaeoselinum Asclepium β meoides
Torilis arvensis
— anthriscus
— nodosa
Caucalis daucoides
Turgenia latifolia
Chaerophyllum aromaticum
— hirsutum
— aureum

Athamanta sicula
— cretensis β Matthioli
Pleurospermum austriacum
Molopospermum peloponnesiacum
Physospermum aquilegifolium
Coriandrum sativum
Bifora testiculata
Magydaris pastinacea
Hippomarathrum Libanotis β siculum
Prangos ferulacea
Oenanthe aquatica
— fistulosa
— pimpinelloides δ peucedanifolia
— crocata
~~Vetus [illegible] [illegible]~~

Celastraceae

Evonymus europaeus

Sapindaceae

Acer platanoides
— Opalus
— Pseudoplatanus
Aesculus Hippocastanum
Cardiospermum Halicacabum

Balsaminaceae

Impatiens Noli-tangere
— Balsamina

Polygalaceae

Chamaebuxus alpester

35/0018-285 10

ε P. cinquecentesche

Polygala vulgaris
— — η flavescens
— — δ nicaeensis

Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
— Robertianum
— lucidum
— phaeum
— rotundifolium
— columbinum
— argenteum
— sanguineum
— tuberosum
— silvaticum
— pratense
— nodosum
Erodium ~~[illegible]~~
— cicutarium
Oxalis Acetosella
— corniculata γ stricta
Linum usitatissimum δ angustifolium
— viscosum
— tenuifolium
— maritimum
— gallicum

Tropaeolaceae
Tropaeolum majus

Zygophyllaceae
Zygophyllum Fabago

Peganum Harmala

Rutaceae
Citrus medica β Limon
— Aurantium ε Bigaradia
— — ζ grandis

Simarubaceae
Cneorum tricoccum

Meliaceae
Melia Azedarach

Malvaceae
Althaea cannabina
— ficifolia
Lavatera arborea
— olbia
— punctata
Malva moschata
— alcea
— — δ fastigiata
— crispa
Abutilon Avicennae
Hibiscus Trionum
— roseus

Tiliaceae
Tilia ~~platyphylla~~
— cordata
Corchorus olitorius

Euphorbiaceae
Euphorbia Peplis
— palustris
— spinosa
— epithymoides ε verrucosa
— Apios
— carniolica
— dulcis
— pilosa
— pubescens
— Peplus
— falcata
— segetalis
— Séguiriana
— Cyparissias
— Esula
— amygdaloides
— Characias β veneta
Chrozophora tinctoria
Mercurialis perennis
— — β ovata

Empetraceae
Empetrum nigrum

Ericaceae
Pirola uniflora
— secunda
— rotundifolia
— — β media
Rhododendron hirsutum
— ferrugineum

Erica scoparia
— multiflora
— carnea
Calluna vulgaris
Arctostaphylos Uva-ursi
Vaccinium Vitis-idaea
— uliginosum
— Myrtillus

Ebenaceae
Diospyros Lotus

Primulaceae
Hottonia palustris
Primula elatior
— officinalis
— farinosa
— Palinuri
— Auricula
— villosa β Cottia
— spectabilis
Androsace obtusifolia
— maxima
Cortusa Matthioli
Soldanella alpina
— — β montana
Cyclamen neapolitanum
— vernale
Lysimachia vulgaris
— punctata
— nummularia

P. cinquecentesche

Samolus Valerandi
Coris monspeliensis

Plumbaginaceae
Plumbago europaea
Statice sinuata
— oleifolia
— minuta δ virgata
— bellidifolia
Armeria vulgaris
— — δ majellensis

Oleaceae
Jasminum grandiflorum
— fruticans
— humile
— odoratissimum
Phillyrea angustifolia β media
— — γ latifolia
— — δ stricta
Syringa vulgaris

Apocynaceae
Vinca major
Apocynum venetum

Asclepiadaceae
Periploca graeca
Cynanchum acutum
— nigrum
— Vincetoxicum

Gentianaceae
Gentiana Pneumonanthe
— acaulis
— cruciata
— verna
— utriculosa

Borraginaceae
Cerinthe major β aspera
Onosma echioides
Echium italicum
Lithospermum purpureo-caerulaeum
— arvense
Myosotis palustris
— pyrenaica ζ silvatica
— arvensis β collina
Pulmonaria officinalis
— — ε tuberosa 14
Lycopsis arvensis
Symphytum officinale β patens
— tuberosum δ bulbosum
Cynoglossum creticum
— cheirifolium
Heliotropium europaeum

Convolvulaceae
Convolvulus Cneorum
— Cantabrica
— arvensis
Ipomoea stolonifera
— Quamoclit
— Nil

35/0018-286

Solanaceae

Datura Metel
— Stramonium
Hyoscyamus albus fastuosa
Scopolia carniolica
Nicotiana rustica
— Tabacum
Lycium europaeum
Solanum Dulcamara
— tuberosum
— nigrum ϑ villosum
— Melongena γ origerum
— Pseudocapsicum
— Lycopersicum
Capsicum annuum
— — ε longum
Physalis somnifera
Mandragora autumnalis
— — β microcarpa

Scrophulariaceae

Verbascum thapsiforme
— Blattaria
— — β virgatum
— pulverulentum
— Lychnitis
— sinuatum
— nigrum
— Chaixii
— phoeniceum
Linaria Elatine
— vulgaris
— purpurea

ζ P. cinquecentesche

Linaria minor
Antirrhinum Orontium
— latifolium
Scrophularia peregrina
— aquatica
— trifoliata
— canina
Lindernia Pyxidaria
Veronica Bonarota
— Anagallis
— Teucrium
— Chamaedrys
— urticifolia
— officinalis
— aphylla
— longifolia
— spicata
— fruticulosa β fruticans
— serpyllifolia
— arvensis
— persica
— hederifolia
Digitalis purpurea
— ambigua
— lutea
Melampyrum cristatum
— arvense
— nemorosum
— — β pratense
Euphrasica tricuspidata
— officinalis

Bartsia alpina
— latifolia
— viscosa
Odontites lutea
— serotina
Rhinanthus alectorolophus
— minor
Pedicularis gyroflexa

Orobanchaceae

Kopsia ramosa
Orobanche gracilis
— minor
Lathraea Squamaria
Pedaliaceae
Sesamum indicum
— orientale
Labiatae
Ajuga genevensis
Teucrium Scorodonia
— creticum
— Botrys
— Marum
— flavum
— montanum
Scutellaria galericulata
Lavandula ~~[illegible]~~ latifolia
Marrubium Alysson
Sideritis sicula
Dracocephalum Moldavica
Nepeta nuda β pannonica
Brunella vulgaris β laciniata
Melittis Melissophyllum

Piante cinquecentesche

Phlomis fruticosa
— ~~[illegible]~~ Lychnitis
Galeopsis Tetrahit
— Ladanum
Lamium Orvala
— Galeobdolon
— amplexicaule
— purpureum
— album
— maculatum
Molucella spinosa
Ballota nigra
— rupestris
Stachys officinalis
— italica
— heraclea
— alpina
— silvatica
— annua
— recta
— — β labiosa
Horminum pyrenaicum
Salvia triloba
— Horminum
— Sclarea
— Aethiops
— argentea β Gussonei
— silvestris
— virgata
— Verbenaca
Satureja Thymbra

Satureja montana γ subspicata
— Juliana
— graeca
— thymifolia
— grandiflora 16
— Nepeta
— (Clinop.) vulgaris
— Acinos
— alpina
— — β suaveolens
Origanum vulgare β hirtum
— — γ creticum
— Majorana
Lycopus europaeus
— exaltatus
Mentha rotundifolia
— viridis
— arvensis
Verbenaceae
Lippia nodiflora

Lentibulariaceae
Pinguicula vulgaris
— alpina
Utricularia vulgaris

Globulariaceae
Globularia vulgaris
— nudicaulis
— Alypum

Plantaginaceae

Plantago media
— Coronopus
— maritima
— Cynops
— ramosa

Rubiaceae
Galium Cruciata
— vernum
— purpureum
— silvaticum
— aristatum
— lucidum
— Mollugo
— palustre
— parisiense
— Vaillantia
Vaillantia muralis
Asperula arvensis
— taurina
— odorata
— cynanchica
— — δ scabra
Crucianella latifolia

Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Viburnum Tinus
Lonicera Caprifolium
— etrusca
— Xylosteum

Piante cinquecentesche

35/0018 - 287

Lonicera alpigena.

Valerianaceae

Valeriana officinalis
— tuberosa
— dioica
— Phu
— tripteris
— saxatilis
Centranthus ruber
— Calcitrapa
Valerianella olitoria

Dipsaceae

Dipsacus pilosus
Succisa australis
Knautia silvatica
Scabiosa gramontia
— columbaria
— — β uniseta
— atropurpurea β maritima
— cretica
— graminifolia
— crenata

Campanulaceae

Jasione montana
Phyteuma orbiculare
— Halleri
— comosum
Campanula Erinus
— petraea

Campanula glomerata
— spicata
— persicifolia
— fragilis
— rotundifolia
— — δ Scheuchzeri
— bononiensis
— Trachelium
— latifolia
Specularia Speculum
Hedraeanthus graminifolius
Trachelium caeruleum

Compositae

Adenostyles alpina
Homogyne alpina
Petasites officinalis
— niveus
— albus
Senecio nebrodensis δ rupestris
— Jacobaea β barbareifolius
— erucifolius
— Cineraria
— Doria
— nemorensis
— Doronicum
— alpinus
— alpester ζ Gaudini
— — η brachychaetus
— — δ Balbisianus
Doronicum austriacum

Doronicum Pardalianches
— Columnae
— — β cordifolium
— grandiflorum
Arnica montana
Bellis perennis γ hybrida
— silvestris
Aster alpinus
— Tripolium
— acer
— Linosyris
Solidago Virgaurea
Erigeron acer
— alpinus
Chrysanthemum Myconis
— coronarium
— Leucanthemum
— alpinum
— Corymbosum
— — β Achilleae
Artemisia camphorata γ alba
— glacialis β Mutellina
— campestris
— caerulescens
— γ cretacea
Anthemis arvensis
— nobilis
— mucronulata β Barrelieri
— Cota
Achillea macrophylla
— Clavenae

Piante cinquecentesche

Achillea nana
— moschata
— Ptarmica
— tomentosa
— Millefolium δ setacea
— — η tanacetifolia
— nobilis
Ziotis maritimo
Filago gallica
Antennaria dioica
Leontopodium alpinum
Gnaphalium luteo-album
— silvaticum
Helichrysum italicum
Phagnalon sordidum
Inula hirta
— spiraeifolia
— Britannica
— candida
— Conyza
— graveolens
— viscosa
Pulicaria vulgaris
— odora
Carpesium cernuum
Buphthalmum salicifolium
Helianthus annuus
Bidens cernua
— bullata
— tripartita
Tagetes erecta
— patula

Xanthium Strumarium
Echinops sphaerocephalus
Cardopatium corymbosum
Carlina acanthifolia
— acaulis
— — β alpina
— vulgaris
— corymbosa
Xeranthemum cylindraceum
Saussurea alpina β lapa thifolia
Jurinea mollis
Centaurea Rhapontica
— alba
— Jacea γ vochinensis
— uniflora
— — δ nervosa
— montana
— — β Triumfetti
— Scabiosa
— rupestris
— Solstitialis
— Calcitrapa
— sphaerocephala
— napifolia
Amberboa moschata
Cnicus benedictus
Carthamus lanatus
Carduus nutans
— defloratus
— Personata
Cirsium Casabonae

Cirsium eriophorum
— — ε Lobelii
— arvense
— canum
— monspessulanum
— Erisithales
— oleraceum
Galactites tomentosa
Silybum Marianum
Cabanancha caerulea
Cichorium spinosum
— Intybus γ indivisum
Lapsana communis
Rhagadiolus stellatus β edulis
Hypochaeris radicata
Leontodon hirtus
— autumnalis
— hispidus ζ danubialis
Picris hieracioides
Helminthia echioides
Urospermum Dalechampii
Tragopogon dubius
— crocifolius
Scorzonera laciniata β Jacquiniana.
— hispanica
— humilis β latifrons
— purpurea (1168) 20
Chondrilla juncea
Sonchus arvensis
Mulgedium alpinum
Prenanthes purpurea
Lactuca perennis
— Scariola
— muralis
Reichardia picroides
Lacyntha verrucosa
Crepis vesicaria γ taraxacifolia
— setosa
— neglecta
— bulbosa
Hieracium Pilosella
— Hoppeanum
— florentinum δ pilosellaides
— — δ praealtum
— amplexicaule
— villosum
— murorum
— prenanthoides
— vallisiacum
— umbellatum
(Totale 1171 piante)

D. Piante secentesche X P. secentesche 35/0018 - 288 13

[Secolo XVII (1600-1699)]
(1600 - 1699)

Filices

Asplenium lanceolatum β oboratum
Cheilanthes fragrans
Hymenophyllum tunbridgense

Gnetaceae

Ephedra nebrodensis

Graminaceae

Andropogon distachyus
— hirtus
Saccharum aegyptiacum
— Ravennae
Oplismenus undulatifolius
Panicum repens
— colonum
Tragus racemosus
Anthoxanthum odoratum
Stipa tortilis
Crypsis schoenoides
— aculeata
Alopecurus bulbosus
Arundo Pliniana
Aira caryophyllea
— capillaris
— insularis
Trisetum parviflorum
Gaudinia fragilis
Dactyloctenium aegyptiacum
Echinaria capitata
Cynosurus echinatus
Lamarckia aurea
Eragrostis poaeoides γ Barrelieri
— pilosa
Melica Cupani
— uniflora
Briza minor
Poa bulbosa f. vivipara
Glyceria fluitans β plicata
Festuca elatior γ arundinacea
Vulpia ligustica
Catapodium siculum
Sclerochloa maritima
— divaricata
— rigida
Bromus scoparius β alopecurus
Brachypodium pinnatum
Psilurus aristatus
Lepturus incurvatus
— cylindricus
Lolium perenne β compositum
Triticum villosum
— aestivum δ turgidum
— — ε durum
Hordeum bulbosum
— maritimum

Cyperaceae

Cyperus serotinus
— fuscus
Scirpus setaceus β Savii
Heleocharis acicularis
— palustris
Carex baldensis
— divisa
— muricata β divulsa

Araceae

Arum maculatum β cylindraceum
Arisarum proboscideum
Ambrosinia Bassii
— — β maculata
— — γ reticulata

Najadaceae

Potamogeton pectinata
— pusilla β trichoides?
— densa
Cymodocea nodosa

Hydrocharitaceae

Vallisneria spiralis

Juncaginaceae

Triglochin Barrelieri

Juncaceae

Juncus acutus

Liliaceae

Colchicum montanum γ Cupani
— Bivonae

P. secentesche

Fritillaria involucrata
Ornithogalum arabicum
— nutans
Scilla autumnalis
— obtusifolia β intermedia
— peruviana δ Cupanii
— amoena
— non-scripta
Muscari botryoides
Allium carinatum δ flavum
— oleraceum γ pallens
— maritimum
— Cupanii
— angulosum β montanum
— Chamaemoly
— subhirsutum
— triquetrum β pendulinum
— siculum
Yucca gloriosa
Polygonatum multiflorum β Broteri
Asparagus aphyllus
— — β stipularis
— albus
Ruscus racemosus
Smilax aspera β mauritanica

Amaryllidaceae

~~Galanthus nivalis~~
~~[illegible] major~~
Leucojum autumnale
Sternbergia colchiciflora β aetnensis

Narcissus serotinus β autumnalis
— Tazzetta δ orientalis
— incomparabilis
Polyanthes tuberosa

Iridaceae

Crocus longiflorus
Romulea Columnae
— Bulbocodium
Iris Sisyrinchium
— planifolia
Gladiolus communis β byzantinus

Orchidaceae

Ophrys tenthredinifera
— lutea
— fusca β pallida
— Speculum
Serapias cordigera
Aceras anthropophora
Loroglossum hircinum
Orchis longebracteata
— longicornu
— intacta
— tridentata
— longicornis
— lanata
— provincialis
— pseudosambucina
Herminium alpinum
Spiranthes autumnalis

Epipactus palustris

Salicaceae

Salix alba β vitellina
— herbacea
— retusa
— — β serpyllifolia

Betulaceae

Alnus Alnobetula β suaveolens

Urticaceae

Celtis Tournefortii
Parietaria lusitanica

Thymeleaceae

Daphne alpina
Thymelaea Tortonraira

Santalaceae

Thesium Linophyllum

Balanophoraceae

Cynomorium coccineum

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima

Polygonaceae

Polygonum alpinum
— romanum
— equisetiforme

XX P. secentesche 35/0018-289 14

Emex spinosa
Rumex ~~aureus~~
— acutus
— maritimus β paluster
— Acetosa δ alpinus
Oxyria digyna
Rheum Rhaponticum

Chenopodiaceae
Atriplex hastatum δ litorale
Beta vulgaris δ maritima
Chenopodium capitatum
— urbicum
— ambrosioides
Halopeplis amplexicaulis
Salsola longifolia

Amarantaceae
Achyranthes aspera
Amarantus spinosus
Celosia argentea

Phytolaccaceae
Phytolacca decandra

Aizooaceae
Mesembryanthemum nodiflorum

~~Passifloraceae~~
~~Passiflora caerulea~~

Molluginaceae

Glinus lotoides

Paronychiaceae
Corrigiola telephiifolia
Paronychia echinata
— argentea
Loeflingia hispanica
Polycarpon peploides

Caryophyllaceae
Spergularia rubra δ marina
Spergula arvensis
Alsine tenuifolia
Arenaria aggregata
— serpyllifolia β tenuior
Stellaria media γ grandiflora
Cerastium mantium γ erectum
Lychnis Flos-Jovis
— alpina
— Coeli-rosa
— alba β divaricata
Silene succulenta β corsica
— nicaeensis
— sedoides
— fuscata
— conoidea β conica
— sericea
— pendula
— nocturna
— fruticosa
— paradoxa

Silene viridiflora
— catholica
Saponaria depressa
— bellidifolia
Gypsophila repens
— Arrostii
Velezia rigida
Dianthus Carthusianorum β Balbisii
— rupicola

Frankeniaceae
Frankenia pulverulenta
— levis

Tamaricaceae
Reaumuria vermiculata
Theaceae
Thea Bohea

Hypericaceae
Hypericum crispum
— nummularium
— tomentosum

Cistaceae
Helianthemum thymifolium
— levipes
— Chamaecistus β serpyllifolium
— aegyptiacum
— Tuberaria
— halimifolium
Cistus crispus

P. secentesche

Cistus albidus

Violaceae

Viola hirta δ alba
— nummularifolia
— calcarata δ aetnensis
— tricolor γ parvula
— — δ hortensis
— — ζ lutea

Capparidaceae

Capparis spinosa γ sicula

Cruciferae

Matthiola incana δ undulata
— tristis
— — γ sicula
— tricuspidata
Malcolmia maritima
— africana
Hesperis laciniata
Arabis Thaliana
— verna
Sisymbrium Zanonii
— Irio
— Columnae
— tanacetifolium
Barbarea dentata
Nasturtium amphibium
Cardamine asarifolia
— Plumieri

Cardamine hirsuta
— glauca
— impatiens
— resedifolia
— graeca
Carrichtera annua
Brassica pubescens
— fruticulosa
— Gravinae
Diplotaxis erucoides
— viminea
— Harra
Moricandia arvensis
Raphanus Raphanistrum
Clypeola Jonthlaspi
Alyssum argenteum
— campestre
— maritimum
— halimifolium
— mutabile
Aubrietia deltoidea β Columnae
Vesicaria utriculata
Draba muralis
Calepina Corvini
Lepidium hirtum β nebrodense
Hutchinsia petraea
— procumbens
Bivonaea lutea
Aethionema saxatile
Thlaspi alliaceum
— montanum β praecox
— rivale

Iberis saxatilis
— Pruiti
Biscutella didyma
— — β lyrata

Fumariaceae

Fumaria capreolata γ agraria
— officinalis γ densiflora
Corydalis solida γ densiflora

Papaveraceae

Papaver hybridum β arg.

Ranunculaceae

Clematis flammula β maritima
Thalictrum calabricum
Anemone apennina
Adonis distorta
Myosurus minimus
Ceratocephalus falcatus
Ranunculus hederaceus
— aquatilis δ tripartitus
— gramineus
— ophioglossifolius β fontanus
— lateriflorus
— bullatus
— monspeliacus
— flabellatus
— Agerii
— sardous β cordiger
— — ε intermedius

XXX P. Lecentesche 35/0018-290 15

Helleborus viridis δ Bocconei
— lividus
Isopyrum thalictroides
Nigella arvensis β divaricata
Delphinium peregrinum β halteratum
— pentagynum β emarginatum
Aconitum variegatum β Cammarum
Paeonia officinalis ε triternata 8

Saxifragaceae
Saxifraga Tridactylites
— androsacea
— bryoides

Crassulaceae
Cotyledon horizontalis
Sempervivum arachnoideum
Sedum dasyphyllum β Donatianum
— heptapetalum
Bulliarda Vaillantii
Tillaea muscosa
Prunus Cerasus γ pumila
Spiraea hypericifolia γ flabellata
Potentilla apennina
— caulescens γ nebrodensis
— Sibbaldi
— argentea β calabra
— supina

Alchemilla pentaphyllea
Rosa alba 9
— Seraphinii
— Heckeliana
Crataegus Oxyacantha ε laciniata
Pirus communis γ amygdaliformis

Leguminosae
Acacia Farnesiana
Adenocarpus complicatus
Cytisus triflorus
— purpureus
— argenteus
Genista Cupani
— silvestris β aristata
Ononis mitissima
— serrata
— alba β oligophylla
— alopecuroides
— variegata
— pusilla
— minutissima
— Natrix γ ramosissima
— ornithopodioides
— biflora
— pendula
— reclinata
— — β mollis
Medicago lupulina β lupaniana
— scutellata
— rugosa

Medicago obscura
— — γ Helix
— truncatula
— minima β recta
— arabica
— hispida γ nigra
Melilotus messanensis
— sulcata
Trigonella gladiata
— monspeliaca
Trifolium subterraneum
— Bocconei
— scabrum
— Cherleri
— angustifolium
— vesiculosum
— spumosum
— resupinatum
— tomentosum
— physodes
— glomeratum
— suffocatum
— nigrescens
— Bivonae
— speciosum 10
Anthyllis montana
— Hermanniae
Dorycnium pentaphyllum γ suffruticosum
— rectum
— hirsutum

P. Lecentesche

Lotus corniculatus
— angustissimus
— creticus β cytisoides
— ornithopodioides
— edulis
— conjugatus
— Tetragonolobus
— — β Broneus
— hirsutus
Astragalus Glycyphyllos
— Pentaglottis
— Sesameus
— baeticus
— depressus β leucophaeus
— capsicus
— monspessulanus
Robinia Pseudacacia
Ornithopus compressus
Coronilla minima β vaginalis
Hedysarum spinosissimum β pallens
Onobrychis Caput-galli
Lathyrus Nissolia
— odoratus
— grandiflorus
— setifolius
Vicia pannonica β striata
— hybrida β sparsa
— lathyroides
— sicula
— Cracca β incana
— — γ elegans
— tetrasperma

Apios tuberosa
Phaseolus coccineus

Lythraceae

Peplis Portula
Lythrum Hyssopifolia
— tribracteatum

Oenotheraceae

Epilobium alpinum β alsinifolium
— trigonum
Ludwigia palustris
Oenothera biennis
Circaea alpina

Umbelliferae

Hydrocotyle ranunculoides
Eryngium tricuspidatum
— Barrelieri
— dichotomum
— tripetrum
Astrantia minor γ pauciflora
Bupleurum rigidum
— ranunculoides
— Odontites
Pachypleurum simplex
Kundmannia sicula
Bonannia setifolia
Krubera peregrina
Ferula glauca
Heracleum Sphondylium
γ. elegans
— — δ cordatum

Tordylium officinale
Daucus Carota γ communis
— — η Bocconei
— — μ breviaculeatus
— aureus
— grandiflorus
— pumilus
Laserpitium Siler γ trilobum
Elaeoselinum Asclepium
Anthriscus silvestris
Scandix brachycarpa
Smyrnium perfoliatum
Oenanthe globulosa
Echinophora tenuifolia

Rhamnaceae

Zizyphus Lotus
Rhamnus oleoides

Ampelidaceae

Parthenocissus quinquefolia

Sapindaceae

Acer Pseudoplatanus β villosum

Segnale

35/0018-290

XXXX Piante secentesche

Anacardiaceae
Rhus hirta
— oxyacantha
— pentaphylla
— Toxicodendron
Schinus Molle

Polygalaceae
Polygala Prestii
— monspeliaca

Geraniaceae
Geranium phaeum β reflexum
— pyrenaicum
— striatum
Erodium Gussonei
— Reichardi
— chium
— — β alnifolium
— — δ laciniatum
— Botrys
— ciconium
— moschatum
— cicutarium β romanum
Pelargonium triste
Linum decumbens
— perenne γ punctatum
— nodiflorum
— flavum β campanulatum

Rutaceae
Ruta chalepensis
— — β bracteosa
Ruta corsica
Citrus Aurantium γ Bergamia
— — δ Limetta
— — δ Lumia
— — ι Limonia-citrata aurantia

Malvaceae
Althaea hirsuta
Lavatera flava β agrigentina
Hibiscus syriacus

Euphorbiaceae
Euphorbia ceratocarpa
— Bivonae
— epithymoides
— coralloides
— Peplus β peploides
— aleppica
— segetalis γ pinea
— terracina
— Pityusa γ Cupani.
— biglandulosa
— Barrelieri
— Esula β Triumfetti
Ricinus communis β africanus

Callitrichaceae
Callitriche palustris β verna

Ericaceae
Rhodothamnus Chamaecistus
Loiseleuria procumbens

Primulaceae
Vitaliana primuliflora
Androsace lactea
— septentrionalis γ elongata
Lysimachia nemorum
Asterolinum Linum-stellatum
~~Cons monspeliensis~~

Plumbaginaceae
Statice monopetala
— oleifolia. δ densiflora
— minuta π cordata
Armeria Morisii β Gussonei

Oleaceae
Fraxinus excelsior γ parvifolia
Jasminum Sambac

Asclepiadaceae
Asclepias syriaca
— curassavica

Gentianaceae
Gentiana ciliata
— campestris
— Amarella β calycina
Erythraea maritima
— spicata

Borraginaceae
Cerinthe minor β maculata
Echium vulgare δ pustulatum
— confusum
— arenarium
— parviflorum

Piante salsecentesche

Lithospermum rosmarinifolium
— suffruticosum
— apulum
Myosotis pyrenaica γ alpestris 14
Alkanna tinctoria
Nonnea vesicaria
Lycopsis variegata
Anchusa Barrelieri
— undulata
Cynoglossum apenninum
— magellense
— Columnae
Asperugo procumbens
Lappula Myosotis
Eritrichium nanum
Heliotropium europaeum γ suaveolens
— supinum

Convolvulaceae

Convolvulus siculus
— tricolor
— althaeoides
— — β elegantissimus
Ipomoea purpurea
Cressa cretica

Solanaceae

Datura Tatula
— ferox
Nicotiana glauca
Solanum nigrum ι miniatum
Capsicum annuum β pyramidale
— — γ cerasiforme
— — δ grossum
— ζ cordiforme

Scrophulariaceae

Linaria pilosa β pubescens
— Pelisseriana
— reflexa
— triphylla
— heterophylla
— chalepensis
Antirrhinum majus β tortuosum
— siculum
Scrophularia vernalis
— lucida
Veronica Teucrium β prostrata
— montana
— acinifolia
Tozzia alpina
Euphrasia salisburgensis
— officinalis β stricta
— alpina δ Rostkoviana
Bartsia Trixago
Odontites Bocconei
— rigidifolia
Elephas Columnae

Orobanchaceae

Kopsia Schultzii γ Cupani
Orobanche crenata
Lathraea clandestina

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides
Tecoma radicans

Labiatae

Ajuga orientalis
Teucrium spinosum
— fruticans
— campanulatum
Prasium majus
Scutellaria peregrina
— — γ Columnae
Lavandula dentata
Sideritis romana
— montana
Dracocephalum Ruyschiana
— virginianum
Nepeta tuberosa
— apuleji
— Nepetella
Lamium flexuosum β pubescens
— bifidum
Leonurus Marrubiastrum
Stachys Alopecuros
— arvensis
— glutinosa
— hirta
Salvia Horminum β viridis
— pratensis δ haematodes

XXXXX Piante secentesche

Salvia Verbenaca β clandestina
— — γ multifida
— verticillata
Satureja graeca ζ fasciculata
— microphylla
— alpina γ pataviana
Thymus striatus
Prestia cerrina

Lentibularieae
Utricularia minor

Plantagineae
Plantago montana
— Lagopus
— argentea
— albicans
— Serraria

Rubiaceae
Putoria calabrica
Rubia peregrina
Galium rotundifolium
— maritimum
— lucidum γ aetnicum
— silvestre
— parisiense β divaricatum
— verticillatum
— murale
— graecum
Sherardia arvensis

Asperula hirsuta

Caprifoliaceae
Viburnum Opulus β roseum
Linnaea borealis

Valerianaceae
Valeriana montana
Valerianella echinata
— — rimosa
— — eriocarpa
— — coronata
Fedia Cornucopiae

Dipsaceae
Cephalaria transsilvanica
— — joppensis
— — leucantha
Knautia integrifolia
— — β hybrida
Scabiosa dichotoma
— silenifolia
— gramuntia δ pyrenaica
— atropurpurea
— limonifolia
— crenata β glabriuscula
Pycnocomon rutifolium

Campanulaceae
Jasione montana β dentata
Phyteuma hemisphaericum
Phyteuma orbiculare β Columnae
Campanula barbata
— Dichotoma
— Cervicaria
— fragilis β Cavolini
— dichroides
— caespitosa
— rhomboidalis
Adenophora liliifolia
— — β Alpina
Specularia hybrida
Hedraeanthus graminifolius β siculus
— tenuifolius
Laurentia Micheli
— tenella

Compositae
Petasites fragrans
Senecio delphinifolius
— gallicus
— coronopifolius
— leucanthemifolius
— nebrodensis
— squalidus
— — γ aetnensis
— uticanus
— Doronicum ε arachnoideus
Doronicum caucasicum
Bellis annua
Bellium bellidioides
Solidago Virgaurea β pygmaea

Piante secentesche

Erigeron canadensis
Chrysanthemum flosculosum
Artemisia arborescens
— Genipi
— campestris β variabilis
Anthemis mixta
— arvensis γ incrassata
— mucronulata
— montana
— punctata β incana
— maritima
— brachycentros
— austriaca
— Triumfetti
Anacyclus clavatus β tomentosus
Achillea Herba-rota
— ligustica
Lonas inodora
Evax pygmaea
Filago arvensis
— heterantha
Gnaphalium supinum
Helichrysum inodorum
— — ε siculum
— Stoechas
— saxatile γ litoreum
Phagnalon rupestre
— saxatile
— — β intermedium
Inula bifrons
Jasonia glutinosa

Pulicaria sicula
Buphthalmum salicifolium γ flexile
Asteriscus maritimus
— aquaticus
Rudbeckia laciniata
Helianthus tuberosus
— multiflorus
Bidens cernua β radiata
Ambrosia maritima
Atrachylis cancellata
Carlina vulgaris β longifolia
— corymbosa γ involucrata
— — δ globosa
— lanata
Xeranthemum inapertum
Jurinea humilis β Bocconii
Serratula tinctoria δ praealta
— nudicaulis
— cichoracea
— — β mucronata
Crupina vulgaris
Centaurea salmantica
— conifera
— Jacea β amara
— Cineraria
— — β Circae
— paniculata
— ragusina
— rupestris δ ceratophylla
— Centauroides

Centaurea alpina
— melitensis
— solstitialis β Adami
— — γ Schouwii
— nicaeensis
— aspera
— sphaerocephala β sonchifolia
Carthamus caeruleus
— — β tingitanus
Carduus defloratus η raethicus
— argyrous
— corymbosus
Cirsium stellatum
— strictum
— afrum β niveum
— syriacum
— italicum
— scabrum
— polyanthemum
Onopordon tauricum
— illyricum
Scolymus maculatus
— grandiflorus
Catananche lutea
Aposeris foetida
Hyoseris radiata
Tolpis barbata
— virgata
Hypochaeris cretensis γ hispida
— Achyrophorus
— aetnensis

XXXXXX Piante Lecentesche 35/0018-292 18

Robertia taraxacoides
Leontodon hispidus
Geropogon glaber
Tragopogon porrifolius δ Cupanii
— crocifolius β nebrodensis

Scorzonera laciniata
— hirsuta
— villosa
— austriaca
— deliciosa (791) 20
Chondrilla prenanthoides
Sonchus tenerrimus
— arvensis γ maritimus
Lactuca viminea
Launaea resedifolia
Andryala integrifolia
Crepis rubra
— foetida
— vesicaria
— — β purpurea
— bursifolia
— leontodontoides
— pulcra
— pontana
— aurea β Columnae
Hieracium sabinum
— aurantiacum
— Bocconei
— alpinum
— porrifolium
— cophanense

Hieracium crinitum
— vulgatum
(Totale 814 piante)

E Piante settecentesche
[Secolo XVIII (1700-1799)]
(1700 - 1729)

(1) P. Settecentesche 35/0018 - 293 19

Filices

Polypodium vulgare γ cambricum
— Phegopteris
— rhaeticum
Nephrodium Oreopteris
— rigidum
— spinulosum
~~Cystopteris montana~~
Asplenium fontanum
— Adiantum-nigrum γ Oreopteris
— filix
— marinum
— viride
Woodwardia radicans
~~Blechnum spicant~~
Struthiopteris germanica
Pteris Aquilina

Marsiliaceae

Pilularia globulifera

Equisetaceae

Equisetum silvaticum
— palustre

Lycopodiaceae

Lycopodium complanatum
— — β Chamaecyparissus
— alpinum
— Selago

Selaginella helvetica
Ginkgoaceae
Ginkgo biloba
Coniferae
Cedrus Libani
Thuya orientalis
— occidentalis

Juniperus virginiana
Taxodium distichum
Ephedra distachya

Gramineae

Lygeum Spartum
Heteropogon Allionii
Chrysopogon Gryllus
Sorghum vulgare β Saccharatum
— — ε carneum
Panicum capillare
— Crus-galli β oryzoides
Oryza clandestina
Phalaris arundinacea
— tuberosa
— caerulescens
— paradoxa
Hierochloe australis
Stipa Calamagrostis
— Aristella
— capillata
— juncea
Milium effusum
— caerulescens
— multiflorum
Phleum arenarium
— Lenne

Phleum alpinum
— pratense
— — β nodosum
— Michelii
— Boehmeri
Alopecurus Gerardi
— utriculatus
— agrestis
— pratensis
— geniculatus
Mibora minima
Polypogon monspeliensis
Gastridium lendigerum
Agrostis Spica-venti
— — β interrupta
— arenaegrostoides
— alpina
— rupestris
— canina
— alba
Calamagrostis arundinacea
— Epigejos
— Litorea
Psamma arenaria β australis
Holcus mollis
Aira praecox
— minuta
Corynephorus articulatus
Deschampsia flexuosa
— media
— caespitosa

Piante bellunesi

Trisetum subspicatum
— distichophyllum
— flavescens
— paniceum
Ventenata dubia
Avena sativa β orientalis
— fatua γ hirsuta
— pratensis
— versicolor
— pubescens
— Parlatorei
— temperiens β Notarisii
— — δ setacea
Danthonia provincialis
Spartina stricta
Beckmannia eruciformis
Eleusine indica
— — β coracana
Sesleria caerulea
— — γ argentea
— sphaerocephala
— dubia β pedemontana
Triodia decumbens
Dactylis serotina
Molinia caerulea
Koeleria pubescens
— hispida
— phleoides
— setacea
— cristata
— — β splendens
Avellinia Michelii
Sphenopus divaricatus
Catabrosa aquatica
Eragrostis poaeoides
Melica ciliata
— Bauhini
— minuta β latifolia
— nutans
Dactylis glomerata
Poa alpina
— — β insularis
— bulbosa
— annua
— violacea
— nemoralis
— caesia
— compressa
— Chaixii
— pratensis
Glyceria fluitans
— aquatica
— distans ε festuciformis
Festuca ovina
— — ε Halleri
— rubra
— gigantea
— elatior
— pumila
— — γ flavescens
— altissima
Vulpia anglica
Vulpia Myuros
— — β dertonensis
— ciliata
— alopecuros
Nardurus unilateralis
— Halleri
Catapodium loliaceum
Sclerochloa dura
Bromus inermis
— asper
— — β ramosus
— erectus
— tectorum
— secalinus
— mollis
— mollis γ racemosus
— intermedius
— squarrosus
Brachypodium distachyum
— silvaticum
— pinnatum γ ramosum
Nardus stricta
Agropyrum caninum
— repens β glaucum
— — δ litorale
— junceum
Hordeum vulgare β hexastichum
— secalinum
Elymus arenarius
— europaeus

Cyperaceae

Cyperus ~~[illegible]~~ glomeratus
— globosus
— glaber
— aegyptiacus
Eriophorum polystachyum β latifolium
— alpinum
— vaginatum
— Scheuchzeri
Scirpus Michelianus
— silvaticus
— maritimus β compactus
— Caricis
— Holoschoenus β globifer
— — γ romanus
— — δ australis
— litoralis
— pungens
— setaceus
— fluitans
— caespitosus
Fimbristylis squarrosa
— dichotoma
— annua
Schoenus nigricans
Rhynchospora alba
— fusca
Cobresia myosuroides
— bipartita
Carex Davalliana

Carex dioica
— pubicans
— rupestris
— microglochin
— cyperoides
— incurva
— foetida
— curvula
— arenaria
— — γ distichea
— paniculata
— distachya
— brizoides
— leporina
— halleriana β lagopina
— elongata
— echinata
— canescens
— bicolor
— caespitosa β stricta
— — δ acuta
— — ε Goodenowii
— atrata
— — β nigra
— digitata
— alba
— humilis
— Halleriana
— montana
— ericetorum
— β approximata

Carex pulicifera
— tomentosa
— pallescens
— pilosa
— obtusata
— capillaris
— strigosa
— panicea
— limosa
— glauca β serrulata
— mucronata
— macrolepis
— frigida
— ferruginea
— Micheli
— silvatica
— distans γ fulva
— flava
— — β Oederi
— Pseudocyperus
— vesicaria
— riparia β acutiformis
— hirta

Typhaceae

Sparganium simplex
— natans

Lemnaceae

Lemna polyrrhiza
— gibba
Wolffia arrhiza

P. settecentesche

Najadaceae

Potamogeton pectinata β marina
— pusilla
— acutifolia
— lucens
— crispa
— perfoliata
— densa β serrata
Ruppia maritima
— — γ rostellata
Zostera marina
— nana
Najas marina
— minor

Alismataceae

Alisma parnassifolium
— Plantago β lanceolatum

Juncaginaceae

Triglochin maritima
— palustris
— Barrelieri

Commelinaceae

Commelina communis
— virginica
Tradescantia virginica

Juncaceae

Juncus filiformis
Juncus obtusiflorus
— articulatus β acutiflorus
— — δ striatus
— — η alpinus
— heterophyllus
— supinus
— compressus
— trifidus
— — β Hostii
— Jacquinii
— triglumis
— capitatus
— bufonius
— — γ hybridus
— Tenagea
Luzula pilosa
— spadicea
— — β glabrata
— lutea
— silvatica
— campestris β congesta
— — γ adscendens
— spicata
— nutans

Liliaceae

Colchicum alpinum
Balbocodium vernum
Lloydia serotina
Gagea lutea
Scilla italica
Scilla hyacinthoides
— non-scripta
Hyacinthus ciliatus
Muscari maritimum
— commutatum
Dipcadi serotinum
Allium carinatum
— — β violaceum
— narcissiflorum
— angulosum
— suaveolens
— subhirsutum β trifoliatum
— roseum
— neapolitanum
— trigquetrum
— nigrum β Cyrilli
Asphodelus ramosus
Agapanthus africanus
Yucca gloriosa Tintoria Alvaria
— aloifolia
Asparagus officinalis β maritimus
— medeoloides
Leucojum hiemale
Amaryllis Belladonna
Narcissus Tazetta β juncifolius
— Dubius β polyanthus

Iridaceae

Iris variegata
— pumila
— sibirica

Gladiolus paluster
Antholyza aethiopica

Orchidaceae
Ophrys fusca
— myodes
Orchis coriophora
— ustulata
— globosa
— laxiflora β palustris
— pallens
— sambucina
— latifolia
Gymnadenia albida
— odoratissima
Coeloglossum viride
Herminium Monorchis
Corallorrhiza Neottia
Goodyera repens
Spiranthes aestivalis
Listera cordata
Epipogium aphyllum
Juglandaceae
Juglans nigra
Salicaceae
Salix babylonica
— fragilis
— pentandra
— purpurea
— caesia
— incana
— daphnoides

Salix repens
— — β rosmarinifolia
— Lapponum β hebetica
— — γ glauca
— Myrsinites
— — β arbuscula
— reticulata
Populus nigra β italica

Betulaceae
Alnus cordata

Cupuliferae
Carpinus orientalis

Urticaceae
Broussonetia papyrifera
Celtis occidentalis

Magnoliaceae
Magnolia grandiflora
Liriodendron Tulipifera

Thymeleaceae
Daphne alpina β oleoides
Thymelaea dioica
Thesium Linophyllum γ intermedium

Polygonaceae
Polygonum tataricum
— ~~orientale~~
— amphibium

Polygonum strictum
— aviculare γ Bellardi
— — ε effusum
Rumex Hydrolapathum
— pulcher γ divaricatus
— tuberosus
— thyrsoides
— — β intermedius
— Lunaria
— vesicarius

Chenopodiaceae
Atriplex hastatum γ triangulare
Chenopodium capitatum β virgatum
— hybridum
— glaucum
— aristatum
Rubiaeva multifida
Kochia hirsuta
— prostrata
Corispermum hyssopifolium
Polycnemum arvense
Salsola vermicula β microphylla

Amarantaceae
Alternanthera repens
Amarantus retroflexus γ patulus
— hypochondriacus
— paniculatus
— albus
— deflexus

P. settecentesche

Aizoaceae
Tetragonia expansa
Mesembryanthemum crystallinum
— acinaciforme

Cactaceae
Cactus flagelliformis
— grandiflorus
Opuntia vulgaris
— Tuna β maxima

Portulacaceae
Montia fontana
— — β rivularis

Molluginaceae
Mollugo Cerviana
— verticillata

Paronychiaceae
Scleranthus perennis
Illecebrum verticillatum
Paronychia polygonifolia
— Kapela β serpyllifolia
Herniaria alpina
Ortegia hispanica

Caryophyllaceae
Spergularia rubra
— — ε media

Spergularia segetalis
Spergula pentandra
Sagina Linnaei
— — γ glabra
Buffonia macroperma
Alsine mucronata β fasciculata
— verna
— — β recurva
— austriaca β Villarsii
— laricifolia
— graminifolia
— Cherleria
— lanceolata
Arenaria grandiflora
— ciliata
— biflora
— Bertolonii
Moehringia polygonoides
Stellaria media δ apetala
— bulbosa
— uliginosa
— graminea
Holosteum umbellatum
Melachium aquaticum
Cerastium tetrandrum
— illyricum
— brachypetalum
— triviale
— alpinum
— — β latifolium

Cerastium arvense δ lineare
— manticum
Lychnis Viscaria
Silene vulgaris γ alpina
— pumilio
— rupestris
— saxifraga γ multicaulis
— Campanula
— cordifolia
— vallesia
— inaperta
— noctiflora
— conoidea
— gallica β anglica
— italica ε linifolia
Saponaria lutea
Gypsophila porrigens
— muralis
Tunica illyrica
Dianthus virens
— Carthusianorum γ atrorubens
— — δ sanguineus
— Seguierii
— deltoides
— superbus
— plumarius

Frankeniaceae
Frankenia levis β hirsuta

Elatinaceae
Elatine Alsinastrum

Theaceae
Thea japonica

Hypericaceae
Hypericum calycinum
— humifusum
— Richerii

Cistaceae
Helianthemum rotundifolium
— lunulatum
— apenninum β pulverulentum
— — γ pilosum
— — δ roseum
— Chamaecistus γ grandiflorum
— — δ Scopolii
— — ε roseum
— salicifolium
— ledifolium
Cistus florentinus
— laurifolius

Violaceae
Viola canina γ Ruppii
— — x arenaria
— mirabilis
— palustris
— pinnata
— cenisia
— — γ Valderia
— calcarata

Resedaceae
Reseda Phyteuma γ odorata

○④○○ Piante settecentesche

Astrocarpus sesamoides

Cruciferae
Matthiola sinuata
Malcolmia litorea
Erysimum cheiranthoides
— repandum
— hieracifolium
— δ pumilum
Arabis pauciflora
— hirsuta β Allionii
— caerulea
— Scopoliana
— serpyllifolia
— pumila
— Halleri
— auriculata
— saxatilis
Sisymbrium strictissimum
— dentatum
— austriacum
— — δ erysimifolium
— erysimoides
Barbarea vulgaris γ verna
Nasturtium lippizense
— pyrenaicum
— amphibium δ palustre
— anceps
Cardamine bellidifolia
— pratensis
Dentaria pentaphyllos β polyphylla

Sinapis dissecta
Brassica adpressa
— monensis
— oleracea ε villosa
— Richerii
— repanda
— Erucastrum
Rapistrum perenne
Crambe maritima
— hispanica
Bunias Erucago
Ochthodium aegyptiacum
Euclidium syriacum
Myagrum perfoliatum
Isatis tinctoria β Villarsii
— alpina
Alyssum saxatile β petraeum
— alpestre
— incanum
Draba tomentosa
— fladniziensis β carinthiaca
Petrocallis pyrenaica
Cochlearia glastifolia
— officinalis
Lepidium hirtum
Thlaspi alpestre
— montanum
— — γ alpinum
— rotundifolium
Iberis sempervirens
— spathulata β nana
— ciliata

35/0018-296

Piante settecentesche

Iberis linifolia
— intermedia
— amara
Biscutella auriculata
— levigata β coronopifolia

Fumariaceae
Fumaria officinalis η Vaillantii
— spicata
Corydalis solida

Papaveraceae
Glaucium corniculatum
Roemeria hybrida
Papaver alpinum
— Rhoeas ε dubium

Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum
— — β submersum

Ranunculaceae
Clematis integrifolia
Thalictrum foetidum
— — γ elatum
Anemone alpina β sulphurea
— — γ millefoliata
— vernalis
— Pulsatilla β Halleri
— baldensis
Adonis annua β microcarpa
— — γ flammea

Ranunculus aquatilis
— amplexicaulis β plantagineus
— rutifolius
— glacialis
— Séguieri
— lacerus
— Flammula β reptans
— hybridus
— cassubicus β auricornus
— geraniifolius β montanus
— — γ Villarsii
— lanuginosus
— bulbosus β Aleae
— — δ heucherifolius
— parviflorus
— muricatus
Nigella Nigellastrum
Aquilegia alpina
— pyrenaica β Bertolonii
— — δ Einseleana
Delphinium elatum
— — β montanum

Menispermaceae
Menispermum canadense

Droseraceae
Drosera intermedia
Aldroranda vesiculosa 8

Saxifragaceae
Saxifraga Tridactylites β adscendens
— — γ Bellardi

Saxifraga sedoides
— Seguierii
— glabella
— pedemontana
— exarata
— Hirculus
— bryoides β aspera
— mutata
— lingulata
— Aizoon β elatior
— Cotyledon
— media β porophylla
— diapensoides
— caesia β squarrosa
— Vandellii
— Burseriana
— purpurea
— biflora
— oppositifolia
— sarmentosa
Chrysosplenium oppositifolium
Ribes alpinum

Crassulaceae
Sempervivum hirtum
Sedum Telephium
— Fabaria
— Anacampseros
— nicaeense
— alpestre
— hirsutum

Sedum altinefolium
— annuum
— atratum
— villosum

Rosaceae

Prunus brigantiacea
— Mahaleb β Cupaniana
— lusitanica
Spiraea chamaedryfolia β ulmifolia
— salicifolia
— opulifolia
— sorbifolia
Potentilla sterilis
— valderia
— norvegica
— grandiflora
— aurea
— verna
— — β hirsuta
— — δ opaca
— — ε salisburgensis
— hirta
— rupestris
— fruticosa
— multifida
— palustris
Fragaria chiloensis
Rubus fruticosus x tomentosus
— — σ Bellardi
Agrimonia Eupatoria β odorata

Rosa sempervirens δ microphylla
— arvensis
— rubrifolia
— agrestis
— villosa β pomifera
— cinnamomea
— pimpinellifolia
— sulphurea
— indica
Crataegus Crus-galli
— Oxyacantha β monogyna
— coccinea
Pirus florentina
— coronaria

Leguminosae

Albizzia Julibrissin
Mimosa pudica
Acacia triacanthos
Gymnocladus canadensis
Sophora japonica
Lupinus albus β Termis
— hirsutus β micranthus
Cytisus hirsutus β prostratus
— spinescens β ramosissimus
Genista sagittalis
— pedunculata γ diffusa
— sericea
— pilosa
— hispanica
— silvestris γ dalmatica
— cinerea
Calycotome spinosa β infesta
— — γ villosa

Ononis spinosa γ antiquorum
— — δ mitis
— viscosa β breviflora
— canisia
— fruticosa
— rotundifolia
Medicago prostrata
— tuberculata
— rigidula
— laciniata
— minima
— — γ hirsuta
— carsiensis
— intertexta
Melilotus indica
Trigonella polycerata
Trifolium clypeatum
— saxatile
— striatum
— ligusticum
— lappaceum
— hirtum
— Loiseleuri
— obscurum
— maritimum
— echinatum
— pannonicum
— pratense η pallidum
— levigatum
— nigrescens β polyanthemum
— Michelianum
— filiforme

35/0018 - 297

Piante settecentesche

Anthyllis Vulneraria δ rubra
— — ε alpestris
— — κ vulnerarioides
— montana β Jacquini
Lotus corniculatus γ decumbens
— — δ ζ uliginosus
— creticus
Astragalus depressus
— exscapus
— glanduliflorus
— australis
— alpinus
— montanus
— pilosus
— foetidus
— campester
— uralensis β Halleri
— Hypoglottis
— vesicarius
— alopecuroides
— sempervirens
— siculus
Amorpha fruticosa
Robinia hispida
Scorpiurus vermiculatus
Ornithopus perpusillus
Coronilla coronata
— juncea
— valentina
— — β glauca
Hippocrepis comosa β glauca

Hedysarum obscurum
Onobrychis Crista-galli
Arachis hypogaea
Lathyrus articulatus γ Clymenum
— hirsutus
— sphaericus
— palustre
— Linnaei
— montanus
Vicia grandiflora
— peregrina
— sativa δ cordata
— onobrychioides
— dumetorum
— pisiformis
— silvatica
Loja hispida

Lythraceae
Rotala filiformis

Oenotheraceae
Epilobium montanum δ collinum
— palustre
— alpinum
Lopezia coronata

Halorrhagidaceae
Myriophyllum spicatum

qui
Umbelliferae
Hydrocotyle vulgaris

Araliaceae
Aralia spinosa

Eryngium planum
— alpinum
Astrantia minor
— — β carniolica
Bupleurum stellatum
— ranunculoides β gramineum
— Odontites β veronense
— semicompositum
— junceum
Apium inundatum
Petroselinum segetum
Sium latifolium
Cicuta virosa
Pimpinella saxifraga β hircina
— anisoides β Gussonei
Seseli montanum
— — γ glaucum
— Gouani
— tortuosum
— annuum
— Libanotis
Silaus pratensis
Selinum Carvifolia
Ligusticum ferulaceum
Peucedanum Carvifolia
— palustre
Heracleum austriacum
Daucus Carota δ mauritanicus
Laserpitium siler β gerganicum
— gallicum
— pratenicum
— Panax

Piante settacentesche

Thapsia villosa
Torilis heptaphylla
Physocaulis nodosus
Chaerophyllum bulbosum
— temulum
Hladnikia Golaka
Bifora radians
Cachrys laevigata
Oenanthe pimpinelloides
γ silaifolia

Cornaceae
Cornus sanguinea

Rhamnaceae
Rhamnus catharticus β hydriensis
— pumila
— alpina
— rupestris

Celastraceae
Evonymus verrucosus
Celastrus scandens

Sapindaceae
Acer platanoides β Lobelii
Negundo
Koelreuteria paniculata

Anacardiaceae
Rhus Toxicodendron β radicans

Polygalaceae
Polygala amara
— exilis

Geraniaceae
Geranium asphodeloides
Erodium maritimum
— alpinum
Pelargonium zonale
— Radula
— odoratissimum
— capitatum
Oxalis cernua
— violacea
Linum catharticum
— perenne β alpinum
— narbonense
— strictum
— flavum
— — β capitatum
Radiola linoides

Rutaceae
Ruta montana
— patavina
Xanthoxylon fraxinifolium

Malvaceae
Lavatera maritima
— trimestris
Malva Sherardiana
Hibiscus pentacarpos
— esculentus

→ qui

Tiliaceae
Tilia americana

Sterculiaceae
Sterculia platanifolia

Euphorbiaceae
Euphorbia nutans
— taurinensis
— serrata
Acalypha virginica

Callitrichaceae
Callitriche palustris β
— — δ hamulata
— — ζ bifida

Coriariaceae
Coriaria myrtifolia

Ericaceae
Hypopitys multiflora
Erica cinerea
Arctostaphylos alpina
Oxycoccus quadripetalus
Rhododendron ponticum

→ qui

Primulaceae
Primula longiflora
— carniolica
— marginata
— villosa γ viscosa
— — η latifolia
— Allionii
Androsace alpina
— imbricata β multiflora
— villosa
— — β Charmejasme
— carnea

Ebenaceae
Diospyros virginiana

Piante settecentesche

Cyclamen neapolitanum β Poli
Trientalis europaea
Anagallis arvensis β latifolia
— tenella
Centunculus minimus
Glaux maritima

Plumbaginaceae

Statice ferulacea
— echioides
— minuta ξ articulata
Armeria vulgaris β alpina
— pubescens

Oleaceae

Phillyrea angustifolia
Syringa persica
Fontanesia phillyreoides
Jasminum azoricum

Apocynaceae

Vinca difformis

Gentianaceae

Swertia perennis
Pleurogyne carinthiaca
Gentiana purpurea
— punctata
— acaulis β Kochiana
— — δ alpina
— verna γ pumila
— bavarica
— nivalis
— campestris β neapolitana

Gentiana Amarella δ obtusifolia
— tenella
Erythraea pulchella
Menyanthes trifoliata
Limnanthemum nymphoides

Polemoniaceae

Phlox paniculata

Borraginaceae

Cerinthe major
Onosma echioides δ stellulatum
— — ε cinereum
Omphalodes verna
— linifolia
Eritrichium nanum β terglovense
Heliotropium curassavicum

Convolvulaceae

Convolvulus humilis
Ipomoea coccinea
— Bona-nox

Solanaceae

Datura inermis
Cestrum Parqui
Lycium afrum
— barbarum
Solanum Melongena β insanum
— sodomaeum
— marginatum
Physalis pubescens
— — β peruviana

Scrophulariaceae

Verbascum longifolium
— Boerhaavei β bicolor
Linaria cirrosa
— arvensis
— supina
— alpina
— Cepraria
— monspessulana
— rubrifolia
Antirrhinum Orontium β calycinum
Anarrhinum bellidifolium
Scrophularia Scopolii
— aquatica δ auriculata
— Scorodonia
Veronica lutea
— Teucrium γ austriaca
— allionii
— scutellata
— fruticulosa
— serpyllifolia β tenella
— bellidioides
— alpina
— verna
— peregrina
— triphyllos
— praecox
— agrestis
Digitalis ferruginea
Erinus alpinus
Melampyrum silvaticum

35/0018-298

Piante settecentesche

35/0018-299 25

Odontites viscosa
— serotina β verna
Rhinanthus major
Pedicularis verticillata
— tuberosa
— incarnata
— rostrata
— palustris
— silvatica
— acaulis
— foliosa
— — β summana
— recutita
— rosea β Allionii
— Oederi

Orobanchaceae
Kopsia lavandulacea
— purpurea
Bignoniaceae
Catalpa bignonioides

Martyniaceae
Martynia proboscidea

Labiatae
Ajuga pyramidalis
Teucrium Arduini
— lucidum
— — γ intermedium
— — δ luteum

Scutellaria alpina
— hastifolia
— minor
Lavandula multifida
Marrubium candidissimum
— peregrinum
Sideritis hyssopifolia
— hirsuta
— perfoliata
— incana
Nepeta italica
Brunella hissopifolia
— vulgaris γ grandiflora
Phlomis italica
Lamium garganicum
— — β grandiflorum
— hybridum
Ballota frutescens
Stachys densiflora
— recta δ subcrenata
Salvia canariensis
— pratensis ε ceratophylloides
— hispanica
— pinnata
— napifolia
Satureja Piperella 16
Monarda didyma
Thymus Serpyllum η lanuginosus
Mentha arvensis γ parietarifolia
— — ε agrestis

Mentha Pulegium β tomentosa
Perilla ocimoides
Verbenaceae
Lantana Camara
~~Acanthaceae~~
Acanthaceae
Acanthus spinosus β spinosissimus
— longifolius

Lentibulariaceae
Pinguicula vulgaris β leptoceras

Globulariaceae
Globularia cordifolia
— — γ repens

Plantaginaceae
Plantago Cornuti
— fuscescens
— lanceolata β maritima
— — δ altissima
— Coronopus δ macrorrhiza
— crassifolia
— maritima β serpentina
— lusitanica
— Loeflingii
Rubiaceae
Rubia peregrina β lucida
Galium pedemontanum
— boreale

Piante lettecentesche

Galium lucidum β corrudifolium
— — ζ cinereum
— rubrum
— — γ obliquum
— silvestre γ anisophyllum
— hercynicum
— aliginosum
— setaceum
— tricorne
— megalospermum
Asperula glauca
— hexaphylla
Crucianella maritima
Gardenia florida

Caprifoliaceae

Adoxa Moschatellina
Lonicera nigra
— caerulea
— pyrenaica
— sempervirens
Symphoricarpus vulgaris

Valerianaceae

Centranthus angustifolius
Valerianella dentata
— discoidea

Dipsaceae

Dipsacus laciniatus
Cephalaria alpina
— syriaca

Scabiosa gramontia ε holosericea
— columbaria ζ lucida
— stellata
— sicula
— argentea
— prolifera

Cucurbitaceae

Cucurbita moschata
Sicyos angulatus

Campanulaceae

Phyteuma pauciflorum
— Scheuchzeri
— Charmelii
Campanula alpestris
— sibirica
— thyrsoidea
~~— Rapunculus β Lambertiana~~
— patula
— cenisia
— Zoysii
— pyramidalis
— Elatines
— — γ gaiganica
— Bellardi
— rapunculoides
Specularia falcata
Wahlenbergia hederacea

Compositae

Ageratum caeruleum

Adenostyles alpina ζ leucophylla
Cacalia sonchifolia
Homogyne alpina β discolor
Senecio lividus
— silvaticus
— viscosus
— squalidus β glaber
— abrotanifolius
— erucifolius γ tenuifolius
— — δ praealtus
— Cineraria γ gibbosus
— — δ ambiguus
— uniflorus
— paludosus
— camposter β aurantiacus
— ficoides
Doronicum grandiflorum γ glaciale
Bellidiastrum Michelii
Agathea amelloides
Aster Novi-Belgii
— salicifolius
— Tradescanti
— Novae-Angliae
— sinensis
Solidago canadensis
— Virgaurea δ minuta
— — ε litoralis
Erigeron crispus
— annuus
— alpinus δ atticus
— — η uniflorus

Piante settecentesche

35/0018-300

Matricaria inodora
Chrysanthemum Myconis
— β hybridum
— discoideum
— Leucanthemum η heterophyllum
— — δ montanum
— ceratophylloides
— — δ coronopifolium
— indicum
— annuum
Artemisia glacialis
— — γ nitida
— atrata
— chamaemelifolia
— annua
— borealis β nana
— valesiaca
Anthemis fuscata
— arvensis ε sphacelata
— muricata
— alpina
— montana ζ alpina
— Triumfetti β discoidea
Anacyclus radiatus
Achillea atrata
— Millefolium δ dentifera
Santolina Chamaecyparissus β pectinata
— γ pinnata
Micropus erectus
— supinus
Filago minima

Gnaphalium undulatum
— uliginosum β ramosum
Helichrysum orientale
Inula Vaillantii
— ensifolia
Carpesium abrotanoides
Buphthalmum speciosissimum
— salicifolium β grandiflorum
Calendula officinalis ι sicula
— — κ fulgida
Siegesbeckia orientalis
Eclipta alba
Dahlia pinnata
Bidens frondosa
— bipinnata
— heterophylla
Zinnia elegans
Cosmos bipinnatus
Xanthium spinosum
— italicum
Echinops Ritro
— strigosus
Xeranthemum annuum
Staehelina dubia
Berardia lanuginosa
Serratula tinctoria β indivisa
— lycopifolia
Crupina Crupinastrum
Centaurea Rhaponticа β lyrata
— alba β splendens
— Jacea

Centaurea pectinata
— uniflora ζ adscendens
— Cineraria γ cinerea
— paniculata ι carsiana
— hybrida
— rupestris γ aculeosa
— collina
— Calcitrapa β macrantha
— sphaerocephala γ Seridis
— orientalis
Carduncellus Monspeliensium
Carduus nutans δ nigrescens
— litigiosus
— leucographus
Cirsium gnaphaloides
— Acarna
— eriophorum δ Moritianum
— — η ferox
— palustre
— pannonicum
— tuberosum
— medium
— heterophyllum
— ambiguum
— purpureum
— tricephalodes
— Erisithales β ochroleucum
— spinosissimum
Galactites tomentosa β elegans
Arnoseris minima
Hypochaeris maculata
Onopordon acaulon

Piante settecentesche

Hypochaeris uniflora
— cretensis δ pinnatifida
— Achyrophorus β albicans
Leontodon tuberosus
— Taraxaci
— pyrenaicus
— Villarsii
— crispus
— cicanus
Picris pauciflora (1278) 20
Sonchus palustre
Prenanthes purpurea β semifolia

Lactuca viminea δ ramosissima
— saligna
— Scariola β augustana
Andryala integrifolia β sinuata

Pterotheca nemausensis
Crepis Dioscoridis
— albida
— alpina
— virens
— tectorum
— lacera
— chondrilloides
— pygmaea
— conyrifolia
— blattarioides
— mollis β succisifolia
— paludosa

Crepis praemorsa
— — γ incarnata
— aurea
— reflexa
Hieracium staticifolium
— Auricula
— cymosum
— intybaceum
— lanatum
— rupestre
— glaucum
— boreale
— symphytaceum
(Totale 1316 piante)

Piante ottocentesche e novecentesche.

Come fu avvertito altrove, le piante ~~[illegible]~~ della nostra Flora, scoperte o accertate durante l'ottocento e nei primi anni del novecento, qui si omettono e perchè risultano manifeste q dalla enumerazione generale ~~[illegible]~~ quelle più antiche degli altri gruppi e perchè come a noi più prossime assai più facile è la loro documentazione.

q sottraendo

Le piante aggiuntesi in questo periodo di poco oltre un secolo ammontano al cospicuo numero di 4107 in confronto a 3891 notificate nei secoli precedenti, ma è da ~~[illegible]~~ osservarsi che l'elevata somma è in gran parte formata dalla forte proporzione delle sottospecie e degli ibridi che solo le ricerche più sottili della scienza moderna seppero discriminare.

Piante coltivate, avventizie e naturalizzate (in testa di pagina più al foglio 33)

27

II Elenco

Piante esotiche più comunemente coltivate, naturalizzate e avventizie secondo la data del loro primo accertamento fra noi.

Nota. Le lettere C. N. A. indicano: C. piante coltivate; N. naturalizzate; A. avventizie

Naturalmente le piante naturalizzate e le avventizie sono anche x il più delle volte contemporaneamente coltivate o lo furono; onde sono distinte con tre lettere. Invece quelle segnate colla sola lettera C sono le piante che si coltivano (o a vendersi avventizie) ma più comunemente, ma che non riuscirono finora a naturalizzarsi. Le date sono quelle che risultano dai documenti citati, ma che da nuove ricerche potrebbero (forse) (alcune almeno) venire modificate.

Coltivate in più luoghi d'Italia e quindi facili a trovarsi

A. Piante esotiche asiatiche [Epoca romana *)]

Cupressus sempervirens C. N.
Sorghum vulgare C.
— — E cornutum C
Setaria italica C. A.
Panicum miliaceum C. A.
Avena sativa C. A.
~~Oryza sativa C. A.~~
Triticum aestivum C. A.
— — D spelta C.
Secale Cereale C. A.
Hordeum vulgare C. A.
— — β hexastichum C.
— — δ distichum C.
Cyperus Papyrus C. N.
Phoenix dactylifera C.
Acorus Calamus C. N.
~~Chamaerops humilis~~ C.
Colocasia antiquorum C. N.

Lilium candidum C. A.
Hyacinthus orientalis C. N.
Allium sativum C.
— fistulosum C.
— Ascalonicum C.
— Cepa C.
Juglans regia C. A.
Platanus orientalis C. A.
Morus nigra C. A.
Cannabis sativa C. A.
Rumex Patientia C.
Atriplex hortensis C.
Beta vulgaris β Cicla C.
— — γ esculenta C.
Brassica campestris β Rapa C. A.
— oleracea C. A.
Raphanus sativus C. A.
Lepidium sativum C. A.
Papaver somniferum C. A.
Anemone coronaria C.
Nigella sativa C. A.
Prunus Amygdalus C. N.
— — β fragilis C.

& La lettera C obbliqua designa le piante coltivate per la loro utilità; la lettera C retta quelle coltivate principalmente per ornamento.

(*) Vedi nota a pag. 349

Per questo periodo nel quale gli anni della accertamento non sono precisabili le specie sono disposte sistematicamente

35/0018 - 301

Prunus Persica C. N.
— Armeniaca C. N.
— domestica C. N.
Rosa centifolia C.
— damascena C.
Pirus Cydonia C. N.
Ceratonia siliqua C. N.
Medicago sativa C. N
Trigonella Foenum-graecum C. A.
Onobrychis Crista-galli C. L. 1789 A
Cicer arietinum C.
Pisum sativum C.
Lathyrus Cicera β sativus C. A.
Vicia Faba C. A.
— Ervilia C.
— Lens C. A.
Vigna unguiculata C.
Punica granatum C. N.
Sium Sisarum C.
Pimpinella Anisum C. N.
Coriandrum sativum C.
Anethum graveolens C. N.
Anthriscus Cerefolium C. N.
Zizyphus sativa C. N.
Pistacia vera C. N.
Citrus medica C.
— Aurantium C.
Althaea rosea C. N.
Olea europaea C. N.
Marsdenia erecta C.
Origanum Dictamnus C.
Ocimum Basilicum C.
Lagenaria vulgaris C.
Cucumis Citrullus C.
— sativus C.
— Melo C.

Cucurbita Pepo C.
Cichorium Endivia C. A.
Lactuca Scariola γ sativa C. — A.
(Totale 78 piante)

Segue subito
6 pag. 2

B. Piante esotiche medievali

~~Mediocres~~.

860. Saccharum officinarum C.
1300. Morus alba C – A.
1320. Salix viminalis C – N.
— Ocimum minus C.
1375 Cucumis Melo v. flexuosus C.
1415 Allium Ampeloprasum β Porrum C.
— Aloe vera C. – N.
— Spinacia oleracea C. – A.
— Gossypium herbaceum C.
— Brassica oleracea v. gongylodes C.
— — — v. capitata C.
— Solanum Melongena C.
— Jasminum officinale C. – 1785 N.
— Momordica Balsamina C.
— Chrysanthemum Balsamita β tanacetoides C. – N. (e spont.?)
— Artemisia pontica C. – A. 1785
— — Dracunculus C. – N.
— carthamus tinctorius C.
1468 Oryza sativa C.
(Totale 19 piante)

C. Piante esotiche cinquecentesche

1532 Phalaris canariensis C. – N.
— Zea Mays C – A.
— Coix Lacrima C.
— Polygonum Fagopyrum C. – A.
— Kochia scoparia C. – A.
— Amarantus retroflexus C – N.
— Celosia cristata C.
— Leontice Leontopetalum C – A.
— Impatiens Balsamina C.
1532 Cardiospermum Halicacabum C.
— Cercis Siliquastrum C. – N.
— Sesamum indicum C.
— Origanum Majorana C. – A.
— Ipomoea Nil C.
— Tagetes erecta C. – A.
— — patula C. – A.
1550 Hemerocallis flava C. – A.
— Phaseolus vulgaris C.
— Brassica campestris C. – A.
— Crataegus Azarolus C. – N.
— Melia Azedarach C. – A.
— Diospyros Lotus C. – 1745 N.
— Jasminum humile C. – 1898 N.
1551 Triticum aestivum η dicoccum C.
— Amarantus tricolor C. – A.
— Platanus occidentalis C.
— Rosa lutea C. – 1785 N.
— Citrus Aurantium ζ grandis C.
— Solanum Lycopersicum C – A. 1864
— Capsicum annuum C.
— Datura Metel C. – N. 1827
1553. Fritillaria imperialis C.
— Canna indica C.
— Tropaeolum majus C.
— amberboa moschata C.
1554 Triticum monococcum C.
— Cupressus horizontalis C.
— Prunus avium γ Juliana C.
— Citrus Aurantium ε Bigaradia C.
— artemisia Abrotanum C. – N. 1726
1558 Solanum Melongena γ ovigerum C.
— Cucurbita maxima C.

35/0018 - 302

1561 Triticum aestivum β hibernum C.
— — — ι compositum C
— Agave americana C. — N.
— Prunus Persica β Nucipersica C.
— Sesamum orientale C.
— Digitalis purpurea C. — 1697 N.
1562 Elaeagnus angustifolia C. — A.
— Capsicum annuum ε longum C.
1563 Hemerocallis fulva C. — A.
— Prunus Laurocerasus C.
— Anchusa sempervirens C. — 1785 A.
— Datura fastuosa C.
1565 Muscari moschatum C. — A.
— Musa sapientum β paradisiaca C. — A.
— Cassia obovata C.
— Aesculus Hippocastanum C. — A.
— Brassica oleracea b. acephala C.
— — — d. sabauda C.
— — — g. Botrytis C.
— Opuntia Ficus indica C. — N.
— Nicotiana rustica C. — 1820 A.
— Syringa vulgaris C. — 1785 N.
1568 Helianthus annuus C.
1570 Nicotiana Tabacum C.
1571 Dracocephalum Moldavica C. — A
1576 Fritillaria persica C. — A.
1580 Ipomoea Quamoclit C.
1583 Amarantus caudatus C. — A.
— Halogeton sativa C. — A.
— Mirabilis Jalapa C. — A.
— Lychnis chalcedonica C.
— Prunus avium β duracina C.
— Medicago radiata C. — A.
— Phlomis Lychnitis C. — 1785 A (o sp.?)
—

1585. Datura Stramonium C. — 1726 N.
1590. Solanum tuberosum C. — A.
— Jasminum grandiflorum C.
1591. Malva crispa C. — 1896 A.
1592 Tulipa Gesneriana C.
— Dolichos Lablab C.
— Corchorus olitorius C.
1594 Datisca cannabina C.
1595 Ranunculus asiaticus C.
1596 Lepidium perfoliatum C. — 1882 A.
(Totale 127 piante)

D. Piante esotiche secentesche

1605 Schinus Molle C. — N.
1606 Ornithogalum nutans C. — N.
— Jasminum Sambac C.
— Helianthus tuberosus C.
1610. Passiflora caerulea C.
1611. Acacia Farnesiana C.
— Capsicum annuum β pyramidale C.
— — — γ cerasiforme C.
— — — ζ cordiforme C.
1612. Rheum Rhaponticum C.
— Oenothera biennis C. — 1726 N
1620 Scabiosa atropurpurea C. (e sp.?)
1623 Lavandula dentata C. — N.
1630 Tulipa Clusiana C. — 1822 N.
1630 Capsicum annuum β grossum C.
— Ipomoea Batatas C.
1633. Tecoma radicans C. — A.
1635. Yucca gloriosa C. — 1790 A.
1640 Polyanthes tuberosa C.
— Celosia argentea C.
— Gomphrena globosa C.
— Phytolacca decandra C. — N.

Scilla non-scripta C. – 1197 N.

1642 Cochlearia officinalis C – 1772 A.
— Hibiscus Syriacus C. – 1802 N.
— Phaseolus coccineus C.
— Apios tuberosa C. – 1848 N.
— Parthenocissus quinquefolia C. – 1864 N.
— Rhus Toxicodendron C – A.
— Viburnum Opulus β roseum
— Asclepias syriaca C. – 1902 A.
— Ipomoea purpurea C. – 1864 A.
— Schouja alpina γ pataviana C.
— Rudbeckia laciniata C – 1854 A.
1644 Citrus Aurantium c Limonia – citrata – aurantia C.
— Erigeron canadensis C. – 1674 N.
1646 Citrus Aurantium γ Bergamia C.
— — — δ Limetta C.
— — — ε Lumia C.
1651 Asclepias curassavica C.
1653 Nicotiana glauca C. – 1884 A.
1657 Presbia cornia C. – A.
1660 Rosa alba C.
— Helianthus multiflorus C.
1662 Robinia Pseudacacia C. – N.
— Pelargonium triste C.
1673 Chenopodium ambrosioides C. – N.
1675 Datura Tatula C. – N.
— Centaurea ragusina C. – 1853 N.
(– 1875 Spontanea.
1678 Rosa racemosa C. – A.
— Rhus hirta C. – N.
1694 Dracocephalum virginianum C.
1696 Triticum aestivum ε durum C
— — — δ turgidum C.
— Scilla amoena C – N.
— Amaranthus spinosus C – 1885 A.
— Viola tricolor δ hortensis C. – A.
1697 Thea Bohea C
(Totale piante 58 piante)

E. Piante esotiche
× Settecentesche

1701 Thuja occidentalis C. – A.
— Loja hispida C.
— Sicyos angulata C. – 1854 N.
— Bidens bipinnata C. – 1754 N.
— Aster Novi-Belgii C. – N.
— Erigeron annuus C. – 1768 N.
1703 Tradescantia virginica C.
— Commelyna communis C. – 1890 a.
1704 Lantana Camara C.
— Solanum tuberosum C. – 1789 N.
— Xanthium spinosum C.? – N.
— Ageratum caeruleum C.
1712 Perilla ocimoides C. – 1880 A.
1713 Polygonum orientale C. – A.
— Cactus grandiflorus C.
— Xanthium strumarium C.
— Rosa sulphurea C.
— Mesembryanthemum acinaciforme C. – 1854 N.
— Armeria pubescens C.
— Lycium afrum C. – 1827 N.
— Jasminum azoricum C.
— Aster Novae-Angliae C. – 1864 a.
— Solidago canadensis C. – 1864 a.
1718 Sorghum vulgare β saccharatum

35/0018 - 303

1723 Asparagus medioloides C. – 1870 A.
— Amaranthus albus C. – A.
— Malva Sherardiana C. – 1884 A.
1724 Syringa persica C.
1729 Ipomoea coccinea C.
1733 Echinops strigosus C. – 1904 A.
1735 Zantedeschia aethiopica C.
1— Salix babylonica C. – N.
1745 Clematis integrifolia C. – A.
— Xanthium italicum N. (o spont.?)
1749. Alopecurus pratensis C.
1751. Aster laevis C. – 1864 A.
1752. Euphorbia lutea C. – N.
1753. Veronica peregrina C.? – N.
1756 Mollugo Cerviana C. – 1826 a.
1757 Rumex vesicarius C. – a.
— — Lunaria C. – A.
1759 Eleusine indica β coracana C. – A.
1760 Taxodium distichum C.
— Cedrus Libani C.
— Iris variegata C. – 1906 A.
— Juglans nigra C.
— Polygonum tataricum C.
— Xanthoxylon fraxineum C.
— Ailanthus glandulosa C.
— Diospyros virginiana C.
— Sterculia platanifolia C.
— Pelargonium zonale C. – 1901 N.
— — inquinans C. – 1899 N.
— odoratissimum C.
— capitatum C.
— Reseda Phyteuma β odorata C. – 1864 a.
1766 Roemeria hybrida C. – 1882 a.
— Liriodendron Tulipifera C.
— Acalypha virginica C. – 1812 a.
— Mimosa pudica C.
— Amorpha fruticosa C.
— Lonicera pyrenaica C. – 1785 A. (o spont.?)
— bignonioides C. – a. 1864!
— Omphalodes linifolia C. – 1847 a.
— Sideritis perfoliata C. – 1789 a.
— Salvia canariensis C. – 1826 N.
— Monarda didyma C.
— Cephalaria tyrsiaca C. – 1844 a.
— Siegesbeckia orientalis C. – 1875 a.
— Xiderus frondosa C. – 1849 a.
— Aster Tradescanti C. – 1890 a.
1762. Thuja orientalis C. – a.
— Rhus Toxicodendron β radicans C. – a.
— Heliotropium peruvianum C.
— Helichrysum orientale C.
— Eleusine indica C. – 1877 N.
1772 Dipsacus sativus C. – a.
— Amaryllis Belladonna C. – 1901 A.
— Bronmonetia papyrifera C – a
— Chenopodium aristatum C. – 1826 N.
— Amarantus hypochondriacus C – 1826 a.
— Alternanthera repens C – 1906 a.
— Mollugo verticillata C. – 1826 a.
— Ochthodium aegyptiacum C – 1877 a.
— Euclidium syriacum C.? – a.
— Gleditschia Triacanthus C. – N. (o spont.?)
— Martynia proboscidea C. – 1904 A.
— Arachis hypogaea C.
— Panicum capillare C. – 1871 A.

35/0018-304

1772 Salvia hispanica C. — 1785 N.
— Ipomoea Bona-nox C.
— Lycium barbarum C. — A.
— Solanum Melongena β inspanum C.
— Scabiosa prolifera C. — 1789 A.
— Onopordon acanthon C. — 1898 A. (o sport?)
— Artemisia annua C. — 1897 A.
1780 Yucca aloifolia C. — 1860 A.
~~1780~~ Celtis occidentalis C.
— Hypericum calycinum C. — 1864 A.
— Magnolia grandiflora C.
— Rhus glabra C. — A.
— Acer Negundo C. — A.
— Celastrus scandens C.
— Crataegus Crus-galli C. — A.
— — coccinea C.
— Spiraea opulifolia C.
— Fragaria chiloensis C. — A.
— Cactus flagelliformis C.
— Symphoricarpus vulgaris C.
— Senecio picroides C. — 1856 N.
— Zinnia elegans C. — A.
— Agathea amelloides C.
— Cacalia sonchifolia C.
1785. Koelreuteria paniculata C.
— Sideritis incana A. (o sport.?)
— Bidens pilosa β leucantha A. — 1801 C.
— Chrysanthemum annuum A. (o sport.?)
2(1787 Ginkgo biloba C.
1(1786 Tetragonia expansa C. — 1905 A.
1787 Pinus coronaria C.
— Hibiscus esculentus C.
— Cucurbita moschata C.
1789 Opuntia Tuna β maxima C. — N.
— Lonicera sempervirens C.
— Salvia pinnata C. — 1887 A.
1790 Thea (Camellia) japonica C.
1791 Nicandra physaloides C. — 1830 N.
1793 Avena sativa ε orientalis C.
— Tritoma Uvaria C.
— Amarantus paniculatus C. — 1868 A.
— Menispermum canadense C. — A.
— Vigna unguiculata γ Catiang C.
— Gymnocladus canadensis C.
— Cotyledon orbiculata C. — 1850 N.
— Spiraea salicifolia C. — A.
— Pelargonium Radula C.
— Saxifraga sarmentosa C. — A. 1907
— Arabis spinosa C.
— Heliotropium curassavicum C. — 1900 A.
— Datura inermis C. — 1839 A.
— Physalis pubescens C.
— — — β peruviana C.
— Solanum bonariense C. — 1869 A.
— — marginatum C. — 1899 A.
— Lippia citriodora C.
— Salix vaporifolia C. — 1899 A.
— Aster salicifolius C. — 1903 A.
— Eclipta alba C. — 1900 A.
— Sanvitalia procumbens C.
— Centaurea orientalis C. — 1886 A.
1794 Rudbeckia hispida C.
1795 Oxalis violacea C. — 1895 A.
— Lopezia coronata C.
— Cornus stolonifera C. — 1890 A.
— Cestrum Parqui C. — 1868 N.
1796 Juniperus virginiana C.
— Agapanthus africanus C.
— Anthoxyza aethiopica C. — 1812 A

1796 Rondaeva multifida C. – 1809 A.
— Oscalis cernua C. – 1824 N.
— Fontanesia phillyreoides C. – 1826 N.
— Oenothera rosea C. – 1846 N.
1797 Pyrus lusitanica C. – 1904 A.
1798 Commelina virginica C. – 1888
— Tilia americana C.
— Rosa indica C.
— Spiraea sorbifolia C. – 1870 A.
— Gardenia florida C.
— Cosmos bipinnatus C.
— Dahlia pinnata C.
1799 Cercis siliquastrum C. – 1905 A.
— Phlox paniculata C.
— Rhododendron ponticum C.
— Chrysanthemum indicum C.
(Totale 175 piante)

E Piante esotiche ottocentesche

1800 Liquidambar orientale C.
1801 Asimina triloba C.
— Lepidium virginicum C. – 1856 A.
— Pelargonium cucullatum C. – 1901 A.
— Rosa moschata C. – 1885 N.
— — mascosa C.
— Calycanthus floridus C.
— Lecokia cretica C. – 1839 A.
— Lycopersicum solanum f. piriforme C.
— — — f. Pseudolycopersicum C.
— Olea fragrans C.
— Elsholzia cristata C.
1801 Chrysanthemum carinatum C.
— Galinsoga parviflora C. – 1820 A.
1802 Achillea filipendulina C. – 1820 A.
— Aizoon hispanicum C. – 1831 N.
1803 Eucalyptus robusta C.
— Datura arborea C.
1804 Scilla hispanica C. – N.
— Iris ensata C. – A.
— Apium leptophyllum C.? – A.
1806 Ficus stipulata C.
— Camphora officinarum C.
— Aucuba japonica C.
— Rosa semperflorens C. – N.
— Vitis riparia C.
— Hydrangea Hortensia C.
— Fuchsia coccinea C.
— Buxus balearica C. – N. 1866.
— Cobaea scandens C.
— Clerodendron fragrans C.
— Nonnea pulla C. – 1898 A.
1807 Triticum aestivum f. compactum C.
— — — f. polonicum C.
— Prunus domestica β Claudiana C.
1811 Tulipa Oculus-solis f. praecox C. – N.
— Sedum Notarjanni C.? A.
1812 Pinus Strobus C.
1817 Avena sativa β brevis C.
— Funckia subcordata C.
— Ophiopogon japonicus C. – A.
— Magnolia purpurea C.
— Tilia tomentosa C.
— — alba C.
— Eriobotrya japonica C.

35/0018-305

1812 Fragaria virginiana C.
— — grandiflora C. — A.
— Calycanthus praecox C.
— Rochea falcata C.
— Cyclamen persicum C.
— Solanum aviculare C. — 1899 A.
— Chrysanthemum frutescens C.
— Solidago serotina C. — 1882 A.
1814 Keria japonica C. — 1869 A.
— Rosa multiflora C.
1815 Rohdea japonica C.
— Populus angulata C. — A.
— Beta trigyna C. — 1898 A.
— Robinia Pseudacacia β umbraculifera C.
— Rosa blanda C.
1818 Diospyros Kaki C.
— Lycium sinense C. — 1837 N.
— Chrysanthemum bracteatum C.
— Senecio cruentus C.
— Artemisia scoparia C. — 1852 A.
1816 Citrus Aurantium β nobilis C.
1817 Freylinia lanceolata C.
1818 Pirus japonica C.
1820 Avena sativa γ strigosa C. — A.
— Musa sapientum C. — N.
— Linum trigynum C.
— Pittosporum Tobira C.
— Petunia nyctaginiflora C.
— Azalea indica C.
— Symphoricarpus racemosa C.

1820 Lonicera japonica C. — 1907 A.
— Begonia discolor C. — 1870 A.
— Coreopsis tinctoria C. — 1866 A.
1821 Paeonia Moutan C.
— Nandina domestica C.
— Fragaria indica C. — 1856 N.
— Ligustrum japonicum C. — A.
1822 Araucaria imbricata C.
— Tulipa Oculus-solis C. — N.
— — Gesneriana α spathulata N.
— Maclura aurantiaca C.
— Rosa Banksiae C.
— Photinia serrulata C.
1823 Tulipa Oculus-solis β maleolens N.
— Magnolia Yulan C.
— Ribes aureum C.
— Ceanothus azureus C.
1824 Lonicera flexuosa C.
1826 Linum pubescens C? — A.
— Astragalus contortuplicatus C? — A.
1827 Anona Cherimolia C.
— Erucaria aleppica C. — 1889 A.
— Euphorbia prostrata C? — N.
— Salvia fulgens C.
— Gaillardia pulchella C.
— Bidens chrysanthemoides C? — 1891 A.
1828 Cedrus Deodara C.
1829 Salvia splendens C.
1831 Allionia nyctaginea C. — 1889 A.
1832 Corylus Colurna C.
1834 Hypericum mutilum C? — N.
1835 Ehrharta panicea C? — N.

1830 Carduus uncinatus A. (o spont.?)

1836 Portulaca grandiflora C. – A.
— Virgilia lutea C.
— Oenothera stricta C. – 1865 A
— Azalea pontica C.
— Verbena chamaedryfolia C.
— Madia sativa C.
1837 Setaria italica β germanica C – A.
1838 Tulipa Gesneriana γ serotina N.
— Petunia violacea C. – 1907 A.
1839 Polygonum tinctorium C.
1840 Juniperus excelsa C – 1897 A
— Berberis Aquifolium C.
— Deutzia scabra C.
— Ribes sanguineum C.
~~— Cryptomeria japonica C.~~
— Phytolacca dioica C. – 1878 A.
— Rhododendron arboreum C.
1841 Evonymus japonicus C. – A.
— Rosa microphylla C. – N.
— Leonotis Leonurus C.
1842 Pteris serrulata C. – 1869 N.
~~1842~~ Sorghum vulgare γ campanum C.
— Freesia refracta C.
— Lepidium subulatum C? – A.
— Wistaria floribunda C.
— Poinciana Gilliesii C.
— Eucalyptus amygdalina C.
— Hovenia dulcis C.
— Phyllocactus phyllanthoides C.
— Sedum Sieboldii C.
— Lythrum thesioides C? – A.
— Salvia pendula C. – 1899 A.
— — Grahami C. – 1891 A.
— Hyoscyamus reticulatus C. – 1891 A.

— Centaurea iberica C – 1889 A
1842 Phlox Drummondii C.
— Heliotropium anchusifolium C – 1875 A.
— Anchusa ochroleuca C. – 1896 A.
— Nonnea setosa C. – 1845 A.
— Madaria elegans C. – 1850 A.
— Centaurea intybacea C – 1868 A?
1845 Aspidistra elatior C.
— Boussingaultia basselloides C.
— Spiraea lanceolata C.
— Eucalyptus Globulus C.
— Elaeagnus reflexa C.
— Convolvulus betonicifolius C. – 1857 A.
1846 Aegilops caudata C? – A.
— — Aucheri C? – A.
— — bicornis C? – A.
1850 Cryptomeria japonica C.
— Gynerium argenteum C.
— Chamaerops excelsa C. – A.
— ~~Cotyledon orbiculata~~
— Ceratostigma plumbaginoides C.
— Ipomoea Learii C.
— Paulownia tomentosa C. – 1885 A.
— Dichrocephala sonchifolia C. – 1869 A.
1852 Tulipa Gesneriana β Didieri C. – A.
1854 Abutilon striatum C.
— — venosum C.
— Jasminum nudiflorum C.
— Solanum Lycopersicum β macrophyllum C
1855 Dicentra spectabilis C.
— Deutzia gracilis C.
— Euphorbia humifusa C? – N.
— Abelia triflora C.
— Habrothamnus fasciculatus C.
— Centaurea virgata A. (o spont.?)

35/0018-306

1856 Sorghum vulgare ζ glycychylum C.
— Satureja cristata C?_A. (o spont.?)
1858 Arundinaria japonica C._A.
— Bambusa mitis C._A.
— Iris lutescens C._A.
— Polygonum cuspidatum C._A.
— Abelia biflora C.
~~1860 [illegible]~~
1860 Tulipa saxatilis C._A.
— Primula sinensis C.
— Verbena tenera C.
— Solanum citrullifolium C?_A.
1861 Sophora japonica C._A.
1863 Sechium edule C.
1864 Iresine Herbstii C.
— Valerianella fallax A. (o spont.?)
qui
1867 Cryptomeria elegans C.
— Bambusa aurea C.
— — nigra C.
— Triteleja uniflora C._1885 A.
1866 Helodea canadensis C._1866 N.
1867 Akebia quinata C.
— Forsythia viridissima C.
— — suspensa C.
— Clerodendron foetidum C.
1868 Carduus hamulosus A. (o spont.?)
1869 Eragrostis nigricans C._A.
— Alternanthera paronychioides C.
— Oenothera biennis γ grandiflora C.A.
1872 Euphorbia Engelmanni C?_N.
1873 Ceratochloa unioloides C?_A.
— Cycloloma platyphyllum C?_A.
— Azolla caroliniana C_1886 N.

1875 Tamarix parviflora C._A.
— Robinia Pseudacacia γ monophylla C.
— Euphorbia maculata C?_N.
— Vitis rotundifolia C.
— — rupestris C.
— — aestivalis C.
1876 Nonnea obtusifolia C?_A. (o sp.?)
1877 Oenothera biennis β muricata C?_A.
1878 Eulalia japonica C.
— Centaurea diffusa C?_A.
1880 { Azolla filiculoides C_1900 N.
Muehlenbeckia complexa C.
— Jonopsidium acaule C._A.
— Sedum sarmentosum C. A.
— Lagerstroemia indica C.
— Erigeron Karwinskyanum β mucronatus C_1896 N.
1882 Pennisetum longistylum C._A.
— ~~Lepidium perfoliatum C._A.~~
— Centaurea hyalolepis C?_A.
— Oxalis humilis C._A.
1884 Montbretia crocosmiflora C.
— Lappula patula C?_A.
1885 Humulus japonica C_1903 A.
1887 Panicum parvifolium β serpens C?_N.
1889 Digitaria distichae C?_A.
— Enarthrocarpus pterocarpus A. (o spont.?)
— Erucaria aleppica C?_A.
1890 Cudrania triloba C.
— Rudbeckia laciniata β digitata C?_A.
1893 Primula obconica C.

1894. Delphinium orientale C. ✓
— Opuntia Tuna y Dillenii C. – N.
— Ballota hirsuta ✓ A. (o spont.?)
1895. Ipomoea versicolor C.
1896. Panicum phyllopogon A.
— Sorghum vulgare β technicum C.
— Cyperus articulatus β Boeckeleri A (o spont.?)
1897 Centaurea glomerata C.? – A.
1899 Opuntia monacantha C.? – N.
— Senecio mikanioides C. – N.
1900 Polygonum sachalinense C.
1903 Atlantus excelsa C.
— Salpichroa rhombodea C. N.
1904 Stipa setigera C.? – A.
— — hyalina C.? – A.
— Nassella trichotoma C.? – A.
— Xanthium ambrosioides C.? – A.
1905 Opuntia intermedia C. – N.
1908 Panicum erectum A.
— Cuscuta Gronovii A.

(Totale 256 piante)

Aggiunte e correzioni. 33 I

N. 19. Cystopteris montana (Lam.) Bernh.
Agg. 1553 Michiel

N. 39. Allosorus crispus (L.) Bernh.
Agg. 1553 Michiel

N. 135 B Panicum erectum Pollacci
1908. Pollacci in Att. R. Ist. bot. Pavia (Specie trovata nelle risaje pavesi e certamente importatavi col riso dalla Cina (Shangai) Cfr. Poll. l.c.

N. 371 x monococcum = N. 370

N. 630 1846 Rossi, leggi: Rolli

N. 684 Allium Scorodoprasum L.
Agg. 1551 Petrollini e Cibo — 1815 Tenore — 1870 C. P. G. — 1882 Burnat. Cfr. DC. fil. Orig. pl. cultiv. (1896 Bisogni in Riv. sc. nat. Siena) — 1896 Marchesetti — (Talora prob. spontaneo e talora sfuggito alla coltivazione).

N. 348. Bromus mollis L.
Agg. 1551 Aldrovandi I — 1563 Cesalpino

N. 725. Yucca aloifolia L.
Agg. Colt.: 1780 Farsetti (colt.) — 1793 Zuccagni (colt.) — 1801 Bonato (colt.)

N. 744: 1559, leggi: 1599.

N. 756: polianthos, leggi: polyanthos

N. 913 A Celtis occidentalis L.
Agg. Colt.: 1780 Farsetti (colt.) — 1793 Zuccagni (colt.) — 1801 Bonato (colt.)

N. 963 Polygonum orientale L.
Agg. 1553 Michiel.

N. 984: 1558 Moris leggi 1858

N. 1005 Beta trigyna W. et K.
Agg. Colt.: 1815 Biroli — 1824 Bonato MS. — 1842 Visiani

N. 1065 Passiflora caerulea L.
Agg. 1553 Michiel

34

N. 1027 Conspermum hyssopifolium L.
Agg. Colt.: 1762 Allioni. (colt.)

N. 1192: 1875 Allioni, leggi: 1785.

N. 1228: 1415 Sabbati, leggi: 1745.

N. 1308: 1550 Kralik, leggi: 1850

N. 1401 Brassica oleracea e gemmifera DC.
Agg. Colt.: 1881 Tenore e Pasquale in Att. Bot. popol. Napol. Vol. III

N. 1358 Alliaria officinalis Andrz.
Agg.: 1551 Aldrovandi I.

N. 1427 A. Erucaria aleppica Gaertn.
Agg. Colt. 1827 V. Tineo — 1836 Brignoli

N. 1487 B Lepidium perfoliatum L.
Agg. Colt. 1596 Cortuso in Bauhin Phytopin. — 1675 Zanoni — 1793 Zuccagni.

N. 1429. Ochthodium aegyptiacum (L.) DC.
Agg. Colt.: 1772 Allioni — 1793 Tineo — 1798 Farsetti — 1820 Bonato.

N. 1618 Helleborus foetidus L.
Agg. 1553 Michiel

N. 1670: 1581 Tappeiner, leggi: 1851.

N. 2113: collazione, leggi: coltivazione

N. 2273: bortense leggi: hortense e agg. R.

N. 2279 (dopo) aggiung.: Sium L.

N. 2292: 1837, leggi: 1837.

N. 2329: 1858, leggi: 1558.

N. 2405: Coriandrum sativum L. Agg.: R.

N. 2630. Empetrum, leggi: Empetrum

N. 2706. Coris monspeliensis L.
Agg. 1553 Michiel.

N. 2435 Parthenocissus quinquefolia (L.) Pl.
Agg.: Naturalizz. 1864 Savardo

N. 2716 Statice (dictyoclada) β minuta γ
Agg. 1553 Michiel

N. 2723 B Jasminum nudiflorum Lindl.
Agg. Colt. 1854 Caruso, Annal. Agric. e Giard. Milano.

N. 1698 A. Cotyledon orbiculata L.
Agg. Colt. 1793 Zuccagni — 1796 Farsetti — 1801 Bonato — Naturalizzata 1550 ecc.

35/0018-307

N. 2762 B Gentiana crispata Vis.
1908 Cavara in Bull. del II° Congr. Soc. ital. pr il progr. Scienz., in Firenze N.° 7, p. 174.
N. 2839 Convolvulus tricolor L.
Agg. Colt.: 1633 Ferrari.
N. 2848 C si tolga, essendo = 2848 A.
N. 2979: Eur. ecc., leggi: Eur. occ.
N. 3192 a 3205 agg. R.
N. 33242: 1879, leggi 1789.
N. 3801 agg. 1553 Michiel
N 3858 β agg. 1551 Aldrovandi

Al Professore P. A. Saccardo, R. Istituto botanico Padova

Il sottoscritto ~~desidera~~ dichiara acquistare ~~una copia~~ ~~il~~ il libro: Saccardo, Cronologia della Flora italiana. Padova 1919 ~~con~~ al prezzo di Lire e desidera gliene ~~siano~~ tosto spedita una copia ~~il volume~~ (franco)

Firma . . . . . .

Indirizzo . . . . . .

Data . . . . . .

35/0018-308

Fu pubblicato testè in Padova coi tipi del Seminario ed a spese dell'autore, l'opera seguente del prof. P. A. Saccardo:

Cronologia della Flora italiana

ossia Repertorio sistematico delle più antiche date ed autori del rinvenimento delle piante (Fanerogame e Pteridofite) indigene naturalizzate e avventizie d'Italia e della introduzione di quelle esotiche più comunemente coltivate

Complemento storico della Flora analitica d'Italia dei prof. Fiori, Paoletti e Béguinot.

e forma 1 vol. in 8° gr. di pag. 432, per formato, tipi e carta simile alle [illegible] Flora analitica [illegible].

Prezzo L.

Il libro contempla tutte le specie, sottospecie ed ibridi della Flora analitica nella somma di 7788 e le specie (per comodità degli studiosi) recano pure i numeri progressivi portati dalle piante di detta Flora. Sono aggiunte 3 specie nuovamente scoperte in Italia e 209 piante esotiche più comunemente coltivate nei giardini d'Italia, affinchè anche di queste siano documentate le date d'introduzione, troppo spesso ignorate o falsate nei manuali e periodici articoli. In tutto adunque le piante storicamente e cronologicamente esaminate sono 8000. Sono dati in fine del libro due Elenchi. Nel I° sono enumerate le piante tutte della Flora (spontanee, coltivate, avventizie, naturalizzate), coi seguenti risultati numerici:

A. Piante classiche	n. 408	D. Piante le cui antiche	n. 814
B. " medievali	189	E. " " settecentesche	1311
C. " cinquecentesche	1171	F. " " ottonovecentesche	4107

Nel II° Elenco sono enumerate cronologicamente, per lo più anno per anno, esclusivamente le piante esotiche (non spontanee) che avventizie e naturalizzate, (contro l'intento da speciali ragioni giustificate in altro nicchio categorie) Vi figurano 713 specie, così ripartite:

A. Piante introdotte all'era romana	n. 78	D. Piante introdotte nel seicento	58
B. " " nel medioevo	19	E. " " nel settecento	175
C. " " nel cinquecento	127	F. " " dell'ottocento ad oggi	256

Da questi dati riassuntivi il lettore potrà formarsi un'idea sul contenuto, sulla utilità e sulla novità del lavoro.

e gradirne

35/0018-309