

Monsieur Châtelier,

Je vous remercie de votre envoi. Avant d'accepter votre détermination (*Cucurbitaria Rharni*) je vous ferais remarquer que les *Perithèces* naissent sur un strome étranger; que ce strome existe avant la formation des *perithèces*, que ce sont les stromes et non les *perithèces* qui naissent sous l'épiderme de la plante. En grattant la superficie du strome on se détache une poussière qui renferme des spores presque sphériques, sombres, généralement biloculaires. Ces raisons m'ont porté à croire que les sphères naissent sur un Torula qui a assez d'analogie avec le Torula Hilbospora qui vivent sur les rameaux secs du Corylus. L'engaire peut être la portée de ce se disant Torula. je reviens de votre bienveillance quelques mots de réponse, ils serviraient à lever mes dernières doutes.

Quant à la deuxième détermination, par analogie raison, le champignon ne présente point la structure anatomique d'un Hydnum.

Pardonnez-moi, Monsieur Châtelier, d'abuser de vos précieux instants,

Votre dévoué

Nervius 23/5/87

C. Lacroix

13 papiers vous sont expédiés par mandat poste

UNION POSTALE UNIVERSELLE
BELGIQUE

CARTE POSTALE



CE CÔTÉ EST RÉSERVÉ À L'ADRESSE. — ZIJDE VOOR HET ADRES VOORBEHOUDEN.

Monsieur Saccardo Professeur

Université

Padoue