

CERCLE PRATIQUE

D'HORTICULTURE

et de

BOTANIQUE

du

Département

de la

Seine-Inférieure.

Reims, le 27^e 9^e 1861

Monsieur

En étudiant dernièrement la grande
Septosphaeria avec les Fungi italici,
magnifique ouvrage, que le Abbé
Lévesque a mis à ma disposition,
j'ai fait des remarques relatives à mes
Excellences.

1^o. Je vous ai envoyé dernièrement
une Sphaeria sur Houblon, qui me
paraît bien répondre à votre Ceriospora
Dubyi n° 187 du Fung. ital. — une Cercospora?

2^o. J'aurais que vous n'avez fait quelq.
confusion au sujet d'une plante sur
Senecio que je vous ai envoyée (je n'ai plus
le n° sous la main) et que vous avez
nommé Septosph. cotomagnensis Sacc.
Michelia n° VI et des Fungi gallici n° 569
J'aurais trouvé sous ce n° que j'ai
concerné qui l'aurait été qui est peut-être
le Dolioleides. ^{Kröte} Puis ~~un~~, des filaments
bruns et des spores 3-4 septées brunes qui


me parait être appartenir à *Cladoporus*. Je vous envoie à
nouveau des échantillons

Vous recevrez bientôt les premières
feuilles de Sylloge et en même temps
de *Michelia* qui vous fixera sur
nos dernières nouvelles.

Agnez, Monseigneur, avec
l'assurance de ma haute considération

De Malbrancq

277.



Perith. d'abord immergés
(stictiformes), puis saillants
superficiels, globuleux ou un
peu coniques, pâles-livides,
à ostiole noir papilliforme,
à couche extérieure furfuracée
jaunâtre. (du 2 Elat. appartiennent
-ils bien à la même plante?)
Thèques cylindriques (A B), mesurent

187-200 x 6, s'ouvrant, se desséchant au sommet. Spores (D) filiformes
hyalines, 90 x 1, guttulées (?). Paraphyses trifides flexueuses (E).

Sur Eupatorium.

an Schmitzomyia?

Phragmites Nabelegamum (Duv. Ser.) Thér.

278.




Perith. petite, d'abord convertie par l'épiderme,
puis émergente, noire, à ostiole punctiforme.
Thèques en masses oblongues, grandes, spores
3 stiques, hyalines, 1-septées, bi-appendiculées, 34 x 10,
sans les appendices.

Sur tiges mortes d'*Hemidesmos* Luperus. Rouen.

Cinopur Delyi Mout

Helobium

279



Cupula minutissima, sèche ouculo nudo vix
inconspicue, sparsae, vix adhaerentes, albo-hyalinae,
extus glabrae pubescentes. Asci (A) minuti oblongi,
21 x 5, spores singules, ellipticae, hyalinae, 4 x 1.
Cupulae 0,2-0,3 mm. diam.

and Spores caules emortuae. - Quercy
(Rouen)

280

Production terminalis, blanchâtre ou blanchâtre,
en dessus et en dedans des tiges d. Spores.