

Liège, le 23 Mars 1888

Monsieur Saccardo,

Je vous adresse avec la présente une boîte contenant une nouvelle série d'Ascomycètes pour lesquels je désire votre jugement obligeant.

J'espère que vous y trouverez des choses intéressantes; vous trouverez ci-joint des notes sur chacun des numéros.

Je termine par quelques remarques. Dans le N° 16 du dernier envoi les spores sont aciculaires - fusiformes; ($55 = 2\frac{1}{2}\mu$) faussement 7-septées. C'est donc probablement *Godronia callunigena* R.

Ciboria Sydowiana Rehm nov. sp. dans Ascomyc. Exsic. n° 802, est la

même chose que Peziza (Thiala)
petiolorum Desm. qui se rencontre aussi
sur les feuilles de Costanea vulgaris.

J'ai retrouvé en Belgique le Enangium
acuum C. P. in Rehm, Ascomyc. Exsicc. n° 822
sur le même substratum. Dans les exemplaires
américains je trouve « Oogone $60 = 7 \mu$, spores
 $6 = 2 \mu$ ». Dans mes échantillons belges
je trouve « Oogone $90 = 10 \mu$, spores $10 = 4 \mu$.

Veuillez, Monsieur et Honoré Confère,
agréer mes meilleurs sentiments.

Victor Bouton

41 rue d'Archie

à Liège
(Belgique)