

Mon cher confrère !

Avant-hier j'ai vous ai a-
dressé par les soins de la
poste un mandat de 33 frs
pour le 7^e volume de votre
Glossaire. J'espère que cette
somme vous parviendra en
bon ordre. (je vous prie de me dire

chez la boutique l'étan-
tillon de d'écorce d'Ilex
opaca, que j'ai vous envoie
ci-joint et abas par
un Docteur ? Le
connaître ce genre suffi-
ment pour me de l'aide.

Les pithécies sont épars
parmi une sorte de Strombe,
sous qu'on puisse ^{distinguer} ~~voir~~ les
limites de leurs parois. —

Les Spermidies ont en moyenne
une longueur et largeur
de $35 \times 12 \mu$. et sont
très plates d'une matière
albumineuse grasseuse.
Ils ont une forme ob-
longue et sont portés par
des péripustes très appren-
ables. —



II L'arbre champignon croît sur
les Châtaignes, (non sur les parties
végétales des feuilles) du Sirogite
commun. Au premier abord je l'ai
confondu avec le Sirogite rimosa,
mais l'examen microscopique me
montrait mon erreur. — Le vin
un Stroma contenant un maximum
de 5 ^{seuils de} perithèces, pleines de sp.
riches ($12 \times 2 \frac{2}{3}$), droites ou un
peu courbées, et ordinairement
menbrant le coccule. — Le
pourtant au Stroma rimosa West.,
^(il est question de perithèces et)
dans les perithèces sont épar-
pillés isolément. Le Stroma rimosa.
Sphaeria dothioides Sacc. Ill.
111, 246 croît sur les feuilles et
perforée les brèves plus ~~longs~~ courts
et pas plus que 2 seuils de pe-
ri-thèces ! — Je croyais avoir

affairi à un Placophœria
et le nomme Placophœria
rimora. - ite jé agi selon
les règles, ou me puis jé bronjé
quant au genre.

Je vous serai très-reconnaissant
si vous voudriez avoir
l'obligeance de me répondre.

Croyez-moi votre dévoué
assidue

Ch. W. May

Amsterdam 6 Mai 1861.