

Amsterdam 10 Mars 1803

Monsieur et très-honorable Compère!

Permettez-moi de vous demander conseil quant aux genres Sordopora et Stemphylium. -- Selon votre Apuce dans le 2^e Volume du Michelia, ces deux genres seraient différents en ce que les hyphes du premier seraient exemptes de couleur (hyalines), celles du second au contraire colorées. -- Cependant, dans vos fungi Holci, la chose se comporte autrement. Les hyphes du Stemph. asperum, botryorum et macrosporoidum sont tout-à-fait exemptes d'aucune couleur, et dans Mich. II, 376 je lis que, chez le S. sperulum on trouve des hyphes hyalines.

Je viens de trouver sur du papier poudré, sur des nourrices pourrissantes, sur des bulbes pourrissants du Styacinthus orientalis un Champignon (analogue dans son aspect), consistant en des hyphes rampantes, septées, tout-à-fait incolores, ramifiées, qui ça & là produisent de courtes branches droites, articulées, incolores, qui portent une


Spore d'une couleur brune rougeâtre, non
 foncée, d'une forme absolument globu-
 leuse ou plus au moins polygène, à
 cause des cellules polygones, dont elle
 est composée. On voit très-bien les nom-
 breux cloisons qui traversent la spore
 dans diverses directions. Mais il
 m'est impossible de débrouiller l'affaire
 et de trouver le nom, par lequel cette
 espèce devrait être indiquée. Ne
 pourriez-vous me venir à aide ? Je
 vous en serai très-reconnaissant.



Strophium chag-
naticum? Mais je
 ne trouve pas de couleur
 à ces hypophyses comparées
 et aux *Strophium*.

J'ai trouvé ensuite une *Stilboidée* sur
 le *Cratichneumon*, consistant en une tige
 cachée, brisée, se prolongeant en une tige
 de p. m. 1 millim de haut, brun foncé,
 très-effilée à l'extrémité supérieure
 et terminée par une petite globe de spores.

elliptiques, anguleuses par une matière me-
talagénese et qui se peuvent être tou-
chées sans être se répandre sur l'ob-
jet touchant. La globule est blanche
de lait et luisante. Les spores ou
conidies ont 7 µ. de long sur $2\frac{1}{3}$ µ
de large et se se mêlent pas avec
l'eau, mais y restent agglomérées en
petites peignes. Elles sont fort à fait
incolores. - En appliquant mon petit
verre supérieur sur l'objet, tout en
contemplant l'objet, je me suis persuadé
que le sup^e est creux et que de ~~de~~ pe-
tites granules de protoplasma ou d'une
autre substance pourraient se déplacer
du bulbe à la globule de spores. - Les
spores diffusées, on voyait au bout du
style un pinceau de fils extrême-
ment menues et incolores, auxquels il
restait toujours agglutinée une peti-
te quantité de spores. - Je n'ai pu
trouver le nom de cette espèce, quoi-
qu'elle me semble correspondre de plus
près au St. péliiforme Cda K. H. III
p. 2 p. 147. - Par rapport mes spores sont
moins longues en comparant la lati-
tude et Cda. ne figure pas la bulbe.



N.B. L'ea sans dire que
le style est composé de
fils extrêmement fins.

Acquer charneri et
très serré carpire l'ac.
ferme de la parfaite
exécution.

Voie tout de vous

L. H. Dewaraj.