

Strasbourg 1. Juni 1899.

Uochvortetes Freund!

Darf ich Sie bitten, mich mit Ihrer reichen
Erfahrung zu helfen zu kommen.

Ich fand auf Zweigen von *Agave fraxinea*,
foliös und Corneis also *Thier Fungi*, da, der
herrscheidendste, noch, kein Geschlecht
Leptogloeum zu finden waren, jedoch
in ihrem feineren Bau hinreichend viel
mit Cybospora gemein haben. Die Spo-
radien sind farblos, zweifach, und messen
12-14-16 x $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ μ , und setzen zu ver-
schlungenen Gängen, welche einer eigenen
Wand ausbleiben, jedoch durch ^{die} Diametral
einander ausgelegte Septen Insertion der
Kernkerne sehr gut zu unterscheiden
sind.



Den Fungus auf *Agave* habe ich
früher als Leptogloeum *Agave*.
denis beschrieben, eine andere
Form auf *Castanea* jedoch, wenn
ich nicht irre, als Cybochloporpora *Castanea*.

Bei den Fungus auf *Corneis* thut sich jetzt
die Frage vor! Welche Art war richtig
bestimmt: die auf *Agave*, oder die auf
Castanea. Was man scheint ist die Auffassung
dass wir hier mit einer *Cybospora* ohne Wandung
zu machen haben, die richtige.

Können Sie sich mit dieser Meinung vereinigen,
so wäre Septoglossum Nagendines in Cytodiplo-
spora N. um zu setzen; fassen Sie die Sache
andere auf, so sollte Cytodiplospora Castanea
noch Septoglossum überbieten müssen.

In der Hoffnung einer gütigen
Leichte freundlichkeit

Ihr

C. M. Oudemans,