

Amhem 18 Juin 1900.

(Eusebius bultensinger, 39)

Mon cher ami et collègue.

Tout en vous remerciant de vos informations dernières, je tiens de nouveau faire appel à votre bienveillance.

Je vous envoie ci-joint une feuille de *Carpinus Betulea*, dont la face inférieure présente une grande quantité de point noirs. Tout d'abord on pourrait croire avoir affaire à un *Leptostyrium*, mais un examen microscopique prouve que ce serait une erreur.

Le point noir n'a point de structure, mais appartient à la cuticule, noircie à cet endroit. C'est comme un couderc, s'étale sur une petite dépression, sans paroi spéciale, et qui contient des spores très-subtiles de $7 \times 1\frac{1}{6} \mu$, bacillaires, ordinairement courbées, continues, sans gouttelettes, arrondies aux bouts, hyalines.

Carpi & le *Leptostyrium* *Carpini* Reum. et Tourb. Rev. Mycol. 1892 p. 172 et Tell. XI, 554, ne ressemble nullement à notre champignon. - Je n'ai pu trouver un autre genre qui conviendrait ~~assez~~ à la structure de notre espèce, dans votre ouvrage Vol. III, 625, parce que les péritheces n'ont point de structure et ne sont pas même possédées.

L'autre espèce vient sur les feuilles de Jalous
allongée, dont d'autres feuilles portaient la
Dactylis glauca. Ici la membrane courante
a une structure p. ou m. bizarre. Il y a
peu de trous - de même - des dépressions dans
le parenchyme de la feuille, et des pustules
d'une extrême tendresse. Aucun des ch. qui croi-
sent sur la feuille de J. gl. semblait m'occu-
per avec cette production.

Je vous serais fort reconnaissant, si
vous voudriez me faire connaître votre
opinion sur ces deux microfungi.

Croyez-moi O. Fr. de vous
et Confère

(H. B.)
H. B.

Est-ce qu'il ne manquent pas quelques
syllabes au mot li après Carcos pour
Poc. Syr. x, p. 620?

