

di Ciesbach potrebbe, di altissimi, non però quelle di Noth e Polini,
perché le foglie non le ho trovate subulatif, ma piuttosto plano-subulatif,
non acute, cartilaginee super. sephum punctatif, e hanno le soye pilose,
e i petali non crenulatif. Di più questa pianta la rinvenni
solo, nella valle di Lavallo-Ladon a circa 800 metri di altezza
lungo la strada, due costeggiando il fiume, fiancheggiata da
altissime roccie, dove anche la stata opera con piante fiorte
e l'inverno è gelidissimo, per di più è sempre bisognata
da acqua e grandissime piogge; dove in quella ora
i luoghi degli alberi sopraccitati sono ucciso soggetti e
questo infestissimo, la descrivono fiorita in giugno e luglio
e questa spiorita ai 20 giorni.

nella capellina trovata in buona quantità e ben
spioriti spaurati una pianta da una raccolta più ancora
fresca e con bellissimi fiori bianchi; e dove se sia una pianta
e particolare alla cosa, acuta ricoperta nel
monte botanico, in due ore trovata la prima volta dieci
giorni sono nella montagna di Lavallo-Ladon della montagna
località Cervera all'altezza di oltre 2000 metri, dove più
raccolti sono in molti spaurati la bella Thaba leizoides,
venute a casa e portate sotto a studio, non oggi
sopra per l'ingrossamento delle radici determinano a
dichiararla, se faurejama, o eribogama, del che molto
dubito.

Perdoni per carità, ma qualunque i miei talenti e meriti
 sieno da poco, pure ardisco dirizzarmi a lei, onde sollecito avere
 la bontà di dirmi alcuna cosa in proposito sì dell'ucca
 che dell'altre ed io ne sarò eternamente obbligato.
 Che se mai ne miei viaggi esplorativi, scelsi in qualche
 modo, un' darò tutta la premura nel raccogliere e spedire
 quelle piante che le potessero più interessare, e inoltre,
 le anche fresche.

Di nuovo mi scusando e con la più alta stima
 e profondo rispetto mi rassegno

Loro-Laden 22. Maggio 1843

Humboldt ^{no} Doctor ^{no} Valentin
 Sebastianus Ponce