



TORINO, 3 Aprile 1902
(Via Valperga Caluso, 33)

R. ACCADEMIA D'AGRICOLTURA

DI
TORINO

Onorevole Signor Professore,

Sono stato per una decina di giorni a fare un giro in Riviera, affine di veder bene la diffusione della *Septoria drabici* e del *Heterosporium chinulatum* sul garofano, e perciò ho dovuto ritardare di qualche giorno l'invio delle l. 40 per il XVI volume della Sylloge, di cui la ringrazio.

Le invisco alcune foglie di *Quercus ilex* che ho trovato in tutta la Riviera fortemente infestata dalla *Phyllosticta tiniae* e che non so proprio capire come il Bollani non la ricordi nella Contribuzione ec. E' un vero danno per quella regione.

La Portezza (lago di Lugano) un mio allievo mi ha portato foglie

Il Hellaborus niger ammonta da un misero di cui si è visto
un Coniothyrium affine al C. deymianum Allesch. Sotto una forma
però i piccioli portano un prolungamento a guisa di collo che ricorda
la forma stomatica del C. diploidiella.

La pregherei di voler esaminare la porzione di diplotele a cui qui
mi ha, nella quale troverai un deposito bianchiccio costituito da conidii
che portano spore di forma sferica simili a quelle che si osservano
negli iderozii germoglianti, di quella forma sferica che lei mi indicava
di riferire allo Iderodium capivorum. Tali corpi che si vede anche
il Voronin nello sviluppo delle Sclerotinia, sono, in questo caso, da
considerarsi come vere spore.

Lei mi diceva che lo Sclerotium era stato dal Berkeley trovato infetto
dal Uromyces subtilissimus: che forse potremo corrispondere alla forma conidia,

ma nell'esemplare che possiede non v'è la forma di illegor.

Al *Polypogonum* uero molto stentamente e solo ora accenna a
fruttificare.

Redoni le uoit e mi adan d la

Dr
M. J. L. L.

1. Ve. Duboué S. Torino ho visto sviluppatissima nelle foglie della
 Vinca una Scythoria. Il Frant, Die Kriech. e pag. 432 accenna
 ad una Scythoria vincae Desm. che ho trovato nella Sylloge Vol. III, mi
 potrebbe indicare la misura?

W. X 379 1a. Result
tats. Sp. Vireo - Sem. sp. 28-30 p. by
Sp. Holubyi Bäume. sp. 40-50 p. 2
mächte, can. id. nero-magenta & entrant
ventum in Stanz