

Sehr geehrter Herr!

Von einer Reise zurückgekehrt finde ich Ihre werthe Karte und beantworte dieselbe sofort:

1.) Exosporium Preisii ^{novit} n. sp. (Exospora Preisii ^{Bubik} in svedis).

Flecken auf beiden Blattflächen, rundlich, bis 5 mm im Durchmesser, ein wenig eingefallen, schmutzig gelblich, dunkelbraun, ungrenzt, oft zusammenfließend. Conidiensnosen olivenbraun; Conidienträger gebogen, gewöhnlich 2-4 zellig, Kastanienbraun bis 45 μ lang, 6-7 μ breit.

Conidien olivenbraun, lang gestreckt, nach oben verjüngt, viel zellig, in jeder Zelle mit einem grossen Oeltröpfchen, 90-120 μ lang, an der dicksten Stelle (oben im unteren Drittel) 8-9 μ breit. Membran körnig.

Bokenna in foliis Phoenicis ^{reclinatae} ~~canariensis~~, quos magnopere vexat et enecat.

Ich bin nicht sicher ob mein Pilz mit Hirzen Exosporium palmivorum

identitatem nihil est. Et necesse est non venen
Beschreibung hauptsächlich: conidiophoris
^{sepe curvatis} septatis, longioribus; conidiis ^{subrotundis paucis longis} majoribus,
concoloribus.

2.) Aecidium Berulae n. sp. et Aec. carolinum n.
ad Worm. Scirpi (part.) Lagerh. pertinent et
melios characteribus ab aecidiis, quae Pastina-
cum incolunt, divergere videntur.

Species biologicas, quas recenter A. Klebahn
describit, e. g. M. Berulae-Scirpi, M. Past.-Scirpi,
Aec. Thymi-Stephae, Sabinae-Stephae etc. agnoscere
non possum.

Roga Te, clarissime vir, velis mihi bene-
volenter opinionem Tuam, de Evospira
Pezizii communicare.

Mit besten Grüßen

S. F. Bubak.

Tabor in Böhmen, 8. V. 1904.