

Prof. Prof.

Sto studiando le variazioni di forma, struttura
e disposizione delle foglie secondo la posizione
che esse occupano sul ramo ed a seconda della
natura di questo (rami aventi i polloni radicali
rami normali ecc.) Molto poco mi già venute
in luce i questi fenomeni fra bene pubblicata
ora avendo dedicato un capitolo al nutrizione
e studiato la distribuzione degli acidosomi. Di
alcuni esperimenti e delle galle in rapporto spe-
cialmente alla posizione occupata dalle foglie sul ramo
o sul tronco vorrei estendere il tema al perappo-
sso. Ma qui cominciano i guai a causa delle
mie ~~scarse~~ scarse cognizioni botaniche, per
doppio non molto profonda neppure negli altri
rami dell' amabile scienza.

Ho pensato pertanto N abusare delle N
Lei gentilezza per alcuni ragguagli in proposito.
permesso che Vlle, per la ben nota ma
cortesia, non vorrà far il viso dell'anni a
questo mia scrittura.

Lei quanto desidera sapere.

Li danno frugli paranti di piante superiori
(a partir delle felci) o quali attaccino solo
determinate foglie della pianta? vale a dire
che colpiscono ad esempio, solo le foglie dei
polloni radicali, oppure le foglie basali
di un ramo rispettando le apicali, o vice
versa, o infine trattandosi di una pianta
tipicamente eterofilla come Eucalypto,
involcano solo o l'uno e l'altro

tipo fogliare? o versano solo ad es. mi citando
o sulle brattee.

Non sono troppo importuno? Se Vlle vorrà
favorirmi qualche dato in proposito non
mancherà di riportarlo nel mio grosso lavoro
citandone la fonte.

Senza il disturbo e grazie anticipato per
quanto vi compiacere N. referirvi.

Con più N. di ad. segue in ppe

Benedetto in Luigi.

Catania 8 I 1947