



li 30-11

1913

CATTEDRA AGRARIA AMBULANTE

IN CASSINO



Il Direttore

M. Luperone,

La ruggine comune
in queste contrade è la
= *Puccinia rubigo vesca* - in fatti
le poche piante di *Berberis*
che ho trovate non presentano
mai la forma ecidiosporica
della *P. graminis*, e solo nei
posti ove questa specie ho
prodotti da qualche anno
danni enormi, ho potuto
riscontrare qualche *berberis*

Fraccia di - *Sciduum berberidis* -

Fin ad una diecina di anni
or sono il fondo, era con gra-
vemente colpito da premura
gommis, era il più produttivo
or della contrada, da una dieci-
na di anni è cominciata a
manifestarsi la reggia in mo-
do allarmante, limitata per-
a tale fondo. Quest'anno il
raccolto può dirsi distrutto
in modo completo e la premura
gommis ha dimostrata una
tendenza a diffondersi nei

podere vicini. È probabile che
la perpetuazione e diffusione
avvenga con la forma uredosporica,
in ogni caso deve trattarsi d'
infezione importata con altre
varietà di grano sperimentata
te nel fondo a portate da
fuori.

Le manovre nuove comprese
di cui il:

I: preso in campo poco disin-
to da quello infetto e che comin-
cia a presentare l'infezione

II preso nel campo infetto
ma colpito dalla sola puccinia

matijs vera - quasi, e da poche prou-
de di diversa variet  che n' resister
piu resistente.

Come vede la cosa   interessata
Le per me, venendo dalle conclusioni
mi decidere il da farsi. Le sono
sentitamente obbligato se ella
vorra esaminare il materiale che
Le ho inviato e riferirmi in propo-
rito.

Voglio godere coi migliori
ringraziamenti i piu distinte
saluti

D. Leon

Vaupell