



R. STAZIONE BACCOLOGICA
SPERIMENTALE.

Padova, il 191.....

Direzione.

N.

Egregio e Gentile Professore

Mi prendo nuovamente la libertà di sottoporle
all'osservazione due miei preparati. Li ha fatte
di farfalle del *Bombix Mori*, disseccate e maci-
nate in un mortuario. Nei preparati si notano
dei cespuglietti di ife miceliche nelle quali io
credo di riconoscere semplici muffe. Gradirei il
suo parere in proposito, e se è possibile, sapere
di qual muffa può trattarsi: -

Se esclude una fotografia del mio disegno del
"Thoma gelicola": evitai di farla copiare e inchio-
sto e quindi appai bene riunite la riproduzione
e lapis -

Voglio scusarmi se non mi sono fatto più visto
con Lei; vedo che mi sento tanto obbligato; sono
occupatissimo, avendo oltre all'Ufficio, dodici ore
settimanali impegnate alle Lezioni Normali per

L'insegnamento dell'Agraria.

Gradisce i miei ringraziamenti, e mi crede con
tanta gratitudine e profonda ammirazione

Dev^{to} - aff^{to}
Carlo Ghislandi

Padova

22-11-91

P. S. Il Ferraris dice che le spore della Septoria
mori (i conidi) possono germinare in ambiente umi-
do o nell'acqua ec. Secondo Lei sarebbe possibile
la germinazione dei detti conidi in una farfalla
morta e disseccata, contenuta in sacchetti di garza,
sia anche in ambiente umido? È dato anche che
i conidi riescono a germinare, potrebbe il fun-
gillo svolgere le sue fasi vegetative in un
ambiente simile?

I Carbama in mucedine, proliferi. Botry-
Dema o in Oospore.

II Phleopon Moss - a. and. am. perenne
non germinare ai conidi di Phleopon moss.
già che a una farfalla Botryse, ma
non è possibile di sviluppo fungo - totale
a un parassita legato al solo.

3



2



4



1

