

11 bis, Rue d'Alésia, PARIS XIV^e

20/1/09

PARIS XIV^e

J'ai reçu de Kabylie (Algérie)
 des renseignements de Q. Corcoran receveur, extrêmement
 compétent et franc. Les pièces m'ont servi, non
 seulement, à établir par ailleurs, ce qu'il importait
 de connaître sur l'état des affaires, mais aussi
 pour son meuble dans le Palais (l'ancien
 de Corcoran).

M. Corcoran

Mayor
Bull. Soc. Munchelohia
L. naturata. 1408
p. 50

Je vous remercie très sincèrement des enseignements
que vous m'avez bien voulu donner touchant l'Ordre du blém.
Personne, en France, n'a encore traité de peritriches - D'autre
pour l'examen comparé de Microphasma querada a de M. Klein (échantillon n° 1599)
sur Q. pedunculata

qui me paraissent identiques, d'une part; d'^(américain) Oidium quercinum, d'autre part
ne montre que a tous incontestablement 2 Erysiphacés différents, la 1^{re} donnant
du mycélium superficiel sans conidies, la 2^{de} donnant du mycélium
à conidies, sans périthés. - (J'en ai jamais trouvé de conidies à M. Albi; m. quercinae)

En somme il y a maintes rumeurs du type
pour M. Guérin. Son nom en Belgique
4 M. Alvi de mayor Alvi une fois habiter en 1894 à Gand
(lui est dentique)

2^o Phyllactinia corymba

2^o Phyllactinia corymba Thümen Différent de leucos, bien
3^o ridium quercinum L. Guér. En 1^{er}.

Je n'ai pu me procurer d'échantillon authentique de Thiessen - on me dit que c'est Heiter Th. au 2000000. J'ai écrit à M. Vladerov qui ne m'a pas répondu.

heureux si nous pouvions lui envoyer en communication Apothecaria Pomi Schul. & Sacc.

Enfin, ayant examiné le ancien schéma de reduplication
 vertica Pr. et Del. j. trouve qu'il représente le stade jeune et non composé de Botryodiplera
~~theobroma~~ Pat. championn dont on a fait plus tard un Lasioplodia. (ex. L. nigra)
 Or la présence de paraphyses, signalé déjà par Pr. et Del. par Pat. sur un paroi qui
 suffisante pour faire un genre nouveau; de cette Koorders a été que Lasioplodia a signifié
 De plodia pour le alors l'a confondre au theobroma plodia
 qui sont parties en sections plus ou moins en forme de
 une Lasioplodia dans ce cas

la Macrophoma verticillata Pr. et D., identique à Bohyodiplodia Theobromae Pat. trouvée dans Laniodiplodia Theobromae

[illegible]