

Vienna li 15/7 903.

Egregio Signore!

Avendo letto nella *Chalpiighia*
che il suo istituto possiede una
assai completa raccolta di ritra-
ti di Botanici, mi permetto di
mandarle le miei.

Le mando anche le traduzioni
latine di alcuni *Füinghi* descritti
in *Le Tesco* nella *Hedvigia* 1903.

Uno era identico (sec. Esupl.
orig.) con un da Hi'hak el Kabal
^{giacché l'ultima prima}
(descritto, ho conciato la diagnosi)

4) Myxarium atroviolaceum Hb. Th.

è secondo esempl. orig. legit Hb. Th.

typica Coccineae

= Cr. atroviolaceum (Hb. Th.) v. H.

5) Agyniella nitida (Lob.) Sacc.

è sec. l'esempl. di Rabenhart

N° 3778

typica Tuberculariae!

6) Stoxaria truncata Hb. Th.

trovata nel Wiener Wald ed in

Boemia ed è

typica Tuberculariae!

7) Trüllaria nitidula Sacc. trovata

qui, è typica Stoxaria.

ma differente da truncata

Allerher ha fatto bene di metterla 627

nel Genere *Glossaria*, ma male di
cambiare il nome spec. di *Gloss.*
reticulata (V. Rab. Krypt. v. *Stichod.*),

8) *Endocaulis ampelophorum* ^{Pal.}
è certo una specie di *Hymenella*
e non appart. al gen. *Endocaulis*.

9) *Volvella Vitis* (Don.) Sacc. III 688
è senza dubbio una *Cyphella*
vedi la figura di Hennardan,
Hamburg. fig 215.

10) *Volvella melalonia* H. S. H. ha la
spore appendiculate ed è secondo me
un nuovo genere.

11) *Thysanopyxis pulchella* Cesati è
secondo esempl. orig. una vera
Euvalidella, forse = *V. acutopoda* Speg.
S. S. 16. 1096. ?

12) *Volvella diceaia* H. S. H. è una buona

Esthonia, e sta molto vicina
a gilva e villosa (secondo gli
esempl. originali!).

- 13) Cheiromyces, trovai mep. che sta
molto vicina a Ch. tinctor, e certo

Füsteriulariaceae

- 14) Cheiromyces cornutus L. & L. non vidi
ma è sin dubia una specie di
Cryptosynceum Fückel, genere
che forma secondo me una parte
(vielleicht) di Exasperium.

- 15) Che Exasperium rosae Fückel
è una Cecropora (rosae) Fückel & H.
Le ho già comunicato.

- 16) Che Cylindrosporium inconspicuum
Winter = Cecroporella hungarica
Hämmerl

Le ceds d'averschotts. È una
vera *Cenasporella*.

17) *Spezzaziana calyptrospora*
vHöhm è sine dubia

= *Sporobolium lobatum* H. & Gr.
Annals of. nat. hist. 1866. Bd. 18. p.
121 Taf. III fig. 6!

e deve perciò chiamarsi

Spezz. lobata (H. & Gr.) vH.

Alcune sinonimie si trovano
ancora negli stampi a Vienna.

Io ritengo essere un principale

lavoro, di schiarire generi
e specie, avvinguosi permi-
di far questi con unicep-
Il S. n. a

devote
vHöhm

Si attribuisce 4 specie
buone, che mancano
nel Sacc. Fgl. ; le 3 prime
non hanno diagnosi, ma
descrizioni buone e figura

vH.