

Vienna l. 14/8903

Egregio Signore!

Ritornato da un piccolo viaggio
trovai la S^{ra} Carlolina del 25/7
troppo piacevole, per la quale
Le ringrazio. Conciò quanto potei
le diagnosi desiderate da Lei, secondo
il testo inglese e le figure citate.
Non avendo studiato il Latino sarà
necessario di correggerle. Mi venne
il pensiero che la *Stollentia* gramin-
is è forse = *Dilophopora*, ma Koellen-
descrive esatamente, come le spore si
dividono in 2 parti, che alla germina-
zione si separano da un lato



ed anche figura accoi esattamente
8-12 appendici, dunque più che da
Dicrospora. Ma ciò non di meno
ha una forma assai vicina a quest,
ultima. —

Tutta desiderata Heimerlin non ho
che 2 preparati microscopici da
esemplari abbastanza maturi. Gli
altri non mostrano che il stelo



prolungamente nell'~~apice~~ testa,
che dapprima è una goccia d'
acqua (2), che sparisce ^{durante} ~~mentre~~ la pre-
parazione. fucato il fungo deciduo
e piccolissimo, solo preparati lo mo-
strano. Fucato notizia del suo destino,
ritornò una tezza volte il fungo, e Lei
lo ha di certo. —

Le notificavo, che Exosporium Rosae
Fückel è una Cercospora (Rosae (F.) Sth.)
Peri trovo una bella nuova C. su Imperata,
sia Ostruthium del Tirolo, da acc. —

studiando questo libro, che (L.S. ¹⁸⁶⁹ ~~XII~~ ~~11~~)
Cercopora Rosae-alpinae ~~Cassal.~~ ^{Cyphassal.} =
= C. hypophylla Cassal = C. Rosae (Fückel).

La hypophylla potrei paragonare colla
sp. F. Fückel, è perfeltt. identica, e l'altra
è senza dubbio, essendo le diagnosi quasi
identiche, e per questo il frango specialmente
sulla R. alpina = per Fückel!

3 Volte descritto lo stesso frango!

Mi creda il S^{ro} devotiss.

V. Hübner.

P.S.: Non so se Le ho scritto che
Septoria (Rhabdocepura) pinea Karst
è Exerpulina pinea (Karst) Hübner

V.H.