

Vienna li 12. II. 909

Distinto Signore!

Le ringrazio sentitamente per
la Carolina e l'invis della Saccardia
quercina. Questa è un Ascomyceta

 molto vicino a Cochella
erysiphoides Rehm (che ha la
spora colonata). Questi due funghi sono
una famiglia (Saccardiaceae) che appartiene
ai Helotiales (Helothiales), e si distinguono
dai Helotiales nel microscopio, gli asci
arati, l'ascipolo tenue, e l'epitecio. —
Saccardia Surcoufii Rehm è un
discomycete imperfetto (come anche sono
Ascomycetella pennellii Rehm e Saccardia
abundantissima, e diversi Helothiales),
e forma un n. g. Helothiales.

SL. 2504

Österreich'sche Postverwaltung.
Administration des Postes d'Autriche.

Korrespondenz-Karte.

Carte postale.



Al. Illust. Signore Professore

Dr. P. A. Saccardo

via S. Jova (Padua)

Real. Orto botanico dell'Università
Italia.

È anche una famiglia, che chiamo chiosphymaceae.

Sacc. Turalae v. Kichii Rehm sta vicino a Saccar. Similaguarautica
Saccertia Turalae è una Pseudosphaeriaceae (vtt) erumpente e deve
preserv. il n. gen. Diplothea Stehlik.

Ascomycesella quercina Fck, Leptophyllum aiantiacum (P. d. M.) Vacc. e ?
chytriopsis triphurea (Winder) P. Henn. sono Gymnoasceae, che formano la
famiglia delle chytriaceae.

Trichophyllum trichosporiae Rehm è un lichene curioso nuovo.

Trichophyllum trichosporiae violacea Rehm è un lichene. —

Anche cheliopsis sono chytriaceae.

Altri "chytriaceae" sono chytriaceae.

chytriaceae Cinchonae Rehm è Ascomycesella Lipico!

chytriaceae Populinae Rehm = chelaepilex populina (Craen ?) Rehm f. minor.

chytriaceae Kichii Rehm = chelaepilex populina (Craen ?) Rehm f. minor.

chytriaceae Kichii Rehm è chytriaceae senza ostiole (chytriaceae vtt).

chytriaceae mirabilis + Elsinoe 4 spec. Racib. formano una famiglia di
Ascomyces = Elsinoe.

La vera che confusione di ci è. [chi rinerisce molto che non posso
vedere i tipi di Ascomycesella, cheliopsis,
cheliopsis, Ascomycesella!

Così più vi si sentivano il L. d. desotof. vtt. d. d. d.