

Vienna li 2. VI. 1909.

Carissimo Signore!

Lei sarei molto obbligata se
avesse la bontà di persuadersi
dal fatto che tutti perithecii di
Nectria dolichospora F. d. Sacc.

si trovano nella parte superiore
fimbri formati da ifi congelinati

Nella descrizione sta nulla da
questi fimbri ma io sono certo che
ne saranno.

SL. 2508

Österreichische Postverwaltung.
Administration des Postes d'Autriche

Korrespondenz-Karte.

Carte postale.



Al. Illustrissimo Signore Professore

Dr. F. d. Saccardo

in

Padova, Padua
Reale Orto Botanico dell'Università

Italia.

È poi La prego di perire a Terzi che Ceratostomella polyrhyncha
P. Ch. Sacc. ha un ostiolo piano, e che gli ostioli filiformi della diagnosi
sono proliferangulinati.



L'ostiolo è circolare 35-40 μ , circondato dai pili
conglutinati, ed alquanto difficile di vedere.

Io non ho esemplari, e non posso perciò verificare
la mia persuasione.

Onè Jungghi dei miei giapponesi e che credo deon'essere la
specie nominale mi mostrano le suddette singolarità, e perciò
foue importante di constatare se i suoi Esemplari originali
mostrano lo stesso.

Mi scusi, se Le prendo un poco del Suo tempo prezioso.

Mi resta Suo devotissimo

V. Kohnel