

Vienna li 11. III. 1911

Chiarissimo Collega!

Che si potesse separare il genere

Cystotheca da Sphaerotheca

ho già detto nel mio fragm. 2.° del

1909 IX. Mot. N.° 411. Ma ora so

già che questo non si può. Il sacco

interno di Cystotheca si trova da

W. H. Engelkei; non è altro che

l'intercostrato della membrana

peristematica. Questo consiste di 2

ÖSTERR. POSTVERWALTUNG

ADMINISTRATION
DES POSTES D'AUTRICHE

KORRESPONDENZ-
KARTE
CARTE POSTALE



All'illust. Prof. Dr.
F. A. Saccardo

a

Padova (Vatua)

Reale Orto Botanico dell'Università

Italia.

strati semplici di cellule. La separazione dello strato in-
terno si trova anche da Sphaerotheca phytophytophila
(Salmon, Monogr. p. 76), e questa specie sta tanto vicino
a Sph. humilis che è solo una epibiotica (v. Salmon 77).
adunque non si può separare Cystotheca.

Cyst. Wrightii è molto differente da Sph. lancestris
come mostra il paragone, almeno dell'esemplare
nel Holboell. Ma in ogni caso sono assai parentati.
L'ife di Cystotheca sono più rigidi, più crasse, e più oscuri,
meno convoluti. Sia l'aspetto esterno è differente
che è sempre possibile che ci trovassimo forme intermedie.
Ma per ora si deve distinguere le 2 specie.
De Lio deoxy & Holboell