

UNIVERSITÉ D'ALGER

— — —

Alger, le 28/1 1915

FACULTÉ DES SCIENCES

— — —

LABORATOIRE

DE

BOTANIQUE



Très honore Monsieur

Etudiant depuis quelque temps mes récoltes mycologiques
de Grèce, j'y trouve des Pyrenomyces intéressants. Je
vous en envoie un sur lequel je serais heureux d'avoir
votre avis. Il ressemble beaucoup à votre Cratostomella
vestita, mais il me paraît en différer par (A) les spores
souvent 1-2 septées, (B) finement côtelées en long, (C) plus
grandes, ainsi que les arques - Le caractère B ne se voit

quière qu'avec un bon objectif à immersion et pourrait n'
avoir pas été noté. Quant au caractère (A.) (cloisonnement)
il me paraît réel ; j'ai observé avec soin les spores dans
l'eau iodée, le rouge Congo + NH_3 , le bleu lactique, le lac-
tophéinol, et j'ai pu voir dans certains cas une cloison
extrêmement mince, ou tout au moins un rétrécissement de
la cavité interne par un bourrelet qui peut-être l'annonce
de la cloison. Le cloisonnement des spores ferait ranger mon Champignon
dans le genre Ceratospheeria.

Je vous serais bien reconnaissant si vous pourriez comparer
mon champignon à votre Ceratostomella vestita et même
me communiquer un spécimen de ce dernier.

→ Il y a dans le tubiculum des spores brunes, didymes, $8-9 \times 3,5 \mu$
qui rappellent bien celles de Bispora pusilla.

Veuillez agréer, très honoré Monsieur, l'assurance de mes senti-
ments respectueux et dévoués. W. Maing

P.S. Dans le tubiculum j'ai trouvé des spores brunes bisoculaires
 $8-9 \times 3,5 \mu$.