

Chiarissimo Collega.

Firenze 28/III/905

Non ti ho mandata subito la diagrafi
dei due fangilli ultimamente spediti
al Tronzo, perchè la cartolina mittente
da quest'ultimo la ho avuta soltanto
ieri, per caso, apprendendo che era andata
a fissarsi nella busta d'un catalogo
d'incisioni in legno. Principi il
Tronzo dell'arame dei due fangilli
dei quali d'grande mi ricordo me
mandavo degli altri; ricordarmi an-
cora al Dott. Deguini e tu ricevi
mille ringraziamenti per la pronta
pubblicazione delle mie creture. Sper-
do mi farai avere una copia della pubbli-
cazione dove saranno pubblicate le mie
diagrafi, non ho avuto p. l. i tuoi.

articoli contenenti l'Hymenula nersoni
et, e Tranarium lichemicolum (!). Non so
perchè nel Sylloge si tengano unite
tante le specie a peritecio a struttura cellu-
lare rozzata, e quelle a peritecio anisto-
zotto il genere Leptothyrus. Le specie a
peritecio anisto non si potrebbero forse
incorporare in Lacidium? Del resto esi-
stono delle specie di Gloeosporium di cui
gli ascovoli sono coperti dall'epidemi-
de atrata, quasi a somiglianza di Laci-
dium. Pare da tutto questo che esista an-
che un passaggio fra Leptostromaceae
e Melanconieae. Solus cordati

tro opposto
C. Morabonzo

C11 Glaesopharia fructicola C.M.

I. Leptothyrium Berberidis huan C. Manal.
in litt. ad F. G. Yacc. — Peritheciis punctiformibus,
nigris crebre dissemminatis epiphylliis
depresso-clypeatis; parietibus subaenatis
minutissime punctulatis fere ad epidermide
mutata formati; sporulis
bacillaribus hyalinis, utrinque rotundatis
4:5 X 1:1,5 μ ., bacidis 8:10 X 1,5 μ ..

Hab. ad folium sicca Berberidis vulgaris supra
Dadia. Calamena „valle dei Purgoloti“ prov.
Verona 26 Sept. 1909 — C. Manal.

Obs. A L. Berberidis Cooke et Maas. distinguitur impariter peritheciis epiphylliis
et sporulis multo minoribus. — L.
Berberidis Michx., perithecia hemisphaerica
et hypophylla exhibet, sed quoad sporulas
ignotas et species omnino incerta.

granularicula
II. *Leptoxia granularicaefolia* C. Mand.
in litt. ad F. A. Jacq. — Peritheciis epiphyllis
prominulis nigris minutis punctiformi-
bus, poro manifesto parvis, ma-
culis amphigenis irregularibus primis
pallide cinnamomeis dein areolatis,
areolis parvis, saepe confluentibus, albi-
cantibus et linea fusca limitatis; spo-
rulis subuliformibus varis inflexis,
unicellularibus (*Tylenchoideis*), hyali-
nis continuis $35-50 \times 2 \mu$. —

Hab. Ad folia *Prunij granulariae* supra
Dacia-Calarena „*valle dei Rego-
liti*„ prov. *Vromae* 26 Sept. 903
C. Mand.

Obt. A *Leptoxia ardea* L. et L., *L. granularica*
Wet., *L. sibirica* Thüin. et *L. Prunij* Don.
differt forma et colore macularum
vel magnitudine et characteribus
sporularum. —