

Carissimo Enrico

Ferrara 7/XII/913

Il fungillo che ti invando non reputando
che tu per così poco abbia a scrivermi, se
sarà nuovo lo vedrai pubblicato
a suo tempo nelle serie delle tue novità
micologiche. Io prima dedeva trattare
della serie Placophracis punctata⁽¹⁾, ma
gli stromen più grandi, irregolarmente
disposti nelle macchie, e nemmeno
le spore allungatissime, mi fanno
supporre che debba invece ascrivere
il fungillo a Gytopora. Saluti coi
diali

affettuosi
C. Macrolongo

(1) Che trovasi in tuo erbario volante



Cytopora pomicola n. sp.

Thomatis hypodermis erumpentibus
 depressis, conoidis, carbonaceis $0,5 \times 0,2$ mill.
 in diam., vitis ^{panis} rufis ⁵⁰⁻⁷⁰ ~~inter~~ ^{sub}ocularibus, le-
 uibus, marginalibus band raris confluen-
 tibus, in maculis suborbicularibus
 subijectioni lae indidentibus; sporulis
 hyalinis minutissimis subcylindricis
 allantoideis $2,5-4,5 \times 1,2$ ^{1,7} ~~pc.~~ ^{sporangia}, basidis
 fasciculatis $15-20 \times 1,5$ pc. —

Luiputh. A. Trias malis nulle aus
 macature prodotte dalla terribile
 tempesta del 6 agosto 917. Tugueso
 ott. 917 (c. m.)