

19. XI. 1914

(Achtgeachteter Herr Professor.)

Ich erlaube mir heute, Ihnen wieder
noch 11 Bzge zur freundl. Durchsicht
zu senden. Es sind aber für heute wahr-
scheinlich die letzten, da ich infolge
des Kriegesumwirts nichts mehr sammeln
kann.

Die dazu gehörigen Bemerkungen folgen
am Schluß meines Schreibens. Ich
möchte Sie nur noch herzlich bitten,
die Bzge, welche ich Ihnen Mitte Oktober
gesendet habe, sowie diejenigen, wel-
che ich heute sende, wenn möglich bis
Anfang Dezember d. J. untersuchen
und mir das Ergebnis Ihrer Unter-
suchung freundlichst mitteilen zu wollen.
Verhauungsvollst genisund
ergebenster
Petrak

Nr. 1. *Phomopsis*

Auf *Salix amygdalis*

M. Heisterkampen X 1914 by F. Petrak
Sporen 6-10/3-4 μ Ø, an jedem Ende meist
mit je einem kleinen Ölküpfchen, hyalin, einzellig,
ellipsoidisch oder zylindrisch, beiderseits abgerundet.
Vielleicht neue Art?: *Phomopsis parkiana* Facc. et Petr. n. sp.

Nr. 2 ? *Septomyxa* n. sp.?

Auf *Scorulus hippocastanum*

M. Heisterkampen X. 1914 by F. Petrak
Sporen spindelförmig, hyalin, beiderseits zierlich
spitz, A in der Mitte der völligen Breite mit
unmerklicher Querwand 14-23/3-4 μ .

Nr. 3. *Thoma*?

Auf der Rinde von *Robinia pseudoacacia*

M. Heisterkampen X 1914 by F. Petrak

Perithezien zu schirmförmigen Gruppen vereint,
Sporen bräunlich 1-zellig, Stäbchenförmig, 2-3 1/2-1 μ

Nr. 4 ?

Auf Felsen-Brinde

M. Heisterkampen X. 1914 by F. Petrak

Fruchtgehäuse anfangs von der Hypothecium bedeckt,
später mehr o. weniger hervorstehend, oft fast oberflächlich,
gesellig, schwarz Sporen lang, hyalin, später braun
kuglig, 15-18 μ im Durchmesser oder eiförmig, 20-26/
14-16 μ , einzellig.

Nr. 5. *Fusicoccum* n. sp.?

Auf *Cornus sanguinea*

M. Heisterkampen X 1914 by F. Petrak
Sporen zylindrisch, beiderseits abgerundet, hyalin, ge-
rade, selten etwas gekrümmt, 9-12/3-5 μ . Ø
(*Fusicoccum cornicolum* Facc et Petr. n. sp.)

Nr. 6 *Fusicoccum* n. sp.

Auf *Lyringia vulgaris*

M. Heisterkampen X-1914 by Petrak

Schulisch Nr. 5.

(*Tussilago Lyringae* Sacc. et Petr. sp.)

Nr. 7 *Hyphomycet* mit kugligen, dunkelbraunen
Sporen.

Auf dünnen Blättern von *Glyceria fluitans*.

M. Heisterbach

I. 1912 leg. Petr.

Nr. 8. *Diaporthe* (*Tetrastoma*)

Auf *Salix aucuparia*, M. Heisterbach X. 1914 leg. F. Petr.

Stimmt zu keiner der auf *Salix* beschriebenen Arten
und zeichnet sich vor allem durch große Asci und Sporen
aus. Kellersicht neu. Asci 70/75/8-11 μ Sporen meist
4 grossen Obovulen, in der Mitte ziemlich stark
eingeschnürt, 4-zellig, hyalin 18-22/6-8 μ .

(*Diaporthe aucupariae* Sacc. et Petr.)

Nr. 9. *Phyllosticta*

Sporen hyalin zylindrisch, gerade oder etwas gekrümmt,
4-6/11/2-2 μ . Stimmt zu keiner der auf *Phyllosticta* beschriebenen
Arten.

Auf *Stemum lanata*, Königswart in Böhmen

X. 1914 leg. J. Zahner.

Nr. 10 *Phyllosticta Jahrmiana* Sacc. et Petr. sp.

Sporen sehr klein, hyalin, 2/1 μ ellipsoidisch

o. eiförmig. Auf *Rhamnus cathartica* Plan in Böhmen

X. 1914 leg. J. Zahner.

Ich kann in meiner Literatur keine *Phyllosticta*-art
auf *Rhamnus* finden, die bisher passt!

Nr. 11. *Phoma Chenopodii*-*glaucae* Sacc. et Petr. sp.

Sporen hyalin, einzellig 4-6/3.5-4 μ o. par.
zu keiner der auf *Chenopodium* beschriebenen Arten, oft in
Gesellschaft von *Diplobotria Chenopodii* Karst.

Auf *Chenopodium glaucum*

M. Heisterbach X. 1914 leg. F. Petr.