

8/3. 11

Chiaripinus sp. *Duffrenoy*

Ripponda *putida* alla *San carolina*.

de *Agnes* & de *faciendami* i *putida*:

Mon. apiosp. Sacci sp. n. (Mucedineae)
Capitulis albis, dein luteis fuscis, byssinis,
confusis, 3-5 mm. latis (in cultura);
hyphis myceliatis repantibus, filiformibus,
intricatis; conidiophoris decumbentibus (non
erectis!) vix paucisve ramosis, parce
septatis, 2.5-3 μ ca., hyalinis, hinc etiam
puberulis, ramis ascendentes saepe paulo
demum, monosporis; conidiis continuis prae-
-mitibus, oblongis, interdum obsoletis, immo basi
truncatis, 14 μ long. 5.6 μ ca., interdum
11 x 5.7, demum suberundis, inter varic

guttulatis vel granulosis, inter lobos, lon-
gioribus saepe infra medium lobum caecatis,
intus hyalinis, raram distinctissime sordide
roseo-flavidis.

Hab: cult. in tubum solani ex foeculis
granulosis cuticulis nec non pubes-
centis, mollibus sed ^{pedis humanis} spinis omnino
integer tectis, Jan. 1911 (Dr. J. F. Radcliffe).

- Lo ho fatto alla mia comunicazione alla
"XII Riunione della Società Italiana di
Dermatologia e Sifilografia" - Roma Dicembre
1910". Il resoconto della riunione, uscì
la qualche giorno nel Giornale Italiano
della Malattia Venerea e della pelle (anno
1911 - fasc. I.) - Il titolo della comunic.
- pion è: "Caso singolare d'attrazione

cutanea e profonda di natura probabilmente
aristotica in un piede??

Non posso spedire la bague perché la ho
più rimandata e per via della di Milano
occorreranno parecchi giorni. Le spedirò,
appena li riceverò, gli eschatti.

Le rimando i miei ringraziamenti e
la prego di miei affetti.

Seu devoto

Mendach.