

R. ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LE COLTIVAZIONI DEI TABACCHI

Scafati, addì 14 Maggio 1912

N. di Prot.

899

Risposta a Nota

OGGETTO } Piantine di tabacco attaccate da ifomiceti.

ALLEGATI N.

Mi permetto sottoporre al Suo autorevole giudizio due ifomiceti infettanti le piantine di tabacco.

Il primo è dannoso nei semenzai quando le piantine raggiungono l'altezza di tre o quattro cent. fluidicando i teneri fusticini e le foglie. - Dopo qualche tempo le foglioline in putrefazione si covrano di una rete micelica grigiastra, in modo dare apparenza di una fitta tela di ragno, sulla quale - più tardi - si notano dei fiocchi cotonosi. - Il micelio trasportato sulle piantine sane in ambiente umido, riproducono il male. E' da notarsi che le piantine piccolissime resistono all'invasione.

Le fotografie che mi onoro rimettere rappresentano l'infezione sperimentale.

Il secondo ifomicete è comparso nei semenzai in proporzione allarmanti sulle piantine adulte dei semenzai dei tabacchi delicati, tipo Avana specialmente. - Da un esame sommario risulterebbe come Phyllosticta o specie affine.

Grato del favore, con profondo rispetto

IL DIRETTORE

Ill:mo Sig. Prof. Saccardo

PLADOVIA

Splendore