

Chiarissimo Professore

Liena 28 / 7 / 03,

Oggi stesso Le ho rinviato, per mezzo di questa Università, il pacco delle *Leptostromaceae* etc. da Lei gentilmente favoritomi, e del quale di nuovo La ringrazio.

Studiando il piccolo esemplare della *Leptostromella tenuis* mi ha sorpreso il fatto che tutte le sporule erano munite all'estremità di 4 sottilissime ciglia ialine, divergenti, carattere che a mio avviso farebbe di questa specie un nuovo genere analogo tricosporo, di cui Le riporto qui appresso la diagnosi. Le dette ciglia sono assai sottili e perciò per ben vederle occorre un forte ingrandimento. Peccato che il suo esemplare sia così piccolo e in stato poco adatto ad un esame minuzioso!

Grato se vorrà accusarmi ricevimento dell'Erbario, e manifestarmi il suo autorevole parere circa la *Leptostromella*, mi confermo con perfetta stima

*Leptostromella  
Perith.*

Suo Devoto

H. Gatzert




*Perithecia primitus velata*, dein superficialia, elongata, sub-carbonacea, atra, astoma, dimidiata. Sporulae bacillares, continuales, hyalinae, apice setuloso penicillatae.

= *Perithecia gregaria*, innato-erumpentibus, elongatis, modice depressis, circ.  $\frac{1}{2}$  mm. long., astomis, fuliginoparenchymaticis; sporulis cylindraceis, curvulis 20-25 =  $3-3\frac{1}{2}$   $\mu$ , hyalinis, apice setulis quaternis divergentibus diaphanis ornatis - Hab. in caule *Lepidii graminifolii* - Setulae sunt exilissimae vix perspicuae.

Padova 24. 6. 03

NB. Alla presente deve essere lasciata unita la parte della risposta.

CARTOLINA POSTALE CON RISPOSTA  
(Cent. 15.)



03  
Al Chiar.mo Signore

Lig. Cav. Prof. Pier Andrea Saccardo  
Orto Botanico

(Provincia di

Trevi so

SL. 4351

Padova  
Volpago

