

Onorevole Sig. Professore,

Mettersi assieme le note sul brucione e rivedendo i preparati miei
sono convinto che alcune forme di miceti possono anche determinare stati morbosi
ma non però il vero brucione. Tra i miceti più pericolosi io metto le
Sphaeropsis di Cattaneo, *ragi*, *urumi* e *orizzze* che ritengo ideali e che riferisco
al gen. *Coniothyrium* come Ella dice giustamente nello Sylloge, ma questa colla
Septoria di Cattaneo sono le forme pinnidiche e spermatogoniche descritte dal
farovaglio per la *Sphaerella* *orizzze*. Da coltivazioni artificiali non ho ancora trovato
un tale nesso, piuttosto che miceliche di *Coniothyrium* vari diversi
forme sclerotici. Tra sarei o pregato di voler osservare se
Ella avesse nella raccolta qualche esemplare autentico di
farovaglio o Cattaneo per lasciarmelo consultare.
Ho anche coltivando spore di *Diogenaria* *Vaughani* ^{in *Demodora*} (che si differenzia
poco molto poco dalla *manulata*) e ciò perché ho trovata vicino a
Ella, per le di una *Coniothyrium*.
Vogli quindi inviare conquis e di tutto un fanghio autentico alla signora *Coniothyrium*



NB. Sul lato anteriore della presente si scrive soltanto l'indirizzo.

CARTOLINA POSTALE ITALIANA
(CARTE POSTALE D'ITALIE).



901

All' Onorevole

Sig. Prof. D. R. A. Saccardo

Dir. Istituto Botanico - Università N



Padova

SL. 4848