


Figure saccardiane di alcune
Faverozame tarvisine (Selva, Montello,
Costa di Vittorio Veneto, etc.) eseguite
precipuanente nel 1871.

Dato dal Prof. F. S. F. S.




Linum elegans L.

Costa 26 Sept. 71.



Saucy Carota



*Scrophularia
nodosa*




*Linum
vulgare*



*Glechoma
hederacea*



*Populus
alba*



*Rhamnus
Frangula*



*Rhamnus
cathartica*



Dianthus chinensis L.

1. ramus florifer
2. calyx et calyculus
3. petalum
4. androecium et gynoecium

20 Sept. 1871.

Polygonum Hydropiper L.

sapor acer, piperinus




Polygonum nitidum Schok.
sapor nullus
In montis Silva
et totius province,
ubi frequentius est
quam Polygonum
Hydropiper L., quod die
rarum est.

1871-12 Sept


Habetur forma floribus semper albis
et forma floribus sub anthesi albis
seu purpureis.

Polygonum Persicaria L.
sapor nullus



Legumen
Meliloti macrostichi
qui crescit
abunde ad rivulos
a Silva





calyx

androecium

Cyclamen europaeum L.



Symplocarpus racemosa



Galliardia picta

Laurus nobilis

Costa, 20 Sept. 71



Yucca gloriosa L.

1 ramus florifer — 2 androecium et gynoecium
Costa 21 Sept. 71



Oxalis stricta L.

1 ramus ferens folium,
alabastrum, flores,
et fructus.

2 petalum

3 sepalum

4 gynecium et andrecium

5 fructus transverse sectus

6 semen

Crescit ubique abunde — 4/9/51



Pulicaria dyenterica

Crescit ad ripas, fossas.

5/9/51:

1 ramus florifer

2 flosculus femininus radii

3 " " disci

4 " masculus disci.

Carduus nutans L. var. *purpureus*
 et var. *albiflorus*: capitula serotina
 sunt tenuiora, quam capitula
 precociora

ad Brentella, sicut
 sylvan Martello.

25 Aug. 1871.




Centaurea Jacea L.

var. foliis omnibus integris, in d.
 v. remote et obsolete
 denticulatis. Tota planta
 canescens, subfloccosa - Involu-
 crum bractearum ^{apparentes} subintegre, albae,
 membranaceae, totum involucri
 obtegentes - In sylvan
 Martello et hinc, graminosis, siccis.
 25 Aug. 1871



Carpefium cornutum L.

antherae caudatae -
 corollae tubulose 5-dentatae,
 extus sub dentibus glandu-
 losae - Achenium hinc
 bicusculum, oblongo-ovatum,
 obsolete striatum, apice
 subrotundum. Hinc
 glandulis albicanthibus
 globosis, majusculis adper-
 furum -
 Selva in horto sponte
 1871 26 Aug.






Ruscus aculeatus L.

var. lanceolatus : cladodii exquirit lanceolatis : cetera
speciei. — In sylva Montello, promiscue cum specie, raris-
sime (vidi duo specimen — 18 Augusto 1871)

Fig. 1 ramus varietatis, sterilis — 2 cladodium var. cum gemmula
florigera — 3 cladodium speciei fertile — 4 id. sterile.


Varietas hec analoga est varietatibus angustifolij Lauri nobilij,
Citri vulgaris, Raxi temperentis.



Rumex pulcher L. var. lobinteger perigonii
phyllis internis, late cordatis, obsolete basi
dentatis (non spinulosis), mucis calicis
Cetera speciei: folia rad. panduriformia —

Ad murus euleniae Sylvae — 19 Aug. 71

Centaurea nigrescens W.




a Cent. Jacœa, cujus a nonnullis
auctoribus varietas habetur, differt
appendicibus totam involucri non
abtegentibus — a Cent. nigra L.
differt eodem caractere et in super
defectu pappi.

C. nigrescens W. frequentissima est
in pratibus planities et montium
venetorum — 20 Aug. 1871.



Galeopsis Tetrahit
 var. versicolor Wagn.
 G. versicolor Curt -
 variet floribus lutescentibus
 v. purpureis - maculis similibus
 pectus - Frequens ad fossas,
 in montibus tot. prov.
 1871 aug. XXVII



Panicum undulatifolium Ard -

La sostanza grassa onde
 rivestita la spiga, deriva
 dai copiosi lunghi peli,
 che si radice sopra la rachis
 de e sulle glume. Detta
 sostanza è bianca e manda
 un odore spiccatissimo di sugna
 rancida. È singolare
 che nessun trattatista ne
 parli - Anche le
 vesse sono untuose e
 portano all'apice due
 o tre punte cariche trasparenti, forse grassipane.




1.2. pelo di lana

apice di una vessa

o tre punte cariche trasparenti, forse grassipane.



1 seme di Hypericum montanum L.
 2 " di Hypericum hirsutum L.
 Quest'ultimo è rivestito di papille
 bianche-pellucide irregolari - non
 è quindi velutato, come lo dice
 il Koch.





60



61



62



63



64



65

Handwritten notes:
M
M
M



Aster salignus Auct. ital. an W.

ab *A. salignus* W. Koch differe videtur.

Tacem. densifolio, non remotifolio
 involucri laxiusculo, squarrofolio, non adpresso.
 floribus aguceis et in anthesi:

Legi ad aggerem secus fl. Plarim a Narvesa (7 Sept-71)

Vicia Cracca L.



In sylvae Montellae
 1871. 8. 7. 71.

Comparatio Polygoni Persicariae, Hydroxyperis, mitis -

Habitat

	spica	ochreae	perigonis	folia	semina	
Polygon. Persicaria	densa, recta sapore nullo	breve ciliatae	eglandulosa parvula	lanceolata latiuscula impunctata maculata	subdivisa atra, longiora	In arvis, siccis et in aquis
Hydroxyper mitis	laxa, pendula sapore acro laxa, subumbosa sapore nullo	submitis longe ciliatae	glandulosa majorcula eglandulosa majorcula	lanceolata ^{immaculata} latiuscula ^{minutissima} punctata glandulosa lanceolata angustior impunctata immaculata	obtus triquetra in umbrosa granulosa rufo-atra obtus triquetra atra longiora	ad fossas ad fossas, et in umbrosis

Handwritten scribbles and numbers: 300, 380

160 / 130
10 / 5



Eriobotrya japonica

Handwritten initials or mark.