

Frumenti Saccardian

Muschi, Feci.

Dono N. a. 1707

Muschi vetuli.

Burbaumia indusiata Brid. Sui tronchi fracidi delle conifere nel
bono Causiglio (Bér. Sacc.) — nel b. Montale.
sull'argilla umida, rarissima (Sacc.)

Blindia acuta B. S. G.

Pad. (Trev.)

Bryum inclinatum P. S.

Pad. (Menegh.)

Bryum bimum Schreb.

Pad. (Trev.)

frequente nei luoghi umidi musc. del B.
Causiglio. È perfettamente sinorico e compa-
re alle fig. delle briol. eur. e agli esemplari
del Herb. Ma in tutt. gli altri caratteri
è un *B. pallenscens*. Se questo,
secondo Lindberg può essere anche sinorico,
allora il nostro *B. bimum* non sarebbe
altro che la forma sinorica del *B. pallenscens*.

Bryum pallenscens Schlecht. Sui tronchi musc. e sulle rupi umide
del B. Consiglio frequente (Bér. Sacc.)
Mungo Zovello (M.) di ^{J. Montini} ~~Verona~~ (Spagnoli)

~~— *B. boreale* ^{cusp. datum} : foliis costa excedente ^{marginis} cuspidatis : Causiglio (Sacc.)~~

~~— *B. subrotundum* ^{brachycarpum} ; minus, capsulis brevioribus : Causiglio (Sacc.)~~

Bryum vernense Dicks.

Adige Veron. (Dicks.)

Bryum alpinum L.

Tronchi dei Sette Comuni (Spr.) — Pad. (Trev.)

Bryum Donianum Gev.

Vicent. (Lorenz.)

Bryum verticillatum A. Br.

Nell'alveo del Paice (Sacc.) secus Atterina ad Arco
(Venturi).

Bryum argenteum L.

Comune su tutt. e sulla umida terra umida nel

^{vicenda} ~~vicenda~~ (Sacc.) — Bell. (Mol.) — Udine (Mol.) — Trieste (Sacc.) — Belf. (Mont.) — Causiglio (B. S.)

^{Bassano} ~~Bassano~~ (G. Mont.) — ^{Zovello} ~~Zovello~~ (M.) — ^{Verona} ~~Verona~~ (Mugna) — ^{Verona} ~~Verona~~ (Leg.) — ^{Verona} ~~Verona~~ (Poll.) — ^{Verona} ~~Verona~~ (Poll.)

Bryum atropurpureum W. & M.

Muri del Tring. (Sacc.) — Ort. Pad. (Sacc.) —

f. pallida

Verona ^{Marabonghi}

Verona (C. Mont.)

Bryum erythraeum (W. & M.) Berici (Venturi) - Selva? (Sacc.) Pad. (Trevisani)

Oss. Non differisce da una per la capsula più allungata e le foglie più rigide

Bryum caespitium L. Mur. vecchi, e sulle terra arenacee Cadore (Vetro), Angarano (Montini) Tring. (Sacc.) - Vicent. (Magna) - Bell. (Angarano)

- V. imbricatum B.S. Mur. & Pad. (S.) Ver. (P.) Pad. (T) Bell. (Mot.) Vene. (Lann.)

Bryum balduense Vent. et Dill. Baldo (Vent.)

Bryum torquescens B.S.G. Mantello (Sacc.) - Tring. (Ber.) - 7 Comuni (Spr.) - S. Felicità (Bell.) - Mestre (Venturi)

Bryum capillare L. Sulle terra argillosa nel b. Mantello e Causiglio

Angarano (Montini) (Ber. Sacc.) - su. tett. e sui muri ventrali del Tring. (Sacc.) Bassan. (Blum.) - Tring.

(Magna) - Vicent. (Spr.) - Ver. (Leg.) - Vic. (Stern) Pad. (Trevisani) - Vene. (Nacc.) Amaro (M)

Bryum Mildenium Turcz. Marmolada (M^o)

Bryum pallens Sw. Nei muraggi del Piave a Nervetia e w. B. Causiglio (Sacc.) - Bell. (Mot.) M. Amaro (M)

Cadore (Vetro)

Bryum roseum (Dill.) Schreb. Mantello e Causiglio (Sacc.) - Bass. (Blum.)

Bassano (G. Mont.) Fregona (Sacc.) Vicenza (Sacc.) - sempre sterile. Ver. (Leg.) - Pad. (T.)

Bryum pseudotriquetrum Schreb. Palud. Tago, Villorbo, Piave (Sacc.) Monte Ver. (Moreni) Cadore (Vetro) Asiago, Collalti, Montalun

Brachythecium rutabulum B.S. Tring. ovunque (Sacc. Ber.) Pad. (Sacc.)

Angarano (G. Mont.) (L.) Vicent. (Spr. Magna) Bass. (Blum.) Ver. (Blum.)

Minigo (M) Bell. (Mot) Mantov. (Mase) - Liguria (Piccone)

Vene. (Mont.) Genova (Piccone) Ver. (P.) - Vic. (Mar.) Pad. (T)

Oss. Varia nel colore verdiccio, verde, giallo, e nello splendore più o meno nitido

Brachythecium glareosum B.S. Bell. (Mot.)

Brachythecium salebrosum (Hoffm.) B.S.G. Tring., Causiglio (Sacc.) - Civo (Venturi) Sub. B. campestre) Pad. (T) Oss!

Oss. Il B. campestre è una varietà con foglie più largamente cupolate e col pedicello superiormente callosetto

achyrothecium trachypodium B.S. Bell. (Mol.)
achyrothecium reflexum B.S. Bell. (Mol.)
achyrothecium populaceum (Hedw.) B.S. G. Treviso, Montello, Causiglio, Valtina (Sau.)
(Angarano) (G. Mont.) Zovello (M) Bell. (Mol.) Vicent. (Spr.) - Carnia (Pirna) Ver. (P.) Pad. (T.) Eug.
- β protensum ram. elongatis adpressis. 7 Coman. (Spr.)

Op. Raab: appie. Degli alberi presso i font. a Selva una forma
quasi opaca, con peduncol. lisci, in colle uselle immature.
Per caratteri s. avvisabile al *B. collinum*.

achyrothecium velutinum (L.) B.S. G. Montello, Selva (Sau.) Valsugana (G. Mont.)
Liguria (Pec.) - Rabbi (Vent.) Moniga, Zovello (M)

achyrothecium planifolium B.S. Pad. (T.) Val d'Adige (Venturi)

achyrothecium Starkii B.S. Bell. (Mol.)
- *v. simulacrum* Bell. (Mol.)

Barbania Oederi (Gunn) Sw. Causiglio (Bér. Sau.) - Vicent. (Spr.)
Cadore (G. Mont.) Montebelluna (G. Mont.) Collette (G. Mont.) Bass. (Bth.) Ver. (P.) Vic. (Ster.) Pad. (Trev.)

Barbania thyphylla Brid. Bell. (Mol.)

Barbania Halleriana Hedw. Causiglio (Béranger) Valsugana, San Floriano (G. Mont.)

Barbania pomiformis (L.) Hedw. Montello (Sau.) - Causiglio (Bér.) - Ver. (P.)
Bassan. (Bthm.) - Lombardie (Brach.) Vic. (P.)
var. *crispa* (Hook. et Gay.) mt. Pore, S. Michele (G. Mont.) Pad. (T.) Udine (Luff.) Zovello (M) Val. Piave, Gellio (G. Mont.)

Barbania stricta Brid. M. (Comelli)

Barbula gracilis Schwäg. Argin. del Piano a Narvesa e b. Causiglio
(Sau.) Pad. (T.) Pore degli (G. Mont.)

Barbula rigida Schult. Pad. (Trev.) Sogli del Brenta presso Ca Angarano (G. Mont.)

Barbula paludosa Schwäg. Argin. e sabbie del Piano (Sau.) Bell. (Mol.)
a Narvesa (Venturi) alla (Venturi)

Barbula vinealis Brid. Ver. (Rabenh.)

Barbula intermedia (Wils.) Milde - Ver. (Mass!) mt. Baldo (Venturi)

var. *pulvinata* (Tur.) Sui tronchi degli alberi vecchi nel Trivigian.
(*B. longipila* Sau. non Aud.) nel Padorano (Sau.) Onara (Bth.)

Barbula Saavedrana Dth Genova (Piano sub *T. longipila* form.)

var. *longipila* Sui tronchi degli alberi vecchi a Selva

var. *mucronulata* (an *B. ruralis* calva Schimper) - Tronchi a Selva

Oss. La *Tortula virescens* Müll. corrisponde
 per certi alle var. α della *B.* inter-
 media Mild. Anche la *B. latifolia*
 Br. non deve essere che una
 var. della mia var. mucronulata.
 Quanto alle *B. leipista* e *leip-
 formis*, queste si distinguono dalla *B.*
 intermedia per essere ^{monocliche} ~~tricliche~~.
 Il rimanente è perfettamente simile.
 Esiste del resto una invariabilità
 assoluta rispetto alla disposizione dei
 sessi?

Barbula mucronifolia Schreb. Bald. (Vent.) Ampetro (Mido.)

Barbula imadophila Schimp. Bell. (Mot.)

Barbula unguiculata (Dill.) Hedw. In tutte le prov. di Treviso.

S. Michele (G. Mont.)

Vienna (Mugna)

Amaro (M.)

e d. Padova (Sacc.) - Bassano (Bld.)

Mont. - Verona (Bldm.) Sette Comuni

(S. Pranzo) Ver. (Sg.) - Pad. (T) Udine (Suff.)

Bolzano (Vent.) - Genova (Sacco) Ginevra (Cald.)

Varia appa. e specialmente: longicaulis,

elatior, microcarpa, obtusifolia, apiculata etc.

Barbula caerulea Müll. Engelm. (Lorentz)

Barbula Brebissonii Brid. Bell. (Mot.) - Ud. (Sord. tr.)

Barbula fallax Hedw. Piave, Montello, S. Maria, Cansiglio (Sacc.)

Bassano (Bldm.) - Firenze (Cald.) Pad. (Sacc.)

Sala (Bérenq.) - Pad. (T.)

Barbula subulata (L.) Brid. Montello, Montebelluna, Cansiglio (Sacc.)

Trieste (Mugna) Pad. (T.) Bell. (Mot.)

Venezia (Sacc.) Mantova (M.) Angarano (G. Mont.)

~~Barbula~~ recurvifolia Schimp. Sulle rupi calcaree ^{aperte} di M. Causiglio
rara (Sauerb.) ^{improba} Bell. (Mot.)
Nella grotta della Stua di Montebello (Venturi)

~~Barbula~~ raralis (L.) Hedw. Selva, Treviso, Causiglio, Pad. (Sacc.) Montebello
Bassano (G.M.) ~~Ver. Ven.~~ Bell. Vicenza (Mugn.) - Faenza (Cald.) - Genova (Pucc.)

~~Barbula~~ fragilis Willd. ~~fa. W. truncata Dicks.?~~ ~~Sui tetti stramici, fra le fessure delle mura,~~
~~glia a Selva, Vittorio, sopra delle mura di guerra nel M. bello,~~
~~Barbula cincta Tett. & Selva (Sacc.) purpurea (Sacc.) - Padova (M.)~~

~~Barbula~~ squamigera Viv. (~~B. membranifolia Schultg.~~) - Selva, Ruvine
(Sacc.) - Genova (Pucc.) Ver. Vic. (Lor.)
Pad. (T.) Ca' Lirio, lungo il Brenta (G.M.)

~~Barbula~~ muralis (L.) Hedw. Torreggio nelle prov. di Treviso, Venezia, Belluno,
Bassano (G.M.) Padova, Vicenza (Sacc.) - Vicenza (Spr. Albr. Mont.)
Genova (Pucc.) Ver. (Leg.) Pad. (T.) Ud. (Luff.)
Le var. che si osservano qua e là sono

~~Barbula~~ ~~β aestiva~~ - ~~γ rupestris~~ -
~~longipila che~~

~~Barbula~~ Hornschuchiana Mura di Padova (S.)

~~Barbula~~ inclinata Schw. Nell' alveo del Piave, frequente (Sacc.)
e del Brenta p. Bassano (Spr.) e nei tetti
altissimi Tett. & Selva, Padova (Sacc.)
Portole (G.M.) Comuni (Spr.) - Liguria (Cald.) - Caus. (Sacc.)
Ver. Vic. (Poll.) Pad. (Trevis.) Pad. stent. (S.)

~~Barbula~~ tortuosa (L.) W. M. Markello, Caus. (Sacc.) Friuli (Pucc.)
forma humilior) Cornuda (Sacc.) Liguria (Pucc.)
Neuchâtel (Mortier) Ver. (Poll.) - Vic. (Stern.)
Pad. (T.) Bell. (Mot.) Zivello (M.) Chiago, Grappa, Portole
(G.M.)

~~Barbula~~ squarrosa Dicks. ^(Gymnochaete) Nei pascoli collini del Trivigiano, rara (?);
nei luoghi erbosi a Abano presso le terme (Sacc.)
Verona (Lorub.) Mura di Padova abb. (S.)

~~Barbula~~ revoluta Schwägg. Nelle fessure dei muri a S. Giacomo presso Vittorio (S.)
- a Vicenza (Venturi) Avio (Venturi)

~~Barbula~~ convoluta Hedw. Nelle fessure dei murazzi e nell'alveo del
Piave (S.) Pad. (T.) Pad. (S.)

~~Barbula~~ alvipes Veron. (Mass.)

~~Barbula~~ ambigua B.S.G. Supl. argyr. del Piave e sulle murelle
a Treviso (Sacc.) - Pr. Bassano (Sacc.)
Genova (Cald.) Pad. (S.)

~~Amphoridium~~ lapponicum Schimp. Fedrj., Mageri, Marmott. (M^o) V. inf.

~~Abichum~~ undulatum (Hedw.) Beauv. Fing. Montello etc. (Sacc.)

Vicent. (Blk.) Spr. - Mantov. (M)

Zovello (M) Liguria (Picone) Ver. (Leg.) Rov. (Poll.)

M. Berici (Magna) Romano, Angarano, Massolente (Montini).

~~Abichum~~ angustatum (Brid.) B.S.G. Montello, Caufiglio (Sacc.)

Cornuda etc. (Sacc.) - Vicent. (Mageri)

Blk. - Liguria (Cald. Picone)

Pad. (T.) S. Michele, Asto (Mont.)

~~Antitrichia~~ curtipendula (L.) Brid. Montello, certe rara (Sacc.)

Caufiglio, comune (Sacc.) Ver. (Poll.)

~~Amphoridium~~ Morgeotii Schimp. Fedrj., Pad. (M^o)

~~Anomodon~~ attenuatus (Schreb.) B.S.G. Montello, Caufiglio e colline

Angarano (Montini) Fing. (Sacc.) Ver. (P.) Pad. (T.) Ud. (Sacc.)

- β Lenellus (Schimp.) Montello (Sacc.)

sec. Blk. B. europ. 33h.

~~Anomodon~~ tristicus (Mts) Sull. Ai tronchi delle granie nel B. Tr.

Montello, di raro (Sacc.)

~~Anomodon~~ viticulosus (L.) Hook. et Tagl. Pr. di Treviso, Bell.

no, Pad. (Vent. Sacc.) - Vicenz. (Blk.)

(Vicenza) Magna 7 Corn. (Spr.) - Fing. (Cald.) Ver. (Leg.)

Oldin. (Sacc.) Zovello (M) coll. (Montini)

~~Anodus~~ Donianus (Engl. Bot.) B.S.G. Sulle rupi calcaree di una fa-

la (Venturi) Spelunca della la Conca nel Montello (Sacc.)

~~Anthyodon~~ dealbatus Beauv. Bell. (Mot.) - Bellavento Ang. (M^o)

~~Anacalypta~~ lanceolata (Dicks.) Rost. Nelle sabbie del Piave a

Nanessa, sulle mura a Padov. (Sacc.)

Veron. (Blk.) - Parma (Berong.)

Ver. (Poll.) Valugana (Montini)

~~Anacalypta~~ latifolia A. et Horn. - M. Bassan. (Montini) Montalun (Montini)

Blystegium riparium (L.) B.S.G. Tring. Pad. (Sacc.) - Ver. (P.)
S. Felata, Romano, Tring. (G. Montini) Maus. (Mare) Vic. (Sten) Pad (T) ORB!

B. abbreviatum ORB. (Sacc)

B. subsecundum B.S.G. Selva (Sacc.)

B. prolixum (elongatum B.S.G.) - Treviso (Sacc.)

B. trichopodium (pseud-serpens) - Lungo il Reno, a Newes. (Sacc.)

Blystegium Sprucei B.S.

Bell. (Mol.)

Blystegium subtile (Hedw.) - B.S.G. ^{vallibus} Causiglio, (Sacc.) - Grappa (Bltn.)

S. Michele di Angarano (G. Montini)

Blystegium serpens (L.) B.S.G. Comuni. ^{palustre} domus ed ana.

palustre. Tring. Bell. Pad. (Sacc.)

^{anum (M)} ^{magna} Bepan. Vic. (Bltn.) - Bren. (Cald.)

Genova (Piaone) Ver. (Sacc.) Ud. (Luff) - Ven. (Sacc.)

Blystegium radiale

Tring. (Sacc.) - Padov. (Sacc.) - Tring.

^{Carim (Sacc.) Veron. (Piaone)} Ver. (L.) Pad (T.) (Mugue) - S. Anna. morosini (Bltn.)

^{etani (Sacc.) S. Anna Morosini Bell.}

Off. A mio vedere gli Amb. serpenti,

radiale, saxatile (*Hypnum hygrophilum* Jur.) Kocher, o *Saxatikanum* non sono che forme di una stessa specie proteiforme

Blystegium imbricatum (Hook. et Will.) - Schimper. Rivoli.

Blystegium imbricatum (Hook. et Will.) - Schimper. Rivoli. o Ver. (Poll.) Treviso, comune, ma sterile (Sacc.)

B. fallax - Selva, Treviso (Sacc.) Martello, ^{vand.} ^{st. ag. Mf.}

Aulacomnion palustre (Dill.) Schwäg. Nei pascoli acquitrinosi
^{Abigo Batiunidi (G. Montini)} interno Vittorio, stent. (Sacc.) - negli stagni
del B. Causiglio, con *Hyp. stramineum*, *Sphagnum* etc

Fabronia pusilla Radd. sui tronchi. Dept. albi ad Udine (Ber.)
- Firenze (Cald.) Pad. (T.) Pat. (Tre.)

Fabronia octoblepharis Schlecht. Pad. Lug. (T.)

Funaria mediterranea Lindb. (B.S.G.) Treviso, Narvesa, Padova (Sacc.) - Liguria (Piaone) Angarano (G. Mont.) Vicenza (L.)

~~Funaria~~ *hygrometria* (L.) Hedw. - Tring. Paclor. Bell. (Laut.)
Bassano (Blom.) - Rom. (Spr.)
Genovese (Cald. Pire.) Ver. (Leg.) - Vic.
Udrice (Luffr.) Venezz (Madd.) Zovello (M)
Cadoze (Venez)

~~Festuca~~ *antipyretica* L. Tring. (Frachin., Sacc.) - Tring.
Amore (M) qua - Recoaro (Blom.) Mantov. (Mant.)
Ver. (Leg.) Pad. (Polt.) Ud. (Luffr.) Venezz. (Mant.)

~~Fissidens~~ *crassipes* Wils. Nei molini a Selva, alle sorgenti
OVB.P. (S.) Del Meno, lungo il Piane ede hy

~~Fissidens~~ *taxifolius* (L.) Hedw. Selva, nel B. Montello, a Panchy
va coll' o. bot. (Sacc.) Pad. (T.)
Augarano G. Mont.

~~Fissidens~~ *decipiens* Mbs. Montello, Causiglio (Sacc.) Bass. (P.)
Genova (Pucare)

~~Fissidens~~ *adantoides* Hedw. Ver. (Leg.) - Ud. (Luffr.) Pad. (Tr.)

~~Fissidens~~ *incurvus* (W.M.) Schwäg. Selva in terra, raro (Sacc. m.)
Firenze, e Boboli (Cald.) OVB.P. (Sacc.)

~~β pusillus~~ (Wils.) Schimper. Su mattoni dei muri a lacer
a Selva, Costa (Sacc.)

~~Fissidens~~ *osmundoides* Hedw. Eug. (Keuigh.)

~~Fissidens~~ *bryoides* (Hedw.) Selva e B. Montello (Sacc.) Ver.
Pad. (T.) Bell. (Mol.)

~~Dichodontium~~ *pellucidum* (Hedw.) Schimper. Luoghi umidi arg. stoff.
presso il B. Causiglio (Saccardo)

~~Eucalypte~~ *commutata* N. et N. Bell. (Mol.)

~~Eucalypte~~ *streptocarpa* Hedw. In le forme delle vecchie mura
ghie a Selva, Navepa (Sacc.)
Stenile - coll. Vent. (Magne)
Pad. (T.) Bell. (Mol.) Amore (M)

- Lypta rhabdica* Schreb. Bell. (Mol.)
Lypta citrata Hedw. (Pad. (T.) - Bell. (Mol.) Ringo (M.) Agaro (G. Mont.)
Lypta longicollis Bruch. Bell. (Mol.)
Lypta vulgaris Hedw. Sa. Letti a Selva, a bacio. (Sacc.)
Lypta (G. Mont.) Mura di Padon (S.) Ver. (Leg.) Pad. (T.) Ud. (Puff.) Venz. (Macc.) Eug. (Mant.)
Dichodon fascicularis (Dicks.) Schimper. Merse (Vent.) Pad. (T.)
Cladum verticillatum (L.) B.S.G. Piane, Cornide, Torgo, Reine,
 Alpi del Cadore (Venz.) Lago-Morto (Sacc.) Eug. (T.) Bell. (Mol.)
 Dalm. (Muegl.) form. elongata sterile?
 Tirolo (Venturi) Valle di S. Pivita (G. Mont.)
Mercurium sematum Hampe Pad. (Trev.)
Hynochium strigosum Schimper. Bolca (Pall.) Eug. (T.) - Baldo (Vent.) Marmolata (M.)
Hynochium (G. Mont.) *subbriatum* Bell. (Mol.)
Hynochium strictum (Schreb.) B.S.G. Montello, abbondantissimo (Sacc.)
 Angarano, Colletti (G. Mont.) prop. Bassano (G.M. Bolani.) Pad. (T.)
 Testa parente (Cald.) Bell. (Mol.) Ud. (Puff.)
Hynochium Junckii (Schimper) Landt (M.)
Hynochium proelongum (L.) B.S.G. Comune nel B. Montello, ove
 è freq. fertile e nei prat. e luoghi umid.
 di tutte le campagne ove è sterile; Pad!
 (Sacc.) Ver. (P.) Vic. (Mern.) Pad. (T.) Bassano (G.M.)
 var. *pseudostriatum*; foliis majoribus, solidioribus, capulis
 subcylindricis. Montello (Sacc.)
Hynochium piliferum (G. speciosum Brid.) B.S. Ver. (Pall.) - Bell. (Mol.)
Hynochium curvatum (Brid.) B.S.G. Selva, Treviso, Narvesa etc;
 parca mente multifero (Sacc.)
Hynochium (Cypripedium) *Vaucherii* Schimper (non H. Vaucherii Desq.) - Luoghi graminosi; e
 (Brachyth. ambiguum Dicks.) nipi nel Casisio, (Sacc.) Sterile. (Sacc. pulacee.
 (Cypripedium) *cypripedium* Mol.)
Hynochium striatum (Sm.) B.S.G. Muri vecchi intorno a
 Angarano (G. Mont.) Ver. (Moss.) Vittorio (Sacc.) - Vallarano (Bolani.)
 M. Baldo (Venturi), Vic. (Dicks.) Rincina (Cald.) - Montello (Sacc.)
Dicranella polichiana Grav. Bell. (Mol.)
Dicranella rufescens (Turn.) Schimper. Montello, in siti argillosi umid.
 (Sacc.)
Dicranella heteromalla (Hedw.) B.S.G. Montello nei fit. argillosi,
 ovunque portatissimo (Sacc.) Ver. (Leg.) Pad. (T.)

Siranella varia (Hedw.) Schmp. Treviso, Selva, Vittorio
Augarano (G. Mont.) Padova, etc. frequentissima (Sacc. Ber.
Bapt. (Blthm.) Pad. (T.) Pad (Sacc.)

Siranella subulata Schmp. Bell. Agordo (Mol.)

Siranella sicilliana Schmp. Recoaro (Venturi)

Siranum scoparium (L.) Hedw. B. Montello e Causiglio
Cadore (Venturi) (Sacc.) - pr. Bopano (Blthm.) - Tri-
fino (Mugna) - Eugani. (Sacc.) Chia-
vari (Vicenza) - Boecina (Bracht)
Bell. (Mol.) Udine (Sacc.)
Liguria orient. (Cald.) Ver. (P.) Vic. (Sacc.)

S. orthophyllum Bell. (M.) - Lovello (M)

Siranum undulatum B.S.G. B. Montello, molto più copioso e frequente
fero del *S. scoparium* (Sacc.)
Pad (T.) Cadore (Venturi) - Brago, Augarano (G. Mont.)

Siranum montanum Hedw. Si tronchi fracid. nel Causiglio
raro e sterile (Sacc.)

Siranum Sauber. B.S.G. Nel f. Causiglio, appressi dei faggi
Montalora, (di Strigno) Val Sugana (Monti) bss. Si distingue bene dal *S. lasifolium*, per
ala e alba in valle di Fassa (Venturi) il nervo fogliare è più sottile, occupando
un quinto circa e non un terzo delle dimensioni
della lamina fogliare)

Siranum longifolium Hedw. B. Causiglio, raro (Sacc.)
Comuni (Spranzi) - Rabbì (Venturi)
Bapt. (Mont.) Lovello (M) Valstagna Montebelluna (G. Mont.)

Siranum Muehlenbeckii B.S.G. Ne. colli della Tombola presso
Conegliano, sterile (Sacc.) Bell. (Mol.)
Val di Fiemme (Venturi)

Siranum Bonjeani D.Mts. (*S. palustre* B.S.G.) Nelle paludi
a Tarzo, assieme agli *Sfagni* etc, sterile

(Sacc.) Ampuzzo (Molendo)
var. juniperifolium In fagetis M. Baldo (Venturi)
canodontium longirostre (W.M.) B. S. G. B. Consiglio (Bereng.)
canodontium latifolium B. S. G. Lago Tedesco, Padoa (M^{do})
canodontium cernuus B. S. G. Ampuzzo (M^{do})
canodontium luridus (Horn.) Spr. Alle Piane o Nerese, Corolo etc.;
Padoa veli O. bot. (Sacc.) Pad. (T.)

Verona (M^{do})
canodontium rubellus (Rth.) B. S. G. Bono Consiglio; frequente
Monego (M) (Sacc.) Rabbi (Venturi) Pad. (T.) Bell. (M.)
mun. d. Padoa (S.)

canodontium foliosum (L.) B. S. G. frequente. Simo nei laghi argillif.
apici del B. Mantello (Sacc.) Cadore
(M^{do})

canodontium capillatum (L.) B. S. G. Bono Consiglio e mont. intorno
Vittorio (Sacc.) - Vicent. I Com. (Spr.)
Rabbi (Vent.) Ver. Vic. (P.) Bell. (M^{do}) Eug. (T.)
Asiago, Collalti, Valtiano, Portole (G. Montini) Cadore (Ventre)

canodontium inclinatum (Hedw.) B. S. G. M. Baldo (Venturi) Bell. (M^{do})
canodontium nigritum Br. D. Bell. M. Cristallo (M^{do}) Montalun (G. Montini)
canodontium boreale Sw. Bell. (M^{do})

canodontium concinnum (Dicks.) Schimp. Nei pascoli intorno Vittorio e
lungo il fiume (Sacc.) Sterile Bell. (M^{do}) Ver. (D. M^{do})

canodontium repens (Schwägr.) D. M^{do}. Bassano, e sp. (Mont. D. M^{do})
canodontium cladorrhizans (Hedw.) Schimp. Mantello, Colforno, Can-
figlio (Sacc.) - mont. Vicent. (Spr.) -
Bassano (Bereng.) Eug. (Menes)

canodontium heteromalla (Hedw.) Mohr. Sui tronchi degli alberi campestri
nel Tringiano o Padovano, freq. (Sacc.)
Udine (Ruell.)

Cynodontium virens ^(Hörnerum) (Hedw.) Schimp. Nelle alpi de T. Comun. v.
 ^{Arrago, Collalti (G. Mont.)} tnu. (Sprang, Mont. h.) - Bell. (M^o)
 - *B. serratum* Bell. (M^o) Ver.!

Cynodontium polycarpum Schp. *p. strumiferum* Ver. (Poll. Bert.)
 Climacium dendroideum (L.) Web. Montello (Sac.) - Virent.
 ^{Angarano (G. Mont.)} Bapian. (Spr. Mont.) sterile.
 Ver. (Leg.) Vic. (M.) Pad. (T.) Ud. (Sup.)

Cinclidium stygium Sw. M. Tosan. p. Anzengo Ud. (M^o)
 Cinclidolus aquaticus (L.) B. S. G. Alle sorgenti del Me-
 no, pr. Vittorio, fruttifero a bbau.
 (Grachin, Sac. Bering.) Ver.
 Vic. (Stem.) Pad. (T.)

Cinclidolus riparius (Hedw.) B. S. G. Alle sponde del Sile
 e sui molini a Treviso (Sac.)
 sterile. - Ud. (Conell, Sudb.)

Cinclidolus fontinaloides (Hedw.) Beauv. Alle sorgenti del
 Meno e nelle roccie lungo il suo
 corso pr. Vittorio (Sac.) di va
 fruttif. (Sac.) - Bapian ^{Angarano} (Mont. h.)
 Ver. Vic. (Poll.) Pad. (T.)

Ceratodon purpureus (L.) Brid. Raro nelle sabbie del Pian
 a Ranca (Sac.) - abb. copioso
 nel Cautiglio (Sac.) - Sale p.
 Parma (Bering.) Ver. (P.) Bell. (Mol.)
 Pad. (T.) Ven. (M.) Collalti (G. Mont.)

Campythecium tuterens (Hud.) Schimp. Montello, Ceneda (Sac.)
 Treviso (Bering.) Ver. (Poll.) Bell. (M^o)
 Pad. (T.) Ven. (Mau.) Vicenza (Magna)
 Michele (G. Montini)

Campythecium nitens Schimp. Anzengo (M^o) - Ver. (P.) Portole (G. Mont.)
 Ceratodon polivatus Spr. (Gr. arthrop.) Pad. (Trev.)

1784

2

2

He,

Q. M.

2

24

L

1

1

2

1



~~num~~ *hypnium* W. M. Nelle paludi intorno il Lago d.
Tago, non copioso e stente (Sav.)

~~num~~ *fluitans* (Dill.) Hedw. Negl. stagn. palustr. Del B.
Causiglio, stente (Sav.) - Paludic
bono Tiverto (Sav.) - Manzo (M.)
- ~~*β falcatum*~~ B. S. G. Colle specio vel Causiglio (Sav.)

~~num~~ *Kueiffii* (B. S. G.) Schimper. Negl. stagn. Del B.
Montell. (Sav.) - Castel d'Arno, Rover
bella ^(robusta) (Masi) - Ravenna (Cald.) Ver (Masi.)
- ~~*β subtilissimum*~~ (var. *tenuis* Lorentz.) ramis gra
cilibus elongatis microphyllis amove
virentibus - Prati palustr. intorno
il Meno a Vittorio (Sav.)

~~num~~ *caprethiforme* L. Comune ovunque. Ticino. Pad. Bell.
Zovello (M) (Sav.) - Vicent. (Sprunz. Bell.)
Liguria (Vicente) Ver. Pad. Vic. M. Vercy.
Angarano (G. Mont.) M. Berici (Magna)

~~var.~~ *elatum* Schimper
depressum
obtusum
β forense et. } comun. promiscuamente alle specie

~~num~~ *arcuatum* Lindb. (*H. patientiae* Lindb. post.)
H. poratae *β hamatum* Schimper.
Nei luoghi erbose umide. Del Mon.
tello, lungo il fiume a Verroja
et (Sav.) - M. Baldo alle acque
vere (Venturi)

~~num~~ *fulcatum* Schimper M. Gallo Bell (M.)

~~Hypnum~~ rugosum Ehrh. Nei luoghi erbosi. fechi. dei colli
e dei monti. p. o. B. Montello
B. Causiglio (Sacc.) - Pad (T.) Bell.
Sammanno (G. Mont.)

~~Hypnum~~ reptile e integrifolium Grev. Ne. luoghi umidi putrescenti
del B. Causiglio, raro (Sacc.)

~~Hypnum~~ Haldanianum Bassano (Mont. u. Diks)

~~Hypnum~~ chrysophyllum Brid. Sulle rupi del B. Montello
a var. protensum ala (Venturi) piuttosto raro (Sacc.) - Pad (T.) Bell.

~~Hypnum~~ stellatum Schreb. Negli argini murali del Piave,
raramente Saccus, copioso, e non
di rado putrefero (Sacc.) Pad. (T.) Bell.
Verona (Mont.)

~~Hypnum~~ commutatum Hedw. Nella situazione palustre acquosa
presso a Narvesa, Treviso, Vittorio
100 Collalti Augustano (G. Mont.) (Sacc.) - Vicent. (Loranz.)
M. Guzo (B. Rom.) Ver. (Bell.) Pad (T.) Bell.
- β falcatum (Bridel) Luoghi acquinosi presso Vittorio
(Sacc.)

~~Hypnum~~ filicinum L. Alle sponde del Piave e del Mese,
Abago, Gallico Augustano (G. Mont.) M. Amaro (Mont.) M. (M.)
polixum Diks. (Sacc.) - Pavia (Venturi) (Sacc.) Verona (Mont.)
Ario (Venturi) Pad (T.) Bell. (M.)

~~Hypnum~~ intermedium L. udb. Milde (H. C. von Schimp.)
(Hypnum) Leudneri Schimp. (H. aduncum Brid. var. sp.
auch.) Nelle zone palustri intorno
no Treviso, sterile (Sacc.) -
è nel lago di Targa e nei
prati acquinosi a Carpesine
(Sacc.) - sterile

~~Hypnum~~ revolutum Sw. Bell. lago Misurina (Mol.)

Stellinum uncinatum Hedw. Frequente appie dei tronchi vec-
chi dei faggi nel B. Consiglio
Colletti (G. Mont.) Lorno (Vent.)
(Bereng. Saccardo) Ver. (P.) Bell. (M^o)

Stellinum fastigiatum Brid. M. Cristall. Bell. (M^o)
Stellinum cuspidatum L. Nei luoghi erbosi in pi. umidi a S. Lora
intermedium
var. ~~fastigiatum~~ - Prati
uliginosi a Vittorio (Sacc.)
Trevise, Rovereto, Padov. etc. (Sacc.) -
Vicentino (B. Ber.) Ver. M^o. Pad. Ven. (Zwilling) (M^o)

Stellinum Lauteri B. S. S. M. Cristall. Bell. (M^o) Verona (M. Sacc.) Asiago, Mussolente (G. Mont.)

Stellinum Sambergeri Schimp. M. Cristall. Bell. (M^o) Impero (M^o)

Stellinum moluscum Hedw. Tutte m. p. e a terra nel B.
Montello e B. Consiglio (Sacc.) -
Vicentino, Trieste, Vallerana, (Mugna,
B. Ber.) Ver. Pad. M^o. Bell. Aman (M)
Genova (Orione, Cald.) Mugna. Colletti (G. Mont.)

Stellinum Vaucherii Lesq. Algh. Capite, Sottoguda, Rou. Bell. (M^o)

Stellinum Halleri L. fil. Bosco Consiglio, abbat. copioso (Sacc.)
Tirolo, Tor. Grimm. (Venturi) Veron. (M^o)
Norveg. (Lor.) Montalun (G. Mont.)

Stellinum Schreberi W. Bosco Consiglio frutt. (Bereng. Sacc.)
Montello, lungo il Prave etc. sterile
(Sacc.) - Rabb. fert. (Venturi)
Pad. (T.) Colletti, Angarano (G. Mont.)

Stellinum purum L. Danj. sterile Fertile nel B.
Ver. (M^o) Montello (Sacc.) - Vicent. (S. M.)
Ver. Romano (Martini) Borsolo, Vallerana (G. Mont.)

Stellinum incurvatum Schrad. B. Montello di raro, e B. Consiglio
Aman (M) freq. (Sacc.) - Vicent. (Spr.) -
Castelbarco (Venturi) Ver. Pad. Bell.

Stellinum Heufleri Jurz. Mamolate (M^o)

~~Hypnum~~ Sommerfelti Myr. B. Montello sui tronchi e nelle
campagne vicine (Sacc.) - Borro
(B. Mont.) - Vi. Baldo (Venturi)

~~Hypnum~~ cordifolium Hedw. Intorno al lago di Tarzo in
luoghi torbidi (Sacc.) sterile. Ver. 11.

~~Hypnum~~ palustre L. Presso gli argini del Piave a Norve
dassente l'acqua (Sacc.) - Gruppo
(B. Mont.) - Vicus. S. Michele (B. Mont.)
Ver. (P.) Pad. (T.) - Bell (M^o) Angarano (M^o)

~~Subphacelocarpus~~ sui mulini a Selva, Graven (Sacc.)
M. Castelli. Bell. (M^o)

~~Hypnum~~ stramineum Dicks. Negl. stagn. palustri (Cames) del
B. Causiglio, insieme al H. fluvi-
ale (Sacc.) - sterile.

~~Hylacomium~~ biquestrum Schumpr. Comune nel B. Mon-
tello, ma per lo più sterile - copioso
nel B. Causiglio, e fertile (Sacc. B.)
- Bassan. (D. M.) - Chiavari (P. de
ne) - Ver. Vi. Pad. Ver. Anar. (M)
Colletti, S. Michele (G. Mont.)

~~Hylacomium~~ squarrosum (L.) Schumpr. B. Causiglio, na-
voro, ma sterile (Ber. Sacc.) Bell (M^o)

~~Hylacomium~~ laevis Schumpr. Ver. (P.) Pad. (T.)

~~Hylacomium~~ beirostre (Shrb.) B. S. G. Borro Montello,
di raro copios. pubescente (Sacc.) Ver. (P.)
Angarano (G. Mont.)

~~Hylacomium~~ splendens (Dill.) B. S. G. Copioso nel Montello,
ma sempre sterile. Comune anche
nel Causiglio, ma pubescente (Sacc.)
Ver. Vi. Pad. Ver. ^{Angarano} Colletti (G. Mont.)
S. Michele (G. Mont.)

M. Kreutz (Muzn, Spr. H.N.)

Locomium Oakesii (Pall.) Schimp. Hel B. Causidico, in lac
Marmolada (Molando) ghi. asciatt, in ficu al tt. uncinetura.
di raro e sterile (Sact.) - Serai, Padov. (M^{do})

malia lichomanoides (Schreb.) B. S. G. Penn. i tronchi degli
alberi presso Treviso (Béring. Gracchia)
Pad. (T.) Alpi del Cadore (Vento) Colletti (G. Mont.)

Malotheca sericeum (L.) B. S. G. Appie e sul domo degli
alberi comuni. Sclva, Trieste,
Vittorio, Caspicio, Padova (Sacc.) -
Vicent. (Spr. Blt. ^{magna} Mond.) -
Leguria (Picc.) Ver. Vic. Pad. Bell. Ven.
Bassano (G. Mont.) Angarano, Vallerano (G. Mont.)

Malothecium Philippeanum (Spruce) B. S. G. Valle Lupat. nel
B. Consiglio, fruttifero (Lac.) Bald (Veru)
Verona (ma Nat.)
divergens citata Hedw. Ver. Paol. Bell. (M^{do}) Monajo (M) Vicenza (all'onda)
Azzurro (B. Mont.) M. alto (Zav)

Dugesia striata Hedw. Ver. Paet. Bell. (M^o) Monejo (M) Vicuña (Atacama)
kerucadien, Anurphua B.S.S. Tedaj., Pada (M^o) Angarano (S. Mont.) / M. albo (Zava)

monostomum murale Spruce Schap. Alle rive del Sile in Treviso
(Venturi) — Forcelli Arianu e M. Baldo (Vent.)

univertum, tenuis Schp. - *Trinellongus* (M) - *Avesa* (Poll.)

~~monostomum~~ tortile Schwäg. Negl. intestini. Dei muni a Treviso,
Nervesa, Vittorio — a terra del Montebello (Sav.)
I. Eusebio Vic. (Psthu.) — Friuli (Vent.)
Ver. Pad. muni d'Adone! Vallerana (G. Munt.) Verona (G. Munt.)

gynostomum microstomum Hedw. In terra arenacea a Ranverso,
vel B. Montello, a Vittorio (Sav.) Paed. (17)

muricatus bicolor B. S. S. M. Cristallo Bell. (M^{do}) - Principio (Lardner)

amnothomus carinostre Ehrh. Ker. lugh. calcarei unid. : sopra una for.

1767 Pad (100) Taz. - Mafer, sui mui. waki a Navera,
 Amaro (M.) Reine, Taz. (Sau.) Pad. Bell. Valmuna (M)
 muntumun rufesthe Schw. Bell. Sera. pr. Agordo (M)

~~Orthotrichum~~ *neglectum* ? Minajo (Miraf.)

~~Orthotrichum~~ *anomalous* Hedw. Piane Montello, Cautiglio, Vithrio, Padov. or bot. (Sacc.)
Zwello (M) Vicent. (Bibl. ^{magna} Spr.) Ver. Pad.

~~Orthotrichum~~ *stramineum* Horns. Su. tronchi. Delfi albei vel D. Cautiglio e Montello, non corrispondente (Sacc.) -
Tirol. merid. (Ventur.) - Baldo (Vent.)

~~Orthotrichum~~ *affine* Schrad. Sa. tronchi. Delfi albei vel Trivignano (Sacc.) - Svezia (Lor.)
Ver. (P.) Padova.

~~Orthotrichum~~ *speciosum* Nees Su. rami. Delfi albei. vecchi vel D. Cautiglio e Montello (Sacc.)

~~Orthotrichum~~ *fallax* Schimp. Su. tronchi. Delfi albei vecchi e Selva? (Sacc.) - Pad. (T.) Sacc.)
Tirol. merid. (Vent.) Alpi del Cadore (Vinc.)

~~Orthotrichum~~ *leuellum* Bruch Sa. tronchi. Delfi albei campestri in tutto il Trivignano (Sacc.)
Liguria (Piane) Amaro (M) Angarano (G. Mont.)

~~Orthotrichum~~ *leiocarpum* B. S. G. Montello, Cautiglio (Sacc.) - Treviso (Bérenq.)
Ver. Pad. Verc. Ud. Angarano (G. Mont.)

~~Orthotrichum~~ *daphanum* Sm. Su. tronchi. vecchi e Jullo laro Angarano (G. Mont.) e traor. umide a Selva ed. altrove comuni. (Sacc.) - Pad. (H.)
Genova (Piane) Amaro (M)

~~Orthotrichum~~ *capulatum* Hoffm. Ver. (P.) - Nelle fessure dei muretti del Piave a Narvesa; formi sulle H. Bot. Patavino.

Heium Myurum Bid. Montello, Causiglio, comune (Sacc.)
Pad. (T.) Monjo (M.)
— *B. robustum* Montello (Sacc.)

Lotrichum glaucescens (Hedro.) Hampe Sulle rupi calcaree, umide
del B. Causiglio, insieme a *Lieria julacea*.
(Sacc.) — Genova (Cald.)

Lotrichum flexicaule (Schwäg.) Hampe. Lungo gl. argini
del Pave a Novara, Corbo, stent. — nel
Causiglio, fertile (Pérenq. Sacc.) Ver. Bell. Pad!
Tiro. (Venturi) Amaro (M.) Vette di Seltre (G. Mont.)
— *A. densum* Caus. stent. (Sacc.)

Lotrichum tortile (Schrad.) Hampe. Luoghi argillosi del B.
Montello, con caale più o meno alto
(Sacc.) Cadore (Vairo/Argarino (G. M.))

Lotrichum pallidum (Schreb.) — Hampe Ne. luoghi argillosi opri
ci del Montello e dei colli di Casarano,
inferius a Pleuridium, alternif. (Sacc.)
S. Michele pr. Bass. (G. Mont.) Ver. (M)

Leptobryum pyriforme (L.) Schimp. Nelle rupi umide lungo il
Pave a Corbo, e negli interstizi dei muri
a bacio a Selva (Sacc.) Vic. Pad.
Montidistretto (G. Mont.)

Leucodon sciuroides (L.) Schwäg. Su tronchi degli alberi nel Tri-
giaro, Bellun. Pad. (Sacc.) Argarino (G. Mont.)
Vicent. (Spr. ^{magna} Mont.) Ver. Vic. Pad. Bell. Ver.
Liguria (Vic. Cald.) Zwick. (M)

Leptodon Smithii (Dicks.) Mohr. sui tronchi degli alberi presso
Vicenza (Sacc.) - Pad. Ven. Mbo (Sacc.)
Liguria (Pruone) - Firenze (Cald.) (P. Levis)

Leucobryum vulgare (L.) Hpe Martello, copiosamente (Sacc.)
Romano Baff. (Blom.) - Potsdam (M.)
Vic. - Pall. Angarano, Mussolente (G. Mont.)

Leskea polycarpa Th. sui tronchi degli alberi nel Tirolo
comune. (Sacc.) - Pad. (T.)

Leskea nervosa Myn. Baldo. (Vent.) Vette di Feltr. (G. Mont.)

Phascum bryoides Dicks. Treviso, Merrefa, Padon (ort. bot.)
(Sacc.) - Mestre (Vent.) Treviso
(Vent.) - Pad. (T.)

Phascum cuspidatum Schreb. Selva, Graven (Sacc.) -
Treviso (Vent.) Pad. (T.) A.B.P.!

Philonotis fontana Brid (L.) Lungo i margini argillosi dei
fonti a Selva, Graven ch. str.
var. *falcata* Potol. Montebelluna (Sacc.) - Bassan. (Blom. Montebelluna)
(G. Mont.) Ver. Vic. Pad. - Monigo (M.) (Sacc. Montebelluna)

Philonotis marchica (W.) - Brid. Nel lago di Tago, sempre
frutti (Sacc.) - Agro Vicentino, (Sacc.)
(Mughe) - Udine (Péreg.)
Liguria (Pruone).

Philonotis calcarea B.S.G. Vero e rosce umide
in rotte, calcaree nei monti intorno
a Vittorio, insieme ad *Hypnum stellatum*
e *Bryum pseudotriquetrum* etc.
(Sacc.) sterile; Monigo (M.)

Physcomitrella patens (Hedw.) Schimper. Alle sponde del Sile in
Trevise (Venturi)

Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. Selva, Treviso, Padova,
comun. (Sacc.) - Ver. Pad. Ven. Pad!
Vicenza (Allerh.)

Agrothecium silvaticum (L.) B. S. G. Nei luoghi argillosi uni.
M. Baldo (Venturi) di del B. Cansiglio (Bérenq.)
- β orthocladum B. Montello (Sacc.)

Agrothecium pulchellum Schimper. Lago Misurina e Padova (Mdo)

Agrothecium filicinum (Selig.) B. S. G. Sui tronchi fracid.
degli alberi nel B. Cansiglio, comun.
e spesso associato al *P. denticulatum*.
(Sacc.) Collalti, Vallerana (G. Mont.) Verona (Mattiabriga)

Agrothecium undulatum Schimper. M. Bassano (Menegh.) Abate (G. Mont.)

Agrothecium denticulatum (Dill.) B. S. G. Nei tronchi fracid. del
B. Cansiglio (Bér. Sacc.) - Pad. (T.)
Bassano (Blum.) Angarano (G. Mont.)

Agrothecium plicatum Schimper. Baldo (Dill.) - Cristallo, Pedago (Mdo)

Leucidium alternifolium (Brid.) B. S. G. Nei luoghi argillosi
del B. Montello, copiosamente (Sacc.)
nelle paludi sabbie a Venezia (Venturi)

- β stagnicola
vivace, caule elongato, proceriore. stagn.
del Montello (Sacc.) - Obs. fructu anni precedenti adrem
in basi caulis cum fructibus novellis.

Opp. Non ho ancora constatato sicuramente il *P. subulatum*.

Leucidium subulatum B. S. G. Pad. (Trev.)

Leucidium urnigerum (L.) B. S. G. Montello (Sacc.) - Cansiglio
(Bér. Sacc.) - Vette, Angarano (G. Mont.)
Lomb. (Bracht) - Abate (Vonnemann)
- Toxan. (Cald.) - Pad. (T.) Canis (M)

~~*Pogonatum*~~ ~~*brachythecium*~~ capuli brevioris Coll. d. Trifino (Mug.)
~~*Pogonatum*~~ *alpinum* (L.) Rthl. In Anno Comm. (M.) vinct. (Trifino)
~~*Pogonatum*~~ *nanum* Beauv. (Xll. L.) - B. Causiglio (Ber.)
Ver. (P.) - Vic. Pad. Udin. Alago, Collati (G. Mont.)
~~*Pogonatum*~~ *aloides* (Hedw.) Beauv. B. Montello e vicinaz
ze, copiosiss. (Sacc.) - Trifino
(Mugna) - Liguri. (Piccone) Ver. Pad. D.
(M. amaran (M.) Michele (G. Mont.)

~~*Polytrichum*~~ *formosum* Hedw. Comune Trifino vel Montello
(Sacc.) vel Vicentini (Sper. d. M.)
vel B. Causiglio, meno comune (Ber.)
Liguria (Vic. Cald.) - Pad. (Tr.)
Euganei (Sacc.) Michele, Monteban (G. Mont.)
Verona (Mass.)

~~*Polytrichum*~~ *commune* L. Comune vel B. Causiglio (Ber.)
Angarano (G. Mont.) Sacc.) - e molto più raro vel
Montello (Ber. Sacc.) Ver. Vic. Pad. Bell. G.
Eiceli del B. Montello, raro (Sacc.)

~~*Polytrichum*~~ *minus*
~~*Polytrichum*~~ *piliferum* Schreb. Montello, parzialmente fruttifera
(Sacc.) - Vicent. Trifino (Mugna)
Sola per Parme (Ber.) Pad. (T.)

~~*Polytrichum*~~ *juniperinum* Hedw. M. veneti (Falconelli) -
Portole, Trifino (G. Mont.) Cadore (Ventre). Ligna (Cald.) - Ver. Pad. Zuello (M.)
monteban
~~*Polytrichum*~~ *strictum* (Menz.) B. Causiglio, sterile (Sacc.)
Cadore (Ventre) fruttif.

~~*Polytrichum*~~ *gracile* Menz. Negli stagni palustri, sfagnosi,
(lame) del B. Causiglio, sterile
(Sacc.) Angarano (G. Mont.)
Euganei (Menz. d. Mbs.)

~~*Pottia*~~ *carisfolia* Ehrh.

~~*Pottia*~~ *truncata* (L.) B. P. S. Selva, Treviso, Pederobba,
(Sacc.) - Ver. Pad.

β major. B.S.G. Vittorio, Treviso, Euganei (Sacc.) Treviso
minutula B.S.G. Treviso (Venturi)

Isia polyantha (Schreb.) Schimper Montello, Colfioro, Selva
na comune (Sacc.) - Causiglio (Bérenz.)
Valdagno (Blum.) - Bassano (Blum.)
Ver. Pad. Angarano, Valdagno (G.Mont.)

Isia catenulata (Brid.) B.S.G. B. Causiglio, Nante
(Sacc.) - Bell. (M^d) Valle di Strigno (G.Mont.)

Isia atrovirens B.S.G. Pad. (T.) - Bell. (M^d)

Isia filiforme Hedw. Su. simili degli alberi nel B. Causiglio
(Bér. Sacc.) fruttiferi - Ver. (P.)

Collalti, M. Alolone (G.Mont.) Argenta (Piccone) - M. Amaro (M.)
- *β heteroptera* Rabb. (Venturi) Bell. (M^d)

Isia polyphylla B.S.G. Veron. (Bell. Bér.)

Isia cristata-castanea (L.) Sacc. B. Causiglio, frutt. (Sacc.)
Tidolo (Venturi) Angarano (G.Mont.)

Isia gracile Sw. Pad. (T.)

Isia confertum (Dicks.) - B.S.G. Treviso &

Vicenza (Allardi)

Amaro (Morici)

Montello, non comune (Sacc.)

Liguria (Piccone) - Bassano (Blum.)

Ver. Pad. Amaro (M^d) Angarano (G.Mont.)

Isia megapolitana (Bland.) B.S.G. v. meridionale -
Lido di Venezia (Venturi) Ort. bot. Pad!

Isia depressum (Brach.) - B.S.G. Sub imp. terrose uni-
de del B. Montello, non raro (Sacc.)

Isia murale (Hedw.) B.S.G. Selva, Vittorio, Montello,
Angarano, Valdagno (G.Mont.) Nervesa (Sacc.) - Vicenza Bass. (Blum.)
Veron. (Blum.) Ver. Pad. Bell. Pad. (L.)

β julaceum Causiglio (Sacc.) - Bass. (Blum.)

Isia lanuginosum Brid. Pad. (T.)

Isia caerulea Brid. Ver. Pad. Ver. - Zavello (M^d) Bassano, Romano, Angarano
Valdagno (G.Mont.)

Rhynchosetium Teesdali (Sm.) Bono Mantello, e sulle lavande
Pad. B. De meridionale a Selva (Sacc.)

Rhynchosetium tenellum (Brid.) - B.S.G. Mantello, Canziani, Se
Vittorio, Trento, Piane, (Sacc.)
Vicenza (Sprunz) Ver. Pad. Angarano (Mazz)

Rhynchosetium musciforme B.S. Alle mie del Piane, del S.
Argento (M.) Argento (Pachia) Bonariva (Mazz) sulle lavande dei ruderi a Selva; alle
Zucchi (M.) Pad. Ver. genti del Merco etc. (Sacc.) - Sordani
Sordani del Merco (Sacc.)

Seligeria histrica B.S. M. Cristallo (Mazz)

Seligeria pusilla (Hedw.) B.S. S. Sulle rupi nel B. Mantello
inferiore ad Anodis, Dorianus, più raro:
Lungo il Piane, nei monti a Vittorio
nel Canziani etc. (Sacc.) Ver. Pad. B. Mazz

Off. Nelle rupi calcaree del Mantello raccolte
in esemplari giovanili, che vennero infatti
S. calcarea dal dr. Venturi: vi fatto l'analisi
e foglie più brevi e all'apice più crassate
e nervose: però non corrispondono bene a
figura della *Bryol. europ.*, la quale
le foglie larghissime alla base e proporzionate
lasci all'apice (secondo il maggior numero di più
Cassiole che la S. pusilla è molto
brevi, mostrando nella stessa individuo foglie
ottere, largam-quali alla base, e foglie
breve, lunghe, acuminata, e quasi nulla più
alla base, peraltro a ritardare questi effetti
sotto la S. pusilla.

Seligeria recurvata B.S. S. Recaro (Venturi) Capri (Mazz)

Splachnum ampullaceum L. Mont. Bassi (Mord. Dicks) Bassi di Marcellina

Splachnum sphaericum L. fit. Landro (Mazz) Cade (Mazz)

Splachnum tenue Hook et Tayl. Amp. (Mazz)

~~Cladium~~ *cymbifolium* (Dill.) Ehrh. Laghetto d. Tarzo e lame del
Carpizlio (Sacc.) - Recoaro (Blum.)

~~Cladium~~ *purpuraceum* Lame del Carpizlio (Sacc.) - Monigo (Blum.)

~~Cladium~~ *subsecundum* Nees Laghetto d. Tarzo (Sacc.)

~~Cladium~~ *flavum* Laghetto d. Tarzo (Sacc.)

~~Cladium~~ *contortum* Pad. (T.)

~~Cladium~~ *cuspidatum* Ehrh. Nelle lame del B. Carpizlio (Sacc.)

~~Cladium~~ *acutifolium* (Dill.) Ehrh. Laghetto d. Tarzo (Sacc.) -
M. Patole (Blum.) - Vic. (P.) Monigo (Blum.)
Boschi di Alago (Mont.)

~~Cladium~~ *purpureum* Laghetto d. Tarzo (Sacc.) *confus.* ^{re}
~~Cladium~~ *rigidum* N. H. *pedale* (M^o) *compactum* ^{Palud. di Marcellina (Mont.)} Pad. (Muegl.)

~~Cladium~~ *crispum* (Hedw.) Schumpr. Nei campi a Selva infossati
al Phanum cuspidatum. (Sacc.)

~~Cladium~~ ^(Brachythecium) *opodum*, *ilicetum* Schumpr. Pad. (T.)

~~Cladium~~ *pellucida* (L.) Hedw. In legu. fac. d. umidi nel
B. Carpizlio (Ber. Sacc.) Ver. Pad.

~~Cladium~~ *alopecurum* (L.) Schumpr. Rupi. calcaree del B.
Montello, copios. frutifer. - Cened.
(Sacc.) - Pegli (Cold.) Ver. Pad.

~~Cladium~~ *abietinum* (L.) B. S. G. Parcolie rupi. apice del Montello,
del Carpizlio, d. Selva, Canale etc. sempre
feno (Sacc.) - Bassano (Blum.) Ver.
Pad. Bell. Colletti (Mont.)

~~Cladium~~ *lamariscinum* (Hedw.) B. S. G. Montello, non copioso frut.
(Sacc.) - Ver. Pad. Bell. Venet.
Chiavari (Picard)

~~Thuridius~~ delicatulum (L.) B.S.G. M. paroli. Del Mantello e
delle campagne; fruttifer. solo nel Ma-
tello (Sac.) - Ver. Pad.
Collalt' (Mont. M.)

~~Trichostomum~~ boricum D.M. Colli. Geni. (D.M.)
~~Trichostomum~~ (Barbula Schvög.) sulle rupi e nelle fenditure de-
anomalum presso Vittorio, al lago Morto, (Sac.)
Schimper. presso il Causiglio (Bereng.)
Alvaro, sterile e lumeggiante (Sac.) per
Ingarano, Romano (Mont.)

~~Trichostomum~~ lophaceum Brid. In terra humidile, calcareo
Ario (Venturi) Ingarano, Ca' Erivo (Mont.) a Treviso (fuori porta Portello) Sac.
lungo il Brenta (Blum.) - Valle de
d'Adige (Venturi) - Eug. (Munich)

~~Trichostomum~~ (Desmatodon) convolutum Brid. Pad. (T.) Bell. (M.D.)

~~Trichostomum~~ crispulum Bruch. Nelle fessure degli argini del
Piave a Narvesa (Sac.)
Pontedecimo (Piccone)

~~Trichostomum~~ rigidulum (Dicks.) Sm. Nel B. Mantello in terra
In agro Tassiano (Venturi) umida, sulle rupi umide; lungo il Pi-
ave appresi degli argini (Sac.) Eug. Bell.
amaro (M) Sui muri del Piave a Narvesa, Corlo;
S. compactum. nei muri a Treviso, Ceneda; nel Causiglio
vifera e Didymoda rubella. (Sac.) -
Tirolo (Venturi)

~~Ulotia~~ Ludwigii Brid. Sui tronchi degli alberi nel B. Causiglio
vifera ad U. crisp. (Bereng.)
sulle giovani querce nel Mantello, vifera
(Sac.)

crispula Bruch, bei Bruch & rauc. Dopl. alben. mit B.
Causiglio (Lac.) - Gruppe (Blum.)

bera annottina Hedw. Appie' degli argini: raramente il Piau a Nang
Carolo etc. (Sed.) Sterile. - Ver. Vic.

hera cruda Schimper. *Caup. 100. hirta (Sac.) - Ver. (P.) - Bell. (Mol.)*

622 acuminate Sharp. Bald. (Vend.)

Ver! Pad. Zuello (M) Pad (S.) ^{Vallugant} Angarano (GM)

issa crispula Hedw. Ver. (P.) - Eug. (Ther.) Montaloni (J. Mont.)

Weisia truncicola D.Mts. sui tronchi annosi delle querce a
B. Montello, rara (Zanatta, Sacc.)
Sterile - L'areolazione delle foglie
perfettamente weisiaea e l'avvicina-
re poco alla *W. Breutoni*: per lo
gioco delle *W. truncicola* di D.Mts. qua-
lunque colla nostra: e così pure l'areolazione
truncicola.

v. *Barbula fragilis*

Weisia cirrhata Hedw. sui tetti e fra le fessure dei muri
a Selva, e Vittorio, un comune
(Sacc.) Ver. (P.) Venz. (Nac.)

Lieria julacea (Dicks.) Schimp. Nei luoghi umidi, tenaci; comu-
nissimi del B. Caufiglio, copiosi
fruttiferi (Sacc.)


Totale specie 218 329

B	Bygg
S.	Sauand.
M.	Molend.
Mor.	Morash.
Mall.	Mendelgo Ab.
Ber.	Bereuz.
V.	Ventun.
Bel.	Beltram.
T.	Treisan.
P.	Pollin.
Suff.	Suffen.
Vengo	Vengo.
M.	Mankin. Giovanni.
Spr.	Spranzi.
Stem.	Stemby.
Mu.	Muzen.
Ma	Mazan.
Traceln	Traceln.


Citare solo il Vento, se il muso si vocella
in altro 4 giorni concesso Venezia.


Citare la localita spedita solo per moneta
van.


Torre l'ammiraglio per gli altri di a. di ordine
gli esemplari



Muri. vietni: a cl. Dact. Allexich.
 Brachyph. rubellum Thiene, Sagaratto Vic.
 Tortula muralis Thiene, Vietina
 Immar. hypomelica Graud. Hypon. cuprifera
 Tortula unguiculata β . minorcarpa Bogua. atropurp. argentum
 Orthob. d. daphn. Schist. apocarp. Neurochel. squam.







2

